Le abbreviazioni riportate nella barra sottostante sono intuitive, ma preferisco egualmente riassumerle per chiarezza:

— nella tipologia **gx** sta per "galassia", **aa** per "ammasso aperto", **ag** per "ammasso globulare", **neb** per "nebulosa" (a emissione o riflessione), **nebo** per "nebulosa oscura", **qso** per "quasi stellar object" (quasar), **ss** per "sistema stellare", **aster** per "asterismo" (semplice raggruppamento stellare senza fisica correlazione fra le componenti); infine gli **knot** si riferiscono a piccole regioni H II o associazioni stellari situate nei bracci di galassie esterne.
— **AR** e **Dec** sono le usuali coordinate (in declinazione l'approssimazione è al decimo di primo d'arco) ricavate dal Megastar, il mio principale riferimento per le osservazioni.
— **Uran.** si riferisce all'Uranometria 2000 1ª edizione e numeri sotto riportati preceduti da una "q" (quadro) indicano la pagina dove si trova l'oggetto. E' indicato il quadro soltanto per gli oggetti effettivamente presenti nell'atlante; per gli altri valgono le semplici coordinate celesti. Per quegli oggetti situati presso i margini delle pagine (e che quindi sono presenti in più quadri) mi sono attenuto a quella riportata sul Megastar.
— **cost** è la costellazione di riferimento nella consueta sigla triletterale sancita nel 1930 dall'Unione Astronomica Internazionale.
— **Ø"** indica l'apertura dello strumento in pollici (secondo gli standard commerciali): per averla in cm. basta moltiplicare il valore per 2.54.
— nella penultima colonna sono infine riportate molto sinteticamente le condizioni meteo in termini di trasparenza e seeing.

Non ci sono link ipertestuali (come nelle corrispondenti pagine web). Ad ogni modo, su www.galassiere.it/aladin.html puoi digitare quello che ti occorre.

oggetto	tipol.	A.R.	Dec.	Uran.	cost.	Ø	traspar. / seeing	descrizione
NGC 1	gx	00h07m16s	+27°42.5'	q 125	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø 1' e un nucleo stellare molto evidente; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x.
NGC 2	gx	00h07m17s	+27°40.7'	q 125	Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina a 1' W — 450x.
NGC 3	gx	00h07m17s	+08°18.1'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole ovale di luminosità pressoché uniforme, allungata ~ da NW a SE, di dimensioni 40"×20", situato a poco più di 1' NE di una stellina brillante *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 4	gx	00h07m24s	+08°22.4'		Psc	24"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta e molto piccola, orientata da N a S con dimensioni di appena 20"×10" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' verso N (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 5	gx	00h07m49s	+35°21.7'	q 170	And	16"	buona / ottimo	piccola, debole, rotonda, abbastanza compatta, Ø max 30"; forma un piccolo triangolo isoscele molto schiacciato (l'angolo ottuso è rivolto a E) con 2 stelline; ce n'è un'altra più debole quasi a ridosso verso S, ma si vede solo a momenti — 380x.
NGC 7	gx	00h08m21s	−29°55.0'	q 350	Scl	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW (ossia a perpendicolo con le 2 stelle brillanti situate a S e con le quali forma un triangolo rettangolo) con dimensioni 80"×20" — 270x.
NGC 8	ss	00h08m45s	+23°50.3'	q 125	Peg	16"	ottima / discreto	debolissima e molto piccola, di aspetto stellare a bassi ingrandimenti, estesa sì e no una decina di secondi; appare in visione distolta quando si osserva NGC 9 dalla quale dista 3' a NW (si tratta in realtà di una doppia stretta di 15-esima scoperta da Struve nel 1865) — 380x.
NGC 9	gx	00h08m54s	+23°49.0'	q 125	Peg	16"	ottima / discreto	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N-S con dimensioni 45"×30" — 380x.
NGC 10	gx	00h08m35s	−33°51.5'	q 350	Scl	16"	ottima / ottimo	appare molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 90"×45", ma è preferibile scalare a 188x.
NGC 11	gx	00h08m43s	+37°26.9'	q 89	And	24"	m. buona / buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, debolmente screziata a 450x, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20"; allineata ed equidistante con una doppia stretta e brillante situata 3' a N e un'altra stella ancora più a N (la gx era a mala pena osservabile in visione indiretta nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 12	gx	00h08m45s	+04°36.7'	q 260	Psc	16"	ottima / buono	molto debole, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi o poco più e di luminosità uniforme; salta fuori facilmente in visione distolta a 270x.
NGC 13	gx	00h08m48s	+33°26.0'	q 89	And	16"	m. buona / buono	molto allungata da NE a SW ed estesa per una paio di primi; presenta un bulge rotonda con Ø di ~ 20" molto più evidente del disco e un nucleo stella re visibile a tratti; c'è una stellina a ridosso verso S — 270x.
NGC 14	gx	00h08m46s	+15°48.9'	q 170	Peg	16"	discreta / buono	relativamente brillante, diffusa e poco più brillante verso l'interno, orientata all'incirca da N a S con dimensioni di 2'×1'; c'è una stellina abbastanza brillante a un paio di primi verso S — 208x.
NGC 15	gx	00h09m02s	+21°37.5'	q 125	Peg	16"	ottima / discreto	allungata da NE a SW per ca. 1' con bulge evidente; c'è una stellina appena percettibile verso l'estremità nord-orientale — 380x.
NGC 16	gx	00h09m05s	+27°43.8'	q 125	Peg	24"	m. buona / buono	bella, allungata da N a S, di dimensioni 90"×45", molto diffusa e con piccolo bulge molto brillante; debolmente screziata all'interno se osservata a 450x (era facilmente visibile anche nel 10" in condizioni di cielo discrete).
NGC 20	gx	00h09m33s	+33°18.6'	q 89	And	24"	m. buona / buono	è molto disturbata da una stella brillante situata a ridosso E del bulge; in visione distolta appare rotonda con Ø di 1' e gradatamente più brillante verso l'interno (era visibile molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 21	gx	00h10m41s	+32°59.0'	q 89	And	24"	m. buona / buono	poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; a tratti debolmente screziata (anche questa era molto debole nel 10" e di aspetto un po' confuso a 240x) — 450x.
NGC 22	gx	00h09m48s	+27°49.9'	q 89	Peg	24"	m. buona / buono	bolla circolare, diafana, di ~ 1' di Ø, diffusa e con gradiente di luce molto basso; c'è una stella brillante a 2.5' verso N (osservabile elusivamente nel 10" a 178x in condizioni di cielo buone) — 450x.
NGC 23	gx	00h09m54s	+25°55.4'	q 125	Peg	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 80"×40" e con nucleo stellare molto marcato (più luminoso della stellina a ridosso SE); la gx era facilmente osservabile nel 10" a 178x.
NGC 24	gx	00h09m57s	−24°57.7'	q 305	Scl	24"	ottima / buono	molto estesa, orientata da NE a SW, di dimensioni 5'×1.5', con bulge diffuso, poco contrastato sul disco e debolmente screziato; c'è una stellina brillante al bordo NE; la visione è comunque più interessante scalando a 340x (era facilmente visibile anche nel 10" a 178x).
NGC 26	gx	00h10m26s	+25°49.9'	q 125	Peg	24"	ottima / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, a prima vista rotonda, mentre in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 80"×60" — 450x.
NGC 27	gx	00h10m33s	+28°59.8'	q 89	And	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con UGC 95 situata a poco più di 1' verso W — molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge rotondo abbastanza contrastato; c'è una debole stellina a ridosso NW — 450x.
NGC 29	gx	00h10m41s	+33°21.1'	q 89	And	24"	m. buona / buono	poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30" e di luminosità pressoché uniforme, salvo il nucleo visibile tuttavia solo a momenti; c'è una stellina al bordo N (era osservabile senza difficoltà nel 10" a 176, anche se appariva di luminosità un po' irregolare, forse a causa della stellina che non riuscivo a risolvere).
NGC 34	gx	00h11m07s	−12°06.5'	q 34	Cet	16"	buona / buono	rotonda, con Ø max di 1', alto gradiente di luce, condensazione centrale molto marcata, poco diffusa; c'è una stellina doppia stretta a un paio di primi verso W — 188x.
NGC 35	gx	00h11m10s	−12°01.3'	q 260	Cet	16"	buona / buono	è di dimensioni simili a NGC 34, dalla quale dista 5' verso N, ma di forma più irregolare e più debole; c'è una stellina appena percettibile a 1' SSW — 188x.
NGC 36	gx	00h11m22s	+06°23.3'	q 170	Psc	16"	ottima / ottimo	debole, di aspetto un po' irregolare, con lievi discrepanze di luce all'interno; allungata ~ da N a S, di dimensioni 60"×40" — 380x.
NGC 38	gx	00h11m47s	−05°35.2'	q 260	Psc	16"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 1'; presenta un bulge piccolo e diffuso ben contrastato sul disco; c'è una stellina brillante a un paio di primi verso NW — 380x.
NGC 39	gx	00h12m19s	+31°03.7'	q 89	And	24"	m. buona / buono	piuttosto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina al bordo meridionale (la gx era visibile solo a tratti in visione distolta e con difficoltà nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 40	np	00h13m01s	+72°31.3'	q 15	Cep	24"	m. buona / m. buono	molto bella, di aspetto screziato, circondata da un anello sottile maggiormente marcato verso W; c'è una stellina molto debole al bordo meridionale; leggermente ovale e orientata da N a S con dimensioni 70"×60"; la stellina centrale è molto brillante; ricorda vagamente la NGC 4361 nel Corvo — 450x.
NGC 41	gx	00h12m48s	+22°01.4'	q 125	Peg	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
NGC 42	gx	00h12m56s	+22°06.0'	q 125	Peg	24"	m. buona / m. buono	estesa e orientata come NGC 41, ma poco più affusolata, di dimensioni 50"× 25", diffusa alle estremità NW e SE, con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
NGC 43	gx	00h13m01s	+30°54.9'	q 89	And	24"	m. buona / buono	rotonda con Ø di 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NW (la gx era facilmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 45	gx	00h14m04s	−23°10.9'	q 305	Cet	24"	ottima / buono	è una gx molto stemperata sul fondo cielo: anche scalando a 210x si fatica un po' a capirne le dimensioni osservandola in visione diretta; in distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 6'×4'; la parte più evidente è ovviamente costituita dal bulge, tondeggiante e poco contrastato con Ø di 1.5': questo è situato subito a N di una stellina brillante; un nodulo diffuso molto debole, ma facilmente riconoscibile soprattutto col filtro deepsky, si trova al bordo SE; e tuttavia la visione d'insieme non migliora sensibilmente col filtro, anche perché la gx è disturbata dalla SAO 166132 di 7ª grandezza situata quasi a ridosso SW.
NGC 47	gx	00h14m31s	−07°10.1'	q 260	Cet	16"	buona / m. buono	debole e molto diffusa, poco più brillante verso l'interno approssim. circolare con Ø di oltre 1' — 188x.
NGC 48	gx	00h14m02s	+48°14.1'	q 59	And	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; è allineata con NGC 49 e 51 situate a ENE (fa parte di un sestetto cui appartengono anche IC 1534, IC 1535 e IC 1536) — 450x.
NGC 49	gx	00h14m22s	+48°14.8'	q 59	And	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
NGC 50	gx	00h14m45s	−07°20.7'	q 260	Cet	16"	buona / m. buono	molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 1.5'×1'; presenta un piccolo bulge contrastato e un nucleo stellare — 188x.
NGC 51	gx	00h14m35s	+48°15.4'	q 59	And	24"	m. buona / buono	è la più brillante del sestetto di NGC 48: poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina molto debole al bordo SE; altre due stelline si trovano rispettivamente subito a W e a NE — 450x.
NGC 52	gx	00h14m40s	+18°34.9'	q 125	Peg	16"	ottima / discreto	è posta quasi di taglio, di luminosità pressoché uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per 1.5' — 270x.
NGC 54	gx	00h15m08s	−07°06.4'	q 260	Cet	16"	buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; presenta un bulge esteso poco più brillante dell'alone — 188x.
NGC 55	gx	00h15m08s	−39°12.9'	q 386	Scl	10"	buona / buono	è una galassia enorme, ma nel complesso piuttosto debole, molto allungata da WNW a WSE, di dimensioni ~ 30'×4' e molto diffusa; presenta un'estesa zona centrale più brillante orientata nella stessa direzione, ma palesemente spostata verso W; c'è una stellina brillante quasi a ridosso del bordo orientale e 2 più deboli a pochi primi verso S e SW; meglio evidente scalando a 63x.
NGC 57	gx	00h15m31s	+17°19.6'	q 125	Psc	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 1.5', debolmente screziata nella parte più interna a 450x; c'è una stellina a 1.5' SW e un'altra appena percettibile alla stessa distanza verso SE (osservabile abbastanza facilmente anche nel 10" a 178x).
NGC 59	gx	00h15m25s	−21°26.7'	q 305	Cet	16"	buona / buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1' con bulge esteso poco più brillante del disco — 188x.
NGC 60	gx	00h15m58s	−00°18.2'	q 215	Psc	16"	buona / ottimo	elusiva, visibile con molta difficoltà; estesa 40"-50" e visibile solo a tratti in una piccola zona di cielo depleta — 270x.
NGC 61A	gx	00h16m24s	−06°19.0'	q 261	Cet	16"	buona / discreto	assieme a **NGC 61B** tende a fondersi in un unico oggetto di dimensioni 60"×30" e orientato da N a S; a tratti, comunque, si riescono a separare: la 1ª è più grande, con Ø di 35"-40" e nucleo stellare abbastanza evidente; la 2ª, leggermente più compatta, ha invece Ø di 20"-25" — 270x.
NGC 61B	gx	00h16m24s	−06°19.3'	q 261	Cet	16"	buona / discreto	v. **NGC 61A**
NGC 62	gx	00h17m05s	−13°29.2'	q 261	Cet	16"	buona / buono	debole, con basso gradiente di luce, di forma un po' irregolare, di dimensioni max 1'; è situata tra 2 stelline molto deboli distanti 5' in direzione NE-SW — 188x.
NGC 63	gx	00h17m46s	+11°27.0'	q 171	Psc	24"	ottima / ottimo	bella, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 90"×45"; più interessante scalando a 340x (era facilmente osservabile nel 10" a 240x).
NGC 64	gx	00h17m30s	−06°49.5'	q 261	Cet	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NNE a SSW per un paio di primi; è situata in un campo ove sono presenti solo deboli stelline — 188x.
NGC 65	gx	00h18m59s	−22°52.8'	q 306	Cet	24"	m. buona / scarso	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 340x.
NGC 66	gx	00h19m05s	−22°56.3'	q 306	Cet	24"	m. buona / scarso	allungata da N a S con dimensioni 50"×25", poco diffusa e di luminosità uniforme; si trova tra la SAO 166184 di 10ª grandezza situata 1' a N e una stellina debole alla stessa distanza verso SW — 340x.
NGC 67	gx	00h18m15s	+30°03.8'	q 89	And	24"	ottima / buono	(fa parte, assieme a NGC 68, 69, 70, 72, 72A e 74, di un piccolo gruppo abbastanza compatto — è una piccola gx molto debole, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
NGC 68	gx	00h18m18s	+30°04.3'	q 89	And	24"	ottima / buono	è la più brillante del gruppo, rotonda con Ø di 1' scarso e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
NGC 69	gx	00h18m21s	+30°02.4'	q 89	And	24"	ottima / buono	è una piccola galassia rotonda e condensata di Ø poco superiore alla 67 e più facile da vedere a 450x.
NGC 70	gx	00h18m23s	+30°04.8'	q 89	And	24"	ottima / buono	sembra a prima vista di dimensioni inferiori alla 68, ma in visione distolta è in realtà molto diffusa, rotonda e con Ø analogo (il Ø è all'incirca pari alla distanza delle 2 stelline che ne lambiscono i bordi N e S) — 450x.
NGC 71	gx	00h18m24s	+30°03.8'	q 89	And	24"	ottima / buono	rotonda con Ø di 45" (ossia poco meno della 68 osservata prima) e con condensazione centrale evidente — 450x.
NGC 72	gx	00h18m28s	+30°02.4'	q 89	And	24"	ottima / buono	rotonda con Ø di 45, poco diffusa e con basso gradiente di luce — 450x.
NGC 72A	gx	00h18m34s	+30°02.1'	q 89	And	24"	ottima / buono	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e relativamente compatta — 450x.
NGC 73	gx	00h18m39s	−15°19.3'	q 261	Cet	16"	buona / m. buono	debole, allungata da NW a SE per max 1', presenta un nucleo molto piccolo, puntiforme; c'è una debole stellina doppia verso la zona orientale con componenti separate da una 20-ina di secondi — 188x.
NGC 74	gx	00h18m49s	+30°03.7'	q 89	And	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; meglio osservabile a 340x; è situata ~ 6' più a E del gruppo di NGC 68.
NGC 75	gx	00h19m26s	+06°26.9'	q 171	Psc	16"	m. buona / ottimo	macchiolina rotonda abbastanza brillante, con Ø di una 30-ina di secondi, gradatamente più brillante all'interno — 380x.
NGC 76	gx	00h19m38s	+29°56.1'	q 89	And	16"	ottima / buono	diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; si riesce a vedere facilmente nonostante la luna al primo quarto non sia ancora tramontata — 270x.
NGC 77	gx	00h20m01s	−22°31.9'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, visibile a momenti in visione distolta a 270x.
NGC 78A	gx	00h20m26s	+00°49.6'	q 216	Psc	16"	buona / ottimo	forma una coppia assieme a **NGC 78B** — si vedono due nuclei che a prima vista appaiono immersi in un'unica chiazza lattescente molto allungata da NE a SW; quello settentrionale è più brillante; tuttavia col seeing buono come stasera le 2 galassie si separano: quella a SW è molto allungata ~ E W, mentre quella a NE è un piccolo bozzolo circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
NGC 78B	gx	00h20m27s	+00°50.0'	q 216	Psc	16"	buona / ottimo	v. **NGC 78A**
NGC 79	gx	00h21m03s	+22°34.0'	q 126	And	16"	buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 132x.
NGC 80	gx	00h21m11s	+22°21.4'	q 126	And	16"	buona / discreto	è la più facile del gruppo, rotonda con Ø di oltre 1' e alto gradiente di luce — 132x.
NGC 81	gx	00h21m13s	+22°23.0'	q 126	And	16"	buona / discreto	questa è invece la più elusiva; si riesce a intravedere a momenti in visione distolta solo perché è molto piccola e compatta; situata a 1.5' a N di NGC 80 — 132x.
NGC 83	gx	00h21m22s	+22°26.0'	q 126	And	16"	buona / discreto	poco diffusa, rotonda con Ø di e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline brillanti a ridosso verso SE — 132x.
NGC 84	gx	00h21m34s	+22°35.5'	q 126	And	16"	buona / discreto	molto debole e di forma indistinta, osservabile solo in visione distolta — 132x.
NGC 85	gx	00h21m26s	+22°30.7'	q 126	And	16"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con **IC 1546** — le 2 gx si sdoppiano facilmente a 380x; la 1ª è poco più evidente, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale; la 2a, situata 1' scarso a SE, è poco allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale puntiforme — 380x.
NGC 86	gx	00h21m29s	+22°33.4'	q 126	And	16"	ottima / buono	allungata da N a S con piccola condensazione centrale abbastanza marcata; c'è una stellina brillante al bordo meridionale — 380x.
NGC 91	gx	00h21m52s	+22°24.0'	q 126	And	16"	buona / discreto	abbastanza evidente, con Ø di ~ 2', di luminosità pressoché uniforme, con una stellina abbastanza brillante situata a ~ 1' verso SW — 132x.
NGC 93	gx	00h22m03s	+22°24.5'	q 126	And	16"	buona / discreto	più brillante di NGC 91, dalla quale dista 3' scarsi verso E, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" e marcata condensazione centrale; situata subito a W di un minuscolo triangolo rettangolo di deboli stelline — 132x.
NGC 94	gx	00h22m14s	+22°29.0'	q 126	And	16"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare solo a momenti in visione laterale, estesa sì e no una 20-ina di secondi — 132x.
NGC 95	gx	00h22m14s	+10°29.5'	q 171	Psc	24"	ottima / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' e un piccolo bulge abbastanza contrastato; c'è una stellina brillante a un paio di primi NE (appariva molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 96	gx	00h22m18s	+22°32.8'	q 126	And	16"	buona / discreto	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 132x.
NGC 97	gx	00h22m30s	+29°44.7'	q 90	And	24"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e con aspetto a isofote: un nucleo stellare evidente è circondato da una zona abbastanza brillante con Ø di una 30-ina di secondi; quest'ultima è infine circonfusa da un alone tenue; c'è una stellina al bordo W — 450x.
NGC 99	gx	00h23m59s	+15°46.3'	q 171	Psc	16"	ottima / ottimo	piccola chiazza rotondeggiante, ma di forma un po' irregolare e luminosità pressoché uniforme, con Ø di 45"; c'è una stellina a 1.5' verso W — 380x.
NGC 100	gx	00h24m03s	+16°29.1'	q 171	Psc	16"	ottima / ottimo	debole lama di luce di luminosità uniforme estesa almeno 3' in direzione NE-SW (era osservabile in buone condizioni anche nel 10") — 380x.
NGC 101	gx	00h23m55s	−32°32.2'	q 351	Scl	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø > 1' e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 102	gx	00h24m36s	−13°57.4'	q 261	Cet	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; è difficile da trovare a 188x, perché situata in una zona depleta.
NGC 103	aa	00h25m18s	+61°19.3'	q 15	Cas	6"	discreta / buono	nel Comet Tracker a 30x è molto debole e sembra formato da due lobi ravvicinati orientati all'incirca da NE a SW; nel 15×80 appariva solo in visione laterale come una debolissima macchia estesa 3' o 4'.
NGC 105	gx	00h25m17s	+12°53.0'	q 171	Psc	16"	ottima / ottimo	allungata da N a S con dimensioni 60"×40", poco diffusa e con gradiente di luce molto basso; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso W — 380x.
NGC 106	gx	00h24m44s	−05°08.9'	q 261	Psc	16"	m. buona / ottimo	facile, poco diffusa, rotonda, con Ø inferiore a 1' e con evidente condensazione centrale — 380x.
NGC 107	gx	00h25m42s	−08°17.0'	q 261	Cet	16"	buona / m. buono	molto debole; a tratti, in visione distolta, appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; è di luminosità irregolare forse per la presenza di una o più debolissime stelline sovrapposte non risolvibili individualmente — 188x.
NGC 108	gx	00h26m00s	+29°12.7'	q 90	And	24"	m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1'; presenta un piccolo bulge abbastanza contrastato e un nucleo stellare visibile a tratti (debolmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 109	gx	00h26m15s	+21°48.4'	q 126	And	16"	m. buona / discreto	piccolo oggetto compatta, circolare, con Ø di ~ 45", appena più brillante verso l'interno; sembra di vedere, a tratti, una "barra" allungata da E a W — 270x.
NGC 110	aa	00h27m24s	+71°23.0'	q 15	Cas	10"	discreta / buono	piccolo gruppo povero e disperso di una dozzina di stelle quasi del tutto indistinguibile dal background; meglio evidente restando a 30x.
NGC 112	gx	00h26m49s	+31°42.2'	q 90	And	16"	ottima / ottimo	debole e di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 380x.
NGC 113	gx	00h26m55s	−02°30.1'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	facile, rotonda con Ø di 45", relativamente compatta e con alto gradiente di luce; interessante anche a 380x.
NGC 114	gx	00h26m58s	−01°47.2'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	rotonda, molto diffusa, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale evidente — 380x.
NGC 115	gx	00h26m47s	−33°40.6'	q 351	Scl	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 188x; è allungata da NW a SE con dimensioni ~ 60"×30".
NGC 116	gx	00h27m05s	−07°40.1'	q 261	Cet	16"	buona / m. buono	piccola, abbastanza compatta, allungata da NW a SE (o da WNW a ESE) per una 40-ina di secondi; un piccolo nucleo puntiforme è visibile solo a tratti — 188x.
NGC 117	gx	00h27m11s	+01°20.0'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	piccolo "sigaro" di luminosità uniforme, esteso una 30-ina di secondi e orientata da E a W; c'è una stellina molto debole a ridosso verso W — 380x.
NGC 118	gx	00h27m16s	−01°46.8'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi, più compatta della 114 e con condensazione centrale più marcata — 380x.
NGC 120	gx	00h27m30s	−01°30.8'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con bulge luminoso e un nucleo stellare che tuttavia potrebbe anche essere una stellina sovrapposta — 380x.
NGC 124	gx	00h27m52s	−01°48.6'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	debole ovale allungata da N a S, di dimensioni 80"×40" e con gradiente di luce molto basso di luce — 380x.
NGC 125	gx	00h28m50s	+02°50.3'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, molto diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso — 380x.
NGC 126	gx	00h29m08s	+02°48.7'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, allungata ca. da E a W con dimensioni 30"×20" — 380x.
NGC 127	gx	00h29m12s	+02°52.3'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	è la gx satellite occidentale della 128; rimane di aspetto quasi stellare anche a 270x, mentre a 380x si vede abbastanza chiaramente diffusa (si riusciva a intravedere anche nel 10").
NGC 128	gx	00h29m15s	+02°51.8'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	brillante, dai bordi abbastanza definiti, allungata da N a S, di dimensioni 80"×30", con bulge ben contrastato e nucleo stellare — 270x.
NGC 129	aa	00h29m54s	+60°13.0'	q 35	Cas	6"	discreta / buono	nel Comet Tracker a 30x è un gruppo piuttosto ricco di stelle nel quale risalta un piccolo triangolo rettangolo la cui componente più a NW, situata al centro dell'ammasso, è la DL Cas (già parzialmente risolto in un 15×80).
NGC 130	gx	00h29m19s	+02°52.2'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	questa è invece la gx satellite orientale della 128 che a 380x appare chiaramente allungata da NE a SW per una 15-ina di secondi (si riusciva a intravedere anche nel 10") — 380x.
NGC 131	gx	00h29m38s	−33°15.6'	q 351	Scl	10"	m. buona / buono	debolissima, è visibile in visione distolta a 63x, ma solo a momenti appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo 90"×30".
NGC 132	gx	00h30m11s	+02°05.6'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	facile, rotonda, estesa almeno 1', poco più brillante verso l'interno e molto diffusa; è una di quelle galassie a bassa luminanza superficiale — 380x.
NGC 133	aa	00h31m18s	+63°21.2'	q 15	Cas	10"	discreta / buono	gruppo molto piccolo e disperso di una dozzina di stelle — 126x.
NGC 134	gx	00h30m22s	−33°14.7'	q 351	Scl	10"	m. buona / buono	molto estesa e allungata in direzione NE-SW con dimensioni 6'×1.5' (ossia con rapporto degli assi di 4 a 1); i bordi appaiono piuttosto sfilacciati e all'interno sono presenti alcune irregolarità di luce, particolarmente evidenti a 178x; c'è una stellina percettibile a tratti a 1.5' verso SE.
NGC 135	gx	00h33m06s	−13°22.3'	q 261	Cet	16"	buona / m. buono	è un oggetto molto piccolo, rotondo con Ø di 15"-20", di aspetto quasi stellare se osservato in visione diretta a bassi ingrandimenti; è situata 2.5' WSW di una stellina brillante (è riportata sull'Uranometria come **IC 26**) — 188x.
NGC 137	gx	00h30m58s	+10°12.5'	q 171	Psc	16"	ottima / ottimo	piccola gx compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, relativamente brillante e con condensazione centrale evidente — 380x.
NGC 138	gx	00h30m59s	+05°09.6'	q 171	Psc	16"	m. buona / ottimo	abbastanza luminosa, ovale, con bulge marcato, allungata da N a S e dimensioni 40"×20" — 380x.
NGC 139	gx	00h31m07s	+05°04.7'	q 171	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S, dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso verso NE visibile a tratti — 380x.
NGC 140	gx	00h31m20s	+30°47.5'	q 90	And	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; c'è una coppia abbastanza serrata d debolissime stelline a ridosso SW; sempre a SW, ma poco più all'esterno, c'è un'altra stellina appena più brillante — 270x.
NGC 141	gx	00h31m17s	+05°10.8'	q 171	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; si nota a tratti un nodulo verso W — 380x.
NGC 142	gx	00h31m08s	−22°37.2'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	fa parte di un terzetto assieme a NGC 143 e 144 posto ai vertici di un triangolo rettangolo isoscele — chiazza diffusa, orientata da NW a SE con dimensioni ~ 60"×30"; presenta una tenue condensazione centrale osservabile a tratti; c'è una doppia stretta situata subito a N — 270x.
NGC 143	gx	00h31m16s	−22°33.6'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	è la più debole del terzetto: una piccola lama di luce estesa 40", orientata ~ da N a S con un nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 144	gx	00h31m21s	−22°38.7'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	facile, rotonda con Ø di ~ 45", poco diffusa e con basso gradiente di luce — 270x.
NGC 145	gx	00h31m46s	−05°09.2'	q 261	Cet	16"	m. buona / ottimo	facile, diffusa, con gradiente di luce molto basso e di aspetto un po' irregolare; è approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — 380x.
NGC 146	aa	00h33m06s	+63°18.0'	q 15	Cas	6"	discreta / buono	piccolo e compatto, situato una dozzina di primi a E di NGC 133.
NGC 147	gx	00h33m12s	+48°30.5'	q 60	Cas	16"	m. buona / discreto	debole e molto stemperata sul fondo cielo, con gradiente di luce molto basso di luce, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 5'×3' e con nucleo stellare marcato; appare poco più contrastata scalando a 188x.
NGC 148	gx	00h34m15s	−31°47.1'	q 351	Scl	10"	non registrati	è debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 60"×30".
NGC 149	gx	00h33m50s	+30°43.4'	q 90	And	16"	ottima / ottimo	potrebbe apparire di aspetto stellare a bassi ingrandimenti, perché è molto piccola, con Ø di una 20-ina di secondi una condensazione centrale marcata; è situata ~ 30" NE di una stellina brillante — 380x.
NGC 150	gx	00h34m16s	−27°48.3'	q 306	Scl	24"	ottima / buono	poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, ma di aspetto un po' irregolare se si osserva in visione distolta; è ad ogni modo orientata da NW a SE con dimensioni di circa 2'×1' (era visibile molto debolmente anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 151	gx	00h34m02s	−09°42.3'	q 261	Cet	24"	discreta / mediocre	appare molto diffusa, allungata da E a W e con dimensioni superiori a 2'×1'; presenta un bulge rotonda e contrastato sul disco; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso E (già debolmente osservabile nel 10") — 280x.
NGC 154	gx	00h34m19s	−12°39.4'	q 261	Cet	16"	buona / m. buono	debole, circolare, con Ø di una 30-ina di secondi, gradatamente più brillante verso l'interno e molto diffusa — 188x.
NGC 155	gx	00h34m40s	−10°46.0'	q 261	Cet	16"	buona / m. buono	relativamente brillante; presenta un nucleo luminoso, diffuso e un tenue alone di forma non ben regolare; è comunque all'incirca rotonda con Ø di ~ 1' — 188x.
NGC 157	gx	00h34m47s	−08°24.0'	q 261	Cet	24"	discreta / mediocre	molto brillante e relativamente compatta, ma con basso gradiente di luce, poco allungata da NE a SW con dimensioni 3'×2'; a 280x appaiono a tratti alcune lievi irregolarità di luce all'interno; era già visibile nel Comet Tracker da 15 cm.
NGC 160	gx	00h36m04s	+23°57.5'	q 126	And	24"	buona / buono	bella, molto diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×45" — 495x..
NGC 161	gx	00h35m34s	−02°50.9'	q 216	Cet	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare marcato — 450x.
NGC 163	gx	00h36m00s	−10°07.3'	q 261	Cet	16"	buona / m. buono	assieme a **NGC 165** costituisce una coppia di gx separate da 8' in direzione E-W; la 1ª ha un nucleo brillante, tenue alone, allungata ~ da E a W, di dimensioni 90"×45"; la 2ª ha più o meno le stesse dimensioni, ma è molto più debole, di luminosità pressoché uniforme, nonché di forma indistinta; c'è una stellina a ridosso verso NE — 188x.
NGC 164	gx	00h36m33s	+02°45.0'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	elusiva, di aspetto quasi stellare a bassi ingrandimenti; appare solo a tratti in visione distolta; a 270x appare estesa per una 20-ina di secondi.
NGC 165	gx	00h36m29s	−10°06.4'	q 261	Psc	16"	buona / m. buono	v. **NGC 163**
NGC 166	gx	00h35m49s	−13°36.7'	q 261	Cet	16"	buona / discreto	debolissima, ma relativamente compatta; a 188x sembra poco più di una stellina sfocata, mentre a 270x appare a tratti leggermente allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; è situata in una piccola zona depleta (l'unica stellina brillante di riferimento si trova 5' NW) — 270x.
NGC 167	gx	00h35m23s	−23°22.4'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	debole, ma facilmente osservabile in visione distolta, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; appare appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 168	gx	00h36m39s	−22°35.6'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	fa parte di un terzetto assieme a NGC 172 ed NGC 177 — debole ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 169	gx	00h36m52s	+23°59.5'	q 126	And	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con IC 1559 situata a ridosso verso S — poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30", con bulge evidente e abbastanza contrastato; IC 1559 è compatta, rotonda con Ø < 30" ed evidente condensazione centrale; il campo è comunque disturbato dalla SAO 74148 di 6ª grandezza situata 3.5' ENE — 450x.
NGC 170	gx	00h35m46s	+01°53.2'	q 216	Cet	16"	m. buona / m. buono	galassietta di luminosità uniforme molto debole e compatta, allungata da E a W di dimensioni 20"×15"; c'è una stella brillante a un paio di primi verso S — 270x.
NGC 172	gx	00h37m13s	−22°35.2'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	è la più debole del terzetto di NGC 168, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; in visione distolta appare a tratti più brillante all'interno — 270x.
NGC 173	gx	00h37m12s	+01°56.5'	q 216	Cet	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø > di 1', poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 175	gx	00h37m21s	−19°56.0'	q 306	Cet	24"	ottima / buono	molto diffusa e con lievi discrepanze di luce all'interno; in visione distolta appare rotonda con Ø di 80"; presenta un tenue bulge poco contrastato di 30"×15" orientato da NW a SE (era visibile molto debolmente anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 177	gx	00h37m34s	−22°33.0'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	relativamente facile, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; presenta un bulge evidente e una tenue condensazione centrale visibile a tratti; ogni tanto appare un po' irregolare all'interno (come se ci fosse una stellina a ridosso da qualche parte) — 270x.
NGC 178	gx	00h39m08s	−14°10.4'	q 261	Cet	24"	buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 90"×45" e di luminosità pressoché uniforme, salvo qualche lieve screziatura osservabile a 570x (già debolmente visibile nel 10").
NGC 179	gx	00h37m46s	−17°50.9'	q 261	Cet	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" e con piccolo nucleo brillante quasi stellare, c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
NGC 180	gx	00h37m58s	+08°38.1'	q 171	Psc	16"	ottima / ottimo	presenta un debole bulge esteso e orientata da NW a SE, immerso in un lucore di dimensioni 60"×40" con una stellina abbastanza brillante a ridosso di NW — 380x.
NGC 181	gx	00h38m23s	+29°28.3'	q 90	And	28"	m. buona / discreto	molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×10", relativamente compatta e con nucleo stellare — 495x.
NGC 182	gx	00h38m12s	+02°43.7'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	rotonda, stemperata sul fondo cielo, con Ø di una 40-ina di secondi e una evidente condensazione centrale — 380x.
NGC 183	gx	00h38m29s	+29°30.7'	q 90	And	28"	m. buona / discreto	brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40" — 495x.
NGC 184	gx	00h38m36s	+29°26.8'	q 90	And	28"	m. buona / discreto	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; situata tra due stelline orientate da WNW a ESE, ma poco più spostata verso quella orientale — 495x.
NGC 185	gx	00h38m58s	+48°20.2'	q 60	Cas	16"	m. buona / discreto	molto diffusa, di gradiente di luce uniforme, ma senza un nucleo vero e proprio; la gx appare ovale, orientata da NE a SW e di dimensioni 5'×4'; ci sono 3 stelline a ridosso verso NW, W e SW — 270x.
NGC 186	gx	00h38m25s	+03°10.0'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile; è un ovale a d alto gradiente di luce, di dimensioni 40"×30" e orientata ca. da nord a S — 380x.
NGC 187	gx	00h39m30s	−14°39.3'	q 261	Cet	24"	m. buona / m. buono	abbastanza brillante, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30" (già debolmente visibile nel 10" a 178x in buone condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 188	aa	00h47m30s	+85°14.5'	q 1	Cep	24"	m. buona / m. buono	a 110x appare molto ricco e diradato, approssim. rotondo con Ø di una dozzina di primi; c'è una stellina abbastanza brillante proprio nel mezzo; è totalmente risolto a 200x; ricorda un ammasso globulare a basso range di luce (tipo NGC 5053, per intendersi).
NGC 189	aa	00h39m36s	+61°05.7'	q 16	Cas	10"	m. buona / buono	piccolo gruppo serrato di stelle deboli: se ne contano facilmente una decina a 63x; dà a prima vista l'impressione è che sia come "bilobato" e orientato da E a W.
NGC 190	gx	00h38m55s	+07°03.7'	q 171	Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 45"×20"; in visione distolta a 380x sembra come divisa in 2: la gx è effettivamente doppia e la parte meridionale è costituita da **Hickson 5B**.
NGC 191	gx	00h38m59s	−09°00.2'	q 261	Cet	16"	buona / discreto	rotonda, con Ø di 1' scarso, diffusa ai bordi e con condensazione centrale marcata di aspetto stellare. La piccola IC 1563, situata a ridosso verso S, si vede separata a 270x, presenta nucleo stellare abbastanza pronunciato e un alone rotonda di una 20-ina di secondi di Ø.
NGC 192	gx	00h39m13s	+00°51.8'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	è la più brillante di un quartetto cui appartengono anche NGC 196, 197 e 201; presenta un bulge abbastanza brillante circonfuso da un tenue alone molto allungata da NNE a SSW di dimensioni 80"×30" — 380x.
NGC 193	gx	00h39m19s	+03°19.9'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	anche questa fa parte di un quartetto assieme a NGC 202, 203 e 204; abbastanza compatta, ovale allungata da NW a SE, dimensioni 40"×30" e alto gradiente di luce; c'è una stellina brillante a ridosso verso SW — 380x.
NGC 194	gx	00h39m18s	+03°02.2'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	brillante, compatta, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, ma con basso gradiente di luce — 380x.
NGC 195	gx	00h39m36s	−09°11.7'	q 261	Cet	16"	buona / discreto	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più brillante verso il centro; si trova all'interno di un triangolo equilatero di stelle brillanti — 270x.
NGC 196	gx	00h39m18s	+00°54.8'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, con bulge abbastanza marcato e Ø di 45" — 380x.
NGC 197	gx	00h39m19s	+00°53.5'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	molto debole, appare in visione distolta come una piccola chiazza circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
NGC 198	gx	00h39m23s	+02°47.9'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	chiazza rotonda, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con un Ø di ~ 1'; presenta una luminanza superficiale poco superiore a NGC 200 situata 6' a NNE — 380x.
NGC 199	gx	00h39m33s	+03°08.3'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di luminosità uniforme e dimensione 40"×20" — 380x.
NGC 200	gx	00h39m35s	+02°53.3'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	gx debole e con bassa luminanza superficiale; ciò nonostante sembra molto facile da vedere, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40" — 380x.
NGC 201	gx	00h39m35s	+00°51.6'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	è una gx a bassa luminanza superficiale, di luminosità uniforme, molto diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 90"×60" — 380x.
NGC 202	gx	00h39m40s	+03°32.1'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NNW a SSE (quasi una edge-on) per 45" — 380x.
NGC 203	gx	00h39m40s	+03°26.5'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	un piccolo "sigaro" di luminosità uniforme, allungata ~ da E a W e dimensioni 30"×15" — 380x.
NGC 204	gx	00h39m44s	+03°18.0'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale evidente — 380x.
NGC 205	gx	00h40m23s	+41°41.4'	q 60	And	24"	m. buona / ottimo	molto bella, ma più interessante e meglio definita scalando a 340x; è una gx molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni approssim. di 8'×4' e gradatamente più brillante verso l'interno; in visione distolta appare limitata a SW da una stella di 11-esima e a E da una di 13-esima; presenta un vasto bulge abbastanza contrastato di 3'×1.5' con un nucleo di aspetto quasi stellare; una stellina si trova al bordo settentrionale del bulge (altresì nota come **M110**).
NGC 206	knot	00h40m33s	+40°44.5'	q 60	And	24"	m. buona / ottimo	**associazione stellare in M31** – chiazza estesa di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S con dimensioni 3'×1.5'; presenta un nodulo (o una stellina) al bordo N, uno più debole poco più a N del centro, uno appena percettibile verso il bordo orientale e un paio, anche questo appena percettibili, al margine S; poco meglio contrastata, causa abbattimento del fondo cielo, scalando a 210x assieme al filtro O III (la regione, altresì nota come **A 78**, era già facilmente riconoscibile nel 10" a 63x).
NGC 207	gx	00h39m41s	−14°14.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso SW (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 208	gx	00h40m18s	+02°45.4'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima, estesa max 20"; salta fuori in visione distolta quando si osserva un piccolo triangolo equilatero di stelline brillanti situato subito a E — 380x.
NGC 209	gx	00h39m03s	−18°36.5'	q 306	Cet	16"	buona / buono	presenta un nucleo di aspetto stellare abbastanza brillante e un tenuissimo alone visibile solo in visione distolta, un po' confuso e con un'estensione d ~ 1' — 188x.
NGC 210	gx	00h40m35s	−13°52.4'	q 261	Cet	24"	buona / ottimo	presenta una zona brillante interna, ben definita, orientata da N a S, di dimensioni 90"×45" con all'interno un nucleo brillante; in visione distolta, tuttavia, appare molto più estesa, circa 4'×2', con tenuissime irregolarità di luce nella parte più esterna del disco; c'è una stellina quasi a ridosso verso N e un'altra brillante a ridosso W (già precedentemente osservata nel 10" a 178x) — 400x.
NGC 214	gx	00h41m28s	+25°30.0'	q 126	And	24"	ottima / ottimo	bella, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NE a SW con dimensioni 90"×60" (era debolmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 216	gx	00h41m27s	−21°02.7'	q 306	Cet	16"	mediocre / ottimo	relativamente brillante, ma di gradiente di luce molto basso; presenta un piccolo nucleo puntiforme visibile a tratti in visione laterale; è molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20" — 270x.
NGC 217	gx	00h41m34s	−10°01.3'	q 261	Cet	16"	buona / discreto	bella, facile, molto allungata da ESE a WNW con dimensioni 2'×30"; presenta un bulge evidente e un nucleo stellare; c'è una stellina a 1.5 NE — 270x.
NGC 218	gx	00h41m44s	+36°21.4'	q 90	And	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore di luminosità uniforme esteso 30" o 40"; c'è una debole stellina a ridosso SE; allineata ed equidistante con altre due stelline più brillanti a NW — 270x.
NGC 219	gx	00h42m11s	+00°54.2'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	piccola, rotonda, di luminosità uniforme, diffusa e con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
NGC 223	gx	00h42m16s	+00°50.7'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	poco più compatta di NGC 219, relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, di forma ovale, orientata da E a W e dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 225	aa	00h43m30s	+61°47.0'	q 16	Cas	16"	m. buona / m. buono	è un bel gruppo d una 20-ina di stelle abbastanza brillanti esteso una 15-ina di primi e visibile già nel cercatore da 50 mm; c'è una conformazione simile a una "L" rovesciata che aggetta verso N, ma che probabilmente non appartiene all'ammasso — 132x.

NGC 226	gx	00h42m54s	+32°34.7'	q 90	And	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S e una appena percettibile a ~ 1' SW (la gx facilmente era osservabile, compresa la stellina a S, anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 227	gx	00h42m37s	−01°31.7'	q 216	Cet	24"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo stellare brillante (era facilmente visibile anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 228	gx	00h42m54s	+23°30.2'	q 126	And	10"	buona / discreto	costituisce assieme a NGC 229 una coppia di deboli galassiette di dimensioni simili, distanti tra loro poco più di 2' in direzione E-W'; la 1ª è più debole, rotonda con di 1' ed è di luminosità pressoché uniforme; la 2ª appare invece allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con un piccolo nucleo molto evidente.
NGC 229	gx	00h43m05s	+23°30.5'	q 126	And	10"	buona / discreto	v. **NGC 228**
NGC 230	gx	00h42m26s	−23°37.8'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	fa parte, assieme a NGC 232 ed NGC 235, di un terzetto di galassie allineate — questa è debolissima, quasi elusiva, situata tra 2 stelline distanti 1.5' e orientate da NW a SE; ciò che riesco a vedere, a tratti, deve essere solo il bulge in quanto la gx è in realtà una lama di luce — 270x.
NGC 232	gx	00h42m45s	−23°33.7'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	debole, rotonda, con Ø di ~ 45" e appena più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 233	gx	00h43m37s	+30°35.2'	q 90	And	16"	buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di 1', gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 380x.
NGC 234	gx	00h43m32s	+14°20.6'	q 171	Psc	24"	ottima / ottimo	bella, poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 80"; a tratti finemente screziata; più interessante scalando a 340x (era debolmente visibile nel 10" a 178x).
NGC 235	gx	00h42m53s	−23°32.4'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	più brillante di NGC 232, dalla quale dista un paio di primi verso NE, rotonda, diffusa, con Ø analogo e con nucleo marcato di aspetto stellare; a prima vista, in visione distolta, sembra allungata da NW a SE a causa della 235 A che a tratti si stacca dalla galassia assumendo l'aspetto di una debole stellina sfuocata situata a ridosso della principale — 270x.
NGC 235A	gx	00h42m54s	−23°32.7'	q 306	Cet	16"	ottima / mediocre	v. **NGC 235** (riportata sul Megastar come **MCG-4-2-41**).
NGC 236	gx	00h43m27s	+02°57.5'	q 216	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 45" — 380x.
NGC 237	gx	00h43m28s	−00°07.5'	q 216	Cet	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 70"×35" e a tratti finemente screziata se osservata a 450x (appariva debolmente e di aspetto un po' confuso nel 10" a 178x).
NGC 239	gx	00h44m38s	−03°45.6'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 240	gx	00h45m02s	+06°06.8'	q 171	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, ma facile da vedere, dai bordi piuttosto confusi; probabilmente rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a poco più di 1' verso SE — 270x.
NGC 243	gx	00h46m01s	+29°57.6'	q 90	And	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con brillante condensazione centrale quasi stellare; c'è una stella brillante a 1' W e una appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso N — 450x.
NGC 244	gx	00h45m47s	−15°35.8'	q 261	Cet	16"	buona / discreto	è una chiazza diffusa di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; situata 3.5 NNW si una stellina brillante — 270x.
NGC 245	gx	00h46m06s	−01°43.4'	q 217	Cet	24"	ottima / ottimo	è una bolla circolare con Ø di oltre 1', di aspetto uniforme salvo un debole nucleo stellare al centro; il bordo appare a tratti meno definito verso N (sembra quasi una nebulosa planetaria); la gx era debolmente osservabile anche nel 10" a 240x.
NGC 246	np	00h47m04s	−11°52.3'	q 261	Cet	16"	ottima / buono	debole e di luminosità piuttosto irregolare; è rotonda con Ø di 4'; la stellina centrale è ben evidente e a 1' SW di questa ce n'è un'altra abbastanza brillante; un'ulteriore stellina brillante lambisce il bordo NW, mentre una più debole è situata in direzione opposta verso il bordo SE; una macchia diffusa poco più luminosa si nota nella parte NE della planetaria — 270x senza filtri.
NGC 247	gx	00h47m09s	−20°45.6'	q 306	Cet	16"	m. buona / buono	molto estesa e molto allungata da N a S, con dimensioni 15'×3' (lo spessore massimo è determinato da una coppia di stelline orientate a circa 60° con l'asse della gx e situate poco a S del nucleo); anche se bordi sono piuttosto confusi, la gx arriva a lambire una stellina brillante di 9ª situata a S; è di luminanza alquanto irregolare e si nota un ampio bulge diffuso, condensata verso il centro ed esteso meno della metà della gx; la visione migliore si ha a 188x.
NGC 250	gx	00h47m16s	+07°54.6'	q 171	Psc	16"	m. buona / ottimo	piccola e debole galassia con condensazione centrale di aspetto stellare abbastanza marcata; è allungata all'incirca da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
NGC 251	gx	00h47m54s	+19°35.8'	q 126	Psc	16"	m. buona / discreto	facile, allungata da E a W, di dimensioni 80"×40", con un bulge poco evidente rispetto al disco; c'è una stellina a ridosso verso E — 270x.
NGC 252	gx	00h48m02s	+27°37.4'	q 127	And	16"	m. buona / discreto	abbastanza brillante, con alto gradiente di luce, poco allungata da ENE a WSW, con dimensioni ~ 40"×30" — 270x.
NGC 253	gx	00h47m33s	−25°17.3'	q 306	Scl	24"	ottima / m. buono	a 200x in visione distolta si estende oltre il campo oculare (pari a 20.5°); è di luminosità irregolare, con al centro un piccolo bulge diffuso di dimensioni 45"×30"; a NW di questo si nota chiaramente una banda scura leggermente concava che poi prosegue sino a incunearsi tra 2 stelline situate sul disco a SW; dalla più meridionale di queste, un baffo luminoso esteso oltre 1' si diparte parallelamente all'asse e si estende per oltre 1'; la gx appare poco più diffusa verso NE dove arriva a lambire un piccolo triangolo equilatero di stelline; già ben visibile nel cercatore 12×60.
NGC 254	gx	00h47m27s	−31°25.3'	q 351	Scl	10"	non registrati	è una debolissima chiazza lattescente di luminosità uniforme che solo a momenti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 2'×1'; anche a 240x non si riesce a tenere fuori campo la SAO 192746 di 7ª grandezza situata ad appena 5' NE.
NGC 255	gx	00h47m47s	−11°28.1'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	facile, diffusa e di aspetto un po' irregolare, grosso modo rotonda, di oltre 1.5' di Ø e con piccolo bulge abbastanza evidente a 270x.
NGC 257	gx	00h48m02s	+08°17.8'	q 172	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole ovale, diffuso, allungata da E a W, di dimensioni 80"×40", con una zona centrale poco più brillante dell'alone — 380x.
NGC 258	gx	00h48m13s	+27°39.4'	q 127	And	16"	ottima / buono	è la più debole di un terzetto di cui fa parte la 252 e la 260, già osservate; è piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina situata 45" WSW che disturba un po'' — 270x.
NGC 259	gx	00h48m03s	−02°46.5'	q 217	Cet	16"	m. buona / ottimo	bella, posta praticamente di taglio, estesa almeno un paio di primi e orientata da NW a SE; presenta un bulge diffuso poco più brillante del disco — 380x.
NGC 260	gx	00h48m35s	+27°41.5'	q 127	And	16"	m. buona / discreto	molto debole, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 262	gx	00h48m47s	+31°57.4'	q 90	And	24"	m. buona / buono	rotonda con Ø di 45", molto diffusa, poco più brillante all'interno e con nucleo stellare (era debolmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 263	gx	00h48m48s	−13°06.4'	q 262	Cet	16"	buona / discreto	molto debole e situata in un piccolo campo totalmente depleto; ho dovuto scalare a 188x per individuarla; in visione distolta salta fuori abbastanza facilmente come una macchiolina estesa una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 266	gx	00h49m48s	+32°16.7'	q 90	Psc	24"	m. buona / buono	presenta una zona interna brillante, orientata da E a W, di dimensioni 40"×20", con nucleo stellare circonfusa da un alone grosso modo circolare, molto stemperato sul fondo cielo ed esteso 1.5'; meglio evidente e più interessante scalando a 340x; ci sono 3 stelline allineate a NNW; la visione è un po' disturbata dalla SAO 54174 di magnitudo 7.7 situata 3.5' a S e che è difficile tenere fuori campo (era debolmente visibile nel 10" a 178x).
NGC 268	gx	00h50m10s	−05°11.6'	q 262	Cet	24"	ottima / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; appare a tratti un po'' sfilacciata ai bordi (era visibile molto debolmente anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 270	gx	00h50m32s	−08°39.1'	q 262	Cet	16"	ottima / m. buono	relativamente facile e poco diffusa, leggermente ovale, con dimensioni 60"×45", orientata ~ da N a S e con condensazione centrale puntiforme — 380x.
NGC 271	gx	00h50m42s	−01°54.6'	q 217	Cet	24"	m. buona / buono	molto diffusa e piuttosto disturbata dalla SAO 128981 di magnitudo 8.7 situata 1.5' a SE; è allungata da N a S, di dimensioni 60"×40", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo di aspetto stellare; in visione distolta la gx pare immersa in una chiazza lattescente molto diffusa, grosso modo rotonda con Ø > 1' (già facilmente osservabile nel 16") — 450x.
NGC 272	aa	00h51m26s	+35°49.3'	q 90	And	16"	m. buona / discreto	nella posizione riportata sull'Uranometria (q 90) si vede solo un piccolo trapezio regolare di stelline con la base maggiore a N e quella minore a S; la componente più a W della base minore è una doppia strettissima e sbilanciata; non so se le altre 5 stelle situate a N, fra cui la SAO 54201 di 9a grandezza, fanno parte o meno dell'ammasso — 270x.
NGC 273	gx	00h50m48s	−06°53.1'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	molto allungata ~ da E a W, di dimensioni 70"×30", con bulge tenue e diffuso; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 380x.
NGC 274	gx	00h51m02s	−07°03.4'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	assieme a NGC 275 forma una coppia di gx che sembrano collidere fra loro; la 1ª ha un alto gradiente di luce, è rotonda, di 45" di Ø, con piccola ed evidente condensazione centrale; la 2ª è di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SW con dimensioni 60"×40" — 380x.
NGC 275	gx	00h51m04s	−07°03.9'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	v. **NGC 274**
NGC 276	gx	00h52m06s	−22°40.8'	q 307	Cet	16"	buona / buono	debolissima, quasi elusiva, a tratti visibile in visione distolta a poco più di 4' S di una stella brillante; è un po' disturbata da quest'ultima; un'altra stellina più debole si trova a ~ 1'.5 verso E — 188x.
NGC 277	gx	00h51m17s	−08°35.8'	q 262	Cet	16"	ottima / m. buono	è una tenue bolla circolare e poco diffusa, appena più brillante all'interno, situata quasi a ridosso verso SE di una stellina luminosa — 380x.
NGC 278	gx	00h52m05s	+47°33.0'	q 60	Cas	16"	m. buona / discreto	rotonda con Ø > 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 279	gx	00h52m09s	−02°13.1'	q 262	Cet	16"	m. buona / m. buono	bozzolo rotonda, poco diffusa, con basso gradiente di luce, con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 280	gx	00h52m30s	+24°21.0'	q 127	And	16"	m. buona / discreto	debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con una stellina brillante a ridosso del bordo orientale — 270x.
NGC 281	neb	00h53m00s	+56°38.0'	q 36	Cas	16"	buona / ottimo	tenui volute di vapore in un campo ricco di stelline; a 132x e filtro O III sembra come spaccata in 2; c'è una stellina brillante nel centro e, sempre nel mezzo della nebulosa, una doppia molto stretta che si separa agevolmente a 270x. La stellina brillante si trova al centro di un gruppetto molto povero che costituisce l'ammasso IC 1590. La nebulosa, già osservata molti anni fa, in una notte molto limpida appariva già ben evidente con un 15×80.
NGC 282	gx	00h52m42s	+30°38.3'	q 90	Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, ma di aspetto un po' confuso, diffusa; appare a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" ed evidente condensazione centrale; è situata ca. 1' E di una stellina brillante e a ~ 2' N della SAO 54223 di magnitudo 7.7 — 380x.
NGC 283	gx	00h53m13s	−13°09.9'	q 262	Cet	16"	buona / discreto	fa parte assieme a NGC 284, 285 e 286 di un quartetto di galassiette molto deboli; la visione è stata un po' compromessa dal cielo che cominciava a velarsi — debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme salvo un piccolo nucleo stellare visibile a tratti; è poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 284	gx	00h53m24s	−13°09.5'	q 262	Cet	16"	buona / discreto	molto piccola, rotonda, con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 285	gx	00h53m30s	−13°09.6'	q 262	Cet	16"	buona / discreto	situata a poco più di 1' E della precedente, è di aspetto e dimensioni del tutto simili, solo appena più debole — 270x.
NGC 286	gx	00h53m30s	−13°06.7'	q 262	Cet	16"	buona / discreto	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 287	gx	00h53m28s	+32°28.9'	q 90	Psc	16"	ottima / ottimo	abbastanza facile, diffusa ai bordi, con condensazione centrale evidente; rotonda con Ø inferiore a 1' — 380x.
NGC 288	ag	00h52m45s	−26°34.8'	q 307	Scl	16"	m. buona / buono	è parzialmente risolto a 188x e di aspetto un po' irregolare, grosso modo rotondo con Ø di 6' e poco concentrato; un piccolo triangolo serrato si stacca subito a E; qualche stella diradata si trova invece a N; si vede comodamente nel cercatore da 50 mm.
NGC 289	gx	00h52m42s	−31°12.3'	q 351	Scl	10"	non registrati	debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 2'×1.5'; la visione migliore si ha a 178x (a 242x si spampana troppo).
NGC 291	gx	00h53m30s	−08°46.0'	q 262	Cet	16"	ottima / m. buono	debole ovale relativamente compatta, di dimensioni 40"×20", orientata da E a W e con tenue condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
NGC 293	gx	00h54m16s	−07°14.1'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	molto debole, a prima vista appare di aspetto un po' confuso, ma in visione distolta si vede allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata a 270x.
NGC 295	gx	00h55m08s	+31°32.5'	q 90	Psc	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", con basso gradiente di luce; presenta un bulge diffuso e poco contrastato sul disco; c'è la SAO 54260 di 10a grandezza a ridosso SE che però non crea problemi nell'osservazione; una stellina appena percettibile si trova a ridosso E — 450x.
NGC 296	gx	00h55m21s	+31°40.6'	q 90	Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×20"; è poco meglio contrastata scalando a 340x, ma a 450x è più evidente una stellina situata subito a N.
NGC 297	gx	00h54m59s	−07°21.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	appare abbastanza facilmente come una debole stellina sfocata a poco più di 1' SW di NGC 298 (NGC 297 non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 298	gx	00h55m02s	−07°20.0'	q 262	Cet	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" (già osservata, seppur molto debolmente, nel 16" a 380x) — 450x.
NGC 300	gx	00h54m54s	−37°41.0'	q 351	Scl	10"	buona / buono	a dispetto della sua fama è una galassia debolissima e assai stemperata sul fondo cielo; in pratica è visibile la parte centrale poco più evidente sulla quale si stagliano 4 stelline, di cui una brillante verso S, poste a trapezio irregolare; meglio contrastata scalando a 46x.
NGC 301	gx	00h56m18s	−10°40.4'	q 262	Cet	16"	ottima / m. buono	è una piccola galassia debole e relativamente compatta, con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 302	gx	00h55m56s	−10°39.2'	q 262	Cet	16"	ottima / m. buono	ho dovuto tentarla più volte! È una piccola ed elusiva lama di luce orientata circa da N a S ed estesa per una 40-ina di secondi; salta fuori ogni tanto a 380x fissando attentamente la debole stellina situatale quasi a ridosso verso NE — 380x.
NGC 303	gx	00h54m55s	−16°39.3'	q 262	Cet	16"	ottima / m. buono	molto difficile, debole e diffusa, situata in un piccolo campo quasi depleto, in quanto l'unica stellina brillante di riferimento si trova 5' NE; in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 304	gx	00h56m06s	+24°07.6'	q 127	And	16"	ottima / scarso	relativamente brillante, con alto gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" e diffusa — 270x.
NGC 307	gx	00h56m33s	−01°46.3'	q 217	Cet	24"	m. buona / buono	bella gx con alto gradiente di luce, bulge evidente e nucleo stellare, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" (era facilmente osservabile anche nel 16") — 450x.
NGC 308	gx	00h56m25s	−01°48.8'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e poco diffusa; c'è una stellina brillante a 1' verso S (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 309	gx	00h56m43s	−09°54.8'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	è una bolla circolare poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme con Ø di un paio di primi; meglio visibile a 270x; c'è una stellina a ridosso verso W e una brillante a ~ 2' NE.
NGC 311	gx	00h57m33s	+30°16.8'	q 90	Psc	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" (anche questa era facilmente visibile nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 340x.
NGC 314	gx	00h56m52s	−31°57.8'	q 351	Scl	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e nucleo quasi stellare; c'è una stellina brillante un paio di primi a SE — 270x.
NGC 315	gx	00h57m49s	+30°21.2'	q 90	Psc	24"	m. buona / m. buono	molto brillante, diffusa, con alto gradiente di luce, poco allungata da NE a SW con dimensioni 90"×60" (era facilmente visibile nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 340x.
NGC 317A	gx	00h57m39s	+43°48.0'	q 60	And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo evidente con Ø di 15"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SW (che ha una debole compagna verso S) — 450x.
NGC 317B	gx	00h57m41s	+43°47.5'	q 60	And	24"	m. buona / ottimo	di aspetto più uniforme della precedente, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con piccola condensazione centrale appena più contrastata del disco — 450x.
NGC 318	gx	00h58m05s	+30°25.5'	q 90	Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' NW (era di aspetto simile nel 16" a 270x in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 320	gx	00h58m46s	−20°50.4'	q 307	Cet	16"	buona / buono	è un piccolissimo momenti; se si osserva in visione diretta appare quasi stellare; è situata a 1' SE di una stellina brillante; un'altra stellina di ugual magnitudo si trova 2' verso NE da quest'ultima — 188x.
NGC 321	gx	00h57m39s	−05°05.2'	q 262	Cet	24"	m. buona / buono	fa parte, assieme a NGC 325 e alla coppia NGC 327-9 di un quartetto già precedentemente osservato col 16" — debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
NGC 325	gx	00h57m48s	−05°06.7'	q 262	Cet	24"	m. buona / buono	debole lama di luce orientata da E a W, estesa per oltre 1' e con tenue bulge diffuso (questa era appena percettibile col 16") — 450x.
NGC 326	gx	00h58m23s	+26°51.9'	q 127	Psc	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; allineata ed equidistante con due stelline a W (le quali fanno parte di un piccolo triangolo equilatero); un'altra stellina appena percettibile si trova a poco più di 1' verso SW; la gx non sembra particolarmente disturbata né dalla SAO 74409 di 9ª grandezza (situata 3.5' E), né dalla più brillante SAO 74405 di 7ª situata 5' a SSE (che si fatica a tenere fuori campo a 450x).
NGC 327	gx	00h57m55s	−05°07.8'	q 262	Cet	24"	m. buona / buono	fa parte di un quartetto già precedentemente osservato col 16" — allungata da N a S, di dimensioni 60"×40", diffusa e con basso gradiente di luce; leggermente screziata a 450x; un debole nodulo sembra staccarsi verso N (forse una stellina a ridosso del corpo principale) — 450x.
NGC 329	gx	00h58m01s	−05°04.3'	q 217	Cet	24"	m. buona / buono	poco più debole di NGC 327 e di aspetto più uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo S — 450x.
NGC 331	gx	00h57m05s	−02°46.2'	q 217	Cet	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, approssim. in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; è situata in mezzo a 2 stelline orientate da WNW a ESE e distanti 5' scarsi; bisogna osservare a 380x per tentare di tenere fuori campo una stella brillante di 7° situata 5' NW.
NGC 332	gx	00h58m49s	+07°06.7'	q 172	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole galassia rotonda, compatta, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
NGC 333	gx	00h58m51s	−16°28.1'	q 262	Cet	24"	ottima / m. buono	molto diffusa, in visione distolta appare allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×40" e con tenue bulge evidente, ma poco contrastato; meglio definita scalando a 340x.
NGC 335	gx	00h59m19s	−18°14.0'	q 262	Cet	16"	buona / buono	molto debole, quasi elusiva; appare in visione distolta a ~ 4' NNE di una stellina abbastanza luminosa completamente isolata nel campo dell'oculare; forse allungata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi — 188x.
NGC 337	gx	00h59m50s	−07°34.7'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	gx molto facile, ma a basso gradiente di luce; appare screziata a 380x; è poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1.5'.
NGC 337A	gx	01h01m34s	−07°35.3'	q 262	Cet	16"	ottima / m. buono	debolissima chiazza piuttosto estesa e molto stemperata sul fondo cielo, di dimensioni 80"×40" e orientata grosso modo da NE a SW; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE; l'osservazione è più agevole a 188x.
NGC 338	gx	01h00m36s	+30°40.1'	q 91	Psc	16"	m. buona / discreto	relativamente brillante, poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×30"; c'è una coppia di stelline ravvicinate a ridosso verso S — 270x.
NGC 340	gx	01h00m35s	−06°52.0'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	fa parte di un piccolo gruppo situato nei pressi della SAO 129088 di 7ª grandezza — allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×20", poco diffusa e con piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
NGC 341	gx	01h00m46s	−09°11.1'	q 262	Cet	24"	buona / ottimo	molto diffusa, con nucleo stellare poco contrastato, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; un debolissimo nodulo esteso una decina di primi e situato a oriente della gx si riesce a separare solo a momenti a 450x: si tratta di **MCG-2-3-64** ed è riportata sulla I edizione dell'Uranometria come **341B**.
NGC 342	gx	01h00m50s	−06°46.4'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	fa parte del gruppo di NGC 340 — debole, poco allungata da E a W, con dimensioni 30"×20", poco diffusa e appena condensata — 380x.
NGC 344	gx	01h01m36s	−23°15.9'	q 307	Cet	16"	ottima / ottimo	elusiva e molto diffusa, estesa per una 30-ina di secondi; appare solo a momenti e con gran difficoltà a 380x; è situata 1' scarso a S di una stellina brillante — 270x.
NGC 345	gx	01h01m22s	−06°53.1'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	fa parte del gruppo di NGC 340 — allungata da NW a SW, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare — 380x.
NGC 347	gx	01h01m35s	−06°44.0'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	fa parte del gruppo di NGC 340 — piccola e debolissima, estesa sì e no una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; disturbata dalla SAO 129088 di 7ª grandezza situata ad appena 4' S — 380x.
NGC 349	gx	01h01m51s	−06°48.1'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	fa parte del gruppo di NGC 340 — rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 350	gx	01h01m57s	−06°47.8'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	fa parte del gruppo di NGC 340 — è una galassietta leggermente condensata con Ø non superiore a 20"; c'è una stellina brillante a 1' verso ESE — 380x.
NGC 351	gx	01h01m58s	−01°56.2'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	gx diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 60"×30", con bulge evidente e nucleo stellare facilmente visibile — 270x.
NGC 352	gx	01h02m09s	−04°14.7'	q 217	Cet	16"	m. buona / m. buono	bella, molto allungata da N a S per oltre 1' (quasi una edge-on); sembra di vedere lievi irregolarità di luce verso la parte meridionale; ma presenta comunque un basso gradiente di luce — 270x.
NGC 353	gx	01h02m25s	−01°57.4'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	relativamente compatta, allungata da N a S, dimensioni 30"×15"; è poco più evidente di NGC 351 — 270x.
NGC 354	gx	01h03m16s	+22°20.6'	q 127	Psc	16"	m. buona / discreto	piccolo ovale con basso gradiente di luce, allungata all'incirca da N a S, con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso W — 270x.
NGC 355	gx	01h03m07s	−06°19.5'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di 15" o 20" che appare in visione distolta a 380x; solo a tratti appare una stellina a NE appena percettibile — 380x.
NGC 356	gx	01h03m07s	−06°59.3'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 90"×60" — 270x.
NGC 357	gx	01h03m22s	−06°20.4'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	a prima vista pare di luminosità piuttosto irregolare, rotonda con Ø di 1.5' e molto diffusa; presenta un nucleo brillante poco contrastato; c'è una stellina a ridosso verso E — 380x.
NGC 358	aster	01h05m11s	+62°01.3'	q 16	Cas	10"	buona / buono	è un piccolo asterismo formato da 4 stelline abbastanza brillanti poste a parallelogramma, esteso meno di 2' e coi lati maggiori orientati da E a W; la coppia più a W, che costituisce uno dei lati minori è più brillante di quella opposta. Non è riportato sull'Uranometria ed è situato a circa 1.5° NE di Gamma Cas.
NGC 359	gx	01h04m17s	−00°45.9'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	rotonda, debole, alto gradiente di luce, con Ø ~ 30"; presenta un nucleo brillante, stellare; c'è una stellina a 1' SSE — 270x.
NGC 363	gx	01h06m16s	−16°32.6'	q 262	Cet	16"	ottima / m. buono	relativamente compatta, piccola e rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi, poco più brillante all'interno; c'è una stellina 2.5' verso N — 380x.
NGC 364	gx	01h04m41s	−00°48.1'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	più luminosa e poco più grande di NGC 363, molto diffusa, con alto gradiente di luce e nucleo stellare, circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 366	aa	01h06m27s	+62°13.7'	q 16	Cas	16"	m. buona / m. buono	piccolo gruppo disperso e irregolare di stelle esteso circa 3'; è più interessante a 270x in quanto si risolvono meglio le componenti più deboli.
NGC 367	gx	01h05m49s	−12°07.7'	q 262	Cet	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa; appare a tratti in visione distolta in una piccola zona depleta (è ancora più difficile della 303) — 380x.
NGC 369	gx	01h05m09s	−17°45.6'	q 307	Cet	16"	buona / buono	molto debole, forse allungata da N a S, situato a ~ 4' NNE di una coppia di stelline brillanti di ugual magnitudo, distanti poco più di 1' e orientate da ESE a WNW — 188x.
NGC 372	ss	01h06m44s	+32°25.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	è un piccolo triangolo molto serrato di stelline la cui componente N è la più brillante — 450x.
NGC 373	gx	01h06m58s	+32°18.5'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW — 291x.
NGC 374	gx	01h07m06s	+32°47.7'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	debole, poco più brillante all'interno, poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", situata tra 2 deboli stelline distanti poco più di 1' in direzione NE-SW — 380x.
NGC 375	gx	01h07m06s	+32°20.8'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	situata 3' a NW di NGC 373, anche questa è una galassietta piccola, diffusa e di Ø analogo — 291x.
NGC 379	gx	01h07m16s	+32°31.2'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	assieme a NGC 380, alla coppia NGC 382-83, a NGC 384, 385, 386 e 387 forma una stringa di 7 galassie grosso modo orientata da N a S ed estesa una 15-ina di primi — questa è brillante, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con bulge contrastato; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso S — 291x.
NGC 380	gx	01h07m18s	+32°29.0'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	anche questa è molto brillante, diffusa, rotonda con Ø di 1', con un bulge luminoso e contrastato; c'è una debole stellina a 1°5' verso S — 291x.
NGC 381	aa	01h08m18s	+61°35.0'	q 16	Cas	16"	m. buona / m. buono	gruppo di stelle relativamente deboli esteso 6' o 7'; se ne contano più di 30 a 270x; ce ne sono un paio abbastanza brillanti: una verso il margine N e l'altra a W.
NGC 382	gx	01h07m24s	+32°24.2'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; in visione distolta sembra immersa nell'alone di NGC 383 situata a ridosso NNE; c'è una stellina brillante a 1' SSW — 291x.
NGC 383	gx	01h07m25s	+32°24.8'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	è la più luminosa della stringa galattica (v* NGC 379), diffusa, rotonda con Ø di 80" e con un bulge brillante e debolmente screziato; un piccolo oggetto molto debole situato 1°5' a NW è risultato essere la **PGC 197570**, ma il seeing non permetteva di distinguerlo bene da una stellina — 291x.
NGC 384	gx	01h07m25s	+32°17.6'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale molto contrastata — 291x.
NGC 385	gx	01h07m27s	+32°19.2'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	poco più grande di NGC 384 — situata 1°5' a SSW — con alto gradiente di luce e nucleo stellare; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline 2°5' a WNW — 291x.
NGC 386	gx	01h07m31s	+32°21.7'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 291x.
NGC 387	gx	01h07m33s	+32°23.9'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	è la più debole della stringa galattica (v* NGC 379), molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, diffusa e debolmente condensata — 291x.
NGC 388	gx	01h07m47s	+32°18.6'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	piccola, relativamente compatta, poco allungata da N a S, di dimensioni 20"×15" e con nucleo stellare poco contrastato — 291x.
NGC 389	gx	01h08m30s	+39°41.7'	q 60	And	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NE a SW, con tenue bulge poco contrastato; è estesa 1' scarso e spessa una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso NE (appariva elusivamente in visione distolta nel 10" a 178x come un baffo di luce appena percettibile che aggettava a SW dalla stellina di cui sopra) — 450x.
NGC 390	gx	01h08m13s	+32°27.2'		Psc	28"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a S (non riportata sull'Uranometria) — 291x.
NGC 391	gx	01h07m23s	+00°55.6'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	galassietta rotonda abbastanza compatta, con condensazione centrale evidente, con Ø max di 20" o 25" — 270x.
NGC 392	gx	01h08m23s	+33°08.0'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	facile, ma con basso gradiente di luce, approssim. circolare, con Ø di una 40-ina di secondi e con un piccolo nucleo di aspetto stellare — 380x.
NGC 393	gx	01h08m37s	+39°38.6'	q 60	And	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso (era facilmente visibile nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 394	gx	01h08m26s	+33°08.9'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo poco più marcato della 392 ed è più compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 380x.
NGC 396	gx	01h08m09s	+04°31.8'	q 217	Scl	16"	ottima / discreto	debolissima e molto piccola, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; appare comunque anche in visione diretta a 270x.
NGC 397	gx	01h08m31s	+33°06.5'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, estesa max per 30", approssim. circolare e molto diffusa — 380x.
NGC 398	gx	01h08m54s	+32°30.9'	q 91	Psc	28"	m. buona / mediocre	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare marcato; c'è una stellina a 1' verso E — 291x.
NGC 399	gx	01h08m59s	+32°38.1'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, molto piccola, di aspetto un po' confuso, estesa per 30" al massimo, forse poco allungata da NE a SW — 380x.
NGC 403	gx	01h09m14s	+32°45.1'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W — quasi una edge-on — di dimensioni 80"×20", con bulge ben evidente — 380x.
NGC 404	gx	01h09m27s	+35°43.1'	q 91	And	24"	m. buona / buono	molto bella, diffusa, rotonda con Ø di un paio di primi; presenta un bulge centrale di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare marcato; la brillante e rossa β Andromedae di 2ª grandezza situata 6.5' a SSE non crea problemi a 450x, in quanto si riesce a tenere fuori campo (era un oggetto facile nel 10" a 178x che aveva l'aspetto di un piccolo ammasso globulare).
NGC 407	gx	01h10m36s	+33°07.5'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S, di luminosità uniforme e dimensioni 45"×20" — 380x.
NGC 408	gx	01h10m51s	+33°06.8'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	è un oggetto elusivo, molto piccolo, esteso sì e no una 15-ina di secondi; si riesce a "catturare" solo a momenti a 380x.
NGC 410	gx	01h10m58s	+33°09.1'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	bella, relativamente brillante, rotonda con Ø di ~ 1'; presenta una piccola e marcata condensazione centrale — 380x.
NGC 413	gx	01h12m31s	−02°47.6'		Cet	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, assai stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di ~ 80" (più o meno come la distanza delle 2 stelline a NW) e di luminosità pressoché uniforme (non è riportata sull'Uranometria) — 380x.
NGC 414	gx	01h11m18s	+33°06.8'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, piccola, approssim. circolare con Ø max di 30" — 380x.
NGC 417	gx	01h11m06s	−18°08.9'	q 307	Cet	24"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale quasi stellare — 450x.
NGC 418	gx	01h10m36s	−30°13.2'	q 352	Scl	16"	ottima / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 80"×60", con basso gradiente di luce e diffusa; c'è una stellina un paio di primi verso S — 188x.
NGC 420	gx	01h12m10s	+32°07.4'	q 91	Psc	24"	m. buona / m. buono	bella, molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo brillante quasi stellare, rotonda con Ø di una 70-ina di secondi (poco più di 1') — 450x.
NGC 425	gx	01h03m02s	+38°46.1'	q 91	And	24"	m. buona / discreto	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con una tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a ridosso verso NW; una stellina brillante si trova a 1' NNE — 450x.
NGC 426	gx	01h12m49s	−00°17.4'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	assieme a NGC 429 ed NGC 430 costituisce un terzetto di gx facili da vedere; la 1ª è la più diffusa, con piccolo nucleo stellare, di dimensioni 40"×30" e orientata da NW a SE; la 2ª è la più debole, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e presenta una debole stellina a 45" N; la 3ª è poco più brillante della 426, ha un nucleo marcato, stellare ed è rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ~ 1' verso S — 270x.
NGC 428	gx	01h12m56s	+00°58.9'	q 217	Cet	6"	buona / buono	debole, di luminosità uniforme e con Ø di un paio di primi; è situata tra 2 deboli stelline; c'è una stella brillante a 6' verso W e un'altra simile equidistante verso N.
NGC 429	gx	01h12m57s	−00°20.7'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	v. **NGC 426**
NGC 430	gx	01h13m00s	−00°15.1'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	v. **NGC 426**
NGC 431	gx	01h14m05s	+33°42.2'	q 91	And	24"	m. buona / discreto	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×40" e con nucleo quasi stellare molto evidente — 450x.
NGC 433	aa	01h15m10s	+60°07.5'	q 36	Cas	10"	m. buona / buono	oggetto disperso, molto povero, con 2 filari di stelle posti a "V".
NGC 435	gx	01h14m00s	+02°04.2'	q 217	Cet	16"	buona / buono	debole lucore di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare, di ca. 1' di Ø, situata a 3' NE di una stella brillante; c'è una debole stellina a ridosso verso W — 270x.
NGC 436	aa	01h15m58s	+58°49.0'	q 36	Cas	16"	buona / ottimo	si contano una 15-ina di componenti a 270x; ci sono 3 stelline brillanti allineate da E a W verso la parte sud-orientale dell'ammasso.
NGC 437	gx	01h14m22s	+05°55.6'	q 172	Psc	16"	m. buona / ottimo	facile, presenta un nucleo molto brillante circonfuso da un alone rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a poco più di 1' verso NW — 380x.
NGC 439	gx	01h13m47s	−31°44.8'	q 352	Scl	16"	ottima / ottimo	allungata da NNW a SSE, di dimensioni 90"×60" con alto gradiente di luce, bulge diffuso, ben evidente e nucleo di aspetto stellare — 270x.
NGC 441	gx	01h13m51s	−31°47.3'	q 352	Scl	16"	ottima / ottimo	è di luminosità più uniforme di NGC 439, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 442	gx	01h14m39s	−01°01.2'	q 217	Psc	24"	m. buona / buono	brillante, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45", con condensazione centrale diffusa e abbastanza contrastata; non sembra disturbata dalla SAO 129196 bianco-gialla di 6ª grandezza situata a 4' scarsi verso NE (era debolmente osservabile anche nel 10" a 240x) — 450x.
NGC 443	gx	01h15m08s	+33°22.6'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	galassietta rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 444	gx	01h15m50s	+31°04.8'	q 91	Psc	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da N a S ed estesa ~ 1' — 450x.
NGC 445	gx	01h14m53s	+01°55.1'	q 217	Cet	24"	m. buona / buono	orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×20", poco diffusa e con bulge diffuso; a 450x il nucleo sembra doppio; è situata tra 2 stelline brillanti orientate da WNW a ESE, ma poco più spostata verso quella a W.
NGC 446	gx	01h14m48s	+04°11.4'	q 217	Psc	16"	ottima / discreto	è una gx abbastanza facile, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20", diffusa e appena più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 447	gx	01h15m38s	+33°04.0'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	è allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con nucleo puntiforme; 2 stelline, distanti una 20-ina di secondi, si trovano a E, situate a perpendicolo con l'asse della galassia; quella più a ridosso è la più brillante — 380x.
NGC 448	gx	01h15m16s	−01°37.5'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	bella, tipica spirale vista di 3/4, allungata da WNW a ESE, di dimensioni ~ 60"×30", bulge brillante, diffuso e nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 449	gx	01h16m07s	+33°05.3'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	assieme a **NGC 451** forma una coppia di piccole galassie molto deboli, di luminosità uniforme e di aspetto simile distanti un paio di primi in direzione NW-SE. La 1ª è appena più brillante e poco allungata da E a W; entrambe non sono comunque estese più di 20" o 30" — 380x.
NGC 450	gx	01h15m31s	−00°51.6'	q 217	Cet	24"	m. buona / buono	debole ed estesa chiazza rotondeggiante, con basso gradiente di luce e Ø che in visione distolta arriva a un paio di primi; una debole screziatura appare a tratti verso la parte orientale della gx. Una sorta di debole "protuberanza" si estende verso NE, di luminosità uniforme e dimensioni 30"×15": questa è UGC 807 (la gx principale era visibile, seppur molto debolmente, anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 451	gx	01h16m12s	+33°03.8'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	v. **NGC 449**
NGC 452	gx	01h16m15s	+31°02.0'	q 91	Psc	24"	m. buona / m. buono	presenta un bulge esteso molto evidente, orientato da NNE a SSW, di dimensioni 60"×20" circonfuso da un alone estremamente tenue che porta l'estensione della gx a circa 90"×30"; l'alone tuttavia si nota solo in visione distolta scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso del bulge verso NNE; quest'ultima è allineata sempre a NNW con un'altra stellina più brillante situata all'esterno della gx.
NGC 455	gx	01h15m57s	+05°10.7'	q 217	Psc	16"	m. buona / ottimo	facile, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; presenta un bulge evidente e un nucleo stellare abbastanza brillante — 380x.
NGC 457	aa	01h19m33s	+58°17.4'	q 36	Cas	16"	buona / ottimo	con parecchia fantasia sembra di ravvisare una civetta in volo; i due occhi, distanti un paio di primi, sono luminosi e fosforescenti (il più brillante dei 2 è la f Cas di 5ª grandezza), mentre l'apertura alare arriva a circa 20' (ma è difficile stabilire, almeno visualmente, se le estremità delle ali e dei piedi fanno parte dell'ammasso; gli stessi occhi sono probabilmente stelle di foreground). La visione è comunque stupenda a 132x; fra le numerose stelle se ne nota una arancione.
NGC 459	gx	01h18m08s	+17°33.7'	q 127	Psc	16"	m. buona / discreto	elusiva, visibile solo a tratti, probabilmente di dimensione non superiore a 30"; anche in un 45 centimetri ad alti ingrandimenti appare di aspetto simile; un appannamento anche minimo della lente oculare può essere critico — 270x.
NGC 462	gx	01h18m11s	+04°13.5'	q 217	Psc	16"	buona / buono	molto debole, rotonda, con Ø di 1', indistinta ai bordi; presenta una debole condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
NGC 463	gx	01h18m58s	+16°19.5'	q 172	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, ma con una condensazione centrale visibile (seppur a tratti) di aspetto stellare; è allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
NGC 464	gx	01h19m06s	+34°56.8'	q 91	And	28"	m. buona / buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo NW — 495x.
NGC 467	gx	01h19m10s	+03°18.0'	q 217	Psc	24"	m. buona / buono	fa parte di un celebre terzetto assieme a NGC 470 e 474 (vedi le voci corrispondenti) — diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di oltre 1'; la gx è allineata ed equidistante con due stelline luminose a E (era visibile molto debolmente nel 10" in analoghe condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 468	gx	01h19m48s	+32°46.0'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	piccola chiazza di luce molto debole, di luminosità uniforme estesa max per 30" — 380x.
NGC 469	gx	01h19m33s	+14°52.2'	q 172	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" — 380x.
NGC 470	gx	01h19m45s	+03°24.6'	q 217	Psc	24"	m. buona / buono	fa parte di un celebre terzetto — presenta un piccolo nucleo stellare al centro di una chiazza poco diffusa, debolmente screziata, di dimensioni 2'×1' e con gradiente di luce molto basso (era facilmente visibile nel 10" in analoghe condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 471	gx	01h20m00s	+14°47.2'	q 172	Psc	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto compatta, brillante, con una condensazione centrale di aspetto stellare, con Ø max di 30"; c'è una stellina percettibile solo a tratti a ~ 20" verso N — 380x.
NGC 472	gx	01h20m29s	+32°42.5'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	poco più brillante di NGC 468, è rotonda, con Ø di ~ 45" e presenta una condensazione centrale evidente di aspetto stellare — 380x.
NGC 473	gx	01h19m55s	+16°32.7'	q 172	Psc	24"	buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNW a SSE con dimensioni 70"×40"; appare leggermente screziata a 450x; è situata tra 2 stelline: una debole un paio di primi a NE e un'altra appena percettibile alla stessa distanza verso SW (già precedentemente osservata col 10" a 178x).
NGC 474	gx	01h20m07s	+03°25.0'	q 217	Psc	24"	buona / m. buono	fa parte di un celebre terzetto — presenta un bulge molto marcato e brillante con Ø di una 30-ina di secondi circonfuso da un alone che si stempera molto gradualmente sul fondo cielo; in visione distolta appare con un Ø sino a 3', anche se è meglio contrastata scalando a 340x; la visione d'insieme, tuttavia, è ancora più interessante a 210x (era facilmente visibile nel 10" in analoghe condizioni di visibilità).
NGC 475	gx	01h20m02s	+14°51.7'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	galassietta molto debole estesa 20" o 30" che salta a tratti in visione distolta; è situata in una piccola zona di cielo priva di stelline di riferimento — 380x.
NGC 476	gx	01h20m20s	+16°01.2'	q 172	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
NGC 477	gx	01h21m21s	+40°29.3'	q 61	And	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina brillante a ridosso NE e una più evidente dalla parte opposta (era debolissima nel 10" a 178x in condizioni di visibilità analoghe) — 450x.

NGC 478	gx	01h20m09s	−22°22.6'	q 308	Cet	16"	ottima / mediocre	debole, diffusa, estesa una 40-ina di secondi, con tenue condensazione centrale visibile abbastanza facilmente (non sono riuscito a vedere la compagna a N) — 270x.
NGC 479	gx	01h21m16s	+03°51.7'	q 218	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma visibile senza difficoltà in visione distolta, rotonda con Ø di 45", diffusa e di luminosità uniforme; meglio osservabile a 270x (a 380x s stempera troppo).
NGC 480	gx	01h20m34s	−09°52.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta, orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con condensazione centrale appena percettibile, anche se visibile solo a momenti; occorre tuttavia cercare di tenere fuori campo la SAO 147742 di magnitudo 6.6 situata a meno di 8' verso W (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 481	gx	01h21m13s	−09°12.7'	q 263	Cet	16"	m. buona / mediocre	galassietta rotonda e diffusa, con Ø di ~ 45", con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 1' verso NW — al momento dell'osservazione non era più alta di 20 gradi sull'orizzonte — 270x.
NGC 483	gx	01h21m56s	+33°31.2'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno; appare debolmente screziata a 450x.
NGC 485	gx	01h21m28s	+07°01.1'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" — 380x
NGC 486	gx	01h22m10s	+05°24.7'	q 173	Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata a 1' scarso WSW della 492 — 450x.
NGC 487	gx	01h21m55s	−16°22.2'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	debole, ovale, orientata da E a W, di dimensioni 60"×40" e appena più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 488	gx	01h21m47s	+05°15.4'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce; appare poco allungata da N a S con dimensioni 4'×3'; osservando a 340x la gx arriva a lambire facilmente una stellina luminosa situata a S (la quale fa parte di una stringa leggermente arcuata formata da 4 componenti orientate da ENE a WSW).
NGC 489	gx	01h21m54s	+09°12.4'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	abbastanza brillante, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15", con bulge diffuso ben evidente — 380x.
NGC 490	gx	01h22m03s	+05°22.0'	q 173	Psc	24"	m. buona / ottimo	debole e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; debolmente screziata al centro se osservata a 450x.
NGC 492	gx	01h22m14s	+05°25.0'	q 173	Psc	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
NGC 493	gx	01h22m09s	+00°56.8'	q 218	Cet	16"	discreta / buono	a prima vista, a 75x, sembra posta quasi di taglio, orientata da NE a SW; a 208x appare invece con dimensioni 3'×45" e di luminosità non perfettamente regolare, con un bulge che risalta debolmente soltanto in visione distolta — 208x.
NGC 494	gx	01h22m55s	+33°10.4'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e con basso gradiente di luce, debolmente screziata a 340x, allungata da E a W con dimensioni 90"×40"; c'è una stellina al bordo S — 450x
NGC 495	gx	01h22m56s	+33°28.3'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; è situata sul cateto occidentale di un piccolo triangolo rettangolo di stelline — 450x.
NGC 496	gx	01h23m12s	+33°31.7'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	è una debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 80"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 497	gx	01h22m24s	−00°52.5'	q 218	Cet	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 120"×40"; più interessante scalando a 340x.
NGC 498	gx	01h23m11s	+33°29.4'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (è situata 1.5' a N di NGC 499) — 450x.
NGC 499	gx	01h23m12s	+33°27.6'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	bella, diffusa e con alto gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 90"×60"; più interessante scalando a 340x.
NGC 500	gx	01h22m39s	+05°23.2'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	piuttosto debole, rotonda, di 45" di Ø, poco diffusa e con gradiente di luce molto basso; presenta una condensazione centrale quasi stellare visibile a 380x.
NGC 501	gx	01h23m22s	+33°25.9'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
NGC 502	gx	01h22m55s	+09°02.9'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di oltre 1' e un nucleo stellare evidente — 450x.
NGC 503	gx	01h23m28s	+33°19.9'	q 91	Psc	16"	ottima / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta e visibile senza problemi a 380x, è di luminosità uniforme e ha Ø di ~ 20"; è allineata con 2 stelline orientate da NW a SE.
NGC 504	gx	01h23m28s	+33°12.3'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×20", con bulge poco contrastato e un nucleo stellare marcato — 450x.
NGC 505	gx	01h22m57s	+09°28.1'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, poco allungata da NE a SW, con condensazione centrale abbastanza evidente e di dimensioni 30"×20"; è poco più brillante di NGC 509 osservata in precedenza, di luminosità uniforme ed estesa 60"×20" in direzione E-W — 380x.
NGC 507	gx	01h23m40s	+33°15.4'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	è una gx con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di un paio di primi scarsi e con l'aspetto tipico a isofote: quella più esterna è molto stemperata sul fondo cielo, quella mediana ha un Ø di una 30-ina di secondi e al centro appare un nucleo quasi stellare; tuttavia è più interessante scalando a 340x.
NGC 508	gx	01h23m41s	+33°16.8'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
NGC 509	gx	01h23m24s	+09°26.0'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30" — 450x.
NGC 510	gx	01h23m43s	+33°25.0'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debolissima, appare elusivamente in visione distolta a 450x; non dovrebbe essere più estesa di 15"; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso E (quest'ultima appare prima della gx).
NGC 511	gx	01h23m31s	+11°17.5'	q 173	Psc	16"	buona / buono	debole, piccola, rotonda, con Ø massimo pari a 40"; c'è una stellina a ridosso verso SW situata dentro l'alone — 270x.
NGC 512	gx	01h24m00s	+33°54.5'	q 91	And	16"	m. buona / m. buono	allungata da WNW a ESE, di dimensioni 1'.5×30", con bulge evidente; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso SE — 270x.
NGC 513	gx	01h24m27s	+33°48.0'	q 91	And	16"	m. buona / m. buono	ovale di luminosità uniforme, di dimensioni 60"×45" orientata da E a W — 270x.
NGC 514	gx	01h24m04s	+12°55.0'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	estesa, molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 3'×2' e tenue bulge poco contrastato; c'è una coppia di stelline a ridosso verso E, a sua volta situata 1' W di una stella brillante; un'altra coppia più debole si trova invece a ridosso verso S; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 515	gx	01h24m39s	+33°28.3'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45" e a tratti debolmente screziata all'interno (già precedentemente osservata col 10" a 178x in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 516	gx	01h24m08s	+09°33.1'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta, con piccolo bulge evidente, molto allungata da NE a SW con dimensioni 70"×20" — 450x.
NGC 517	gx	01h24m44s	+33°25.8'	q 91	Psc	24"	m. buona / discreto	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 70"×35", con alto gradiente di luce e un nucleo stellare molto evidente — 450x.
NGC 518	gx	01h24m18s	+09°19.9'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30", molto diffusa alle 2 estremità del fuso e con piccolo bulge evidente abbastanza contrastato (era osservabile anche molto debolmente anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 519	gx	01h24m29s	−01°38.5'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	molto debole, ma facilmente visibile in quanto piccola, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
NGC 520	gx	01h24m34s	+03°47.7'	q 218	Psc	16"	m. buona / ottimo	è di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 2'×45", nel punto di massimo spessore, ossia verso SE; appare infatti un po' irregolare, nel senso che a NW è meglio definita e tende invece a sfilacciarsi verso l'estremità opposta; meglio evidente a 270x.
NGC 521	gx	01h24m34s	+01°43.9'	q 218	Cet	24"	ottima / ottimo	presenta un piccolo bulge luminoso, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi circonfuso da un alone abbastanza uniforme che si stempera molto sul fondo cielo e con Ø di 2.5' — 450x.
NGC 522	gx	01h24m45s	+09°59.7'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole lama di luce orientata da NE a SW ed estesa un paio di primi — 380x.
NGC 523	gx	01h25m20s	+34°01.5'	q 91	And	16"	ottima / ottimo	compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 45"×15"; ci sono 2 deboli stelline sovrapposte lungo l'asse della galassia — 380x.
NGC 524	gx	01h24m48s	+09°32.3'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	bella, rotonda, molto diffusa e con alto gradiente di luce di luce; il bulge è piccolo e marcato; appare leggermente screziata all'interno a 450x; situata a ridosso di un piccolo asterismo foggiato a "Y".
NGC 525	gx	01h24m53s	+09°42.3'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, ma abbastanza compatta, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e un poco più brillante all'interno — 380x.
NGC 528	gx	01h25m34s	+33°40.3'	q 91	And	16"	ottima / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" con bulge abbastanza luminoso — 380x.
NGC 529	gx	01h25m40s	+34°42.8'	q 91	And	16"	ottima / ottimo	compatta, circolare, con alto gradiente di luce, con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 530	gx	01h24m41s	−01°35.2'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	facile, orientata da NW a SE, di dimensioni 60"×30"e con un bulge brillante; c'è una stellina brillante al margine SE — 380x.
NGC 531	gx	01h26m19s	+34°45.2'	q 91	And	16"	ottima / ottimo	debole, piccola, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso ENE — 380x.
NGC 532	gx	01h25m17s	+09°15.9'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	bella, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'×45"; presenta un bulge diffuso abbastanza evidente, ma poco contrastato sul disco (era osservabile molto debolmente anche nel 10" a 63x) — 450x.
NGC 533	gx	01h25m31s	+01°45.6'	q 218	Cet	24"	ottima / ottimo	molto bella, diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 3'×2' — 450x.
NGC 535	gx	01h25m31s	−01°24.5'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con bulge evidente — 380x.
NGC 536	gx	01h26m21s	+34°42.4'	q 91	And	16"	ottima / ottimo	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
NGC 538	gx	01h25m26s	−01°33.0'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	relativamente compatta, con bulge poco evidente, allungata ~ da N a S dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso del margine settentrionale — 380x.
NGC 539	gx	01h25m22s	−18°09.9'	q 308	Cet	16"	buona / scarso	molto debole e diffusa, ma facilmente osservabile in visione distolta; è poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 540	gx	01h27m09s	−20°02.1'	q 308	Cet	16"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; a tratti, in visione distolta, appare un bulge molto tenue — 270x.
NGC 541	gx	01h25m44s	−01°22.7'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	poco più debole delle componenti della coppia NGC 545-547, rotonda, con Ø di ~ 45", molto diffusa e poco più brillante all'interno — 380x.
NGC 542	gx	01h26m31s	+34°40.5'	q 91	And	16"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, diffusa, allungata da NW a SE, con dimensioni 30"×15" — 380x.
NGC 543	gx	01h25m50s	−01°17.6'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	piccola, compatta, con condensazione centrale puntiforme, orientata da E a W, di dimensioni 30"×20" — 380x.
NGC 545	gx	01h25m59s	−01°20.4'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con NGC 547 situata una 30-ina di secondi a SE; sono entrambe estese 45", con alto gradiente di luce e condensazione centrale marcata di aspetto stellare; la prima è però di aspetto più diffuso — 380x.
NGC 547	gx	01h26m01s	−01°20.7'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	v. **NGC 545**
NGC 548	gx	01h26m02s	−01°13.5'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, poco più brillante all'interno, all'incirca rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 550	gx	01h26m42s	+02°01.3'	q 218	Cet	16"	m. buona / ottimo	bella, allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×40" con bulge evidente, contrastato sul disco e nucleo decisamente stellare — 380x.
NGC 551	gx	01h27m40s	+37°11.0'	q 91	And	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con una stellina brillante quasi a ridosso di NW; a 1' E c'è una stellina doppia debole con componenti molto serrate — 380x.
NGC 554	gx	01h27m10s	−22°43.5'	q 308	Cet	16"	m. buona / mediocre	fa parte di un terzetto assieme a NGC 555 ed NGC 556 — questa è la più facile, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" ed evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 555	gx	01h27m12s	−22°45.7'	q 308	Cet	16"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, estesa 30"35", osservabile con una certa difficoltà in visione distolta — 270x.
NGC 556	gx	01h27m12s	−22°41.8'	q 308	Cet	16"	m. buona / mediocre	appare come una debole stellina sfuocata, ma si riesce a vedere senza grosse difficoltà anche in visione diretta — 270x.
NGC 557	gx	01h26m25s	−01°38.4'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme salvo un tenue nucleo stellare visibile a tratti — 380x.
NGC 558	gx	01h27m16s	−01°58.2'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	debole, piccola, diffusa, orientata ~ da NW a SE, di dimensioni 30"×20" — 380x.
NGC 559	aa	01h29m30s	+63°18.0'	q 16	Cas	6"	discreta / buono	irrisolto nel Comet Tracker a 30x; era già visibile come una debole macchia nel 15×80.
NGC 560	gx	01h27m25s	−01°54.8'	q 218	Cet	16"	buona / ottimo	sembra una edge-on, orientata da N a S, estesa per quasi 1', con un grosso bulge esteso una 30-ina di secondi e un piccolo nucleo stellare — 380x.
NGC 561	gx	01h28m19s	+34°18.5'	q 91	And	16"	ottima / ottimo	galassietta debole e compatta allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20"e con basso gradiente di luce — 380x.
NGC 562	gx	01h28m29s	+48°23.2'	q 61	And	24"	m. buona / m. buono	diffusa e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø 45" (appariva molto debolmente nel 10" a 178x, ma in condizioni di visibilità scarse) — 450x.
NGC 563	gx	01h27m10s	−18°39.2'	q 308	Cet	16"	m. buona / scarso	relativamente facile e diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso; è situata ~ 2' SE di una stellina brillante — 188x.
NGC 564	gx	01h27m48s	−01°52.8'	q 218	Cet	16"	ottima / ottimo	rotonda, Ø ~ 40", gradatamente più brillante all'interno, e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ca. 40" verso NW — 380x.
NGC 565	gx	01h28m10s	−01°18.4'	q 218	Cet	16"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da NE a SW per 45" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 566	gx	01h29m03s	+32°19.9'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	debole ovale orientato da N a S, di dimensioni 40"×20" e nucleo di aspetto stellare visibile a tratti — 380x.
NGC 567	gx	01h27m02s	−10°15.9'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	abbastanza facile, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" e appena più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 569	gx	01h29m07s	+11°07.9'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da N a S con dimensioni 50"×25", gradatamente più brillante verso l'interno e con piccolo nucleo quasi stellare (già precedentemente osservata, seppur debolmente, col 16" a 270x) — 450x.
NGC 570	gx	01h28m58s	−00°57.0'	q 218	Cet	16"	m. buona / m. buono	ovale, orientata da E a W, dimensioni 40"×30", con basso gradiente di luce; è una gx tutto sommato facile da individuare — 270x.
NGC 571	gx	01h29m56s	+32°30.1'	q 91	Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, poco allungata da NW a SE per ~ 1', di luminosità uniforme; c'è una stellina doppia molto debole dalle componenti molto serrate a ~ 1' verso SW — 380x.
NGC 573	gx	01h30m49s	+41°15.4'	q 61	And	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW (era debolmente osservabile nel 10" a 178, ma in condizioni di visibilità scarse).
NGC 575	gx	01h30m46s	+21°26.4'	q 128	Psc	16"	ottima / discreto	molto debole, diffusa, vagamente. circolare, ma dai bordi indistinti, di luminosità uniforme; c'è una debole stellina all'interno verso SE — 270x.
NGC 577	gx	01h30m40s	−01°59.6'	q 218	Cet	16"	m. buona / m. buono	debole dai bordi un po' confusi, poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE e di dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 578	gx	01h30m29s	−22°40.0'	q 308	Cet	10"	buona / discreto	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 4'×2'; è meglio contrastata scalando a 63x (ad alti ingrandimenti si stempera troppo sul fondo cielo).
NGC 579	gx	01h31m47s	+33°36.9'	q 91	Tri	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso — 380x.
NGC 582	gx	01h31m58s	+33°28.6'	q 91	Tri	16"	ottima / ottimo	poco più brillante di NGC 579, è una debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme estesa per almeno 1' in direzione NE-SW; c'è una stellina a ridosso di SW — 380x.
NGC 583	gx	01h29m44s	−18°20.3'	q 308	Cet	16"	m. buona / mediocre	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare; forma un piccolo triangolo equilatero di 1.5' di lato con una stellina situata a NW e un'altra molto debole a NNE — 270x.
NGC 584	gx	01h31m20s	−06°52.1'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	è un bell'ovale molto brillante e con alto gradiente di luce di luce, di dimensioni 3'×1.5' e orientata da NE a SW; presenta un bulge diffuso e contrastato sul disco — 270x.
NGC 585	gx	01h31m42s	−00°56.0'	q 318	Cet	16"	m. buona / m. buono	posta pressoché di taglio, estesa forse oltre 1' con bulge appena più evidente del disco — 270x.
NGC 586	gx	01h31m37s	−06°53.7'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e solo appena più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 587	gx	01h32m33s	+35°21.5'	q 91	Tri	16"	ottima / ottimo	allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30"; presenta un piccolo nucleo di aspetto stellare — 380x.
NGC 588	knot	01h32m46s	+30°38.9'	q 91	Tri	24"	ottima / m. buono	**regione H II in M33:** diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" (era osservabile anche nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 589	gx	01h32m40s	−12°02.5'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	piccola, abbastanza compatta, di aspetto un po' irregolare, forse leggermente allungata da E a W con dimensioni 30"×20" presenta un nucleo stellare visibile a tratti — 380x.
NGC 590	gx	01h33m41s	+44°55.8'	q 61	And	24"	m. buona / m. buono	è un bell'ovale diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno, orientato da N a S con dimensioni 80"×40"; è situato al margine SW di un asterismo di una 10-ina di stelle, 6 o 7 delle quali brillanti che paiono un piccolo ammasso aperto; la gx è comunque più interessante scalando a 340x (era debolmente osservabile nel 10" a 178x, ma in condizioni di visibilità scarse).
NGC 591	gx	01h33m31s	+35°40.1'	q 91	And	16"	ottima / ottimo	è un piccolo fuso di forma regolare, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con basso gradiente di luce — 380x.
NGC 592	knot	01h33m12s	+30°38.7'	q 91	Tri	24"	ottima / m. buono	regione H II in M33: piccola, relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso SE, ma potrebbe anche trattarsi di una piccola estensione condensata del nodulo (osservabile anche nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 593	gx	01h32m21s	−12°21.2'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	piccola lama di luce molto debole e di luminosità pressoché uniforme, estesa 40" e orientata da N a S — 380x.
NGC 594	gx	01h32m57s	−16°32.2'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
NGC 595	knot	01h33m34s	+30°41.6'	q 91	Tri	24"	ottima / m. buono	**regione H II in M33:** facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno (osservabile anche nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 596	gx	01h32m52s	−07°01.9'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	molto luminosa, a prima vista appare rotonda, in quanto il brillante nucleo tende un po' a cancellare l'estremità del tenue alone; quest'ultimo è in realtà poco allungata da NE a SW con dimensioni ~ 2'×1.7' — 270x.
NGC 599	gx	01h32m54s	−12°11.5'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	presenta un nucleo brillante, stellare circonfuso da un alone rotondo, diffuso che in visione distolta supera 1' di Ø — 380x.
NGC 600	gx	01h33m05s	−07°18.8'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, con basso gradiente di luce; è rotonda con Ø di un paio di primi (appariva solo elusivamente nel 10" a 63x) — 270x.
NGC 604	knot	01h34m33s	+30°47.0'	q 91	Tri	24"	ottima / m. buono	**regione H II in M33:** molto brillante, di forma un po' irregolare, screziata a 450x, approssim. circolare con Ø di 1' (facilmente osservabile nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo).
NGC 605	gx	01h35m02s	+41°14.9'	q 61	And	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con bulge esteso e abbastanza contrastato sul disco; c'è una debole stellina subito a W e una appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso NE (appariva molto debolmente nel 10" a 178x in discrete condizioni di cielo) — 450x.
NGC 606	gx	01h34m50s	+21°25.1'	q 128	Psc	16"	ottima / discreto	debole e con basso gradiente di luce; presenta un piccolo nucleo diffuso visibile a tratti; è approssim. circolare con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 608	gx	01h35m28s	+33°39.4'	q 91	Tri	16"	ottima / ottimo	forma, assieme a **NGC 614**, una coppia di galassiette distanti 5' in direzione ~ E-W; questa presenta un piccolo nucleo abbastanza brillante circonfuso da un tenue alone con Ø di 1' — 380x.
NGC 609	aa	01h36m24s	+64°32.2'	q 16	Cas	6"	discreta / perfetto	è un debole lucore irrisolto esteso un paio di primi che appare come tale anche a 90x; c'è una stellina brillante subito a SE.
NGC 613	gx	01h34m17s	−29°25.0'	q 352	Scl	6"	m. buona / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 3'×2' e con basso gradiente di luce; è situata a SW di una stella abbastanza brillante; c'è un'altra stella della stessa luminosità a poco più di 6' NW.
NGC 614	gx	01h35m52s	+33°40.9'	q 91	Tri	16"	ottima / ottimo	situata 5' E della 608, è allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con evidente condensazione centrale — 380x.
NGC 615	gx	01h35m05s	−07°20.3'	q 263	Cet	24"	m. buona / m. buono	bella, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNE a SSE, di dimensioni che in visione distolta arrivano a 3'×1' e con nucleo stellare marcato; c'è una stellina a 1' verso E (già precedentemente osservata col 10" a 126x in condizioni di cielo uguali) — 340x.
NGC 617	gx	01h34m02s	−09°46.4'	q 263	Cet	24"	buona / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale appena percettibile — 450x.
NGC 620	gx	01h37m00s	+42°19.3'	q 61	And	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (appariva molto debolmente nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 621	gx	01h36m49s	+35°30.7'	q 91	And	24"	m. buona / discreto	molto diffusa, rotonda con Ø di ~ 45" e una piccola condensazione centrale poco contrastata; un nodulo (o forse una stellina) appare solo a momenti a ridosso SW — 450x.
NGC 622	gx	01h36m00s	+00°39.8'	q 218	Cet	16"	m. buona / m. buono	debole, a basso gradiente di luce, ovale, di dimensioni 45"×30" e coi bordi molto diffusi — 270x.
NGC 624	gx	01h35m51s	−10°00.1'	q 263	Cet	16"	m. buona / mediocre	debole chiazza diffusa di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30", c'è una stellina a ridosso verso S; un'altra stellina si trova allineata con la gx un paio di primi a N (al momento dell'osservazione era ancora bassa sull'orizzonte) — 270x.
NGC 631	gx	01h36m47s	+05°50.1'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 632	gx	01h37m18s	+05°52.6'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	più grande e luminosa di NGC 631, è approssim. circolare, con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso di NE — 380x.
NGC 634	gx	01h38m18s	+35°21.9'	q 91	Tri	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da NNE a SSW, di dimensioni di 40"×20"o meno, con una stellina quasi a ridosso verso W — 380x.
NGC 636	gx	01h39m07s	−07°30.8'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	presenta un nucleo brillante, marcato, circondato da un alone molto diffuso, orientata da NE a SW con dimensioni 90"×60" — 270x.
NGC 637	aa	01h43m04s	+64°02.2'	q 16	Cas	6"	discreta / buono	piccolo e relativamente compatto; 4 o 5 stelle allineate da NE a SW sono il particolare che salta subito all'occhio.
NGC 638	gx	01h39m38s	+07°14.3'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, estesa e molto diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 2'×1'; presenta una zona interna poco più brillante allungata esattamente lungo la stessa direzione — 380x.
NGC 640	gx	01h39m25s	−09°24.1'	q 263	Cet	16"	m. buona / mediocre	debolissima tanto che si stacca molto a fatica dal fondo cielo; dovrebbe essere estesa meno di 1', ma è di aspetto confuso — 270x.
NGC 645	gx	01h40m09s	+05°43.7'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1'; presenta due svirgole alle estremità: quella a NW è più evidente — 450x.
NGC 647	gx	01h39m56s	−09°14.5'	q 263	Cet	16"	m. buona / mediocre	presenta un nucleo evidente, stellare, circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di 1' scarso — 270x.
NGC 648	gx	01h38m40s	−17°49.9'	q 308	Cet	16"	m. buona / scarso	debole, piccola, relativamente compatta, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a 1.5 SE — 188x.
NGC 649	gx	01h40m07s	−09°16.3'	q 263	Cet	16"	m. buona / mediocre	debolissima, appare solo a tratti allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", ma è molto diffusa e disturbata dalla luce di una stella brillante di 8ª situata a neppure 3' verso NE — 270x.
NGC 652	gx	01h40m44s	+07°59.0'	q 173	Psc	16"	buona / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, probabilmente allungata da WSW a ENE, di dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 653	gx	01h42m26s	+35°38.3'	q 92	And	16"	ottima / ottimo	lama di luce abbastanza facile orientata da NE a SW con bulge luminoso e nucleo marcato di aspetto stellare: appare come una classica gx vista di taglio — 380x.
NGC 654	aa	01h44m00s	+61°53.0'	q 16	Cas	6"	discreta / perfetto	molto bello, relativamente compatto, molto granulato e vagamente allungato da N a S; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SE.
NGC 655	gx	01h41m55s	−13°04.9'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	galassietta rotonda di 35" o 40" max di Ø, poco diffusa e con gradiente di luce molto basso; presenta un nucleo stellare visibile a tratti — 380x.
NGC 656	gx	01h42m27s	+26°08.6'	q 128	Psc	16"	ottima / discreto	presenta un brillante nucleo poco diffuso e un tenuissimo alone di forma irregolare con Ø di ca. 45"; è situata 1',5 SE di una stella doppia brillante dalle componenti molto serrate — 270x.
NGC 657	aa	01h43m42s	+55°52.3'	q 37	Cas	16"	mediocre / discreto	gruppetto povero e molto serrato di 4 o 5 stelle situato a pochi primi SE da una brillante stella di 7ª grandezza — 75x.
NGC 658	gx	01h42m09s	+12°36.0'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 2'×1', con bulge ampio e abbastanza contrastato sul disco; c'è una stellina all'interno verso il bordo SSW; non sembra particolarmente disturbata dalla SAO 93587 di 9ª che si trova ad appena verso 3' NNE — 450x.
NGC 659	aa	01h44m24s	+60°40.2'	q 37	Cas	16"	m. buona / m. buono	piccolo gruppo piuttosto povero di una dozzina di stelle esteso 3' o 4'; ci sono 3 stelline ravvicinate in fila, orientate da E a W, verso il margine orientale — 270x.
NGC 660	gx	01h43m02s	+13°38.6'	q 173	Psc	16"	m. buona / ottimo	è brillante, ma con gradiente di luce tutto sommato modesto, molto allungata da NE a SW con dimensioni 3'×1'; entrambe le estremità, molto diffuse, tendono a curvarsi in senso orario dando alla gx la forma di una "S"; c'è una stellina a un paio di primi SE — 270x.
NGC 661	gx	01h44m15s	+28°42.3'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 1', diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare; ci sono 2 deboli stelline quasi a ridosso: una a NE e l'altra a S — 380x.
NGC 662	gx	01h44m35s	+37°41.8'	q 92	And	16"	discreta / mediocre	molto debole, sembra poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; è necessario osservare a 132x in quanto situata ad appena 3' di distanza NE dalla SAO 54944 di magnitudo 7.4 che disturba parecchio.
NGC 663	aa	01h46m17s	+61°13.1'	q 16	Cas	16"	m. buona / m. buono	si vede facilmente nel cercatore 10x50 — gruppo irregolare di oltre 50 stelle esteso una 15-ina di primi; le più brillanti sembrano disposte verso la periferia; ci sono all'interno 3 coppie serrate verso i bordi N, NW e W di cui una sbilanciata; è più interessante a 132x.
NGC 664	gx	01h43m46s	+04°13.4'	q 218	Psc	16"	m. buona / m. buono	mi sembra leggermente ovale, di dimensioni 40"×30", orientata da E a W, debole e con basso gradiente di luce; simile sotto certi aspetti a NGC 570 — 270x.
NGC 665	gx	01h44m56s	+10°25.4'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	ha un bulge brillante, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi circonfuso da un alone molto tenue orientata da NW a SE e di dimensioni 1.5'×1'; a 450x appare screziata all'interno; c'è una debole stellina a ridosso verso SSE e un'altra più brillante a 1.5' verso S.
NGC 666	gx	01h46m06s	+34°22.5'	q 92	Tri	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale (era visibile molto debolmente nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 667	gx	01h44m57s	−22°55.1'	q 308	Cet	16"	m. buona / mediocre	è una debole galassia rotonda di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa e con Ø di una 30-ina di secondi; è situata ~ 1' SE di una stellina brillante — 270x.
NGC 668	gx	01h46m23s	+36°27.6'	q 92	And	16"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NNE a SSW e con dimensioni 70"×50"; presenta un piccolo nucleo di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 669	gx	01h47m16s	+35°33.8'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	è un bel fuso orientata da NE a SW, di dimensioni 2.5'×30" e con tenue bulge diffuso poco contrastato sul disco — 270x.
NGC 670	gx	01h47m25s	+27°53.1'	q 128	Tri	24"	m. buona / m. buono	brillante, diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", con bulge evidente, contrastato e nucleo stellare (era debole, ma facilmente visibile nel 10" a 126x) — 450x.
NGC 671	gx	01h46m59s	+13°07.5'	q 173	Ari	16"	buona / buono	relativamente brillante, si presenta con una sorta di "barra" orientata da WSW a ENE di dimensioni 60"×45"; quest'ultima è circonfusa, tuttavia, da un tenue alone di aspetto circolare con Ø di ~ 1.5' — 270x.
NGC 672	gx	01h47m54s	+27°26.0'	q 128	Tri	24"	m. buona / buono	molto diffusa, allungata da ENE a WSW con dimensioni 5'×2', leggermente screziata a 340x e con tenue bulge irregolare poco contrastato sul disco; pare incastonata all'interno di un triangolo isoscele di stelline il cui vertice più acuto punta a ENE; c'è una stellina a bordo meridionale, esattamente a metà galassia (era osservabile, quasi al limite, anche in un 6").
NGC 673	gx	01h48m23s	+11°31.3'	q 173	Ari	16"	buona / buono	dimensioni 2'.5 ×1'.5, orientata da N a S stemperata ai bordi, con ampio bulge poco più brillante dell'alone — 270x.
NGC 675	gx	01h49m09s	+13°03.6'	q 173	Ari	16"	buona / buono	molto debole, allungata da E a W per almeno 1'.5 e con una condensazione centrale appena visibile; c'è una stellina a ridosso verso NW — 270x.
NGC 676	gx	01h48m57s	+05°54.4'	q 173	Psc	24"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S con dimensioni 3'×45", diffusa e con piccolo bulge poco contrastato sul quale si sovrappone, un poco verso S, una stella brillante arancione; c'è una stellina al bordo E — 450x.
NGC 677	gx	01h49m14s	+13°03.3'	q 173	Ari	16"	buona / buono	è situata a un paio di primi a E della 675; oggetto brillante, con marcata condensazione centrale, rotondo, con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 678	gx	01h49m25s	+21°59.8'	q 128	Ari	16"	ottima / buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 3'×45", con bulge brillante ed esteso; il disco fusiforme si stempera notevolmente alle 2 estremità E e W — 380x.
NGC 679	gx	01h49m44s	+35°47.1'	q 92	And	16"	ottima / ottimo	rotonda, molto diffusa e con alto gradiente di luce; ha Ø > 1' e un nucleo brillante di aspetto quasi stellare — 380x.
NGC 680	gx	01h49m47s	+21°58.3'	q 128	Ari	16"	ottima / buono	presenta un nucleo marcato di aspetto stellare e un bulge evidente circonfuso da un alone che via via si stempera; grosso modo rotonda con Ø di 2' scarsi — 380x.
NGC 681	gx	01h49m11s	−10°25.7'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	poco allungata da NE a SW con dm 60"×45" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso verso W; piccolo rombo di stelline di luminosità simile subito a SW — 270x.
NGC 682	gx	01h49m04s	−14°58.5'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	bella, rotonda con Ø < 1', diffusa, poco più brillante all'interno e nucleo puntiforme — 380x.
NGC 683	gx	01h49m47s	+11°42.1'	q 173	Ari	16"	buona / buono	debole, approssim. circolare, di ~ 1' di Ø, coi bordi molto sfumati e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 684	gx	01h50m14s	+27°38.8'	q 128	Tri	24"	m. buona / buono	è posta praticamente di taglio, orientata da E a W ed estesa per quasi 3'; relativamente compatta, presenta un bulge evidente, diffuso con al centro un nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso ESE e un'altra appena percettibile alla stessa distanza verso ENE — 450x.
NGC 686	gx	01h48m56s	−23°47.8'	q 308	For	16"	m. buona / scarso	facile, rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con Ø di 1' a tratti sembra comunque di vedere un piccolo nucleo quasi stellare; la galassia è in parte disturbata dalla presenza di 2 stelle brillanti: una di 10ª a 4' NW e un'altra di 8ª a 5' SW — 132x.
NGC 687	gx	01h50m33s	+36°22.2'	q 92	And	16"	ottima / buono	debole, rotonda con Ø di 1' scarso, poco diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a 1.5' verso NW — 208x.
NGC 688	gx	01h50m44s	+35°17.0'	q 92	Tri	16"	buona / m. buona	è molto stemperata sul fondo cielo, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 689	gx	01h49m52s	−27°27.9'	q 308	For	16"	m. buona / mediocre	è una chiazza lattiginosa approssim. rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 1'; c'è una stellina 1.5' a SW a oltre un paio di primi verso E — 270x.
NGC 690	gx	01h47m48s	−16°43.3'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	chiazza diffusa di luminosità uniforme e molto debole; in visione distolta appare leggermente allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 691	gx	01h50m42s	+21°45.6'	q 128	Ari	16"	ottima / buono	molto diffusa, con bulge evidente ed esteso, orientata da E a W con dimensioni 2'×1.5'; c'è una stellina doppia stretta dalle componenti brillanti quasi a ridosso verso NE — 380x.
NGC 693	gx	01h50m31s	+06°08.7'	q 173	Psc	16"	discreta / buono	poco diffusa allungata da E a W con dimensioni 70"×35" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stella brillante quasi a ridosso verso E — 208x.
NGC 694	gx	01h50m58s	+21°59.8'	q 128	Ari	16"	ottima / buono	piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 695	gx	01h51m14s	+22°35.0'	q 128	Ari	16"	ottima / buono	piccola, rotonda con Ø di 30"-35" e condensazione centrale appena evidente; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso W e un'altra più debole a ~ 1' SW — 380x.
NGC 697	gx	01h51m17s	+22°21.5'	q 128	Ari	16"	ottima / buono	facile e di aspetto ben regolare, molto allungata da WNW a ESE, con dimensioni 4'×1.5' e basso gradiente di luce (solo poco più brillante verso l'interno) — 380x.
NGC 699	gx	01h50m43s	−12°02.1'	q 263	Cet	16"	buona / ottimo	debolissima! Appare a tratti allungata da NW a SE per una 40-ina di secondi; presenta un piccolo e debole bulge che appare prima dell'alone — 270x.
NGC 700	gx	01h52m13s	+36°05.8'	q 92	And	28"	m. buona / ottimo	molto allungata da N a S, diffusa, di dimensioni 60"×15" e con piccolo bulge rotondo abbastanza contrastato; è situata tra 2 stelline a ridosso N e S (quella a S appare a tratti con un piccolo "baffo" come in presenza di una compagna debolissima e irrisolta verso N); fa parte dell'ammasso **AGC 262** — 495x.
NGC 701	gx	01h51m03s	−09°42.2'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	bella, poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×45" e appena più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 702	gx	01h51m19s	−04°03.3'	q 218	Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa, presenta un piccolo nucleo brillante, poco decentrato verso S, su un disco grosso modo circolare con Ø di 45"; un tenue baffo leggermente arcuato in direzione W si diparte verso N dal nucleo (già facilmente osservabile nel 16" a 270x) — 450x.
NGC 703	gx	01h52m40s	+36°10.3'	q 92	And	28"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, poco allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso S; fa parte, assieme alle due successive dell'ammasso **AGC 262** — 495x.
NGC 704	gx	01h52m38s	+36°07.6'	q 92	And	28"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina al margine S — 495x.
NGC 705	gx	01h52m41s	+36°08.6'	q 92	And	28"	m. buona / ottimo	diffusa, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×20", con bulge esteso ed evidente; c'è una stellina subito a S. A ridosso verso S appare a momenti una stellina appena percettibile, ma si tratta in realtà di **MAC 0152+3608A** — 495x.
NGC 706	gx	01h51m50s	+06°17.7'	q 173	Psc	16"	discreta / buono	approssim. circolare, con Ø max di 1', poco diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina brillante subito a N — 208x.
NGC 707	gx	01h51m27s	−08°30.3'	q 263	Cet	24"	ottima / m. buono	diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" e nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina all'interno del disco verso E — 400x.
NGC 708	gx	01h52m46s	+36°09.1'	q 92	And	28"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, poco allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×60"; c'è una stellina all'interno verso il margine N; fa parte, assieme alle due successive, dell'ammasso **AGC 262** — 495x.
NGC 709	gx	01h52m51s	+36°13.4'	q 92	And	28"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente — 495x.
NGC 710	gx	01h52m54s	+36°03.2'	q 92	And	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso S; altre due stelline molto deboli si trovano a ridosso SW ed E — 495x.
NGC 711	gx	01h52m28s	+17°30.8'	q 129	Ari	16"	ottima / discreto	piccola, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×30" e con bulge brillante; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso E — 270x.
NGC 712	gx	01h53m08s	+36°49.1'	q 92	And	24"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso SE e una abbastanza brillante a 1' scarso verso N; solo a momenti appare qualcosa di puntiforme a NE, ma non capisco se si tratti di un nodulo della gx o di una debolissima stellina — 450x.
NGC 713	gx	01h55m21s	−09°05.0'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	molto debole, visibile a tratti in visione distolta; è difficile da osservare in quanto situata in una piccola zona depleta — 270x.
NGC 714	gx	01h53m30s	+36°13.3'	q 92	And	24"	m. buona / buono	molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 80"×20" e con nucleo quasi stellare ben contrastato; c'è una stellina al margine WNW che fa parte di un piccolo triangolo rettangolo — 450x.
NGC 715	gx	01h53m12s	−12°52.4'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	molto debole, piccola, di luminosità uniforme, allungata ~ da N a S e dimensioni 30"×15" — 270x.
NGC 716	gx	01h52m59s	+12°42.5'		Ari	16"	ottima / ottimo	diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" (non è riportata sull'Uranometria) — 380x.
NGC 717	gx	01h53m55s	+36°13.7'	q 92	And	24"	m. buona / buono	è una debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme, orientata da WNW a ESE ed estesa 1' — 450x.
NGC 718	gx	01h53m13s	+04°11.8'	q 219	Psc	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo brillante, stellare circondata da un alone molto diffuso, rotonda con Ø di un paio di primi scarsi — 270x.
NGC 719	gx	01h53m39s	+19°50.5'	q 129	Ari	24"	ottima / molto buono	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una coppia di stelline a ridosso SE (appariva evidente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 720	gx	01h53m00s	−13°44.3'	q 264	Cet	24"	m. buona / m. buono	bella, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 3'×1.5', con bulge rotondo, molto contrastato e di aspetto screziato a 340x (era facilmente visibile nel 10" a 126x in condizioni di cielo uguali).
NGC 721	gx	01h54m45s	+39°23.0'	q 61	And	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 80"×60"; meglio contrastata scalando a 340x (appariva elusivamente e di forma indistinta nel 10" a 178x).
NGC 722	gx	01h54m47s	+20°41.9'	q 129	Ari	24"	m. buona / buono	diffusa e a tratti debolmente screziata, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×30" e con nucleo stellare poco contrastato (appariva molto debolmente e con condensazione centrale nel 10" a 178x; la gx era comunque molto disturbata dalla β Arietis di 3ª grandezza situata a 7' scarsi NNW) — 450x.
NGC 723	gx	01h53m46s	−23°45.5'	q 309	Cet	16"	m. buona / scarso	facile, relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 1' e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a più di 1' verso SW — 132x e 188x.
NGC 725	gx	01h52m35s	−16°31.1'	q 264	Cet	16"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola, di luminosità uniforme e di aspetto un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø maggiore di 1' — 270x.
NGC 726	gx	01h55m32s	−10°48.0'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, stemperata sul fondo cielo, con debole condensazione centrale ed estesa per max 30" — 270x.
NGC 728	ss	01h55m01s	+04°13.4'		Psc	24"	buona / ottimo	è una tripla molto serrata dalle componenti sbilanciate, facilmente visibile e risolvibile a 450x; tuttavia a bassi ingrandimenti e col seeing sfavorevole potrebbe essere scambiata per un piccolo oggetto diffuso.
NGC 731	gx	01h54m56s	−09°00.6'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	brillante, rotonda con Ø di almeno 1', poco diffusa e con alto gradiente di luce — 270x.

NGC 732	gx	01h56m28s	+36°48.2'	q 92	And	16"	discreta / mediocre	estremamente debole e diffusa, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a ridosso verso NW — 132x.
NGC 733	gx	01h56m25s	+33°03.9'	q 92	Tri	16"	m. buona / discreto	elusiva! È appena percettibile a tratti in visione distolta come un oggetto approssim. circolare con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 734	gx	01h54m57s	−17°04.8'	q 309	Cet	16"	m. buona / mediocre	elusiva! Appare solo a tratti scalando a 188x; forma un triangolo rettangolo con 2 stelline brillanti distanti 2.5', orientate da E a W e situate a S della gx — 270x.
NGC 735	gx	01h56m38s	+34°10.5'	q 92	Tri	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con condensazione stellare appena percettibile; c'è una stellina al bordo NW; poco disturbata da una stella brillante di 10a grandezza situata 1.5' a SW (era visibile, seppure molto debolmente, nel 10" a 190x nelle stesse condizioni di cielo) — 450x.
NGC 736	gx	01h56m41s	+33°02.6'	q 92	Tri	16"	m. buona / discreto	approssim. circolare, con Ø di 1', alto gradiente di luce e marcata condensazione centrale; c'è una stellina a una 20-ina di secondi verso N — 270x.
NGC 738	gx	01h56m46s	+33°03.5'	q 92	Tri	16"	buona / discreto	situata un paio di primi a NE di NGC 736, è una piccola galassia con condensazione centrale quasi stellare — 270x.
NGC 739	gx	01h56m55s	+33°16.0'	q 92	Tri	16"	m. buona / discreto	piccola, debole, appena appena più brillante verso l'interno, con Ø di una 30-ina di primi; c'è una debolissima stellina a ridosso verso S — 270x.
NGC 740	gx	01h56m55s	+33°00.9'	q 92	Tri	16"	m. buona / discreto	molto debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30" e di luminosità uniforme; è disturbata dalla luce di una stella brillante a un paio di primi verso E — 270x.
NGC 741	gx	01h56m21s	+05°37.7'	q 174	Psc	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø che in visione distolta supera il 1' — 450x.
NGC 742	gx	01h56m24s	+05°37.6'	q 174	Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20"; in visione distolta pare inviluppata nell'alone della precedente — 450x.
NGC 743	aa	01h58m32s	+60°10.0'	q 37	Cas	16"	m. buona / m. buono	si vede già nel cercatore — è un gruppo triangolare di stelline di luminosità diseguale; se ne contano facilmente 15 a 132x (senza tuttavia considerare quelle molto deboli); c'è una bella corona di 5 stelle brillanti a poco più di mezzo grado SW.
NGC 744	aa	01h58m30s	+55°28.5'	q 37	Per	16"	buona / ottimo	a 270x appaiono una 20-ina di componenti di luminosità diseguale; le 6 stelle principali, delle quali 3 sono in realtà delle coppie, sono situate ai vertici di un esagono concavo e irregolare di dimensioni 5'×3'.
NGC 746	gx	01h57m51s	+44°55.0'	q 61	And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, poco allungata da E a W con dimensioni 80"×60"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W; ancora più a W si trova un asterismo di 5 componenti brillanti fatto a "W" molto schiacciata; meglio contrastata scalando 340x (era elusivamente osservabile in visione distolta nel 10" a 178x).
NGC 748	gx	01h56m22s	−04°28.0'	q 219	Cet	16"	buona / buono	galassia molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×45" e con una evidente condensazione centrale; c'è una stellina brillante a 1.5' NW — 188x.
NGC 750	gx	01h57m33s	+33°12.5'	q 92	Tri	16"	m. buona / discreto	assieme a NGC 751 forma una coppia di piccoli oggetti compatti, molto ravvicinati, situati in direzione N-S e; la 1ª è di forma pressoché circolare, con Ø di ca. 1' e presenta una condensazione centrale evidente; la 2ª è più piccola, di 40" max di dimensioni e a prima vista pare una semplice propaggine della prima — 270x.
NGC 751	gx	01h57m33s	+33°12.2'	q 92	Tri	16"	m. buona / discreto	v. **NGC 750**
NGC 752	aa	01h57m48s	+37°51.0'	q 92	And	6"	m. buona / m. buono	molto bello, brillante, esteso, già parzialmente risolto nel cercatore 6x30, nonché visibile a occhio nudo quando transita nei pressi dello zenit.
NGC 753	gx	01h57m42s	+35°55.0'	q 92	And	24"	m. buona / discreto	rotonda con Ø, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, ma con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N (la gx era debolmente visibile nel 10" a 126x) — 340x.
NGC 755	gx	01h56m22s	−09°03.6'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	quasi una edge-on; è una galassia a basso gradiente di luce, orientata da NE a SW, di dimensioni 2'×30" — 270x.
NGC 756	gx	01h54m29s	−16°42.5'	q 219	Cet	16"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, estesa ~ 1', con bulge evidente e debole nucleo stellare — 270x.
NGC 758	gx	01h55m42s	−03°04.0'	q 219	Cet	16"	buona / buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è facilmente visibile in visione distolta in una zona ove sono presenti solo deboli stelline — 188x.
NGC 759	gx	01h57m50s	+36°20.5'	q 92	And	24"	m. buona / m. buono	molto facile, rotonda con Ø di 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; qualche tenue screziatura appare a momenti nelle regioni periferiche; c'è una stellina quasi a ridosso S (già precedentemente osservata nel 16" in ottime condizioni di trasparenza e seeing) — 450x.
NGC 760	ss	01h57m47s	+33°21.3'		Tri	24"	ottima / mediocre	si tratta di una doppia irrisolta e molto debole che a 450x si presenta come un minuscolo oggetto nebuloso e compatto orientato da E a W (situata poco più di 1' a S di NGC 761).
NGC 761	gx	01h57m50s	+33°22.6'	q 92	Tri	24"	ottima / mediocre	è un bell'ovale con basso gradiente di luce, poco diffuso, orientato da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' scarso E (la più meridionale di un piccolo triangolo) — 450x.
NGC 762	gx	01h56m58s	−05°24.2'	q 264	Cet	16"	m. buona / discreto	abbastanza facile, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×40" con lievi irregolarità di luce all'interno — 270x.
NGC 765	gx	01h58m48s	+24°53.5'	q 129	Ari	16"	ottima / buono	chiazza circolare con Ø di 1.5', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; meglio osservabile a 270x.
NGC 766	gx	01h58m42s	+08°20.8'	q 174	Psc	24"	buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di ~ 80" — 450x.
NGC 767	gx	01h58m51s	−09°35.3'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	molto debole, quasi elusiva, visibile solo in visione distolta, estesa max una 30-ina di secondi; è visibile a tratti una piccola condensazione centrale — 270x.
NGC 768	gx	01h58m41s	+00°31.7'	q 219	Cet	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa e con gradiente di luce molto basso, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina a meno di 1' verso E — 380x.
NGC 769	gx	01h59m36s	+30°54.6'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina a ridosso verso SE; più a E ce n'è un'altra della stessa luminosità distante 1' scarso: la dimensione max della galassia è pari alla distanza di queste stelline — 380x.
NGC 770	gx	01h59m14s	+18°57.3'	q 129	Ari	24"	buona / buono	facile e relativamente compatta, con basso gradiente di luce, allungata da N a S e di dimensioni 45"×30" — 450x.
NGC 772	gx	01h59m20s	+19°00.5'	q 129	Ari	24"	buona / buono	presenta un bulge rotonda, molto brillante con Ø di 45" e un alone circonfuso, a tratti irregolarmente screziato e allungata da NW a SE con dimensioni 4'×2.5; in visione distolta appare distintamente un lungo baffo arcuato che dal centro arriva a 1' N di una stellina abbastanza brillante — 450x.
NGC 773	gx	01h58m52s	−11°31.0'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 774	gx	01h59m35s	+14°00.5'	q 174	Ari	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", con piccolo bulge contrastato e nucleo stellare — 450x.
NGC 775	gx	01h58m33s	−26°17.6'	q 309	For	16"	ottima / mediocre	è una debole chiazza lattiginosa, diffusa e a basso gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60" (dimensioni e orientamento sono stimati in base alle 2 stelline situate a NNW) — 270x.
NGC 776	gx	01h59m55s	+23°38.6'	q 129	Ari	16"	ottima / buono	chiazza rotonda, con Ø di 70"-75" e con condensazione centrale quasi stellare abbastanza ben visibile a 270x.
NGC 777	gx	02h00m14s	+31°25.6'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	rotonda, poco diffusa e con Ø di 1' ; presenta basso gradiente di luce e un nucleo stellare; c'è una stellina a ~ 1' verso N — 380x.
NGC 778	gx	02h00m19s	+31°18.8'	q 92	Tri	16"	discreta / mediocre	molto debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, salvo una leggera condensazione centrale visibile solo a momenti in visione distolta; è orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 132x.
NGC 779	gx	01h59m43s	−05°57.9'	q 264	Cet	24"	ottima / m. buono	bella e di aspetto molto regolare; è molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 3'×1', con bulge diffuso, contrastato e nucleo stellare — 400x.
NGC 780	gx	02h00m34s	+28°13.4'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	di aspetto un po' confuso, ma con evidente condensazione centrale, forse un poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45"; ci sono 2 stelline appena percettibili, una a ridosso verso S e l'altra a E — 270x.
NGC 781	gx	02h00m09s	+12°39.4'	q 174	Ari	16"	ottima / ottimo	è una bella edge-on estesa un paio di primi in direzione N-S, con bulge evidente, diffuso e nucleo stellare; ottima visione a 380x.
NGC 783	gx	02h01m07s	+31°52.9'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, approssim. rotonda con Ø > 1'; c'è una stellina al margine occidentale e un'altra poco più distante a SE — 380x.
NGC 784	gx	02h01m17s	+28°50.2'	q 92	Tri	24"	m. buona / m. buono	molto estesa e con gradiente di luce molto basso, di aspetto a tratti un po' irregolare, molto allungata da N a S con dimensioni 5'×1'; è molto diffusa verso S, poco meno dalla parte opposta; il bulge non è definito, solo un'ampia zona interna è appena più brillante e debolmente screziata, ma il contrasto col disco galattico è bassissimo; meglio definita a 340x (già osservata nel 10" a 178x in buone condizioni di trasparenza e seeing).
NGC 785	gx	02h01m40s	+31°49.6'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, poco più luminosa all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; è situata tra 2 stelline brillanti distanti 5' e orientate da NNW a SSE — 380x.
NGC 786	gx	02h01m25s	+15°38.8'	q 173	Ari	10"	discreta / buono	piccola, debole, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e con una evidente condensazione centrale di aspetto stellare meglio individuabile a 208x.
NGC 787	gx	02h00m49s	−09°00.2'	q 264	Cet	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W, di dimensioni 90"×60" e con nucleo stellare — 400x.
NGC 788	gx	02h01m06s	−06°48.9'	q 264	Cet	24"	m. buona / discreto	rotonda con Ø > 1', di aspetto ben regolare, diffusa, con alto gradiente di luce e nucleo quasi stellare — 400x.
NGC 789	gx	02h02m26s	+32°04.3'	q 92	Tri	24"	m. buona / m. buono	poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30", poco diffusa e con basso gradiente di luce (appariva molto debolmente nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 790	gx	02h01m22s	−05°22.3'	q 264	Cet	16"	m. buona / mediocre	presenta una zona interna brillante, compatta, esteso 20" con nucleo stellare, circonfusa da un tenuissimo alone rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 791	gx	02h01m44s	+08°30.0'	q 174	Psc	16"	ottima / ottimo	rotonda, gradatamente più brillante verso l'interno, diffusa e con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a ridosso verso NW — 380x.
NGC 792	gx	02h02m15s	+15°42.7'	q 174	Ari	10"	discreta / buono	è una piccola chiazza di luce, debole, più facilmente visibile ad alti ingrandimenti per ridurre un effetto di micro abbagliamento indotto da una stellina brillante situata 1.5' a NNE.
NGC 794	gx	02h02m29s	+18°22.4'	q 129	Ari	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 45", molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con piccola condensazione centrale quasi stellare (appariva debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 797	gx	02h03m28s	+38°07.0'	q 92	And	16"	ottima / ottimo	molto piccola, estesa per max 20" o 30" con un nucleo brillante stellare luminoso come la stellina situata a 45" verso W — 380x.
NGC 798	gx	02h03m20s	+32°04.7'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", con piccolo bulge diffuso e ben contrastato sul disco (appariva molto debolmente nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 799	gx	02h02m12s	−00°06.0'	q 219	Cet	16"	ottima / buono	assieme a NGC 800 forma una coppia di gx piuttosto deboli distanti un paio di primi in direzione N-S — la 1ª è rotonda, diffusa, con tenue condensazione centrale e Ø > 1'; c'è una stellina a ridosso verso E; la 2ª è leggermente allungata da N a S con dimensioni 50"×40", di luminosità uniforme e diffusa; c'è una stellina a 1' verso SW — 270x.
NGC 800	gx	02h02m12s	−00°07.9'	q 219	Cet	16"	ottima / buono	v. **NGC 799**
NGC 801	gx	02h03m45s	+38°15.6'	q 92	And	16"	discreta / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; date le condizioni non certo eccezionali del cielo ha richiesto diverso tempo per essere "scovata" col 14 mm. a 132x: appariva molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'×30".
NGC 803	gx	02h03m45s	+16°01.9'	q 174	Ari	16"	discreta / buono	molto allungata da N a S con dimensioni 2'×30", molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W — 208x.
NGC 804	gx	02h04m02s	+30°50.0'	q 92	Tri	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", con basso gradiente di luce e un nucleo stellare poco contrastato (già osservata, seppur molto debolmente, nel 10" a 178x in buone condizioni di trasparenza e seeing) — 450x.
NGC 805	gx	02h04m30s	+28°48.7'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	molto piccola, rotonda, con Ø massimo di 20", con piccola condensazione centrale puntiforme; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelline orientate in direzione NNW-SSE e distanti 30" — 270x.
NGC 806	gx	02h03m31s	−09°55.9'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	quasi una edge-on, molto debole, di luminosità uniforme e orientata da NE a SW ed estesa meno di 1' — 270x.
NGC 807	gx	02h04m56s	+28°59.3'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	piccola galassia con alto gradiente di luce, pressoché rotonda con Ø di 45"; presenta un nucleo brillante e leggermente eccentrico (spostato un poco a S); c'è una stellina brillante a poche decine di secondi verso NNE — 270x.
NGC 808	gx	02h03m57s	−23°18.7'	q 309	Cet	16"	m. buona / scarso	è un fuso molto debole allungato da N a S, di dimensioni 80"×30", diffuso e con bulge evidente; c'è una stellina a 1.5' NNE — 188x.
NGC 809	gx	02h04m19s	−08°44.1'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	abbastanza compatta, allungata da N a S, di dimensioni 40"×30", debole, ma con nucleo stellare visibile — 270x.
NGC 810	gx	02h05m28s	+13°15.1'	q 274	Ari	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45" — 450x.
NGC 811	gx	02h04m35s	−10°06.5'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	piccola e molto debole, quasi elusiva, estesa ~ 30" e osservabile solo in visione distolta — 270x.
NGC 812	gx	02h06m51s	+44°34.5'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30" e di aspetto un po' irregolare, con lievi discrepanze di luce all'interno; la gx è abbastanza definita verso N, ma tende un poco a sfilacciarsi dalla parte opposta; c'è una stellina brillante a 1' SW (appariva molto debolmente e di forma indistinta nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 814	gx	02h02m57s	−14°36.5'	q 264	Cet	16"	m. buona / mediocre	elusiva, molto diffusa ed estesa ~ 1'; ho dovuto scalare a 188x e aspettare che si alzasse sull'orizzonte, perché ai primi tentativi non ero riuscito a vederla.
NGC 815	gx	02h02m54s	−14°40.4'	q 264	Cet	16"	m. buona / mediocre	debolissima e poco diffusa, appare solo a momenti in visione distolta; è situata 4' a S di NGC 814 — 188 x e 270x.
NGC 816	gx	02h08m09s	+29°15.4'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	è una piccola galassia approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole a ridosso di SW — 270x.
NGC 817	gx	02h07m34s	+17°12.1'	q 129	Ari	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 45"×20" — 380x.
NGC 818	gx	02h08m44s	+38°46.6'	q 92	And	16"	m. buona / m. buono	allungata da WNW a ESE, diffusa, con basso gradiente di luce di luce e dimensioni 90"×45"; c'è una stellina a S del bordo orientale — 270x.
NGC 819	gx	02h08m35s	+29°14.0'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	è più luminosa della 816 dalla quale dista ~ 5' ESE, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×30", con bulge esteso, ben evidente in visione distolta; è situata in mezzo a 2 stelline orientate come la galassia delle quali quella settentrionale è più brillante — 270x.
NGC 820	gx	02h08m25s	+14°21.0'	q 174	Cet	16"	ottima / ottimo	è una bella gx ad alto gradiente di luce, leggermente screziata a 380x, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una debole stellina a ridosso verso SE.
NGC 821	gx	02h08m21s	+10°59.7'	q 174	Ari	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, orientata da NE a SW con dimensioni di quasi 2'×1'; presenta un piccolo bulge contrastato di 30"×15" con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile al margine SW, mentre una stella brillante — la SAO 92805 di 9ª grandezza — si trova a ridosso NW, ma non sembra interferire più di tanto con la visione; la visione è comunque più interessante scalando a 340x (facilmente visibile anche nel 10" a 126x).
NGC 823	gx	02h07m20s	−25°26.6'	q 309	For	16"	ottima / mediocre	è una piccola chiazza relativamente brillante, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40", con nucleo puntiforme e una stellina puntiforme proprio al margine orientale — 270x.
NGC 825	gx	02h08m32s	+06°19.5'	q 174	Cet	16"	ottima / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", con bulge evidente ed esteso — 380x.
NGC 826	gx	02h09m25s	+30°44.4'	q 92	Tri	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, approssim. rotonda con Ø di 30"-35" e con piccolo bulge poco contrastato; situata all'interno di un quadrilatero irregolare di stelline deboli (quella più a S ha una compagna appena percettibile a E). In visione distolta sembra a tratti "allungarsi" verso N a causa della piccola e debolissima **MAC 0209+3044** che tuttavia non si separa dalla gx principale — 495x.
NGC 827	gx	02h08m56s	+07°58.3'	q 174	Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, con basso gradiente di luce; è molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30"; poco interessante a 380x.
NGC 828	gx	02h10m09s	+39°11.5'	q 62	And	16"	discreta / mediocre	assai diffusa e stemperata sul fondo cielo, con gradiente di luce di luce molto basso, forse rotonda con Ø di un paio di primi; c'è una doppia stretta con componenti brillanti a 3' ESE (la gx stata successivamente osservata con con un 10" a 178x e in condizioni di visibilità un poco migliori, ma non appariva molto diversa) — 132x.
NGC 829	gx	02h08m42s	−07°47.4'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	è di aspetto un po' confuso, con basso gradiente di luce, poco allungata ~ da E a W e dimensioni 45"×30 — 270x.
NGC 830	gx	02h08m59s	−07°46.0'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	è di dimensioni simili, ma di aspetto più regolare, allungata ca. come NGC 829 e con nucleo puntiforme abbastanza brillante — 270x.
NGC 831	gx	02h09m34s	+06°05.8'	q 174	Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
NGC 832	ss	00h11m01s	+35°32.5'		Tri	28"	m. buona / ottimo	è una doppia stretta con componenti orientate da N a S e separate da < 10"; un paio di primi a SSW c'è un'altra doppia orientata nello stesso modo e con le stelle appena più brillanti. È da notare che il Megastar riporta, sia con questa sigla, sia con PGC 8280, un minuscolo oggetto situato a 45" a S di una coppia di deboli stelline, orientate da NW a SE, ma che tuttavia non sono riuscito a vedere nemmeno a 495x; questa però si trova 11' più a W rispetto alla doppia in questione.
NGC 833	gx	02h09m20s	−10°08.0'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	costituisce, assieme a NGC 835, NGC 838 ed NGC 839, un quartetto di gx facili, diffuse: la 1ª è allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con evidente condensazione centrale; la 2ª è più brillante, di dimensioni 60"×45", allungata da N a S, con una marcata condensazione centrale di aspetto stellare; la 3ª, poco più debole della precedente, è grosso modo rotonda, con nucleo stellare e Ø inferiore a 1'; la 4ª, infine, è allungata da E a W, di dimensioni 60"×30"e più diffusa rispetto alle altre 3 *(presenza di chiarore lunare)* — 270x.
NGC 834	gx	02h11m01s	+37°40.0'	q 92	And	24"	m. buona / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; due stelline abbastanza brillanti si trovano rispettivamente subito a E e a 1' verso NE — 450x.
NGC 835	gx	02h09m24s	−10°08.1'	q 264	And	16"	buona / ottimo	v. **NGC 833**
NGC 836	gx	02h10m25s	−22°03.3'	q 309	Cet	16"	m. buona / scarso	debole, grosso modo rotonda con Ø di 45", diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a un paio di primi verso E — 188x.
NGC 837	gx	02h10m16s	−22°25.9'	q 309	Cet	16"	ottima / mediocre	è un debole ovale di 45"×20", luminosità pressoché uniforme e orientata da N a S; c'è una stellina brillante molto vicina al bordo settentrionale — 270x.
NGC 838	gx	02h09m38s	−10°08.8'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	v. **NGC 833**
NGC 839	gx	02h09m43s	−10°11.0'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	v. **NGC 833**
NGC 840	gx	02h10m16s	+07°50.7'	q 174	Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e un nucleo stellare visibile solo a momenti — 450x.
NGC 841	gx	02h11m17s	+37°29.8'	q 92	And	16"	m. buona / m. buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×45", molto diffusa, con piccolo bulge evidente e nucleo stellare marcato di aspetto quasi stellare — 380x.
NGC 842	gx	02h09m51s	−07°45.7'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	poco più piccola della 830 — da cui dista 12' verso E — allungata ~ da N a S, di dimensioni 40"×20"e con condensazione centrale brillante — 270x.
NGC 843	ss	02h11m08s	+32°05.8'		Tri	24"	ottima / mediocre	è una tripla molto serrata con le 3 deboli componenti disposte secondo un minuscolo triangolo isoscele — 450x.
NGC 844	gx	02h10m14s	+06°03.0'	q 174	Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, relativamente compatta e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
NGC 845	gx	02h12m20s	+37°28.6'	q 92	And	16"	discreta / mediocre	molto debole, visibile in visione distolta a 132x, a tratti appare come una lama di luce orientata da NW a SE ed estesa 1.5'.
NGC 846	gx	02h12m12s	+44°34.1'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W, di dimensioni 80"×60" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una debole stellina a ridosso verso NW; a 5.5' verso N c'è un piccolo gruppo molto serrato di 4 stelline brillanti di cui 3 formano un minuscolo piccolo arco. La gx è altresì denominata come NGC 847 (era osservabile senza problemi anche nel 10" a 118x).
NGC 848	gx	02h10m17s	−10°19.2'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	estesa, diffusa, con gradiente di luce molto basso, allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×40"; c'è una stellina brillante a ~ 1' NE *(presenza di chiarore lunare)* — 270x.
NGC 849	gx	02h10m11s	−22°19.4'	q 309	Cet	16"	ottima / mediocre	debole macchiolina rotonda di luminosità uniforme, poco diffusa e con Ø max di 30" — 270x.
NGC 850	gx	02h11m14s	−01°29.1'	q 219	Cet	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa e con Ø di una 40-ina di secondi; presenta un piccolo nucleo brillante di aspetto quasi stellare; è allineata ed equidistante con 2 stelline situate a SE e distanti meno di 2' — 270x.
NGC 851	gx	02h11m12s	+03°46.8'	q 219	Cet	16"	ottima / ottimo	allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; presenta un nucleo stellare osservabile a 380x; c'è una stellina al bordo NE.
NGC 853	gx	02h11m41s	−09°18.4'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	ovale facile, di dimensioni 60"×40", orientata da ENE a WSW e di luminosità pressoché uniforme *(presenza di chiarore lunare)* — 270x.
NGC 855	gx	02h14m04s	+27°52.6'	q 219	Tri	16"	buona / buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso ENE — 188x.
NGC 856	gx	02h13m38s	−00°43.0'	q 219	Cet	16"	ottima / ottimo	facilmente visibile, ma con basso gradiente di luce, rotonda, diffusa con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a 1' ENE — 380x.
NGC 858	gx	02h12m30s	−22°28.2'	q 309	Cet	16"	m. buona / scarso	debole chiazza circolare, diffusa e stemperata sul fondo cielo, di Ø > 1' e appena più brillante all'interno; è situata in un piccolo campo quasi depleto; meglio osservabile a 132x.
NGC 860	gx	02h15m00s	+30°46.7'	q 92	Tri	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
NGC 861	gx	02h15m51s	+35°54.9'	q 92	Tri	16"	buona / m. buono	piccola, con basso gradiente di luce,bulge appena evidente, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 270x.
NGC 863	gx	02h14m34s	−00°46.0'	q 219	Cet	16"	buona / buono	presenta una condensazione centrale abbastanza evidente, di aspetto stellare e un alone circonfuso molto tenue e diffuso, approssim. circolare con Ø di ~ 45"; è altresì denominata NGC 866 o NGC 885 — 188x.
NGC 864	gx	02h15m27s	+06°00.1'	q 174	Cet	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 2.5×1.5'; c'è una stellina brillante al bordo orientale e una molto debole dalla parte opposta più interessante scalando a 340x (era debolmente visibile nel 10" a 126x).
NGC 865	gx	02h16m15s	+28°36.1'	q 92	Tri	16"	m. buona / m. buono	è molto allungata da N a S, di dimensioni 2'×20" e con un debole bulge appena più brillante del disco — 270x.
NGC 868	gx	02h15m58s	−00°42.8'	q 219	Cet	16"	buona / buono	molto piccola e debole, di aspetto alquanto confuso, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a 3' SSW di una stellina brillante; una stellina appena percettibile si trova a 1' scarso verso NE — 188x.
NGC 870	gx	02h17m09s	+14°31.4'	q 174	Ari	16"	buona / buono	elusiva, visibile solo a momenti in visione distolta a 178x; non è comunque più estesa di 15" o 20"; c'è una coppia di stelline orientate da N a S subito a SW — 188x.
NGC 871	gx	02h17m11s	+14°33.0'	q 174	Ari	16"	ottima / ottimo	brillante, relativamente compatta, ma con gradiente di luce molto basso di luce, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30"; una debolissima stellina è visibile a 380x a ridosso verso E.
NGC 872	gx	02h15m25s	−17°46.9'	q 309	Cet	16"	m. buona / scarso	in visione distolta appare come una debole fuso orientato da N a S con dimensioni 80"×30" e con bulge poco più evidente del disco; c'è una stellina brillante a 3' verso NW — 188x.
NGC 873	gx	02h16m32s	−11°21.0'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	relativamente brillante e compatta, ma basso gradiente di luce, approssim. circolare con Ø inferiore a 1' — 380x.
NGC 875	gx	02h17m05s	+01°14.7'	q 219	Cet	16"	buona / buono	è una galassia facile, rotondeggiante, con Ø di 1' scarso e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata in una zona ove sono presenti solo deboli stelline — 188x.
NGC 876	gx	02h17m53s	+14°31.3'	q 174	Ari	16"	ottima / ottimo	è una gx debolissima; scalando a 270x appare a tratti allungata da NE a SW per una 40-ina di secondi; ci sono 2 deboli stelline ravvicinate verso S.
NGC 877	gx	02h18m00s	+14°32.8'	q 174	Ari	16"	ottima / ottimo	allungata da NW a SE con dimensioni 1.5'×1'; presenta un bulge evidente e un alone a tratti screziato; c'è una stellina al margine SE — 380x.
NGC 878	gx	02h17m54s	−23°23.0'	q 309	Cet	16"	ottima / mediocre	debole, di aspetto un po' irregolare, forse poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; a tratti sembra di vedere all'interno qualcosa di puntiforme, ma non riesco a capire se è il nucleo stellare una debolissima stellina sovrapposta — 270x.
NGC 879	gx	02h16m51s	−08°57.8'	q 264	Cet	16"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, con bassissima luminanza superficiale, estesa una 40-ina di secondi; è situata in un campo ove sono presenti solo deboli stelline — 270x.
NGC 880	gx	02h18m27s	−04°12.3'	q 219	Cet	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, non più estesa di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 881	gx	02h18m45s	−06°38.4'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	estesa, diffusa ai bordi, poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE, con dimensioni 90"×60" — 380x.
NGC 882	gx	02h19m40s	+15°48.9'	q 174	Ari	16"	m. buona / scarso	debole, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con bulge piccolo e abbastanza evidente; a 380x appare a tratti un nucleo stellare; c'è una stellina a 1' SW.
NGC 883	gx	02h19m05s	−06°47.5'	q 264	Cet	24"	m. buona / discreto	presenta un bulge brillante circonfuso da un alone rotonda di 1' di Ø e un nucleo stellare leggermente decentrato verso W; c'è una stellina appena percettibile al bordo meridionale — 400x.
NGC 886	aa	02h23m30s	+63°47.0'	q 17	Cas	16"	m. buona / m. buono	è un gruppo molto irregolare grosso modo delimitato da 2 stelle brillanti orientate da NNW a SSE e distanti 8'; se consideriamo queste ultime come l'ipotenusa di un triangolo, al vertice rettangolo si trova una doppia stretta; meglio osservabile a 132x. L'oggetto è altresì riportato come Stock 6.
NGC 887	gx	02h19m33s	−16°04.2'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	chiazza estesa e diffusa, leggermente condensata e con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a ridosso del nucleo verso E (presenza della Luna di età 6 giorni) — 270x.
NGC 890	gx	02h22m01s	+33°16.0'	q 93	Tri	16"	ottima / ottimo	è una bella gx ad alto gradiente di luce, allungata da NE a SW, diffusa, di dimensioni 2'×1', con bulge diffuso e contrastato e nucleo stellare — 380x.
NGC 891	gx	02h22m33s	+42°21.0'	q 62	And	16"	m. buona / discreto	abbraccia circa 2/3 del campo del UWA 6.7 (pari a 18'), orientata da NNE a SSW; il bulge, poco contrastato e di dimensioni grosso modo 2.5'×1.5', è delimitato a NE da una stellina abbastanza brillante; una banda scura attraversa il rigonfiamento ed è visibile per ~ 3'; una stellina brillante si trova nei pressi del bordo meridionale — 270x.
NGC 892	gx	02h20m52s	−23°06.7'	q 309	Cet	16"	ottima / mediocre	debolissima, quasi elusiva, appare solo a tratti, ma in visione distolta di tanto in tanto si vede allungata da N a S con dimensioni attorno a 40"×20" — 270x.
NGC 895	gx	02h21m36s	−05°31.3'	q 264	Cet	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, presenta una zona centrale orientata da E a W con dimensioni 40"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno; è abbastanza evidente il braccio arcuato situato a W della gx, mentre appare quasi elusivamente quello orientale (era un oggetto debole nel 10" a 178x in condizioni di cielo analoghe) — 340x.
NGC 896	neb	02h26m40s	+62°05.0'	q 17	Cas	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante, orientata da N a S con dimensioni 3'×2', tendenzialmente più brillante verso S; praticamente delimitata da 3 stelline poste a triangolo rettangolo (fa parte di IC 1795 di cui costituisce la parte più brillante) — 200x con filtro O III.
NGC 898	gx	02h23m20s	+41°57.1'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	brillante, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", con bulge evidente e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a ridosso N e una più debole a W — 450x.
NGC 899	gx	02h21m53s	−20°49.3'	q 309	Cet	16"	m. buona / scarso	facile, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, approssim. rotonda con Ø > di 1'; c'è una stellina doppia con componenti distanti una 20-ina di secondi e orientate E-W a 1.5' verso SW — 188x.
NGC 900	gx	02h23m32s	+26°30.7'	q 129	Ari	16"	ottima / discreto	piccola, approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi o 40"; presenta un debole nucleo stellare visibile a tratti. A circa 3' verso N trovasi un'altra galassia più o meno delle stesse dimensioni, ma più debole, con basso gradiente di luce e di aspetto più confuso; un controllo successivo ha stabilito trattarsi della **MAC 0223+2633** — 270x.
NGC 902	gx	02h22m22s	−16°40.7'	q 264	Cet	16"	m. buona / scarso	è una macchiolina molto debole, piccola e compatta, con Ø di una 30-ina di secondi — 188x.
NGC 903	gx	02h24m01s	+27°21.4'	q 130	Ari	16"	ottima / discreto	è debolissima, a tratti visibile in visione distolta come una piccola chiazza di luce di luminosità uniforme — 270x.
NGC 904	gx	02h24m06s	+27°20.5'	q 130	Ari	16"	ottima / discreto	situata a 1.5' a SE di NGC 903, è relativamente facile, diffusa, con alto gradiente di luce, grosso modo circolare con Ø di 1' — 270x.
NGC 905	gx	02h22m44s	−08°43.1'	q 264	Cet	16"	buona / ottimo	galassietta molto debole visibile solo a tratti in visione distolta ed estesa non più di 20" o 30" — 380x.
NGC 906	gx	02h25m16s	+42°05.4'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
NGC 907	gx	02h23m02s	−20°42.7'	q 309	Cet	16"	m. buona / scarso	bella, abbastanza brillante, molto allungata da E a W con dimensioni 2'×40" e bulge poco più brillante del disco — 188x.
NGC 908	gx	02h23m05s	−21°14.0'	q 309	Cet	24"	m. buona / m. buono	bella, ma nell'insieme di aspetto un po' irregolare, screziata a 340x, allungata da E a W con dimensioni che in visione laterale arrivano a 5'×2.5'; a prima vista sembra a che vi sia una zona "separata" a E la quale si unisce al corpo principale in visione distolta; un tenue bulge di 30"×10" appare facilmente all'interno della gx, ma si trova decentrato verso W (era visibile nel 10" a 126x e in condizioni di cielo analoghe, ma appariva come un fuso di luminosità pressoché uniforme.) — 340x.
NGC 909	gx	02h25m23s	+42°02.1'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	presenta un piccolo nucleo molto marcato circonfuso da un alone più tenue, rotondo con Ø di 45" — 450x.
NGC 910	gx	02h25m27s	+41°49.5'	q 62	And	28"	m. buona / m. buono	molto brillante e diffusa, con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di almeno 1'; presenta un piccolo bulge con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
NGC 911	gx	02h25m42s	+41°57.4'	q 62	And	16"	m. buona / discreto	mostra un'evidente condensazione centrale e un debole alone che in visione distolta appare orientata da SE a NW e di dimensioni approssim. 60"×30" — 270x.
NGC 912	gx	02h25m43s	+41°46.6'	q 62	And	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare evidente — 495x.
NGC 913	gx	02h25m44s	+41°48.0'	q 62	And	28"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×15" — 495x.
NGC 914	gx	02h26m05s	+42°08.6'	q 62	And	16"	m. buona / discreto	debole, estesa, approssim. circolare,con Ø di 1'.5 o 2' e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 915	gx	02h25m46s	+27°13.2'	q 130	Ari	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata 1' più a N — molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccola condensazione centrale evidente — 450x.
NGC 916	gx	02h25m48s	+27°14.5'	q 130	Ari	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con la precedente situata 1' più a S — diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
NGC 918	gx	02h25m51s	+18°29.8'	q 130	Ari	24"	m. buona / m. buono	assai stemperata sul fondo cielo, con gradiente di luce molto basso, allungata da N a S con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina all'interno a NW del centro (di aspetto simile, anche se ovviamente molto più debole, nel 10" a 118x) — 340x.
NGC 919	gx	02h26m17s	+27°12.7'	q 130	Ari	24"	m. buona / buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e molto diffusa alle due estremità; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso N — 450x.
NGC 920	gx	02h20m52s	+45°56.8'	q 62	And	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ci sono 2 deboli stelline: una a ridosso NE e l'altra poco più distante verso SW; occorre non scendere sotto i 450x, perché il campo è molto ricco e le numerose stelle presenti interferiscono un poco con l'osservazione.
NGC 921	gx	02h26m33s	−15°50.9'	q 265	Cet	16"	m. buona / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ~ 1' verso SE — 270x.
NGC 922	gx	02h25m04s	−24°47.4'	q 310	For	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con alto gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60"; screziata a 340x; meno interessante a 450x (appariva molto debolmente nel 10" a 118x).
NGC 923	gx	02h27m35s	+41°58.7'	q 62	And	28"	m. buona / buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 495x.
NGC 924	gx	02h26m47s	+20°29.9'	q 130	Ari	24"	m. buona / buono	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×45", con piccolo bulge molto contrastato e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1.5'; ci sono 2 stelline appena percettibili, una a ridosso NW e l'altra a 1' verso N — 450x.
NGC 925	gx	02h27m17s	+33°34.7'	q 93	Tri	16"	m. buona / discreto	è una gx a basso gradiente di luce, allungata da WNW a ESE con dimensioni ~ 3.5'×1'; è situata tra una coppia di stelline a N e una stella più brillante a S; un'altra stellina debole si trova a NE — 270x.
NGC 926	gx	02h26m07s	−00°19.8'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	è un bel fuso molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30", ma con gradiente di luce molto basso — 380x.
NGC 927	gx	02h26m37s	+12°19.3'	q 175	Ari	16"	ottima / scarso	debole chiazza approssim. circolare, ma di forma effettivamente un po' confusa e con bassissima luminanza superficiale; ha Ø di ~ 1' ed è solo appena più brillante all'interno — 188x.
NGC 928	gx	02h27m41s	+27°13.2'	q 130	Ari	16"	ottima / discreto	è un piccolo oggetto approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi con un bel nucleo evidente di aspetto stellare — 270x.
NGC 929	gx	02h27m18s	−12°05.2'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta e abbastanza facile da vedere; è allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 930	gx	02h27m55s	+20°19.9'	q 130	Ari	16"	m. buona / scarso	abbastanza facile, rotonda, con Ø di ~ 1', gradatamente più brillante verso l'interno; è situata tra 2 stelline orientate da NW a SW delle quali la 1^ è più brillante 132x.
NGC 931	gx	02h28m15s	+31°18.8'	q 93	Tri	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e molto allungata da E a W, di dimensioni 2'×30", con piccolo bulge oblungo evidente e contrastato; un debolissimo baffo esteso una 20-ina di secondi a tratti si "stacca" a ridosso N del bulge: questo è in realtà la **MAC 0228+3118**; la gx principale è meglio visibile scalando a 340x, ma la MAC appare meglio a 450x (era visibile molto debolmente nel 10" a 178x come un fuso di luminosità uniforme esteso 1').
NGC 933	gx	02h29m17s	+45°54.6'	q 62	And	24"	m. buona / buono	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con basso gradiente di luce; c'è una stellina appena percettibile (o un nodulo galattico) a ridosso del centro verso W (era osservabile, seppure molto debolmente, nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 934	gx	02h27m33s	−00°14.6'	q 220	Cet	16"	buona / buono	rotonda, diffusa, con Ø di 1' scarso e una piccola condensazione centrale abbastanza marcata — 188x.
NGC 935	gx	02h28m11s	+19°35.9'	q 130	Ari	16"	ottima / ottimo	diffusa, con basso gradiente di luce, poco allungata da NW a SE e di dimensioni 1.5'× 1'; c'è una stellina evidente verso il bordo meridionale; forma una coppia ravvicinata con IC 1801; una stella brillante di 10ª si trova a poco più di 1' verso W della coppia — 380x.
NGC 936	gx	02h27m37s	−01°09.3'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	presenta un bulge molto brillante, orientata da E a W con dimensioni 60"×40", e un alone diffuso orientato invece da NW a SE e di dimensioni 3'×2' — 270x.
NGC 937	gx	02h29m28s	+42°15.0'	q 62	And	16"	ottima / ottimo	piccola galassia estesa per max una 30-ina di secondi, di luminosità uniforme; c'è una stellina sovrapposta (o strettamente a ridosso) verso SW — 380x.
NGC 938	gx	02h28m33s	+20°17.0'	q 130	Ari	24"	buona / buono	presenta un piccolo bulge molto brillante e un nucleo stellare circonfuso da un alone leggermente ovale, orientato da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
NGC 940	gx	02h29m27s	+31°38.4'	q 93	Tri	16"	m. buona / m. buono	è un ovale orientata da NE a SW,di dimensioni 60"×45", con nucleo piuttosto brillante e un tenue alone molto sfumato ai bordi — 270x.
NGC 941	gx	02h28m28s	−01°09.1'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60" (già visibile molto debolmente nel 10" a 118x) — 270x.
NGC 942	gx	02h29m10s	−10°50.2'	q 265	Cet	16"	m. buona / buono	assieme a NGC 943 forma una coppia di piccole galassie ben evidenti, separate da meno di 1' in direzione N-S, di dimensioni a prima vista simili; la 1ª è poco più brillante, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e presenta un'evidente condensazione centrale; la 2ª, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, oltre a essere più debole è pure di luminosità più uniforme — 188x.
NGC 943	gx	02h29m10s	−10°49.6'	q 265	Cet	16"	m. buona / buono	v. **NGC 942**
NGC 944	gx	02h26m42s	−14°31.0'	q 265	Cet	24"	buona / mediocre	relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e tenue bulge puntiforme visibile a tratti — 280x.
NGC 945	gx	02h28m37s	−10°32.4'	q 265	Cet	16"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. rotonda con Ø di un paio di primi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE, ma comunque ben separata dalla galassia — 188x.
NGC 946	gx	02h30m38s	+42°14.0'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	di aspetto molto regolare, diffusa e con basso gradiente di luce, orientata da E a W con dimensioni 60"×40"; ci sono 3 deboli stelline quasi allineate a 1' verso N; la gx si trova subito a S di un piccolo triangolo isoscele molto schiacciato di stelline brillanti della stessa luminosità (appariva molto debole e diffusa nel 10") — 450x.
NGC 947	gx	02h28m33s	−19°02.5'	q 310	Cet	16"	m. buona / scarso	facile, ma con bassa luminanza superficiale e basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40" — 188x.
NGC 948	gx	02h28m45s	−10°30.8'	q 265	Cet	16"	m. buona / buono	è più debole e più piccola della 945 e dalla quale dista poco più di 2' NE, ma facilmente visibile in visione distolta come un tenue chiazza di luminosità pressoché uniforme ed estesa per ~ 1' — 188x.
NGC 949	gx	02h30m49s	+37°08.1'	q 93	Tri	16"	ottima / ottimo	brillante, ma con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
NGC 950	gx	02h29m12s	−11°01.5'	q 265	Cet	24"	m. buona / ottimo	debole e molto stemperata sul fondo cielo, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme.
NGC 951	gx	02h28m57s	−22°21.0'	q 310	Cet	16"	ottima / mediocre	debolissima, visibile con difficoltà solo a tratti in visione distolta; è piccola con dimensioni non superiori a 30" — 270x.
NGC 953	gx	02h31m10s	+29°35.3'	q 93	Tri	16"	ottima / m. buono	rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con Ø di 45"; c'è una debole stellina a 1' verso NE e un'altra più brillante poco più distante a W — 380x.
NGC 955	gx	02h30m33s	−01°06.5'	q 220	Cet	24"	m. buona / m. buono	è un bel fuso di aspetto regolare, orientato da N a S, esteso un paio di primi e spesso una 30-ina di secondi; presenta una piccola condensazione centrale molto brillante con all'interno un nucleo stellare poco contrastato (era facilmente visibile nel 10" a 178x) — 340x.
NGC 956	aa	02h32m30s	+44°39.0'	q 62	And	10"	ottima / buono	gruppo povero e disperso di una 10-ina di stelle, di cui 7 disposte a semicerchio, con Ø di circa 6'; ricorda, sia pur vagamente, una piccola Corona Australis o una collanina di perle.

NGC 957	aa	02h33m20s	+57°34.2'	q 38	Per	6"	discreta / buono	debole, vagamente allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 10'×6'; una stellina brillante si trova presso il margine S (la quale fa parte di un arco di 4 componenti con la concavità rivolta verso SE).
NGC 958	gx	02h30m43s	−02°56.3'	q 220	Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa, debolmente screziata a 340x, con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30" (facilmente visibile nel 10" a 178x); a un paio di primi N c'è una coppia di stelline sbilanciate in luminosità le cui componenti sono distanti una 30-ina di secondi in direzione NE-SW; quella a NE è molto debole, ma da un controllo successivamente effettuato è in realtà la PGC 1080361 — 340x.
NGC 959	gx	02h32m24s	+35°29.7'	q 93	Tri	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da ENE a WSW con dimensioni 90"×45"; situata tra due stelline appena percettibili orientate come la gx — 495x.
NGC 960	gx	02h31m41s	−09°18.0'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	molto debole e molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", con bulge poco più evidente; in visione distolta sembra una edge-on — 270x.
NGC 962	gx	02h32m40s	+28°04.2'	q 93	Ari	16"	ottima / ottimo	presenta un bulge diffuso abbastanza brillante circonfuso da un alone rotondo di 1' di Ø; c'è una debole stellina al bordo settentrionale — 380x.
NGC 963	gx	02h30m31s	−04°13.0'	q 220	Cet	24"	m. buona / buono	appare prospetticamente sovrapposta a IC 1808 e costituisce un sistema doppio che però non si riesce a separare — poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno perfettamente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele molto appiattito con 2 stelline situate un paio di primi a WNW e a SE (già precedentemente osservata, seppur debolmente, col 16") — 450x.
NGC 965	gx	02h32m25s	−18°38.4'	q 310	Cet	16"	m. buona / scarso	molto debole e diffusa, appare più brillante all'interno; probabilmente rotonda con Ø di ~ 50" — 188x.
NGC 966	gx	02h31m47s	−19°52.9'	q 310	Cet	16"	ottima / mediocre	debole gx rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; in visione distolta sembra protrudere da una stellina brillante situata quasi a ridosso verso SW; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso NW — 270x.
NGC 967	gx	02h32m13s	−17°13.0'	q 310	Cet	16"	m. buona / mediocre	molto diffusa con nucleo abbastanza brillante stellare, approssim. rotonda con Ø di 45" — 270x.
NGC 968	gx	02h34m06s	+34°28.8'	q 93	Tri	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×45", e con piccolo bulge brillante debolmente screziato — 495x.
NGC 969	gx	02h34m08s	+32°56.8'	q 93	Tri	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 80"×60", con bulge contrastato e un nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
NGC 970-1	gx	02h34m12s	+32°58.6'	q 93	Tri	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10"; c'è una debole stellina subito a E e una poco più evidente a 1' NW. In realtà costituisce una coppia con **NGC 971**, ma le due componenti non sono separabili neppure a 580x; tutto ciò che si nota, in corrispondenza della compagna, è una sorta di "sfumatura" della gx principale verso il bordo SW.
NGC 972	gx	02h34m13s	+29°18.7'	q 93	Ari	16"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1' (poco più estesa della distanza occupata dalle 3 stelline poste ad arco e situate subito a SW); non si nota un bulge vero e proprio, ma un'estesa zona brillante che occupa quasi tutta la gx — 380x.
NGC 973	gx	02h34m20s	+32°30.3'	q 93	Tri	28"	m. buona / buono	è un bel fuso relativamente compatto e con gradiente di luce molto basso, esteso un paio di primi in direzione NE-SW e spesso una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo W — 495x.
NGC 974	gx	02h34m26s	+32°57.3'	q 93	Tri	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con bulge evidente, ma meno contrastato della 969 — situata 4' scarsi a W — anch'essa di di dimensioni 80"×60" e orientata da NE a SW; è situata tra due stelline orientate all'incirca da N a S — 450x.
NGC 975	gx	02h33m23s	+09°36.1'	q 175	Cet	24"	buona / buono	rotonda con Ø, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stella brillante a un paio di primi NNW — 450x.
NGC 976	gx	02h34m00s	+20°58.6'	q 130	Ari	24"	m. buona / m. buono	brillante, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60"; presenta un alto gradiente di luce e appare debolmente screziata nella parte interna in corrispondenza del bulge (osservabile senza problemi nel 10" a 190x) — 450x.
NGC 977	gx	02h33m03s	−10°45.6'	q 263	Cet	16"	ottima / m. buono	molto diffusa, pressoché circolare con Ø < 1' e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 978A	gx	02h34m47s	+32°50.7'	q 93	Tri	24"	ottima / ottimo	fa parte, assieme alla successiva, di una coppia di gx in collisione — la 1ª è rotonda con Ø di 45"-50", diffusa e con nucleo stellare evidente; la 2ª è piccola e molto più debole, situata al margine meridionale, di aspetto uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×10" (l'Uranometria riporta solo un'unica galassia: NGC 978) — 450x.
NGC 978B	gx	02h34m48s	+32°50.4'	q 93	Tri	24"	ottima / ottimo	v. **NGC 978A**.
NGC 980	gx	02h35m19s	+40°55.6'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con nucleo stellare, screziata all'interno se osservata a 450x, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è un piccolo triangolo di stelline brillanti subito a N (appariva molto debole nel 10").
NGC 981	gx	02h33m00s	−10°58.4'	q 265	Cet	24"	buona / mediocre	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
NGC 982	gx	02h35m25s	+40°52.2'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	situata 3.5' a S della 980, è molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30"; presenta un bulge diffuso abbastanza contrastato e screziato a 450x (relativamente facile da vedere anche nel 10").
NGC 984	gx	02h34m43s	+23°24.8'	q 130	Ari	16"	m. buona / scarso	debole, poco sfumata, con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W, di dimensioni 90"×60" e con bulge evidente; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 132x.
NGC 985	gx	02h34m37s	−08°47.1'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	presenta un nucleo brillante, stellare, circonfuso da un alone rotonda con Ø di ~ 40" e di aspetto a tratti un po' irregolare; anziché del nucleo potrebbe tuttavia trattarsi anche di una stellina a ridosso del centro — 270x.
NGC 987	gx	02h36m40s	+33°19.6'	q 93	Tri	16"	ottima / ottimo	allungata da NE a SW con dimensioni 70"×50" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline ~ 2' a NW — 380x.
NGC 988	gx	02h35m28s	−09°21.4'	q 265	Cet	24"	buona / mediocre	è una chiazza estesa, molto diffusa, che si diparte dalla SAO 129994 di 7ª grandezza verso ESE per almeno 3'; dalla parte opposta della stella sembra protrudere per meno di 1'; le dimensioni totali sono dunque di circa 4'×1'; presenta lievi irregolarità di luce all'interno osservabili a 340x (a 450x si stempera troppo sul fondo cielo); c'è una debole stellina sul prolungamento dell'asse della galassia verso SSE.
NGC 989	gx	02h33m46s	−16°30.7'	q 265	Cet	16"	m. buona / mediocre	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 990	gx	02h36m18s	+11°38.5'	q 175	Ari	16"	ottima / scarso	facile, rotonda con Ø di ~ 1', diffusa e ad alto gradiente di luce; presenta una piccola condensazione centrale di aspetto stellare — 188x.
NGC 991	gx	02h35m32s	−07°09.2'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	è una debole bolla circolare di ~ 2' di Ø e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; meglio contrastata a 270x.
NGC 992	gx	02h37m25s	+21°06.1'	q 130	Ari	16"	m. buona / scarso	debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; un poco disturbata dalla SAO 75477 di 9ª grandezza situata 4' a NNE — 132x.
NGC 993	gx	02h36m46s	+02°03.0'	q 220	Cet	16"	buona / buono	molto piccola, compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso NNW; è situata in mezzo a 2 stelle brillanti distanti una decina di primi e orientate da NE a SW — 188x.
NGC 995	gx	02h38m32s	+41°31.8'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a NGC 996, 1000, 1001 e 1005 di un piccolo gruppo di galassiette situate a poco più di 1' SSW dell'ammasso aperto M34, la maggior parte delle quali osservate col 16" — questa è una delle più brillanti, presenta un piccolo nucleo quasi stellare abbastanza brillante circonfuso da un alone ovale orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante a ridosso verso E (era facilmente osservabile anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 996	gx	02h38m40s	+41°38.9'	q 62	And	16"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la debole NGC 999 situata un paio di primi a NE — facile, rotonda con Ø di 1', diffusa, con alto gradiente di luce e nucleo stellare evidente (già osservata col 10" a 178x in buone condizioni di visibilità) — 380x.
NGC 997	gx	02h37m14s	+07°18.4'	q 175	Cet	16"	ottima / scarso	rotonda, Ø ~ 45", diffusa, gradatamente più brillante all'interno, situata a poco più di 1' NE di una stellina brillante — 188x.
NGC 998	gx	02h37m16s	+07°20.1'	q 175	Cet	16"	ottima / scarso	molto debole, più facilmente visibile in visione distolta, piccola, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20"e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 999	gx	02h38m48s	+41°40.2'	q 62	And	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, poco allungata da NE a SW, dimensioni 45"×30" e con tenue nucleo stellare osservabile a 380x; c'è una stellina a ridosso verso SW; un'altra abbastanza brillante si trova a ~ 1' NE — 380x.
NGC 1000	gx	02h38m50s	+41°27.6'	q 62	And	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di 45" diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno (appariva debolissima nel 10" a 178x in buone condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 1001	gx	02h39m12s	+41°40.3'	q 62	Per	16"	ottima / m. buono	fa parte del gruppo di NGC 1000 e company, già precedentemente osservata, seppure molto debolmente, col 10" a 178x — relativamente facile, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", poco diffusa e con nucleo stellare che a 380x risalta facilmente su un disco abbastanza uniforme.
NGC 1002	gx	02h38m56s	+34°37.3'	q 93	Tri	16"	ottima / discreto	in visione distolta la gx è allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; fissandola in visione diretta appare una zona centrale abbastanza marcata di dimensioni 30"×15" e orientata da E a W (probabilmente una barra) — 380x.
NGC 1003	gx	02h39m16s	+40°52.4'	q 62	Per	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con gradiente di luce molto basso, debolmente e uniformemente screziata, orientata da E a W con rapporto di dimensioni 4:1 (circa 3'×45"); è situata tra 2 stelle di cui una molto brillante a SW e l'altra a ridosso di NE; c'è una stellina appena percettibile al bordo N; più interessante scalando a 340x (debole, ma osservabile senza problemi anche nel 10").
NGC 1004	gx	02h37m42s	+01°58.5'	q 220	Cet	16"	ottima / m. buono	piccola, compatta, circolare, con Ø di 20 o 30 secondi e con un'evidente condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso di SW — 270x.
NGC 1005	gx	02h39m28s	+41°29.6'	q 62	Per	24"	m. buona / ottimo	fa parte del piccolo gruppo di NGC 1000 — rotonda con Ø di 1' scarso, poco diffusa e con alto gradiente di luce (già osservata nel 10" a 178x: appariva di aspetto simile alla 995, ma più debole) — 450x.
NGC 1007	gx	02h37m52s	+02°09.3'	q 220	Cet	16"	ottima / m. buono	debolissima, visibile a tratti in visione distolta; è molto piccola, tanto che in visione diretta è di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 1008	gx	02h37m55s	+02°04.8'	q 220	Cet	16"	ottima / m. buono	debole, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 1009	gx	02h38m19s	+02°18.6'	q 220	Cet	16"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole, a tratti appena più brillante all'interno, orientata da NW a SE per 60" o 70" — 380x.
NGC 1010	gx	02h37m35s	−11°01.5'	q 265	And	16"	m. buona / buono	con NGC 1011 forma una coppia di galassiette che assieme a NGC 1017 fanno parte di un terzetto ravvicinato — sono separate da poco più di 1' in direzione NE-SW; la 1ª ha un gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 45"; la 2ª è più piccola, con Ø di una 30-ina di secondi e presenta una piccola condensazione centrale di aspetto stellare — 188x.
NGC 1011	gx	02h37m39s	−11°00.3'	q 265	Cet	16"	m. buona / buono	v. **NGC 1010**
NGC 1012	gx	02h39m15s	+30°09.2'	q 93	Ari	16"	ottima / ottimo	è di aspetto vagamente screziato a 380x, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 2'×45" e con gradiente di luce molto basso; c'è una stellina brillante a ridosso SE.
NGC 1013	gx	02h37m50s	−11°30.4'	q 265	Cet	16"	m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa, pressoché circolare con Ø una 40-ina di secondi e con tenue condensazione centrale molto evidente — 188x.
NGC 1015	gx	02h38m11s	−01°19.1'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	oggetto ad alto gradiente di luce, con bulge di dimensioni 40"×20"' e orientato da E a W, nucleo stellare e un alone rotondo, molto stemperato di almeno 1.5' di Ø (già precedentemente osservata col 10" in buone condizioni di visibilità) — 380x.
NGC 1016	gx	02h38m19s	+02°07.1'	q 220	Cet	16"	ottima / m. buono	è relativamente brillante, ma molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 1.5' e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una debole stellina subito a SE — 270x.
NGC 1017	gx	02h37m50s	−11°00.6'	q 265	Cet	16"	m. buona / buono	quasi elusiva: appare solo a momenti in visione distolta a 188x a 1' verso W da una stellina appena percettibile.
NGC 1018	gx	02h38m10s	−09°32.7'	q 265	Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; più interessante e contrastata scalando a 280x.
NGC 1019	gx	02h38m27s	+01°54.4'	q 220	Cet	16"	buona / buono	debole, molto diffusa, approssim. circolare con Ø di 1' e una tenue condensazione centrale appena percettibile in visione indiretta — 188x.
NGC 1020	gx	02h38m44s	+02°13.9'	q 220	Cet	16"	buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette molto deboli, distanti poco più di 1' in direzione NW-SE; a prima vista paiono di aspetto simile, ma a un'osservazione più attenta si nota che la 1a, oltre a essere più brillante, è anche molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con un'evidente condensazione centrale; la 2ª è invece di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi ed è visibile agevolmente solo in visione distolta — 188x.
NGC 1021	gx	02h38m48s	+02°13.0'	q 220	Cet	16"	buona / buono	v. **NGC 1020**
NGC 1022	gx	02h38m33s	−06°40.7'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	rotonda con Ø di 1.5', molto diffusa e con nucleo stellare osservabile a 380x; a tratti appare all'interno una tenue zona allungata da E a W e di dimensioni 40"×20" che è probabilmente la barra centrale.
NGC 1023	gx	02h40m24s	+39°03.8'	q 62	Per	24"	ottima / m. buono	molto bella, molto allungata da E a W, con un'estensione che in visione distolta arriva a quasi 6' in lunghezza e 2' in spessore; presenta un piccolo bulge molto brillante poco allungata nella stessa direzione; una debole stellina si trova a 1' W del nucleo e una più evidente a 1.5' verso E; una 3a stellina si trova all'estremità orientale della gx; più interessante scalando a 340x (era già facilmente visibile nel Comet Tracker a 56x).
NGC 1023A	gx	02h40m36s	+39°03.2'		Per	24"	ottima / m. buono	è una sorta di elusivo rigonfiamento che si nota a tratti verso l'estremità orientale della 1023; situata tra 2 stelline orientate da WNW a ESE; poco meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 1024	gx	02h39m12s	+10°50.8'	q 175	Cet	16"	ottima / scarso	è la più brillante di un terzetto cui appartengono anche la 1028 e 1029; oggetto ovale, di dimensioni 80"×40", orientato da NW a SE, diffuso e ad alto gradiente di luce, situato 40" SW di una stellina brillante — 188x.
NGC 1026	gx	02h39m19s	+06°32.6'	q 175	Cet	16"	ottima / scarso	rotonda con Ø di 1', diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale — 188x.
NGC 1027	aa	02h42m36s	+61°35.7'	q 17	Cas	16"	m. buona / m. buono	anche questo è osservabile nel cercatore da 50 mm — è di aspetto irregolare: una stella brillante al centro è circondata da una gragnola di stelline di luminosità molto diseguale; ci sono 3 stelline allineate a E e orientate da NW a SE; una 4ª quasi allineata con le precedenti verso SE è una doppia stretta; c'è un piccolo triangolo serrato verso NW; 2 stelline brillanti sembrano delimitarlo verso S — 132x.
NGC 1028	gx	02h39m37s	+10°50.6'	q 175	Ari	16"	ottima / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 188x.
NGC 1029	gx	02h39m36s	+10°47.6'	q 175	Ari	16"	ottima / scarso	relativamente compatta, di dimensioni 40"×20", orientata da NE a SW, con una sorta di "riga" luminosa che l'attraversa longitudinalmente — 188x.
NGC 1030	gx	02h39m51s	+18°01.5'	q 130	Ari	16"	m. buona / m. buono	debole e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 90"× 45"; c'è una stellina a 1.5' NNE — 270x.
NGC 1032	gx	02h39m24s	+01°05.6'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	bella, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 2.5'×45" e con bulge rotondo e diffuso; una stellina, che fa parte di un piccolo triangolo rettangolo situato a N della gx, ne lambisce il bordo ENE — 380x.
NGC 1033	gx	02h40m16s	−08°46.6'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	è un lucore molto debole e stemperato sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotondo con Ø di 1' — 380x.
NGC 1034	gx	02h38m14s	−15°48.6'	q 265	Cet	16"	m. buona / mediocre	poco diffusa e più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 1035	gx	02h39m29s	−08°08.0'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 2'×40", relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme; appare leggermente screziata a 380x; c'è una stellina al bordo SSE.
NGC 1036	gx	02h40m29s	+19°17.8'	q 130	Ari	16"	m. buona / scarso	facilmente visibile, ma con basso gradiente di luce, approssim. circolare con Ø poco inferiore a 1' e poco più brillante verso l'interno — 132x.
NGC 1037	gx	02h37m59s	−01°50.6'		Cet	16"	ottima / ottimo	debole, di aspetto un po' irregolare a 380x, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 1038	gx	02h40m06s	+01°30.5'	q 220	Cet	16"	buona / buono	molto allungata da NW a SW, di dimensioni 60"×20" e con un nucleo abbastanza evidente; si trova al vertice meridionale di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline distanti 4' e orientate da NE a SW — 188x.
NGC 1041	gx	02h40m25s	−05°26.4'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	è di aspetto un po' irregolare, ma sostanzialmente rotonda con Ø di ~ 1'; presenta un nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 1042	gx	02h40m24s	−08°26.0'	q 265	Cet	24"	m. buona / m. buono	estesa chiazza molto diffusa, di aspetto abbastanza uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 3'×2'; c'è una stellina a ridosso verso E, mentre un'altra poco più brillante si trova a 1.5' dal bordo settentrionale — 400x.
NGC 1043	gx	02h40m47s	+01°20.6'	q 220	Cet	16"	m. buona / ottimo	a 380x si vede un oggetto molto piccolo e diffuso, non più esteso di 15" o 20", di forma indistinta e con nucleo stellare; è situato ~ 30" N d una stellina; a 270x è poco più di una stella sfuocata.
NGC 1044	gx	02h41m06s	+08°44.3'	q 175	Cet	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia serrata con **MAC 0241+0844** situata a ridosso SE — rotonda, poco diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare; la MAC è molto piccola e compatta, rotonda con Ø di 10"-15" e anch'essa con condensazione centrale stellare; si separa facilmente dalla principale a 450x.
NGC 1045	gx	02h40m29s	−11°16.6'	q 265	Cet	16"	m. buona / mediocre	brillante, diffusa ai bordi, allungata da NE a SW, di dimensioni 1.5' x 1' e con un bel bulge evidente — 270x.
NGC 1046	gx	02h41m13s	+08°43.1'	q 175	Cet	16"	ottima / scarso	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di 35"-40" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' SE — 188x.
NGC 1047	gx	02h40m33s	−08°08.8'	q 265	Cet	24"	m. buona / mediocre	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x (era già visibile, seppur elusivamente, anche nel 10" a 178x in condizioni di visibilità simili).
NGC 1048	gx	02h40m38s	−08°32.0'	q 265	Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, m. allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 400x.
NGC 1048A	gx	02h40m36s	−08°32.8'	q 265	Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e poco più piccola di NGC 1048, dalla quale dista si e no 1' a SW, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 400x.
NGC 1049	ag	02h39m48s	−34°15.4'	q 354	For	16"	discreta / mediocre	è una debole macchiolina rotonda, condensata, ma totalmente irrisolta, con Ø di una 30-ina di secondi; a 132x, a causa del fondo cielo più chiaro, è di aspetto quasi stellare: probabilmente si vede solo il nucleo; è decisamente meglio a 270x.
NGC 1050	gx	02h42m36s	+34°45.8'	q 93	Per	16"	ottima / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a 1' verso N — 380x.
NGC 1051	gx	02h41m02s	−06°56.2'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	è molto diffusa e stemperata sul fondo cielo; a prima vista sembra un alone asimmetrico che si diparte verso SW da una stellina brillante con dimensioni 80"×60" — 270x.
NGC 1052	gx	02h41m05s	−08°15.4'	q 265	Cet	24"	m. buona / m. buono	molto bella, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1.5' e con bulge diffuso, brillante e contrastato sul disco; questo appare leggermente screziato a 400x.
NGC 1053	gx	02h43m13s	+41°30.0'	q 62	Per	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con nucleo stellare brillante, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; è situata tra 2 stelline orientate da N a S e quasi a ridosso di SW; a ridosso W della stellina a N si nota, a 450x, un piccolo e debole oggetto nebuloso, a tratti orientato da E a W ma non più esteso di 15"; da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la MAC 0243+4130.
NGC 1054	gx	02h42m16s	+18°13.0'	q 265	Ari	16"	m. buona / scarso	debole, piccola, allungata ~ da E a W, di dimensioni 45"×30", ma dato il cattivo seeing non sono riuscito a capire se c'è una stellina a ridosso a W o se si tratta di un nodulo della galassia — 132x.
NGC 1055	gx	02h41m45s	+00°26.5'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	è una gx notevole seppure di basso gradiente di luce e di forma un po' irregolare; a 270x è di dimensioni 5'×2' (poco meno della distanza delle 2 stelle brillanti a N) e orientata da ESE a WNW; c'è un piccolo triangolo equilatero di stelline a ridosso NW.
NGC 1056	gx	02h42m49s	+28°34.5'	q 93	Ari	16"	ottima / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni che in visione distolta arrivano a 1.5'×1', con piccola condensazione centrale marcata e nucleo stellare — 380x.
NGC 1057	gx	02h43m03s	+32°29.5'	q 93	Tri	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una doppia irrisolta al bordo NW che anche a 495x appare solo come un minuscolo "trattino"; una debole stellina si trova a 1' scarso verso W — 495x.
NGC 1058	gx	02h43m30s	+37°20.5'	q 93	Per	16"	m. buona / discreto	è una chiazza rotonda poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 1.5'; c'è una stellina situata all'interno della gx verso il margine NW — 270x.
NGC 1060	gx	02h43m15s	+32°25.5'	q 93	Tri	28"	m. buona / ottimo	brillante, molto diffusa, rotonda con Ø di 1.5, con bulge ben evidente e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso E. Un piccolo oggetto diffuso molto debole e condensato si trova subito a SE, ed è risultato essere la MAC 0243+3224 — 495x.
NGC 1061	gx	02h43m16s	+32°28.0'	q 93	Tri	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 495x.
NGC 1062	gx	02h43m44s	+32°29.7'	q 93	Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina subito a N — 495x.
NGC 1063	gx	02h42m10s	−05°34.1'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	è un debole ovale diffuso e di luminosità uniforme, allungata da E a W e di dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 1064	gx	02h42m23s	−09°21.8'	q 265	Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 45"; anche questa appare meglio definita a 280x.
NGC 1065	gx	02h42m06s	−15°05.5'	q 265	Cet	16"	m. buona / mediocre	rotonda, molto diffusa, con Ø di 45" e un piccolo nucleo abbastanza evidente — 270x.
NGC 1066	gx	02h43m50s	+32°28.5'	q 93	Tri	28"	m. buona / ottimo	brillante e con alto gradiente di luce, diffusa, rotonda con Ø di 80" — 495x.
NGC 1067	gx	02h43m50s	+32°30.7'	q 93	Tri	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; situata all'interno di un triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta a SE — 495x.
NGC 1069	gx	02h43m00s	−08°17.4'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	chiazza estesa di luminosità uniforme, stemperata sul fondo cielo, allungata ~ da N a S con dimensioni 1.5'×1' — 270x.
NGC 1070	gx	02h43m22s	+04°58.1'	q 220	Cet	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, presenta un bulge centrale rotondo, contrastato con Ø 20"-25", finemente screziato, circonfuso da un alone grosso modo circolare con Ø di 1' — 450x.
NGC 1071	gx	02h43m08s	−08°46.5'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	debolissima, osservabile solo in visione distolta a tratti appare allungata da N a S ed estesa per 1' scarso — 270x.
NGC 1072	gx	02h43m31s	+00°18.4'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	piuttosto debole e poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e solo appena più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 1073	gx	02h43m40s	+01°22.6'	q 220	Cet	10"	ottima / discreto	debole e assai stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø di ~ 4' e di luminosità pressoché uniforme.
NGC 1074	gx	02h43m36s	−16°17.9'	q 265	Cet	16"	m. buona / mediocre	debolissima e quasi al limite della visibilità meglio evidente scalando a 188x; in visione distolta appare molto diffusa, orientata da N a S con dimensioni grosso modo 45"×30".
NGC 1075	gx	02h43m33s	−16°12.1'	q 265	Cet	16"	m. buona / mediocre	appare elusivamente e solo a momenti scalando a 188x; non sembra comunque più estesa di una 30-ina di secondi.
NGC 1076	gx	02h43m29s	−14°45.3'	q 265	Cet	16"	m. buona / mediocre	bella, brillante, allungata da E a W con dimensioni 90"×45" e bulge poco più brillante del disco — 270x.
NGC 1077A	gx	02h46m00s	+40°05.4'	q 62	Per	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e con nucleo stellare visibile a momenti — 450x.
NGC 1077B	gx	02h46m03s	+40°05.6'	q 62	Per	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare a momenti a ridosso verso E di NGC 1077A; non sembra più estesa di 20" — 450x.
NGC 1078	gx	02h44m08s	−09°27.2'	q 265	Cet	16"	buona / ottimo	debole gx rotonda di 45" di Ø, diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente — 270x.
NGC 1079	gx	02h43m45s	−29°00.2'	q 354	For	10"	buona / buono	poco allungata da E a W, con piccola condensazione centrale marcata e un tenue alone estesa per oltre 2' che si estingue rapidamente sul fondo cielo.
NGC 1080	gx	02h45m10s	−04°42.6'	q 220	Eri	16"	buona / mediocre	era alta solo 30°; debole, di aspetto confuso, grosso modo rotonda, con Ø < 1'; solo a tratti appare una debole condensazione centrale — 270x.
NGC 1081	gx	02h45m05s	−15°35.3'	q 265	Eri	16"	m. buona / mediocre	debole ovale di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE e dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 1082	gx	02h45m41s	−08°10.8'	q 265	Eri	16"	buona / ottimo	è una debole bolla rotonda estesa meno di 1', di aspetto regolare, gradatamente più brillante verso l'interno, ma con basso gradiente di luce — 270x.
NGC 1083	gx	02h45m40s	−15°21.4'	q 265	Eri	16"	m. buona / mediocre	debole lama di luce di luminosità uniforme, più facile di NGC 1082, estesa oltre 1' e orientata ~ da N a S — 270x.
NGC 1084	gx	02h46m00s	−07°34.7'	q 265	Eri	10"	ottima / discreto	compatta, brillante, allungata da NE a SW con dimensioni 2'×1' — 57x.
NGC 1085	gx	02h46m25s	+03°36.5'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare osservabile a tratti a 380x.
NGC 1086	gx	02h47m56s	+41°14.8'	q 62	Per	16"	buona / m. buono	diffusa, approssim. circolare con Ø di 50" e di luminosità pressoché uniforme; ci sono due stelline poste simmetricamente alla galassia a ~ 1' NW e SW — 380x.
NGC 1087	gx	02h46m25s	−00°30.0'	q 220	Cet	10"	ottima / discreto	relativamente brillante e diffusa allungata da N a S con dimensioni 2'×1.5' e luminosità pressoché uniforme.
NGC 1088	gx	02h47m04s	+16°12.0'	q 175	Ari	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", gradatamente più brillante verso l'interno e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
NGC 1089	gx	02h46m10s	−15°04.4'	q 265	Eri	16"	m. buona / mediocre	rotonda, con alto gradiente di luce e Ø di 45", diffusa; c'è una stellina a 1' SE dal centro e un'altra appena percettibile quasi a ridosso verso S — 270x.
NGC 1090	gx	02h46m34s	−00°14.8'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 3'×1.5' e con bulge diffuso; di aspetto vagamente screziato a 380x; c'è una stellina a ridosso verso S.
NGC 1091	gx	02h45m22s	−17°32.0'	q 310	Eri	16"	m. buona / mediocre	fa parte assieme a NGC 1092 e al terzetto NGC 1098, 1099 e 1100 di un quintetto di galassie abbastanza facili; questa è piuttosto debole, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 1092	gx	02h45m29s	−17°32.5'	q 310	Eri	16"	m. buona / mediocre	situata a neppure un paio di primi ESE di NGC 1091 è poco più brillante, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' e bulge evidente, diffuso — 270x.
NGC 1093	gx	02h48m16s	+34°25.2'	q 93	Tri	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 70"×40"; c'è una stellina a 1' verso W — 380x.
NGC 1094	gx	02h47m28s	−00°17.1'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	è un bell'ovale di aspetto molto regolare, orientata da E a W, di dm 70"×40" e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 1095	gx	02h47m38s	+04°38.3'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; si apprezza meglio scalando a 270x.
NGC 1097	gx	02h46m19s	−30°16.3'	q 354	For	6"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce, orientata da NNW a SSE con dimensioni 4'×2'; c'è una irregolarità in brillanza verso NNW (ossia sul prolungamento dell'asse maggiore della gx) che è forse imputabile a una stellina; da un controllo successivamente, in questa posizione c'è effettivamente la compagna NGC 1097A — 86x.
NGC 1097A	gx	02h46m10s	−30°13.7'	q 354	For	6"	m. buona / ottimo	appare come una piccola e debole stellina sfuocata a ridosso NNW di NGC 1097 — 86x.
NGC 1098	gx	02h44m54s	−17°39.5'	q 310	Eri	16"	m. buona / mediocre	è la più brillante del quintetto (v. NGC 1091), rotonda, diffusa con Ø di 1.5' e bulge evidente — 270x.
NGC 1099	gx	02h45m18s	−17°42.5'	q 310	Eri	16"	m. buona / mediocre	molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 1100	gx	02h45m36s	−17°41.3'	q 310	Eri	16"	m. buona / mediocre	è poco più evidente di NGC 1099, ovale con dimensioni 60"×30", orientata da NE a SW e appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 1101	gx	02h48m15s	+04°34.7'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	galassietta rotonda molto diffusa con Ø di una 40-ina di secondi e una nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso W — 380x.
NGC 1102	gx	02h47m13s	−22°12.6'	q 310	Eri	16"	ottima / mediocre	molto debole, approssim. rotonda con Ø di 30" o 40" e una condensazione centrale molto tenue visibile a momenti — 270x.
NGC 1103	gx	02h48m06s	−13°57.6'	q 265	Eri	16"	m. buona / mediocre	relativamente facile, ma di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina brillante al margine orientale — 270x.
NGC 1104	gx	02h48m39s	−00°16.3'	q 220	Cet	16"	buona / buono	debole, con un nucleo puntiforme, orientata da NW a SE, di dimensioni 45"×30"; è situata 1' a N di una stellina — 270x.
NGC 1105	gx	02h52m18s	−15°42.6'	q 265	Eri	16"	m. buona / mediocre	è una debole galassia poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30", leggermente più brillante all'interno; è situata all'interno di un quadrilatero sghembo di stelline brillanti — 270x.
NGC 1106	gx	02h50m41s	+41°40.3'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e un nucleo quasi stellare contrastato; c'è una stellina al bordo SW; un'altra stellina poco più brillante si trova quasi a ridosso verso SE (era abbastanza facile da vedere anche nel 10" a 178x; la stellina a SW dava l'impressione che la gx fosse dotata di 2 condensazioni) — 450x.
NGC 1107	gx	02h49m20s	+08°05.6'	q 175	Cet	24"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 90"×60"; presenta un bulge debolmente screziato a 450x.
NGC 1108	gx	02h48m38s	−07°57.1'	q 265	Eri	16"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; a tratti appare più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 1109	gx	02h49m00s	+13°13.4'	q 175	Ari	16"	ottima / scarso	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 188x.
NGC 1110	gx	02h49m09s	−07°50.4'	q 265	Eri	16"	buona / ottimo	debolissima lama di luce di luminosità uniforme osservabile con relativa facilità in visione distolta quando si punta lo sguardo sulle 2 stelline brillanti situate a S e orientate N-S; rispetto a queste la gx risulta orientata da NNE a SSW per un paio di primi (più o meno la distanza delle 2 stelline) — 270x.
NGC 1111	gx	02h49m51s	+13°08.7'	q 175	Ari	16"	ottima / scarso	ancora più debole e più diffusa, visibile a tratti in visione distolta, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi (poco meno di NGC 1109) — 188x.
NGC 1114	gx	02h49m07s	−16°59.7'	q 265	Eri	16"	m. buona / mediocre	è un bell'ovale di dimensioni 90"×45", orientata da N a S e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 1115	gx	02h50m25s	+13°16.0'	q 175	Psc	16"	ottima / scarso	molto debole, di luminosità uniforme, estesa non più di 20" o 30" — 188x.
NGC 1116	gx	02h50m36s	+13°20.1'	q 175	Psc	16"	ottima / scarso	è una piccola "righetta" di luce molto debole di dimensioni 45"×15" e orientata da NE a SW — 188x.
NGC 1117	gx	02h51m13s	+13°11.1'	q 175	Tri	16"	ottima / scarso	forma una coppia ravvicinata con **MCG+2-8-20** e nonostante il seeing scarso si riescono a sdoppiare a 188x grazie al fatto che presentano due nuclei piccoli, di aspetto stellare; la 1ª ha un Ø di 30" e presenta il nucleo più brillante, mentre la 2ª ha un Ø di appena 20" — 188x.
NGC 1118	gx	02h49m59s	−12°09.9'	q 265	Eri	24"	m. buona / discreto	molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×30" e con tenue bulge diffuso poco contrastato — 450x.
NGC 1119	gx	02h48m17s	−17°59.2'		Eri	24"	buona / mediocre	relativamente facile e compatta, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 1120	gx	02h49m04s	−14°28.2'	q 265	Eri	16"	m. buona / mediocre	debole, poco più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 1121	gx	02h50m39s	−01°44.0'	q 220	Eri	16"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con piccola condensazione centrale marcata; situata 1.5 a SSW di una stellina brillante (già osservata nel 10" a 178x) — 380x.
NGC 1122	gx	02h52m51s	+42°12.3'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	è grosso modo rotonda con Ø di 1' e una condensazione centrale abbastanza contrastata; tuttavia la struttura è un po' disturbata dalle stelle di campo presenti vicino alla gx; fra queste una si trova a ridosso verso NE, mentre un'altra è al bordo SE (era osservabile senza problemi nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 1124	gx	02h51m36s	−25°42.1'	q 310	For	16"	m. buona / scarso	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso; presenta un nucleo stellare visibile a tratti; è disturbata dalla luce di una stella di 10ª situata a neppure 2' verso NE — 188x.
NGC 1125	gx	02h51m40s	−16°39.0'	q 265	Eri	24"	m. buona / discreto	molto allungata da NE a SW, poco diffusa alle 2 estremità e con basso gradiente di luce; un piccolo e debolissimo oggetto rotondo esteso ~ 20", diffuso e a tratti condensato appare in visione distolta, a ridosso SW: si tratta in effetti di MCG-3-8-24 — 450x.
NGC 1126	gx	02h52m19s	−01°17.8'	q 220	Eri	16"	buona / buono	lama di luce molto debole, orientata da NW a SE, estesa 1' e con condensazione stellare abbastanza evidente a 270x.
NGC 1127	gx	02h52m52s	+13°15.4'	q 175	Ari	16"	ottima / scarso	molto debole, con bassissima luminanza superficiale, rotondeggiante con Ø di ~ 40" — 188x.
NGC 1129	gx	02h54m27s	+41°34.7'	q 63	Per	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 90"×60" e con ampio bulge a tratti debolmente screziato; un nodulo vistoso con una stellina appena percettibile a SW si nota a ridosso W del bulge: si tratta di **MCG+7-7-3** (la gx si trova al centro di un gruppo formato da una 15-ina di componenti) — 495x.
NGC 1130	gx	02h54m24s	+41°36.3'	q 63	Per	28"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina al bordo meridionale; situata grosso modo al centro di un gruppo di una 15-ina di gx — 495x.
NGC 1131	gx	02h54m34s	+41°33.5'	q 63	Per	28"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e condensata; c'è una stellina abbastanza brillante a 1 scarso verso SSW — 495x.
NGC 1132	gx	02h52m52s	−01°16.5'	q 220	Eri	16"	buona / buono	è orientata da NW a SE, di dimensioni 1.5'×1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; presenta un bulge evidente a 270x.
NGC 1133	gx	02h52m42s	−08°48.3'	q 265	Eri	16"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale — 270x.
NGC 1134	gx	02h53m41s	+13°00.9'	q 175	Ari	16"	ottima / scarso	facile, allungata da NW a SE, di dimensioni almeno 90"×45", con bulge evidente e un piccolo nucleo visibile a tratti; c'è una stellina a ~ 1' E — 188x.
NGC 1137	gx	02h54m03s	+02°57.7'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 1', con condensazione centrale diffusa ed evidente; a 380x appare coi bordi alquanto sfilacciati. È riportata sull'Uranometria come **UGC 2119** (già precedentemente osservata, seppur limitatamente alla zona centrale, col 10" in buone condizioni di visibilità).
NGC 1138	gx	02h56m36s	+43°02.9'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	bella, presenta un nucleo molto brillante circonfuso da un alone rotondo molto regolare con Ø di una 40-ina di secondi; a ingrandimenti più bassi pare un piccolo ammasso globulare irrisolto; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline a S e SE (già precedentemente osservata col 10") — 450x.
NGC 1139	gx	02h52m47s	−14°31.7'	q 265	Eri	16"	m. buona / mediocre	è una piccola e debolissima gx di 30"×15", di luminosità uniforme, orientata da NE a SW, meglio visibile in visione distolta a 188x.
NGC 1140	gx	02h54m33s	−10°01.7'	q 265	Eri	16"	buona / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con bulge diffuso ben evidente e bordi sfumati — 380x.
NGC 1143	gx	02h55m10s	−00°10.7'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con NGC 1144 situata a ridosso SE — sono due oggetti rotondi di aspetto simile separati da meno di 1' e con condensazione centrale evidente; la 1ª sembra leggermente più piccola (35" contro 40"). Erano entrambe già visibili nel 10" a 178x in buone condizioni di visibilità, anche se si riuscivano a separare solo a momenti — 380x.
NGC 1144	gx	02h55m12s	−00°11.0'	q 220	Cet	16"	ottima / ottimo	v. **NGC 1143**
NGC 1145	gx	02h54m33s	−18°38.2'	q 310	Eri	16"	m. buona / scarso	è una lama di luce di luminosità pressoché uniforme e visibile abbastanza facilmente, estesa per quasi 3' in direzione NE-SW; situata a ridosso di un piccolo asterismo di 4 stelle di cui 3 brillanti — 188x.
NGC 1148	gx	02h57m04s	−07°41.1'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	è poco più debole di NGC 1152, dalla quale dista 8.5' a SE, e di aspetto confuso (purtroppo non posso ingrandire a causa del seeing), probabilmente orientata da E a W ed estesa almeno 1'; c'è una stellina a ridosso verso E o SE — 188x.
NGC 1149	gx	02h57m24s	−00°18.6'	q 221	Cet	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø di max 20"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 450x.
NGC 1150	gx	02h57m01s	−15°02.9'	q 266	Eri	16"	m. buona / mediocre	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette molto deboli distanti un paio di primi in direzione NNE-SSW; la 1ª è poco più evidente, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare visibile a tratti; la 2ª è debolissima e più piccola; salta fuori a tratti quando si osserva la 1a, ma in visione diretta sparisce! — 188x.
NGC 1151	gx	02h57m05s	−15°00.8'	q 266	Eri	16"	m. buona / mediocre	v. **NGC 1150**
NGC 1152	gx	02h57m34s	−07°45.5'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	relativamente facile, leggermente ovale, orientata da E a W, di dimensioni 50"×40" con nucleo abbastanza marcato; c'è una stellina brillante a ~ 2' verso S — 188x.
NGC 1153	gx	02h58m10s	+03°21.7'	q 221	Cet	16"	ottima / buono	presenta una condensazione centrale piccola e marcata su un disco diffuso, rotondo di 1' di Ø; c'è una stellina a ridosso S — 380x.
NGC 1154	gx	02h58m08s	−10°21.8'	q 266	Eri	16"	m. buona / mediocre	assieme a NGC 1155 forma una coppia di deboli galassie abbastanza facili, distanti 1.5' in direzione NE-SW; la 1ª è di luminosità più uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×50"; la 2ª è invece rotonda, di dimensioni analoghe, ma molto diffusa e presenta una condensazione centrale evidente — 270x.
NGC 1155	gx	02h58m13s	−10°21.0'	q 266	Eri	16"	m. buona / mediocre	v. **NGC 1154**
NGC 1156	gx	02h59m42s	+25°14.2'	q 131	Ari	28"	m. buona / ottimo	bella, molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 90"×60" e debolmente screziata all'interno; c'è una coppia di stelline molto sbilanciate in luminosità a ridosso N; una stellina molto debole si trova presso il bordo meridionale — 495x.
NGC 1157	gx	02h58m07s	−15°07.1'	q 266	Eri	16"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 270x.
NGC 1158	gx	02h57m11s	−14°23.7'	q 266	Eri	16"	m. buona / mediocre	debolissima, estesa forse una 40-ina di secondi, appare solo a tratti in visione distolta — 270x.
NGC 1159	gx	03h00m46s	+43°09.8'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (nel 10" appariva debolissima e visibile solo in visione distolta a 178x) — 450x.
NGC 1160	gx	03h01m13s	+44°57.3'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	bella, relativamente compatta, ma con gradiente di luce molto basso; allungata da NE a SW con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE e un piccolo triangolo serrato di stelline brillanti a 1.5' N; meglio contrastata scalando a 340x (sia questa gx, sia NGC 1161 erano osservabili senza problemi nel 10" a 178x in buone condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 1161	gx	03h01m14s	+44°53.8'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	presenta un piccolo bulge luminoso di 30"×20" circonfuso da un alone molto stemperato sul fondo cielo che in visione distolta arriva a lambire la coppia di stelline brillanti a W le quali, tuttavia, tendono un po' a confondere la forma della gx: poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 2'×1'; anche questa è meglio contrastata scalando a 340x.

NGC 1162	gx	02h58m56s	−12°23.9'	q 266	Eri	16"	m. buona / mediocre	relativamente facile, rotonda con Ø di ~ 1' e diffusa ai bordi; presenta condensazione centrale evidente e stellare — 270x.
NGC 1163	gx	03h00m22s	−17°09.2'	q 311	Eri	16"	buona / ottimo	è una lama di luce molto debole, orientata da NW a SE ed estesa per un paio di primi; presenta un bulge evidente e palesemente più rigonfio rispetto al disco — 270x.
NGC 1164	gx	03h02m00s	+42°35.1'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con brillante nucleo stellare, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante ridosso verso N (nel 10" appariva solo elusivamente in visione distolta a 178x) — 450x.
NGC 1166	gx	03h00m35s	+11°50.6'	q 176	Ari	16"	m. buona / scarso	debole chiazza rotonda di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 45" — 188x.
NGC 1167	gx	03h01m42s	+35°12.4'	q 94	Per	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, con alto gradiente di luce e nucleo stellare, rotonda con Ø di 1.5' — 270x.
NGC 1168	gx	03h00m47s	+11°46.3'	q 176	Ari	16"	m. buona / scarso	debolissima e diffusa, estesa max 30", appare solo a tratti in visione distolta a 132x (a 188x è già di aspetto confuso a causa del seeing).
NGC 1169	gx	03h03m35s	+46°23.2'	q 63	Per	24"	ottima / m. buono	presenta un piccolo nucleo rotondo, di una 20-ina di secondi di Ø con una stellina a ridosso S, circonfuso da un tenue alone molto stemperato sul fondo cielo che in visione distolta è di dimensioni 3'×2'; si apprezza meglio scalando a 340x; c'è una doppia stretta quasi a ridosso verso E, più un paio deboli subito a S; ce n'è anche una appena percettibile a ridosso SE (la gx era già stata osservata esattamente 30 anni prima col 10" in buone condizioni di visibilità: appariva di dimensioni simili, ma avevo scambiato la stellina a ridosso del nucleo come il nucleo stesso decentrato verso S).
NGC 1171	gx	03h03m59s	+43°23.9'	q 63	Per	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNW a SSE con dimensioni che in visione distolta sono di ~ 2'×1'; c'è una stellina a 1.5' verso NNW (sul prolungamento dell'asse maggiore della gx) e un'altra appena percettibile quasi a ridosso verso S *(presenza di chiarore lunare)*; la gx era visibile, seppur debolmente, anche nel 10" in buone condizioni di visibilità — 450x.
NGC 1172	gx	03h01m36s	−14°50.2'	q 266	Eri	16"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo marcato di aspetto quasi stellare; poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60" — 270x.
NGC 1175	gx	03h04m33s	+42°20.4'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 90"×30", con piccolo bulge diffuso e contrastato sul disco (era visibile anche nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 1177	gx	03h04m37s	+42°21.8'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	più debole e più piccola di NGC 1175, dalla quale dista 1.5' a NE rotonda con Ø < 30", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso N (visibile, seppur molto debolmente, anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 1179	gx	03h02m38s	−18°53.9'	q 311	Eri	24"	discreta / mediocre	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme salvo un nucleo stellare molto tenue; la gx è grosso modo rotonda con Ø che in visione distolta supera i 2'; c'è una stellina a ridosso SE (era debolmente visibile e con difficoltà nel 10" a 118x) — 340x.
NGC 1180	gx	03h01m51s	−15°01.8'		Eri	24"	m. buona / scarso	debole e diffusa, appena più brillante all'interno rotonda con Ø < 40" (non è riportata sulla Uranometria) — 450x.
NGC 1181	gx	03h01m43s	−15°03.1'		Eri	24"	m. buona / scarso	situata 2.5' a SW di NGC 1180, è debole, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare visibile a momenti (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 1182	gx	03h03m28s	−09°40.2'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; a 188x e in visione distolta appare chiaramente allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso E — 270x.
NGC 1184	gx	03h16m46s	+80°47.6'	q 5	Cep	24"	m. buona / m. buono	è un bel fuso brillante, orientata da N a S ed estesa per oltre 2' è molto affusolata alle due estremità N e S; presenta un piccolo bulge brillante e contrastato di dimensioni 20"×15" (era facilmente visibile nel 10" a 178x in buone condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 1185	gx	03h03m00s	−09°07.9'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	molto debole e molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20", poco più netta verso la parte SE; c'è una stellina a 1' verso S — 270x.
NGC 1186	gx	03h05m31s	+42°50.1'	q 63	Per	24"	m. buona / m. buono	bella, molto diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da NW a SE con dimensioni 3'×45"; c'è una stellina brillante al bordo SW; un'altra stellina si trova subito a SE, mentre una coppia di stelline deboli distanti si e no una 20-ina di secondi si trova verso l'estremità SE: la componente più a N è appena percettibile *(presenza di chiarore lunare)*; la gx era osservabile senza problemi anche nel 10" a 178x — 450x.
NGC 1187	gx	03h02m38s	−22°52.1'	q 311	Eri	6"	buona / buono	debole ovale di dimensioni 3'×2', orientata da NW a SE e di luminosità uniforme — 57x.
NGC 1188	gx	03h03m43s	−15°29.1'		Eri	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" (non è riportata sull'Uranometria) — 400x.
NGC 1189	gx	03h03m24s	−15°37.4'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	fa parte del quintetto assieme a NGC 1190, 1191, 1192 e 1199 — questa è la più elusiva, appare a tratti in visione distolta, molto stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di 1' — 270x.
NGC 1190	gx	03h03m26s	−15°39.7'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	debole, di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 1191	gx	03h03m31s	−15°41.1'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	è una debole e piccola galassia con Ø di una 30-ina di secondi con tenue nucleo puntiforme — 270x.
NGC 1192	gx	03h03m35s	−15°40.7'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	è di aspetto simile a NGC 1191, dalla quale dista ~ 1' all'incirca verso E, con nucleo puntiforme e dimensioni simili, salvo il fatto che è leggermente più brillante — 270x.
NGC 1193	aa	03h05m56s	+44°23.0'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	piccolo e fitto polverio di stelle quasi totalmente risolto a 450x, compreso tra 2 stelline abbastanza brillanti orientate da E a W; 8 componenti più brillanti risaltano da quelle di fondo e tra queste sono presenti un paio di coppie strette a E e NE; a 200x appare solo come una chiazza granulata orientata da NNW a SSE di dimensioni 1.5'×1' (appariva molto debole e irrisolto nel 10" a 178x).
NGC 1194	gx	03h03m49s	−01°06.2'	q 221	Eri	16"	ottima / m. buono	debole, di luminosità uniforme e aspetto piuttosto irregolare; è comunque estesa non più di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 1195	gx	03h03m33s	−12°02.4'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	fa parte, assieme a NGC 1196, 1198 e a IC 285, di un quartetto posto a trapezio — è una piccola gx rotonda molto debole, di 30" di Ø e situata ~ 1' NW di una stellina — 270x.
NGC 1196	gx	03h03m35s	−12°04.6'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	poco allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×45", diffusa, con nucleo poco più evidente del disco — 270x.
NGC 1198	gx	03h06m13s	+41°50.9'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo brillante, stellare, circonfuso da un tenue alone molto stemperato sul fondo cielo; è orientata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; una brillante si trova invece 1' a N (era visibile molto debolmente anche nel 10" in buone condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 1199	gx	03h03m38s	−15°36.8'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	fa parte del quintetto di NGC 1189 di cui rappresenta il membro più cospicuo — bella, brillante, con nucleo stellare, bulge evidente e ben contrastato su un disco diffuso; è orientata da NE a SW con dimensioni 90"×60" — 270x.
NGC 1200	gx	03h03m54s	−11°59.5'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	è la più luminosa del quartetto cui appartiene la coppia NGC 1195-1196 — bella, brillante, diffusa, presenta nucleo stellare e bulge abbastanza contrastato sul disco, approssim. rotonda con Ø di 80"; c'è una stellina a ridosso verso S, ma situata ancora all'interno dell'alone della gx — 270x.
NGC 1201	gx	03h04m08s	−26°04.1'	q 311	For	6"	buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 3'×1.5'; a 86x presenta una evidente condensazione centrale; è situata a poco più di 3' SSW di una stellina di 11-esima.
NGC 1202	gx	03h05m02s	−06°29.5'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 1203	gx	03h05m14s	−14°22.9'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, situata tra 2 stelle brillanti; appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; questo è sicuramente dovuto alla presenza della piccola compagna — la 1203A — che però non sono riuscito a separare neppure a 380x.
NGC 1204	gx	03h04m40s	−12°20.5'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	anche a 380x appare solo come un baffo orientata da E a W e situato a ridosso di una stellina brillante; è molto diffusa ed estesa per ~ 1'.
NGC 1206	gx	03h06m10s	−08°49.9'	q 266	Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare visibile però solo a momenti (era visibile, debolissima, anche nel 16" a 188x) — 450x.
NGC 1207	gx	03h08m16s	+38°22.9'	q 94	Per	16"	ottima / ottimo	diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×50"; c'è una stellina all'interno dell'alone verso NW; meglio contrastata a 270x.
NGC 1208	gx	03h06m12s	−09°32.5'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	facile e abbastanza brillante; in visione diretta, alla prima occhiata, appare di forma circolare, ma in visione distolta è invece chiaramente allungata da E a W con dimensioni 80"×40" e più brillante verso l'interno; presenta un nucleo stellare visibile solo a tratti — 270x.
NGC 1209	gx	03h06m03s	−15°36.7'	q 263	Eri	16"	ottima / m. buono	brillante, leggermente screziata a 380x, allungata da E a W con dimensioni 80"×40" — 380x.
NGC 1210	gx	03h06m45s	−25°43.0'	q 311	For	16"	ottima / mediocre	relativamente brillante, con alto gradiente di luce, diffusa, rotonda con Ø di 80"; c'è una stellina quasi a ridosso del bordo settentrionale e una appena percettibile a ridosso verso E (o SE); una doppia molto serrata è invece situata 4' SSE — 188x.
NGC 1211	gx	03h06m52s	−00°47.7'	q 221	Cet	16"	ottima / m. buono	abbastanza luminosa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30"; presenta un bulge estesa, evidente e brillante — 270x.
NGC 1212	gx	03h08m43s	+40°51.7'		Per	28"	m. buona / m. buono	è una sorta di piccolo e debolissimo lucore che aggetta per una 20-ina di secondi a SE della più orientale di una coppia di stelline orientate in direzione E-W — 495x.
NGC 1213	gx	03h09m17s	+38°38.9'	q 94	Per	16"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, approssim. circolare con Ø di ~ 1'; ci sono 3 stelline appena percettibili allineate da N a S, osservabili a 380x.
NGC 1214	gx	03h06m56s	−09°32.6'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	fa parte di un terzetto assieme a NGC 1215, 1216 e Hickson 23D — è allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30" e poco più brillante all'interno — 188x e 270x.
NGC 1215	gx	03h07m09s	−09°35.5'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	più diffusa di NGC 1214 e poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; presenta un nucleo abbastanza brillante di aspetto quasi stellare — 188x e 270x.
NGC 1216	gx	03h07m19s	−09°36.7'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	relativamente compatta, orientata ~ da E a W, di dimensioni 30"×15" e nucleo evidente di aspetto quasi stellare — 188x e 270x
NGC 1218	gx	03h08m26s	+04°06.7'	q 221	Cet	16"	ottima / buono	facile, rotonda, con alto gradiente di luce e Ø di ~ 1'; presenta un tenue nucleo stellare visibile a tratti a 270x.
NGC 1219	gx	03h08m28s	+02°06.5'	q 221	Cet	10"	ottima / m. buono	debole, estesa oltre 1', con bassissima luminanza superficiale; un nucleo stellare (o una stellina sovrapposta) è visibile solo a momenti — 270x.
NGC 1220	aa	03h11m41s	+53°20.9'	q 38	Per	10"	buona / buono	nella posizione segnata si vede un gruppetto di stelle deboli, molto compatto e delle dimensioni di qualche primo.
NGC 1221	gx	03h08m16s	−04°15.6'	q 221	Eri	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", diffusa e con gradiente di luce molto basso; visibile un bulge assai poco contrastato sul disco — 450x.
NGC 1222	gx	03h08m57s	−02°57.3'	q 221	Eri	16"	ottima / m. buono	relativamente brillante, rotonda, con una marcata condensazione centrale di aspetto stellare e bulge evidente; presenta un tenuissimo alone circonfuso con Ø di 1' o poco più — 270x.
NGC 1223	gx	03h08m20s	−04°08.3'	q 221	Eri	16"	ottima / m. buono	rotonda con Ø di 45", facile da vedere, ma con gradiente di luce molto basso — 270x.
NGC 1224	gx	03h11m14s	+41°21.7'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	è una bella gx brillante, ma con gradiente di luce piuttosto basso, diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una doppia stretta a 1.5' verso E (era osservabile, molto debolmente, anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 1225	gx	03h08m47s	−04°06.1'	q 221	Eri	16"	ottima / m. buono	debole e diffusa, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 1226	gx	03h11m05s	+35°23.2'	q 94	Per	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 1' scarso, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 380x.
NGC 1227	gx	03h11m08s	+35°19.5'	q 94	Per	16"	buona / m. buono	piccola galassia pressoché uniforme, estesa una 30-ina di secondi e situata ~ 4' a S di NGC 1226 osservata, però, in altra data — 270x.
NGC 1228	gx	03h08m12s	−22°55.4'	q 311	Eri	16"	ottima / mediocre	fa parte di un quartetto assieme a NGC 1229, 1230 e IC 1892 — rotonda, diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 270x.
NGC 1229	gx	03h08m11s	−22°57.7'	q 311	Eri	16"	ottima / mediocre	fa parte di un quartetto assieme a NGC 1228, 1230 e IC 1892 — debolissima, visibile a tratti in visione distolta; appare orientata da E a W, di dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 1230	gx	03h08m16s	−22°59.0'	q 311	Eri	16"	ottima / mediocre	fa parte di un quartetto assieme a NGC 1228, 1239 e IC 1892 — poco più debole e più piccola di NGC 1229, si vede solo a momenti in visione distolta come un piccolo oggetto di una 20-ina di secondi — 270x.
NGC 1231	gx	03h06m29s	−15°34.1'	q 263	Eri	16"	ottima / m. buono	molto e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 380x.
NGC 1232	gx	03h09m45s	−20°34.9'	q 311	Eri	16"	ottima / m. buono	a dispetto della sua fama è una gx visualmente piuttosto deludente, nel senso che non mostra strutture, salvo una lieve condensazione centrale diffusa; a 270x appare come una chiazza grosso modo rotonda con Ø di 6' e dai bordi molto sfilacciati; c'è una stellina a ridosso del margine NNE.
NGC 1232A	gx	03h10m02s	−20°35.9'	q 311	Eri	16"	ottima / m. buono	debolissima galassietta rotonda visibile a momenti in visione distolta, molto diffusa, di luminosità uniforme ed estesa una 40-ina di secondi; meglio osservabile scalando a 270x.
NGC 1233	gx	03h12m33s	+39°19.1'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	bella, diffusa, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 90"×30", con bulge esteso poco contrastato e debolmente screziato a 450x; c'è una stellina a 1' verso NNE, ossia sul prolungamento dell'asse galattico (nel 10" era molto debole a 178x; nondimeno il bulge era visibile, come lo era, anche se appena percettibile, la stellina a NNE).
NGC 1234	gx	03h09m39s	−07°50.8'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	debolissima, diffusa, molto stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 60"×30" — 270x.
NGC 1236	gx	03h11m28s	+10°48.5'	q 176	Ari	16"	ottima / scarso	molto debole, piccola, rotondeggiante, con Ø 30" e luminosità pressoché uniforme; a tratti sembra d'intravedere un nucleo puntiforme — 188x.
NGC 1237	ss	03h10m45s	−08°39.5'		Eri	24"	m. buona / mediocre	è solo una coppia di deboli stelline distanti una 15-ina di secondi e orientate da N a S — 450x.
NGC 1238	gx	03h10m53s	−10°44.8'	q 266	Eri	24"	buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" e un piccolo bulge abbastanza contrastato sul disco — 450x.
NGC 1239	gx	03h10m54s	−02°33.2'	q 221	Eri	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con alto gradiente di luce; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE (già debolmente osservabile nel 10") — 450x.
NGC 1241	gx	03h11m15s	−08°55.3'	q 266	Eri	24"	ottima / m. buono	è un bell'ovale molto diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da NW a SE con dimensioni 2.5'×1.5'; presenta un piccolo nucleo d aspetto quasi stellare; c'è una doppia abbastanza stretta a 3' SW — 400x.
NGC 1242	gx	03h11m19s	−08°54.1'	q 266	Eri	24"	ottima / m. buono	è situata quasi a ridosso di NGC 1241 verso NE; è un debole ovale di luminosità pressoché uniforme, orientata anch'esso da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stella brillante a 3' N della coppia e un'altra più debole allineata e grosso modo equidistante con le 2 gx verso NE (la gx era visibile debolmente anche nel 10") — 400x.
NGC 1245	aa	03h14m42s	+47°14.3'	q 63	Per	6"	discreta / buono	debole chiazza lattiginosa e irrisolta, di Ø pari a 6' o 7' e con una stellina brillante al bordo S.
NGC 1247	gx	03h12m12s	−10°28.8'	q 266	Eri	24"	buona / buono	molto allungata allungata da ENE a WSW 3'×30" (vista praticamente di taglio), diffusa alle estremità e con bulge esteso abbastanza contrastato — 450x.
NGC 1248	gx	03h12m48s	−05°13.5'	q 266	Eri	16"	buona / mediocre	relativamente brillante, rotonda, diffusa, Ø ~ 1' con marcata condensazione centrale e nucleo stellare — 270x.
NGC 1250	gx	03h15m21s	+41°21.3'	q 63	Per	24"	buona / buono	relativamente brillante e diffusa, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 90"×30" e con un piccolo bulge rotondo di una 20-ina di secondi contrastato; c'è una stellina a 1' N dal centro — 450x.
NGC 1253	gx	03h14m09s	−02°49.4'	q 221	Eri	16"	ottima / buono	molto diffusa, di aspetto un po' irregolare, allungata da E a W, con dimensioni grosso modo di 2'×1' e poco più brillante all'interno; c'è una stellina a ridosso verso SW — 270x.
NGC 1253A	gx	03h14m24s	−02°48.0'	q 221	Eri	16"	ottima / buono	situata 4' NE di NGC 1253, è una debolissima chiazza di luce, anche questa di aspetto irregolare, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1'; meglio visibile scalando a 188x; c'è una stellina brillante a ridosso SW.
NGC 1254	gx	03h14m24s	+02°40.7'	q 221	Cet	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare (in condizioni analoghe era debolmente visibile anche nel 10" a 178x, mentre il nucleo appariva solo in visione distolta) — 450x.
NGC 1255	gx	03h13m32s	−25°43.6'	q 311	For	10"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso di luce, orientata da NW a SE con dimensioni 3'×2'; c'è una stellina abbastanza brillante presso il bordo SW; meglio scalando a 118x.
NGC 1256	gx	03h13m58s	−21°59.2'	q 311	Eri	16"	ottima / buono	molto allungata da ESE a WNW con dimensioni 60"×20", diffusa e con bulge marcato — 188x.
NGC 1257	gx	03h16m26s	+41°31.8'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	fa parte del **Grande Ammasso di Perseo** — lama di luce poco diffusa, estesa 1' e orientata da ENE a WSW; presenta un piccolo bulge diffuso poco contrastato; c'è una stella brillante a ridosso N — 388x.
NGC 1258	gx	03h14m05s	−21°46.5'	q 311	Eri	16"	m. buona / scarso	allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a quasi 3' verso SE — 188x.
NGC 1259	gx	03h17m17s	+41°23.1'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	fa parte, assieme alla successiva del **Grande Ammasso di Perseo** — molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con evidente condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina verso il bordo occidentale — 388x.
NGC 1260	gx	03h17m27s	+41°24.3'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 388x.
NGC 1262	gx	03h15m34s	−15°52.8'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	molto debole, di aspetto un po' confuso; appare più brillante all'interno, appena allungata da NW a SE con dimensioni 60"×50" — 270x.
NGC 1263	gx	03h15m39s	−15°05.9'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	è una piccola galassia rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 1264	gx	03h18m00s	+41°31.2'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	fa parte, assieme alla successiva, del **Grande Ammasso di Perseo** — molto diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale evidente, ma poco contrastata sul disco; c'è una coppia di stelline molto deboli a ridosso NE — 388x.
NGC 1265	gx	03h18m16s	+41°51.5'	q 63	Per	28"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo stellare molto luminoso (ma potrebbe di fatto trattarsi di una stella sovrapposta) circonfuso da un alone rotondo molto stemperato sul fondo cielo che in visione distolta si estende per almeno 1' — 495x.
NGC 1266	gx	03h16m01s	−02°25.6'	q 221	Eri	16"	ottima / m. buono	relativamente. brillante, ma di aspetto un po' confuso; forse allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a poco meno di 2' verso W — 270x.
NGC 1267	gx	03h18m45s	+41°28.0'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	fa parte assieme alle 13 successive, esclusa quindi NGC 1280, del **Grande Ammasso di Perseo** — presenta un nucleo molto brillante, quasi stellare circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di una 40-ina di secondi — 388x.
NGC 1268	gx	03h18m45s	+41°29.3'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø Ø < 40"; c'è una stellina al bordo meridionale — 388x.
NGC 1270	gx	03h18m18s	+41°28.2'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	molto diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" e una condensazione centrale molto pronunciata — 388x.
NGC 1271	gx	03h19m11s	+41°21.2'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge evidente — 388x.
NGC 1272	gx	03h19m21s	+41°29.5'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	rotonda con Ø di oltre 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso SE — 388x.
NGC 1273	gx	03h19m27s	+41°32.4'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con nucleo marcato — 388x.
NGC 1274	gx	03h19m40s	+41°32.9'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue nucleo stellare — 388x.
NGC 1275	gx	03h19m48s	+41°30.7'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	è la componente più vistosa del **Grande Ammasso di Perseo** — bella, molto diffusa, con Ø di 80" e un bulge centrale molto brillante; c'è una stellina al margine W e una abbastanza brillante a ridosso NE — 388x.
NGC 1276	gx	03h19m52s	+41°33.0'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	piccola e molto debole, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" (o poco più); c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso W — 388x.
NGC 1277	gx	03h19m51s	+41°34.4'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo evidente — 388x.
NGC 1278	gx	03h19m54s	+41°33.8'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 50-ina di secondi (1' scarso) e con piccolo nucleo poco contrastato — 388x.
NGC 1280	gx	03h17m57s	−00°10.1'	q 221	Cet	16"	ottima / buono	facile, relativamente compatta, rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 1281	gx	03h20m06s	+41°37.8'	q 63	Per	28"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme alle due successive del **Grande Ammasso di Perseo** — relativamente brillante, diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina molto debole a ridosso N e una brillante a 1' WSW — 495x.
NGC 1282	gx	03h20m12s	+41°22.0'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	brillante e con alto gradiente di luce, molto diffusa, a prima vista circolare, ma osservando attentamente si nota che in realtà è poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 388x.
NGC 1283	gx	03h20m15s	+41°23.9'	q 63	Per	28"	ottima / discreto	diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø < 40" e una condensazione centrale più piccola della precedente — 388x.
NGC 1284	gx	03h17m45s	−10°17.3'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	chiazza rotonda molto evanescente estesa per oltre 1' con nucleo diffuso abbastanza evidente; c'è una stellina doppia con componenti distanti una 20-ina di secondi a un paio di primi verso S — 270x.
NGC 1285	gx	03h17m53s	−07°17.8'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	diffusa, di aspetto un po' irregolare e diffuso; è poco allungata all'incirca da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 1286	gx	03h17m49s	−07°37.0'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	piccola, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" ed evidente nucleo di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 1287	gx	03h18m34s	−02°43.9'	q 221	Eri	16"	ottima / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, aspetto confuso, estesa al massimo per 40" — 270x.
NGC 1289	gx	03h18m50s	−01°58.4'	q 221	Eri	16"	ottima / buono	è un bell'ovale di dimensioni 60"×45", poco diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 1290	gx	03h19m25s	−13°59.4'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, con tenue condensazione centrale; si trova alla fine, verso E, di un piccolo arco di stelle estesa ~ 6' con la concavità rivolta verso S — 270x.
NGC 1292	gx	03h18m15s	−27°36.7'	q 311	For	16"	m. buona / scarso	molto allungata da N a S, di dimensioni 3'×1' e con bulge appena più brillante del disco; c'è una stellina doppia serrata a 3' verso NE che fa parte di un piccolo asterismo triangolare di 4 stelline — 188x.
NGC 1293	gx	03h21m37s	+41°23.6'	q 262	Per	28"	ottima / discreto	fa parte, assieme alla successiva del **Grande Ammasso di Perseo** —relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno; un nucleo stellare appena percettibile appare a momenti — 495x.
NGC 1294	gx	03h21m40s	+41°21.6'	q 63	Per	28"	m. buona / ottimo	poco più brillante e più grande della precedente, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con un piccolo nucleo luminoso molto contrastato — 495x.
NGC 1295	gx	03h20m03s	−13°59.9'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	debole, con condensazione centrale puntiforme, poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e dai bordi abbastanza definiti — 270x.
NGC 1296	gx	03h18m50s	−13°03.8'	q 266	Eri	16"	buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 1297	gx	03h19m14s	−19°06.0'	q 311	Eri	10"	ottima / buono	debole, rotonda con Ø > 1', molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno.
NGC 1298	gx	03h20m13s	−02°06.8'	q 221	Eri	16"	m. buona / discreto	diffusa, rotonda, di 1' di Ø, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina a ridosso verso N — 270x.
NGC 1299	gx	03h20m09s	−06°15.7'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, allungata da NE a SW e di dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 1300	gx	03h19m41s	−19°24.7'	q 221	Eri	10"	ottima / discreto	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 3'×2'.
NGC 1301	gx	03h20m35s	−18°42.9'	q 221	Eri	16"	m. buona / scarso	debole lama di luce abbastanza definita, poco più brillante all'interno, estesa per oltre 2' da NW a SE; c'è una stellina appena percettibile poco oltre il margine NW — 132x.
NGC 1302	gx	03h19m51s	−26°03.6'	q 311	For	24"	m. buona / m. buono	brillante, rotonda e molto diffusa, con bulge evidente estesa 1' e nucleo stellare marcato; in visione, a 340x, il Ø è di ~ 3' e arriva a lambire una stellina brillante a ridosso verso NNW (era osservabile anche nel Comet-Tracker a 86x).
NGC 1303	gx	03h20m41s	−07°23.7'	q 266	Eri	16"	buona / ballerino	è una piccola galassia rotondo abbastanza compatto, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi o 35"; c'è una stellina evidente a ridosso del margine orientale — 270x.
NGC 1304	gx	03h21m13s	−04°35.0'	q 221	Eri	16"	buona / ottimo	relativamente brillante, poco più brillante all'interno di luce e nucleo di stellare; è di aspetto un po' irregolare: grosso modo circolare con Ø di ~ 45" *(presenza di chiarore lunare)* — 270x.
NGC 1305	gx	03h21m23s	−02°19.0'	q 221	Eri	10"	buona / discreto	debolissima, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NE — 178x.
NGC 1306	gx	03h21m03s	−25°30.7'	q 266	For	16"	ottima / mediocre	facile, poco diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e gradatamente più brillante all'interno — 270x.
NGC 1308	gx	03h22m29s	−02°45.4'	q 221	Eri	16"	ottima / m. buono	debole, approssim. circolare, molto sfumata e con una condensazione centrale piccola ed evidente; si trova 1.5' W di una stellina di 11ª e a 2' SSE di un'altra di 12ª che disturbano alquanto — 270x.
NGC 1309	gx	03h22m06s	−15°24.0'	q 266	Eri	16"	ottima / ottimo	brillante, ma con basso gradiente di luce e poco diffusa; presenta solo un piccolo bulge appena più contrastato del disco; è rotonda con Ø di 1.5'; molto disturbata dalla SAO 148921 di 7ª grandezza situata a soli 4' SSW — 270x.
NGC 1312	gx	03h23m30s	+01°19.4'	q 221	Tau	16"	m. buona / ottimo	elusiva, salta fuori in visione distolta osservando la stellina situata ~ 1' NW; anche a 380x non riesco a capire com'è orientata; non sembra comunque più estesa di 20" o 30".
NGC 1314	gx	03h22m41s	−04°11.2'	q 221	Eri	16"	buona / ottimo	molto debole, rotonda, diffusa, estesa ~ 40"; si osserva facilmente in visione distolta *(presenza di chiarore lunare)* — 270x.
NGC 1315	gx	03h23m07s	−21°22.5'	q 221	Eri	16"	m. buona / scarso	galassia circolare abbastanza facile, poco più brillante all'interno e con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1.5' verso SE — 188x.
NGC 1319	gx	03h23m56s	−21°31.6'	q 311	Eri	16"	m. buona / scarso	allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina 1' scarso verso W — 188x.
NGC 1320	gx	03h24m49s	−03°02.6'	q 221	Eri	16"	buona / ottimo	galassia compatta che presenta una zona centrale molto marcata; è molto allungata da SE a NW con dimensioni 45"×20" — 270x.
NGC 1321	gx	03h24m49s	−03°01.0'	q 221	Eri	16"	buona / ottimo	brillante ovale di 45"×30", orientato da E a W e con condensazione centrale molto evidente — 270x.
NGC 1322	gx	03h24m55s	−02°55.1'	q 221	Eri	16"	buona / ottimo	debole, ma facilmente visibile, rotonda, con basso gradiente di luce e con Ø di ~ 45" — 270x.
NGC 1323	gx	03h24m56s	−02°49.3'	q 221	Eri	16"	buona / ottimo	piccolo e debole piccola galassia orientata da E a W, estesa una 20-ina di secondi; è situata quasi a ridosso verso NE di una stellina di 14-esima — 270x.
NGC 1324	gx	03h25m02s	−05°44.7'	q 266	Eri	16"	buona / mediocre	debole, ma facilmente visibile, estesa per ~ 2.5' e orientata da NW a SE, con bulge allungata ed evidente; la galassia è sfumata in direzione dell'allungamento — 270x.
NGC 1325	gx	03h24m25s	−21°32.6'	q 311	Eri	16"	m. buona / scarso	è un bel fuso orientata da NE a SW, lungo 3' e largo 1' che sembra dipartirsi verso SW da una stellina brillante — 188x.
NGC 1325A	gx	03h24m48s	−21°20.2'	q 311	Eri	16"	m. buona / scarso	chiazza estesa e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di 2' — 132x.
NGC 1328	gx	03h25m39s	−04°07.5'	q 221	Eri	16"	buona / ottimo	piccolo oggetto compatto, circolare, con Ø di 25" o 30" e gradatamente più brillante all'interno *(presenza di chiarore lunare)* — 270x.
NGC 1329	gx	03h26m02s	−17°35.5'	q 311	Eri	16"	buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø poco > a 1', gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 1330	gx	03h29m12s	+41°23.3'	q 63	Per	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo e debole oggetto abbastanza compatto, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono nelle immediate vicinanze 2 stelline distanti una 20-ina di secondi e orientate da NW a SE delle quali la 2ª lambisce la galassia — 270x.
NGC 1331	gx	03h26m28s	−21°21.3'	q 311	Eri	16"	m. buona / scarso	abbastanza facile, rotonda, con Ø di 45", relativamente compatta e con nucleo stellare visibile a tratti; si trova praticamente allineata con l'asse di NGC 1332 — 188x.
NGC 1332	gx	03h26m17s	−21°20.1'	q 311	Eri	16"	m. buona / scarso	molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 3.5'×1'; presenta un bulge molto brillante e contrastato sul disco e con Ø di 1' — 188x.
NGC 1333	neb	03h29m15s	+31°23.9'	q 94	Per	16"	ottima / ottimo	a 132x pare a prima vista una gx irregolare; è grosso modo ovale, orientata da NE a SW con dimensioni 5'×3'; c'è una stella brillante al bordo NE che appare circonfusa da un alone (questa stella fa parte di un triangolo isoscele regolare il cui vertice più acuto punta a SW); un'altra stellina più debole si trova al bordo SW; altre 2 deboli stelline sono situate all'interno della nebulosa.
NGC 1334	gx	03h30m01s	+41°50.0'	q 63	Per	16"	m. buona / m. buono	è una galassia con basso gradiente di luce, forse un poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45", con una stellina molto debole al bordo orientale — 270x.
NGC 1335	gx	03h30m19s	+41°34.4'	q 63	Per	16"	m. buona / m. buono	è più debole di NGC 1334, molto diffusa e presenta un nucleo abbastanza marcato; è allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 1337	gx	03h28m06s	−08°23.3'	q 267	Eri	16"	ottima / buono	facile, molto estesa, di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 4'×1' — 270x.
NGC 1338	gx	03h28m54s	−12°09.3'	q 267	Eri	24"	buona / m. buono	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso; presenta una debolissima nucleo stellare visibile a tratti; la gx è nel complesso rotonda con Ø di ~ 1'; c'è un nodulo a ridosso verso W. Anche nel 16" a 270x, in condizioni di cielo simili, appariva abbastanza facile, ma avevo notato un bulge leggermente decentrato verso NE — 400x.
NGC 1339	gx	03h28m06s	−32°17.2'	q 355	For	10"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, appare con relativa facilità solo a 178x; in visione distolta appare poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45" e con marcata condensazione centrale.
NGC 1342	aa	03h31m36s	+37°31.6'	q 94	Per	16"	ottima / ottimo	si vede già nel cercatore da 50 mm — è un bell'oggetto abbastanza ricco che a 132x con campo di mezzo grado appare di forma quadrata, coi lati grosso modo inclinati di ~ 30° rispetto alle direzioni cardinali e lunghi una 15-ina di primi; all'interno di questo quadrato si contano oltre 30 stelle di cui una doppia stretta all'estremità W; a 100x, con un campo superiore, il quadrato sembra però un "sottoinsieme" di un complesso stellare più esteso.
NGC 1343	gx	03h37m50s	+72°34.3'	q 18	Cas	24"	m. buona / m. buono	a prima vista appare rotonda e relativamente compatta, brillante e anche debolmente screziata a 450x; tuttavia in visione distolta appaiono a momenti 2 tenuissimi baffi che si dipartono a E e a W del centro per una 30-ina di secondi ad ambo le direzioni; c'è una doppia abbastanza stretta con componenti relativamente brillanti a 1' verso N; 2 stelline molto deboli di luminosità simile si trovano all'estremità del baffo orientale molto diffusa, con condensazione centrale molto tenue (nel 10" a 240x appariva molto diffusa e con un nucleo appena percettibile) — 450x.
NGC 1344	gx	03h28m19s	−31°04.1'	q 355	For	10"	ottima / m. buono	gx facile, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni approssim. 3'×2'; presenta una zona centrale molto brillante, meglio evidente scalando a 118x.
NGC 1345	gx	03h29m31s	−17°46.7'	q 312	Eri	16"	buona / ballerino	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con basso gradiente di luce; a tratti appare una stellina a ridosso del bulge verso (N a meno che non si tratti del nucleo decentrato) — 270x.
NGC 1346	gx	03h30m13s	−05°32.6'	q 267	Eri	16"	buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme; sembra allungata da E a W, ma forse trattasi dell'effetto prodotto da una stellina brillante situata a ridosso dell'estremità occidentale — 270x.
NGC 1347	gx	03h29m42s	−22°16.7'	q 312	Eri	16"	m. buona / scarso	diffusa e di aspetto un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø > di 1' e di luminosità uniforme; c'è una piccolo triangolo di stelline a 4' verso NE — 132x.
NGC 1348	aa	03h34m09s	+51°25.2'	q 63	Per	10"	buona / discreto	molto piccolo e debole; a 178x si contano a mala pena 5 o 6 stelline di cui solo una abbastanza brillante.
NGC 1349	gx	03h31m27s	+04°22.9'	q 222	Tau	16"	ottima / buono	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 1352	gx	03h31m33s	−19°16.7'	q 312	Eri	16"	ottima / mediocre	è di aspetto un po' irregolare, comunque grosso modo orientata da NE a SE con dimensioni 50"×30", poco diffusa e con condensazione centrale evidente — 270x.
NGC 1353	gx	03h32m03s	−20°49.1'	q 312	Eri	10"	ottima / m. buono	facilmente visibile, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni di ~ 2'×1'; c'è una stellina a SW su prolungamento dell'asse maggiore della galassia.
NGC 1354	gx	03h32m29s	−15°13.3'	q 267	Eri	16"	buona / ottimo	bella, facile, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×40", con bulge e abbastanza contrastato — 270x.
NGC 1355	gx	03h33m24s	−04°59.9'	q 267	Eri	24"	m. buona / mediocre	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×20", con bulge diffuso e nucleo stellare (la gx era debolmente osservabile anche nel 10") — 450x.
NGC 1357	gx	03h33m17s	−13°39.9'	q 267	Eri	16"	ottima / ottimo	molto bella, molto diffusa e con alto gradiente di luce; è leggermente ovale, orientata da NE a SW con dimensioni 2'×1.5' e presenta un piccolo bulge abbastanza marcato; l'"ovalizzazione", tuttavia, si apprezza meglio scalando a 188x.
NGC 1358	gx	03h33m40s	−05°05.4'	q 267	Eri	24"	m. buona / mediocre	presenta un nucleo stellare marcato e un piccolo bulge compatto di dimensioni 20"×15" orientata da NW a SE immersi in una chiazza lattescente molto stemperata sul fondo cielo; la gx è allungata da N a S con dimensioni 2'×1.5'; due debolissime anse appaiono a tratti a NW e a SW; c'è una doppia brillante a NE; meglio contrastata a 270x (precedentemente osservata anche in un 10").
NGC 1359	gx	03h33m47s	−19°29.3'	q 312	Eri	10"	ottima / buono	molto debole e diffusa, a tratti, in visione distolta, appare grosso modo rotonda con Ø poco superiore a 1' e di luminosità a tratti irregolare.
NGC 1360	np	03h33m15s	−25°52.2'	q 312	For	6"	m. buona / ottimo	molto estesa e insolitamente allungata per una planetaria, orientata da N a S con dimensioni 8'×5' e di luminosità uniforme; e di aspetto galattico se osservata a 57x con filtro O III.
NGC 1361	gx	03h34m18s	−06°15.8'	q 267	Eri	16"	buona / ballerino	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; è rotonda con Ø di ~ 1' e nucleo evidente — 270x.
NGC 1362	gx	03h33m53s	−20°16.9'	q 312	Eri	10"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; è situata a ~ 5' N di una doppia sbilanciata (la componente principale è molto brillante; meglio osservabile a 178x.
NGC 1363	gx	03h34m49s	−09°50.5'	q 267	Eri	16"	buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di galassie abbastanza facili, separate da poco più di 2' in direzione E-W — la 1ª è più brillante ed estesa, approssim. rotonda con Ø > di 1'; la 2ª, più debole e poco più diffusa, è pure rotonda con Ø di ~ 40"; sono entrambe molto disturbate dalla luce di una stella brillante di 6ª situata a 4' WSW della coppia; ho dovuto impiegare 380x per ridurne l'abbagliamento.
NGC 1364	gx	03h34m59s	−09°50.4'	q 267	Eri	16"	buona / ottimo	v. **NGC 1363**
NGC 1365	gx	03h33m36s	−36°08.3'	q 355	For	10"	ottima / m. buono	è una galassia molto debole, malgrado la sua fama, ma forse perché è bassissima sull'orizzonte; in visione diretta, a 63x, appare solo il nucleo; in visione distolta e alternando gli occhi si nota un allungamento abbastanza netto in direzione E-W di dimensioni 4'×2' e imputabile, verosimilmente, alla barra centrale; non sono tuttavia riuscito a vedere i 2 bracci principali.
NGC 1366	gx	03h33m54s	−31°11.6'	q 355	For	10"	ottima / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 90"×45"; 178x per cercare di tenere fuori campo, o quanto meno ridurre l'abbagliamento della SAO 194375 di 6ª grandezza situata 7' più a N.
NGC 1368	gx	03h34m59s	−15°39.4'	q 267	Eri	16"	buona / ottimo	debole, ma facilmente visibile in visione distolta, piccola, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 1370	gx	03h35m14s	−20°22.4'	q 312	Eri	10"	ottima / m. buono	molto debole, approssim. circolare con Ø di 1' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso del bordo NW e un'altra appena percettibile a ridosso di quello opposto che risaltano abbastanza facilmente a 178x.
NGC 1371	gx	03h35m01s	−24°56.0'	q 312	For	6"	m. buona / ottimo	debole e molto stemperata sul fondo cielo, con gradiente di luce molto basso e una piccola condensazione centrale di aspetto stellare osservabile in visione distolta a 86x; la galassia è grosso modo circolare con Ø di 3'; c'è una stella abbastanza brillante di 9ª (la SAO 168653) situata a NE che infastidisce un poco l'osservazione.
NGC 1372	gx	03h37m00s	−15°52.9'	q 267	Eri	16"	buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a 1' verso SW — 270x.
NGC 1374	gx	03h35m17s	−35°13.6'	q 355	For	10"	buona / buono	relativamente facile a 118x, relativamente compatta, rotonda con Ø > 1' e una condensazione centrale evidente di aspetto stellare.
NGC 1375	gx	03h35m17s	−35°16.0'	q 355	For	10"	buona / buono	situata un paio di primi a S di NGC 1374, appare debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e appena più brillante verso l'interno.
NGC 1376	gx	03h37m06s	−05°02.6'	q 267	Eri	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1.5' o poco più; appare meglio contrastata a 270x.
NGC 1377	gx	03h36m39s	−20°54.1'	q 312	Eri	16"	ottima / mediocre	facile, relativamente brillante poco più brillante all'interno di luce, allungata da E a W con dimensioni 80"×40" — 270x.
NGC 1379	gx	03h36m04s	−35°26.5'	q 355	For	10"	buona / buono	a prima vista è di aspetto simile a 1374, ma più compatta, Ø di 1.5' e con condensazione centrale evidente di aspetto quasi stellare.
NGC 1380	gx	03h36m27s	−34°58.5'	q 355	For	10"	ottima / m. buono	relativamente facile e compatta, allungata da N a S con dimensioni 4'×2' e gradatamente più brillante verso l'interno; più interessante a 118x.
NGC 1383	gx	03h37m39s	−18°20.3'	q 312	Eri	16"	ottima / mediocre	allungata da E a W con dimensioni 80"×40", diffusa; presenta un bulge evidente e contrastato sul disco; si trova tra 2 stelline distanti 3' e orientate da NE a SW — 270x.
NGC 1384	gx	03h39m13s	+15°49.1'	q 177	Tau	16"	ottima / scarso	debole, diffusa, approssim. circolare, con Ø ~ 40", con piccola condensazione centrale e leggermente decentrata verso S — 188x.
NGC 1385	gx	03h37m29s	−24°30.1'	q 312	For	6"	m. buona / buono	chiazza lattescente molto debole e diffusa osservabile più facilmente in visione distolta a 118x, orientata da N a S con dimensioni 3'×1.5'; c'è una stellina a un paio di primi verso NNE.
NGC 1386	gx	03h36m46s	−36°00.0'	q 355	Eri	10"	buona / buono	molto debole, con tenue condensazione centrale; a 178x appare chiaramente molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 3'×1'.
NGC 1387	gx	03h36m57s	−35°30.4'	q 355	Eri	10"	buona / buono	simile a NGC 1374 ed NGC 1379; tuttavia è più estesa, relativamente compatta e con Ø di un paio di primi; anche questa presenta una condensazione centrale evidente di aspetto quasi stellare — 118x.
NGC 1388	gx	03h38m12s	−15°54.0'	q 267	Eri	16"	buona / ottimo	più evidente di NGC 1387, presenta un piccolo bulge compatto circonfuso da un tenue alone molto stemperato, rotondo con Ø di 1' scarso — 270x.
NGC 1389	gx	03h37m12s	−35°44.8'	q 355	Eri	10"	buona / buono	molto debole, compatta, con gradiente di luce molto basso, situata 1.5' a S di una stellina brillante — 118x.
NGC 1390	gx	03h37m52s	−19°00.5'	q 312	Eri	16"	ottima / mediocre	molto debole, allungata all'incirca da N a S con dimensioni 60"×30", diffusa; a tratti appare una condensazione centrale molto tenue — 270x.

NGC 1391	gx	03h38m53s	−18°21.3'	q 312	Eri	16"	ottima / mediocre	fa parte, assieme a NGC 1393, 1394, 1395, 1402 e a IC 343, di un sestetto situato a W della brillante NGC 1407 — debole, diffusa, con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 50"×30" — 270x.
NGC 1393	gx	03h38m39s	−18°25.7'	q 312	Eri	16"	ottima / mediocre	è la più brillante del sestetto di NGC 1391, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45" e con bulge abbastanza marcato — 270x.
NGC 1394	gx	03h39m07s	−18°17.5'	q 312	Eri	16"	ottima / mediocre	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", con nucleo puntiforme evidente — 270x.
NGC 1395	gx	03h38m30s	−23°01.7'	q 312	Eri	10"	m. buona / buono	debole, diffusa, approssim. circolare con Ø di almeno 3' e nucleo brillante puntiforme; situata tra una stellina a N e una coppia ravvicinata di stelline a S; meglio visibile a 118x.
NGC 1397	gx	03h39m47s	−04°40.3'	q 222	Eri	16"	ottima / buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" e gradiente di luce molto basso — 270x.
NGC 1398	gx	03h38m52s	−26°20.2'	q 312	For	10"	m. buona / ottimo	grosso modo rotonda con Ø di almeno 4' e molto diffusa; presenta una marcata condensazione centrale estesa una 30-ina di secondi o poco più; si trova all'interno di un triangolo isoscele molto allungata di stelline abbastanza brillanti col vertice più acuto che punta a W: la galassia si trova verso questo vertice.
NGC 1399	gx	03h38m29s	−35°27.0'	q 355	For	10"	ottima / m. buono	molto brillante, diffusa, rotonda con Ø superiore di 4' e alto gradiente di luce; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti fatto a losanga irregolare subito a E; più interessante a 118x.
NGC 1400	gx	03h39m31s	−18°41.3'	q 267	Eri	10"	ottima / discreto	relativamente brillante, rotonda, con Ø di ~ 1' gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare visibile a tratti. È più debole e piccola della 1407 situata 12' a NE.
NGC 1401	gx	03h39m22s	−22°43.5'	q 312	Eri	16"	ottima / m. buono	facile, relativamente brillante, molto allungata da NW a SW con dimensioni 90"×30" e un bulge evidente; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 270x.
NGC 1402	gx	03h39m30s	−18°31.6'	q 312	Eri	16"	ottima / mediocre	fa parte del sestetto di NGC 1391 — relativamente compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 1403	gx	03h39m11s	−22°23.3'	q 312	Eri	16"	ottima / m. buono	piccola galassia rotonda relativamente compatta e con Ø di una 30-ina di secondi (pari cioè alla distanza delle 2 stelline brillanti situate 4' a N); presenta una tenue condensazione centrale visibile a momenti — 270x.
NGC 1404	gx	03h38m52s	−35°35.6'	q 355	Eri	10"	ottima / buono	è di aspetto simile a NGC 1399 dalla quale dista una decina di primi a SSE, ma è un po' più piccola, sempre rotonda e con Ø di 3' abbastanza brillante e con Ø inferiore a 1'; c'è una stella brillante a 2.5' verso SSE.
NGC 1405	gx	03h40m19s	−15°31.9'	q 267	Eri	16"	buona / ballerino	elusiva! È un debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo che appare solo a tratti in visione distolta tra 2 stelline molto deboli distanti 4' in direzione NW-SE; è poco più spostata verso quella a SE; solo a tratti appare molto allungata da N a S per circa metà della distanza tra queste 2 stelline — 188x.
NGC 1406	gx	03h39m23s	−31°19.3'	q 355	For	10"	ottima / m. buono	a 118x appare come una lama di luce molto debole e uniforme orientata da N a S ed estesa 3'; meno interessante a 178x.
NGC 1407	gx	03h40m12s	−18°34.8'	q 312	Eri	16"	ottima / discreto	brillante, rotonda con Ø di 3', diffusa e con alto gradiente di luce; presenta un nucleo marcato di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 1409	gx	03h41m10s	−01°19.1'	q 222	Tau	16"	ottima / m. buono	a prima vista appare un'unica galassia di forma piuttosto irregolare immersa in un alone estesa ~ 45"; in visione distolta si nota, seppur a tratti, la 1409 come una macchia leggermente ovale, di dimensioni 40"×30" e orientata da E a W, mentre la 1410 appare come una stellina sfocata, ma col centro puntiforme, situata a ridosso verso NE della principale; si possono comunque separare solo a 380x.
NGC 1410	gx	03h41m11s	−01°17.9'	q 222	Tau	16"	ottima / m. buono	v. **NGC 1409**
NGC 1413	gx	03h40m11s	−15°36.6'	q 222	Eri	16"	buona / ballerino	piccola, compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso W — 270x.
NGC 1414	gx	03h40m57s	−21°42.8'	q 312	Eri	16"	ottima / m. buono	è un debolissimo fuso di 60"×20" orientata da N a S con centrale visibile solo a tratti; è situata in un campo depleto — 270x.
NGC 1415	gx	03h40m57s	−22°33.9'	q 312	Eri	10"	ottima / buono	diffusa, orientata da NW a SE con dimensioni poco superiori a 2'×1' e alto gradiente di luce.
NGC 1416	gx	03h41m03s	−22°43.1'	q 312	Eri	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; è situata a N di un piccolo triangolo rettangolo di stelle brillanti coi cateti di 4' e 2'; c'è una debole stellina a 1' SE della gx — 270x.
NGC 1417	gx	03h41m57s	−04°42.3'	q 222	Eri	16"	m. buona / discreto	allungata da N a S, diffusa e di dimensioni ~ 2'×1'; presenta alto gradiente di luce e nucleo di aspetto quasi stellare; c'è una stellina brillante a SW (già precedentemente osservata nel 10") — 270x.
NGC 1418	gx	03h42m16s	−04°43.8'	q 222	Eri	16"	m. buona / discreto	più debole di NGC 1417, diffusa e di luminosità uniforme; è poco allungata da N a S con di dimensioni 50"×40" (già precedentemente osservata, seppur molto debolmente, nel 10" a 178x) — 270x.
NGC 1420	ss	03h42m42s	−05°51.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	è una tripletta serrata posta a guisa di minuscolo triangolo rettangolo; le due stelline dell'ipotenusa sono poco più evidenti della terza — 450x.
NGC 1421	gx	03h42m29s	−13°29.4'	q 267	Eri	16"	ottima / discreto	molto allungata da N a S con dimensioni 3'×45", di luminosità pressoché uniforme e poco diffusa ai bordi — 270x.
NGC 1422	gx	03h41m31s	−21°40.8'	q 312	Eri	16"	ottima / m. buono	è molto debole e diffusa, molto allungata da ENE a WSW per un paio di primi e di luminosità abbastanza uniforme; è molto difficile da trovare perché situata in un campo depleto a 8' ENE dalla 1414 — 270x.
NGC 1423	gx	03h42m40s	−06°22.9'	q 267	Eri	16"	buona / ballerino	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, allungata grosso modo da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 1424	gx	03h43m14s	−04°43.8'	q 222	Eri	24"	m. buona / mediocre	molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30", con piccola e tenue condensazione centrale diffusa; a tratti appare di luminosità un poco irregolare; meglio contrastata scalando a 340x (già elusivamente visibile a 178x nel 10").
NGC 1426	gx	03h42m49s	−22°06.5'	q 312	Eri	10"	ottima / buono	diffusa, orientata da E a W con dimensioni 2'×1' e nucleo molto brillante; si tratta nel complesso di oggetto abbastanza facile a 178x.
NGC 1427	gx	03h42m20s	−35°23.6'	q 356	For	10"	buona / buono	molto debole, meglio visibile in visione indiretta a 118x (a 178x tende a stemperarsi quasi totalmente sul fondo cielo); poco allungata da E a W con dimensioni 2'×1.5'; c'è una debole stellina a ridosso verso W.
NGC 1431	gx	03h44m41s	+02°50.1'	q 222	Tau	16"	ottima / buono	molto debole, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è visibile abbastanza facilmente in visione distolta — 270x.
NGC 1434	gx	03h46m13s	−09°41.0'	q 222	Eri	24"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale poco contrastata sul disco (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 1438	gx	03h45m17s	−23°00.1'	q 312	Eri	16"	ottima / discreto	relativamente facile e compatta, ma con gradiente di luce molto basso, allungata da ENE a WSW con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso E — 270x.
NGC 1439	gx	03h44m50s	−21°55.2'	q 312	Eri	16"	ottima / discreto	presenta un bulge abbastanza brillante e un nucleo stellare circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di ~ 2.5' — 270x.
NGC 1440	gx	03h45m03s	−18°16.0'	q 312	Eri	10"	ottima / discreto	è un piccolo ovale orientata da NE a SW, di dimensioni 1.5'×1', compatto e con condensazione centrale visibile.
NGC 1441	gx	03h45m43s	−04°05.5'	q 222	Eri	16"	m. buona / discreto	allungata da E a W, con dimensioni 70"×35" e di aspetto molto regolare; ha un bulge diffuso e contrastato sul disco (già debolmente visibile a 178x nel 10" assieme alle più difficili NGC 1449 ed NGC 1451; l'unica a mostrare una condensazione centrale molto tenue) — 270x.
NGC 1444	aa	03h49m27s	+52°39.3'	q 39	Per	10"	buona / scarso	molto povero, piccolo e disperso (ma sarà quello?); oltre a una stella brillante che è doppia si notano 4 stelline allineate in direzione NW-SE più una a perpendicolo verso SE.
NGC 1445	gx	03h44m56s	−09°51.3'	q 267	Eri	16"	buona / ottimo	debole, ma abbastanza definita ai bordi, rotonda con di 45" e di luminosità pressoché uniforme; a 380x appare una stellina a ~ 1' NE.
NGC 1447	gx	03h45m47s	−09°01.1'	q 267	Eri	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, con nucleo puntiforme, estesa ~ 40"; ho dovuto spingere a 380x per smorzare la luce della brillante stella di 8ª situata 2.5' a E — 270x.
NGC 1449	gx	03h46m03s	−04°08.2'	q 222	Eri	16"	m. buona / discreto	poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare abbastanza pronunciato — 270x.
NGC 1450	gx	03h45m36s	−09°14.0'	q 267	Eri	24"	ottima / ottimo	diffusa, con basso gradiente di luce, rotonda con Ø <40"; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW — 450x.
NGC 1451	gx	03h46m07s	−04°04.1'	q 222	Eri	16"	m. buona / discreto	piccola, relativamente compatta, rotonda, di 30" di Ø e con nucleo stellare visibile a 270x.
NGC 1452	gx	03h45m22s	−18°38.0'	q 321	Eri	10"	ottima / discreto	piccola e poco contrastata, di dimensioni 60"×45", orientata ~ da NW a SE e con evidente condensazione centrale.
NGC 1453	gx	03h46m27s	−03°58.2'	q 222	Eri	16"	m. buona / discreto	leggermente allungata da NE a SW, di dimensioni 70"×60", con alto gradiente di luce e bulge diffuso ben contrastato sul disco — 270x.
NGC 1459	gx	03h46m58s	−25°31.3'	q 312	For	16"	ottima / m. buono	debole lucore diffuso e luminosità uniforme orientato da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina appena percettibile a 30" dal bordo meridionale — 270x.
NGC 1461	gx	03h48m27s	−16°23.6'	q 267	Eri	16"	ottima / ottimo	presenta un bulge ben evidente con nucleo quasi stellare circonfuso da un alone diffuso, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 2'×40" — 380x.
NGC 1462	gx	03h50m23s	+06°58.4'	q 177	Tau	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a 1' NNE; una coppia di stelline si trova a 1.5' NW — 450x.
NGC 1464	gx	03h51m24s	−15°24.1'	q 267	Eri	16"	buona / ottimo	abbastanza facile, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con evidente condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 1465	gx	03h53m32s	+32°29.5'	q 95	Per	16"	buona / ottimo	relativamente compatta, presenta un nucleo stellare, marcato e un alone allungata da N a S di dimensioni 40"×20" — 380x.
NGC 1467	gx	03h51m53s	−08°50.3'	q 267	Eri	24"	buona / m. buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge abbastanza evidente (seppur elusivamente era visibile anche nel 10" durante una serata con ottimi trasparenza e seeing) — 400x.
NGC 1468	gx	03h52m13s	−06°20.9'	q 267	Eri	16"	buona / ballerino	allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; presenta bulge estesa e nucleo stellare osservabile anche in visione diretta; c'è una stellina quasi a ridosso verso E (una stella doppia con componenti brillanti e distanti 1' si trova ~ 3' verso S) — 270x.
NGC 1469	gx	04h00m27s	+68°34.7'	q 18	Cam	16"	m. buona / mediocre	brillante, con alto gradiente di luce allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente quasi stellare; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso E — 270x
NGC 1470	gx	03h52m10s	−09°00.0'	q 267	Eri	24"	buona / m. buono	molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15", poco diffusa e di luminosità uniforme (seppur elusivamente era visibile anche nel 10" durante una serata con ottimi trasparenza e seeing) — 400x.
NGC 1472	gx	03h53m47s	−08°34.1'	q 267	Eri	16"	m. buona / scarso	fa parte, assieme a NGC 1477 ed NGC 1478, di un terzetto di galassiette appena percettibili — questa è la più facile, presenta un nucleo stellare circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø max 45" — 188x.
NGC 1477	gx	03h54m03s	−08°34.5'	q 267	Eri	16"	m. buona / scarso	fa parte, assieme a NGC 1472 ed NGC 1478, di un terzetto di galassiette appena percettibili — di aspetto e Ø simili a NGC 1472, ma di luminosità più uniforme — 188x.
NGC 1478	gx	03h54m07s	−08°33.3'	q 267	Eri	16"	m. buona / scarso	è la componente più debole del terzetto di NGC 1472 — in visione distolta appare a tratti orientata ~ da N a S con dimensioni 40"×20" — 188x.
NGC 1481	gx	03h54m29s	−20°25.6'	q 312	Eri	16"	ottima / discreto	è una debole galassietta rotonda di luminosità uniforme, relativamente compatto con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 1482	gx	03h54m39s	−20°30.1'	q 312	Eri	16"	ottima / discreto	chiazza d'aspetto un po' irregolare, poco allungata da E a W, dimensioni 1.5'×1' con una sorta di cordolo poco più brillante che corre verso l'interno; la gx è in parte disturbata da 2 stelle brillanti distanti 3' e situate a N — 270x.
NGC 1485	gx	04h05m04s	+70°59.8'	q 18	Cam	24"	m. buona / m. buono	bella, poco diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S, di dimensioni 2'×30" e con bulge poco contrastato; c'è una stellina all'interno verso la parte meridionale della gx — 450x
NGC 1486	gx	03h56m19s	−21°49.3'	q 312	Eri	16"	ottima / discreto	molto debole, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 1488	gx	03h58m12s	+18°35.1'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 495x.
NGC 1489	gx	03h57m38s	−19°12.9'	q 267	Eri	16"	m. buona / discreto	è una debole chiazza diffusa e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da N a S e di dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 1491	neb	04h03m36s	+51°18.0'	q 94	Per	10"	buona / buono	debole lucore a forma di triangolo rettangolo, con una netta demarcazione all'ipotenusa; c'è una stellina verso il vertice rettangolo.
NGC 1496	aa	04h04m32s	+52°39.7'	q 39	Per	6"	buona / buono	molto piccolo, rotondeggiante; a 90x appaiono le 5 o 6 stelle più brillanti su un fondo lattiginoso.
NGC 1497	gx	04h02m07s	+23°08.0'	q 133	Tau	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30", con bulge contrastato e nucleo stellare; ci sono 2 stelline abbastanza brillanti: una a 1' SE e l'altra poco più distante e luminosa a SE — 495x.
NGC 1499	neb	04h00m28s	+36°33.0'	q 95	Per	6"	m. buona / buono	**Nebulosa California** — con l'oculare da 24.5 (22x con 3° di campo) e il filtro H-Beta è un oggetto relativamente facile, ricco di esili sfumature e piccole differenze di contrasto che si notano lungo i bordi, specialmente nella parte a NE. Stranamente non è osservabile con l'O III, mentre con l'H Beta si riesce a intravvedere a occhio nudo!
NGC 1501	np	04h07m00s	+60°55.2'	q 39	Cam	16"	ottima / ottimo	è rotonda con Ø di 1' scarso, ha i bordi definiti ed è finemente screziata; una zona circolare più scura circonda la stellina centrale facilmente visibile a 380x.
NGC 1502	aa	04h07m50s	+62°19.9'	q 18	Cas	6"	m. buona / m. buono	oggetto facile e disperso, di forma irregolare e con poche stelle brillanti — 56x.
NGC 1504	gx	04h02m29s	−09°20.1'	q 268	Eri	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; fa parte di un gruppo diradato assieme alla successiva — 450x.
NGC 1505	gx	04h02m36s	−09°19.3'	q 268	Eri	24"	m. buona / discreto	molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e con piccola condensazione centrale ben evidente; c'è una stellina a 1' SE; un'altra stellina appena percettibile appare a tratti più o meno alla stessa distanza verso, ma da un controllo effettuato in seguito è risultata essere la **PGC 992440** — 450x.
NGC 1507	gx	04h04m27s	−02°11.3'	q 223	Eri	10"	ottima / buono	molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni 3'×45" (è posta praticamente di taglio) e di luminosità uniforme; meglio evidente in visione distolta a 125x.
NGC 1508	gx	04h05m48s	+25°24.5'	q 133	Tau	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso verso W; forma un triangolo equilatero perfetto con 2 stelle brillanti situate a NE e SE (era osservabile molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 1509	gx	04h03m55s	−11°10.7'	q 268	Eri	16"	m. buona / mediocre	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 270x.
NGC 1513	aa	04h09m55s	+49°31.0'	q 64	Per	6"	discreta / buono	molto debole, poche stelline si staccano dal fondo cielo a 30x.
NGC 1514	np	04h09m17s	+30°46.6'	q 95	Tau	16"	m. buona / m. buono	è un diffuso alone rotondo con Ø di un paio di primi, di aspetto molto regolare e leggermente screziato che circonda una stella brillante; il contrasto sul fondo cielo aumenta sensibilmente a 270x con l'O III.
NGC 1516A	gx	04h08m07s	−08°49.7'	q 268	Eri	16"	m. buona / mediocre	assieme a NGC 1516B forma una coppia molto serrata le cui componenti si sdoppiano solo a momenti a 270x in due piccole chiazze rotonde con Ø di una 30-ina di secondi; la 2ª, ossia quella più a S, è poco più evidente.
NGC 1516B	gx	04h08m08s	−08°50.1'	q 268	Eri	16"	m. buona / mediocre	v. **NGC 1516A**
NGC 1517	gx	04h09m12s	+08°38.9'	q 178	Tau	16"	ottima / scarso	rotonda, diffusa, con Ø di ~ 45", con basso gradiente di luce; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SE — 188x.
NGC 1518	gx	04h06m49s	−21°10.6'	q 313	Eri	10"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 3'×1'; c'è una stella brillante a 2.5' SW; più interessante scalando a 118x.
NGC 1519	gx	04h08m07s	−17°11.5'	q 313	Eri	16"	m. buona / mediocre	è un fuso molto debole con bulge appena più evidente, orientata all'incirca da E a W ed estesa per almeno un paio di primi; c'è una stellina brillante verso il margine occidentale — 270x.
NGC 1521	gx	04h08m19s	−21°03.1'	q 313	Eri	10"	ottima / m. buono	debole, diffusa e poco più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 2'×1'; a 178x non sembra disturbata dalla SAO 169161 di 9ª grandezza situata ~ 5' a S.
NGC 1528	aa	04h15m19s	+51°12.7'	q 39	Per	6"	discreta / buono	facile, già visibile nel cercatore 6x30, rotondeggiante con Ø > 15'; si contano alcune decine di stelle a 30x.
NGC 1530	gx	04h23m27s	+75°17.8'	q 5	Cam	16"	discreta / mediocre	alquanto allungata da N a S, di dimensioni 3'×1.5', molto diffusa e con un'evidente condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 132x.
NGC 1531	gx	04h11m59s	−32°51.0'	q 356	Eri	16"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; è situata a ridosso NW di NGC 1532 — 270x.
NGC 1532	gx	04h12m02s	−32°53.3'	q 356	Eri	16"	m. buona / m. buono	facile, estesa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 6'×1', con bulge diffuso, ben evidente abbastanza contrastato sul disco ed esteso un paio di primi; minute stelline visibili a tratti si sovrappongono alla galassia — 270x.
NGC 1535	np	04h14m16s	−12°44.3'	q 268	Eri	16"	ottima / m. buono	è una bella planetaria brillante, perfettamente rotonda con Ø di ~ 1'; a 380x appare finemente screziata e di una tonalità azzurra. Sembra disegnata a isofote: la stellina centrale è circondata da un primo alone esteso una 30-ina di secondi e quindi da un secondo più debole; non c'è transizione di luce tra i 2.
NGC 1537	gx	04h13m41s	−31°38.8'	q 356	Eri	16"	m. buona / m. buono	bella, brillante, orientata da E a W con dimensioni 2'×1.5'; presenta un bulge evidente, diffuso e un nucleo stellare — 270x.
NGC 1538	gx	04h14m36s	−13°10.5'	q 268	Eri	16"	m. buona / mediocre	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 1539	gx	04h19m02s	+26°49.6'	q 133	Tau	10"	buona / discreto	molto debole, di forma indistinta, con dimensioni di Ø 1'; ci sono 3 stelline equidistanti quasi allineate e della stessa luminosità ~ 3' verso E.
NGC 1540	gx	04h15m10s	−28°28.8'	q 356	Eri	16"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **NGC 1540A** situata a ridosso verso S, ma si separano solo a tratti a 270x (a 380x tendono a impastarsi); la 1ª sembra più facile, mentre la 2ª è molto più diffusa; ogni tanto appare qualcosa di stellare, ma non riesco a capire se è il nucleo di una delle 2 o una debolissima stellina sovrapposta.
NGC 1540A	gx	04h15m10s	−28°29.3'	q 356	Eri	16"	m. buona / m. buono	v. **NGC 1540**
NGC 1541	gx	04h17m00s	+00°50.1'	q 223	Tau	16"	buona / ottimo	piccola, debole e diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo di aspetto stellare — 188x.
NGC 1542	gx	04h17m14s	+04°46.9'	q 223	Tau	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno; in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso NE — 188x.
NGC 1544	gx	05h02m33s	+86°13.3'	q 1	Cep	16"	buona / scarso	appare come "binucleata", di dimensioni 60"×30" e orientata grosso modo da N a S; è situata all'interno di un piccolo asterismo di forma triangolare formato da 4 stelle (in realtà il "doppio nucleo" è dovuto a una coppia serrata di stelline di 15-esima a ridosso verso N che probabilmente a causa del seeing non sono riuscito a risolvere) — 188x.
NGC 1545	aa	04h20m57s	+50°15.3'	q 39	Per	10"	buona / buono	disperso, a forma di pentagono irregolare; una coppia di stelline brillanti abbastanza ravvicinata si trova proprio nel mezzo.
NGC 1547	gx	04h17m12s	−17°51.4'		Eri	24"	buona / mediocre	debole e diffusa, leggermente screziata a 340x, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina brillante a 1' verso NE (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 1548	aa	04h21m20s	+36°55.0'	q 96	Per	10"	buona / discreto	gruppo esteso molto povero e disperso nel quale si contano sì e no una decina di stelle sparse su un'area estesa una 20-ina di primi.
NGC 1550	gx	04h19m38s	+02°24.6'	q 223	Tau	16"	buona / ottimo	rotonda con Ø di ~ 1', molto debole diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo molto luminoso; c'è una doppia serrata molto debole a ~ 1.5' verso S — 188x.
NGC 1552	gx	04h20m18s	−00°41.5'	q 223	Eri	16"	buona / ottimo	presenta un nucleo piccolo e brillante circonfuso da un tenue alone facilmente visibile in visione distolta, rotondo con Ø di ~ 1' — 188x.
NGC 1554	neb	04h21m57s	+19°32.0'	q 133	Tau	28"	buona / ottimo	**Hind Variable Nebula** — è uno spesso arco molto debole, esteso oltre 1' e orientato da N a S, situato a ridosso di una stella brillante di 9ª grandezza che disturba un poco l'osservazione (altresì denominata **NGC 1555**) — 495x.
NGC 1560	gx	04h32m49s	+71°53.0'	q 19	Cam	16"	discreta / mediocre	debole, diffusa, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni che in visione distolta arrivano a 6'×1' e di luminosità pressoché uniforme; è praticamente delimitata da 3 deboli stelline allineate lungo l'asse maggiore della gx; una stellina brillante subito a SE è probabilmente esterna — 188x.
NGC 1561	gx	04h23m01s	−15°50.7'	q 268	Eri	16"	m. buona / scarso	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; è disturbata dalla luce di una stellina brillante situata un paio di primi SW — 188x.
NGC 1562	gx	04h21m48s	−15°45.3'	q 268	Eri	16"	m. buona / scarso	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, forse rotonda con Ø di ~ 40" — 188x.
NGC 1563	gx	04h22m54s	−15°44.0'	q 91	Eri	16"	m. buona / scarso	assieme alla successiva forma una coppia di debolissime galassie, piccole e diffuse, estese max 30" e distanti meno di 2' in direzione E-W; la seconda delle due è poco più evidente — 188x.
NGC 1564	gx	04h23m01s	−15°44.3'	q 268	Eri	16"	m. buona / scarso	v. **NGC 1563**
NGC 1565	gx	04h23m23s	−15°44.6'	q 268	Eri	16"	m. buona / scarso	debole lucore molto stemperato sul fondo cielo e approssim. rotondo con Ø di ~ 1'; appare solo in visione distolta a poco più di 1' SE di una stellina — 188x.
NGC 1568	gx	04h24m25s	−00°44.8'	q 223	Eri	24"	m. buona / m. buono	diffusa, orientata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno; il bulge è piccolo e contrastato sul disco (era facilmente osservabile anche nel 16" a 188x) — 450x.
NGC 1569	gx	04h30m50s	+64°51.0'	q 19	Cam	16"	ottima / ottimo	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×45", con bulge diffuso ed evidente, ma poco decentrato verso NW; c'è una stellina al bordo SE e un'altra brillante subito a N — 380x.
NGC 1573	gx	04h35m04s	+73°15.7'	q 5	Cam	16"	ottima / ottimo	è una bella gx ovale abbastanza brillante, con alto gradiente di luce, orientata da NW a SW e di dimensioni 60"×40" — 380x.
NGC 1576	gx	04h26m19s	−03°37.2'	q 223	Eri	16"	buona / ottimo	rotonda con Ø inferiore a 1', poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; è situata tra due stelline orientate da NW a SE e distanti un paio di primi; una doppia con componenti abbastanza brillanti separate da una 30-ina di secondi si trova 5' scarsi a NW — 188x.
NGC 1577	gx	04h26m20s	−10°05.9'	q 268	Eri	16"	m. buona / mediocre	rotonda, diffusa, stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme e con Ø inferiore a 1.5'; c'è una stellina brillante un paio di primi a S — 270x.
NGC 1579	neb	04h30m07s	+35°17.0'	q 96	Per	16"	m. buona / m. buono	è di aspetto irregolare se esaminata attentamente a 132x; la zona principale è grosso modo circolare con Ø di un paio di primi, molto sfumata verso W e più incisa dalla parte opposta; una chiazza rotonda molto debole di 30" o 40" si trova a ridosso verso NE; una coppia di stelline ravvicinate si trova a S: in visione distolta la nebulosità arriva a lambirle; una stella brillante è situata 3' a S e appare immersa in un fondo leggermente lattiginoso; la visione non sembra migliorare gran che col filtro deepsky.
NGC 1580	gx	04h28m19s	−05°10.7'	q 268	Eri	16"	mediocre / m. buono	molto debole e diffusa, stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE; sempre a SE, a 3' di distanza, c'è una stella doppia brillante, con componenti distanti una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 1582	aa	04h31m39s	+43°45.0'	q 65	Per	6"	m. buona / m. buono	gruppo disperso di stelle le più brillanti delle quali sono poste secondo una "S" orientata da E a W.
NGC 1583	gx	04h28m21s	−17°35.7'	q 313	Eri	16"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE; sempre a SE, a 3' di distanza, c'è una stella doppia brillante, con componenti distanti una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 1584	gx	04h28m10s	−17°31.4'	q 313	Eri	16"	m. buona / discreto	molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e presenta un nucleo stellare — 270x.
NGC 1586	gx	04h30m38s	−00°18.2'	q 223	Eri	16"	buona / ottimo	molto debole, con basso gradiente di luce e un nucleo molto tenue; la galassia è orientata da N a S con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 188x.
NGC 1587	gx	04h30m40s	+00°39.7'	q 223	Tau	16"	buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette distanti ~ 1' in direzione E-W; la 1ª è rotonda con Ø di 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; la 2ª è molto piccola, con un nucleo di aspetto stellare; osservata in visione diretta a bassi ingrandimenti potrebbe di fatto apparire come una stellina debolmente sfuocata — 188x.
NGC 1588	gx	04h30m44s	+00°39.9'	q 223	Tau	16"	buona / ottimo	v. **NGC 1587**
NGC 1589	gx	04h30m45s	+00°51.8'	q 223	Tau	16"	buona / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 2'×45" e con nucleo molto luminoso di aspetto quasi stellare; c'è una stellina brillante a meno di 1' verso E; un'altra stellina appena percettibile si trova subito a SW — 188x.
NGC 1590	gx	04h31m10s	+07°37.8'	q 178	Tau	16"	ottima / scarso	debole,circolare, abbastanza compatta, Ø 40", con lievi discrepanze di luce all'interno — 188x.
NGC 1591	gx	04h29m31s	−26°42.8'	q 313	Tau	16"	m. buona / discreto	debole, diffusa, poso più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina situata a 1' verso W — 270x.
NGC 1594	gx	04h30m52s	−05°47.9'	q 268	Eri	16"	mediocre / m. buono	debole, circolare con Ø di una 40-ina di secondi, relativamente compatta e con lievi discrepanze di luce all'interno — 270x.
NGC 1597	gx	04h31m13s	−11°17.4'	q 268	Eri	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
NGC 1599	gx	04h31m39s	−04°35.3'	q 223	Eri	16"	buona / ottimo	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata 1' W di una stellina brillante — 188x.
NGC 1600	gx	04h31m40s	−05°05.2'	q 268	Eri	24"	m. buona / buono	gx con alto gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 2'×1.5', diffusa e leggermente screziata all'interno a 400x. La gx era stata precedentemente osservata anche con il 16" e un 10".
NGC 1601	gx	04h31m42s	−05°03.6'	q 268	Eri	16"	buona / ottimo	molto piccola e con condensazione centrale di aspetto stellare, tanto che a bassi ingrandimenti appare come una stellina sfuocata; si trova quasi a ridosso verso N della 1600 — 188x.
NGC 1603	gx	04h31m50s	−05°05.6'	q 268	Eri	16"	buona / ottimo	molto debole e molto diffusa, presenta un piccolo nucleo che risalta a fatica in visione distolta a 188x; è situata 2.5' W della 1600 — 188x.
NGC 1604	gx	04h31m58s	−05°22.2'	q 268	Eri	16"	ottima / m. buono	approssim. circolare, diffusa, con un piccolo nucleo stellare abbastanza evidente; si vede una piccola zona centrale più brillante allungata da N a S: che si tratti di una barrata? — 380x.
NGC 1605	aa	04h34m53s	+45°16.3'	q 65	Per	10"	ottima / m. buono	relativamente compatto ed estremamente debole; appare una lievissima granulazione solo in visione distolta a 188x.
NGC 1606	gx	04h32m03s	−05°01.9'		Eri	24"	m. buona / buono	piccola, debolissima e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso NNW; doppia stretta un paio di primi a ENE (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 1607	gx	04h32m03s	−04°27.6'	q 224	Eri	16"	buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; disturbata dalla SAO 131272 di 8ª grandezza situata 5' scarsi più a N — 188x.
NGC 1608	gx	04h32m06s	+00°34.0'	q 223	Tau	16"	buona / ottimo	molto debole, ma con nucleo relativamente brillante, solo a momenti appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 60"×30"; c'è stellina abbastanza brillante a poco più di 1' verso N — 188x.
NGC 1609	gx	04h32m45s	−04°22.3'	q 224	Eri	16"	buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a poco più di 30" verso NW — 188x.
NGC 1610	gx	04h34m14s	−04°42.0'	q 224	Eri	16"	buona / ottimo	elusiva, s'intravede a tratti in visione distolta a 188x quasi nel mezzo di due stelline brillanti (di fatto un poco spostata verso W) orientate da N a S; quella a S è la SAO 131319 di 9ª grandezza — 188x.
NGC 1611	gx	04h33m06s	−04°17.9'	q 224	Eri	16"	buona / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con basso gradiente di luce e molto diffusa — 188x.
NGC 1612	gx	04h33m13s	−04°10.3'	q 224	Eri	16"	buona / ottimo	debole, molto diffusa, circolare con Ø di 1' scarso e di luminosità pressoché uniforme, salvo un piccolo nucleo di aspetto stellare che è tuttavia visibile solo a momenti a 188x.
NGC 1613	gx	04h33m25s	−04°16.0'	q 224	Eri	16"	buona / ottimo	più piccola di NGC 1612 e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un piccolo nucleo visibile con facilità; è equidistante con 2 stelline situate a E — 188x.
NGC 1614	gx	04h33m59s	−08°35.2'	q 269	Eri	16"	m. buona / scarso	facilmente osservabile, ma di aspetto un po' irregolare, grosso modo allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale di aspetto stellare — 188x.
NGC 1615	gx	04h36m02s	+19°57.1'	q 134	Tau	16"	ottima / ottimo	allungata da E a W con dimensioni 45"×30", poco diffusa e con nucleo stellare evidente a 380x.
NGC 1618	gx	04h36m06s	−03°09.1'	q 224	Eri	16'	ottima / m. buono	forma, assieme a NGC 1622 ed NGC 1625, un celebre terzetto situato a ridosso della m Eri e già osservato precedentemente col 10" a 178x — orientata da NE a SW, di dimensioni 100"×45" e con bulge molto diffuso appena più brillante del disco; meglio contrastata a 270x.
NGC 1620	gx	04h36m37s	−00°08.6'	q 224	Eri	16"	buona / buono	debole, leggermente screziata, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 2.5'× 45"; c'è una debole stellina al bordo NNE; non sembra disturbata dalla SAO 131350 di 10ª grandezza situata 5' scarsi a ENE — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1621	gx	04h36m25s	−04°59.3'	q 224	Eri	16"	ottima / m. buono	relativamente facile; è un ovale orientata da E a W, dimensioni 60"×30", diffusa ai bordi e con una marcata condensazione centrale — 380x.
NGC 1622	gx	04h36m36s	−03°11.3'	q 224	Eri	16'	ottima / m. buono	è orientata come NGC 1618, ma molto più allungata; ha dimensioni 2'×40", diffusa e con nucleo stellare — 380x.
NGC 1623	gx	04h35m33s	−13°33.4'	q 269	Eri	16"	m. buona / scarso	galassietta piccola ed elusiva, appare solo a tratti in visione distolta fissando la stellina situata 1.5' SE (forse con un seeing migliore, e potendo quindi ingrandire, sarebbe più facile!) — 188x.
NGC 1624	aa	04h40m37s	+50°27.7'	q 40	Per	24"	m. buona / m. buono	è un piccolo gruppo molto povero formato da 4 stelline foggiate a "Y" orientata da E a W; la componente centrale è una doppia stretta e molto sbilanciata; altre due stelline molto deboli si trovano verso W; in visione distolta il piccolo ammasso appare chiaramente immerso in una chiazza lattescente grosso modo circolare con Ø di ~ 3': questa è effettivamente la Sh2-212 — 340x.
NGC 1625	gx	04h37m06s	−03°18.2'	q 224	Eri	16'	ottima / m. buono	è un bel fuso orientata da NW a SE estesa 2.5' e spesso una 30-ina di secondi, con piccola condensazione centrale; c'è una stellina all'estremità NW — 380x.
NGC 1627	gx	04h37m38s	−04°53.2'	q 224	Eri	16"	buona / buono	è una tenuissima bolla circolare con Ø di oltre 1' e di luminosità uniforme; si trova al vertice rettangolo di un triangolo formato con 2 stelline brillanti situate a S e a E — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1628	gx	04h37m36s	−04°42.9'	q 224	Eri	16"	buona / buono	è una debole lama di luce di luminosità uniforme orientata da N a S ed estesa per 1.5' — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1630	gx	04h37m15s	−18°54.1'	q 314	Eri	16"	m. buona / discreto	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta, rotondeggiante con Ø di una 40-ina di secondi; bisogna fissare lo sguardo su una stellina molto debole situata un paio di primi a S — 270x.
NGC 1631	gx	04h38m24s	−20°38.9'	q 314	Eri	16"	m. buona / discreto	debole, di aspetto un po' irregolare e luminosità pressoché uniforme, facilmente visibile in visione distolta ed estesa ~ 1'; c'è una debole stellina a un paio di primi verso W — 270x.
NGC 1632	gx	04h39m58s	−09°27.4'	q 269	Eri	16"	m. buona / scarso	piccola galassia rotonda molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e osservabile senza difficoltà in visione distolta a 188x.
NGC 1633	gx	04h40m09s	+07°21.0'	q 179	Tau	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso S — molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
NGC 1634	gx	04h40m10s	+07°20.3'	q 179	Tau	24"	ottima / buono	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con evidente nucleo stellare; una coppia molto serrata e irrisolta di deboli stelline situata a ridosso W della coppia dà l'impressione di un piccolo oggetto allungato da NW a SE — 450x.
NGC 1635	gx	04h40m08s	−00°32.8'	q 224	Eri	10"	ottima / buono	molto debole, pressoché circolare con Ø di 1', poco diffusa e con gradiente di luce molto basso; c'è una coppia di stelle molto deboli quasi a ridosso verso NW.
NGC 1636	gx	04h40m40s	−08°36.5'	q 269	Eri	16"	m. buona / scarso	diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina poco oltre il bordo meridionale — 188x.
NGC 1637	gx	04h41m28s	−02°51.4'	q 224	Eri	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di 3' scarsi; presenta un piccolo nucleo quasi stellare abbastanza contrastato con una tenue svirgola che a tratti si diparte verso S; verso N arriva quasi a lambire una stellina di 13-esima; circa a metà strada tra questa e il nucleo si nota, seppure a momenti, una sorta di gap (verosimilmente una lacuna nel sistema di bracci che riempie il disco di aspetto altrimenti uniforme); una stellina molto debole si trova all'estremità NW; meglio contrastata scalando a 340x (nel Comet Tracker da 6" era visibile solo come una debole chiazza uniforme, rotondeggiante ed estesa un paio di primi).
NGC 1638	gx	04h41m36s	−01°48.5'	q 224	Eri	16"	ottima / scarso	è un ovale orientata da ENE a WSW, di dimensioni 90"×60", con bulge piccolo ed evidente e nucleo stellare; c'è una debolissima stellina, o un nodulo, a ridosso verso W — 270x.
NGC 1640	gx	04h42m14s	−20°26.1'	q 314	Eri	10"	ottima / discreto	piccola, debole, rotonda con Ø di 1' scarso; forma un triangolo equilatero con 2 stelline di 12-esima.
NGC 1642	gx	04h42m55s	+00°37.1'	q 224	Tau	16"	ottima / scarso	rotonda, poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno con Ø > 1'; c'è una coppia di stelline allineate da N a S: una a E e l'altra a SE (era debolmente visibile anche nel 10" a 178x) — 270x.
NGC 1643	gx	04h43m44s	−05°19.1'	q 269	Eri	16"	ottima / m. buono	relativamente brillante, ma di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 40"×30", poco diffusa — 380x.
NGC 1645	gx	04h44m06s	−05°28.0'	q 269	Eri	16"	ottima / m. buono	poco più evidente, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare — 380x.
NGC 1646	gx	04h44m23s	−08°31.9'	q 269	Eri	16"	m. buona / scarso	è di aspetto un po' irregolare; presenta un bulge brillante e un disco allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina a ridosso verso S e un'altra a poco più di 1' NE — 188x.
NGC 1647	aa	04h45m54s	+19°08.0'	q 134	Tau	6"	buona / buono	facile, già visibile nel cercatore 6x30; è abbastanza ricco ed esteso una 30-ina di primi.
NGC 1648	gx	04h44m35s	−08°28.7'	q 269	Eri	16"	m. buona / scarso	molto più debole di NGC 1646 situata 4' a SW, ma facilmente visibile; è poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e presenta un piccolo nucleo stellare. Entrambe le gx sono disturbate dalla luce di una stella brillante di 6ª situata 5' a W — 188x.
NGC 1650	gx	04h45m11s	−15°52.2'	q 269	Eri	24"	ottima / m. buono	è un ovale diffuso e di luminosità pressoché uniforme, orientato da N a S con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
NGC 1653	gx	04h45m47s	−02°23.6'	q 224	Eri	16"	buona / buono	rotonda con Ø di ~ 1', gradatamente più brillante verso l'interno e nucleo evidente quasi stellare marcato; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso W — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1654	gx	04h45m49s	−02°05.0'	q 224	Eri	24"	m. buona / buono	rotonda, diffusa e con basso gradiente di luce e Ø di 45". Precedentemente osservata anche col 16" e appariva distintamente anche nel 10" — 400x.
NGC 1656	gx	04h45m53s	−05°08.2'	q 224	Eri	16"	ottima / m. buono	sembra una spirale, o lenticolare, vista di 3/4, orientata da NW a SE, dimensioni 60"×30", con bulge allungata ; c'è una stellina ben evidente a ridosso verso nord — 380x.
NGC 1657	gx	04h46m07s	−02°04.6'	q 224	Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme pressoché uniforme, allungata da NNA a SSE con dimensioni 60"×30". Precedentemente osservata anche col 16" — 400x.
NGC 1659	gx	04h46m30s	−04°47.3'	q 224	Eri	16"	ottima / scarso	diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×50"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S (già elusivamente visibile nel 10" a 178x) — 270x.
NGC 1661	gx	04h47m08s	−02°03.3'	q 224	Ori	16"	buona / buono	molto debole, approssim. circolare, con Ø una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; è situata subito a N di un piccolo triangolo rettangolo isoscele coi cateti orientati secondo le direzioni cardinali; il cateto E-W ha nel mezzo una debole doppia stretta — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1662	aa	04h48m29s	+10°55.8'	q 179	Ori	24"	ottima / buono	gruppo molto irregolare di una 15-ina di stelle brillanti e molte altre più deboli; una doppia stretta e molto sbilanciata si trova al centro dell'ammasso; le componenti principali sono visibili nel cercatore 12×50 (già osservato a suo tempo con un piccolo riflettore da 6") — 210x.
NGC 1663	aa	04h48m24s	+13°08.2'	q 179	Ori	16"	ottima / buono	è un piccolo gruppo molto disperso e irregolare di una 15-ina di stelle, esteso 7' od 8' e delimitato a S e SW da 2 stelle brillanti distanti 3' che però, forse, non ne fanno parte — 132x.
NGC 1664	aa	04h51m06s	+43°40.6'	q 96	Aur	10"	buona / buono	è un oggetto curioso: sembra un fungo dotato di un gambo sottile (rappresentato da un filare di stelline) e un cappello irregolare, arrotondato verso SW e appuntito in direzione opposta; il gambo termina a ~ 3' NW di una stellina brillante di 7ª grandezza — 63x.
NGC 1665	gx	04h48m17s	−05°25.6'	q 269	Eri	16"	ottima / m. buono	diffusa, allungata da NE a SW, dimensioni 60"×45" con condensazione centrale abbastanza evidente; la zona centrale appare un poco irregolare in luminosità — 380x.
NGC 1666	gx	04h48m33s	−06°34.2'	q 269	Eri	24"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 1', diffusa, con alto gradiente di luce e piccolo nucleo quasi stellare abbastanza contrastato (era già osservabile nel 10" a 178x in buone condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 1667	gx	04h48m37s	−06°19.2'	q 269	Eri	24"	ottima / ottimo	brillante, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, allungata da N a S di dimensioni 80"×60" e con piccolo nucleo poco contrastato abbastanza evidente (osservabile nel 10" a 178x in buone condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 1670	gx	04h49m43s	−02°45.6'	q 224	Ori	16"	buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso verso S — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1677	gx	04h50m52s	−04°53.5'	q 224	Eri	16"	ottima / m. buono	molto allungata da NW a SE, estesa una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 1678	gx	04h51m35s	−02°37.4'	q 224	Ori	24"	ottima / discreto	diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con nucleo quasi stellare ben contrastato; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 450x.
NGC 1681	gx	04h51m50s	−05°48.2'	q 269	Eri	16"	ottima / m. buono	relativamente facile e brillante, ma di aspetto un po' confuso; probabilmente è rotonda, con Ø di ca. 1', con basso gradiente di luce e appena più brillante all'interno — 380x.
NGC 1682	gx	04h52m20s	−03°06.3'	q 224	Ori	16"	buona / buono	assieme a NGC 1684 forma una coppia di gx facili, distanti 3' scarsi in direzione E-W approssim. circolari e con evidente condensazione centrale; la 1ª è relativamente compatta, con Ø di una 30-ina di secondi; la 2ª è più estesa e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 90"×60" — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1683	gx	04h52m17s	−03°01.5'	q 224	Ori	16"	buona / buono	debolissima, appare elusivamente in visione distolta a 5' scarsi N della 1682; si trova all'interno di un piccolo asterismo formato da 5 stelline molto deboli: le tre a N sono allineate da E a W, come le 2 situate a E della galassia — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1684	gx	04h52m31s	−03°06.4'	q 224	Ori	16"	buona / buono	v. **NGC 1682**

NGC 1685	gx	04h52m34s	−02°57.0'	q 224	Ori	16"	buona / buono	debole, con basso gradiente di luce; è allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 60"×30"; una debole stellina è situata proprio al bordo sud-orientale — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1686	gx	04h52m54s	−15°20.8'	q 269	Eri	16"	buona / scarso	è una debolissima lama di luce di luminosità pressoché uniforme, estesa 1.5' in direzione NE-SW che tuttavia appare nella sua interezza solo in visione distolta; c'è una stellina a un paio di primi a E — 188x.
NGC 1690	gx	04h54m17s	+01°40.0'	q 224	Ori	24"	m. buona / discreto	debole e poco diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" (già debolmente osservabile nel 16" in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 1691	gx	04h54m38s	+03°16.1'	q 224	Ori	16"	buona / buono	presenta un nucleo brillante e un tenue alone molto diffuso che a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1692	gx	04h55m24s	−20°34.3'	q 314	For	16"	ottima / m. buono	è una debolissima bolla circolare appena più brillante al centro e con Ø di 45" — 270x.
NGC 1694	gx	04h55m17s	−04°39.2'	q 224	Eri	16"	ottima / m. buono	è un debole ovale orientato da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale; c'è un dell'asterismo di 7 stelle brillanti disposte a … ombrello nello stesso campo dell'oculare (6.7 mm e 18' di campo) e situate a NE — 380x.
NGC 1699	gx	04h57m00s	−04°45.5'	q 224	Eri	16"	m. buona / buono	molto debole, rotondeggiante, con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con poco più brillante all'interno; c'è una stellina a ~ 1' verso NE; disturbata dalla SAO 187494 di 7ª grandezza situata 4' a SW — 188x.
NGC 1700	gx	04h56m56s	−04°51.9'	q 224	Eri	16"	buona / ottimo	appare molto diffusa in visione distolta, poco allungata da E a W, di dimensioni ~ 90"×60", con bulge diffuso e nucleo quasi stellare abbastanza marcato; a 380x la visione migliora nel dettaglio, ma la galassia appare di dimensioni più ridotte.
NGC 1709	gx	04h58m44s	−00°28.7'	q 224	Ori	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NE a SW, dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a 45" verso NW (era osservabile debolmente anche nel 16") — 450x.
NGC 1710	gx	04h57m17s	−15°17.3'	q 269	Lep	16"	mediocre / m. buono	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø < 1'; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso SE — 270x.
NGC 1713	gx	04h58m54s	−00°29.5'	q 224	Ori	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 90"×60"; è grosso modo equidistante da 2 deboli stelline, una a NE e l'altra a SW (era debolmente visibile anche 16") — 450x.
NGC 1716	gx	04h58m13s	−20°21.8'	q 314	Lep	16"	m. buona / discreto	chiazza molto estesa con gradiente di luce molto basso, poco allungata da N a S con dimensioni 90"×60"; c'è una stellina a ~ 3' verso S — 270x.
NGC 1719	gx	04h59m35s	−00°15.6'	q 224	Ori	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e nucleo puntiforme; c'è una stellina al bordo meridionale — 450x.
NGC 1720	gx	04h59m21s	−07°51.5'	q 269	Eri	16"	ottima / buono	diffusa, presenta una zona centrale (probabilmente la barra) di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W e di dimensioni 70"×25" immersa in una tenuissima chiazza lattescente grosso modo circolare di oltre 1' di Ø; è più interessante a 270x.
NGC 1721	gx	04h59m17s	−11°07.1'	q 269	Eri	16"	m. buona / mediocre	fa parte assieme alla 1721 e alla 1728 di un terzetto di galassie brillanti poste ad arco e molto ravvicinate; questa è allungata da NW a SE, con alto gradiente di luce e di dimensioni 60"×30"; presenta un bulge evidente ed esteso — 270x.
NGC 1723	gx	04h59m26s	−10°58.9'	q 269	Eri	16"	m. buona / mediocre	pressoché rotonda con Ø > di 1', coi bordi diffusi e un piccolo bulge di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 1725	gx	04h59m23s	−11°08.0'	q 269	Eri	16"	m. buona / mediocre	rotonda con Ø di ~ 1', basso gradiente di luce e un piccolo bulge che si staglia appena sul disco — 270x.
NGC 1726	gx	04h59m42s	−07°45.4'	q 269	Eri	16"	ottima / buono	brillante, poco diffusa e con alto gradiente di luce; è poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 380x.
NGC 1728	gx	04h59m28s	−11°07.4'	q 269	Eri	16"	m. buona / mediocre	allungata da N a S, di dimensioni 70"×40", poco più brillante all'interno; presenta un bulge evidente estesa lungo l'asse maggiore della gx e un nucleo stellare visibile a momenti — 270x.
NGC 1729	gx	05h00m16s	−03°21.2'	q 224	Ori	16"	m. buona / buono	è un diffuso lucore di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di oltre 1' facilmente visibile in visione distolta a 188x subito a E di una stellina brillante; un'altra stellina poco più debole si trova a ridosso verso N — 188x.
NGC 1730	gx	04h59m32s	−15°49.4'	q 269	Lep	16"	mediocre / m. buono	presenta un bulge evidente circonfuso da un alone molto tenue allungata da E a W con dimensioni 1.5'×1'; a tratti appare un nucleo stellare; forse è un poco più evidente scalando a 188x.
NGC 1738	gx	05h01m47s	−18°09.4'	q 314	Lep	16"	m. buona / discreto	assieme a NGC 1739 forma una coppia di gx che sdoppia facilmente a 270x; la 1ª è più estesa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"40" e condensazione centrale evidente; la 2ª pare, a prima vista, una pendice della prima; è più debole, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con una condensazione centrale visibile solo a tratti.
NGC 1739	gx	05h01m47s	−18°10.0'	q 314	Lep	16"	m. buona / discreto	v. **NGC 1739**
NGC 1740	gx	05h01m55s	−03°17.8'	q 224	Ori	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di 45" e poco più brillante all'interno; c'è una stellina brillante a ridosso verso SW — 188x.
NGC 1741	gx	05h01m39s	−04°15.5'	q 224	Eri	24"	m. buona / buono	fa parte del piccolo quartetto serrato denominato Hickson 31 (di cui sono però riuscito a osservare solo tre componenti) — molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 30"×15"; a 340x tende ancora a impastarsi con la Hickson 31C, la quale, a prima vista, sembra un nodulo luminoso della prima; a 450x appare invece una galassietta a sé stante, molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×15"; infine, la Hickson 31B è una piccola lama di luce molto tenue, orientata anch'essa da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi; un nucleo stellare appare abbastanza facilmente a 450x; il terzetto è un po' disturbato da una stellina brillante di 12-esima situata 1' a SE.
NGC 1744	gx	04h59m58s	−26°01.3'	q 314	Lep	10"	ottima / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, allungata da N a S con dimensioni 4'×2' e di luminosità uniforme.
NGC 1746	aa	05h03m36s	+23°49.0'	q 135	Tau	10"	ottima / buono	appare facilmente nel cercatore 10×50, di aspetto simile a NGC 1647, ma poco più esteso e disperso; saltano all'occhio due piccole circonferenze di stelle ravvicinate a guisa di un "8"; la 1ª, poco più grande, ha una soluzione di continuità verso SE, mentre la 2ª. Vecchie edizioni dell'Uranometria riportavano in effetti, all'interno di NGC 1746, due ulteriori piccoli ammassi aperti denominati NGC 1750 ed NGC 1758; questi erano stati scoperti e osservati da W. Herschel il quale ne aveva dato una descrizione molto simile a quella qui riportata — 118x.
NGC 1750	aa	05h03m55s	+23°41.4'		Tau	10"	ottima / buono	v. **NGC 1746**
NGC 1752	gx	05h02m09s	−08°14.4'	q 269	Eri	24"	m. buona / buono	è un bel fuso orientato da ENE a WSW, di dimensioni 2'×40" e di luminosità pressoché uniforme (era visibile, seppur debolmente, anche nel 10") — 400x.
NGC 1753	gx	05h02m32s	−03°20.7'	q 224	Ori	16"	m. buona / buono	debolissima, è osservabile in visione laterale a 188x; solo a momenti appare orientata da N a S ed estesa per una 40-ina di secondi, ma non si riesce a vedere di più.
NGC 1758	aa	05h04m24s	+23°47.0'		Tau	10"	ottima / m. buono	v. **NGC 1746**
NGC 1762	gx	05h03m37s	+01°34.4'	q 224	Ori	16"	buona / buono	poco allungata all'incirca da N a S, diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina brillante a ridosso del bordo orientale — 132x (alcuni problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 1778	aa	05h08m06s	+37°01.4'	q 97	Aur	6"	m. buona / m. buono	gruppetto compatto a forma di triangolo rettangolo; a pochi primi di distanza verso N c'è un altro gruppo arcuato di stelline con la concavità rivolta verso il primo.
NGC 1779	gx	05h05m18s	−09°08.8'	q 270	Eri	16"	ottima / buono	allungata da WNW a ESE, di dimensioni 80"×40", con bulge brillante e contrastato; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso N — 270x.
NGC 1780	gx	05h06m21s	−19°28.0'	q 315	Lep	16"	mediocre / m. buono	molto debole e diffusa, estesa ~ 45"; a tratti appare leggermente più brillante all'interno; salta fuori in visione distolta osservando quella stellina situata 1.5' a N — 270x.
NGC 1781	gx	05h07m55s	−18°11.4'	q 315	Lep	16"	m. buona / discreto	relativamente facile, rotonda, poco diffusa, poco più brillante all'interno e Ø di 1'; c'è una stellina situata a poco più di 1' verso S; altresì nota come NGC 1794 — 270x.
NGC 1784	gx	05h05m27s	−11°52.3'	q 270	Lep	24"	m. buona / buono	presenta una zona centrale abbastanza brillante circonfusa da un alone molto diffuso e sfilacciato; è orientata da E a W con dimensioni 3'×2'; c'è una debole stellina a ridosso del bulge verso SE; un'altra al bordo S e una 3ª brillante al ridosso N. Visibile seppur debolmente anche nel 10" — 400x.
NGC 1788	neb	05h06m55s	−03°20.3'	q 225	Ori	24"	buona / scarso	è aperta a ventaglio con ampiezza di ~ 90°; è molto stemperata sul fondo cielo, per cui è difficile stabilirne le dimensioni: la parte più appariscente si estende per poco più di 4' da E a W e per 3' scarsi da N a S; il vertice del ventaglio punta verso S ed è occupato da una stellina brillante; questa zona, tra l'altro, è anche la più contrastata dell'intera nebulosa perché confina con una formazione scura di circa 90"×60" denominata LDN 1616; un'altra stella brillante si trova verso l'estremità occidentale del ventaglio: in mezzo a queste 2 stelle luminose ce n'è una debole, mentre altre 2 appena percettibili sono poste quasi a perpendicolo (la nebulosa era osservabile anche nel 10") — 340x.
NGC 1792	gx	05h05m15s	−37°58.7'	q 358	Col	10"	buona / buono	debole, ma relativamente facile, poco diffusa, orientata da NW a SE con dimensioni 3'×1.5'; a 118x è visibile senza problemi una tenue condensazione centrale.
NGC 1797	gx	05h07m45s	−08°01.1'	q 270	Eri	16"	buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotondeggiante con Ø di 1' e piccola condensazione centrale poco più evidente; c'è una stellina brillante a ridosso verso NW — 270x.
NGC 1798	aa	05h11m40s	+47°41.7'	q 65	Aur	24"	m. buona / m. buono	piuttosto debole, di forma e struttura irregolari; a 110x appaiono all'interno delle pezze nebulose, quasi si trattasse di zone irrisolte che a prima vista restano tali anche a 200x; l'effetto tende a scomparire a 400x: a questi ingrandimenti la piccola parte centrale diventa un polverio di deboli stelline.
NGC 1799	gx	05h07m45s	−07°58.2'	q 270	Eri	16"	buona / m. buono	situata 3' a N di NGC 1797, è relativamente facile, poco diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale marcata — 270x.
NGC 1802	aa	05h10m13s	+24°08.0'		Tau	6"	ottima / ottimo	gruppo molto disperso di stelle di luminosità molto varia disposte su un'area di 15' di dimensioni; anche scalando a 132x è praticamente indistinguibile dal background; si contano una dozzina di componenti brillanti; c'è una doppia stretta verso il margine NW (non è riportata sull'Uranometria).
NGC 1807	aa	05h10m46s	+16°30.8'	q 180	Tau	24"	ottima / ottimo	visibile nel cercatore 12x50, è principalmente costituito da 2 segmenti di stelle molto brillanti disposte vagamente come lo spiovente di un tetto in direzione N-S; la stella "culminante" è una doppia stretta; quest'ultima è allineata ortogonalmente con altre 2 di luminosità decrescente — 110x.
NGC 1808	gx	05h07m43s	−37°30.8'	q 358	Col	10"	buona / buono	è più debole della 1792 (dalla quale dista una 40-ina di primi a NE) e più estesa e di luminosità pressoché uniforme; è orientata nello stesso modo, ma con dimensioni 4'×2' — 118x.
NGC 1817	aa	05h12m27s	+16°41.0'	q 180	Tau	24"	ottima / ottimo	anche questo è visibile nel cercatore, è situato a meno di 30' a NE di NGC 1807 (circa mezzo grado a SW); è costituito da una gragnola abbastanza fitta di stelle con moderato range di luminosità; esteso una 15-ina di primi, ma anche a 110x è difficile stabilirne i confini; spiccano 3 stelle brillanti situate verso SW, nonché una doppia stretta e sbilanciata verso il margine NW.
NGC 1819	gx	05h11m46s	+05°12.0'	q 180	Ori	16"	m. buona / ottimo	facile, presenta un bulge rotondo e brillante, con Ø di una 30-ina di secondi con 2 baffi che saltano fuori in visione distolta a 380x verso NW e SE; c'è una debole stellina doppia quasi a ridosso verso W.
NGC 1821	gx	05h11m46s	−15°08.1'	q 270	Lep	16"	buona / m. buono	poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme salvo un piccolo nucleo puntiforme visibile a 270x; è allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30".
NGC 1832	gx	05h12m03s	−15°41.2'	q 270	Lep	24"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da N a S con dimensioni 2'×1.5'.
NGC 1843	gx	05h14m06s	−10°37.6'	q 270	Ori	16"	buona / m. buono	facile, rotonda, diffusa, poco più brillante all'interno di luce e Ø di un paio di primi — 270x.
NGC 1857	aa	05h20m06s	+39°20.6'	q 66	Aur	10"	ottima / discreto	piccolo gruppo molto povero e serrato; anche a 118x è difficile effettuare la conta delle componenti a causa di una stella molto brillante arancione centrata sull'ammasso; rappresenta la propaggine meridionale di un altro gruppo esteso una 15-ina di primi, praticamente indistinguibile dal background stellare e riportato sull'Uranometria come **Czernik 20**.
NGC 1875	gx	05h21m46s	+06°41.3'	q 180	Ori	16"	ottima / scarso	debole, rotonda, di aspetto diffuso, con Ø di una 40-ina di secondi; a tratti si vede una piccola zona centrale poco più brillante (impossibile osservare a 270x!) — 188x.
NGC 1883	aa	05h25m55s	+46°29.4'	q 66	Aur	16"	ottima / buono	molto bello osservato a 208x: completamente risolto sembra una manciata di finissime perline; c'è una stellina brillante subito a SW (nel Comet Tracker a 30x appariva solo come una debolissima macchia rotondeggiante estesa un paio di primi, ma senza strutture).
NGC 1886	gx	05h21m48s	−23°48.6'	q 315	Lep	16"	mediocre / m. buono	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme estesa forse un paio di primi in direzione NE-SW (al momento dell'osservazione non era più alta di una 20-ina di gradi sull'orizzonte) — 270x.
NGC 1888	gx	05h22m34s	−11°30.2'	q 270	Lep	24"	ottima / m. buono	assieme a NGC 1889 forma una coppia di gx interagenti — la 1ª è molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'×30", diffusa e con basso gradiente di luce; l'altra è situata a ridosso della precedente ed è rotonda, compatta, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 20-ina di secondi (nel 10" le 2 gx apparivano invece come un unico oggetto di forma irregolare anche a 178x) — 400x.
NGC 1889	gx	05h22m35s	−11°29.8'	q 270	Lep	24"	ottima / m. buono	v. **NGC 1888**
NGC 1893	aa	05h22m46s	+33°25.2'	q 97	Aur	10"	buona / buono	sembra una farfalla in volo, con tenue traccia di nebulosità (IC 410) solo nell'ala occidentale.
NGC 1906	gx	05h24m47s	−15°56.6'	q 270	Lep	16"	buona / buono	è piuttosto debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina abbastanza brillante verso SE — 270x.
NGC 1907	aa	05h28m05s	+35°19.5'	q 97	Aur	10"	buona / buono	molto bello e compatto, con stelline di luminosità uniforme.
NGC 1924	gx	05h28m02s	−05°18.6'	q 270	Ori	16"	m. buona / buono	è di aspetto vagamente screziato e irregolare, diffusa, approssim. rotonda con Ø di 1'; in visione distolta sembra di vedere, a tratti, una sorta di "barra" che l'attraversa da E a W — 270x.
NGC 1931	neb	05h31m26s	+34°14.7'	q 97	Aur	10"	buona / buono	è un alone relativamente compatto, esteso max 4' che circonda una stella abbastanza brillante.
NGC 1954	gx	05h32m48s	−14°03.8'	q 270	Lep	24"	ottima / m. buono	allungata da N a S, di dimensioni 2'×1', diffusa e con basso gradiente di luce; si apprezza meglio scalando a 200x; c'è una stellina al bordo N.
NGC 1957	gx	05h32m55s	−14°08.0'	q 270	Lep	24"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare abbastanza marcato; c'è una stellina a 1' SW — 400x.
NGC 1961	gx	05h42m04s	+69°22.7'	q 20	Cam	16"	ottima / buono	molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 3'×2'; presenta un bulge evidente, ma poco contrastato sul disco; una stellina lambisce questo bulge verso S — 270x.
NGC 1964	gx	05h33m22s	−21°56.8'	q 315	Lep	24"	ottima / ottimo	presenta un nucleo stellare brillante all'interno di un piccolo bulge molto luminoso e contrastato di 20"×10" e orientato da N a S; l'esteso alone circonfuso è di aspetto molto uniforme e stemperato sul fondo cielo, orientato da NNE a SSW con dimensioni 3.5'×1'; c'è una doppia stretta a ridosso W; due stelline all'interno dell'alone si trovano a N e a SSW; un triangolo irregolare molto aperto di stelle brillanti situato subito a W della gx non sembra interferire con l'osservazione (era visibile, anche se molto debolmente e senza le stelline interne, nel 10" a 188x in condizioni di cielo simili) — 450x.
NGC 1973	neb	05h37m25s	−04°47.0'	q 225	Ori	10"	ottima / buono	denominata anche NGC 1975, è un vasto complesso nebulare situato a poco più di mezzo grado a N della Nebulosa di Orione; presenta alcune irregolarità di luce all'interno; è molto netta una demarcazione a SW di 42 e 45 Orionis; la parte più meridionale è denominata NGC 1977, ma non sembra avere alcuna soluzione di continuità con la precedente — 63x.
NGC 1977	neb	05h35m18s	−04°49.0'	q 225	Ori	10"	ottima / buono	v. **NGC 1973**
NGC 1979	gx	05h34m01s	−23°18.6'	q 315	Lep	16"	ottima / discreto	brillante, diffusa, con alto gradiente di luce, nucleo quasi stellare, rotonda, con Ø di almeno 1.5'; c'è una stellina a un paio di primi verso ESE — 270x.
NGC 1980	aa + neb	05h35m26s	−05°55.0'	q 270	Ori	24"	ottima / ottimo	gruppo eterogeneo di una 30-ina di stelle, per la maggior parte brillanti con una sorta di "coda" arcuata che protrude verso S ed estesa una dozzina di primi (quest'ultima, però, non fa probabilmente parte dell'ammasso); le stelle sembrano incastonate in un background chiaro — la cui differenza col reale fondo cielo si può notare, ad esempio, spostando lo strumento un poco verso S — che probabilmente rappresenta la tenue e confusa nebulosità associata, non distintamente osservabile a 110x (questa nebulosità si apprezza meglio in un 10" che smorza un po' il bagliore delle stelle e permette l'utilizzo di un campo superiore a 1°.
NGC 1981	aa	05h35m12s	−04°26.0'	q 225	Ori	6"	discreta / buono	gruppo disperso di una decina di stelle brillanti che anche a 30x non sembrano condensate in un ammasso aperto vero e proprio.
NGC 1993	gx	05h35m25s	−17°48.9'	q 315	Lep	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' (già visibile, seppure molto debolmente, nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 1999	neb	05h36m14s	−06°39.0'	q 271	Ori	10" 16"	ottima / discreto	molto brillante, di aspetto quasi stellare. Successivamente osservato nel 40 a 270x appare chiaramente una zona scura trilobata (pare la miniatura di un tricorno!) situata all'interno poco verso W.
NGC 2017	aster	05h39m16s	−17°51.0'	q 316	Lep	24"	m. buona / m. buono	molto povero: presenta 4 stelle brillanti principali, di cui quella centrale, di 6ª grandezza, è la SAO 150652 di colore bluastro; altre 2 stelle di 12-esima si trovano a E e NE della più luminosa; altre due stelle sono situate 4' o 5' più a N, ma non si capisce se appartengono o meno all'ammasso (già precedentemente osservato col Comet-Tracker da 6") — 450x.
NGC 2022	np	05h42m06s	+09°05.2'	q 181	Ori	24"	buona / buono	leggermente allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 30"×25"; appare screziata a 570x, ma non v'è traccia evidente della stellina centrale.
NGC 2023	neb	05h41m42s	−02°15.0'	q 226	Ori	16"	ottima / buono	nel 40 cm. a 75x appare come una chiazza di luce irregolare, poco estesa, con una stella brillante sovrapposta; era tuttavia visibile, anche se debolmente, nel Comet Tracker a 30x.
NGC 2024	neb	05h41m39s	−01°48.0'	q 226	Ori	10"	ottima / discreto	Nebulosa Fiamma — facile, malgrado la luce..accecante della ζ Ori; ben visibile anche ad appena 57x la banda scura ramificata.
NGC 2064	neb	05h46m17s	+00°00.5'	q 226	Ori	10"	m. buona / buono	molto piccola e debole; si trova a ~ 3 / 5 della distanza tra M78 e una stellina posta una decina di primi a W; la nebulosa non è sulla congiungente, ma spostata verso S.
NGC 2067	neb	05h46m29s	+00°07.5'	q 226	Ori	6"	discreta / buono	oggetto evanescente, visibile solo a tratti in visione distolta; sembra talora allungato da NW a SE.
NGC 2071	neb	05h47m05s	+00°18.0'	q 226	Ori	10"	ottima / discreto	visibile chiaramente come un alone che circonda la superiore di una coppia di stelline distanti poco più di 3' in direzione NW-SEE.
NGC 2073	gx	05h45m54s	−21°59.9'	q 316	Lep	16"	mediocre / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 1' e gradatamente più brillante all'interno — 270x.
NGC 2076	gx	05h46m48s	−16°46.9'	q 271	Lep	24"	m. buona / m. buono	chiazza diffusa con basso gradiente di luce, orientata da NE a SW e con dimensioni che in visione distolta sfiorano 2'×1'; situata in mezzo a 2 stelline: una a 1.5' E e l'altra molto debole alla stessa distanza verso W; la visione è più interessante scalando a 340x.
NGC 2089	gx	05h47m51s	−17°36.1'	q 316	Lep	16"	m. buona / ottimo	facile, rotonda con Ø di 45", poco diffusa, con alto gradiente di luce e nucleo brillante stellare; c'è una stellina subito a NE; quasi allineata ed equidistante con 2 altre stelline brillanti a SE — 270x.
NGC 2090	gx	05h47m02s	−34°15.1'	q 359	Col	10"	buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo e con gradiente di luce molto basso; è allungata da N a S con dimensioni 90"×45" — 118x.
NGC 2106	gx	05h50m47s	−21°34.0'	q 316	Lep	16"	m. buona / discreto	presenta un bulge brillante di dimensioni 45"×30" orientata da N a S circonfuso da un alone molto tenue, diffuso ed esteso ~ 1'; si trova tra 2 stelline distanti 2.5' orientate da N a S — 270x.
NGC 2110	gx	05h52m11s	−07°27.4'	q 271	Lep	16"	m. buona / ottimo	piccola, piuttosto debole e diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti; è approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' S e un'altra a 1' verso E — 270x.
NGC 2112	aa	05h53m46s	+00°24.6'	q 226	Ori	6"	buona / buono	piccolo, molto debole, formato da 5 o 6 stelle di cui una brillante.
NGC 2119	gx	05h57m27s	+11°56.9'	q 181	Ori	24"	discreta / m. buono	molto diffusa, rotonda a prima vista, ma osservando più attentamente si nota che è in realtà poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare abbastanza marcato (anche a 450x il campo rimane molto ricco: una stella brillante di 9ª grandezza si trova ad appena un paio di primi a NE); la gx era già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10" a 178x.
NGC 2124	gx	05h57m52s	−20°05.1'	q 316	Lep	16"	m. buona / discreto	bella, è una edge-on estesa per 2.5' in direzione N-S con bulge evidente; c'è una stellina a ridosso del bordo meridionale — 270x.
NGC 2126	aa	06h02m34s	+49°52.0'	q 67	Aur	16"	ottima / mediocre	gruppo di ~ 25 stelle situate a ridosso SW della brillante SAO 40801, di 6ª grandezza, con range di luminosità poco elevato — 132x.
NGC 2128	gx	06h04m34s	+57°37.7'	q 41	Cam	10"	buona / discreto	relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 45" e gradatamente più brillante verso l'interno; a 178x sembra un piccolo ammasso globulare irrisolto; è virtualmente circondata da stelle anche molto brillanti.
NGC 2129	aa	06h01m07s	+23°19.2'	q 136	Gem	10"	ottima / m. buono	gruppo abbastanza serrato di una 15-ina di stelle di cui 2 molto brillanti.
NGC 2131	gx	05h58m47s	−26°39.1'	q 316	Lep	16"	m. buona / discreto	molto debole, estesa per max 45"; in visione distolta appare come un alone di luminosità uniforme che si diparte verso S da una stellina; fissando questa stellina la gx sembra scomparire — 270x.
NGC 2139	gx	06h01m08s	−23°40.4'	q 316	Lep	16"	m. buona / discreto	chiazza diffusa facilmente visibile, approssim. rotonda con Ø di ~ 2' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 270x.
NGC 2141	aa	06h02m56s	+10°26.8'	q 181	Ori	10"	buona / m. buono	molto debole; è necessaria la visione distolta per distinguere una chiazza lattescente attraverso le stelle di campo; nei pressi si vede una buffa configurazione stellare: sembra l'impronta lasciata sul muro da una manata.
NGC 2146	gx	06h18m41s	+78°21.5'	q 6	Cam	24"	buona / m. buono	diffusa e di aspetto un po' irregolare, molto sfumata verso SE; a 340x sembra leggermente arcuata, con la concavità rivolta verso NW; il bulge è esteso e abbastanza contrastato sul disco; un tenuissimo baffo si diparte a SE verso una doppia delle componenti brillanti (era facilmente osservabile nel 10" a 126x).
NGC 2146A	gx	06h23m56s	+78°31.8'	q 6	Cam	16"	buona / mediocre	molto debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×1' e di luminosità pressoché uniforme; deboli stelline ammiccano a tratti a ridosso — 188x.
NGC 2149	neb	06h03m32s	−09°44.0'	q 271	Mon	16"	ottima / buono	è una chiazza di luce irregolare, abbastanza brillante, con una marcata condensazione centrale di aspetto quasi stellare; potrebbe a prima vista essere scambiata per una gx — 75x.
NGC 2158	aa	06h07m26s	+24°05.8'	q 136	Gem	10"	ottima / buono	è una macchia vagamente triangolare, molto facile e con forte granulazione, situata a mezzo grado scarso SW di M35.
NGC 2169	aa	06h08m25s	+13°57.9'	q 182	Ori	10"	ottima / discreto	è un piccolo oggetto con poche stelle disposte vagamente in forma di una losanga — 190x.
NGC 2170	neb	06h07m29s	−06°24.2'	q 271	Mon	16"	m. buona / ottimo	è un alone molto ben evidente, approssim. circolare con Ø di 1.5' che circonda una stellina brillante; in visione distolta sembra di discernere una specie di baffo che aggetta verso NW — 270x.
NGC 2174	neb	06h09m42s	+20°29.0'	q 137	Ori	10"	ottima / buono	è visibile una chiazza estesa molto debole attraversata da ramificazioni scure molto irregolari.
NGC 2179	gx	06h08m02s	−21°44.8'	q 317	Lep	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; era osservabile, sia pure a mala pena, anche nel DS-10 a 178x — 208x.
NGC 2182	neb	06h09m31s	−06°19.6'	q 272	Mon	16"	m. buona / ottimo	debole appannamento attorno a una stella che in visione distolta appare rotondo con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a ridosso del margine orientale; interessante il confronto diretto con una stella poco distante, situata 4' a E, che ne è privo — 270x.
NGC 2183	neb	06h10m48s	−06°13.0'	q 272	Mon	16"	m. buona / ottimo	è di aspetto galattico, di forma irregolare, estesa ~ 1' con una stellina debole all'interno spostata verso SE — 270x.
NGC 2185	neb	06h11m06s	−06°13.0'	q 272	Mon	16"	m. buona / ottimo	situata ~ 5' e di NGC 2183, appare come un alone che circonda una stellina brillante, più debole della 2170 e di Ø non superiore a 1' — 270x.
NGC 2186	aa	06h12m08s	+05°27.5'	q 182	Ori	10"	discreta / discreto	gruppo piuttosto disperso nel quale, a 178x, si contano agevolmente una 15-ina di componenti; sembra spaccato in 2 da NE a SW; la parte di NE è dominata da una coppia di stelle brillanti separate da ~ 40" e orientate da NW a SE.
NGC 2188	gx	06h10m10s	−34°06.4'	q 359	Col	10"	buona / buono	molto debole, osservabile in visione laterale a 118x, dovrebbe essere molto allungata da N a S per almeno 3'; a 178x si stempera sul fondo cielo; c'è una debole stellina a ~ 1' verso W.
NGC 2192	aa	06h15m18s	+39°51.3'	q 67	Aur	28"	buona / mediocre	gruppo disperso e abbastanza eterogeneo nel quale, a 495x, si contano 30-35 stelle; contrariamente a quanto riportato sul Megastar, l'ammasso appare chiaramente orientato da NE a SW con dimensioni 6'×3' (anche se non è facile definirne i confini); si nota una tripletta serrata verso il margine W.
NGC 2194	aa	06h13m46s	+12°48.4'	q 182	Ori	10"	ottima / discreto	oggetto debole e compatto; a una 20-ina di primi verso E (sul prolungamento di 73-74 Ori) si vedono altri 2 oggetti molto deboli non riportati sull'Uranometria.
NGC 2196	gx	06h12m10s	−21°48.4'	q 317	Lep	10"	ottima / buono	rotonda, con basso gradiente di luce, diffusa e con Ø di un paio di primi; è situata in un campo ove sono presenti molte stelline deboli; meglio visibile a 178x.
NGC 2204	aa	06h15m33s	−18°40.0'	q 317	CMa	10"	ottima / discreto	debole macchia di ca. 8' di Ø dominato da 2 stelline brillanti a N e W; una 3ª stellina si trova a ridosso verso S — 57x.
NGC 2206	gx	06h16m00s	−26°45.9'	q 317	CMa	16"	m. buona / discreto	facilmente visibile, ma molto stemperata sul fondo cielo, orientata da NW a SE con dimensioni 90"×60"; appaiono a tratti lievi irregolarità di luce all'interno — 270x.
NGC 2207	gx	06h16m21s	−21°22.4'	q 317	CMa	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata e interagente con IC 2163 (già precedentemente osservate col 10" a 178x) — presenta un bulge brillante, rotondo con Ø di una 20-ina di secondi con una stellina a ridosso verso S; l'alone è tenue e a tratti irregolare in brillanza, poco allungata da E a W con dimensioni 2.5'×2'. La IC appare invece molto uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2'×1' e tende ad assottigliarsi, nonché a sfumare verso E; la coppia appare più interessante scalando a 340x.
NGC 2208	gx	06h22m35s	+51°54.6'	q 41	Aur	16"	m. buona / buono	relativamente brillante e gradatamente più luminosa verso l'interno, poco diffusa, orientata da ESE a WNW con dimensioni 60"×40"; presenta un piccolo nucleo puntiforme visibile a tratti — 270x.
NGC 2211	gx	06h18m30s	−18°32.2'	q 317	CMa	16"	m. buona / discreto	è un bel fuso abbastanza compatto e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NNE a SSW, con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 2212	gx	06h18m35s	−18°31.2'	q 317	CMa	16"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 40"; c'è una stellina a 1' verso NE — 270x.
NGC 2215	aa	06h20m50s	−07°17.0'	q 272	Mon	6"	ottima / discreto	grosso modo rotondo con Ø di ca. 8'; si contano una 20-ina di stelle a 57x.
NGC 2216	gx	06h21m30s	−22°05.2'	q 317	CMa	16"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 270x.
NGC 2217	gx	06h21m40s	−27°14.0'	q 317	CMa	24"	m. buona / discreto	molto diffusa, soprattutto verso E e W, presenta un bulge molto marcato, allungato da WNW a ESE di dimensioni 60"×40" e un nucleo di aspetto quasi stellare; l'alone si stempera molto sul fondo cielo e in visione distolta arriva a lambire una coppia di stelline a W orientate a perpendicolo col bulge (quella a S è più evidente); meglio contrastata a 340x.
NGC 2223	gx	06h24m36s	−22°50.3'	q 317	CMa	10"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con dimensioni di almeno un paio di primi; a 178x la gx diventa molto difficile, ma come spesso avviene aumentando molto gli ingrandimenti diventa visibile una stellina situata subito a N del centro.
NGC 2227	gx	06h25m58s	−22°00.3'	q 317	CMa	16"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina doppia stretta a ridosso verso S con le componenti orientate in direzione NE-SW (a prima vista pareva un nodulo brillante); una doppia larga dalle componenti brillanti si trova invece a 1.5' verso W — 270x.
NGC 2232	aa	06h28m02s	−04°50.8'	q 227	Mon	6"	discreta / buono	dimensioni 2'×1'; c'è una stellina doppia stretta a ridosso verso S con le componenti
NGC 2236	aa	06h29m40s	+06°49.8'	q 181	Mon	10"	buona / m. buono	orientate in direzione NE-SW (a prima vista pareva un nodulo brillante); una doppia larga
NGC 2237	neb	06h31m40s	+05°04.0'	q 227	Mon	6"	m. buona / buono	dalle componenti brillanti si trova invece a 1.5' verso W.
NGC 2239	aa	06h31m00s	+04°56.0'	q 227	Mon	6"	buona / buono	debolissima chiazza circolare, poco estesa, granulata a tratti in visione distolta (57x); non emerge alcuna stella di luminosità apprezzabile; forse non è un ammasso vero e proprio; tra l'altro, partendo dal vicino 2244 si nota come un repentino vuoto di stelle nella posizione occupata dall'oggetto (riportato sull'Uranometria, ma non sul Megastar).
NGC 2242	np	06h34m08s	+44°36.6'	q 67	Aur	16"	ottima / discreto	è un piccolo oggetto rotondo, molto debole, di luminosità uniforme e del Ø di 20" o 25"; l'impiego dell'O III a 100x non serve a gran che.
NGC 2244	aa	06h32m19s	+04°51.4'	q 227	Mon	6"	buona / buono	le 6 stelle brillanti principali situate al centro della Rosetta si vedono già facilmente comodamente nel cercatore 6×30.
NGC 2245	neb	06h32m41s	+10°09.2'	q 182	Mon	10"	buona / buono	è di aspetto cometario, con la zona principale di dimensioni poco superiori a 1' e un tenuissimo baffo che aggetta leggermente verso S; c'è una stellina all'interno verso NE; situata un paio di primi a SW della SAO 95518 di 7ª grandezza.
NGC 2247	neb	06h33m05s	+10°19.3'	q 282	Mon	10"	buona / buono	più piccola e più debole della NGC 2245, dalla quale dista una dozzina di primi a NNE, appare come un alone di aspetto irregolare che circonda una stella brillante.
NGC 2250	aa	06h33m48s	−05°05.0'	q 227	Mon	16"	ottima / buono	gruppo disperso di una 20-ina di stelle che anche ad appena 132x si stacca a fatica dal fondo cielo; appare allungato da E a W con dimensioni 6'×3' ed è delimitato a E da una stellina brillante — 132x.
NGC 2251	aa	06h34m39s	+08°22.0'	q 182	Mon	6"	buona / buono	facile, le 5 o 6 stelle più brillanti sono disposte secondo una losanga orientata da NW a SE e praticamente vuota all'interno.
NGC 2252	aa	06h34m24s	+05°22.5'	q 182	Mon	6"	buona / buono	oggetto esteso a forma di "x" o di una "k" greca irregolare, nel quale si contano comodamente una 15-ina di stelle.
NGC 2254	aa	06h35m47s	+07°40.1'	q 182	Mon	10"	buona / buono	è un piccolo gruppo di 7 od 8 stelle principali disposte a guisa di crescente lunare e delle dimensioni poco superiori a 1'; le componenti principali si risolvono più facilmente a 178x, ma l'ammasso diventa meno interessante.
NGC 2255	gx	06h33m59s	−34°48.8'	q 360	Col	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 340x.
NGC 2256	gx	06h47m14s	+74°14.2'	q 6	Cam	24"	buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1'; c'è una coppia di stelline molto deboli a W, una delle quali praticamente a ridosso della gx (era osservabile anche nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 2258	gx	06h47m46s	+74°28.9'	q 6	Cam	24"	buona / m. buono	bella, diffusa e con basso gradiente di luce, approssim. circolare con Ø di 1'; presenta un piccolo bulge poco contrastato sul suo disco; c'è una coppia di stelline brillanti quasi a ridosso E e SE; una 3ª stellina debole si trova al margine S della gx (era osservabile anche nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 2259	aa	06h38m33s	+10°53.0'	q 182	Mon	10"	discreta / discreto	molto debole, approssim. circolare con Ø di ~ 4', molto granulato a 178x, ma difficilmente risolvibile in stelle anche a tale ingrandimento; qualche debole stellina si distingue nella parte più a W; c'è una stellina doppia brillante a ridosso verso N.
NGC 2261	neb	06h39m09s	+08°44.9'	q 182	Mon	10"	ottima / buono	**Nebulosa Variabile di Hubble** — facile, relativamente compatta orientata da N a S e di aspetto curioso: ricorda una pallina da volano.
NGC 2262	aa	06h39m39s	+01°08.6'	q 227	Mon	10"	ottima / m. buono	molto debole e povero; è più interessante a 118x, perché diventa possibile contare 8 deboli componenti; ci sono 2 stelline abbastanza brillanti a NW e a SW.
NGC 2263	gx	06h38m28s	−24°50.8'	q 317	CMa	16"	ottima / discreto	debole chiazza di luminosità pressoché uniforme, poco allungata grosso modo da NW a SE con dimensioni 80"×60"; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da N a S; un tenue bulge appare tuttavia scalando a 188x.
NGC 2264	aa	06h40m59s	+09°53.7'	q 183	Mon	6"	buona / buono	brillante, disperso, a forma di albero di Natale, con una stella azzurra luminosa al margine N (15 Mon).
NGC 2266	aa	06h43m20s	+26°58.2'	q 138	Gem	10"	m. buona / m. buono	oggetto di forma triangolare, molto granulato, con 3 stelle abbastanza brillanti arcuate situate all'interno, presso il vertice SW; quest'ultimo è occupato da una stella brillante di 8a.
NGC 2267	gx	06h40m52s	−32°28.9'	q 360	CMa	24"	buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di 45"; presenta una piccola zona centrale brillante, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a ridosso W; una stellina brillante si trova a 1.5' verso E — 340x.
NGC 2268	gx	07h14m18s	+84°23.0'	q 7	Cam	24"	ottima / m. buono	molto diffusa, allungata da ENE a WSW a WSW con dimensioni 2'×1'; presenta un bulge evidente, anche se poco contrastato, di 30"×20" con all'interno un tenue nucleo stellare; debolmente screziata a 450x (era già osservabile nel 10" in condizioni di cielo analoghe).
NGC 2269	aa	06h43m17s	+04°37.0'	q 228	Mon	24"	m. buona / discreto	si contano una dozzina di stelle di luminosità poco discordante poste ad arco con la concavità rivolta verso ENE; esteso non più di 4' — 200x.
NGC 2271	gx	06h42m53s	−23°28.5'	q 318	CMa	16"	m. buona / discreto	abbastanza facile, diffusa, gradatamente più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 2272	gx	06h42m41s	−27°27.5'	q 317	CMa	16"	m. buona / discreto	approssim. rotonda, con alto gradiente di luce, poco diffusa e con Ø di ~ 1' — 188x.
NGC 2273	gx	06h50m08s	+60°50.8'	q 42	Lyn	24"	ottima / buono	bella, molto diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 90"×60"; presenta una zona interna concentrica più brillante estesa 45" e un nucleo stellare molto evidente; la gx è più interessante scalando a 340x (era facilmente osservabile nel 10" a 178x).
NGC 2273B	gx	06h46m32s	+60°20.4'	q 42	Lyn	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina brillante a ridosso SW — 450x.
NGC 2274	gx	06h47m17s	+33°34.0'	q 99	Gem	16"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx relativamente brillanti distanti un paio di primi in direzione N-S; la 1ª è più brillante, rotonda con Ø di ~ 1' e una marcata condensazione centrale; la 2ª è di luminosità più uniforme salvo una tenue condensazione centrale visibile solo a momenti ed è allungata da NNW a SSE con dimensioni di 45"×30" — 380x.
NGC 2275	gx	06h47m18s	+33°35.9'	q 99	Gem	16"	m. buona / ottimo	v. **NGC 2274**
NGC 2276	gx	07h27m17s	+85°45.3'	q 1	Cep	24"	buona / ottimo	poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di quasi 2'; non sembra disturbata dalla SAO 1148 di 8ª grandezza situata un paio di primi a W la quale possiede una compagna più debole a E (già precedentemente osservata nel 10" a 126x) — 340x.
NGC 2280	gx	06h44m49s	−27°38.4'	q 318	CMa	10"	buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 3'×1.5'; è posta praticamente all'interno di un piccolo trapezio di stelline con le 2 meridionali più brillanti; meglio contrastata a 118x.
NGC 2281	aa	06h48m18s	+41°04.7'	q 68	Aur	10"	m. buona / m. buono	visibile già nel cercatore, è un oggetto molto disperso costituito da una 20-ina di stelle brillanti sparpagliate su un'area estesa una dozzina di primi.
NGC 2282	neb +aa	06h46m52s	+01°18.9'	q 228	Mon	24"	m. buona / discreto	è debole alone grosso modo circolare con Ø di ~ 3' attorno a una stellina brillante; alcune deboli stelline sono sparpagliate negli immediati dintorni; la visione non sembra migliorare granché utilizzando il filtro deepsky a 200x. È altresì riportata come **IC 2172** (anche se questo si riferisce forse all'ammasso aperto associato).
NGC 2283	gx	06h45m53s	−18°12.7'	q 318	CMa	24"	m. buona / discreto	è una debole chiazza diffusa situata all'interno di un quadrilatero irregolare formato da 2 stelline abbastanza brillanti (quelle orientate da ENE a WSW) e 2 più deboli (orientate a perpendicolo); la gx appare estesa per oltre 1' e presenta un evidente rinforzo di luce verso S — 340x.
NGC 2286	aa	06h47m41s	−03°08.9'	q 228	Mon	10"	ottima / discreto	debole e molto disperso, poco evidente sul background — 57x.
NGC 2288	gx	06h50m52s	+33°27.7'	q 99	Gem	16"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme a NGC 2289, -90, -91 e -94 di un piccolo gruppo di 5 gx — è la più piccola e appare elusivamente a 380x a ~ 1' SSW della successiva; non dovrebbe essere più estesa di 10"-12".
NGC 2289	gx	06h50m54s	+33°28.7'	q 99	Gem	16"	m. buona / m. buono	debole, approssim. circolare, con Ø 45" e bulge poco più luminoso dell'alone — 270x.
NGC 2290	gx	06h50m57s	+33°26.2'	q 99	Gem	16"	m. buona / m. buono	assieme alla precedente sono i membri più evidenti del gruppo di NGC 2288; è allungata da NE a SW, di forma irregolare, dimensioni 60"×45" e con una stellina situata visibile anche in visione diretta — 270x.
NGC 2291	gx	06h50m59s	+33°31.5'	q 99	Gem	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 2292	gx	06h47m39s	−26°44.8'	q 318	CMa	16"	m. buona / discreto	fa parte di un facile terzetto assieme a NGC 2293 e 2295 — in visione distolta pare a prima vista fondersi con la successiva, rispetto alla quale è più debole ed estesa e di luminosità pressoché uniforme; è poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 2293	gx	06h47m43s	−26°45.3'	q 318	CMa	16"	m. buona / discreto	rotonda con Ø di 1' scarso, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo evidente — 270x.
NGC 2294	gx	06h51m11s	+33°31.6'	q 99	Gem	16"	m. buona / m. buono	fa parte del gruppo di NGC 2288 debole, appena poco più brillante verso l'interno, allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 2295	gx	06h47m24s	−26°44.1'	q 318	CMa	16"	m. buona / discreto	è praticamente una edge-on, orientata da NE a SW con nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso N — 270x.
NGC 2296	gx	06h48m39s	−16°54.1'	q 273	CMa	16"	mediocre / m. buono	diffusa, facile, con bulge brillante e marcato nucleo stellare, rotonda con Ø di 1' — 270x.
NGC 2300	gx	07h32m21s	+85°42.5'	q 1	Cep	24"	buona / ottimo	presenta un bulge brillante, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi, screziato a 450x circondato da un alone molto diffuso, poco orientata da E a W con dimensioni 80"×60" (già precedentemente osservata, seppure molto debolmente, nel Comet-Tracker da 6").
NGC 2301	aa	06h51m46s	+00°27.6'	q 228	Mon	24"	m. buona / discreto	molto bello e ricco, già facilmente visibile nel cercatore 12×60 e costituito da un gran numero di stelle brillanti; durante il passaggio in meridiano dà l'impressione di un fiasco capovolto (visione telescopica) — 200x.
NGC 2302	aa	06h51m54s	−07°05.0'	q 273	Mon	10"	ottima / m. buono	piccolo gruppo abbastanza serrato nel quale si contano 7 stelle abbastanza brillanti di cui 3 vicine e arcuate verso il bordo NW.
NGC 2303	gx	06h56m17s	+45°29.6'	q 68	Aur	16"	buona / scarso	di aspetto circolare, molto diffusa, con Ø di almeno 1', con condensazione centrale e piccolo nucleo puntiforme visibile a tratti — 188x.
NGC 2304	aa	06h55m12s	+17°59.3'	q 138	Gem	10"	m. buona / buono	molto debole, approssim. circolare con una pendice verso SW; la granulosità appare solo in visione distolta.
NGC 2308	gx	06h58m39s	+45°12.7'	q 68	Aur	16"	buona / scarso	debole, appena più brillante verso l'interno, molto diffusa,allungata da N a S, di dimensioni 1.5'x1'. C'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E — 188x.
NGC 2309	aa	06h56m04s	−07°10.5'	q 273	Mon	6"	ottima / buono	nel Comet-Tracker a 30x è un oggetto facile, rotondo e molto granulato.
NGC 2311	aa	06h57m48s	−04°36.7'	q 228	Mon	6"	buona / buono	poche stelline deboli disperse su un'area estesa un paio di primi.
NGC 2314	gx	07h10m32s	+75°19.7'	q 7	Cam	16"	ottima / buono	brillante, rotonda con Ø poco superiore a 1', diffusa ai bordi e con marcata condensazione centrale — 270x.
NGC 2315	gx	07h02m33s	+50°35.5'	q 42	Lyn	24"	ottima / buono	molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 80"×20", con bulge diffuso, evidente, ma poco contrastato; allineata ed equidistante con 2 stelline a NNE, ossia a perpendicolo con l'asse della gx: quella più vicina è molto debole (appariva molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2316	neb	06h59m41s	−07°46.5'	q 273	Mon	10"	ottima / buono	è un alone che circonda 4 stelline poste a guisa di una stella a 3 punte.
NGC 2320	gx	07h05m41s	+50°34.8'	q 42	Lyn	24"	ottima / buono	molto diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni che in visione distolta sono di 80"×40" e con un piccolo bulge particolarmente brillante; c'è una stellina a ridosso N; a 1.5' NE c'è la SAO 26147 di 9ª grandezza (appariva debolmente nel 10" a 178x) — 450x.

NGC 2321	gx	07h05m59s	+50°45.3'	q 7	Lyn	24"	ottima / buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1' scarso; meglio contrastata scalando a 340x (appariva solo a momenti nel 10" a 178x).
NGC 2322	gx	07h06m00s	+50°30.6'	q 42	Lyn	24"	ottima / buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", poco diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a 1' verso E (appariva molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2324	aa	07h04m08s	+01°02.7'	q 228	Mon	24"	buona / ottimo	è un ammasso non particolarmente ricco che nel complesso appare poco allungato da N a S; le stelle sono a basso range di luminosità e sembrano disposte a piccole a piccole stringhe e/o catene intervallate da canali scuri (un'impressione già avuta oltre 20 anni fa osservando con un 10"); un gap di forma grosso modo triangolare è situato nella parte NE; una stellina brillante si trova verso NW — 200x.
NGC 2325	gx	07h02m40s	−28°41.8'	q 361	CMa	16"	ottima / buono	debole, allungata da N a S con dimensioni 2'×1' o poco più e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a SE che diviene molto evidente a 208x (il campo è comunque molto ricco di stelle anche luminose).
NGC 2326	gx	07h08m11s	+50°40.9'	q 42	Lyn	16"	m. buona / buono	molto diffusa e con evidente condensazione centrale, rotonda con Ø di 1.5'; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a "Y" molto allungata, situato subito a W ed estesa un paio di primi — 270x.
NGC 2326A	gx	07h08m34s	+50°37.8'	q 68	Lyn	16"	m. buona / buono	poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", con bulge estesa e diffuso appena più evidente dell'alone; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
NGC 2327	neb	07h04m08s	−11°18.9'	q 273	CMa	24"	buona / buono	diffuso alone asimmetrico vagamente rotondo con Ø poco superiore a 1' che circonda una doppia abbastanza stretta con le componenti molto sbilanciate; ricorda una piccola cometa con la coda molto tozza aperta a ventaglio che punta verso NW; un altro alone molto tenue ed esteso non più di 30" si nota attorno alla stellina situata 1.5' a E; quest'ultima fa parte di una piccola "L" rovesciata (in visione telescopica) con angolo a 120° — 340x.
NGC 2329	gx	07h09m08s	+48°36.9'	q 68	Lyn	28"	m. buona / discreto	brillante, molto diffusa, e con alto gradiente di luce, leggermente orientata da N a S, di dimensioni 60"×50"; c'è una stellina quasi a ridosso W e un piccolo triangolo isoscele formato da stelline con la stessa luminosità 1.5' a NE (situato al centro dell'ammasso **AGC 569**) — 495x.
NGC 2330	gx	07h09m28s	+50°09.1'	q 42	Lyn	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" (è situata un paio di primi a SW di NGC 2332, ma questa gx non era visibile nel 10") — 450x.
NGC 2331	aa	07h06m59s	+27°17.7'	q 138	Gem	10"	m. buona / buono	oggetto disperso di una 15-ina di stelle brillanti e altre più deboli.
NGC 2332	gx	07h09m34s	+50°10.9'	q 42	Lyn	24"	ottima / buono	brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da ENE a WSW con dimensioni 80"×40"; c'è una debole stellina a 1' S e una più evidente più o meno alla stessa distanza verso E (appariva debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2333	gx	07h08m21s	+35°10.1'	q 100	Gem	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con piccolo nucleo abbastanza evidente a 270x.
NGC 2335	aa	07h06m50s	−10°01.7'	q 273	Mon	24"	buona / buono	gruppo abbastanza disperso di una 60-ina di stelle di luminosità diseguale sparse su un'area estesa una dozzina di primi; si notano 5 coppie serrate fra cui 3 disposte ai vertici di un triangolo equilatero e una quarta all'interno — 110x.
NGC 2336	gx	07h27m01s	+80°10.7'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	presenta un piccolo nucleo brillante circonfuso da un alone molto stemperato sul fondo cielo, orientato da N a S con dimensioni 3'×1.5'; c'è una stellina quasi a ridosso E del nucleo; a tratti appare qualche tenue nodulo luminoso qua e là, probabilmente in corrispondenza dei bracci spirale (molto debole nel 10" a 126x, ma con dimensioni simili) — 360x.
NGC 2337	gx	07h10m14s	+44°27.5'	q 68	Lyn	16"	buona / scarso	debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE, con dimensioni 60"×45" — 188x.
NGC 2339	gx	07h08m21s	+18°46.8'	q 138	Gem	16"	ottima / ottimo	è un bell'oggetto poco allungato da N a S con dimensioni 80"×60", appena più brillante all'interno e di aspetto leggermente screziato a 270x; c'è una stellina a ridosso verso NE.
NGC 2340	gx	07h11m11s	+50°10.5'	q 42	Lyn	24"	ottima / buono	bella, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 90"×45"; tuttavia è più interessante se si scala a 340x (appariva molto debolmente nel 10" a 178x).
NGC 2341	gx	07h09m12s	+20°36.1'	q 138	Gem	16"	ottima / ottimo	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 45" verso N — 380x.
NGC 2342	gx	07h09m18s	+20°38.1'	q 138	Gem	16"	ottima / ottimo	appare di luminosità perfettamente uniforme, poco allungata da NW a SW con dimensioni 60"×45" — 380x.
NGC 2343	aa	07h08m07s	−10°37.0'	q 273	Mon	24"	buona / buono	piccolo gruppo relativamente serrato di una 20-ina di stelle ad ampio range di luminosità fra cui due brillanti al bordo orientale; il campo è ricco di stelle, ma l'ammasso risalta facilmente a 110x con estensione di 4' o 5'.
NGC 2344	gx	07h12m28s	+47°10.0'	q 68	Lyn	16"	buona / mediocre	relativamente brillante e diffusa, circolare con Ø di un paio di primi scarsi e alto gradiente di luce — 270x.
NGC 2345	aa	07h08m19s	−13°11.6'	q 273	CMa	24"	m. buona / ottimo	gruppo disperso di una 50-ina di stelle ad ampio range di luminosità; non si notano conformazioni particolari, salvo una doppia larga verso N — 450x.
NGC 2346	np	07h09m22s	−00°48.4'	q 228	Mon	24"	m. buona / discreto	bella, poco diffusa, rotonda con Ø di almeno 1', leggermente screziata a 450x; la stella centrale è molto brillante; la visione è comunque più interessante senza filtro (già facilmente visibile nel 10" a 118x).
NGC 2347	gx	07h16m04s	+64°42.7'	q 21	Cam	10"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a un paio di primi verso SW; una stella brillante si trova 4' a N.
NGC 2350	gx	07h13m12s	+12°16.0'	q 184	CMi	16"	buona / m. buono	relativamente facile, allungata da E a W, dimensioni ~ 60"×30", con bulge evidente, esteso e poco più brillante dell'alone — 270x.
NGC 2353	aa	07h14m31s	−10°16.0'	q 274	Mon	24"	buona / buono	gruppo molto ricco e di aspetto irregolare con all'interno un'ampia zona scura e arcuata estesa quasi a semicerchio; l'ammasso è esteso una 20-ina di primi e presenta una stella brillante verso il margine meridionale — 110x.
NGC 2354	aa	07h14m16s	−25°41.5'	q 319	CMa	6"	m. buona / ottimo	molto disperso ed esteso una 20-ina di primi; sembra di vedere una sorta di canale scuro che lo divide quasi a metà.
NGC 2355	aa	07h17m00s	+13°45.0'	q 184	Gem	24"	m. buona / buono	gruppo relativamente serrato, ma non particolarmente fitto nel quale si contano comodamente una 50-ina di componenti con range di luce relativamente basso; è dominato da una stella brillante verso E; 4 stelline allineate più un quadratino regolare sembrano unirlo alla SAO 96722 situata subito a N — 200x.
NGC 2357	gx	07h17m41s	+23°21.4'	q 139	Gem	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce, debole e di aspetto ben regolare, estesa almeno 3' in direzione NW-SE e appena più brillante all'interno — 380x.
NGC 2359	neb	07h18m31s	−13°14.0'	q 274	CMa	16"	ottima / ottimo	è tenue e poco contrastata sul fondo cielo se osservata normalmente; il contrasto aumenta sensibilmente col filtro deepsky, ma diviene un oggetto stupendo con l'O III. Il disegno rende schematicamente ciò che è possibile vedere attraverso lo SWA da 13.8 (132x): il N è in basso e il W a sinistra.
NGC 2360	aa	07h17m44s	−15°38.5'	q 274	CMa	24"	m. buona / buono	molto bello e molto ricco, esteso una decina di primi, con una stellina brillante al bordo orientale; colpiscono le numerose stringhe e allineamenti di 3, 4 o 5 stelle che gli conferiscono un aspetto caratteristico — 200x.
NGC 2362	aa	07h18m42s	−24°57.3'	q 319	CMa	24"	m. buona / buono	gruppo molto bello e serrato di una 40-ina di stelle brillanti di luminosità pressoché costante racchiuse in un'area a forma di triangolo equilatero; è dominato dalla brillante τ CMa che è spostata un poco verso il lato N; c'è una piccola "W" regolare di 5 stelline subito a N dell'ammasso; una coppia di stelle a SSW paiono staccate dal corpo principale — 200x.
NGC 2363	knot	07h28m30s	+69°11.6'		Cam	16"	m. buona / buono	**regione H II in NGC 2366** — molto brillante, di aspetto quasi stellare, ma soltanto con un buon seeing è facilmente riconoscibile dalle stelle di campo; in visione distolta si staglia chiaramente su un tenue fondo nebuloso (non riportata sull'Uranometria) — 270x.
NGC 2365	gx	07h22m23s	+22°05.0'	q 139	Gem	24"	ottima / discreto	molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 90"×45"; presenta un bulge evidente di dimensioni 30"×20" con all'interno un nucleo stellare poco contrastato; c'è una stellina a ridosso SW e una percettibile solo a momenti subito a S; poco più interessante scalando a 340x.
NGC 2366	gx	07h28m53s	+69°12.7'	q 21	Cam	16"	m. buona / buono	molto allungata da NE a SW con dimensioni 3'×1', diffusa e di luminosità pressoché uniforme; **NGC 2363** è una zona H II che appare come un nodulo molto brillante e leggermente distaccato dalla gx; non è esattamente puntiforme, in quanto a 270x sembra un poco irregolare e appena allungata da E a W.
NGC 2367	aa	07h20m05s	−21°53.0'	q 319	CMa	24"	m. buona / ottimo	gruppo poco disperso di una 20-ina di stelle con ampio range di luminosità; 4 di queste sono poste a rettangolo abbastanza regolare con al centro una doppia stretta dalle componenti brillanti; i lati lunghi del rettangolo sono orientati da NNE a SSW e sono lunghi fra 3' e 4' — 450x.
NGC 2368	aa	07h21m00s	−10°22.0'	q 274	Mon	10"	m. buona / buono	piccolo gruppo relativamente compatto di stelle deboli; è attraversato da un largo canale scuro da NE a SW.
NGC 2370	gx	07h25m02s	+23°47.0'	q 139	Gem	10"	ottima / m. buono	debole, estesa, di dimensioni 3'×1', orientata da NE a SW, con gradiente di luce molto basso di luce — 178x.
NGC 2371	np	07h25m35s	+29°29.4'	q 100	Gem	16"	m. buona / m. buono	presenta in realtà la doppia numerazione NGC 2371-2 — è infatti "bilobata", con 2 zone rotonde separate tra loro; nel complesso è orientata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×30" e coi bordi abbastanza definiti; il lobo meridionale è più brillante; tra i 2 si vede facilmente la debole stellina centrale — 380x.
NGC 2373	gx	07h26m37s	+33°49.5'	q 100	Gem	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso NE — 450x.
NGC 2374	aa	07h23m57s	−13°15.8'	q 274	CMa	24"	m. buona / ottimo	gruppo molto disperso di stelle brillanti, ma di cui è difficile stabilirne i confini, anche scalando a 110x; un piccolo raggruppamento di una 15-ina di stelline più deboli si trova verso SW: fra queste spicca una sorta di "J" speculare o "pipa" formata da 7 componenti.
NGC 2375	gx	07h27m09s	+33°49.9'	q 100	Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e con tenue condensazione centrale; c'è una coppia di stelline subito a N; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 2376	gx	07h26m36s	+23°04.4'	q 139	Gem	16"	ottima / m. buono	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso del margine di NW — 380x.
NGC 2377	gx	07h24m56s	−09°39.6'	q 274	Mon	24"	buona / ottimo	è una chiazza molto diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale poco pronunciata, orientata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante al bordo S e una coppia di deboli stelline a ridosso W; la gx è meglio contrastata scalando a 340x, a 450x si vedono più distintamente le due stelline (era già debolmente visibile nel 10" a 118x).
NGC 2378	gx	07h27m26s	+33°48.7'	q 100	Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo quasi stellare evidente; c'è una stellina abbastanza brillante subito a WNW e una più debole a 1' NNW; è altresì nota come **NGC 2379** — 450x.
NGC 2380	gx	07h23m55s	−27°31.7'	q 319	CMa	10"	ottima / buono	debole, ma relativamente facile se osservata a 178x, rotonda con Ø di oltre 1', molto diffusa e con basso gradiente di luce.
NGC 2383	aa	07h24m40s	−20°56.9'	q 319	CMa	24"	m. buona / ottimo	gruppo relativamente serrato di una 15-ina di stelle piuttosto deboli; è curvo (a mo' di grasso crescente lunare), con concavità rivolta verso E ed esteso poco più di 2'; c'è una stellina brillante sulla cuspide N; è situato tra 2 stelle brillanti di 9ª e 10ª una stellina brillante.
NGC 2384	aa	07h25m12s	−21°01.4'	q 319	CMa	24"	m. buona / ottimo	sembra formato da 2 blocchi orientati da E a W; quello orientale è una sorta di "L" lunga e stretta formata da 5 componenti: le 2 più brillanti formano la base della lettera; a W c'è un'altra "L" più piccola e irregolare, pure formata da 5 stelle, la più brillante delle quali è una doppia strettissima; altre 2 stelle si trovano a N — 450x.
NGC 2385	gx	07h28m28s	+33°50.3'	q 100	Gem	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
NGC 2387	gx	07h28m58s	+36°52.8'	q 100	Aur	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, estesa una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme. Si trova al vertice occidentale di un piccolo triangolo equilatero il cui lato opposto è costituito da due stelline deboli distanti 1.5' — 270x.
NGC 2388	gx	07h28m53s	+33°49.1'	q 100	Gem	24"	m. buona / m. buono	di aspetto a prima vista simile a NGC 2385, ma più brillante, è poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con bulge evidente poco contrastato; c'è una stellina subito a NE — 450x.
NGC 2389	gx	07h29m05s	+33°51.6'	q 100	Gem	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45", con bulge evidente abbastanza contrastato e un nucleo stellare; c'è una stellina brillante 1.5' a N, una più debole alla stessa distanza verso S e una appena percettibile subito a E; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 2392	np	07h29m11s	+20°54.6'	q 139	Gem	16"	ottima / ottimo	Nebulosa Eskimo — stupenda, appare finemente screziata a 380x, perfettamente rotonda, coi bordi ben definiti e con Ø poco inferiore a 1'; una piccola zona interna concentrica estesa una 20-ina di secondi è poco più brillante e circonda la stellina centrale di color bianco-azzurro; sembra la delicata corolla di un fiore.
NGC 2393	gx	07h30m05s	+34°01.6'	q 100	Gem	16"	m. buona / m. buono	debole, molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 1'; c'è una stellina debole a 1' verso NE — 270x.
NGC 2395	aa	07h27m13s	+13°36.5'	q 184	Gem	16"	ottima / buono	gruppo di una 40-ina di stelle di forma vagamente romboidale esteso ~ 12' delimitato a NW da 3 deboli stelline poste ad arco e a SE da una coppia di stelle brillanti che sembrano allungarlo; meglio visibile a 132x (nel Comet Tracker a 30x se ne contavano sì e no una decina).
NGC 2396	aa	07h28m00s	−11°43.0'	q 274	Pup	10"	m. buona / buono	gruppo disperso di una ventina di stelle poste a "U" e con dimensioni di una decina di primi.
NGC 2398	gx	07h30m16s	+24°29.3'	q 139	Gem	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW. Forma una coppia ravvicinata con CGCG 117-46 che si presenta come una debolissima chiazza rotondeggiante con Ø di una 30-ina di secondi e luminosità uniforme — 450x.
NGC 2401	aa	07h29m25s	−13°58.0'	q 274	Pup	10"	discreta / ottimo	molto debole, a 63x appare come una chiazza lattescente leggermente allungata da E a W, estesa al massimo un paio di primi e con una piccola propaggine triangolare verso N; è di aspetto granulato a 178x, ma non si riescono a contare le singole componenti.
NGC 2402	gx	07h30m46s	+09°38.8'	q 184	CMi	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina al bordo E (la quale fa parte di una stringa di 4 componenti allineate in direzione NW-SE); una stellina molto debole si trova invece al bordo N — 450x.
NGC 2403	gx	07h36m52s	+65°36.2'	q 21	Cam	16"	ottima / ottimo	molto diffusa e dai bordi piuttosto irregolari; è nel complesso allungata da NW a SE con dimensioni 8'×4'; presenta un bulge diffuso, ovale, orientata da N a S (ossia inclinato di una 40-ina di gradi rispetto all'asse della gx) e di dimensioni 1.5×1'; un nodulo abbastanza compatto di trova verso il margine NE; c'è una stellina a ridosso del bulge verso SE e altre 3 quasi allineate verso W; 2 stelline abbastanza brillanti distanti 3.5' e orientate da E a W si trovano all'interno dell'alone — 270x.
NGC 2405	gx	07h32m14s	+25°54.4'	q 139	Gem	10"	ottima / m. buono	debolissima e molto piccola; a 178x, in visione distolta, sembra estesa una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; è situata a circa 3' verso E di una coppia di stelline deboli distanti una 40-ina di secondi e orientate da N a S.
NGC 2406	gx	07h31m48s	+18°17.3'	q 139	Gem	16"	ottima / m. buono	assieme alla successiva forma una coppia di gx di aspetto simile, deboli, rotonde, poco diffuse, con Ø di ~ 30" e che presentano una debole condensazione centrale; sono tra loro distanti 3.5' in direzione NE-SW — 380x.
NGC 2407	gx	07h31m57s	+18°20.0'	q 139	Gem	16"	ottima / m. buono	v. **NGC 2406**
NGC 2409	aa	07h31m38s	−17°11.3'		Pup	24"	buona / ottimo	è un piccolo asterismo esteso 2' o 3' e costituito da 10 stelle, 8 delle quali formano una "pinza" o una "tenaglia", mentre un paio sono separate verso W; quella più a E del braccio meridionale è la più debole; non è riportato sugli atlanti Uranometria e Megastar — 340x.
NGC 2410	gx	07h35m02s	+32°49.4'	q 100	Gem	16"	m. buona / m. buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30", con bulge diffuso, poco contrastato sul disco e un nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
NGC 2411	gx	07h34m36s	+18°16.9'	q 139	Gem	10"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta con condensazione centrale di aspetto stellare, tant'è vero che essendo situata una 30-ina di secondi a E di una stellina della stessa luminosità, in visione diretta sembra in effetti di vedere una coppia di stelle (specialmente a bassi ingrandimenti); a 178x appare a momenti orientata da E a W con dimensioni 45"×30".
NGC 2414	aa	07h33m13s	−15°27.2'	q 274	Pup	10"	discreta / ottimo	è un piccolo gruppo piuttosto povero esteso per poco più di 3' nel quale a 178x si contano facilmente una dozzina di componenti; una stella brillante domina l'ammasso al centro; a una 20-ina di secondi SSW di quest'ultima c'è una stellina doppia molto stretta.
NGC 2415	gx	07h36m57s	+35°14.5'	q 100	Lyn	16"	m. buona / m. buono	brillante, relativamente compatta, ma con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; è situata tra 2 stelline distanti 1.5' — 380x.
NGC 2416	gx	07h35m41s	+11°36.8'	q 184	CMi	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno se osservata a 340x (a 450x è di luminosità più uniforme), rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una doppia a 1' scarso verso N.
NGC 2418	gx	07h36m37s	+17°53.1'	q 139	Gem	16"	ottima / m. buono	facile, relativamente brillante, rotonda, con Ø di 45", con bulge brillante — 380x.
NGC 2419	ag	07h38m08s	+38°52.9'	q 100	Lyn	10"	m. buona / buono	rotondo con Ø di un paio di primi, piuttosto debole, non si riesce a risolvere neppure a 118x; pare più una galassia ellittica che un globulare; allineato ed equidistante con 2 stelle brillanti a W.
NGC 2420	aa	07h38m24s	+21°34.4'	q 139	Gem	24"	ottima / discreto	molto bello, ricco, totalmente risolto in stelle a 340x; le 15 o 16 componenti più brillanti formano una struttura grosso modo triangolare; la più luminosa ne delimita in un certo senso il margine occidentale.
NGC 2421	aa	07h34m12s	−20°36.7'	q 319	Pup	6"	m. buona / ottimo	anche questo, a prima vista, pare un settore circolare, ma di 90°, di dimensioni ~ 7', con stelle di luminosità assai diseguale; se ne contano una decina a 86x.
NGC 2423	aa	07h37m07s	−13°52.3'	q 274	Pup	6"	ottima / buono	molto bello, luminoso, abbastanza compatto; sembra unito al vicino M47 da un ponte di stelle; ci sono alcune stelle brillanti all'interno.
NGC 2424	gx	07h40m40s	+39°14.0'	q 69	Lyn	20"	buona / buono	lama di luce estesa 2.5' in direzione E-W con un tenue bulge molto diffuso e poco contrastato; c'è una stellina brillante un paio di primi a SE del dentro della gx e una coppia di stelline poco più distante verso N (era visibile molto debolmente nel 10" a 118x) — 360x.
NGC 2425	aa	07h38m18s	−14°52.7'	q 274	Pup	10"	m. buona / buono	molto debole, piccolo, relativamente compatto, allungato in direzione NW-SW con dimensioni 3'×1.5'; si contano a fatica una decina di stelline a 118x.
NGC 2426	gx	07h43m19s	+52°19.1'	q 43	Lyn	16"	ottima / discreto	rotonda con Ø di 45", di aspetto regolare, gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 270x.
NGC 2429A	gx	07h43m48s	+52°21.4'	q 43	Lyn	16"	ottima / discreto	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", con una stellina a ridosso verso S; c'è una stellina all'interno della gx verso il bordo SE; una stellina brillante si trova quasi a ridosso verso S — 270x.
NGC 2429B	gx	07h43m52s	+52°20.9'	q 43	Lyn	16"	ottima / discreto	è un'elusiva galassietta molto piccola, estesa sì e no 20" e situato a ridosso NE di una stella di 11-esima; in visione distolta sembra proiettarsi da questa stella (durante l'osservazione il sistema era allo zenit); si riesce tuttavia a catturare solo a momenti a 270x.
NGC 2431	gx	07h45m13s	+53°04.5'	q 43	Lyn	28"	m. buona / buono	presenta un piccolo nucleo brillante quasi stellare, circondato da un alone rotondo molto diffuso con Ø di una 40-ina di secondi (era visibile molto debolmente nel 10" a 178x in una notte con ottima trasparenza) — 495x.
NGC 2432	aa	07h40m54s	−19°05.1'	q 319	Pup	6"	m. buona / buono	debole, appare orientato da N a S per 4' o 5', granulato a 86x; si nota una sorta di gap nel mezzo che sembra dividerlo in 2 piccoli blocchi.
NGC 2433	gx	07h42m57s	+09°20.9'	q 184	CMi	16"	m. buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, visibile in visione distolta a ridosso, verso S, della più orientale di una coppia di stelline di luminosità simile, distanti 40" e orientate ~ da E a W; appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi. È situata verso il margine orientale di un ammasso di galassie costituito da pochi elementi estremamente deboli denominato **AGC 592** — 380x.
NGC 2435	gx	07h44m14s	+31°39.1'	q 101	Gem	16"	m. buono / m. buono	brillante, con alto gradiente di luce, allungata da NE A SW, di dimensioni 90"×30"; c'è una stellina molto debole visibile a tratti quasi a ridosso verso E — 270x.
NGC 2438	np	07h41m50s	−14°44.1'	q 274	Pup	24"	m. buona / buono	appare perfettamente rotonda con Ø poco superiore a 1'; all'interno del dischetto si nota una zona più scura, pure rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la stellina centrale sembra leggermente decentrata verso NW; a ridosso di questa verso SW ce n'è un'altra molto debole; tutto il campo è fittamente punteggiato di stelle brillanti (appartenenti all'ammasso aperto M46) — 340x.
NGC 2439	aa	07h40m46s	−31°41.5'	q 362	Pup	6"	discreta / buono	relativamente compatto, fortemente granulato in visione distolta; in visione diretta, tuttavia, si contano poche stelle singolarmente; ce n'è una brillante al margine NE.
NGC 2440	np	07h41m55s	−18°12.5'	q 319	Pup	10"	ottima / discreto	facile, brillante, poco allungata da E a W con dimensioni 70"×50".
NGC 2441	gx	07h51m55s	+73°01.0'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	molto diffusa, di aspetto regolare e con gradiente di luce molto basso rotonda con Ø di 1.5' (era visibile molto debolmente anche nel 10" a 126x e in condizioni di cielo simili) — 360x.
NGC 2444	gx	07h46m53s	+39°02.0'	q 69	Lyn	28"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30", con piccolo bulge brillante e contrastato; c'è una stellina a 1' scarso verso W. Forma una coppia ravvicinata con NGC 2445 situata a ridosso S — 495x.
NGC 2445	gx	07h46m54s	+39°00.7'	q 69	Lyn	28"	ottima / ottimo	debole e molto stemperata sul fondo cielo, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e con piccolo nucleo evidente, ma decentrato verso N (a meno che non si tratti di un nodulo del disco o di una stellina sovrapposta); c'è una stellina verso il margine meridionale (che fa parte di un piccolo triangolo rettangolo — 495x.
NGC 2446	gx	07h48m39s	+54°36.7'	q 43	Lyn	10"	buona / mediocre	debolissima, quasi elusiva, appare solo in visione distolta a 6' o 7' NE di una stellina brillante; la gx, estesa forse 1', si trova a ridosso verso S di una coppia di stelline debolissime distanti una 40-ina di secondi e orientate da N a S; meglio comunque non scendere sotto i 178x.
NGC 2449	gx	07h47m20s	+26°55.8'	q 140	Gem	16"	ottima / m. buono	debole ma facile da vedere, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso NW — 270x.
NGC 2450	gx	07h47m32s	+27°01.1'	q 140	Gem	16"	ottima / m. buono	molto debole, molto allungata da NW a SE (quasi edge-on) per una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 2451	aa	07h45m24s	−37°57.0'	q 362	Pup	10"	discreta / m. buono	gruppo disperso di oltre 20 stelle brillanti sparse su un'area di circa 1 grado quadrato; c'è una stella rossa e luminosa al centro; tuttavia le stelle più deboli si perdono nelle brume dell'orizzonte — 63x.
NGC 2452	np	07h47m26s	−27°20.1'	q 320	Pup	10"	ottima / buono	presenta un piccolo disco di una 30-ina di secondi se osservata a 118x con filtro O III; a 178x e senza filtro appare molto debole e diffusa.
NGC 2453	aa	07h47m35s	−27°11.7'	q 320	Pup	6"	m. buona / ottimo	debole, granulato a 86x, allungato da NW a SE con dimensioni ~ 3'×2'; c'è una stellina brillante al bordo NW.
NGC 2454	gx	07h50m35s	+16°22.1'	q 185	Gem	16"	buona / m. buono	allungata da E a W, di dimensioni 60"×45" e gradiente di luce medio di luce; c'è una stellina a ~ 30" verso S — 270x.
NGC 2455	aa	07h48m59s	−21°17.4'	q 320	Pup	6"	m. buona / ottimo	debole, granulato e debolmente risolto a 86x, grosso modo rotondo con Ø di 4'; c'è una stellina brillante a ~ 6' verso E.
NGC 2456	gx	07h54m10s	+55°29.8'	q 43	Lyn	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NE a SW con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E e una abbastanza brillante a poco più di 1' S (già precedentemente osservata col 10" a 178x in condizioni di ottima trasparenza) — 450x.
NGC 2457	gx	07h54m54s	+55°32.8'	q 43	Lyn	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 262-47 situata 1' più a W — sono 2 deboli gx di aspetto simile, orientate a perpendicolo tra loro, poco diffuse, con dimensioni 30"×15" e appena più brillanti verso l'interno; la CGCG è tuttavia poco più evidente a 450x.
NGC 2458	gx	07h55m35s	+56°49.1'	q 43	Lyn	16"	mediocre / scarso	debolissima e molto piccola, di aspetto quasi stellare anche a 188x; c'è una debole stellina a 1' verso W.
NGC 2460	gx	07h56m53s	+60°21.0'	q 43	Cam	16"	ottima / m. buono	è un bell'ovale brillante, diffuso e ad alto gradiente di luce, con nucleo stellare marcato; è orientata da NE a SW con dimensioni 1.5'×1' — 380x.
NGC 2461	gx	07h55m51s	+56°42.6'	q 43	Lyn	16"	mediocre / scarso	molto piccola e debole, osservata subito dopo la 2458; anche questa, a prima vista, è di aspetto quasi stellare (forse a causa del seeing); appare in visione distolta a una 30-ina di secondi NE di una stellina — 188x.
NGC 2462	gx	07h56m32s	+56°41.2'	q 43	Lyn	16"	mediocre / scarso	debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con una evidente condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 188x.
NGC 2463	gx	07h57m12s	+56°40.6'	q 43	Lyn	16"	ottima / m. buono	facile, piccola, rotonda, poco più brillante all'interno di luce, poco diffusa e con Ø di 35"-40"; presenta una nucleo stellare percettibile a 380x.
NGC 2467	aa	07h52m30s	−26°25.8'	q 320	Pup	10"	ottima / buono	è un gruppo piuttosto disperso e assai eterogeneo di oltre 20 stelle; all'interno si trova la nebulosa a emissione SH 2-311; quest'ultima è appena percettibile come una tenue lattescenza a 118x.
NGC 2468	gx	07h58m02s	+56°21.6'	q 43	Lyn	16"	mediocre / scarso	poco diffusa, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a circa 1' verso W — 188x.
NGC 2469	gx	07h58m03s	+56°40.8'	q 43	Lyn	16"	mediocre / scarso	debole e diffusa, poco più brillante verso l'interno; a 188x, in visione distolta, appare a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una debole stellina a ~ 1' verso NW.
NGC 2470	gx	07h54m20s	+04°27.6'	q 230	CMi	16"	buona / ottimo	bella, molto allungata da NW a SE per oltre 1.5'; è posta praticamente di taglio e presenta un bulge luminoso ed estesa ; c'è una stellina subito a N — 188x.
NGC 2473	gx	07h58m42s	+56°42.1'	q 43	Lyn	16"	mediocre / scarso	altresì denominata **NGC 2472** — debolissima, appare elusivamente e solo ogni tanto a 188x, a poco più di 4' E della SAO 26593 di 9ª grandezza.
NGC 2474	gx	07h57m59s	+52°51.4'	q 43	Lyn	24"	ottima / ottimo	assieme a NGC 2475 forma una coppia di piccole galassie rotonde separate da una 20-ina di secondi in direzione NE-SW — la 1ª è più piccola, con Ø di 20" e condensata; la 2ª ha un Ø < 30" ed è di aspetto simile; le gx non sembrano granché disturbate dalla SAO 26594 di 9ª grandezza situata 2.5' a NW (la coppia era visibile e separabile anche nel 10" a 178x in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 2475	gx	07h58m01s	+52°51.7'	q 43	Lyn	24"	ottima / ottimo	v. **NGC 2474**
NGC 2476	gx	07h56m45s	+39°55.7'	q 69	Lyn	10"	buona / discreto	debole e molto diffusa, ma con evidente condensazione centrale, a 178x appare allungata da NW a SE con dimensioni di 60"×40"; c'è una debole stellina subito a S e un'altra appena percettibile quasi a ridosso verso E.
NGC 2477	aa	07h52m10s	−38°32.0'	q 362	Pup	10"	buona / buono	gruppo molto ricco e finemente disperso di stelle deboli le cui componenti si contano a fatica a 63x; è esteso una 15-ina di primi ed è situato subito a N della SAO 198545 di magnitudo 4.5; salta all'occhio una striscia irregolare di stelline che sembra attraversare il campo dell'oculare da NE a SW.
NGC 2479	aa	07h55m06s	−17°42.0'	q 320	Pup	10"	buona / discreto	gruppo di oltre 40 stelle di luminosità abbastanza uniforme, esteso meno di 10' e che presenta una forma vagamente romboidale; è interessante la parte sud-orientale ove si nota un semicerchio di stelline che pare un collier di piccole perle — 118x.
NGC 2480	gx	07h57m10s	+23°46.8'	q 140	Gem	16"	m. buona / scarso	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti circa 1.5' in direzione NW-SE. La 1ª è molto debole, piccola, di luminosità uniforme e di forma indistinta; la 2ª è relativamente brillante, dai bordi netti ed elevato gradiente di luce; è allungata da NE a SW di dimensioni 1.5'×45" — 132x.
NGC 2481	gx	07h57m14s	+23°46.0'	q 140	Gem	16"	m. buona / scarso	v. **NGC 2480**
NGC 2482	aa	07h57m10s	−24°15.0'	q 320	Pup	6"	m. buona / buono	gruppo di forma assai irregolare di dimensioni di una decina di primi; a 86x si contano una dozzina di componenti di cui 4 abbastanza brillanti; un piccolo triangolo molto allungato di stelle brillanti si trova a NE dell'ammasso.
NGC 2483	aa	07h55m39s	−27°53.2'	q 320	Pup	6"	m. buona / buono	gruppo disperso di stelle deboli: se ne contano 7 o 8 a 86x; una coppia larga di stelle brillanti situata verso E probabilmente non ne fa parte.
NGC 2484	gx	07h58m28s	+37°47.2'	q 101	Lyn	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 380x.
NGC 2485	gx	07h56m49s	+07°28.7'	q 185	CMi	24"	ottima / buono	presenta un nucleo quasi stellare molto brillante circonfuso da un alone assai stemperato sul fondo cielo, circolare con Ø di 1'; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
NGC 2486	gx	07h57m56s	+25°09.7'	q 140	Gem	24"	buona / buono	debole e molto diffusa, con piccolo bulge ovale poco contrastato sul disco; è allungata da E a W con dimensioni 70"×35" — 340x (era visibile, seppur molto debolmente anche nel 10").
NGC 2487	gx	07h58m20s	+25°09.0'	q 140	Gem	24"	buona / buono	molto stemperata sul fondo cielo, con piccolo bulge evidente quasi stellare, rotonda con Ø di 80"; a 340x notasi abbastanza facilmente, in visione distolta, una tenue barra spessa 10"-15" che corre diametralmente alla gx da NE a SW; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso S e un'altra più debole a SE (anche questa era visibile, molto debolmente, nel 10").
NGC 2488	gx	08h01m46s	+56°33.2'	q 43	Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 80"×40", con bulge brillante, a tratti debolmente screziato di dimensioni 30"×20" (era visibile abbastanza facilmente anche nel 10" a 118x e in condizioni di cielo analoghe) — 495x.
NGC 2489	aa	07h56m16s	−30°03.9'	q 362	Pup	6"	m. buona / ottimo	pressoché circolare, del Ø di ~ 3', appare leggermente granulato solo a 86x in visione distolta.
NGC 2490	gx	07h59m18s	+27°04.7'	q 140	Gem	16"	ottima / m. buono	molto debole e molto piccola, di dimensioni 30"×20", orientata da NE a SW con piccolo nucleo stellare visibile solo a tratti — 380x.
NGC 2491	gx	07h58m27s	+07°59.0'	q 185	CMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni di 30"×15" e con tenue nucleo stellare; situata 3.7' a SW di NGC 2496 — 450x.
NGC 2492	gx	07h59m30s	+27°01.6'	q 140	Gem	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di 45"; presenta una condensazione centrale contrastata e un nucleo stellare (era relativamente facile da vedere nel 10" in visione distolta a 178x e in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 2493	gx	08h00m24s	+39°49.8'	q 69	Lyn	16"	m. buona / m. buono	rotonda, con Ø > 1', diffusa, con alto gradiente di luce e brillante nucleo di aspetto stellare — 380x.
NGC 2494	gx	07h59m07s	−00°38.3'	q 230	Mon	16"	buona / ottimo	debole e molto piccola, diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso del bordo occidentale — 188x.
NGC 2495	gx	08h00m33s	+39°50.4'	q 69	Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, estesa 15"-20", appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x a ridosso verso W di una stellina.
NGC 2496	gx	07h58m37s	+08°01.7'	q 185	Cmi	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina al bordo occidentale — 450x.
NGC 2497	gx	08h02m11s	+56°56.6'	q 43	Lyn	28"	m. buona / ottimo	presenta un piccolo bulge brillante circonfuso da un alone rotondo con Ø di 1' che si stempera gradualmente sul fondo cielo; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NE (era osservabile molto debolmente nel 10" a 178x in condizioni di cielo simili) — 495x.
NGC 2498	gx	07h59m39s	+24°58.9'	q 140	Gem	24"	buona / buono	poco diffusa, allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×40"; presenta un piccolo bulge abbastanza marcato di aspetto quasi stellare (era visibile molto debolmente anche nel 10") — 340x.
NGC 2499	gx	07h58m52s	+07°29.5'	q 185	CMi	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 50"×30"; è situata tra 2 deboli stelline: una a 1' NE e l'altra poco più distante a SW; c'è una doppia abbastanza stretta quasi a ridosso verso W; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 2500	gx	08h01m54s	+50°44.3'	q 43	Lyn	28"	m. buona / buono	è una bella chiazza rotonda, con Ø di quasi un paio di primi, ma con gradiente di luce molto basso; debolmente screziata a 495x, anche se la visione è preferibile scalando a 291x, in quanto appare ben inserita nel campo stellare; è situata in un quadrilatero di stelle: la più brillante, di 11-esima grandezza, si trova a 1.5' verso SSW; simmetricamente, a NNE, ce n'è una di 12-esima; le altre due si trovano rispettivamente a 1' SE e 1' NW (quest'ultima è la più debole). Appariva molto debolmente e assai stemperata sul fondo cielo nel 10" a 126x in condizioni di cielo analoghe.
NGC 2501	gx	07h58m30s	−14°21.3'	q 275	Ori	16"	buona / m. buono	facile, abbastanza brillante, con nucleo marcato e puntiforme e disco diffuso, approssim. circolare con Ø > di 1': è immersa in un campo molto ricco di stelline — 270x.
NGC 2503	gx	08h00m37s	+22°24.0'	q 140	Cnc	16"	m. buona / scarso	diffusa, rotonda, di luminosità uniforme, di poco meno di 1' di Ø e situata a poco più di 1' WNW di una stellina brillante — 132x.
NGC 2504	gx	07h59m52s	+05°36.5'	q 185	CMi	16"	buona / ottimo	piccola e debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; è immersa in una zona ricca di stelline — 188x.
NGC 2505	gx	08h04m07s	+53°33.0'	q 43	Lyn	10"	buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 178x, allungata da N a S con dimensioni 60"×30".
NGC 2506	aa	08h00m02s	−10°46.2'	q 275	Mon	6"	buona / ottimo	stupendo, molto ricco, compatto e granulato, approssim. circolare con Ø di 5'; situato tra 2 bande di scure marcate; sembra una versione in tono minore di M11 — 30x.
NGC 2507	gx	08h01m37s	+15°42.6'	q 185	Cnc	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e con alto gradiente di luce, poco allungata da NE a SW, approssim. circolare con Ø di 1.5'; il bulge è abbastanza esteso e contrastato sul disco; l'alone lambisce una debole stellina a SW; un'altra stellina si trova a ridosso N del bulge; a E di questo appaiono a momenti alcune tenuissime irregolarità di luce (già precedentemente osservata col 10" a 178x) — 450x.
NGC 2508	gx	08h01m57s	+08°33.1'	q 185	CMi	16"	buona / m. buono	piccola, rotonda, abbastanza compatta, con Ø di ~ 45", condensazione centrale molto tenue visibile solo a tratti; è equidistante da 2 stelline distanti una 30-ina di secondi e orientate E-W — 270x.
NGC 2509	aa	08h00m48s	−19°03.0'	q 320	Pup	10"	buona / discreto	oggetto molto irregolare formato da 2 blocchi con una sorta di gap centrale che a bassi ingrandimenti ricorda l'ingresso di un tunnel..È esteso al massimo 8' e a 118x resta ancora parzialmente irrisolto; le stelle sono di luminosità molto diseguale; quelle delle regioni più interne, specie a ridosso del gap, creano uno strano effetto tridimensionale.
NGC 2510	gx	08h02m11s	+09°29.1'	q 185	CMi	16"	buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme a tratti appare orientata da E a W con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 2511	gx	08h02m15s	+09°23.7'	q 185	CMi	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni di 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso NW — 450x.
NGC 2512	gx	08h03m08s	+23°23.5'	q 140	Cnc	16"	ottima / m. buono	gx abbastanza facile, allungata in direzione ~ E-W, di dimensioni 45"×30", con basso gradiente di luce e diffuso ai bordi — 380x.
NGC 2513	gx	08h02m25s	+09°24.8'	q 185	CMi	24"	ottima / buono	bella, presenta un bulge rotondo con Ø di una 20-ina di secondi con all'interno un nucleo stellare molto tenue, il tutto circonfuso da un alone molto diffuso con Ø di 1.5'; più interessante e meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 2514	gx	08h02m50s	+15°48.5'	q 185	Cnc	10"	discreta / ottimo	più debole di NGC 2507 e di aspetto un po' confuso; è grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso e di luminosità uniforme; è situata 3' WSW di una stellina che dovrebbe essere doppia (ma le componenti, orientate da N a S, non sono separate da più di 2" o 3") — 178x.
NGC 2517	gx	08h02m47s	−12°19.0'	q 275	Pup	16"	buona / m. buono	piccola, brillante, con alto gradiente di luce, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a NE accompagnata, a mo' di minuscolo arco, da altre 2 deboli stelline in direzione della galassia — 270x.
NGC 2518	gx	08h07m20s	+51°08.0'	q 43	Lyn	28"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, a prima vista rotonda con Ø di 1', ma osservando attentamente si nota che è in realtà leggermente allungata da NE a SW con dimensioni 60"×50" (appariva molto debole, diffusa e rotonda nel 10" a 178x) — 495x.
NGC 2521	gx	08h08m49s	+57°46.2'	q 43	Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte di un sestetto la cui appartenenza sarà indicata di volta in volta — debole, diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×45" e con piccola condensazione centrale — 380x.
NGC 2522	gx	08h06m14s	+17°42.4'	q 140	Cnc	16"	m. buona / scarso	abbastanza facile, piccola, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" con bulge evidente — 132x.
NGC 2523	gx	08h15m00s	+73°34.7'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	molto diffusa, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 2'×1'; si vede facilmente la barra centrale estesa 1' e orientata in direzione ortogonale e al centro della quale un nucleo quasi stellare poco contrastato sul disco (era visibile molto debolmente anche nel 10" a 126x e in condizioni di cielo simili) — 360x.
NGC 2523A	gx	08h04m08s	+74°02.9'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è un minuscolo triangolo rettangolo con componenti molto deboli 1' SE e una stellina a 1' verso N — 360x.
NGC 2523B	gx	08h12m56s	+73°33.8'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×20" e con piccolo bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante praticamente al centro della gx; c'è una stellina brillante a 1' SW e una debole alla stessa distanza verso NW — 360x.
NGC 2523C	gx	08h17m44s	+73°19.0'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con piccola condensazione centrale poco contrastata; c'è una doppia sbilanciata a 1' SE — 360x.
NGC 2524	gx	08h08m10s	+39°09.4'	q 69	Lyn	10"	buona / buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di 1' scarso e gradatamente più brillante verso l'interno; meglio definita a 178x.
NGC 2525	gx	08h05m38s	−11°25.6'	q 275	Pup	24"	ottima / ottimo	facile, poco diffusa, con gradiente di luce molto basso, orientata da E a W, di dimensioni 2'×1.5' e con piccolo nucleo poco contrastato; 4 stelline allineate a S della gx terminanti con una sorta di "manico" ricurvo ricordano vagamente una pastorale; una stellina appena percettibile si trova al bordo NW; meglio definita a 340x (appariva molto debolmente anche nel 10").
NGC 2526	gx	08h06m58s	+08°00.2'	q 185	Cnc	16"	m. buona / ottimo	debole, ma con un'evidente condensazione centrale, diffusa, allungata da NW a SE — come le 2 stelline doppie situate a NE — di dimensioni 40"×20' *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 2527	aa	08h04m55s	−28°08.0'	q 362	Pup	6"	m. buona / ottimo	gruppo disperso di una dozzina di stelle di forma vagamente quadrangolare.
NGC 2528	gx	08h07m25s	+39°11.7'	q 69	Lyn	10"	buona / discreto	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, rotondeggiante, con Ø max di 1'; è situata 2.5' SE di una stellina brillante.
NGC 2529	gx	08h07m55s	+17°49.0'	q 140	Cnc	24"	buona / buono	è un'estesa chiazza diffusa di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N. È altresì denominata NGC 2530 o 2531 — 340x.
NGC 2532	gx	08h10m15s	+33°57.5'	q 101	Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa, con basso gradiente di luce e priva di dettagli, rotonda con Ø di 1.5'; forma un piccolo triangolo isoscele schiacciato con 2 stelline abbastanza brillanti situate a NE — 380x.
NGC 2533	aa	08h07m00s	−29°52.0'	q 362	Pup	6"	m. buona / ottimo	molto piccolo e debole, di dimensioni poco superiore a 2'; rimane nebuloso anche a 86x; c'è una stella molto brillante al bordo meridionale.
NGC 2534	gx	08h12m54s	+55°40.3'	q 43	Lyn	10"	ottima / buono	relativamente brillante, di luminosità pressoché uniforme approssim. rotonda con Ø di 1'; in parte disturbata dalla SAO 26726 di 8ª grandezza situata 3' a N — 178x.
NGC 2535	gx	08h11m13s	+25°12.4'	q 140	Cnc	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; ci sono 3 stelline quasi allineate subito a W — 380x.
NGC 2536	gx	08h11m16s	+25°10.8'	q 140	Cnc	16"	ottima / ottimo	situata 1.5' a SSE di NGC 2535, è una piccola galassia rotonda di 30" di Ø, diffusa e leggermente condensata — 380x.

NGC 2537	gx	08h13m14s	+45°59.5'	q 69	Lyn	24"	m. buona / discreto	brillante, ma con basso gradiente di luce, relativamente compatta e di aspetto un po' irregolare, grosso modo rotonda con Ø superiore a 1'; presenta due caratteristiche simili a "ditate" poco contrastate e orientate da N a S (una 3a ditata quella più orientale, appare solo elusivamente per contrasto con quella centrale); c'è un nodulo (o forse una stellina) appena percettibile al bordo N; una 2a stellina evidente si trova a 1' NE e una 3a brillante a un paio di primi scarsi SE (la gx era stata osservata nel 10" in condizioni di trasparenza e seeing molto buoni, ma anche a 190x era di aspetto uniforme) — 450x.
NGC 2537A	gx	08h13m41s	+45°59.6'	q 69	Lyn	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
NGC 2538	gx	08h11m23s	+03°38.0'	q 230	CMi	16"	buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e poco più luminosa verso l'interno; c'è una debole stellina subito a NW e un'altra abbastanza brillante a 1.5' verso SE — 188x.
NGC 2539	aa	08h10m38s	−12°49.2'	q 275	Pup	24"	m. buona / discreto	un ricco brulichio di stelle brillanti con basso range di luminosità e a forma di triangolo curvilineo molto allungato da E a W ed esteso una 20-ina di primi (il vertice più acuto punta a E); una stella brillante giallo-oro, la 19 Puppis di magnitudo 4.7, si trova a SE (l'ammasso era già facilmente osservabile nel 6") — 110x.
NGC 2540	gx	08h12m46s	+26°21.7'	q 140	Cnc	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; situata tra due stelline orientate da NE a SW (quella a NE è più debole) — 450x.
NGC 2541	gx	08h14m40s	+49°03.7'	q 69	Lyn	24"	discreta / m. buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, situata tra 2 stelle brillanti distanti 7.5' in direzione NE-SW; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 4'×2', di luminosità uniforme e maggiormente sfumata dalla parte meridionale; meglio contrastata a 340x (era visibile, al limite, nel 10" a 60×in una serata con ottima trasparenza).
NGC 2543	gx	08h12m58s	+36°15.3'	q 101	Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, orientata da NE a SW con dimensioni 90"×60"; appare leggermente screziata a 380x; c'è un bell'asterismo foggiato a "Y" allungata a 11' SE.
NGC 2544	gx	08h21m40s	+73°59.3'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e gradatamente più brillante verso l'interno (appariva molto debolmente nel 10" a 118x); forma una coppia ravvicinata con **CGCG 331-37** situata a poco più di 1' verso NW — 360x.
NGC 2545	gx	08h14m14s	+21°21.3'	q 140	Cnc	10"	buona / discreto	debole, orientata all'incirca da N a S, di dimensioni 90"×45" con basso gradiente di luce, più interessante a 178x; c'è una debole stellina a ridosso del bordo N.
NGC 2546	aa	08h12m24s	−37°37.0'	q 362	Pup	10"	buona / buono	gruppo disperso di stelle abbastanza brillanti esteso 1° scarso e nel quale si contano agevolmente una 40-ina di componenti di luminosità assai diseguale; è meglio evidente a 63x.
NGC 2549	gx	08h12m58s	+57°48.2'	q 43	Lyn	10"	buona / m. buono	facile, molto allungata da N a S con dimensioni 3'×1', relativamente compatta e con nucleo quasi stellare.
NGC 2550	gx	08h24m34s	+74°00.7'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con bulge esteso molto tenue; c'è una stellina a ridosso W (era osservabile molto debolmente nel 10", ma maggiormente disturbata dalla SAO 6528 di magnitudo 7.7 situata ad appena 2.5' verso E) — 360x.
NGC 2550A	gx	08h28m40s	+73°44.9'	q 7	Cam	16"	m. buona / ottimo	diffusa, di luminosità uniforme, estesa per ~ 1.5', con con una stellina brillante a ridosso di SW; in visione distolta sembra muoversi come..un'ameba — 270x.
NGC 2551	gx	08h24m50s	+73°24.7'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	brillante, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 70"×35", con piccolo bulge evidente e nucleo stellare; c'è una stellina molto debole a bordo NE (appariva debole nel 10" a 118x) — 360x.
NGC 2552	gx	08h19m20s	+50°00.5'	q 43	Lyn	28"	m. buona / buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, ma di aspetto un po' confuso a 495x (meglio scalare gli ingrandimenti), allungata da NE a SW con dimensioni 2'×1'; ci sono 3 deboli stelline che formano un piccolo triangolo rettangolo a ridosso NE della gx, mentre 2 stelle brillanti si trovano rispettivamente a 3' NE e 2' NW (appariva molto debole e stemperata nel 10" a 63x e in condizioni di cielo analoghe).
NGC 2554	gx	08h17m54s	+23°28.3'	q 140	Cnc	16"	ottima / ottimo	diffusa, con condensazione centrale evidente, allungata ~ da N a S, dimensioni 45"×30" — 380x.
NGC 2555	gx	08h17m56s	+00°44.7'	q 231	Hya	24"	discreta / m. buono	molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1.5', ma la forma è di fatto un po' compromessa dalla presenza di alcune stelline sovrapposte; lo stesso nucleo è di aspetto stellare (quasi si trattasse di una stella al centro); una coppia ravvicinata di stelline orientate da E a W si trova a NW del nucleo; una doppia stretta sbilanciata si trova a ridosso verso N, mentre una stellina brillante si trova subito a SE (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10", nel quale a 178x la gx sembrava compresa tra le 2 stelline a NW e a SE) — 450x.
NGC 2556	gx	08h19m01s	+20°56.2'	q 141	Cnc	16"	ottima / ottimo	piccola e molto debole e molto diffusa, con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione centrale quasi stellare osservabile a 380x.
NGC 2557	gx	08h19m11s	+21°26.2'	q 141	Cnc	16"	ottima / m. buono	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
NGC 2558	gx	08h19m13s	+20°30.6'	q 141	Cnc	10"	discreta / scarso	molto debole, grosso modo rotonda con Ø di circa 1' e assai stemperata sul fondo cielo; presenta una condensazione centrale visibile in visione distolta a 178x, anche se la galassia è meglio visibile scalando a 118x.
NGC 2559	gx	08h17m06s	−27°27.4'	q 321	Pup	16"	ottima / discreto	chiazza di aspetto un po' irregolare (forse anche a causa delle numerose stelline di campo presenti); è allungata da N a S, di luminosità uniforme e dimensioni grosso modo di 2'×1'; nella parte meridionale la gx lambisce un piccolo triangolo rettangolo, mentre un'altra stellina si trova a ridosso verso NNW — 270x.
NGC 2560	gx	08h19m54s	+20°59.1'	q 141	Cnc	16"	m. buona / m. buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×20", relativamente compatta e con piccolo bulge di aspetto quasi stellare — 380x.
NGC 2561	gx	08h19m37s	+04°39.4'	q 231	Hya	24"	buona / discreto	allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30", piccolo bulge contrastato e nucleo stellare evidente (era visibile, anche se molto debolmente, nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2562	gx	08h20m24s	+21°07.9'	q 141	Cnc	16"	ottima / ottimo	ovale di 45"×30" orientata da N a S, poco diffuso e con condensazione centrale evidente — 380x.
NGC 2563	gx	08h20m36s	+21°04.0'	q 141	Cnc	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, di Ø 45" e con piccola condensazione centrale quasi stellare visibile a 380x.
NGC 2564	gx	08h18m30s	−21°48.9'	q 321	Pup	16"	ottima / discreto	piccola, diffusa, con nucleo stellare abbastanza marcato, estesa non più di 30" o 40"; c'è una stellina a 1' scarso verso W — 270x.
NGC 2565	gx	08h19m48s	+22°01.8'	q 141	Cnc	24"	m. buona / ottimo	orientata da N a S, presenta un piccolo bulge marcato quasi stellare e un tenue disco molto diffuso che in visione distolta è di circa 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante verso il bordo meridionale — 450x.
NGC 2566	gx	08h18m45s	−25°30.0'	q 321	Pup	16"	ottima / discreto	oggetto diffuso di aspetto un po' irregolare, diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da ENE a WSW con dimensioni 1.5'×1'; c'è una nodulo brillante o una stellina a ridosso verso NW; il campo è molto ricco di stelline; ho dovuto scalare a 188x perché, essendo molto bassa, il seeing non è buono — 270x.
NGC 2567	aa	08h18m30s	−30°38.7'	q 362	Pup	6"	m. buona / ottimo	assieme a NGC 2571, 2580 e 2587 costituisce un quartetto di piccoli ammassi situati entro 2 gradi quadrati di cielo e posti a losanga irregolare; il 1° è il più interessante, compatto granulato, foggiato a semicerchio; il 2° è poco più esteso, disperso, con stelle di luminosità assai diseguale; il 3° è debole, compatto ma molto povero; il 4°, infine, è debolissimo e a bassi ingrandimenti è di aspetto nebuloso, più difficile del precedente.
NGC 2569	gx	08h21m21s	+20°52.1'	q 141	Cnc	16"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta, tenue condensazione centrale di aspetto stellare e di Ø max 20"; c'è un piccolo triangolo compatto di stelline a poco più di 1' verso E — 380x.
NGC 2570	gx	08h21m23s	+20°54.6'	q 141	Cnc	16"	ottima / m. buono	molto debole, osservabile in visione distolta, molto diffusa e di dimensioni simili a NGC 2569, dalla quale dista 2.5' verso N — 380x.
NGC 2571	aa	08h18m57s	−29°45.0'	q 362	Pup	6"	m. buona / ottimo	v. **NGC 2567**
NGC 2572	gx	08h21m25s	+19°08.9'	q 141	Cnc	16"	ottima / m. buono	molto debole, piccola e compatta, di luminosità uniforme, dimensioni 30"×15" e orientata da NW a SE: c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 380x.
NGC 2574	gx	08h20m48s	−08°55.1'	q 276	Hya	16"	buona / m. buono	estesa, con bassa luminanza superficiale e basso gradiente di luce; in visione distolta appare orientata da NNE a SSW e di dimensioni 2'×1'; ci sono molte stelline brillanti nel campo fra cui 3 in fila presso il bordo meridionale — 270x.
NGC 2575	gx	08h22m45s	+24°17.8'	q 141	Cnc	16"	ottima / ottimo	debole, molto stemperata sul fondo cielo, di forma un po' irregolare, grosso modo rotonda, con Ø < 1'; ci sono due stelline a ridosso: una a S e l'altra a W; quella a S è più brillante — 380x.
NGC 2576	gx	08h22m58s	+25°44.3'	q 141	Cnc	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW e con dimensioni 30"×20"; si osserva meglio a 380x.
NGC 2577	gx	08h22m44s	+22°33.2'	q 141	Cnc	16"	ottima / m. buono	bella, brillante, allungata ~ da E a W, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente e nucleo di aspetto stellare — 380x.
NGC 2578	gx	08h21m24s	−13°19.1'	q 276	Pup	24"	m. buona / m. buono	presenta un piccolo nucleo brillante circonfuso da un alone tenue e stemperato sul fondo cielo; la gx appare allungata da E a W con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina a ridosso del nucleo verso NE; un'altra stellina si trova a 1' SW — 450x.
NGC 2580	aa	08h21m29s	−30°18.0'	q 363	Pup	6"	m. buona / ottimo	v. **NGC 2567**
NGC 2581	gx	08h24m31s	+18°35.8'	q 141	Cnc	10"	discreta / scarso	debolissima, quasi elusiva, visibile solo a momenti a 178x 4' NNE di una stella giallastra abbastanza brillante.
NGC 2582	gx	08h25m12s	+20°20.1'	q 141	Cnc	10"	discreta / scarso	molto debole e di luminosità uniforme, visibile a tratti in visione distolta a 178x, probabilmente rotonda con Ø di 1' scarso; forma un triangolo rettangolo con 2 stelline abbastanza brillanti il cui cateto maggiore è costituito dalle 2 componenti orientate da NNE a SSW; la gx è situata a un paio di primi ESE rispetto alla stella più a S.
NGC 2583	gx	08h23m08s	−05°00.1'	q 231	Hya	24"	buona / m. buono	fa parte, assieme a NGC 2584 e 2585, di un terzetto di galassie allineate da NE a SW su un'estensione di 7' — abbastanza compatta e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
NGC 2584	gx	08h23m15s	−04°58.2'	q 231	Hya	24"	buona / m. buono	alquanto debole e molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 400x.
NGC 2585	gx	08h23m26s	−04°54.9'	q 231	Hya	24"	buona / m. buono	allungata da E a W con dimensioni 60"×40", diffusa gradatamente più brillante verso l'interno — 400x.
NGC 2586	gx	08h24m32s	−04°53.3'	q 231	Hya	16"	m. buona / m. buono	debolissima, forse allungata da N a S per una 40-ina di secondi, grosso modo allineata con 2 deboli stelline situate a W — 270x.
NGC 2587	aa	08h23m25s	−29°30.5'	q 363	Pup	6"	m. buona / ottimo	v. **NGC 2567**
NGC 2590	gx	08h25m02s	−00°35.4'	q 231	Hya	24"	discreta / m. buono	molto diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 2'×30" e con tenue bulge poco contrastato; poco meglio evidente e contrastata scalando a 340x (appariva solo elusivamente nel 10" a 178x).
NGC 2591	gx	08h37m25s	+78°01.5'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	bella, relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30" e con bulge molto diffuso e poco contrastato; c'è una stellina a 1' SW (ma spostata verso W rispetto all'asse della gx) — 360x.
NGC 2592	gx	08h27m08s	+25°58.2'	q 141	Cnc	16"	ottima / ottimo	brillante, rotonda, con alto gradiente di luce, poco diffusa, Ø 40"; a bassi ingrandimenti potrebbe essere scambiata per un piccolo globulare — 380x.
NGC 2593	gx	08h26m48s	+17°22.5'	q 141	Cnc	24"	buona / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 50"×30" (già osservata col 16" nel quale, tuttavia, appariva di luminosità uniforme) — 450x.
NGC 2594	gx	08h27m17s	+25°52.7'	q 141	Cnc	24"	m. buona / buono	molto diffusa e con bulge contrastato, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso S — 450x.
NGC 2595	gx	08h27m42s	+21°28.8'	q 141	Cnc	24"	m. buona / buono	molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina al bordo NE e una più debole subito a NW; un tenuissimo baffo osservabile a tratti in visione distolta aggetta verso N (la gx era debolmente visibile anche nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 2596	gx	08h27m26s	+17°17.0'	q 141	Cnc	16"	buona / m. buono	molto debole e molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 90"×30" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 2598	gx	08h30m02s	+21°29.3'	q 141	Cnc	24"	m. buona / buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e con nucleo puntiforme abbastanza evidente (appariva elusivamente in visione distolta nel 10" a 178x, ma non ne capivo la forma) — 450x.
NGC 2599	gx	08h32m11s	+22°33.6'	q 141	Cnc	24"	m. buona / buono	molto brillante e diffusa, rotonda con Ø di oltre 1', presenta un bulge esteso una 30-ina di secondi con all'interno un nucleo stellare evidente (era facilmente osservabile nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 2600	gx	08h34m45s	+52°43.0'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	fa parte assieme a NGC 2602 e 2603 di un terzetto di galassie difficili da osservare — molto debole, molto allungata E a W, di dimensioni 60"×30" con debole bulge poco estesa e appena più brillante del disco — 188x.
NGC 2602	gx	08h35m04s	+52°49.9'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 2603	gx	08h35m34s	+52°47.3'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	debole, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo evidente; c'è una stellina appena percettibile a quasi a ridosso verso SE; altresì designata come **NGC 2606** — 188x.
NGC 2604	gx	08h33m23s	+29°32.3'	q 102	Cnc	16"	m. buona / ottimo	facile da vedere, ma piuttosto debole, diffusa e di aspetto un po' irregolare; è grosso modo rotonda con Ø > 1' e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelline distanti una 20-ina di secondi di subito a NW al limite della visibilità, ma osservabili senza tanti problemi a 380x.
NGC 2607	gx	08h33m57s	+26°58.3'	q 141	Cnc	24"	buona / ottimo	piuttosto debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a 1' verso WSW (appariva elusivamente nel 10") — 340x.
NGC 2608	gx	08h35m17s	+28°28.4'	q 141	Cnc	24"	buona / ottimo	bella, allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×45", diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con piccolo nucleo quasi stellare; c'è una stellina a pochi secondi NW del nucleo (già precedentemente osservata nel 10") — 450x.
NGC 2610	np	08h33m23s	−16°09.0'	q 276	Hya	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 50-ina di secondi (1' scarso, per intenderci) di luminosità uniforme e coi bordi leggermente sfumati; c'è una stella a ridosso NW; la stellina centrale non è visibile neppure a 570x; l'osservazione è stata effettuata senza filtro (era debolmente visibile anche nel 10").
NGC 2611	gx	08h35m29s	+25°01.6'	q 141	Cnc	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×13" (vale a dire un rapporto di 3 a 1) e con bulge tenue poco contrastato (era evanescente e appariva solo a momenti nel 10" a 118x) — 450x — q 141.
NGC 2612	gx	08h33m50s	−13°10.5'	q 276	Hya	16"	buona / m. buono	bella, brillante, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30" con bulge evidente, estesa e nucleo puntiforme; è situata tra 2 stelline brillanti distanti un paio di primi e orientate da N a S — 270x.
NGC 2613	gx	08h33m23s	−22°58.4'	q 321	Pyx	24"	buona / ottimo	bella, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 5'×1', con piccolo bulge contrastato di 30"×20" su un disco molto diffuso alle estremità WNW ed ESE; c'è una stellina al bordo N, all'incirca a metà del fuso e un'altra più debole a quello NE (quest'ultimo sembra quasi un nodulo della gx); una stellina brillante si trova quasi a ridosso W; un piccolo arco di 3 stelline equidistanti e più o meno della stessa luminosità si diparte verso N (già precedentemente osservata, seppure molto debolmente, nel Comet-Tracker) — 340x.
NGC 2614	gx	08h42m48s	+72°58.6'	q 22	UMa	10"	discreta / scarso	molto debole, di forma grosso modo circolare con Ø di oltre 1' e assai stemperata sul fondo cielo; è osservabile in visione distolta preferibilmente a 118x, perché a 178x tende a estinguersi.
NGC 2615	gx	08h34m33s	−02°32.8'	q 231	Hya	24"	discreta / m. buono	molto diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 2'×1' e con piccola condensazione centrale abbastanza marcata; la gx è meglio definita scalando a 340x, ma a 450x appaiono 3 stelline appena percettibili: una all'interno verso NE e le altre 2 ai margini E e SW (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10" a 118x).
NGC 2616	gx	08h35m34s	−01°50.9'	q 231	Hya	24"	buona / discreto	poco allungata da N a S con dimensioni 60"×50", diffusa, a tratti leggermente screziata a 450x e con bulge estesa ; c'è una stellina al bordo N e un'altra abbastanza brillante quasi a ridosso verso NE (debolmente osservabile anche nel 10") — 450x.
NGC 2617	gx	08h35m39s	−04°05.3'	q 231	Hya	24"	buona / buono	brillante, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, rotonda con Ø di 45" e condensazione centrale evidente; c'è una stellina all'interno verso il bordo meridionale e un'altra quasi a ridosso a SSE (debolmente osservabile anche nel 10" a 178x) — 280x.
NGC 2618	gx	08h35m54s	+00°42.4'	q 231	Hya	10"	buona / discreto	debole, diffusa, approssim. circolare con Ø di 1.5' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza evidente a ridosso verso E.
NGC 2619	gx	08h37m33s	+28°42.3'	q 141	Cnc	24"	buona / ottimo	è di dimensioni grosso modo simili a NGC 2608, ma con gradiente di luce più basso; leggermente screziata a 340x (già debolmente visibile nel 10").
NGC 2620	gx	08h37m28s	+24°56.8'	q 141	Cnc	24"	m. buona / buono	diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×20" e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
NGC 2621	gx	08h37m37s	+25°00.0'	q 141	Cnc	24"	m. buona / buono	molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; situata tra una stellina abbastanza brillante a E una debole verso W — 450x.
NGC 2622	gx	08h38m11s	+24°53.7'	q 141	Cnc	24"	m. buona / buono	molto diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con evidente condensazione centrale — 450x.
NGC 2623	gx	08h38m24s	+25°45.3'	q 141	Cnc	24"	buona / ottimo	relativamente compatta, con tenue condensazione centrale quasi stellare, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso N e una poco più brillante a 1.5' NW (era elusiva nel 10") — 340x.
NGC 2624	gx	08h38m10s	+19°43.5'	q 141	Cnc	24"	ottima / molto buono	assieme alla successiva è una delle galassiette del Praesepe — poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
NGC 2625	gx	08h38m23s	+19°43.0'	q 141	Cnc	24"	ottima / molto buono	poco più debole e più piccola della precedente, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
NGC 2627	aa	08h37m15s	−29°57.0'	q 363	Pyx	6"	m. buona / ottimo	allungato da E a W con dimensioni grosso modo di 8'×4' e granulato a 86x; è leggermente arcuato con la concavità rivolta verso N.
NGC 2628	gx	08h40m23s	+23°32.4'	q 141	Cnc	24"	buona / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina brillante subito a NNE (già precedentemente osservata, seppure molto debolmente, nel 10") — 340x.
NGC 2629	gx	08h47m16s	+72°59.1'	q 22	UMa	16"	ottima / discreto	molto compatta, relativamente brillante, con Ø di 45"; sembra un piccolo ammasso globulare; c'è una stellina a 1' verso SE *(presenza di chiarore lunare)* — 188x.
NGC 2630	gx	08h45m35s	+73°00.0'	q 22	UMa	16"	ottima / discreto	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata all'incirca da N a S ed estesa ~ 1.5'; è situata 1.5' a S di una stellina *(presenza di chiarore lunare)* — 188x.
NGC 2633	gx	08h48m04s	+74°06.0'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	molto debole e leggermente screziata a 360x, gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi nel centro (solo appena spostata verso S). La gx era comunque visibile nel 10" a 188x, anche se ne avevo sovrastimato le dimensioni).
NGC 2634	gx	08h48m25s	+73°58.1'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di 1', molto diffusa e con nucleo stellare marcato (anche questa era visibile senza problemi nel 10" a 188x) — 360x.
NGC 2634A	gx	08h48m37s	+73°56.3'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20" — 360x.
NGC 2636	gx	08h48m24s	+73°40.3'	q 7	Cam	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare poco contrastato (già debolmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2637	gx	08h41m13s	+19°41.5'	q 141	Cnc	16"	m. buona / ottimo	fa parte delle galassiette del **Praesepe** — debolissimo lucore esteso una 30-ina di secondi visibile solo a momenti e con difficoltà in visione distolta a 380x; è situato nella parte centrale di M44.
NGC 2638	gx	08h42m26s	+37°13.3'	q 102	Lyn	10"	buona / buono	brillante e relativamente compatta, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 80"×20" e con piccola condensazione centrale molto evidente; c'è una stellina brillante quasi sul prolungamento dell'asse maggiore della gx a 1.5' di distanza verso ENE (già debolmente visibile nel 10", compreso il nucleo quasi stellare) — 450x.
NGC 2639	gx	08h43m38s	+50°12.3'	q 44	UMa	10"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 1.5'×1'.
NGC 2641	gx	08h47m57s	+72°53.7'	q 22	UMa	16"	ottima / discreto	debole, con nucleo puntiforme che risalta abbastanza nettamente su un tenue alone circonfuso; è rotonda con Ø di 1' *(presenza di chiarore lunare)* — 188x.
NGC 2642	gx	08h40m44s	−04°07.3'	q 231	Hya	24"	discreta / m. buono	è una chiazza circolare molto diffusa, con Ø di 1.5' e una condensazione centrale appena percettibile; più interessante a 340x; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso del nucleo verso SE e una più debole praticamente al margine N; tra queste 2 appare, solo a momenti, una terza stellina appena percettibile (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10" a 178x dove però era maggiormente disturbata da quel triangolo equilatero di stelle brillanti situato subito a S).
NGC 2643	gx	08h41m52s	+19°42.1'	q 141	Cnc	16"	m. buona / ottimo	fa parte delle galassiette del **Praesepe** — molto debole, ma più compatta e piccola della 2637, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
NGC 2644	gx	08h41m32s	+04°58.8'	q 231	Hya	10"	buona / discreto	molto debole, diffusa ed estesa ~ 1', con una condensazione centrale visibile abbastanza facilmente a 178x.
NGC 2646	gx	08h50m22s	+73°27.8'	q 7	Cam	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 1' e alto gradiente di luce; presenta un nucleo di aspetto stellare molto evidente; c'è una stellina subito a SW (facilmente visibile anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2647	gx	08h42m43s	+19°39.0'	q 141	Cnc	16"	m. buona / ottimo	poco più brillante ed estesa di NGC 2643, rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
NGC 2648	gx	08h42m40s	+14°17.1'	q 186	Cnc	10"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×30", con un nucleo molto luminoso e bordi abbastanza ben definiti; è situata tra 2 stelline, una abbastanza brillante a E e l'altra molto debole a SW.
NGC 2649	gx	08h44m08s	+34°43.0'	q 102	Lyn	24"	discreta / m. buono	poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, perfettamente rotonda con Ø di una 70-ina di secondi e debolmente screziata a 450x; c'è una stellina abbastanza brillante al margine N (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10" a 118x×in buone condizioni di visibilità).
NGC 2650	gx	08h49m58s	+70°18.0'	q 22	UMa	24"	ottima / m. buono	presenta un bulge di 30"×20" orientato da E a W circonfuso da un tenue alone molto stemperato sul fondo cielo di dimensioni grosso modo 60"×45"; tre stelline si trovano a ridosso della gx: a N, NE e una più debole subito a S (era già osservabile nel 10" a 178x, comprese le 3 stelline!) — 450x.
NGC 2651	gx	08h43m55s	+11°46.3'	q 186	Cnc	24"	ottima / m. buono	è una debole chiazza diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
NGC 2654	gx	08h49m12s	+60°13.3'	q 44	UMa	10"	ottima / buono	è una edge-on estesa per almeno 3', orientata da ENE a WSW; a tratti in visione distolta appare un piccolo nucleo di aspetto stellare.
NGC 2655	gx	08h55m39s	+78°13.5'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	molto bella, sembra fatta a isofote: presenta un nucleo luminoso debolmente screziato circonfuso da una zona brillante leggermente ovale di dimensioni 50"×40" e orientata da E a W; questa è immersa in una chiazza molto diffusa grosso modo circolare con Ø di una paio di primi scarsi; c'è una stellina a ridosso SW e una poco più distante a W (era una gx facile nel 10" a 126x) — 360x.
NGC 2656	gx	08h47m53s	+53°52.6'	q 44	UMa	16"	buona / buono	molto debole, rotondeggiante con Ø inferiore a 1', molto diffusa e poco più brillante verso l'interno; è situata a ~ 3' verso E della più brillante di una coppia di stelle distanti 1' e orientate da E a W — 188x.
NGC 2657	gx	08h45m16s	+09°38.8'	q 186	Cnc	16"	buona / m. buono	debole, di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø di 1' e una stellina a ridosso verso E — 270x.
NGC 2661	gx	08h46m00s	+12°37.2'	q 186	Cnc	16"	m. buona / buono	è grosso modo circolare con Ø di 1', poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W; meglio visibile scalando a 132x.
NGC 2662	gx	08h45m32s	−15°08.3'	q 276	Hya	16"	buona / m. buono	debole, di aspetto un po' irregolare, ma probabilmente rotonda con Ø di 45" e poco più brillante al centro; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso W e una molto debole a ridosso del bordo di NE — 270x.
NGC 2665	gx	08h46m01s	−19°18.1'	q 321	Hya	16"	ottima / discreto	facile, relativamente compatta, ma con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 90"×45" — 270x.
NGC 2667	gx	08h48m27s	+19°01.1'	q 142	Cnc	24"	m. buona / buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15", diffusa e con nucleo stellare evidente — 450x.
NGC 2668	gx	08h49m23s	+36°42.6'	q 102	Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; allineata ed equidistante con 2 stelline a NE — 450x.
NGC 2672	gx	08h49m22s	+19°04.5'	q 142	Cnc	24"	buona / ottimo	brillante e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 1.5' e con nucleo stellare; in visione distolta arriva ad avviluppare NGC 2673 situata a ridosso E; quest'ultima è più piccola e debole, rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale evidente (erano entrambe visibili nel 10" a 178x e 240x) — 450x.
NGC 2673	gx	08h49m24s	+19°04.4'	q 141	Cnc	24"	buona / ottimo	v. **NGC 2672**
NGC 2675	gx	08h52m05s	+53°37.1'	q 44	UMa	10"	buona / mediocre	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme; approssim. circolare con Ø di 1'; è situata un paio di primi NW di una stellina abbastanza brillante; un'altra stellina molto più debole si trova più o meno alla stessa distanza verso W — 178x.
NGC 2676	gx	08h51m36s	+47°33.5'	q 70	UMa	16"	m. buona / buono	debole, piccola, diffusa, approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 2677	gx	08h50m01s	+19°00.6'	q 142	Cnc	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
NGC 2679	gx	08h51m33s	+30°51.9'	q 102	Cnc	10"	buono / ottimo	debole, relativamente compatta, rotonda con Ø >1' e marcata condensazione centrale; c'è una stellina a un paio di primi verso S; altresì nota come NGC 2680 — 178x.
NGC 2681	gx	08h53m33s	+51°18.9'	q 44	UMa	10"	buona / m. buono	presenta un nucleo molto brillante, quasi stellare e un estesa alone circonfuso molto tenue con Ø di quasi 3'; ci sono 2 stelline vicinissime che lambiscono l'alone verso W.
NGC 2683	gx	08h52m41s	+33°25.0'	q 102	Lyn	16"	m. buona / discreto	brillante e con alto gradiente di luce, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 6'×1' e con bulge diffuso; appare leggermente arcuata con la concavità rivolta verso NW; un piccolo arco di 3 deboli stelline attraversa la gx verso NE; un'altra stellina si trova al bordo NE; appare appena screziata a 380x.
NGC 2684	gx	08h54m54s	+49°09.6'	q 70	UMa	16"	m. buona / m. buono	fa parte di un piccolo gruppo di galassie molto difficili — questa però è facile, diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×40" di luminosità uniforme — 270x.
NGC 2685	gx	08h55m35s	+58°44.0'	q 44	UMa	10"	ottima / buono	poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1' e un nucleo molto brillante.
NGC 2686	gx	08h54m59s	+49°08.5'	q 70	UMa	16"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, probabilmente allungata da E a W e con dimensioni 30"×15" (da un controllo successivamente effettuato è però risultato che la gx è di fatto rotonda e l'allungamento è causato dalla compagna — NGC 2686B — che non sono riuscito a risolvere neppure spingendo a 380x).
NGC 2687	gx	08h55m06s	+49°09.4'	q 70	UMa	16"	m. buona / buono	è una piccola gx orientata da N a S, con dimensioni 30"×20" e osservabile una 30-ina di secondi a E di una stellina — 270x.
NGC 2688	gx	08h55m12s	+49°07.3'	q 70	UMa	16"	m. buona / buono	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta, ma alternando gli occhi; a 270x sembra poco più di una stellina sfocata, con Ø non superiore a 10"-15".
NGC 2689	gx	08h55m15s	+49°09.1'	q 70	UMa	16"	m. buona / buono	elusiva come NGC 2688, dalla quale dista 1.5' verso N, anche questa appare solo a momenti con dimensioni simili — 270x.
NGC 2690	gx	08h52m38s	−02°36.2'	q 232	Hya	16"	buona / ottimo	debole e diffusa, con basso gradiente di luce, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20"; si trova al vertice rettangolo di un triangolo molto allungata formato con 2 stelle di 10ª grandezza — 188x.
NGC 2691	gx	08h54m47s	+39°32.3'	q 70	Lyn	16"	m. buona / buono	relativamente Facile, con alto gradiente di luce, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", diffusa con piccolo nucleo puntiforme; c'è una stellina a 30" dal margine settentrionale — 270x.
NGC 2692	gx	08h56m58s	+52°03.9'	q 44	UMa	16"	mediocre / scarso	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccola condensazione centrale abbastanza marcata; c'è una stellina molto debole a meno di 1' verso N — 188x.
NGC 2693	gx	08h56m59s	+51°20.9'	q 44	UMa	10"	buona / m. buono	poco allungata da N a S con dimensioni 1.5'×1', diffusa e con alto gradiente di luce.
NGC 2694	gx	08h56m59s	+51°19.9'	q 44	UMa	16"	mediocre / scarso	piccolissimo piccola galassia molto diffuso, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale tenue, ma evidente; è situata a circa 1' a S di NGC 2693 osservata tuttavia col 10" in altra data — 188x.
NGC 2695	gx	08h54m27s	−03°04.0'	q 232	Hya	24"	buona / discreto	poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, brillante, ma con gradiente di luce piuttosto basso; è situata tra 2 stelle: una abbastanza brillante quasi a ridosso verso W e l'altra, più debole, al margine opposto — 400x.
NGC 2697	gx	08h55m00s	−02°59.2'	q 232	Hya	10"	buona / ottimo	molto diffusa e poco più brillante verso l'interno; rotonda a prima vista, ma a 188x, in visione distolta, appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 90"×60".
NGC 2698	gx	08h55m36s	−03°11.0'	q 232	Hya	16"	m. buona / ottimo	è allungata da E a W, di dimensioni 80"×40", diffusa, con nucleo stellare brillante e marcato; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
NGC 2699	gx	08h55m49s	−03°07.6'	q 232	Hya	16"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di 45", alto gradiente di luce e nucleo di aspetto stellare; situata tra 2 stelline: quella a ridosso di SW è appena percettibile — 380x.
NGC 2701	gx	08h59m06s	+53°46.2'	q 44	UMa	10"	m. buona / m. buono	debole, poco allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 1.5'×1' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso del margine occidentale.
NGC 2702	gx	08h55m37s	−03°03.2'	q 232	Hya	16"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, estesa non più di 25"-30"; appare solo in visione distolta, meglio a 380x.
NGC 2704	gx	08h56m48s	+39°23.0'	q 70	Lyn	20"	m. buona / mediocre	piuttosto debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 360x.
NGC 2706	gx	08h56m12s	−02°33.8'	q 232	Hya	10"	buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×20" e di luminosità un poco irregolare; abbastanza definita ai bordi E e W; c'è una stellina brillante a 1.5' SE — 118x.
NGC 2708	gx	08h56m08s	−03°21.6'	q 232	Hya	24"	m. buono / ottimo	bella, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con ampio bulge abbastanza contrastato; molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'×45", a tratti debolmente screziata nella zona più esterna; c'è una stellina a ridosso NE e un'altra di luminosità simile a 1' NW (era visibile molto debolmente anche nel 10" a 178x, comprese le 2 stelline a NE e NW) — 450x.
NGC 2709	gx	08h56m13s	−03°14.6'	q 232	Hya	10"	ottima / m. buono	debolissima, appare elusivamente in visione distolta a 178x, e solo a momenti, a poco più di 1' E di una stellina molto debole; non dovrebbe comunque essere più estesa di 30".
NGC 2710	gx	08h59m49s	+55°42.3'	q 44	UMa	10"	buona / mediocre	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 90"×45"; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW, ma è visibile solo a momenti a 178x.
NGC 2711	gx	08h57m24s	+17°17.3'	q 142	Cnc	16"	buona / m. buono	debole ovale di dimensioni 30"×15" e orientato all'incirca da E a W, che a tratti appare poco più brillante verso l'interno; c'è una debole stellina a 1' verso NE — 270x.
NGC 2712	gx	08h59m31s	+44°54.8'	q 70	Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 2'×1' e con piccolo bulge brillante; c'è una coppia serrata di deboli stelline a ridosso S (appariva debolmente nel 10" a 126x) — 495x.
NGC 2713	gx	08h57m21s	+02°55.4'	q 232	Hya	24"	buona / discreto	allungata da WNW a ESE, di dimensioni 90"×45", molto diffusa, con bulge estesa e poco contrastato sul disco e tenue nucleo di aspetto quasi stellare; appare meglio contrastata scalando a 280x.
NGC 2715	gx	09h08m07s	+78°05.2'	q 8	Cam	20"	m. buona / ottimo	molto diffusa, molto allungata da NNE a SSW e di aspetto uniforme salvo un piccolo bulge, tenue e debolmente contrastato sul disco (era visibile nel 10", anche se ne avevo un po' sovrastimato le dimensioni) — 360x.
NGC 2716	gx	08h57m36s	+03°05.4'	q 232	Hya	24"	buona / discreto	rotonda, con alto gradiente di luce, Ø < di 1' e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' SE; meglio contrastata a 280x.
NGC 2717	gx	08h57m01s	−24°40.4'	q 322	Pyx	16"	ottima / ottimo	facile, diffusa, con alto gradiente di luce ed evidente condensazione centrale, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 2718	gx	08h58m50s	+06°17.6'	q 187	Hya	24"	m. buono / ottimo	diffusa e con piccola condensazione centrale quasi stellare, molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30"; in visione distolta appare come immersa in un alone circonfuso molto tenue, ma l'effetto si apprezza meglio scalando a 340x.
NGC 2719	gx	09h00m15s	+35°43.7'	q 103	Lyn	28"	ottima / m. buono	forma una coppia serrata con la successiva situata a ridosso S — molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15, poco diffusa e di luminosità uniforme — 495x.
NGC 2719A	gx	09h00m16s	+35°43.2'	q 103	Lyn	28"	ottima / m. buono	forma una coppia serrata con la precedente situata a ridosso N — allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20", diffusa e con tenue condensazione centrale — 495x.
NGC 2720	gx	08h59m08s	+11°09.0'	q 187	Cnc	16"	m. buona / buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di 1' scarso e gradatamente più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 2721	gx	08h58m57s	−04°54.1'	q 232	Hya	16"	ottima / buono	facile, diffusa, con basso gradiente di luce, allungata da NNW a SSE con dimensioni 90"×60"; presenta un piccolo nucleo visibile a momenti — 270x.
NGC 2722	gx	08h58m46s	−03°42.6'	q 232	Hya	16"	buona / ottimo	poco allungata da E a W con dimensioni 90"×60", assai stemperata sul fondo cielo e con basso gradiente di luce; c'è una stellina abbastanza brillante a un paio di primi scarsi NW — 188x.
NGC 2723	gx	09h00m14s	+03°10.7'	q 232	Hya	10"	buona / discreto	molto piccola e debole, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
NGC 2724	gx	09h01m02s	+35°45.7'	q 103	Lyn	28"	ottima / m. buono	debole chiazza ovale orientata da N a S, di dimensioni 90"×45", diffusa e con gradiente di luce molto basso — 495x.
NGC 2725	gx	09h01m03s	+11°05.8'	q 187	Cnc	16"	m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stella doppia larga dalle componenti molto deboli a un paio di primi scarsi verso SE — 188x.
NGC 2726	gx	09h04m57s	+59°56.0'	q 44	UMa	10"	buona / mediocre	debole, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e di luminosità a tratti un poco irregolare; forma un triangolo equilatero assieme a 2 stelline orientate da NE a SW: quella a NE è più luminosa — 178x.
NGC 2728	gx	09h01m41s	+11°05.0'	q 187	Cnc	16"	m. buona / buono	è di aspetto simile alla 2725 dalla quale dista 9' verso E; è poco più debole e più diffusa, ma di Ø simile; c'è una stellina appena percettibile al bordo orientale; una stellina abbastanza brillante si trova invece a un paio di primi verso W — 188x.
NGC 2729	gx	09h01m29s	+03°47.3'	q 232	Hya	16"	buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa, estesa < 30", con una stellina appena percettibile a ridosso del bordo orientale; è situata 3' a N di una doppia brillante con componenti abbastanza serrate — 188x.
NGC 2730	gx	09h02m16s	+16°50.3'	q 187	Cnc	24"	m. buono / ottimo	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 80"×60"; c'è una stellina evidente a ridosso S; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 2731	gx	09h02m08s	+08°18.1'	q 187	Cnc	16"	m. buona / buono	si vede una sorta di piccola "barra" orientata da NE a SW immersa in un alone più tenue estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso del margine NE — 188x.
NGC 2732	gx	09h13m24s	+79°11.3'	q 8	Cam	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 1.5'×30", con bulge brillante e contrastato e nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E; una doppia stretta e sbilanciata si trova 1.5' verso W (era debolmente visibile anche nel 10") — 450x.
NGC 2734	gx	09h03m02s	+16°51.8'	q 187	Cnc	24"	m. buono / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; è situata sul lato sud-orientale di un piccolo asterismo di 5 stelle a forma di losanga — 450x.
NGC 2735	gx	09h02m39s	+25°56.0'	q 142	Cnc	16"	discreta / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con un tenue nucleo stellare visibile a tratti — 380x.
NGC 2735A	gx	09h02m42s	+25°56.3'	q 142	Cnc	16"	discreta / ottimo	molto piccola e debole, ma visibile senza problemi, compatta, con Ø max di 10"-15"; situata a ridosso NE di NGC 2735 — 380x.
NGC 2737	gx	09h04m00s	+21°54.4'	q 142	Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con condensazione centrale contrastata — 450x.
NGC 2738	gx	09h04m00s	+21°58.1'	q 142	Cnc	24"	m. buona / ottimo	facile, allungata da NE a SW (come la precedente), di dimensioni 60"×30" e con basso gradiente di luce — 450x.
NGC 2739	gx	09h06m03s	+51°44.7'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	galassietta molto tenue, piccola e condensata, di aspetto quasi stellare a 132x; situata a 1' S di una stellina brillante — 188x.
NGC 2740	gx	09h06m05s	+51°44.1'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	situata a una 40-ina di secondi SSE di NGC 2739, è una gx elusiva che appare solo a momenti in visione distolta a ~ 30" NE di una debole stellina; non è più estesa di 30" — 188x.
NGC 2742	gx	09h07m33s	+60°28.8'	q 44	UMa	10"	ottima / buono	è un ovale brillante, ma a con basso gradiente di luce, orientata da E a W e con dimensioni 2'×1'; c'è una stella brillante a ~ 4' verso NW.
NGC 2742A	gx	09h09m58s	+62°14.8'	q 23	UMa	16"	m. buona / mediocre	relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, dimensioni 60"×30"; appare maggiormente allungata in visione distolta — 270x.
NGC 2743	gx	09h04m54s	+25°00.2'	q 142	Cnc	16"	discreta / ottimo	è un debole lucore molto diffuso, approssim. circolare con Ø 1', appena più brillante all'interno; c'è una stellina a ~ 1' verso N — 380x.
NGC 2744	gx	09h04m39s	+18°27.8'	q 142	Cnc	24"	buona / buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 70"×35" e con basso gradiente di luce; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E (la gx era a mala pena osservabile in visione distolta nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2745	gx	09h04m39s	+18°15.4'	q 142	Cnc	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione stellare evidente (era appena visibile in visione laterale nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2746	gx	09h06m00s	+35°22.7'	q 103	Lyn	10"	ottima / buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di oltre 1' e con tenue condensazione centrale osservabile in visione distolta; c'è una stellina abbastanza brillante che ne lambisce il bordo settentrionale; la galassia appare comunque meglio definita scalando a 118x.
NGC 2747	gx	09h05m18s	+18°26.5'	q 142	Cnc	24"	buona / buono	relativamente compatta e leggermente condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
NGC 2748	gx	09h13m44s	+76°28.6'	q 8	Cam	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, di aspetto molto regolare, a tratti debolmente screziata nella parte più interna; è allungata da NE a SW con dimensioni 2.5'×45"; c'è una debole stellina quasi a ridosso SW; un asterismo di 5 stelle brillanti foggiato a "Y" si trova subito a N; più interessante a 340x (era debolmente visibile anche nel 10").
NGC 2749	gx	09h05m21s	+18°18.8'	q 142	Cnc	24"	buona / ottimo	bella, debolmente screziata a 340x, presenta una zona centrale brillante circonfusa da un alone rotondo con Ø di 1'; è visibile al centro il nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso E (era già osservabile senza difficoltà nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 2750	gx	09h05m48s	+25°26.1'	q 142	Cnc	16"	buona / mediocre	pressoché circolare, con Ø di ~ 2', con nucleo piccolo di aspetto stellare e poco contrastato sul disco *(presenza di chiarore lunare)* — 270x.
NGC 2751	gx	09h05m32s	+18°15.7'	q 142	Cnc	24"	buona / ottimo	molto diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
NGC 2752	gx	09h05m43s	+18°20.3'	q 142	Cnc	24"	buona / ottimo	molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.

NGC 2753	gx	09h07m08s	+25°20.5'	q 142	Cnc	16"	discreta / ottimo	è un piccolo e debole ovale relativamente compatto, orientato da N a S, di dimensioni 30"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ~ 1' verso NW — 380x.
NGC 2754	gx	09h05m11s	−19°05.1'	q 322	Hya	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 40"; solo a tratti appare una condensazione centrale molto tenue di aspetto stellare — 270x.
NGC 2755	gx	09h07m58s	+41°42.6'	q 70	Lyn	16"	buona / m. buono	debole e situata in un piccolo campo quasi depleto; è un ovale orientata da NW a SE, di dimensioni 60"×40" e di luminosità pressoché uniforme, salvo un piccolo nucleo stellare visibile, però, solo a tratti. L'unico valido riferimento per trovarla è una stella doppia situata una dozzina di primi verso E — 270x.
NGC 2756	gx	09h09m01s	+53°50.9'	q 44	UMa	16"	discreta / buono	molto diffusa e con alto gradiente di luce, orientata da N a S con dimensioni 80"×40" — 188x.
NGC 2758	gx	09h05m31s	−19°02.6'	q 322	Hya	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto allungata da N a S per Ø 1.5', ma molto stemperata sul fondo cielo; presenta un piccolo bulge abbastanza evidente di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 2759	gx	09h08m37s	+37°37.3'	q 103	Lyn	10"	ottima / buono	molto debole, rotonda con Ø di 1' scarso e con condensazione centrale evidente anche in visione diretta a 178x.
NGC 2761	gx	09h07m31s	+18°26.1'	q 142	Cnc	16"	ottima / ottimo	ovale molto debole, piuttosto compatto, di luminosità uniforme, di dimensioni 30"×20" e orientata all'incirca da N a S — 380x.
NGC 2762	gx	09h09m55s	+50°25.1'	q 44	UMa	16"	mediocre / scarso	debolissima, molto piccola e con nucleo di aspetto stellare; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata 3' a WNW di NGC 2767 osservata però in altra data; c'è una stellina un paio di primi a N — 188x.
NGC 2763	gx	09h06m50s	−15°30.0'	q 277	Hya	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 1.5'; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 270x.
NGC 2764	gx	09h08m17s	+21°26.6'	q 142	Cnc	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con bulge estesa e poco contrastato sul disco; c'è una stellina a 1' verso SE; situata tra 2 stelle brillanti orientate da NNW a SSE e distanti poco più di 4' — 450x.
NGC 2765	gx	09h07m37s	+03°23.5'	q 232	Hya	24"	buona / discreto	allungata grosso modo da E a W, di dimensioni 70"×30", con bulge diffuso, poco contrastato e nucleo quasi stellare — 400x.
NGC 2766	gx	09h08m47s	+29°51.8'	q 103	Cnc	10"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, piccola e relativamente compatta; a 178x appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una doppia abbastanza serrata con componenti molto deboli un paio di primi a N; una stellina appena più brillante si trova 1.5' a E.
NGC 2767	gx	09h10m12s	+50°24.1'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	fa parte assieme a NGC 2769 e a NGC 2771 di un terzetto di galassie abbastanza facili; a queste, tuttavia, dovremmo aggiungere anche la debolissima NGC 2762, sopra descritta, ma osservata in data successiva — poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensata — 188x.
NGC 2768	gx	09h11m38s	+60°02.4'	q 44	UMa	16"	ottima / buono	è una gx molto bella, orientata da E a W, di dimensioni 4'×2', con bulge evidente, ben contrastato sul disco e di aspetto leggermente screziato a 270x; a questo ingrandimento appare altresì senza difficoltà un nucleo stellare.
NGC 2769	gx	09h10m32s	+50°26.0'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	fa parte del terzetto di a NGC 2767 — molto allungata da NW a SE per 2' scarsi e con bulge molto brillante — 188x.
NGC 2770	gx	09h09m34s	+33°06.3'	q 103	Lyn	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da NW a SE con dimensioni 3'×45" (ossia con rapporto di 4 a 1), poco diffusa e di luminosità uniforme; è meglio contrastata a 270x.
NGC 2771	gx	09h10m40s	+50°22.8'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	fa parte del terzetto di a NGC 2767 — meno evidente della 2767, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" e appena più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 2772	gx	09h07m42s	−23°37.0'	q 322	Pyx	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa con bulge poco più evidente, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30", ma di aspetto un po' confuso; è situata a S di una stringa di 2 stelline brillanti orientata da NNE a SSW — 270x.
NGC 2773	gx	09h09m44s	+07°10.4'	q 187	Cnc	24"	buona / buono	allungata da E a W, di dimensioni 30"×15", con piccolo bulge diffuso appena più brillante — 400x.
NGC 2774	gx	09h10m40s	+18°41.8'	q 142	Cnc	16"	ottima / ottimo	tenue lucore rotondo e diffuso, di luminosità uniforme, Ø 30"40" con una debole stellina a ridosso verso W — 380x.
NGC 2775	gx	09h10m20s	+07°02.3'	q 187	Cnc	24"	buona / buono	bella, molto diffusa, sembra fatta a isofote: un piccolo nucleo di aspetto quasi stellare, subito all'esterno un bulge evidente, rotondo con Ø di ~ 1' e infine un alone che si stempera via via sul fondo cielo; la gx è leggermente ovale, orientata da N a S con dimensioni 3'×2.5'; indubbiamente si apprezza meglio scalando a 200x.
NGC 2776	gx	09h12m14s	+44°57.3'	q 71	Lyn	28"	m. buona / ottimo	bella, molto diffusa, rotonda con Ø di un paio di primi scarsi; presenta un bulge brillante circonfuso da un disco non uniforme in luminosità dovuto alla presenza dei bracci spirale che tuttavia non si risolvono; c'è una debole stellina al bordo SE; un elusivo nodulo al bordo E che appare solo a momenti è risultato essere il nucleo di **MAC 0912+4457** il cui disco però si confonde con quello della galassia principale (la gx appariva debolmente nel 10" a 127x)— 495x.
NGC 2777	gx	09h10m42s	+07°12.3'	q 187	Cnc	24"	buona / buono	abbastanza brillante, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 400x.
NGC 2778	gx	09h12m24s	+35°01.7'	q 103	Lyn	10"	ottima / buono	rotonda con Ø di 1', relativamente compatta e con piccola condensazione centrale evidente — 178x.
NGC 2779	gx	09h12m28s	+35°03.2'	q 103	Lyn	16"	buona / m. buono	debolissima! In visione distolta appare molto diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata 2' a NE di NGC 2778 — 380x.
NGC 2780	gx	09h12m44s	+34°55.5'	q 103	Lyn	10"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è situata a circa 1.5' E di una doppia molto stretta e sbilanciata — 178x.
NGC 2781	gx	09h11m28s	−14°49.0'	q 277	Hya	16"	m. buona / ottimo	presenta un bulge brillante con nucleo stellare circonfuso da un disco molto tenue e diffuso; è allungata da E a W con dimensioni 90"×45" — 270x.
NGC 2782	gx	09h14m05s	+40°06.8'	q 71	Lyn	28"	m. buona / discreto	è una gx molto diffusa, con un piccolo bulge rotondo di una 20-ina di secondi molto brillante; il disco, con Ø di un paio di primi, è di aspetto uniforme e si stempera gradualmente sul fondo cielo; una debolissima chiazza di ~ 80"×40" e orientata da N a S si trova 2' a E dal centro della gx, presumibilmente in corrispondenza di un braccio separato; a ridosso W di questo c'è una stellina (era visibile nel 10" a 188x) — 495x.
NGC 2783	gx	09h13m39s	+29°59.5'	q 103	Cnc	16"	buona / m. buono	relativamente brillante, con marcata condensazione centrale, poco allungata all'incirca da N a S e di dimensioni 60"×40" — 380x.
NGC 2783B	gx	09h13m33s	+30°00.0'	q 103	Cnc	16"	buona / m. buono	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
NGC 2784	gx	09h12m19s	−24°10.4'	q 322	Hya	10"	buona / discreto	molto brillante, diffusa e con gradiente di luce elevato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 4'×2'; c'è una stellina all'estremità orientale.
NGC 2785	gx	09h15m15s	+40°55.0'	q 71	Lyn	16"	mediocre / discreto	debole, allungata da WNW a ESE, di luminosità uniforme e dimensioni 90"×30"; c'è una debole stellina a una 40-ina di secondi dal margine NNE — 270x.
NGC 2787	gx	09h19m18s	+69°12.2'	q 23	UMa	10"	buona / m. buono	facile, con bulge brillante, allungata da E a W con dimensioni 3'×1.5'.
NGC 2789	gx	09h15m00s	+29°43.8'	q 103	Cnc	10"	ottima / buono	debole, rotonda con Ø di 1', molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante un paio di primi a NW — 178x.
NGC 2790	gx	09h15m03s	+19°41.8'	q 142	Cnc	16"	buona / ottimo	piccola galassietta rotonda relativamente compatta, di luminosità uniforme e con Ø di 20"-25" — 270x.
NGC 2791	gx	09h15m02s	+17°35.5'	q 142	Cnc	16"	buona / m. buono	debole, poco allungata da N a S, di dimensioni ~ 60"×30", con bulge evidente, diffuso; c'è una stellina a ridosso verso E — 270x.
NGC 2793	gx	09h16m46s	+34°25.9'	q 103	Lyn	10"	ottima / buono	molto debole, piccola, di aspetto un po' confuso; forse rotonda con Ø di 45"; è situata appena all'esterno del lato orientale di un triangolo perfettamente equilatero al cui vertice settentrionale si trova una stellina doppia.
NGC 2794	gx	09h16m02s	+17°35.4'	q 142	Cnc	16"	buona / m. buono	assieme alla successiva forma una coppia di galassie di aspetto simile distanti poco più di 2' in direzione N-S; la 1ª è poco più brillante; sono entrambe rotonde, con Ø di ~ 1' e con condensazione centrale diffusa — 270x.
NGC 2795	gx	09h16m04s	+17°37.7'	q 142	Cnc	16"	buona / m. buono	v. **NGC 2794**
NGC 2796	gx	09h16m42s	+30°54.9'	q 103	Cnc	10"	ottima / buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo; sembra di aspetto un po' confuso a 178x, forse rotonda con Ø di ~ 1' e di luminosità pressoché uniforme.
NGC 2797	gx	09h16m22s	+17°43.6'	q 142	Cnc	16"	buona / m. buono	piuttosto debole, di Ø inferiore a 1' e luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 2798	gx	09h17m23s	+42°00.0'	q 71	Lyn	24"	ottima / buono	allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'×1', con piccolo bulge molto brillante e nucleo stellare; più diffusa e stemperata dalla parte meridionale; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina brillante a 1.5' NNE (era già facilmente visibile nel 10" a 178x in condizioni di visibilità simili).
NGC 2799	gx	09h17m31s	+41°59.6'	q 71	Lyn	24"	ottima / buono	più debole e poco meno estesa di NGC 2798 — situata 1.5' a WNW — molto allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30", con basso gradiente di luce e tenue bulge molto diffuso; c'è una stellina a ridosso verso N; anche questa appare meglio contrastata a 340x (osservabile elusivamente anche nel 10" a 178x).
NGC 2800	gx	09h18m35s	+52°30.9'	q 44	UMa	10"	discreta / ottimo	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso NW; una doppia stretta si trova un paio di primi a SW; a 4' scarsi verso SE c'è poi la SAO 27206 di 9ª grandezza che interferisce un po' con le osservazioni — 178x.
NGC 2801	gx	09h16m44s	+19°56.1'	q 142	Cnc	24"	ottima / buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso — 450x
NGC 2802	gx	09h16m41s	+18°57.8'	q 142	Cnc	16"	ottima / ottimo	Sono 2 oggetti rotondi molto piccoli e deboli distanti meno di 1' in direzione NW-SE; il 2° è poco più brillante e più grande; le dimensioni sono rispettivamente di 20" e 30"; sono meglio osservabili a 380x.
NGC 2803	gx	09h16m44s	+18°57.3'	q 142	Cnc	16"	ottima / ottimo	v. **NGC 2802**
NGC 2804	gx	09h16m50s	+20°11.9'	q 142	Cnc	16"	m. buona / scarso	è una delle più brillanti del gruppo di cui fa parte la 2801; è diffusa, con basso gradiente di luce, rotondeggiante con Ø maggiore di 1' — 132x.
NGC 2805	gx	09h20m20s	+64°06.1'	q 23	UMa	10"	buona / buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo visibile solamente a tratti in visione distolta a 178x; grosso modo rotonda con Ø di almeno di 3'.
NGC 2806	gx	09h17m01s	+20°02.2'	q 142	Cnc	16"	buona / m. buono	assieme a NGC 2807 forma una coppia di gx di aspetto molto diverso: la 1ª è, tutto sommato, abbastanza facile, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; la 2ª invece debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta a 1' SW della precedente; dovrebbe essere rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 2807	gx	09h16m58s	+20°01.7'	q 142	Cnc	16"	buona / m. buono	v. **NGC 2806**
NGC 2809	gx	09h17m07s	+20°04.2'	q 142	Cnc	16"	m. buona / scarso	relativamente brillante ma con basso gradiente di luce, rotondeggiante con Ø attorno a 1'. Assieme alla 2804 è una delle più luminose del gruppo della 2801 — 132x.
NGC 2810	gx	09h22m05s	+71°50.7'	q 23	UMa	24"	m. buona / ottimo	molto brillante e diffusa, rotonda con Ø di 1; presenta un bulge luminoso con Ø di una 20-ina di secondi, contrastato e un nucleo stellare evidente (era visibile anche nel 10"a 178x) — 450x.
NGC 2811	gx	09h16m11s	−16°18.8'	q 277	Hya	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da NNE a SSW, con bulge diffuso, evidente e contrastato; più interessante a 380x; c'è una stellina brillante a 1.5' WNW (ossia a perpendicolo con l'asse della gx).
NGC 2812	gx	09h17m41s	+19°55.1'	q 142	Cnc	24"	ottima / buono	molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme — 450x.
NGC 2813	gx	09h17m45s	+19°54.4'	q 142	Cnc	24"	ottima / buono	diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e una piccola condensazione centrale evidente — 450x.
NGC 2814	gx	09h21m11s	+64°15.1'	q 23	UMa	16"	discreta / buono	piccola e molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto brillante a 1' verso SSW — 188x.
NGC 2815	gx	09h16m19s	−23°38.1'	q 322	Hya	10"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 3'×30".
NGC 2817	gx	09h17m11s	−04°45.2'	q 232	Hya	16"	buona / ottimo	è una chiazza molto debole, di forma indistinta a prima vista, soprattutto se osservata a 188x e di luminosità uniforme; scalando a 132x sembra approssim. circolare con Ø di oltre 1'.
NGC 2819	gx	09h18m09s	+16°11.9'	q 187	Cnc	16"	buona / m. buono	relativamente brillante, approssim. circolare con Ø di ~ 1' e una marcata condensazione centrale — 270x.
NGC 2820	gx	09h21m47s	+64°15.5'	q 23	UMa	16"	discreta / buono	è una lama di luce di aspetto uniforme, orientata da NE a SW, estesa per almeno 3' e di aspetto leggermente screziato a 188x.
NGC 2821	gx	09h16m48s	−26°49.0'	q 322	Pyx	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce, orientata da NE a SW, estesa per almeno 3' e di aspetto screziato — 188x.
NGC 2823	gx	09h16m17s	+34°00.5'	q 103	Lyn	16"	ottima / m. buono	piccola, molto debole, di luminosità uniforme, estesa al massimo per 30"; occorre la visione distolta, perché è disturbata dalla luce di una stellina di 10ª situata a 1' SSW — 270x.
NGC 2824	gx	09h19m02s	+26°16.2'	q 142	Cnc	16"	m. buona / scarso	piccola,compatta, rotonda, abbastanza brillante, con Ø inferiore a 1', con alto gradiente di luce; è situata 3' a W di una stella brillante di 6ª grandezza — 132x.
NGC 2825	gx	09h19m22s	+33°44.5'	q 103	Lyn	16"	m. buona / m. buono	piccola galassietta debole, ma con bulge abbastanza marcato, allungata da E a W e di dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 2826	gx	09h19m24s	+33°37.4'	q 103	Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 1'×20", con bulge marcato e tenuissimo alone osservabile in visione distolta — 270x
NGC 2827	gx	09h19m19s	+33°52.8'	q 103	Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole, ma più evidente e poco più grande di NGC 2828, con dimensioni di 30"; è situata a ~ 1' SSE di una stellina doppia con le componenti molto serrate — 270x.
NGC 2828	gx	09h19m35s	+33°53.3'	q 103	Lyn	16"	ottima / m. buono	debolissima e piccolissima, visibile in visione distolta; in visione diretta appare a tratti di aspetto stellare — 270x.
NGC 2829	gx	09h19m30s	+33°38.9'	q 103	Lyn	16"	m. buona / m. buono	elusiva, appare a momenti in visione distolta a 380x, ma solo come una debolissima stellina appena sfuocata — 270x
NGC 2830	gx	09h19m41s	+33°44.3'	q 103	Lyn	16"	m. buona / m. buono	è posta praticamente di taglio, molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE per circa 1' — 270x
NGC 2831	gx	09h19m45s	+33°44.7'	q 103	Lyn	16"	m. buona / m. buono	è una piccola galassia rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e che presenta un'evidente condensazione centrale; è situata a 20" SW della 2832 osservata in altra data — 270x
NGC 2832	gx	09h19m47s	+33°45.0'	q 103	Lyn	10"	ottima / buono	brillante, rotonda, diffusa, con Ø superiore a 1' con condensazione centrale molto evidente. È la più luminosa di un gruppo che comprende una decina di galassiette deboli, ma per lo più invisibili nel 10".
NGC 2833	gx	09h19m58s	+33°55.6'	q 103	Lyn	16"	ottima / m. buono	è una piccola galassietta di luminosità uniforme allungata ~ da N a S con dimensioni 30"×15" — 270x.
NGC 2834	gx	09h20m02s	+33°42.6'	q 103	Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda, di una 30-ina di secondi al massimo di Ø e con gradiente di luce molto basso di luce — 270x
NGC 2835	gx	09h17m53s	−22°21.4'	q 322	Hya	24"	buona / ottimo	è una debole chiazza appena più brillante verso l'interno, di aspetto un po' irregolare, poco allungata da N a S con dimensioni 4'×3'; c'è una stella al bordo E; è situata in mezzo a 2 stelle brillanti distanti 6' e orientate in direzione WNW-ESE: quella orientale è una doppia serrata (già precedentemente osservata, seppure molto debolmente, nel Comet-Tracker) — 340x.
NGC 2838	gx	09h20m43s	+39°19.0'	q 71	Lyn	28"	m. buona / discreto	relativamente brillante, diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline orientate da E a W subito a N (era osservabile anche nel 10" a 178x) — 495x.
NGC 2839	gx	09h20m36s	+33°39.0'	q 103	Lyn	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, rotondeggiante, con Ø di una 30-ina di secondi; bisogna cercare di tenere fuori campo la SAO 61408 di 9ª grandezza stella brillante situata 7' a N — 270x.
NGC 2840	gx	09h20m53s	+35°22.1'	q 103	Lyn	10"	non registrati	molto debole, visibile in visione indiretta a 178x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è disturbata dalla luce di una stellina abbastanza brillante situata a una 30-ina di secondi verso NW.
NGC 2841	gx	09h22m02s	+50°58.8'	q 44	UMa	16"	ottima / ottimo	stupenda! È allungata da NW a SE con dimensioni 5'×2' e diffusa ai bordi; presenta un bulge piccolo e marcato con nucleo stellare; ci sono 4 stelline di luminosità molto diseguale poste a losanga subito a NW: quella più brillante lambisce il bordo della gx proprio a NW — 380x.
NGC 2843	gx	09h20m29s	+18°55.6'	q 142	Cnc	16"	discreta / ottimo	molto piccola e debole, estesa non più di 10" o 15"; appare a 380x in visione distolta a ridosso verso S di una stellina abbastanza brillante.
NGC 2844	gx	09h21m48s	+40°09.1'	q 71	Lyn	28"	m. buona / discreto	è una bella gx diffusa, con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 80"×40" (era già osservabile nel 10" a 188x) — 495x.
NGC 2848	gx	09h20m10s	−16°31.5'	q 278	Hya	16"	m. buona / ottimo	debole chiazza molto diffusa e con gradiente di luce molto basso di luce, poco allungata da NE a SW e di dimensioni 2'×1.5'; meglio scalare a 270x.
NGC 2850	gx	09h20m57s	−04°56.4'	q 233	Hya	16"	buona / ottimo	molto piccola e di aspetto un po' confuso, grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale di aspetto stellare — 188x.
NGC 2851	gx	09h20m30s	−16°29.7'	q 278	Hya	16"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×20" — 270x.
NGC 2852	gx	09h23m15s	+40°09.8'	q 71	Lyn	16"	mediocre / discreto	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette separate da un paio di primi in direzione N-S; la 1ª è molto debole e presenta un nucleo di aspetto quasi stellare; la 2ª è più facile, allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 45"×30" e con bulge esteso; una stellina appena percettibile è visibile solo a momenti a ridosso S — 270x.
NGC 2853	gx	09h23m17s	+40°12.0'	q 71	Lyn	16"	mediocre / discreto	v. **NGC 2852**
NGC 2854	gx	09h24m03s	+49°12.2'	q 71	UMa	24"	discreta / m. buono	diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40" — 450x (già debolmente visibile nel 10").
NGC 2855	gx	09h21m27s	−11°54.6'	q 278	Hya	16"	m. buona / ottimo	è molto stemperata sul fondo cielo, con bulge diffuso e contrastato sul disco, rotonda con Ø > 1.5' — 380x.
NGC 2856	gx	09h24m16s	+49°14.9'	q 71	UMa	24"	discreta / m. buono	è posta perpendicolarmente a NGC 2855, di dimensioni 60"×30", compatta, brillante e di luminosità uniforme — 450x (già debolmente visibile nel 10").
NGC 2857	gx	09h24m38s	+49°21.3'	q 71	UMa	24"	discreta / m. buono	è una chiazza rotonda esteso un paio di primi con bassissima luminanza superficiale, facilmente visibile a 340x, ma di luminosità uniforme e senza alcuna struttura interna; è situata a ridosso verso E di un piccolo trapezio irregolare formato da 4 stelline (elusivamente osservabile nel 10" a 118x in buone condizioni di visibilità).
NGC 2858	gx	09h22m55s	+03°09.4'	q 233	Hya	16"	buona / ottimo	diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 80"×40" e con nucleo brillante, di aspetto stellare; c'è un piccolo nodulo di luminosità uniforme verso il bordo occidentale (che si tratti di una stellina sovrapposta appena percettibile?) — 188x.
NGC 2859	gx	09h24m19s	+34°30.8'	q 103	LMi	10"	ottima / buono	brillante e molto diffusa, rotonda con Ø di un paio di primi e una condensazione centrale molto luminosa.
NGC 2860	gx	09h24m53s	+41°03.6'	q 71	Lyn	16"	mediocre / discreto	debole, con basso gradiente di luce, stemperata ai bordi, allungata ~ da E a W con dimensioni 90"×45" — 270x.
NGC 2861	gx	09h23m36s	+02°08.2'	q 233	Hya	24"	buona / discreto	rotonda, con Ø poco superiore a 1', gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina a 1' verso E e un'altra di luminosità simile a 1.5' S (era visibile debolmente anche nel 16" a 188×in una serata con buona trasparenza e ottimo seeing) — 188x.
NGC 2862	gx	09h24m55s	+26°46.5'	q 71	Leo	16"	m. buona / scarso	bella, posta di taglio, orientata da NW a SE per oltre 2', con bulge brillante e bordi abbastanza netti — 132x.
NGC 2863	gx	09h23m36s	−10°26.0'	q 278	Hya	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto "spumoso" a 340x e debolmente screziata a 450x, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina al bordo N e un'altra più debole a ridosso verso S (già facilmente osservabile nel 16").
NGC 2864	gx	09h24m15s	+05°56.5'	q 188	Hya	16"	ottima / discreto	è una debole chiazza rotonda di meno di 1' di Ø, di luminosità uniforme e diffusa; c'è una stellina a poco più di 1' verso W — 270x.
NGC 2865	gx	09h23m30s	−23°09.7'	q 323	Hya	10"	buona / discreto	relativamente compatta, rotonda con Ø poco superiore a 1' e marcata condensazione centrale *(presenza di chiarore lunare)*.
NGC 2868	gx	09h23m27s	−10°25.8'		Hya	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con nucleo stellare, allungata da ENE a WSW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso verso E (non è riportata sull'Uranometria: situata a poco più di 2' W di NGC 2863) — 450x.
NGC 2870	gx	09h27m54s	+57°22.5'	q 44	UMa	10"	buona / mediocre	molto debole, di luminosità uniforme, visibile abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 118x; è posta quasi di taglio, orientata da NW a SE ed estesa un paio di primi.
NGC 2872	gx	09h25m43s	+11°25.9'	q 188	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 80" presenta un piccolo bulge brillante, screziato a 450x con all'interno un nucleo stellare (già debolmente visibile nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 2873	gx	09h25m49s	+11°27.2'	q 188	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; è situata 1.5' a NE della coppia formata con NGC 2872 ed NGC 2874 — 450x.
NGC 2874	gx	09h25m47s	+11°27.5'	q 188	Leo	24"	m. buona / ottimo	bella, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30", con bulge diffuso ed esteso, poco contrastato all'interno del quale si nota un nucleo stellare meno marcato di quello presente in NGC 2872 (già debolmente visibile nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 2876	gx	09h25m14s	−06°43.0'	q 278	Hya	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, presenta un nucleo puntiforme evidente e un piccolo alone; appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 2877	gx	09h25m47s	+02°13.7'	q 233	Hya	24"	buona / ottimo	relativamente compatta e abbastanza brillante, ma con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; a poco più di 1' NW salta fuori, in visione distolta, una debolissima chiazza uniforme orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N; da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la MAC 0925+0214 — 450x.
NGC 2878	gx	09h25m48s	+02°05.3'	q 233	Hya	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
NGC 2880	gx	09h29m35s	+62°29.5'	q 23	UMa	16"	ottima / ottimo	orientata da NW a SE, diffusa e di dimensioni 2'×1' scarsi; presenta una zona interna rotonda poco più brillante e un nucleo stellare; una stellina ne lambisce il margine NW e si trova praticamente sul prolungamento dell'asse della galassia (questa stellina fa parte di un piccolo asterismo di 4 deboli componenti foggiato a "L" molto allungata) — 380x.
NGC 2881	gx	09h25m55s	−11°59.7'	q 278	Hya	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia interagente con MAC 0925-1159, dalla quale si separa con una certa fatica; sono entrambe orientate da NE a SW, di luminosità uniforme ed entrambe hanno una stellina alle estremità S (quella della NGC è più evidente); la MAC appare più cicciotta della compagna che è di 30"×20" — 450x.
NGC 2882	gx	09h26m36s	+07°57.3'	q 188	Leo	16"	m. buona / ottimo	facile,gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 2884	gx	09h26m24s	−11°33.3'	q 278	Hya	16"	buona / m. buono	è molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×30" con bulge evidente poco più brillante del disco — 270x.
NGC 2885	gx	09h27m18s	+23°01.2'	q 143	Leo	16"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo puntiforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
NGC 2888	gx	09h26m20s	−28°02.1'	q 364	Pyx	16"	ottima / ottimo	abbastanza luminosa, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" e gradatamente più brillante verso l'interno (al momento dell'osservazione era alta ~ 15° sull'orizzonte) — 270x.
NGC 2889	gx	09h27m13s	−11°38.6'	q 278	Hya	16"	buona / m. buono	bella, brillante, diffusa, con alto gradiente di luce, poco allungata da ~ da N a S con dimensioni 2'×1.5' — 270x.
NGC 2890	gx	09h26m30s	−14°31.7'	q 278	Hya	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, con bassissima luminanza superficiale ed estesa ~ 1'; è disturbata dalla luce della SAO 155191 di 8ª situata 4' a NE — 270x.
NGC 2891	gx	09h26m57s	−24°47.0'	q 323	Pyx	16"	ottima / ottimo	è una bolla rotonda relativamente compatta, con Ø di ~ 1' e con brillante nucleo stellare — 270x.
NGC 2892	gx	09h32m53s	+67°37.0'	q 23	UMa	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 70" (era debolmente visibile nel 10" a 178x in buone condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 2893	gx	09h30m17s	+29°32.4'	q 103	Leo	10"	ottima / buono	non è facile da individuare a prima vista, specialmente a bassi ingrandimenti, perché presenta un nucleo brillante di aspetto stellare e un tenuissimo alone circonfuso che a 60×tende a sparire; è visibile in visione distolta a 178x, approssim. circolare con Ø di ~ 1'; situata 3' a SW di una stella brillante — 178x.
NGC 2894	gx	09h29m30s	+07°43.1'	q 188	Leo	10"	m. buona / m. buono	debole, allungata da N a S per un paio di primi; ci dovrebbero essere sovrapposte un paio di stelline che appaiono solo a momenti a 178x, ma non riesco a capire dove; una abbastanza evidente di trova a 1' SE; a 3' scarsi verso S c'è la SAO 117726 giallo-arancia di 8ª grandezza.
NGC 2895	gx	09h32m25s	+57°29.0'	q 45	UMa	10"	buona / mediocre	è una debolissima galassia di luminosità uniforme che a 178x, in visione distolta, pare leggermente orientata da N a S per meno di 1'.
NGC 2896	gx	09h30m17s	+23°39.8'	q 143	Leo	16"	discreta / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso del bordo occidentale — 380x.
NGC 2897	gx	09h29m46s	+02°12.4'	q 233	Hya	16"	buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a 1.5' W della SAO 117736 di 8ª grandezza che interferisce alquanto con l'osservazione — 188x.
NGC 2898	gx	09h29m46s	+02°03.8'	q 233	Hya	16"	buona / ottimo	è di dimensioni poco superiori a NGC 2897, ma meno diffusa, grosso modo rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina abbastanza a un paio di primi verso W — 188x.
NGC 2900	gx	09h30m15s	+04°08.6'	q 233	Hya	16"	m. buona / m. buono	molto debole e molto stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso SW — 270x.
NGC 2902	gx	09h30m53s	−14°44.1'	q 278	Hya	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con Ø > 1'; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
NGC 2903	gx	09h32m10s	+21°30.0'	q 143	Leo	16"	ottima / m. buono	bella, orientata da N a S con di dimensioni ~ 6'×3'; presenta un bulge di 30"×20" e una tenue barra centrale leggermente ruotata in senso antiorario rispetto all'asse della gx; un nodulo diffuso e poco allungato da NW a SE si trova verso SSW in corrispondenza della barra (NGC 2905), mentre un'altra zona molto più debole è situata diametralmente opposta; c'è una stellina a un paio di primi SE dal centro della galassia — 270x.
NGC 2905	knot	09h32m12s	+21°31.0'		Leo	16"	ottima / m. buono	è un nodulo diffuso e poco allungato da NW a SE e situato in corrispondenza della barra di NGC 2903 verso NNE — 270x.
NGC 2906	gx	09h32m06s	+08°26.6'	q 188	Leo	16"	buona / m. buono	bella, abbastanza brillante, ma con gradiente di luce piuttosto basso è allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 2907	gx	09h31m37s	−16°44.1'	q 278	Hya	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e con elevato gradiente di luce, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 90"×60" e con nucleo stellare abbastanza evidente; è tuttavia meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 2908	gx	09h43m31s	+79°42.1'	q 8	Hya	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W osservabile a 380x.
NGC 2911	gx	09h33m46s	+10°09.1'	q 188	Leo	24"	m. buona / discreto	presenta un bulge rotondo, molto brillante circonfuso da un alone tenue che si stempera abbastanza rapidamente sul fondo cielo, pure rotondo con Ø di un paio di primi; c'è un nodulo o una stellina appena percettibile a ridosso del nucleo verso NW (la gx era facilmente visibile anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2912	gx	09h33m51s	+10°09.6'	q 188	Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 10-ina di secondi e priva di condensazione; appare in visione distolta a 450x a ridosso verso W di una stellina molto debole (è una sorta di "foruncolo" della 2911).
NGC 2913	gx	09h34m03s	+09°28.8'	q 188	Leo	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 2914	gx	09h34m03s	+10°06.6'	q 188	Leo	24"	m. buona / discreto	allungata da N a S con dimensioni 45"×30", poco diffusa e con piccolo nucleo rotondo molto marcato; c'è una stellina subito a E (già precedentemente osservata nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2916	gx	09h34m58s	+21°42.3'	q 143	Leo	16"	buona / ottimo	brillante, ma con basso gradiente di luce, diffusa, allungata da NNE a SSW e dimensioni 90"×60" — 270x.
NGC 2917	gx	09h34m27s	−02°30.3'	q 233	Hya	16"	buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S di dimensioni 60"×20" e con piccolo nucleo di aspetto quasi stellare; è situata un paio di primi a NW di una stellina brillante — 188x.
NGC 2918	gx	09h35m44s	+31°42.3'	q 103	Leo	10"	ottima / buono	è debole, ma ben evidente a 178x, approssim. circolare con Ø di ~ 1' e molto diffusa; è situata tra due deboli stelline distanti 5' e orientate da N a S.
NGC 2919	gx	09h37m48s	+10°16.9'	q 188	Leo	10"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 90"×45"; è comunque piuttosto deludente osservata a 178x perché tende a estinguersi sul fondo cielo: meglio dunque scalare a 118x.
NGC 2920	gx	09h34m12s	−20°51.5'	q 323	Hya	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di primi, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso verso E — 270x.
NGC 2921	gx	09h34m31s	−20°55.2'	q 323	Hya	16"	ottima / ottimo	allungata da E a W con dimensioni 2'×1' e piuttosto stemperata sul fondo cielo; presenta bulge evidente e molto diffuso; c'è una stellina a ridosso del disco verso WNW — 270x.
NGC 2922	gx	09h36m53s	+37°41.6'	q 103	LMi	10"	ottima / buono	molto debole e di aspetto un po' confuso a 178x; solo a momenti appare orientata da E a W, di dimensioni grosso modo 40"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a ~ 30" verso S.
NGC 2923	gx	09h36m04s	+16°45.6'	q 188	Leo	16"	buona / m. buono	molto piccola e debole, a 270x appare solo come una stellina appena sfuocata; non è facile da trovare a ingrandimenti più alti, in quanto situata in una piccola plaga celeste povi di stelle.
NGC 2924	gx	09h35m11s	−16°23.9'	q 278	Hya	16"	m. buona / scarso	rotonda, poco diffusa, con piccola condensazione centrale evidente e Ø < 1'; c'è una stellina a ridosso SW e un'altra più brillante a 1' verso SE — 270x.
NGC 2926	gx	09h37m31s	+32°50.5'	q 103	Leo	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina a 1.5' SW; meglio contrastata a 340x (già osservata, seppur elusivamente, nel 10").
NGC 2927	gx	09h37m15s	+23°35.4'	q 143	Leo	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 90"×45" e un bulge esteso di dimensioni 30"×20" — 340x.
NGC 2928	gx	09h37m10s	+16°58.6'	q 188	Leo	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, con dimensioni di ~ 45", ma di aspetto un po' confuso; (fa parte di un piccolo gruppo comprendente 6 galassie NGC) — 270x.
NGC 2929	gx	09h37m30s	+23°09.7'	q 143	Leo	16"	m. buona / scarso	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni ~ 40"×20" — 132x.
NGC 2930	gx	09h37m33s	+23°12.2'	q 143	Leo	16"	m. buona / scarso	situata a poco più di 1' a S di NGC 2929 è un oggetto molto debole, esteso al massimo una 40-ina di secondi e osservabile in visione distolta — 132x.
NGC 2931	gx	09h37m38s	+23°14.4'	q 143	Leo	16"	m. buona / scarso	un'altra galassia di luminosità uniforme e piccole dimensioni, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi. queste 3 ultime galassie sono allineate grosso modo in direzione N-S e sono fra loro quasi equidistanti — 132x.
NGC 2933	gx	09h37m55s	+17°00.9'	q 143	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20"; poco disturbata da una stella brillante situata 1.5' a S (fa parte di una coppia sbilanciata in luminosità) — 450x.
NGC 2935	gx	09h36m45s	−21°07.7'	q 323	Hya	10"	buona / discreto	facile, diffusa e relativamente brillante con marcata condensazione centrale, ma di forma non molto chiara a causa del chiarore lunare che nonostante i 240x attenuava il contrasto sul fondo cielo; è grosso modo rotonda, con Ø di un paio di primi; c'è una stellina abbastanza brillante a SE.
NGC 2936	gx	09h37m43s	+02°45.4'	q 233	Hya	16"	m. buona / m. buono	assieme alla successiva forma una coppia di galassie che si separano facilmente a 270x, anche se in visione distolta appaiono come immerse in un'unica chiazza lattescente; la 1ª è grosso modo ovale, orientata da N a S con dimensioni 60"×30"; la 2ª è invece rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
NGC 2937	gx	09h37m45s	+02°44.8'	q 233	Hya	16"	m. buona / m. buono	v. **NGC 2936**
NGC 2938	gx	09h38m24s	+76°19.2'	q 8	Dra	24"	m. buona / buono	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da E a W con dimensioni 90"×45"; meglio contrastata scalando a 340x; è situata tra 2 stelline molto deboli: una un paio di primi a NE e l'altra più o meno alla stessa distanza verso S (era già visibile, sia pur al limite, in un 10").
NGC 2939	gx	09h38m08s	+09°31.5'	q 188	Leo	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×30", con bulge brillante ed estesa — 188x.
NGC 2940	gx	09h38m05s	+09°37.0'	q 188	Leo	16"	m. buona / buono	molto più debole e più piccola di NGC 2939, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale — 188x.
NGC 2941	gx	09h38m24s	+17°02.7'	q 188	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
NGC 2942	gx	09h39m08s	+34°00.3'	q 103	LMi	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×50"; meglio contrastata a 270x.
NGC 2943	gx	09h38m33s	+17°01.9'	q 188	Leo	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina a ridosso SE e un'altra più debole alla stessa distanza verso SW — 450x.
NGC 2944	gx	09h39m18s	+32°18.7'	q 103	Leo	16"	ottima / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 2945	gx	09h37m41s	−22°02.1'	q 323	Hya	16"	ottima / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø max di 45"; relativamente brillante con nucleo marcato stellare; c'è una coppia di deboli stelline distanti 45" e orientate da N a S a W della gx; un'altra stellina più brillante si trova invece a ~ 1' verso E — 270x.
NGC 2946	gx	09h39m01s	+17°01.5'	q 143	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, di aspetto simile a NGC 2933, ma poco più evidente, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
NGC 2947	gx	09h36m06s	−12°26.2'	q 278	Hya	16"	buona / m. buono	abbastanza facile, seppur debole, rotonda, diffusa, con gradiente di luce molto basso di luce e Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 2948	gx	09h38m59s	+06°57.4'	q 188	Leo	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, ma dai bordi confusi, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", con nucleo puntiforme visibile a tratti; c'è una stellina a 1' scarso verso SE *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 2949	gx	09h39m52s	+16°55.0'	q 143	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 2950	gx	09h42m35s	+58°51.1'	q 45	UMa	10" 16"	ottima / buono	brillante, ovale, orientata da NW a SE, di dimensioni 1.5'×1' e con bulge ben evidente; quando il seeing è ottimo, con un 40 cm al alti ingrandimenti si riescono a vedere 4 debolissime stelline nella parte occidentale poste a "L".
NGC 2951	gx	09h39m41s	−00°14.1'	q 233	Hya	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e con tenue nucleo quasi stellare; un piccolo oggetto diffuso e condensato aggetta a W della gx: si tratta in effetti di MAC 0939-0014.
NGC 2954	gx	09h40m24s	+14°55.3'	q 188	Leo	16"	buona / m. buono	è relativamente brillante; presenta un bulge ben evidente, un nucleo luminoso quasi stellare e un alone poco definito forse appena allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 2955	gx	09h41m17s	+35°52.9'	q 104	LMi	10"	ottima / buono	molto debole e diffusa, allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×30" e poco più brillante all'interno; il bulge è facilmente visibile in visione distolta a 178x.
NGC 2956	gx	09h39m17s	−19°06.0'	q 323	Hya	16"	ottima / ottimo	molto debole, appare a tratti in visione distolta come un baffo luminoso di aspetto uniforme, orientata ~ da E a W ed estesa una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 2957A	gx	09h47m15s	+72°59.2'	q 23	Dra	16"	ottima / ottimo	forma una coppia stretta assieme al NGC 2957B; le due componenti si separano senza difficoltà a 380x grazie all'ottimo seeing; la 1ª è orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e presenta una nucleo stellare marcato; la 2ª è un piccolo oggetto rotondo con Ø max 20" e appena più brillante al centro.
NGC 2957B	gx	09h47m19s	+72°59.0'	q 23	Dra	16"	ottima / ottimo	v. **NGC 2957A**
NGC 2958	gx	09h40m41s	+11°53.3'	q 188	Leo	16"	m. buona / ottimo	è di luminosità uniforme, visibile abbastanza facilmente, poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 2959	gx	09h45m09s	+68°35.7'	q 23	UMa	16"	mediocre / discreto	rotonda, con Ø poco superiore a 1', molto diffusa e con alto gradiente di luce; c'è una stellina a 1' verso W — 270x.
NGC 2960	gx	09h40m36s	+03°34.6'	q 233	Hya	16"	m. buona / m. buono	brillante, rotonda, molto diffusa, Ø ~ 45" con un nucleo marcato di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 2961	gx	09h45m22s	+68°36.6'	q 23	UMa	16"	mediocre / discreto	situata 1.5' NE dalla 2959 — piccola e molto debole, a 188x in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni di 30"×10".
NGC 2962	gx	09h40m54s	+05°10.0'	q 188	Hya	24"	buona / buono	è un bell'ovale diffuso e con alto gradiente di luce, piccolo bulge ben contrastato e nucleo stellare; c'è una coppia di stelline brillante a ridosso verso N — 400x.
NGC 2963	gx	09h47m50s	+72°57.9'	q 23	Dra	16"	ottima / scarso	è una galassietta diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 2964	gx	09h42m54s	+31°50.8'	q 104	Leo	24"	m. buona / m. buono	allungata da E a W, di dimensioni 2'×1', o poco superiori, poco diffusa e con piccola condensazione centrale evidente, ma poco contrastata (facilmente visibile anche nel 10", anche se appariva di aspetto uniforme) — 450x.
NGC 2965	gx	09h43m19s	+36°14.9'	q 104	LMi	16"	m. buona / m. buono	è galassia ovale, visibile abbastanza facilmente, ma con gradiente di luce molto basso, orientata da E a W, con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 2966	gx	09h42m11s	+04°40.4'	q 233	Sex	24"	buona / ottimo	diffusa, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 2"×45" e con piccolo bulge abbastanza contrastato; c'è una stellina brillante a ridosso verso W — 400x.
NGC 2967	gx	09h42m03s	+00°20.2'	q 233	Sex	24"	buona / ottimo	di aspetto regolare, poco diffusa e con basso gradiente di luce; è rotonda con Ø di un paio di primi; appare leggermente screziata a 400x; c'è un debolissimo nodulo verso W (era visibile debolmente anche nel 10" a 118x come un oggetto rotondo di luminosità pressoché uniforme).
NGC 2968	gx	09h43m12s	+31°55.7'	q 104	Leo	24"	m. buona / m. buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 1.5'×1' e con condensazione centrale evidente e maggiormente contrastata rispetto alla 2964 dalla quale dista 6' a NE (era visibile anche nel 10", ma appariva rotondeggiante con Ø di ~ 1') — 450x.
NGC 2969	gx	09h41m55s	−08°36.2'	q 278	Sex	16"	buona / m. buono	debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' — 270x.
NGC 2970	gx	09h43m31s	+31°58.6'	q 104	Leo	24"	m. buona / m. buono	è la più debole di un terzetto cui appartengono la 2964 e la 2968, con le quali è allineata verso NE; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno (non vista nel 10") — 450x.
NGC 2971	gx	09h43m46s	+36°10.8'	q 104	LMi	16"	m. buona / m. buono	più debole della 2965, dalla quale dista 7' SW; è di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 2974	gx	09h42m33s	−03°41.9'	q 233	Sex	10"	ottima / buono	facile, relativamente brillante, di luminosità uniforme e abbastanza definita orientata da NE a SW con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina proprio al bordo SW.
NGC 2975	gx	09h41m16s	−16°40.4'	q 278	Hya	16"	m. buona / ottimo	è debolissima, ma si riesce a vedere senza molte difficoltà in visione distolta; è estesa max 30" o 40" e diffusa — 270x.

NGC 2976	gx	09h47m16s	+67°55.0'	q 23	UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 4'×2' e di aspetto screziato a 270x; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SW (a "metà" della gx) e un'altra poco più in là verso NW (era facilmente visibile anche nel 10").
NGC 2977	gx	09h43m46s	+74°51.6'	q 8	Dra	24"	m. buona / m. buono	di aspetto molto regolare, poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina a 1.5' verso SE (già debolmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2978	gx	09h43m17s	−09°44.7'	q 278	Sex	16"	buona / m. buono	rotonda, poco diffusa, con Ø < 1' e poco più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a una 40-ina di secondi dal margine meridionale — 270x.
NGC 2979	gx	09h43m09s	−10°23.0'	q 278	Sex	16"	buona / m. buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30", di luminosità pressoché uniforme salvo un piccolo nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 2980	gx	09h43m12s	−09°36.8'	q 278	Sex	16"	buona / m. buono	debole macchia di dimensioni 80"×40", orientata da NW a SE, diffusa e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 2981	gx	09h44m56s	+31°05.9'	q 104	Leo	16"	ottima / m. buono	debole ovale di luminosità uniforme, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 2983	gx	09h43m41s	−20°28.6'	q 323	Hya	10"	buona / discreto	debole, poco diffusa e con basso gradiente di luce, visibile abbastanza facilmente a 240x a 2.5' SW di una stellina brillante; è allungata da E a W con dimensioni 90"×45" *(presenza di chiarore lunare)*.
NGC 2984	gx	09h43m40s	+11°03.6'	q 188	Leo	16"	buona / m. buono	debole,forse appena allungata da E a W, di dimensioni 40"×30", di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso S — 270x.
NGC 2985	gx	09h50m22s	+72°16.8'	q 23	UMa	16"	ottima / ottimo	è una bella gx ad alto gradiente di luce che a prima vista pare rotonda, ma osservando più attentamente tradisce la sua forma ovale; è molto diffusa e sembra disegnata a isofote: una zona interna circolare, di 80" di Ø che risalta sull'alone orientato da N a S con dimensioni 3'×2' e un nucleo stellare; una stellina brillante distante ~ 1' dal nucleo lambisce il margine orientale dell'alone; meglio contrastata a 270x.
NGC 2986	gx	09h44m16s	−21°16.7'	q 323	Hya	10"	buona / discreto	pressoché circolare, diffusa, rotonda con Ø di un paio di primi e gradatamente più brillante verso l'interno; a 240 x il bulge non sembra tuttavia uniforme in brillanza *(presenza di chiarore lunare)*.
NGC 2987	gx	09h45m41s	+04°56.5'	q 233	Sex	16"	m. buona / m. buono	debole, gradatamente più brillante all'interno, allungata ca. da N a S, dimensioni 40"×20" e presenta un piccolo rigonfiamento centrale — 270x.
NGC 2988	gx	09h46m48s	+22°00.7'	q 143	Leo	16"	discreta / ottimo	forma una coppia serrata con NGC 2991 situata a ridosso verso E — si sdoppiano con difficoltà, anche a 380x, nel senso che la 1ª è veramente molto debole: solo a tratti appare come un piccolo baffo estesa 30" 40" in direzione NE SW, con tenue condensazione centrale che salta fuori subito; la 2ª è all'incirca rotonda, ma di aspetto un po' irregolare e con marcata condensazione centrale, con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ~ 1' verso S.
NGC 2989	gx	09h45m25s	−18°22.4'	q 323	Hya	10"	ottima / m. buono	debole, con basso gradiente di luce, osservabile in visione laterale a 178x, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stella doppia larga con componenti distanti 1' a poco più di 3' verso SW e orientate grosso modo a perpendicolo con l'asse maggiore della galassia.
NGC 2990	gx	09h46m17s	+05°42.6'	q 188	Sex	24"	buona / buono	abbastanza brillante, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; appare leggermente screziata a 400x.
NGC 2991	gx	09h46m50s	+22°00.8'	q 143	Leo	16"	discreta / ottimo	v. **NGC 2988**
NGC 2992	gx	09h45m42s	−14°19.5'	q 278	Hya	24"	m. buona / buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 3'×45", con bulge molto contrastato e piccolo nucleo quasi stellare; una zona molto debole, oblunga con dimensioni 40"×20" appare staccata dalla gx verso N (questa gx e la successiva NGC 2993 erano entrambe debolmente visibili nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 2993	gx	09h45m51s	−14°22.7'	q 278	Hya	24"	m. buona / buono	molto diffusa, con condensazione centrale assai marcata e nucleo stellare, rotonda con Ø di 1'; un elusivo baffo luminoso sembra a tratti aggettare verso E dall'estremità N della gx; l'effetto si nota meglio scalando a 340x (sia questa, sia NGC 2992 erano entrambe visibili, seppur debolmente, nel 10" a 178x).
NGC 2994	gx	09h47m16s	+22°05.4'	q 143	Leo	16"	discreta / ottimo	abbastanza facile, ovale, compatta, orientata da NW a SE, di dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
NGC 2996	gx	09h46m30s	−21°34.3'	q 323	Hya	16"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffuso e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1'; è situata 1' SW di una stellina brillante — 270x.
NGC 2997	gx	09h45m39s	−31°11.4'	q 365	Ant	16"	ottima / m. buono	presenta un nucleo brillante, estesa , circonfuso da un tenue alone molto stemperato di aspetto irregolare e solo approssim. circolare con Ø di 5'; questo è immerso in un campo molto ricco di stelline; c'è n'è una brillante situata a 2' verso SW — 270x.
NGC 2998	gx	09h48m44s	+44°04.9'	q 71	UMa	16"	m. buona / m. buono	è una gx relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, ovale, orientata da NE a SW, di dimensioni 2.5' ×1' e con i bordi abbastanza definiti. Fa parte di un gruppo — 270x.
NGC 3003	gx	09h48m36s	+33°25.3'	q 104	LMi	24"	buona / buono	molto allungata da E a W con dimensioni 4'×1' e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenuissimo bulge diffuso che tuttavia si nota meglio scalando a 340x (osservabile, seppur debolmente, anche nel 10").
NGC 3005	gx	09h49m15s	+44°07.8'	q 71	UMa	16"	m. buona / m. buono	fa parte del gruppo di NGC 2998 — molto debole, ma in visione distolta appare ben orientata da NW a SE; un nucleo stellare è percettibile solo a momenti — 270x.
NGC 3006	gx	09h49m17s	+44°01.5'	q 71	UMa	16"	m. buona / m. buono	debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" — 270x.
NGC 3007	gx	09h47m46s	−06°26.3'	q 278	Sex	24"	m. buona / buono	diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; è situata tra 2 stelline appena percettibili ai bordi E e W; una stellina brillante si trova invece a 1' verso S (già debolmente visibile nel 16") — 450x.
NGC 3008	gx	09h49m34s	+44°06.1'	q 71	UMa	16"	m. buona / m. buono	compatta, rotonda, con Ø di 45", alto gradiente di luce e nucleo marcato; è situata 1' est di una stellina — 270x.
NGC 3009	gx	09h50m11s	+44°17.7'	q 71	UMa	16"	m. buona / m. buono	debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 3010	gx	09h50m35s	+44°19.4'	q 71	UMa	16"	m. buona / m. buono	è una piccola galassietta ovale, orientata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con piccolo nucleo abbastanza marcato di aspetto stellare — 270x.
NGC 3011	gx	09h49m41s	+32°13.2'	q 104	Leo	24"	buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue nucleo quasi stellare (debolmente osservabile anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3012	gx	09h49m52s	+34°42.9'	q 104	LMi	16"	m. buona / m. buono	si vede abbastanza facilmente; piccola, probabilmente circolare, con Ø di 1' o meno con una stellina appena percettibile a ridosso a SW, ma forse è solo una discrepanza di luce della galassia — 270x.
NGC 3013	gx	09h50m10s	+33°34.1'	q 104	LMi	16"	m. buona / m. buono	molto piccola, di luminosità uniforme e dimensioni max 20" o 30" situata 30" SW di una debole stellina — 270x.
NGC 3014	gx	09h49m08s	−04°44.6'	q 233	Sex	16"	ottima / discreto	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø poco inferiore a 1'; un tenuissimo nucleo stellare appare a tratti; c'è una stellina a ridosso verso E — 270x.
NGC 3015	gx	09h49m23s	+01°08.7'	q 233	Sex	16"	buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; può considerarsi un tipico oggetto "quasi stellare" se osservato a bassi ingrandimenti — 188x.
NGC 3016	gx	09h49m51s	+12°41.7'	q 188	Leo	24"	m. buona / m. buono	fa parte di un quartetto di galassie situate entro una dozzina di primi d'arco: a parte la 3019 erano già state precedentemente osservate nel 10" a 178x in una notte con condizioni di trasparenza e seeing analoghe — diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450x.
NGC 3017	gx	09h49m03s	−02°49.3'	q 224	Sex	16"	buona / buono	rotonda, con Ø di 45", poco diffusa e con basso gradiente di luce — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 3018	gx	09h49m41s	+00°37.3'	q 233	Sex	24"	buona / m. buono	è di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×30"; è situata tre 2 stelle: una brillante a NW e una debole a SE (già intravista, seppur al limite, nel 10" a 178x) — 400x.
NGC 3019	gx	09h50m07s	+12°44.7'	q 188	Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 340x.
NGC 3020	gx	09h50m06s	+12°48.8'	q 188	Leo	24"	m. buona / m. buono	è la più brillante del quartetto di NGC 3016 — molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni di almeno 2'×1'; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 3021	gx	09h50m57s	+33°33.2'	q 104	LMi	24"	buona / buono	gx ovale relativamente compatta, ma di forma non perfettamente regolare, orientata da E a W, di dimensioni 70"×35" e appena più brillante all'interno; appare debolmente screziata a 450x; c'è una stellina a ridosso verso N (visibile abbastanza facilmente anche nel 10").
NGC 3022	gx	09h49m39s	−05°10.0'	q 278	Sex	16"	ottima / discreto	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 3023	gx	09h49m52s	+00°37.2'	q 233	Sex	24"	buona / m. buono	sembra doppia: una zona molto diffusa di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni ~ 60"×40" e una sorta di piccola "appendice" più compatta di dimensioni 20"×10" e orientata da E a W; quest'ultima, da un controllo effettuato successivamente, è risultata di fatto essere la Markarian 1236 — 450x.
NGC 3024	gx	09h50m27s	+12°46.0'	q 188	Leo	24"	m. buona / m. buono	fa parte del quartetto di NGC 3016 — molto allungata da NW a SE, dimensioni 80"×20", con tenue bulge diffuso e abbastanza contrastato; c'è una stellina sul prolungamento dell'asse maggiore della galassia situata a SE; più interessante a 340x.
NGC 3025	gx	09h49m29s	−21°44.5'	q 323	Hya	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø < 1' e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 3026	gx	09h50m54s	+28°33.0'	q 104	Leo	24"	discreta / m. buono	poco contrastata sul fondo cielo, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 2'×30"; meglio evidente a 340x (era molto difficile da vedere nel 10", soprattutto ad alti ingrandimenti, a causa della mancanza di stelline di "appoggio").
NGC 3027	gx	09h55m40s	+72°12.2'	q 23	UMa	24"	m. buona / m. buono	presenta una bassa luminanza superficiale, poco più brillante all'interno e di forma non regolare; è allungata da NW a SE con dimensioni di almeno 3'×1.5'; c'è una stellina al bordo NW e un'altra poco più evidente a "metà galassia" verso SW; meglio definita scalando a 340x (era debolmente osservabile anche nel 10" a 118x).
NGC 3028	gx	09h49m54s	−19°11.1'	q 323	Hya	16"	ottima / ottimo	è di aspetto un po' irregolare, facilmente visibile, approssim. rotonda con Ø < 1' e appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 3029	gx	09h48m54s	−08°03.1'	q 278	Sex	16"	buona / m. buono	piccola e debolissima; in visione distolta appare allungata all'incirca da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 3030	gx	09h50m10s	−12°13.6'	q 278	Hya	24"	m. buona / scarso	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; la visione è purtroppo disturbata dalla presenza in campo di molte stelle brillanti, fra cui la SAO 155521 di magnitudo 8.8 situata 3.5' a SE (era debolmente visibile anche nel 16") — 340x.
NGC 3032	gx	09h52m08s	+29°14.2'	q 104	Leo	24"	buona / buono	presenta un nucleo molto luminoso circonfuso da un alone rotondo con Ø di una 80-ina di secondi che si stempera abbastanza rapidamente sul fondo cielo; è situata tra 2 stelle: una brillante un paio di primi a N e l'altra poco più debole alla stessa distanza verso S (osservabile anche nel 10") — 450x.
NGC 3035	gx	09h51m55s	−06°49.4'	q 278	Sex	16"	buona / m. buono	è una bella galassia rotonda, diffusa, poco più brillante all'interno e con Ø > 1' — 270x.
NGC 3037	gx	09h51m24s	−27°00.6'	q 323	Hya	16"	ottima / ottimo	debole lucore molto diffuso e di luminosità uniforme; a tratti, in visione distolta, appare orientata da NE a SW (ossia come le 2 stelline situate a NNE) per non più di 45" — 270x.
NGC 3039	gx	09h52m30s	+02°09.3'	q 233	Sex	16"	buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso N; un piccolo triangolo di stelline di luminosità crescente (fra cui una di 10ª grandezza) si trova un paio di primi a W della galassia — 132x (problemi di allineamento delle ottiche).
NGC 3040	gx	09h53m05s	+19°25.9'	q 144	Leo	24"	buona / ottimo	diffusa e poco più brillante all'interno di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
NGC 3041	gx	09h53m07s	+16°40.7'	q 189	Leo	24"	buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W, di dimensioni 3'×1.5' e con piccolo nucleo quasi stellare contrastato; una stellina molto debole si trova quasi a ridosso del nucleo verso W; altre 3 stelline si trovano al bordo della gx: una a N, una a NW e una terza, brillante, nonché doppia sbilanciata, a SW (già debolmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 3042	gx	09h53m20s	+00°41.9'	q 234	Sex	24"	m. buona / m. buono	presenta un bulge brillante di 30"×15" circonfuso da un tenue alone orientato da E a W con dimensioni 60"×30" e che si stempera rapidamente sul fondo cielo; presenta un nucleo stellare evidente; c'è una stellina brillante a 1' SW — 450x.
NGC 3043	gx	09h56m14s	+59°18.4'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	compatta e di luminosità uniforme, a tratti debolmente screziata a 450x, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 3' verso SW (era debolmente osservabile anche nel 10").
NGC 3044	gx	09h53m40s	+01°34.7'	q 234	Sex	10"	ottima / discreto	è una lama di luce molto debole, estesa oltre 3' e orientata grosso modo da NW a SW; l'estensione totale si meglio in visione distolta.
NGC 3045	gx	09h53m18s	−18°38.7'	q 325	Hya	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 80"×40" — 270x.
NGC 3047	gx	09h54m29s	−01°17.3'	q 234	Sex	16"	buona / buono	piccola gx compatta, rotonda con Ø max di 30" ed evidente condensazione centrale; è situata ad appena 1' SSE della SAO 137215 di 8ª grandezza — 380x.
NGC 3047A	gx	09h54m32s	−01°17.5'	q 234	Sex	16"	buona / buono	molto piccola e debole, visibile a tratti come un oggetto diffuso di 20" di Ø; è situata una 40-ina di secondi a W di NGC 3047 — 270x.
NGC 3048	gx	09h54m56s	+16°27.4'	q 189	Leo	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 30"; in visione distolta appare un debole aggetto verso NE che sembrerebbe diffuso, ma potrebbe anche essere una stellina irrisolta a ridosso della galassia (da un controllo effettuato successivamente questa è risultata di fatto essere la MAC 0954+1627 — 450x.
NGC 3049	gx	09h54m50s	+09°16.3'	q 189	Leo	16"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW, con bulge evidente e un piccolo nucleo di aspetto stellare; potrebbe tuttavia trattarsi di una stellina a ridosso del nucleo; è di dimensioni ~ 90"×45" — 380x.
NGC 3051	gx	09h53m59s	−27°17.2'	q 324	Ant	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, rotonda, poco diffusa, con alto gradiente di luce; presenta un bulge piccolo ed evidente — 270x.
NGC 3052	gx	09h54m28s	−18°38.3'	q 324	Hya	24"	buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 90"×60"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N e un'altra poco più evidente e distante dalla parte opposta (osservabile molto debolmente anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3053	gx	09h55m34s	+16°26.0'	q 189	Leo	24"	buona / ottimo	bella, poco diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con piccolo nucleo quasi stellare; c'è una debole stellina a 1' scarso verso NE; più interessante a 340x (già precedentemente osservata, seppure molto debolmente, nel 10").
NGC 3054	gx	09h54m28s	−25°42.2'	q 324	Hya	24"	buona / buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, orientata da NW a SE, di dimensioni 3'×2' e con piccola condensazione centrale evidente e abbastanza contrastata su un disco uniforme; meglio contrastata scalando a 340x (debolmente osservabile anche nel 10" a un centinaio di ingrandimenti).
NGC 3055	gx	09h55m18s	+04°16.1'	q 234	Sex	10"	ottima / discreto	piccola, abbastanza facile, di luminosità piuttosto irregolare, allungata da NE a SW con dimensioni di ~ 60"×40".
NGC 3056	gx	09h54m33s	−28°17.9'	q 365	Ant	16"	ottima / ottimo	facile, allungata da N a S con dimensioni 90"×45", con nucleo brillante stellare; è situata a ridosso verso S di una stellina luminosa — 270x.
NGC 3057	gx	10h05m38s	+80°17.1'	q 8	Dra	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con bassa luminanza superficiale, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 90"×45"; c'è una debole stellina a meno di 1' verso W (era osservabile molto debolmente anche nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 3058	gx	09h53m36s	−12°29.0'	q 279	Hya	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 0953-1228 situata a ridosso NW — poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
NGC 3060	gx	09h56m19s	+16°49.9'	q 189	Leo	16"	m. buona / ottimo	bella, molto allungata da ENE a WSW per ~ 1', con bulge evidente e diffuso — 380x.
NGC 3061	gx	09h56m12s	+75°52.0'	q 8	Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola, allungata da N a S, di dimensioni 80"×40", diffusa, uniforme e con bassa luminanza superficiale; c'è una stellina a ridosso verso S e un'altra di luminosità simile a 1.5' NW; meglio definita scalando a 340x (era visibile molto debolmente anche nel 10").
NGC 3062	gx	09h56m36s	+01°25.7'	q 234	Sex	16"	buona / buono	molto debole, diffusa, con condensazione centrale visibile a tratti; non dovrebbe essere più estesa di 1'; è situata ~ 6' NW di una stellina brillante — 270x.
NGC 3064	gx	09h55m42s	−06°21.8'	q 279	Sex	16"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare orientata da NE a SW per ~ 1'; è situata a SW di un asterismo di stelline brillanti; c'è una doppia strettissima verso l'estremità occidentale di questo gruppetto — 270x.
NGC 3065	gx	10h01m55s	+72°10.2'	q 23	UMa	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di un 80-ina di secondi; presenta un piccolo bulge molto brillante e un nucleo stellare (debolmente osservabile anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3066	gx	10h02m10s	+72°07.6'	q 23	UMa	24"	m. buona / m. buono	in visione distolta appare poco più piccola di NGC 3065 e con gradiente di luce minore, rotonda, Ø di 1' e con piccolo bulge diffuso; debolmente screziata a 450x (osservabile anche nel 10" a 178x).
NGC 3067	gx	09h58m22s	+32°22.2'	q 104	Leo	24"	buona / buono	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 2'×40" e di luminosità uniforme a 340x; debolmente screziata a 450x; c'è una stellina appena percettibile a 1' a NNE (visibile anche nel 10"). A poco meno di 2' verso N si nota facilmente una stellina che in realtà è la quasar Ton 469.
NGC 3068	gx	09h58m40s	+28°52.6'	q 104	Leo	16"	ottima / m. buono	è una piccola galassia abbastanza brillante, compatto, di dimensioni ~ 30" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 3069	gx	09h57m57s	+10°26.0'	q 42	Lyn	10"	buona / discreto	debole, molto diffusa, rotonda a prima vista se osservata a 118x; a 178x appare orientata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con bulge centrale poco più brillante osservabile in visione distolta (col 10" non ero riuscito a vedere la 2330 situata un paio di primi a S) Fa parte di un gruppo.
NGC 3070	gx	09h58m07s	+10°21.6'	q 189	Leo	16"	m. buona / buono	sono distanti 5' in direzione NNW-SSE; la 1ª è molto debole, poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo piccolo di aspetto quasi stellare; la 2ª è brillante, rotonda, con Ø di 1' e gradiente di luce elevato — 188x.
NGC 3071	gx	09h58m53s	+31°37.2'	q 104	Leo	16"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, ma facilmente visibile perché compatta; è poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 3072	gx	09h57m24s	−19°21.3'	q 324	Hya	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente compatta, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 80"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 3073	gx	10h00m52s	+55°37.1'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, con nucleo stellare, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S (visibile molto debolmente anche nel 10" in ottime condizioni di trasparenza) — 450x.
NGC 3074	gx	09h59m41s	+35°23.5'	q 104	LMi	16"	m. buona / m. buono	rotonda, estesa almeno 1.5', molto stemperata sul fondo cielo e con una debolissima condensazione centrale visibile a tratti — 270x.
NGC 3075	gx	09h58m56s	+14°25.2'	q 104	Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di aspetto un po' confuso, piccola e approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
NGC 3076	gx	09h57m38s	−18°10.7'	q 324	Hya	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno, con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 270x.
NGC 3077	gx	10h03m21s	+68°44.0'	q 23	UMa	24"	m. buona / m. buono	presenta una chiazza ovale brillante orientata da NE a SW con dimensioni 90"×60", circonfusa da un alone diffuso e asimmetrico che aggetta maggiormente verso NE; la gx appare nel complesso di dimensioni 4'×3'; la parte centrale è debolmente screziata a 450x; un poco disturbata dalla SAO 15064 di 7ª grandezza situata 3' a NW (facilmente visibile anche nel 10" e già osservabile, seppur al limite, nel 20x80) — 450x.
NGC 3078	gx	09h58m24s	−26°55.6'	q 324	Hya	24"	buona / buono	presenta un piccolo bulge rotondo di 20"-25" di Ø circondato da un alone molto diffuso, approssim. circolare con Ø di almeno 1.5'; c'è una stellina a ridosso verso W; meglio contrastata scalando a 340x (facilmente visibile anche nel 10" a 178x nelle stesse condizioni di visibilità).
NGC 3079	gx	10h01m57s	+55°40.6'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	molto brillante, leggermente arcuata e di aspetto un po' irregolare; è molto allungata da N a S, di dimensioni 6'×1', con bulge diffuso e poco contrastato; ci sono 3 stelline brillanti poste ad arco a ridosso verso W, di cui una quasi al bordo N della gx; questa appare poco più affusolata e stemperata verso S — 450x.
NGC 3080	gx	09h59m56s	+13°02.7'	q 189	Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, rotondeggiante, dai bordi non definiti, con Ø di una 30-ina di secondi; appare più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 3081	gx	09h59m30s	−22°49.6'	q 324	Hya	24"	buona / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 80"×60"; immersa in un campo ricco di stelline brillanti (debolmente visibile anche nel 10" a 178x, nelle stesse condizioni di cielo).
NGC 3083	gx	09h59m50s	−02°52.6'	q 234	Sex	24"	ottima / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30"; situata in mezzo a 2 stelline distanti 4' e orientate da E a W; fa parte di un quintetto di cui la 3090 è il membro più brillante — 450x.
NGC 3084	gx	09h59m06s	−27°07.7'	q 324	Ant	16"	ottima / ottimo	poco diffusa, di luminosità uniforme, situata a ridosso NW di una stellina; a prima vista appare rotonda, ma in visione distolta e alternando gli occhi sembra poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40"; lambisce il lato occidentale di un piccolo triangolo equilatero di stelline coi lati di 1' — 270x.
NGC 3085	gx	09h59m29s	−19°29.5'	q 324	Hya	16"	ottima / ottimo	piccola, compatta, facile, orientata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare evidente — 270x.
NGC 3086	gx	10h00m11s	−02°58.6'	q 234	Sex	24"	ottima / buono	fa parte del quintetto della 3090 — molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
NGC 3088A	gx	10h01m08s	+22°24.4'	q 144	Leo	16"	m. buona / ottimo	poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale quasi stellare — 380x.
NGC 3088B	gx	10h01m10s	+22°24.0'	q 144	Leo	16"	m. buona / ottimo	è un baffo elusivo osservabile solo a tratti in visione distolta che aggetta da NGC 3088A verso SE per una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 3089	gx	09h59m37s	−28°19.9'	q 365	Ant	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità uniforme, e approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; la forma è tuttavia un po' compromessa da 2 stelline: una a ridosso del bordo orientale e l'altra, più debole, a S; c'è una stellina brillante a ~ 2' verso E — 270x.
NGC 3090	gx	10h00m30s	−02°58.1'	q 234	Sex	24"	ottima / buono	è la più brillante di un quintetto: rotonda, diffusa con Ø di 1' scarso e condensazione centrale molto evidente; c'è una stellina brillante a ridosso N; quest'ultima fa parte di un piccolo triangolo isoscele col vertice più acuto che punta a W (il vertice meridionale è una doppia stretta) — 450x.
NGC 3091	gx	10h00m14s	−19°38.2'	q 324	Hya	16"	ottima / ottimo	presenta un bulge brillante e nucleo marcato, stellare, circonfuso da un tenue alone che in visione distolta sembra di 2.5'×1.5' e orientata da NW a SE — 270x.
NGC 3092	gx	10h00m47s	−03°00.7'	q 234	Sex	24"	ottima / buono	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×30"; fa parte, assieme a NGC 3093, del quintetto di NGC 3090 — 450x.
NGC 3093	gx	10h00m53s	−02°58.3'	q 234	Sex	24"	ottima / buono	piccola, compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
NGC 3094	gx	10h01m26s	+15°46.2'	q 189	Leo	16"	m. buona / ottimo	è di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso di SE — 380x.
NGC 3096	gx	10h00m33s	−19°39.7'	q 324	Hya	16"	ottima / ottimo	diffusa, approssim. rotonda, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 45" — 270x.
NGC 3098	gx	10h02m17s	+24°42.7'	q 144	Leo	24"	buona / ottimo	orientata da E a W con dimensioni 100"×20", presenta un bulge evidente di 30"×20" e un nucleo stellare brillante; molto diffusa alle estremità E e W, compatta compatta in quelle ortogonali; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x (osservabile anche nel 10").
NGC 3099	gx	10h02m31s	+32°42.9'	q 104	LMi	16"	buona / m. buono	molto debole, appare in visione distolta a poco più di 1' NW di MCG+6-22-58, e più evidente di quest'ultima; è più piccola, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø non superiore a 30" — 380x.
NGC 3101	gx	10h01m35s	−02°59.7'	q 234	Sex	24"	ottima / buono	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; a prima vista sembra di luminosità un poco irregolare quando si osserva a 450x, forse a causa di una stellina appena percettibile al bordo occidentale che appare solo a momenti.
NGC 3102	gx	10h04m32s	+60°06.5'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a meno di 1' verso SE (osservabile, sia pure con un certa difficoltà nel 10"; anche la stellina a SE era visibile a 178x) — 450x.
NGC 3104	gx	10h03m58s	+40°45.5'	q 72	LMi	16"	nottata molto umida e ventosa	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni all'incirca di 2'×1'; c'è una stellina a ridosso verso S e un'altra poco più distante verso NE — 188x.
NGC 3106	gx	10h04m05s	+31°11.1'	q 104	LMi	10"	ottima / buono	debole, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, approssim. circolare con Ø di oltre 1'; c'è una debole stellina a 3' scarsi verso N — 178x.
NGC 3107	gx	10h04m22s	+13°37.3'	q 189	Leo	16"	m. buona / buono	è una macchiolina circolare relativamente compatta, con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante verso l'interno; è situata ad appena un paio di primi NNW della SAO 98932 di 8ª grandezza — 188x.
NGC 3109	gx	10h03m06s	−26°09.4'	q 324	Hya	24"	buona / buono	molto estesa, debolissima, diafana; in visione distolta è visibile abbastanza facilmente l'ampia zona centrale orientata da E a W con dimensioni all'incirca di 6'×2'; scalando a 208x appare di lunghezza circa doppia, anche se è difficile stabilirlo anche per la presenza di numerose stelline di campo; fra queste si nota, ad esempio, un asterismo formato da 8 componenti di luminosità assai diseguale situato subito a S della gx e foggiato a triangolo molto allungato; un piccolo triangolo rettangolo di stelline deboli si trova a ridosso della gx sempre verso S, mentre altre 4 stelline pressoché allineate appaiono al lato opposto (osservabile elusivamente anche nel 10", nelle stesse condizioni di cielo, a 118x).
NGC 3110	gx	10h04m02s	−06°28.5'	q 279	Sex	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e di luminosità pressoché uniforme; appare un poco sfilacciata alle estremità N e S; c'è una stellina a ridosso verso NW (già facilmente osservabile nel 16" a 270x) — 450x.
NGC 3111	gx	10h06m07s	+47°15.8'	q 72	UMa	16"	mediocre / discreto	rotonda, con Ø di ~ 1', bordi diffusi e un bulge luminoso estesa per oltre 30" — 270x.
NGC 3112	gx	10h03m59s	−20°46.9'	q 324	Hya	16"	ottima / ottimo	molto piccola ed elusiva, appare solo a tratti in visione distolta — 270x.
NGC 3113	gx	10h04m26s	−28°26.6'	q 365	Ant	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa e che in visione distolta appare molto allungata da E a E per almeno 3'; la visione migliora leggermente scalando a 188x.
NGC 3115	gx	10h05m14s	−07°43.1'	q 279	Sex	16"	ottima / ottimo	bella e di aspetto molto regolare, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 4'×1', con bulge diffuso e nucleo stellare abbastanza marcato; appare vagamente screziata, soprattutto nella regione dell'alone, se osservata a 380x.
NGC 3116	gx	10h06m45s	+31°05.9'	q 104	LMi	16"	ottima / m. buono	piccola, debole, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e con una condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 3117	gx	10h06m10s	+02°54.8'	q 234	Sex	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile un paio di primi a NE *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
NGC 3118	gx	10h07m11s	+33°01.7'	q 104	LMi	16"	m. buona / m. buono	posta pressoché di taglio orientata da NE a SW, di luminosità uniforme e dimensioni 1.5'×30" — 270x.
NGC 3119	gx	10h06m52s	+14°22.4'	q 189	Leo	16"	m. buona / buono	rotonda con Ø di 1' scarso, condensazione centrale evidente e un debole alone circonfuso — 188x.
NGC 3122	gx	10h06m17s	−06°34.5'	q 279	Sex	16"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta, di dimensioni non superiori a 20" o 30", con nucleo stellare marcato; è situata quasi sul prolungamento, verso S, di una coppia di stelle distanti ~ 45" e orientate in direzione N-S — 270x.
NGC 3124	gx	10h06m40s	−19°13.3'	q 324	Hya	24"	buona / buono	presenta un contrasto molto basso, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme (una piccola condensazione centrale molto tenue appare di fatto solo a momenti); è rotonda con Ø di un paio di primi; c'è una doppia stretta brillante a 5' verso S; meglio evidente a 340x (era visibile nel 10" in visione distolta a un centinaio di ingrandimenti come una chiazza lattescente circolare molto debole).
NGC 3126	gx	10h08m21s	+31°51.8'	q 104	LMi	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, poco diffusa, di dimensioni 2'×30" e con bulge di 30"×20" contrastato (già precedentemente osservata nel 10" a 178x in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 3127	gx	10h06m25s	−16°07.6'	q 279	Hya	16"	m. buona / ottimo	poco più debole di NGC 3128 appare in visione distolta come una lama di luce di luminosità uniforme orientata da NE a SW ed estesa per ~ 1'; è situata tra 2 stelline brillanti distanti 3' e poste a perpendicolo con la galassia — 270x.
NGC 3128	gx	10h06m01s	−16°07.4'	q 279	Hya	16"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30"; è situata tra 2 deboli stelline distanti un paio di primi e orientate da E a W — 270x.
NGC 3130	gx	10h08m12s	+09°58.5'	q 189	Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×30"; è totalmente immersa nei bagliori della 31 Leonis di magnitudo 4.6 (già precedentemente osservata col 10" a 178x) — 450x.
NGC 3131	gx	10h08m36s	+18°13.9'	q 144	Leo	24"	m. buona / buono	molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×30"; presenta un'estesa zona interna di luminosità uniforme che occupa quasi interamente un disco molto sfumato alle estremità NE e SW; c'è una stellina 1.5' a S — 450x.
NGC 3133	gx	10h07m13s	−11°57.9'	q 279	Hya	16"	discreta / buono	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, osservabile solo a tratti in visione distolta — 270x.
NGC 3135	gx	10h10m54s	+45°57.0'	q 72	UMa	16"	mediocre / discreto	debole, allungata da E a W, di dimensioni ~ 60"×40" e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a ridosso verso NE — 270x.
NGC 3138	gx	10h09m17s	−11°57.4'	q 279	Hya	16"	discreta / buono	debolissima, quasi elusiva; a 270x appare a tratti solo fissando l'attenzione su una debole stellina di 15-esima situata un paio di primi a E.
NGC 3139	gx	10h10m05s	−11°46.6'	q 279	Hya	16"	discreta / buono	debole, rotonda con Ø di ~ 1', diffusa; presenta una piccola condensazione centrale visibile a tratti — 270x.
NGC 3140	gx	10h09m28s	−16°37.7'	q 279	Hya	16"	m. buona / ottimo	galassietta circolare relativamente compatta ed estesa max 30", di luminosità uniforme; c'è una doppia a ~ 2' NW con componenti distanti 1' — 270x.
NGC 3141	gx	10h09m20s	−16°39.2'		Hya	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare a tratti in visione distolta, poco allungata da N a S con una tenue condensazione centrale (non è riportata sull'Uranometria: situata 2' a SW di NGC 3140) — 270x.
NGC 3142	gx	10h10m06s	−08°28.8'	q 279	Sex	16"	m. buona / ottimo	facile, abbastanza brillante, compatta, di aspetto un po' irregolare, probabilmente rotonda con Ø max di 40"; impiegato 380x per cercar di tener fuori campo la 17 Sex di 6ª grandezza.
NGC 3143	gx	10h10m04s	−12°34.8'	q 279	Hya	24"	m. buona / buono	poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
NGC 3144	gx	10h15m33s	+74°13.3'	q 8	Dra	20"	m. buona / ottimo	è piuttosto debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina evidente al bordo E (appariva elusivamente e di forma indistinta nel 10" a 178x) — 360x.
NGC 3145	gx	10h10m10s	−12°26.0'	q 279	Hya	24"	m. buona / buono	brillante e con alto gradiente di luce, poco diffusa, orientata da NNE a SSW con dimensioni 2'×1'; lievi discrepanze di luce sembrano a tratti correre all'interno del disco (la λ Hya di magnitudo 3.6 si trova 8' a NE, per cui a 450x si riesce a tenere fuori campo — la gx era osservabile abbastanza facilmente anche nel 10" a 178x).
NGC 3146	gx	10h11m10s	−20°52.2'	q 324	Hya	16"	ottima / ottimo	abbastanza facile, rotonda con Ø di ~ 1' e poco più brillante l'interno; a tratti appare una sorta di barra centrale — 270x.
NGC 3147	gx	10h16m54s	+73°24.0'	q 8	Dra	24"	m. buona / m. buono	bella, presenta un nucleo molto brillante circonfuso da un alone rotondo di ~ 3' di Ø, molto regolare, diffuso e che si estingue gradualmente sul fondo cielo; più interessante e meglio contrastata scalando a 340x; è situata all'interno di un quadrangolo di stelle vagamente foggiato ad aquilone (già facilmente osservabile nel 10").
NGC 3148	gx	10h13m26s	+50°26.7'	q 45	UMa	16"	m. buona / buono	è una piccola galassietta elusiva estesa max 20" o 30" e visibile solo a tratti; è molto difficile da vedere in quanto situata ad appena 4' SW della SAO 27566 di 6ª grandezza; ho dovuto usare il 6.4 mm (285x) per tentare di tenerla fuori campo.
NGC 3150	gx	10h13m26s	+38°39.5'	q 104	LMi	16"	buona / m. buono	è una chiazza lattescente molto debole, di luminosità uniforme ed estesa per 1' scarso — 270x.
NGC 3151	gx	10h13m29s	+38°37.2'	q 104	LMi	16"	buona / m. buono	è più evidente di NGC 3150 e più compatta, rotonda, di luminosità uniforme con Ø di una 40-ina di secondi — fa parte, assieme a NGC 3150, e ad alcune delle gx seguenti, di un gruppo — 270x.
NGC 3152	gx	10h13m34s	+38°50.6'	q 104	LMi	16"	buona / buono	molto debole approssim. circolare, piccola, di luminosità uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
NGC 3153	gx	10h12m50s	+12°40.0'	q 189	Leo	24"	m. buona / discreto	è un bell'ovale orientato da N a S, di dimensioni 90"×45" e con basso gradiente di luce; presenta un bulge diffuso appena più evidente del disco; più interessante scalando a 340x.
NGC 3154	gx	10h13m01s	+17°02.1'	q 144	Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, orientata da NW a SE, di dimensioni ~ 45"×30", situata a un paio di primi NW di una stellina brillante di 9ª; un'altra stellina, debole, si trova a 1' verso N — 380x.
NGC 3155	gx	10h17m39s	+74°21.0'	q 8	Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40" (nel 10" appariva visibile solo a momenti) — 450x.
NGC 3156	gx	10h12m41s	+03°07.8'	q 234	Sex	16"	ottima / ottimo	è un ovale di aspetto molto regolare, gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da NE a SW e con dimensioni 1.5'×45" — 270x.
NGC 3158	gx	10h13m50s	+38°45.9'	q 104	LMi	16"	buona / m. buono	è la più brillante del piccolo gruppo cui appartiene la coppia NGC 3150-3151 — brillante, presenta una marcata condensazione centrale e un alone diffuso; è rotonda, con Ø superiore a 1', ma è poco definita ai bordi — 270x.
NGC 3159	gx	10h13m53s	+38°39.2'	q 104	Lyn	10"	ottima / buono	assieme a NGC 3161 e 3163 costituisce un terzetto di galassiette piuttosto deboli, ma facilmente visibili a 270x, fra loro equidistanti e formanti un piccolo arco con la concavità rivolta verso S; la 3ª delle 3 è la più brillante ed estesa, rotonda con Ø di 1'; la 2ª è la più debole ed è all'incirca quella di luminosità più uniforme, approssim. circolare con Ø di 40-ina di secondi; la 1a, infine, è pure rotonda con Ø di 1' scarso.
NGC 3160	gx	10h13m55s	+38°50.6'	q 104	LMi	16"	buona / m. buono	è una debole lama di luce di luminosità uniforme che si nota abbastanza facilmente; è orientata da NW a SE con dimensioni 60"×20" (fa parte dello stesso gruppo) — 270x.
NGC 3161	gx	10h13m59s	+38°39.4'	q 104	Gem	16"	ottima / buono	v. **NGC 3159**
NGC 3162	gx	10h13m32s	+22°44.2'	q 144	Leo	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e debolmente sfrangiata, rotonda con Ø < 1.5'; appare screziata a 450x e con piccolo nucleo quasi stellare; c'è una debole stellina al bordo orientale e una più brillante a SE; un nodulo appena percettibile salta fuori solo a momenti verso NW (già precedentemente osservata col 10" come una debole chiazza lattescente di forma irregolare).
NGC 3163	gx	10h14m07s	+38°39.1'	q 104	LMi	16"	ottima / buono	v. **NGC 3159**
NGC 3164	gx	10h15m11s	+56°40.3'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	debole e poco contrastata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (osservabile elusivamente e solo a tratti nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3165	gx	10h13m31s	+03°22.5'	q 234	Sex	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 3166	gx	10h13m45s	+03°25.5'	q 234	Sex	16"	ottima / ottimo	appare poco più estesa di NGC 3169 (osservata per prima) e di aspetto più regolare, allungata da E a W, di dimensioni 3.5'×1.5' e con piccola condensazione centrale molto pronunciata — 270x.
NGC 3168	gx	10h16m23s	+60°14.1'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con marcata nucleo stellare (osservabile nel 10", anche se in visione distolta appariva di aspetto stellare; probabilmente perché era visibile solo il nucleo) — 450x.
NGC 3169	gx	10h14m15s	+03°28.0'	q 234	Sex	16"	ottima / ottimo	diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 3'×1.5' e con condensazione centrale marcata; c'è una stellina a SW all'interno del disco; in visione distolta il tenue alone esterno arriva a lambire le 2 stelline situate a E e NE — 270x.
NGC 3171	gx	10h15m37s	−20°38.9'	q 324	Hya	16"	ottima / ottimo	lucore molto debole e stemperato, di luminosità uniforme, approssim. rotondo con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 3172	gx	11h47m14s	+89°05.6'	q 1	UMi	24"	ottima / buono	**Polarissima** — diffusa rotonda con Ø di 1' e nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NW — 340x.
NGC 3173	gx	10h14m34s	−27°41.5'	q 324	Ant	16"	ottima / ottimo	diffusa, pressoché circolare con Ø di ~ 1'; presenta una nucleo stellare visibile a momenti; situata a poco più di 1' W di una stellina brillante — 270x.
NGC 3175	gx	10h14m42s	−28°52.3'	q 365	Ant	16"	ottima / m. buono	estesa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 4'×1'; presenta una graduale caduta di luce verso i margini dell'allungamento; non sono riuscito a discernere un nucleo o un bulge più brillante — 270x.
NGC 3177	gx	10h16m34s	+21°07.4'	q 144	Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno ma con basso gradiente di luce, rotonda con Ø < 1'; appare debolmente screziata a 450x (debolmente visibile nel 10" dove tuttavia appariva di luminosità uniforme).
NGC 3178	gx	10h16m09s	−15°47.5'	q 279	Hya	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 3179	gx	10h17m57s	+41°06.9'	q 72	UMa	16"	mediocre / discreto	presenta un bulge compatto, rotondo, con Ø di ~ 30", un nucleo puntiforme e un tenuissimo alone esteso per ~ 1.5' in direzione NE-SW; forma un piccolo arco con 2 stelline situate a SW — 270x.
NGC 3182	gx	10h19m33s	+58°12.4'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di oltre 1'; c'è una debole stellina a 1.5' verso SW (facilmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3183	gx	10h21m50s	+74°10.6'	q 8	Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; in visione distolta, abbassando gli ingrandimenti (340x), sembra a tratti immersa in una tenuissima e indistinta lattescenza; c'è un minuscolo rombo di 4 stelline a ridosso N (la componente a SE è appena percettibile). La gx era debolmente visibile nel 10" e del piccolo rombo erano a mala pena visibili, a 178x, le 2 stelline più a W).
NGC 3184	gx	10h18m17s	+41°25.5'	q 72	UMa	16"	ottima / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 5'; il bulge appare estesa una 30-ina di secondi ed è poco contrastato sul fondo cielo; c'è una stellina brillante a ridosso verso N e un'altra molto più debole a SE all'interno dell'alone — 270x.
NGC 3185	gx	10h17m38s	+21°41.3'	q 144	Leo	16"	m. buona / m. buono	fa parte di un celebre quartetto di galassie assieme a NGC 3187, -90 e -93 — molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE, di dimensioni 1.5'×1' e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso W e un'altra di eguale luminosità poco più distante a SW — 270x.
NGC 3186	gx	10h17m38s	+06°58.3'	q 189	Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, molto stemperata sul fondo cielo e con Ø di 40-ina di secondi; è situata a ~ 1' SE di una stellina — 380x.
NGC 3187	gx	10h17m48s	+21°52.4'	q 144	Leo	16"	m. buona / m. buono	è la componente più debole del quartetto di NGC 3185 — molto allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30", di luminosità uniforme e con le estremità assai sfumate; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 270x.
NGC 3188	gx	10h19m43s	+57°25.4'	q 45	UMa	16"	mediocre / scarso	molto debole, di dimensioni di ~ 1', diffusa, di forma indistinta e di luminosità pressoché uniforme; c'è una debole stellina a ridosso verso NW e un'altra appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso E — 188x.

NGC 3190	gx	10h18m06s	+21°50.0'	q 144	Leo	16"	m. buona / m. buono	fa parte del quartetto di NGC 3185 — molto allungata da NW a SE, di dimensioni 4'×1', con bulge marcato e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso W — 270x.
NGC 3191	gx	10h19m05s	+46°27.3'	q 72	UMa	16"	mediocre / discreto	appariva stranamente debole per essere una galassia di appena 13a grandezza, forse a causa del passaggio di un cirro; era comunque poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 3192	gx	10h18m58s	+46°27.3'	q 72	UMa	16"	mediocre / discreto	relativamente compatta, pressoché circolare con Ø di ~ 20", appena più brillante verso l'interno e con i bordi abbastanza netti; è situata ~ 1' a W di NGC 3191 — 270x.
NGC 3193	gx	10h18m25s	+21°53.6'	q 144	Leo	16"	m. buona / m. buono	fa parte del quartetto di NGC 3185 — rotonda con Ø > 1' e altro gradiente di luce; presenta un bulge ben contrastato e un nucleo stellare — 270x.
NGC 3197	gx	10h14m27s	+77°49.2'	q 8	Dra	24"	m. buona / m. buono	poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso SE; è situata tra 2 stelle brillanti distanti 7' orientate da NE a SW che non sembrano però interferire con l'osservazione (era visibile, seppur molto debolmente, anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3198	gx	10h19m55s	+45°33.1'	q 72	UMa	16"	ottima / ottimo	è un bel fuso orientato da NE a SW, di dimensioni 6'×1.5', ma con gradiente di luce molto basso; appare leggermente screziato 270x e con un piccolo bulge diffuso molto tenue; una coppia di stelline di uguale luminosità e distanti 1' si trova a S, mentre a N c'è una doppia stretta con componenti abbastanza brillanti.
NGC 3200	gx	10h18m36s	−17°59.0'	q 324	Hya	24"	m. buona / buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 3'×45", assai stemperata alle estremità N e S, con piccolo bulge marcato di 20"×10"; c'è una stellina verso il bordo N (la gx era visibile, seppure molto debolmente, anche nel 10"; persino la condensazione centrale appariva abbastanza distintamente a 178x) — 450x.
NGC 3202	gx	10h20m32s	+43°01.3'	q 72	UMa	16"	mediocre / discreto	rotonda, con Ø di 1', gradatamente più brillante verso l'interno e con una stellina molto debole a ridosso verso NE; un'altra stellina più brillante è invece situata a 1' W rispetto al bulge — 270x.
NGC 3203	gx	10h19m34s	−26°41.9'	q 324	Hya	16"	ottima /ottimo	facile, è un fuso orientata da NE a SW , di dimensioni 2'×30" con bulge evidente, diffuso e nucleo stellare — 270x.
NGC 3204	gx	10h20m11s	+27°49.0'	q 144	Leo	16"	m. buona / ottimo	debole galassia relativamente compatta e facile da vedere, poco allungata ~ da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è qualche lieve irregolarità di luce all'interno che appare a tratti in visione distolta; c'è una stellina a ~ 1.5' verso N — 380x.
NGC 3205	gx	10h20m50s	+42°58.3'	q 72	UMa	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, a prima vista rotonda con Ø, ma prolungando l'osservazione si nota che è poco allungata da N a S con dimensioni 60"×50"; c'è una debole stellina al bordo NE e una abbastanza brillante subito a SW; una 3ª stellina si nota facilmente a 1' SE, ma si tratta in realtà di **PGC 2209136** — 495x.
NGC 3206	gx	10h21m48s	+56°55.8'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 2'×1'; meglio contrastata scalando a 340x (osservabile molto debolmente nel 10" a un centinaio di ingrandimenti).
NGC 3207	gx	10h21m01s	+42°59.1'	q 72	UMa	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con un bulge evidente e contrastato di dimensioni 30"×20" — 495x.
NGC 3208	gx	10h19m41s	−25°48.9'	q 324	Hya	16"	ottima /ottimo	è una debole chiazza rotonda, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda, con Ø di 80" e di luminosità uniforme; è situata tra 2 stelline brillanti distanti 4' o 5' e orientate da E a W — 270x.
NGC 3209	gx	10h20m39s	+25°30.3'	q 144	Leo	24"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo brillante, quasi stellare, circonfuso da un tenue alone, molto stemperato sul fondo cielo che in visione distolta appare circolare con Ø di 1' (già debolmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 3212	gx	10h28m16s	+79°49.4'	q 8	Dra	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile al bordo N; coppia di stelline distanti 20" a NW; forma una coppia ravvicinata con NGC 3215 — 450x.
NGC 3213	gx	10h21m17s	+19°39.1'	q 144	Leo	16"	discreta / ottimo	debole, molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, leggermente ovale, di dimensioni 50"×40" e orientata all'incirca da NW a SE — 380x.
NGC 3214	gx	10h23m08s	+57°02.3'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e nucleo stellare; situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti un paio di primi scarsi — 450x.
NGC 3215	gx	10h28m38s	+79°48.8'	q 8	Dra	24"	m. buona / m. buono	situata poco più di 1' a SW della 3212, è diffusa e di aspetto un po' irregolare, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale debolmente contrastata; c'è una stellina al bordo orientale — 450x.
NGC 3216	gx	10h21m41s	+23°55.4'	q 144	Leo	16"	discreta / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, circolare, Ø ~ 40" con condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
NGC 3219	gx	10h22m37s	+38°34.8'	q 105	LMi	16"	mediocre / discreto	molto debole, di forma indistinta, di ~ 1' di dimensioni; tuttavia in visione distolta appare chiaramente una tenue condensazione centrale diffusa — 270x.
NGC 3220	gx	10h23m45s	+57°01.6'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" (osservabile elusivamente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3221	gx	10h22m20s	+21°34.0'	q 144	Leo	24"	m. buona / m. buono	bella, molto allungata da N a S, di dimensioni 2.5'×30", molto affusolata alle 2 estremità N e S, con piccolo bulge evidente e poco contrastato (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 3222	gx	10h22m34s	+19°53.2'	q 144	Leo	24"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo molto marcato e luminoso e un tenue alone grosso modo rotondo con Ø di 1' scarso che arriva a lambire una stellina a SW (già debolmente visibile nel 10" dove tuttavia appariva di luminosità uniforme) — 450x.
NGC 3225	gx	10h25m10s	+58°09.0'	q 45	UMa	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da NNW a SSE con dimensioni 80"×40", debolmente screziata a 450x, ma nel complesso meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina brillante a 1' NE (era debolissima nel 10" a 118x e la stellina a NE appena percettibile a 178x in discrete condizioni di visibilità).
NGC 3226	gx	10h23m27s	+19°53.9'	q 144	Leo	16"	buona / buono	assieme a NGC 3227 costituisce una famosa coppia di oggetti interagenti, molto facili da osservare a 270x; la 1ª è più debole, orientata da NE a SW, di dimensioni 2'×1.5', diffusa e con bulge evidente contrastato sul disco; la 2ª è più estesa e brillante, orientata praticamente a perpendicolo con la precedente (ossia da NW a SE), con dimensioni 3'×2'; il disco appare poco più uniforme, ma presenta un nucleo molto marcato di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 3227	gx	10h23m31s	+19°51.9'		Leo	16"	buona / buono	v. **NGC 3226**
NGC 3229	gx	10h21m53s	+00°17.7'	q 234	Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40 —20 e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
NGC 3230	gx	10h23m44s	+12°34.1'	q 189	Leo	24"	m. buona / discreto	molto diffusa, con bulge rotondo poco contrastato, allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×30"; c'è una stella vistosa al bordo meridionale — 450x.
NGC 3231	aa	10h27m29s	+66°48.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	gruppo povero e disperso di 16 stelle di luminosità diseguale e del Ø di 8' (ossia poco meno della metà del campo oculare da 6.7mm che è di 18'); l'oggetto non è riportato sulla Uranometria — 270x.
NGC 3232	gx	10h24m24s	+28°01.7'	q 105	LMi	16"	ottima / m. buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, forse poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 270x.
NGC 3233	gx	10h21m57s	−22°16.1'	q 324	Hya	16"	ottima / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30", con tenue bulge diffuso e nucleo perfettamente puntiforme — 270x.
NGC 3235	gx	10h24m59s	+28°01.5'	q 105	LMi	16"	ottima / m. buono	è un ovale allungata da E a W, abbastanza brillante e relativamente compatto, con un nucleo evidente; ha dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 3236	gx	10h26m48s	+61°16.4'	q 24	UMa	16"	m. buona / mediocre	piccola galassia leggermente allungata ~ da N a S, di dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 3237	gx	10h25m43s	+39°38.8'	q 72	UMa	16"	mediocre / discreto	approssim. circolare, con Ø di ~ 1.5' con nucleo brillante, marcato e un tenuissimo alone circonfuso — 270x.
NGC 3238	gx	10h26m43s	+57°13.6'	q 45	UMa	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa rotonda con Ø di 1' scarso e gradatamente più brillante verso l'interno (già osservata nel 10") — 450x.
NGC 3239	gx	10h25m06s	+17°09.0'	q 145	Leo	24"	m. buona / ottimo	è una chiazza diffusa piuttosto irregolare, orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 3'×1'; l'estesa zona centrale è di aspetto uniforme; c'è una stella brillante a ridosso verso S; a meno di 1' E da quest'ultima si trova un nodulo luminoso ben visibile quasi stellare; la gx è tuttavia meglio contrastata scalando a 340x — q 145.
NGC 3240	gx	10h24m31s	−21°47.4'	q 325	Hya	16"	ottima / ottimo	approssim. rotonda, di luminosità pressoché uniforme, diffusa e con Ø di ~ 1'; situata 1' NNW di una stellina — 270x.
NGC 3242	np	10h24m46s	−18°38.6'	q 325	Hya	24"	mediocre / ottimo	**Fantasma di Giove** — molto brillante, poco diffusa e leggermente allungata da NW a SE con dimensioni 60"×50"; colpisce una sorta di anello concentrico, di spessore irregolare con 2 tenui anse più luminose a NW e a SE ben visibili a 450x (era facilmente osservabile anche nel 10" a 240x in una nottata con ottime condizioni di visibilità).
NGC 3243	gx	10h26m21s	−02°37.3'	q 235	Sex	16"	buona / discreto	presenta un nucleo brillante e marcato e un debole alone circonfuso, circolare con Ø di ~ 1'; c'è una stellina brillante a 1.5' NW — 188x.
NGC 3245	gx	10h27m18s	+28°30.5'	q 105	LMi	16"	ottima / m. buono	è un bell'ovale brillante, diffuso ai bordi, orientato da N a S con dimensioni 2.5'×1.5'; presenta un bulge ben evidente e un piccolo nucleo con marcate irregolarità di luce; quest'impressione diviene ben evidente a 270x..
NGC 3245A	gx	10h27m01s	+28°38.4'	q 105	LMi	16"	ottima / m. buono	è una debolissima ed elusiva lama di luce orientata da N a S, visibile solo a momenti in visione distolta — 270x.
NGC 3246	gx	10h26m42s	+03°51.7'	q 235	Sex	16"	buona / discreto	molto debole, con basso gradiente di luce, nucleo piccolo e tenue visibile solo a momenti; è orientata da E a W con dimensioni 2'×1' — 188x.
NGC 3248	gx	10h27m45s	+22°50.8'	q 145	Leo	16"	buona / ottimo	relativamente brillante, ovale, allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×30" con un nucleo marcato di aspetto stellare e alone diffuso — 270x.
NGC 3251	gx	10h29m17s	+26°06.0'	q 145	Leo	16"	discreta / ottimo	è molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", con un piccolo rigonfiamento centrale di luminosità quasi eguale; presenta un nucleo stellare visibile abbastanza facilmente — 380x.
NGC 3252	gx	10h34m23s	+73°45.8'	q 8	Dra	24"	m. buona /m. buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30", diffusa e con gradiente di luce molto basso; è disturbata dalla SAO 7161 di magnitudo 6.7 che possiede una compagna di decima a meno di 20" NW (era visibile, seppure al limite, anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3253	gx	10h28m27s	+12°42.2'	q 190	Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e di aspetto confuso, probabilmente circolare con non superiore a 1' — 380x.
NGC 3254	gx	10h29m20s	+29°29.5'	q 105	LMi	24"	m. buona / m. buono	bella, diffusa e molto allungata da NE a SW, di dimensioni 4'×1', con bulge evidente di 60"×20"; un nucleo stellare appena più luminoso del bulge appare all'interno di quest'ultimo; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso E (precedentemente osservata nel 10" nel quale erano già visibili le principali caratteristiche descritte) — 450x.
NGC 3259	gx	10h32m35s	+65°02.5'	q 24	UMa	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina molto debole a 1.5' NW (appariva debole e uniforme nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3264	gx	10h32m19s	+56°05.0'	q 46	UMa	16"	buona / mediocre	molto debole, di luminosità uniforme, leggermente allungata da N a S per 1.5'; sembra "compressa" tra 2 stelline orientate all'incirca da NE a SW — 188x.
NGC 3265	gx	10h31m07s	+28°47.8'	q 105	LMi	10"	non registrati	relativamente compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45" e con piccolo nucleo evidente; c'è una stellina a ridosso verso SE (già visibile, seppure molto debolmente, anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3266	gx	10h33m18s	+64°45.0'	q 24	UMa	16"	buona / mediocre	abbastanza compatta, pressoché circolare, con Ø di ~ 1' e con alto gradiente di luce — 188x.
NGC 3270	gx	10h31m30s	+24°52.1'	q 145	Leo	16"	discreta / ottimo	molto allungata da NNE a SSW, dimensioni 60"×20", con bulge brillante e nucleo stellare evidente — 380x.
NGC 3272	gx	10h32m10s	+28°29.0'	q 105	LMi	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima galassietta rotonda, diffusa ed estesa una 20-ina di secondi, osservabile in visione indiretta a 450x, a 1' SW di una stellina appena percettibile.
NGC 3274	gx	10h32m07s	+27°40.1'	q 145	Leo	16"	m. buona / m. buono	allungata da E a W, di dimensioni 2'×45", diffusa e con basso gradiente di luce; presenta nucleo stellare visibile a tratti; è situata all'interno di un triangolo quasi rettangolo il cui vertice orientale è occupato da una doppia stretta dalle componenti sbilanciate — 270x.
NGC 3277	gx	10h32m55s	+28°30.7'	q 105	LMi	24"	m. buona / m. buono	molto bella, diffusa, rotonda con Ø di 1.5' e gradatamente più brillante verso l'interno; in visione distolta appare a isofote, anche se queste appaiono un po' sfumate: un nucleo quasi stellare al centro, una zona circostante di 40"-45" abbastanza brillante e un alone esterno tenue e stemperato sul fondo cielo; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso NE (la gx era facilmente visibile anche nel 10") — 450x – q 105.
NGC 3279	gx	10h34m43s	+11°11.9'	q 190	Leo	24"	m. buona / buono	è un bel fuso contrastato sul fondo cielo e di luminosità uniforme, orientato da NNW a SSE ed esteso un paio di primi — 450x.
NGC 3280A	gx	10h32m44s	−12°38.2'	q 280	Hya	24"	mediocre / ottimo	assieme a NGC 3280B e -C forma un terzetto di galassiette molto piccole, condensate e serrate fra loro; la 1ª è la più diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la 2ª è più debole, probabilmente rotonda con Ø non superiore a 10"-15"; la 3ª ha un Ø simile alla precedente e presenta un nucleo stellare; la visione non sembra comunque migliorare forzando a 570x (le prime 2 erano assai difficilmente separabili nel 16" a 270x).
NGC 3280B	gx	10h32m45s	−12°38.2'	q 280	Hya	24"	mediocre / ottimo	v. **NGC 3280A**
NGC 3280C	gx	10h32m46s	−12°38.1'	q 280	Hya	24"	mediocre / ottimo	v. **NGC 3280A**
NGC 3282	gx	10h32m22s	−22°18.1'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	relativamente compatta, gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 188x.
NGC 3285	gx	10h33m36s	−27°27.3'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	abbastanza facile, allungata da WNW a ESE, con dimensioni 90"×45", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 188x.
NGC 3285A	gx	10h32m49s	−27°31.4'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	piccola, rotonda, con nucleo stellare marcato; in visione diretta sembra una stellina appena sfuocata (e in effetti il seeing a questa altezza sul orizzonte non aiuta l'eventuale confronto con le stelline adiacenti!) — 188x.
NGC 3285B	gx	10h34m37s	−27°39.1'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	è una debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 1' e che tuttavia si vede abbastanza facilmente in visione distolta — 188x.
NGC 3286	gx	10h36m21s	+58°37.2'	q 46	UMa	16"	ottima / ottimo	assieme a NGC 3288 forma una coppia di gx distanti ~ 4' in direzione N-S; la 2ª delle 2 è debole, di luminosità quasi uniforme, approssim. circolare con Ø di 1'; l'altra (la 1ª) è più facile, presenta un nucleo brillante e appare pure rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 3287	gx	10h34m48s	+21°39.0'	q 145	Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 100"×40", più sfumata verso N come se la condensazione centrale fosse un poco decentrata dalla parte opposta; appare debolmente screziata a 450x; c'è una debole stellina a 1.5' verso NE (debolmente visibile anche nel 10").
NGC 3288	gx	10h36m26s	+58°33.4'	q 46	UMa	16"	ottima / ottimo	v. **NGC 3286**
NGC 3290	gx	10h35m17s	−17°16.6'	q 280	Hya	24"	mediocre / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" — 450x.
NGC 3292	gx	10h35m34s	−06°10.8'	q 280	Sex	24"	m. buona / discreto	facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25" e con nucleo stellare appena percettibile; la visione è disturbata dalla SAO 137658 di magnitudo 10 che anche a 450x si fatica a tenere fuori campo (era debolmente visibile anche nel 16").
NGC 3294	gx	10h36m16s	+37°19.5'	q 105	LMi	10"	buona / buono	estesa, poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da NW a SE con dimensioni 3'×1.5'; finemente screziata a 450x, ma nell'insieme è più interessante a 340x (la gx è molto bella anche nel 10").
NGC 3296	gx	10h32m45s	−12°43.0'	q 280	Hya	24"	mediocre / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
NGC 3297	gx	10h33m12s	−12°40.3'		Hya	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 3298	gx	10h37m12s	+50°07.2'	q 46	UMa	16"	mediocre / discreto	molto debole, ma con gradiente di luce abbastanza elevato, probabilmente allungata da N a S per una 30-ina di secondi; 2 stelline molto deboli si trovano vicine alla galassia verso W — 270x.
NGC 3299	gx	10h36m24s	+12°42.5'	q 190	Leo	16"	ottima / ottimo	è una gx resa debole dalla bassa luminanza superficiale pur restando facilmente visibile soprattutto a ingrandimenti più bassi (188x); appare rotonda, di luminosità uniforme, con un Ø attorno a 1.5'.
NGC 3300	gx	10h36m38s	+14°10.2'	q 190	Leo	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 80"×40", con bulge evidente e nucleo stellare; a tratti debolmente screziata nella parte più interna — 450x.
NGC 3301	gx	10h36m56s	+21°52.9'	q 145	Leo	24"	discreta / m. buono	bella, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 3'×45", molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; presenta un nucleo stellare molto brillante; la visione è più interessante a 450x (facilmente visibile anche nel 10").
NGC 3303	gx	10h37m02s	+18°07.9'	q 145	Leo	16"	discreta / ottimo	debole, molto diffusa, di aspetto irregolare, vagamente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 3304	gx	10h37m38s	+37°27.4'	q 105	LMi	24"	ottima / buono	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 80"×30", diffusa alle estremità NNW e SSE, con piccolo bulge marcato e nucleo stellare (era osservabile molto debolmente anche nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 3305	gx	10h36m12s	−27°09.7'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	fa parte di un piccolo gruppo centrato sulla SAO 179027 di magnitudo 6.7 — bella, rotonda, relativamente compatta, con evidente condensazione centrale e con Ø di 45"; è situata tra due stelline orientate da E a W e distanti 3.5': quella a W è più brillante — 188x.
NGC 3306	gx	10h37m10s	+12°39.1'	q 190	Leo	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni ~ 60"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 3307	gx	10h36m17s	−27°31.8'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	molto debole, piccola e diffusa. di luminosità uniforme; non capisco la forma, ma non è più estesa di 30" — 188x.
NGC 3308	gx	10h36m22s	−27°26.3'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	diffusa, approssim. rotonda con Ø > di 1', poco più brillante all'interno; presenta un nucleo stellare visibile a tratti — 188x.
NGC 3309	gx	10h36m36s	−27°31.1'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	è poco più brillante e più piccola della contigua 3311, rotonda con Ø di 80" ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso E — 188x.
NGC 3310	gx	10h38m45s	+53°30.3'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	poco diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1.5', anche se di aspetto, a tratti un po' irregolare.
NGC 3311	gx	10h36m43s	−27°31.6'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	rotonda, diffusa, con Ø di 1.5' (più o meno metà della distanza tra le 2 stelline in mezzo alle quali si trova) e appena più brillante all'interno — 188x.
NGC 3312	gx	10h37m02s	−27°33.8'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	presenta un bulge abbastanza brillante circonfuso da un tenuissimo alone; è molto allungata da N a S con dimensioni 3'×1'; la zona centrale brillante sembra leggermente "ruotata" in senso orario rispetto all'asse della gx — 188x.
NGC 3313	gx	10h37m26s	−25°19.1'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	appare un brillante nucleo quasi stellare circonfuso da un tenue alone che salta fuori facilmente in visione distolta; questo alone è poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 188x.
NGC 3314A	gx	10h37m13s	−27°41.0'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso NW — 188x.
NGC 3314B	gx	10h37m10s	−27°39.5'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	è di aspetto stellare alla prima occhiata, ma in visione distolta è chiaramente diffusa, con Ø max di 20" — 188x.
NGC 3315	gx	10h37m19s	−27°11.5'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	è di Ø e aspetto simile alla 3305, ma di gradiente di luce minore; è in parte disturbata dalla luce di una stellina brillante situata a ridosso verso W — 188x.
NGC 3316	gx	10h37m37s	−27°35.6'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	presenta un bulge marcato e un nucleo stellare circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø poco inferiore a 1' — 188x.
NGC 3319	gx	10h39m09s	+41°41.2'	q 72	UMa	28"	m. buona / buono	è una gx molto diffusa e stemperata sul fondo cielo; a 179x appare orientata da NE a SW con dimensioni 4'×2'; a 495x l'alone nella parte esterna si confonde col fondo cielo e risalta un bulge molto contrastato di dimensioni 2'×30", ossia molto stretto e lungo; la gx è allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a NW (era visibile molto debolmente nel 10" a 126x e 190x in ottime condizioni di visibilità, ma era piuttosto difficile distinguerne la forma).
NGC 3320	gx	10h39m37s	+47°23.8'	q 72	UMa	28"	ottima / ottimo	è una bella gx poco diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30" o poco più; c'è una stellina al bordo S e una brillante un paio di primi a N (era debolmente osservabile nel 10" a 126x e 190x) — 495x.
NGC 3321	gx	10h38m50s	−11°39.0'	q 280	Sex	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa, estesa e con basso gradiente di luce, poco allungata da NNE a SSW, di dimensioni 90"×50"; c'è una stellina a ridosso di NW — 270x.
NGC 3323	gx	10h39m39s	+25°19.4'	q 145	LMi	16"	discreta / ottimo	rotonda, poco diffusa, con Ø ~ 40" e luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 30" verso SE — 380x.
NGC 3325	gx	10h39m20s	−00°12.0'	q 235	Sex	16"	buona / discreto	debole, approssim. circolare con Ø di 45 e un nucleo piccolo nettamente più brillante delle regioni periferiche; c'è una stellina poco brillante a poco più di 1' verso W; un'altra stellina di luminosità simile si trova un paio di primi a NNE — 188x.
NGC 3326	gx	10h39m32s	+05°06.5'	q 190	Sex	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso E — 450x – q 190.
NGC 3327	gx	10h39m58s	+24°05.5'	q 145	LMi	16"	discreta / ottimo	gx piccola, relativamente compatta, poco più brillante all'interno, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi40"; c'è una stellina molto debole a ridosso verso W — 380x.
NGC 3329	gx	10h44m40s	+76°48.6'	q 23	Dra	24"	m. buona / ottimo	diffusa e brillante, allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×45", con bulge ben evidente e contrastato; presenta un nucleo stellare visibile a momenti (era piuttosto debole nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3331	gx	10h40m09s	−23°49.2'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	debole, molto diffusa, e stemperata sul fondo cielo, rotonda e poco più brillante verso l'interno; al momento dell'osservazione non era più alta di 10° o 15° sull'orizzonte; ha Ø poco superiore a 1' (ossia ~ i 2/3 della distanza delle due stelline situate 3' NE) — 188x.
NGC 3332	gx	10h40m28s	+09°11.0'	q 190	Leo	16"	m. buona / ottimo	facile, rotonda, dai bordi diffusi, con alto gradiente di luce, con Ø di 1' abbondante; c'è una stellina a un paio di primi verso SW — 380x.
NGC 3334	gx	10h41m31s	+37°18.8'	q 105	LMi	24"	ottima / buono	rotonda con Ø di 1', diffusa e con nucleo stellare molto contrastato sul disco; alcune stelle luminose sono presenti negli immediati dintorni, fra cui una doppia brillante con componenti separate da una 30-ina di secondi a 3' NNE (già osservabile abbastanza facilmente nel 10" in visione distolta a 178x) — 450x.
NGC 3335	gx	10h39m34s	−23°55.3'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	anche questa, come la 3331, è rotondeggiante, ma poco più piccola, meno diffusa, con condensazione centrale puntiforme ed evidente — 188x.
NGC 3336	gx	10h40m17s	−27°46.6'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	debole, ma relativamente compatta, con gradiente di luce molto basso, poco allungata da E a W con dimensioni 80"×60"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 188x.
NGC 3337	gx	10h41m47s	+04°59.3'	q 235	Sex	16"	ottima / scarso	debole, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" con nucleo stellare visibile a tratti — 188x.
NGC 3338	gx	10h42m07s	+13°44.8'	q 190	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 4'×2'; in visione distolta arriva a lambire la SAO 99253 di magnitudo 8.5 situata a ridosso W; presenta un bulge di dimensioni 60"×40" diffuso e contrastato e un nucleo stellare molto tenue; più interessante scalando a 340x *(presenza di debole chiarore lunare)*.
NGC 3340	gx	10h42m18s	−00°22.6'	q 235	Sex	16"	buona / discreto	debole piccola galassia visibile con facilità in visione distolta, di luminosità pressoché uniforme e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile a un paio di primi a W — 188x.
NGC 3341	gx	10h42m31s	+05°02.7'	q 190	Sex	16"	ottima / scarso	debole, di aspetto un po' confuso, estesa all'incirca una 40-ina di secondi di secondi (ma non riesco a capire com'è orientata; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SW — 188x.
NGC 3343	gx	10h46m11s	+73°21.2'	q 8	Dra	16"	ottima / discreto	piccola, compatta, di forma un po' irregolare, con alto gradiente di luce, condensazione centrale brillante, puntiforme, circonfusa da un tenuissimo alone con Ø di almeno 1' — 188x.
NGC 3344	gx	10h43m31s	+24°55.4'	q 145	LMi	16"	buona / ottimo	presenta un nucleo abbastanza marcato, brillante estesa 10"-15" circonfuso da un alone rotondo di oltre 3' di Ø che si stempera molto gradatamente sul fondo cielo; c'è una stellina quasi a ridosso del nucleo verso SE; altre 2 stelline brillanti si trovano 1' E del nucleo e al bordo orientale; più interessante a 270x.
NGC 3346	gx	10h43m39s	+14°52.3'	q 190	Leo	16"	m. buona / m. buono	è una bolla diafana di aspetto uniforme, molto stemperata sul fondo cielo e di oltre 2' di Ø; ci sono 3 stelline abbastanza brillanti allineate a W della gx — 270x.
NGC 3348	gx	10h47m10s	+72°50.4'	q 24	UMa	16"	m. buona / m. buono	presenta un piccolo nucleo brillante di aspetto quasi stellare circonfuso da un alone rotondo, uniforme e con Ø poco superiore a 1'; c'è una stellina evidente a ridosso del nucleo verso SE; la gx è situata un paio di primi verso E da una stella brillante — 270x.
NGC 3349	gx	10h43m50s	+06°45.8'	q 190	Leo	24"	m. buona / buono	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e appena più brillante all'interno; forma una coppia ravvicinata con MAC 1043+0645 situata subito a S: quest'ultima è di dimensioni simili alla compagna, ma molto più debole e diffusa — 450x.
NGC 3350	gx	10h44m23s	+30°43.5'	q 105	LMi	16"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile, compatta, rotonda con Ø max di 30" e marcata nucleo stellare — 380x.
NGC 3352	gx	10h44m15s	+22°22.3'	q 145	Leo	24"	discreta / m. buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40", con piccolo bulge contrastato sul disco e nucleo stellare; è situata tra 2 stelline orientate da WNW a ESE e distanti 3' — 450x (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10", dove tuttavia appariva approssim. rotonda con Ø di 1' scarso).
NGC 3353	gx	10h45m22s	+55°57.5'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	molto piccola e debole; non si capisce la forma, neppure a 126x, ma non dovrebbe comunque essere più estesa di 30".
NGC 3356	gx	10h44m12s	+06°45.6'	q 190	Leo	24"	m. buona / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, a tratti debolmente screziata a 450x, allungata da E a W con dimensioni 60"×30".
NGC 3357	gx	10h44m21s	+14°05.0'	q 190	Leo	16"	ottima / ottimo	probabilmente rotonda, dai bordi poco definiti, con Ø di 45"; ha gradiente di luce medio di luce; c'è una stellina a 1.5' verso E — 380x.
NGC 3359	gx	10h45m36s	+63°13.4'	q 24	UMa	10"	buona / m. buono	molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni ~ 5'×3'; è molto interessante a 188x.
NGC 3360	gx	10h44m16s	−11°14.5'	q 280	Sex	16"	m. buona / ottimo	piccola, di aspetto un po' confuso, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale visibile a tratti — 270x.
NGC 3361	gx	10h44m29s	−11°12.5'	q 280	Sex	16"	m. buona / ottimo	è una diffusa chiazza lattescente di luminosità pressoché uniforme, allungata grosso modo da N a S per un paio di primi e con una stellina a ridosso del margine occidentale — 270x.
NGC 3362	gx	10h44m52s	+06°35.8'	q 190	Leo	24"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di almeno 1'; più interessante e meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 3363	gx	10h45m09s	+22°04.7'	q 145	Leo	16"	discreta / ottimo	poco diffusa, con basso gradiente di luce, relativamente facile, allungata da N a S e dimensioni 45"×30" — 380x.
NGC 3364	gx	10h48m30s	+72°25.5'	q 24	UMa	16"	m. buona / mediocre	chiazza circolare facile da vedere, ma con gradiente di luce basso, diffusa e con Ø di almeno 1' — 270x.
NGC 3365	gx	10h46m13s	+01°48.8'	q 235	Sex	10"	discreta / buono	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme; solo a momenti, a 118x, appare orientata da NW a SE ed estesa per oltre 3'.
NGC 3367	gx	10h46m35s	+13°45.1'	q 190	Leo	16"	m. buona / m. buono	rotonda, diffusa e di aspetto molto regolare; ha un diametro di un paio di primi e un nucleo stellare — 270x.
NGC 3369	gx	10h46m45s	−25°14.6'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	molto debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata ~ da E a W con dimensioni 60"×30" — 188x.
NGC 3370	gx	10h47m04s	+17°16.4'	q 145	Leo	24"	discreta / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'×1' e con nucleo quasi stellare debolmente contrastato; leggermente screziata a 450x (già osservata nel 10" anche se appariva di dimensioni più ridotte).
NGC 3374	gx	10h48m01s	+43°11.2'	q 73	UMa	16"	mediocre / discreto	molto debole, estesa per oltre 1' in direzione NNW-SSE; appare a tratti un piccolo bulge appena più brillante del disco — 270x.
NGC 3375	gx	10h47m01s	−09°56.5'	q 280	Sex	16"	m. buona / ottimo	abbastanza brillante, con alto gradiente di luce, poco diffusa, approssim. circolare con Ø di 1' — 270x.
NGC 3376	gx	10h47m26s	+06°02.9'	q 190	Sex	16"	ottima / ottimo	piccola, relativamente facile, di dimensioni 40"×20", orientata da N a S e con bulge evidente; a 1.5' verso N ci sono 3 minuscole stelline in fila — 380x.
NGC 3377	gx	10h47m42s	+13°58.1'	q 190	Leo	24"	ottima / m. buono	molto bella, strutturata a isofote: presenta un piccolo nucleo molto brillante e screziato di 20"×15" all'interno di un bulge luminoso di 90"×45" e un alone molto diffuso, orientato da NE a SW e dimensioni che in visione distolta arrivano a 4'×2'; anche se il contrasto non cambia, la visione si apprezza meglio scalando a 340x (era facilmente visibile nel 10" z 178x, anche se avevo stimato le dimensioni a circa la metà).
NGC 3377A	gx	10h47m22s	+14°04.3'	q 190	Leo	24"	ottima / m. buono	chiazza circolare con Ø di 2' scarsi, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con tenue condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina sovrapposta verso l'estremità orientale; meglio contrastata scalando a 340x (appariva elusivamente e solo a momenti nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo).
NGC 3379	gx	10h47m50s	+12°34.9'	q 190	Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un famoso terzetto assieme a NGC 3384 ed NGC 3389 — molto bella, sembra disegnata a isofote: c'è una zona centrale molto brillante, debolmente screziata con Ø di una 30-ina di secondi circondata da una corona di spessore simile; questa è circonfusa da un alone più tenue e con Ø molto stemperato sul fondo cielo e che in visione distolta supera i 3'; è altresì nota come **M105** — 340x.
NGC 3380	gx	10h48m12s	+28°36.1'	q 105	LMi	24"	ottima / buono	allungata da N a S con dimensioni 60"×40", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; non presenta nucleo stellare; c'è una stellina a un paio di primi SE (era già osservabile nel 10", compresa la stellina a SE).
NGC 3381	gx	10h48m25s	+34°42.7'	q 105	LMi	10"	non registrati	debolissima, di luminosità pressoché uniforme e assai poco contrastata sul fondo cielo; forse rotonda con Ø di oltre 1'; s'individua più facilmente a bassi ingrandimenti anche se la visione rimane soddisfacente sino a 118x.
NGC 3383	gx	10h47m19s	−24°26.3'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	rotonda, molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme e > 1'; c'è una stellina a un paio di primi verso E — 188x.
NGC 3384	gx	10h48m17s	+12°37.8'	q 190	Leo	24"	m. buona / ottimo	presenta un piccolo nucleo molto brillante circondato da una corona circolare con Ø di 1' scarso situato all'interno di un disco molto diffuso orientato da NE a SW con dimensioni 4'×2'; allineata ed equidistante con 2 stelline a SE — 340x.
NGC 3385	gx	10h48m12s	+04°55.7'	q 235	Sex	16"	buona / discreto	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti 4' in direzione N-S; la 1ª è più evidente ed estesa, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e un nucleo luminoso; a 188x non sembra tuttavia uniforme in brillanza; la 2ª è più piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, leggermente condensata e appare più facilmente in visione distolta sempre a 188x.
NGC 3386	gx	10h48m12s	+04°59.9'	q 235	Sex	16"	buona / discreto	v. **NGC 3385**
NGC 3389	gx	10h48m28s	+12°32.0'	q 190	Leo	24"	m. buona / ottimo	è la meno appariscente del trio, ma nondimeno si tratta di un bell'ovale con basso gradiente di luce, orientato da E a W, di dimensioni 2'×1' e poco diffuso — 340x.
NGC 3391	gx	10h48m56s	+14°13.2'	q 190	Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante e diffusa, ma con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina al bordo NE e una più debole a ridosso W — 450x.
NGC 3392	gx	10h51m03s	+65°46.9'	q 24	UMa	16"	ottima / buono	è un oggetto approssim. circolare di 1' al massimo di Ø con evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 3393	gx	10h48m23s	−25°09.7'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	relativamente brillante, rotonda e poco diffusa, con Ø di 45" e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso NW — 188x.
NGC 3394	gx	10h50m40s	+65°43.6'	q 24	UMa	16"	ottima / buono	situata 3.5' a SW di NGC 3393, appare più grande e relativamente brillante, di luminosità pressoché uniforme, stemperata ai bordi e rotondeggiante con Ø di 1.5' — 270x.
NGC 3395	gx	10h49m50s	+32°59.0'	q 105	LMi	10"	ottima / buono	assieme alla successiva forma una coppia di deboli chiazze di luce molto ravvicinate che alla prima occhiata, a 63x, sembravano un unico oggetto orientato da E a W e frammentato; a 188x si separano senza problemi; sono poste a perpendicolo; la 1ª è allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×30" ed è la più brillante; la 2ª è invece molto allungata da E a W, più diffusa ed estesa per oltre 2'.
NGC 3396	gx	10h49m55s	+32°59.4'	q 105	LMi	10"	ottima / buono	v. **NGC 3395**
NGC 3398	gx	10h51m35s	+55°27.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"×20" — 495x.
NGC 3399	gx	10h49m28s	+16°13.1'	q 190	Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W — 450x.
NGC 3400	gx	10h50m45s	+28°28.2'	q 105	LMi	24"	ottima / buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45" e con piccolo bulge appena più brillante poco contrastato sul disco; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' WSW (la gx era osservabile molto debolmente anche nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 3402	gx	10h50m06s	−12°40.5'	q 280	Hya	16"	m. buona / buono	debolissima, piccola e diffusa, forse rotonda con Ø max di 20" (non sono riuscito a vedere la stellina a ridosso NE) — 270x.
NGC 3403	gx	10h53m55s	+73°41.4'	q 8	Dra	24"	m. buona / ottimo	diffusa, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 2'×30" e con gradiente di luce molto basso; più interessante scalando a 340x (era visibile, seppure molto debolmente, nel 10" a 178x).
NGC 3404	gx	10h50m18s	−12°06.5'	q 280	Hya	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 90"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 3405	gx	10h49m43s	+16°14.3'	q 190	Leo	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di aspetto più uniforme rispetto a NGC 3399 (situata 4' a WSW e osservata subito prima), rotonda anch'essa con Ø di una 40-ina di secondi; forma una coppia serrata con **MCG+3-28-15** situata a ridosso NE — 450x.
NGC 3406	gx	10h51m44s	+51°01.4'	q 46	UMa	10"	m. buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e con tenue condensazione centrale — 178x.
NGC 3407	gx	10h52m18s	+61°22.8'	q 24	UMa	16"	ottima / buono	relativamente facile, piccola, compatta, con evidente condensazione centrale; è allungata da N a S e presenta dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 3408	gx	10h52m11s	+58°26.3'	q 45	UMa	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con basso gradiente di luce, a tratti debolmente screziata all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5 NE. Appariva debolissima nel 10" a 178x *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
NGC 3409	gx	10h50m20s	−17°02.6'	q 325	Hya	16"	m. buona / ottimo	debolissima, visibile a tratti in visione distolta allungata da N a S per 1' scarso; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 270x.
NGC 3410	gx	10h51m53s	+51°00.3'	q 46	UMa	16"	ottima / ottimo	è un debole lucore di forma circolare, di una 40-ina di secondi di Ø e di luminosità uniforme; è situata a ~ 2' SW della 3406 osservata col 10" in altra data — 270x.
NGC 3411	gx	10h50m26s	−12°50.7'	q 280	Hya	16"	m. buona / ottimo	brillante, rotonda, con alto gradiente di luce e di aspetto molto regolare; aumenta sensibilmente di dimensioni quando la si osserva in visione distolta: in questo caso la diffusione dell'alone si estende per almeno 1.5' — 270x.
NGC 3412	gx	10h50m53s	+13°24.7'	q 190	Leo	24"	m. buona / ottimo	bella, molto diffusa, allungata da NNW a SSE con dimensioni 3'×1.5'; presenta un piccolo nucleo molto brillante e screziato a 450x; c'è una stellina a ridosso verso N (facilmente visibile nel 10" a 178x: la stellina a N appariva però solo a momenti) — q 190.
NGC 3413	gx	10h51m21s	+32°46.0'	q 105	LMi	10"	non registrati	debole, ma con condensazione centrale evidente; è diffusa con dimensioni che a 178x appaiono di ~ 60"×30".
NGC 3414	gx	10h51m16s	+27°58.5'	q 145	LMi	16"	buona / ottimo	bella, molto diffusa, appena allungata da N a S con dimensioni 2.5'×2'; presenta un bulge abbastanza contrastato sul disco e nucleo stellare; più interessante a 270x.
NGC 3415	gx	10h51m43s	+43°42.7'	q 73	UMa	24"	m. buona / buono	brillante, con alto gradiente di luce, molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 70"×35"; c'è un triangolo quasi equilatero di stelline brillanti: la più occidentale si trova quasi a ridosso S della gx (era facilmente visibile nel 10" a 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 3416	gx	10h51m48s	+43°45.8'	q 73	UMa	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
NGC 3417	gx	10h51m02s	+08°28.4'	q 190	Leo	16"	ottima / ottimo	è una debolissima galassia rotonda, molto diffusa e con Ø max di 40" — 380x.
NGC 3418	gx	10h51m24s	+28°06.7'	q 105	LMi	16"	ottima / discreto	è un ovale molto stemperato sul fondo cielo, allungata da E a W, di dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 3419	gx	10h51m18s	+13°56.8'	q 190	Leo	16"	ottima / ottimo	presenta un piccolo nucleo brillante e un tenue alone rotondo con Ø di 30'; c'è una stellina a ridosso del nucleo di 10" a NE — 380x.
NGC 3419A	gx	10h51m20s	+14°01.4'	q 190	Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20"; solo a tratti appare appena più brillante all'interno — 380x.
NGC 3420	gx	10h50m09s	−17°14.5'	q 325	Hya	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda, con Ø < 1', poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente — 270x.
NGC 3421	gx	10h50m58s	−12°26.9'	q 280	Hya	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S, di dimensioni 1.5'×1'; c'è una stellina a ridosso verso N — 270x.
NGC 3422	gx	10h51m17s	−12°24.1'	q 280	Crt	16"	m. buona / ottimo	piccola, compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e poco più brillante all'interno; c'è una stellina brillante a una 40-ina di secondi verso SW — 270x.
NGC 3423	gx	10h51m14s	+05°50.4'	q 190	Sex	16"	m. buona / m. buono	è di luminosità uniforme e molto diffusa, grosso modo rotonda con Ø di 3'; c'è una stellina a ridosso verso NE — 270x.
NGC 3424	gx	10h51m47s	+32°54.0'	q 105	LMi	10"	non registrati	debole e con gradiente di luce molto basso, molto allungata da WSW a ESE, di dimensioni 2'×30"; c'è una stellina a poco più di 1' SW — 178x.
NGC 3425	gx	10h51m25s	+08°34.0'	q 190	Leo	24"	m. buona / buono	diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 45" e una piccola condensazione centrale evidente — 450x.
NGC 3426	gx	10h51m42s	+18°28.8'	q 145	Leo	16"	discreta / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di 45", con bulge evidente e marcato e una condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
NGC 3427	gx	10h51m26s	+08°17.9'	q 190	Leo	16"	ottima / ottimo	è allungata all'incirca da E a W, di dimensioni 40"×20", poco più brillante all'interno; presenta un piccolo nucleo di aspetto stellare visibile a tratti *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 3428	gx	10h51m29s	+09°16.8'	q 190	Leo	16"	m. buona / ottimo	è di luminosità uniforme, allungata da N a S di dimensioni 40"×20"; c'è un asterismo sghembo di 6 stelle brillanti tra la 7ª e 10ª magnitudine verso S ed estesa una ventina di primi — 380x.
NGC 3429	gx	10h50m58s	+09°15.9'	q 190	Leo	16"	m. buona / ottimo	è un oggetto piccolo ed estremamente debole, visibile soltanto a momenti in visione laterale; non dovrebbe aver dimensioni superiori a una 20-ina di secondi — 380x.
NGC 3430	gx	10h52m12s	+32°57.0'	q 105	LMi	10"	ottima / buono	bella, ma con gradiente di luce molto basso, diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 2.5'×1'.

NGC 3431	gx	10h51m15s	−17°00.5'	q 280	Crt	16"	m. buona / ottimo	debole, ma abbastanza facile da vedere anche in visione diretta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante a meno di 1' NE — 270x.
NGC 3432	gx	10h52m31s	+36°37.2'	q 105	LMi	16"	ottima / ottimo	è un bellissimo fuso di luminosità pressoché uniforme — salvo un tenuissimo bulge molto piccolo visibile a tratti — e relativamente compatto, orientata da NE a SW con dimensioni ~ 4'×45"; c'è una stellina a ridosso del bordo SE, circa a "metà galassia"; un'altra coppia di stelline di luminosità simile distanti una 30-ina di secondi si trova verso SW — 380x.
NGC 3433	gx	10h52m03s	+10°09.0'	q 190	Leo	10"	ottima / discreto	è una debolissima chiazza lattescente approssim. circolare, con Ø di un paio di primi.
NGC 3434	gx	10h51m58s	+03°47.6'	q 235	Leo	16"	buona / discreto	debole e molto diffusa, approssim. circolare con Ø di oltre 1' e con tenue condensazione centrale abbastanza marcata; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso N; poco disturbata dalla SAO 118x551 di magnitudo 9.7 situata 5' scarsi a SE — 188x.
NGC 3435	gx	10h54m48s	+61°17.4'	q 24	UMa	16"	non registrati	orientata all'incirca da NW a SE, di dimensioni 60"×30", debole, con condensazione centrale piccola e abbastanza marcata 188x.
NGC 3437	gx	10h52m35s	+22°56.1'	q 145	Leo	24"	discreta / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×40", con tenue bulge molto diffuso e poco contrastato; debolmente screziata a 450x; c'è una debole stellina a ridosso verso NW (debolmente visibile anche nel 10").
NGC 3438	gx	10h52m26s	+10°32.8'	q 190	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
NGC 3439	gx	10h52m26s	+08°33.4'	q 190	Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
NGC 3440	gx	10h53m50s	+57°07.1'	q 46	UMa	28"	m. buona / ottimo	diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×20", con bulge evidente, anche se poco contrastato sul disco; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N — 495x.
NGC 3441	gx	10h52m31s	+07°13.5'	q 190	Leo	16"	ottima / ottimo	è di luminosità uniforme, ma di aspetto un po' irregolare; comunque approssim. circolare di 45" di Ø; c'è una stella a ~ 1' verso NE *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 3442	gx	10h53m08s	+33°54.6'	q 105	LMi	10"	non registrati	molto debole, ma relativamente compatta, piccola, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; più facilmente osservabile a 118x; tuttavia a 178x appare più facilmente una stellina appena percettibile situata un paio di primi a SE.
NGC 3443	gx	10h53m00s	+17°34.5'	q 145	Leo	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e molto stemperata sul fondo cielo, con bassissima luminanza superficiale; appare a tratti allungata da NW a SE e di dimensioni 1.5'×1' *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 3444	gx	10h52m19s	+10°12.6'	q 190	Leo	16"	m. buona / buono	elusiva, appare solo a momenti a 188x, ma è totalmente indistinta; occupa il vertice settentrionale di un piccolo rombo formato da tre deboli stelline poste a triangolo rettangolo — 188x.
NGC 3445	gx	10h54m35s	+56°59.3'	q 46	UMa	28"	m. buona / ottimo	brillante, poco diffusa, rotonda con Ø di 1'; presenta una zona centrale poco contrastata orientata da NW a SE di dimensioni 40"×20", forse ascrivibile a una barra (appariva debolmente nel 10" a 178x) — 495x.
NGC 3447	gx	10h53m24s	+16°46.3'	q 190	Leo	16"	buona / ottimo	è un lucore molto debole ed esteso, orientato da N a S, di dimensioni 90"×45" e con gradiente di luce molto basso; la 3447A appare elusivamente solo a momenti a ridosso verso NE della galassia principale — 270x.
NGC 3447A	gx	10h53m31s	+16°47.1'	q 190	Leo	16"	buona / ottimo	v. **NGC 3447**
NGC 3448	gx	10h54m39s	+54°18.4'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	debole, diffusa, molto allungata da NW a SW, con dimensioni 2'×30" e di luminosità uniforme.
NGC 3450	gx	10h48m04s	−20°51.0'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	è una bolla circolare estesa 2,5' con bulge molto diffuso e un alone non perfettamente uniforme: lievi irregolarità di luce appaiono solo a momenti — 188x.
NGC 3451	gx	10h54m21s	+27°14.4'	q 145	LMi	16"	discreta / ottimo	gx facile, ma con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW e di dimensioni 60"×30" — 380x.
NGC 3452	gx	10h54m14s	−11°24.3'	q 280	Crt	16"	m. buona / ottimo	in visione distolta appare come una piccola e debole lama di luce appena più brillante all'interno e orientata da NE a SW; c'è una stellina brillante a pochi secondi verso NE — 270x.
NGC 3453	gx	10h53m40s	−21°47.6'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	compatta, leggermente ovale con dimensioni 40"×30", orientata da N a S e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ~ 1' SSW — 188x.
NGC 3454	gx	10h54m29s	+17°20.6'	q 145	Leo	16"	buona / ottimo	è una lama di luce ben regolare, orientata da NW a SE, estesa un paio di primi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 3455	gx	10h54m31s	+17°17.1'	q 145	Leo	6"	buona / ottimo	poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45", poco diffusa e di luminosità uniforme.
NGC 3456	gx	10h54m03s	−16°01.7'	q 280	Crt	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di aspetto e luminosità un po' irregolari, approssim. rotonda con Ø di 1'; il bulge, assai poco contrastato, sembra leggermente decentrato verso N; c'è una stellina brillante a ridosso NE, una molto debole poco più distante verso E e una terza a 1' SE — 450x.
NGC 3457	gx	10h54m49s	+17°37.3'	q 145	Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo stellare evidente e abbastanza marcato, rotonda con Ø di 1' scarso (appariva in maniera simile anche nel 10"); è altresì riportata come **NGC 3460** — 400x.
NGC 3458	gx	10h56m01s	+57°07.0'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	molto difficile: in visione diretta appare solo il nucleo di aspetto stellare, mentre un alone molto tenue esteso per 1' si può osservare solo in visione distolta a 188x.
NGC 3459	gx	10h54m44s	−17°02.6'	q 325	Crt	16"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×40", con bulge appena più evidente del disco — 270x.
NGC 3461	gx	10h54m55s	+17°42.5'	q 145	Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto piccola e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (non riportata sul Megastar: situata 5.5' a NNE di NGC 3457) — 570x.
NGC 3462	gx	10h55m21s	+07°41.8'	q 190	Leo	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, con alto gradiente di luce e nucleo brillante, diffuso; è approssim. circolare con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a un paio di primi verso S *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 3463	gx	10h55m13s	−26°08.4'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	debole ovale di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 80"×40" — 188x.
NGC 3464	gx	10h54m40s	−21°03.9'	q 325	Hya	16"	m. buona / scarso	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso, diffusa, orientata da NNW a SSE con dimensioni 90"×60" — 188x.
NGC 3465	gx	10h59m29s	+75°11.5'	q 8	Dra	24"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e un nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina quasi a ridosso SE; è altresì nota come NGC 3500 (appariva elusivamente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3466	gx	10h56m15s	+09°45.3'	q 191	Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di 45" — 380x.
NGC 3467	gx	10h56m44s	+09°45.5'	q 191	Leo	16"	m. buona / ottimo	più brillante di NGC 3466 e più piccola, rotonda con un Ø di ~ 30"; presenta una condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso S — 380x.
NGC 3468	gx	10h57m31s	+40°56.8'	q 73	UMa	16"	buona / m. buono	relativamente facile, con alto gradiente di luce, condensazione centrale evidente, poco allungata da NNE a SSW e con dimensioni 60"×30" — 380x.
NGC 3469	gx	10h56m58s	−14°18.0'	q 281	Crt	16"	m. buona / ottimo	è pressoché circolare, diffusa, con Ø di ~ 1' e un'evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 3470	gx	10h58m45s	+59°30.7'	q 46	UMa	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45". Era debolissima nel 10" a 178x *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
NGC 3471	gx	10h59m08s	+61°31.8'	q 24	UMa	16"	buona / mediocre	brillante, ma con basso gradiente di luce, molto diffusa, con piccolo nucleo visibile a tratti; è poco allungata da N a S e di dimensioni 60"×45" — 188x.
NGC 3473	gx	10h58m05s	+17°07.5'	q 146	Leo	16"	discreta / ottimo	diffusa, di luminosità uniforme, estesa una 40-ina di secondi; non si capisce bene la forma perché c'è una stellina brillante proprio al margine settentrionale che disturba; un'altra stellina, debole, si trova subito a E — 380x.
NGC 3474	gx	10h58m09s	+17°05.7'	q 146	Leo	16"	discreta / ottimo	più piccola e compatta di NGC 3473, rotonda, con Ø max 20"-30" e con condensazione centrale appena visibile — 380x.
NGC 3475	gx	10h58m25s	+24°13.6'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' SW e un'altra brillante a ~ 1.5' verso N — 380x.
NGC 3476	gx	10h58m07s	+09°16.6'	q 191	Leo	16"	ottima / ottimo	piccola, rotonda, diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi; è situata 1' a W di una stellina, mentre un'altra coppia di stelline molto deboli si trova 1.5' a SE — 380x.
NGC 3477	gx	10h58m13s	+09°13.0'	q 191	Leo	16"	ottima / ottimo	più piccola e compatta di NGC 3476, in visione distolta appare molto allungata all'incirca da E a W con dimensioni 30"×10" e un tenuissimo nucleo di aspetto stellare — 380x.
NGC 3478	gx	10h59m28s	+46°07.3'	q 73	UMa	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1' e con basso gradiente di luce; meglio contrastata scalando a 340x (era debolmente visibile nel 10" a 178x e in ottime condizioni di cielo).
NGC 3479	gx	10h58m55s	−14°57.7'	q 281	Crt	16"	discreta / buono	debole, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, forse poco allungata da N a S con dimensioni 1.5'×1' — 188x.
NGC 3481	gx	10h59m26s	−07°32.7'	q 281	Crt	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 3483	gx	10h59m00s	−28°28.6'	q 366	Hya	16"	m. buona / m. buono	approssim. rotonda, con evidente condensazione centrale, molto diffusa e con Ø poco superiore a 1'; è situata un paio di primi SW di una stella brillante; un'altra stellina abbastanza brillante si trova a ~ 1' verso N; c'è una debole stellina quasi a ridosso di SW che in visione distolta sembra lambirne il margine — 270x.
NGC 3485	gx	11h00m02s	+14°50.5'	q 191	Leo	24"	m. buona / m. buono	è un'estesa chiazza circolare, molto diffusa e con basso gradiente di luce; a tratti appare all'interno una zona orientata da NE a SW, ma debolmente contrastata sul disco; c'è una stellina brillante a 1' W (già precedentemente osservata col 10" a 178x) — 450x.
NGC 3486	gx	11h00m24s	+28°58.5'	q 106	LMi	24"	ottima / buono	bella, molto diffusa, rotonda con Ø di 3'; presenta un piccolo nucleo estesa una 20-ina di secondi di abbastanza contrastato sul disco; appare finemente screziata a 450x (già facilmente osservabile nel 10").
NGC 3487	gx	11h00m46s	+17°35.2'	q 146	Leo	24"	m. buona / ottimo	allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×30", diffusa e con basso gradiente di luce; lievi irregolarità di luce appaiono a tratti verso i bordi del fuso — 450x.
NGC 3488	gx	11h01m24s	+57°40.6'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	molto debole, di forma indistinta e di luminosità uniforme, estesa per oltre 1'; debole stellina a ridosso verso S; appare poco meglio contrastata scalando a 188x.
NGC 3489	gx	11h00m18s	+13°54.1'	q 191	Leo	16"	ottima / ottimo	allungata da ENE a WSW, di dimensioni 3'×1.5', diffusa, con bulge piccolo e brillante e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso WSW — 380x.
NGC 3490	gx	10h59m54s	+09°21.7'	q 191	Leo	16"	ottima / ottimo	è una piccola galassia molto debole, di un diametro max di una 20-ina di secondi, situato 1.5' NW di una stellina brillante — 380x.
NGC 3491	gx	11h00m35s	+12°09.7'	q 191	Leo	24"	m. buona / buono	brillante, diffusa, con alto gradiente di luce e con nucleo stellare poco contrastato; è rotonda con Ø di 45" — 450x (nel 10" a 178x appariva come un piccolo oggetto rotondo di ~ 30" di Ø, molto tenue e con una condensazione centrale appena percettibile).
NGC 3492	gx	11h00m57s	+10°30.3'	q 191	Leo	24"	m. buona / discreto	fa parte di un quartetto assieme a IC 663, IC 664 e IC 666 — poco allungata da E a W, di dimensioni 50"×40", con bulge diffuso ed evidente (nel 10" a 178x appariva molto debole, di aspetto confuso e con nucleo stellare) — 400x.
NGC 3493	gx	11h01m28s	+27°43.2'	q 193	LMi	16"	discreta / ottimo	molto debole, ma si vede chiaramente che è molto allungata da E a W, di dimensioni 40"×15" e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 3495	gx	11h01m16s	+03°37.7'	q 236	Leo	16"	m. buona / m. buono	molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 4.5'×1' e con gradiente di luce molto basso; a 270x è possibile tenere fuori campo la 58 Leonis di 5ª grandezza.
NGC 3499	gx	11h03m10s	+56°13.4'	q 46	UMa	28"	m. buona / ottimo	brillante, presenta un nucleo luminoso di 15"-20" di Ø circonfuso da un alone rotondo con Ø di una 40-ina di secondi (era facilmente visibile anche nel 10" a 178x) — 495x.
NGC 3501	gx	11h02m47s	+17°59.3'	q 146	Leo	24"	m. buona / m. buono	è un bel fuso di luminosità uniforme, orientato da NNE a SSW, esteso oltre 3' e spesso una 30-ina di secondi (già precedentemente osservata col 10" a 178x) — 450x.
NGC 3502	gx	11h02m20s	−14°08.2'	q 281	Crt	16"	discreta / buono	relativamente facile, ma di aspetto confuso e di luminosità pressoché uniforme, forse rotonda con Ø superiore a 1' — 270x.
NGC 3504	gx	11h03m11s	+27°58.3'	q 146	LMi	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 90"×45", con nucleo molto marcato e brillante di aspetto quasi stellare; c'è una stellina al bordo orientale (già precedentemente osservata col 10" a 178x) — 450x.
NGC 3506	gx	11h03m13s	+11°04.6'	q 191	Leo	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 1', di aspetto molto regolare, poco diffusa e con basso gradiente di luce; a tratti appare debolmente screziata all'interno (era debolmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3507	gx	11h03m26s	+18°08.1'	q 146	Leo	10"	discreta / ottimo	appare molto diffusa e di luminosità uniforme, ma è piuttosto disturbata dalla luce di una stella brillante sovrapposta situata a NE del centro; è approssim. circolare con Ø di 3 primi; meglio contrastata a 118x.
NGC 3508	gx	11h03m00s	−16°17.3'	q 281	Crt	16"	discreta / buono	abbastanza brillante, ma con basso gradiente di luce e di luminosità un poco irregolare; è poco allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×45"; l'allungamento viene enfatizzato a prima vista perché c'è una stellina proprio al bordo settentrionale — 270x.
NGC 3509	gx	11h04m24s	+04°49.7'	q 236	Leo	16"	buona / discreto	debole e molto diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×30" e di luminosità pressoché uniforme anche se a momenti in visione distolta appare alquanto irregolare — 188x.
NGC 3510	gx	11h03m44s	+28°53.1'	q 106	LMi	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 2'×30", con bulge diffuso ed esteso, ma assai poco contrastato; si fatica un po' a tenere fuori campo la SAO 81642 di 7ª grandezza situata 7.5' a NW (era debolmente visibile 10" a 178x) — 450x.
NGC 3511	gx	11h03m23s	−23°05.2'	q 326	Crt	24"	ottima / buono	molto diffusa e molto allungata da E a W, di dimensioni 4'×1.5', con debole bulge esteso e poco contrastato sul disco; le dimensioni della gx sono praticamente delimitate da due stelline ai bordi E e W (già facilmente visibile nel 10") — 340x.
NGC 3512	gx	11h04m03s	+28°02.2'	q 106	LMi	24"	m. buona / m. buono	bella, di aspetto molto regolare, diffusa, rotonda con Ø di 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata all'interno di un quadrilatero irregolare di stelline (già precedentemente osservata col 10" a 178x) — 450x.
NGC 3513	gx	11h03m46s	−23°14.6'	q 326	Crt	24"	ottima / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di un paio di primi; lievi irregolarità di luce appaiono solo a momenti all'interno; la gx è comunque poco contrastata in quanto molto bassa sull'orizzonte; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E e un'altra poco più debole a circa la stessa distanza verso S (è più debole della 3511, ma era comunque ben visibile nel 10") — 450x.
NGC 3514	gx	11h04m00s	−18°46.9'	q 281	Crt	16"	m. buona / m. buono	debole chiazza rotonda di luminosità uniforme, estesa per ~ 1' e alquanto stemperata sul fondo cielo (ho dovuto osservarla a più riprese perché stava passando un maledetto cirro!) — 270x.
NGC 3515	gx	11h04m37s	+28°13.6'	q 106	LMi	16"	mediocre / scarso	debole, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e poco più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 3516	gx	11h07m48s	+72°34.1'	q 24	UMa	24"	m. buona / ottimo	rotonda e molto diffusa; sembra fatta a isofote: presenta un piccolo bulge centrale esteso una 20-ina di secondi, un nucleo stellare evidente, il tutto circonfuso da un alone che stempera su un Ø di 1.5'; più interessante scalando a 340x (era facilmente visibile anche nel 10" a 178x).
NGC 3517	gx	11h05m37s	+56°31.5'	q 46	UMa	10"	buona / mediocre	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a un paio di primi NNE — 178x.
NGC 3518	gx	11h04m21s	−06°30.4'		Leo	24"	m. buona / mediocre	piccola e debolissima, relativamente compatta e di luminosità uniforme, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni 25"×15"; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 deboli stelline: a 2' SSW e a 3' WSW (non è riportata sulla Uranometria) — 450x.
NGC 3521	gx	11h05m49s	−00°02.2'	q 236	Leo	16"	m. buona / m. buono	è già visibile nel cercatore da 50 mm; bella, molto diffusa, presenta un disco uniforme privo di screziature, allungata da NNW a SSE con dimensioni 7'×3'; un piccolo nucleo molto brillante e di aspetto quasi stellare si trova poco decentrato verso W; la gx appare più netta verso il bordo occidentale — 270x.
NGC 3522	gx	11h06m41s	+20°05.1'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", con alto gradiente di luce, ma di luminosità piuttosto irregolare — 380x.
NGC 3523	gx	11h03m06s	+75°07.1'	q 9	Dra	24"	m. buona / ottimo	di aspetto molto regolare, rotonda con Ø di 45", poco diffusa e di luminosità uniforme (era molto debole nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3524	gx	11h06m32s	+11°23.2'	q 191	Leo	24"	m. buona / m. buono	bella, molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", stemperata alle estremità del fuso, con bulge di 30"×20" evidente e contrastato; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NW (già precedentemente osservata col 10" a 178x) — 450x.
NGC 3526	gx	11h06m57s	+07°10.5'	q 191	Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta sfiorano i 100"×20" (praticamente una edge-on); c'è una stellina brillante a ridosso SW (era solo elusivamente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3527	gx	11h07m18s	+28°31.7'	q 106	UMa	16"	mediocre / scarso	molto debole, assai diffusa e di luminosità pressoché uniforme, forse rotonda con Ø di 45"; è situata un paio di primi a E di una stellina brillante — 188x.
NGC 3528	gx	11h07m18s	−19°28.3'	q 326	Crt	16"	m. buona / m. buono	presenta un piccolo bulge brillante e un alone che in visione distolta appare ovale, di dimensioni 60"×45" e orientata da NE a SW; c'è una stellina a ~ 1' verso S — 270x.
NGC 3529	gx	11h07m19s	−19°33.3'	q 326	Crt	16"	m. buona / m. buono	situata 5' N di NGC 3528 è più debole, di aspetto un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø inferiore a 1' e di luminosità pressoché uniforme salvo un nucleo puntiforme visibile perso solo a tratti — 270x.
NGC 3530	gx	11h08m40s	+57°13.8'	q 46	UMa	28"	m. buona / ottimo	brillante, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" scarse e con nucleo stellare marcato (era visibile senza difficoltà anche nel 10" a 178x) — 495x.
NGC 3534	gx	11h08m57s	+26°35.8'	q 146	Leo	16"	buona / ottimo	elusiva, piccola, estesa 20"30"; si osserva a tratti in visione distolta a S di UGC 6190; tuttavia quest'ultima appare in modo preponderante con la visione indiretta — 270x.
NGC 3535	gx	11h08m34s	+04°49.9'	q 236	Leo	16"	discreta / discreto	molto debole, presenta un nucleo piccolo e brillante e un debole alone che a tratti appare un poco allungata da N a S; c'è una stellina appena percettibile a neppure 1' verso E — 188x.
NGC 3536	gx	11h08m51s	+28°28.5'	q 106	UMa	16"	mediocre / scarso	molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta un piccolo nucleo abbastanza evidente a 188x.
NGC 3537	gx	11h08m26s	−10°15.4'	q 281	Crt	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia ravvicinata con PGC 33753 sovrapposta verso S; rotonda con Ø < 60", poco diffusa e con evidente condensazione centrale; la compagna è una sorta di pendaglio o baffo che in visione distolta si protende verso S per una 20-ina di secondi; se ne riesce a notare la tonalità più pallida — 450x.
NGC 3539	gx	11h09m09s	+28°40.3'	q 106	UMa	16"	mediocre / scarso	molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15", poco diffusa e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 3541	gx	11h08m45s	−10°57.8'	q 281	Crt	16"	discreta / buono	debole, piccola e diffusa, estesa max 30" e con condensazione stellare visibile a tratti; non riesco a capire l'eventuale orientamento perché c'è una stellina proprio al bordo orientale: non è brillante, ma disturba egualmente la visione — 270x.
NGC 3542	gx	11h09m56s	+36°56.8'	q 106	UMa	16"	ottima / m. buono	debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 3543	gx	11h10m56s	+61°20.8'	q 24	UMa	16"	non registrati	debolissima e piccola galassia relativamente compatta, di luminosità uniforme e estesa poco meno di 1' — 188x.
NGC 3545A	gx	11h10m12s	+36°57.9'	q 106	UMa	16"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva appare immersa in un alone comune, diffuso di 40"×20" e orientato sa NE a SW; tuttavia a 380x si separano abbastanza facilmente i due nuclei entrambi di aspetto stellare — 270x.
NGC 3545B	gx	11h10m13s	+36°58.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	v. **NGC 3545A**
NGC 3546	gx	11h09m47s	−13°22.8'	q 106	Crt	16"	discreta / buono	presenta un nucleo marcato stellare circonfuso da un piccolo alone abbastanza compatto; è orientata da ESE a WNW e di dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 3547	gx	11h09m56s	+10°43.2'	q 191	Leo	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 90"×45"; appare debolmente screziata a 450x.
NGC 3549	gx	11h10m57s	+53°23.3'	q 46	UMa	28"	ottima / m. buono	molto bella, diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 3'×1' e con basso gradiente di luce; maggiormente "sfilacciata" al bordo SW; ci sono 2 stelline allineate da NNE a SSW a SE della gx (era facilmente visibile anche nel 10" a 126x) — 495x.
NGC 3550	gx	11h10m38s	+28°46.0'	q 106	UMa	16"	mediocre / scarso	fa parte di un gruppo assieme ad alcune delle numerazioni seguenti — relativamente compatta, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 3551	gx	11h09m41s	+21°44.5'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	molto piccola, compatta ed estesa una 20-ina di secondi; ci dovrebbe essere qualcosa subito a SE, forse una coppia non risolta di minuscole stelline; è situata ~ 1' SW di NGC 3555 — 380x.
NGC 3552	gx	11h10m43s	+28°41.6'	q 106	UMa	16"	mediocre / scarso	sembra di forma un po' irregolare a 188x, piuttosto debole e diffusa, rotonda con Ø inferiore a 30"; c'è una debole stellina a una 40-ina di secondi verso SE.
NGC 3554	gx	11h10m48s	+28°39.6'	q 106	UMa	16"	mediocre / scarso	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con condensazione centrale puntiforme — 188x.
NGC 3555	gx	11h09m44s	+21°45.5'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di oltre 1', molto diffusa e con tenue condensazione centrale — 380x.
NGC 3556	gx	11h11m30s	+55°40.3'	q 46	UMa	24"	m. buona / buono	è un bellissimo fuso di dimensioni 8'×1.5' e orientata da E a W; ci sono 3 stelline allineate ed equidistanti che partendo da quella più brillante nei pressi del centro si protendono verso il bordo; la direzione di queste 3 stelline non coincide con l'asse della gx, ma appare poco ruotata in senso antiorario; 3 noduli sono ben visibili all'interno: il 1°, che è anche il più evidente, si trova a W della stellina brillante al centro, quasi a continuarne l'allineamento verso W; un 2° nodulo si trova al centro della gx, in mezzo a 2 delle 3 stelline di cui sopra e un 3°, il più debole, è situato a ridosso NE della stellina estrema dell'allineamento. La gx è di aspetto abbastanza regolare a 110x, ma non rimane più tale a 450x. È altresì nota come M108.
NGC 3558	gx	11h10m56s	+28°32.6'	q 106	UMa	16"	mediocre / scarso	relativamente facile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente — 188x.
NGC 3559	gx	11h10m45s	+12°01.0'	q 191	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, orientata da NE a SW con dimensioni 90"×60"; poco più sfrangiata dalla parte occidentale; appare debolmente screziata a 450x, anche se il contrasto sul fondo cielo miglior scalando a 340x (era visibile molto debolmente anche nel 10" a 178x).
NGC 3561	gx	11h11m13s	+28°41.8'	q 106	UMa	16"	mediocre / scarso	di aspetto simile a NGC 3558, di dimensioni analoghe, ma poco più debole (la gx è stata successivamente riosservata con lo stesso telescopio a 270x in ottime condizioni di visibilità, ma appariva all'incirca nello stesso modo) — 188x.
NGC 3561A	gx	11h11m13	+28°42.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta a 1' N di NGC 3561; non sembra più estesa di 30", ma bisogna scalare a 270x, perché a 380x mancano riferimenti stellari su cui appoggiarsi (non è riportata sull'Uranometria).
NGC 3562	gx	11h12m59s	+72°52.8'	q 24	Dra	16"	m. buona / mediocre	gx tutto sommato facile e brillante, leggermente ovale, orientata da N a S, di dimensioni 90"×60", diffusa e con alto gradiente di luce; c'è una stellina a pochi secondi dal bordo settentrionale — 270x.
NGC 3563A	gx	11h11m24s	+26°57.7'	q 146	Leo	16"	buona / ottimo	forma una coppia serrata con NGC 3563B — si sdoppiano facilmente a 270x, con due nuclei diffusi orientati da E a W e distanti 20"-30"; la 1ª è più grande, estesa una 40-ina di secondi, mentre la 2a, di Ø max 20", presenta una condensazione centrale più marcata.
NGC 3563B	gx	11h11m25s	+26°57.8'	q 146	Leo	16"	buona / ottimo	v. **NGC 3563B**
NGC 3567	gx	11h11m19s	+05°50.2'	q 191	Leo	16"	ottima / ottimo	galassietta compatta, con marcata nucleo stellare, rotonda con Ø max di 30" — 380x.
NGC 3569	gx	11h12m08s	+35°27.2'	q 106	UMa	16"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, con Ø di 45" e appena più brillante verso l'interno" — 380x.
NGC 3570	gx	11h12m03s	+27°35.4'	q 146	Leo	24"	m. buona / mediocre	relativamente brillante e diffusa, rotonda con Ø di 45" con nucleo stellare evidente — 450x.
NGC 3571	gx	11h11m30s	−18°17.3'	q 326	Crt	10"	ottima / m. buono	debole e diffusa, a 178x, in visione distolta, appare molto allungata da E a W con dimensioni di quasi 3'×1' — q 326.
NGC 3574	gx	11h12m08s	+27°34.3'	q 146	Leo	24"	m. buona / mediocre	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
NGC 3577	gx	11h13m45s	+48°16.4'	q 73	UMa	16"	mediocre / discreto	alquanto debole, pressoché circolare, con Ø di ~ 1', indefinita ai bordi e con basso gradiente di luce; si trova 5' SW della brillante 3583 (vedi oltre) — 270x.
NGC 3580	gx	11h13m16s	+03°39.4'	q 236	Leo	16"	discreta / discreto	molto piccola e relativamente compatta, con condensazione centrale evidente a 188x; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' verso SE — 270x.
NGC 3583	gx	11h14m11s	+48°19.1'	q 73	UMa	10"	ottima / buono	bella, relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni ~ 2'×1', con nucleo piccolo e brillante.
NGC 3585	gx	11h13m17s	−26°45.3'	q 326	Hya	10"	buona / buono	facile, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 4'×2', con bulge molto brillante; in visione distolta, a 118x, appare un tenue alone circonfuso che si estende poco oltre le dimensioni sopra riportate; c'è una stellina a un paio di primi verso NE.
NGC 3588	gx	11h14m02s	+20°23.2'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	è un oggetto compatto e rotondo, abbastanza brillante, con Ø di una 30-ina di secondi, ma la visione è particolarmente disturbata dalla luce della d Leo, situata 8' N, il cui bagliore filtra dappertutto! — 380x.
NGC 3589	gx	11h15m14s	+60°42.0'	q 46	UMa	16"	buona / mediocre	debole, con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; si trova a ridosso verso W di un trapezio formato da 4 stelle luminose che a 188x disturbano un poco l'osservazione; la più brillante di queste, situata 4' a N della gx, è la SAO 15447 di 8ª grandezza — 188x.
NGC 3591	gx	11h14m03s	−14°05.2'	q 281	Crt	16"	discreta / buono	si vede facilmente; presenta un bulge piccolo e brillante e un tenue alone molto stemperato sul fondo cielo; forse è poco allungata ~ da NW a SE con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 3592	gx	11h14m27s	+17°15.6'	q 146	Leo	16"	discreta / ottimo	in visione distolta appare come una lama di luce molto debole, di luminosità uniforme, estesa 45"e orientata da NW a SE; è situata a ~ 40" E di una stellina — 380x.
NGC 3593	gx	11h14m37s	+12°49.0'	q 191	Leo	16"	m. buona / m. buono	bella, allungata da E a W, di dimensioni 4'x1.5', con bulge vasto e contrastato sul disco; appare poco più netta all'estremità meridionale — 380x.
NGC 3594	gx	11h16m14s	+55°42.2'	q 46	UMa	16"	buona / mediocre	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e poco più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a 2.5' verso NE — 188x.
NGC 3595	gx	11h15m26s	+47°26.8'	q 73	UMa	28"	ottima / ottimo	presenta un nucleo quasi stellare molto brillante circonfuso da un alone poco allungato da N a S con dimensioni 60"×45"; la SAO 43659 di magnitudo 7.6 situata ad appena un paio di primi NNE non sembra disturbare granché l'osservazione — 495x.
NGC 3596	gx	11h15m06s	+14°47.2'	q 191	Leo	16"	m. buona / m. buono	rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con Ø di un paio di primi — 270x.
NGC 3597	gx	11h14m42s	−23°43.6'	q 326	Crt	16"	m. buona / m. buono	appare relativamente compatta, rotonda, con Ø max di 40", nucleo puntiforme visibile a tratti; c'è una stellina doppia a 1.6' NE con componenti separate da 20" in direzione ESE-WNW — 270x.
NGC 3598	gx	11h15m12s	+17°15.8'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, rotonda con Ø di 1' scarso e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso N e un'altra di luminosità simile a 1.5' verso NE — 380x.
NGC 3599	gx	11h15m27s	+18°06.6'	q 146	Leo	16"	discreta / ottimo	brillante, rotonda, diffusa, con Ø di 1', alto gradiente di luce e nucleo luminoso stellare; è situata in una piccola zona depleta — 380x.
NGC 3600	gx	11h15m52s	+41°35.5'	q 73	UMa	24"	m. buona / buono	molto allungata da N a S con dimensioni 2'×30"; presenta un bulge centrale brillante di 30"×20" ed è molto stemperata alle due estremità del fuso (la lunghezza totale si apprezza solo in visione distolta); c'è una stellina o un nodulo appena percettibile a ridosso S del bulge; appare debolmente screziata a 340x (già visibile nel 10" a 178x in condizioni di cielo analoghe).
NGC 3601	gx	11h15m33s	+05°06.9'	q 236	Leo	16"	buona / discreto	anche questa appare molto debole, piccola e relativamente compatta, con Ø inferiore a 30" e di luminosità pressoché uniforme; situata tra una stellina abbastanza brillante a 3' SSE e una coppia larga e piuttosto sbilanciata situata a poco più di 4' NNW — 188x.
NGC 3602	gx	11h15m48s	+17°25.0'	q 146	Leo	16"	discreta / ottimo	debolissima, piccola e diffusa, estesa una 20-ina di secondi; appare a 380x e in visione distolta — 380x.
NGC 3605	gx	11h16m47s	+18°01.0'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	fa parte assieme a NGC 3607 ed NGC 3608 di un celebre terzetto — brillante, con alto gradiente di luce, poco diffusa e con nucleo stellare; è allungata da N a S con dimensioni 60"×40" — 380x.
NGC 3607	gx	11h16m55s	+18°03.1'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	brillante, rotonda con Ø di ~ 3', molto diffusa, con bulge ben contrastato e nucleo stellare marcato; c'è una stellina a 1' W dal bordo occidentale — 380x.
NGC 3608	gx	11h16m59s	+18°08.9'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	poco più debole della precedente e leggermente ovale (a prima vista appare anch'essa rotonda), orientata da E a W con dimensioni 2'×1.5' — 380x.
NGC 3609	gx	11h17m50s	+26°37.6'	q 146	Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e poco allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×40", con nucleo stellare brillante — 450x.
NGC 3610	gx	11h18m25s	+58°47.2'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	rotonda, abbastanza compatta, con Ø di un paio di primi e con condensazione centrale molto evidente.
NGC 3611	gx	11h17m30s	+04°33.3'	q 236	Leo	16"	m. buona / m. buono	diffusa, poco allungata da NNE a SSW, di dimensioni 1.5'×1', diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 380x.
NGC 3612	gx	11h18m15s	+26°37.2'	q 146	Leo	24"	m. buona / ottimo	più debole di NGC 3609, da cui dista 5' verso E, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
NGC 3613	gx	11h18m36s	+58°00.0'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	brillante, poco diffusa ai bordi, allungata da E a W, di dimensioni 2'×1' e con bulge molto evidente.
NGC 3614	gx	11h18m21s	+45°44.9'	q 73	UMa	24"	m. buona / buono	chiazza estesa, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2.5'×1.5'; meglio definita e contrastata scalando a 340x (era visibile molto debolmente nel 10" a 126x e in ottime condizioni di cielo).
NGC 3614A	gx	11h18m12s	+45°43.0'	q 73	UMa	24"	m. buona / buono	è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata un paio di primi a SW della 3614 (altresì riportata come **MCG+8-21-15**).
NGC 3615	gx	11h18m07s	+23°23.9'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	presenta un bulge molto brillante e un debole alone diffuso con strane irregolarità simili a raggi. è poco allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×45" — 380x.
NGC 3617	gx	11h17m51s	−26°08.1'	q 326	Hya	16"	m. buona / m. buono	poco allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×45" e con evidente condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina a poco più di 1' verso NNE — 270x.
NGC 3618	gx	11h18m32s	+23°28.1'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	più piccola e debole di NGC 3617, circolare, con Ø di ~ 45' e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
NGC 3619	gx	11h19m21s	+57°45.5'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	debole, rotonda con Ø poco superiore a 2', molto diffusa e con tenue condensazione centrale.
NGC 3621	gx	11h18m17s	−32°48.8'	q 367	Hya	10"	buona / buono	molto debole e con gradiente di luce molto basso, orientata grosso modo da N a S con dimensioni 6'×3'; sembra racchiusa all'interno di un quadrangolo sghembo di stelle di cui quella orientale è la più debole; meglio contrastata scalando a 63x.
NGC 3622	gx	11h20m12s	+67°14.5'	q 24	UMa	16"	ottima / buono	sembra circolare alla prima occhiata, con Ø di ~ 1'; in visione distolta, tuttavia, appaiono due piccoli "baffi" alle estremità N e S — 270x.
NGC 3624	gx	11h18m51s	+07°31.3'	q 191	Leo	24"	ottima / m. buono	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; si trova al vertice meridionale di un triangolo equilatero formato con 2 stelline situate 2.5' a N e a WNW (già osservata, seppure elusivamente, nel 10" a 178x).
NGC 3625	gx	11h20m31s	+57°46.9'	q 46	UMa	16"	buona / mediocre	allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 60"×30", con nucleo piuttosto piccolo ma facilmente visibile in visione distolta a 188x.
NGC 3626	gx	11h20m04s	+18°21.4'	q 146	LMi	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 2'×1.5' e con piccolo nucleo rotondo molto brillante; in visione distolta appaiono due piccoli baffi molto tenui che sembrano dipartirsi dal nucleo a N e a S di questo; è situata tra 2 stelline di luminosità simile, una quasi a ridosso verso E e l'altra più distante a W — 450x.
NGC 3628	gx	11h20m16s	+13°35.4'	q 191	Leo	10"	ottima / discreto	nonostante sia visibile nel 15×80 è una galassia a bassa luminanza superficiale che si osserva più agilmente a bassi ingrandimenti; è posta di taglio, orientata all'incirca da E a W con un'estensione di ~ 12'; non sono riuscito a vedere la banda di polvere trasversale, ma il bulge appare comunque poco più luminoso verso N — 57x e 188x.
NGC 3629	gx	11h20m32s	+26°57.8'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di 1.5' e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a 1' SE — 380x.
NGC 3630	gx	11h20m17s	+02°57.8'	q 236	Leo	10"	ottima / discreto	abbastanza brillante, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30".
NGC 3631	gx	11h21m03s	+53°10.2'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	rotonda, diffusa ed estesa, con Ø poco inferiore a 4'; presenta un piccolo nucleo circolare molto brillante.
NGC 3633	gx	11h20m26s	+03°35.1'	q 236	Leo	16"	buona / discreto	debole, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×20" e con nucleo molto piccolo di aspetto quasi stellare; c'è una debole stellina a ~ 1.5' verso WSW (ossia sul prolungamento dell'asse maggiore della galassia); a 4' scarsi ENE c'è la SAO 118x799 di 9ª grandezza, ma non sembra interferire con l'osservazione — 188x.
NGC 3634	gx	11h20m30s	−09°00.8'	q 281	Leo	24"	m. buona / mediocre	assieme a NGC 3635 forma una coppia ravvicinata o forse interagente; la 1ª è un tenue alone grosso modo rotondo con Ø di una 20-ina di secondi attorno a una stellina brillante; la 2ª è di aspetto un po' irregolare e di luminosità uniforme, debolmente screziata a 450x, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; una stella si trova ridosso della coppia verso W.
NGC 3635	gx	11h20m31s	−09°00.8'	q 281	Crt	24"	m. buona / mediocre	v. **NGC 3634**
NGC 3636	gx	11h20m25s	−10°16.9'	q 281	Crt	24"	m. buona / mediocre	rotonda con Ø di una 50-ina di secondi, poco diffusa e con piccola condensazione centrale evidente; la visione è purtroppo disturbata dalla SAO 156618 di magnitudo 6.6 situata ad appena 1.5' SE (sia questa sia NGC 3637 erano facilmente osservabili anche nel 10") — 450x.
NGC 3637	gx	11h20m40s	−10°15.5'	q 281	Crt	24"	m. buona / mediocre	rotonda con Ø di 1', gradatamente più brillante verso l'interno, screziata a 450x; la stessa SAO di cui a NGC 3636, si trova a 3' SW — 450x.
NGC 3638	gx	11h20m10s	−08°06.4'	q 281	Crt	16"	discreta / buono	molto debole e molto allungata da NW a SE per ~ 1.5'; presenta un piccolo bulge visibile a momenti — 270x.
NGC 3639	gx	11h21m36s	+18°27.5'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità uniforme, estesa per 1' scarso e situata un paio di primi a nord di una stellina brillante — 380x.
NGC 3640	gx	11h21m07s	+03°14.1'	q 236	Leo	24"	m. buona / ottimo	è una bella gx brillante e diffusa, con alto gradiente di luce e a prima vista rotonda; a un esame più attento si scopre che è invece leggermente ovalizzata, orientata da E a W, di dimensioni 2.5'×2' e con nucleo stellare marcato; l'ovalizzazione, tuttavia, si nota meglio scalando a 200x; c'è una stellina a un paio di primi N equidistante con NGC 3641 — 400x.
NGC 3641	gx	11h21m09s	+03°11.7'	q 236	Leo	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un tenue alone molto diffuso, rotondo e con Ø di 45" — 400x.
NGC 3642	gx	11h22m18s	+59°04.5'	q 46	UMa	10"	ottima / buono	rotonda, molto diffusa ai bordi, con Ø 2.5' (ma probabilmente è superiore), con condensazione centrale evidente ed estesa.
NGC 3643	gx	11h21m25s	+03°00.8'	q 236	Leo	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante subito a SE (la posizione di questa gx e della 3645 sembrano invertite sull'Uranometria) — 450x.
NGC 3644	gx	11h21m33s	+02°48.6'	q 236	Leo	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e con gradiente di luce molto basso di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x (già osservata, anche se molto debolmente, col 16" a 188x).
NGC 3645	gx	11h21m40s	+02°57.8'	q 236	Leo	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø <30" (mi era apparsa elusivamente anche nel 16" a 188x) — 450x.
NGC 3646	gx	11h21m43s	+20°10.2'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 4'×2'; presenta un piccolo bulge poco decentrato verso SE e abbastanza contrastato su un disco di luminosità alquanto irregolare; all'interno del bulge appare un nucleo stellare — 270x.
NGC 3647	gx	11h21m35s	+02°53.6'	q 236	Leo	24"	ottima / ottimo	assieme a CGCG 39-141 e MAC 1121-0253 forma un terzetto serrato di galassie molto deboli fatto a triangolo isoscele molto schiacciato; NGC 3647 appare diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; la CGCG, a 45" SW, è la più evidente del trio, rotonda con dimensione analoga alla precedente; la MAC, infine, è quella più piccola e compatta, con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
NGC 3648	gx	11h22m31s	+39°52.6'	q 73	UMa	16"	mediocre / discreto	allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", abbastanza compatta e con un nucleo puntiforme — 270x.
NGC 3649	gx	11h22m15s	+20°12.5'	q 146	Leo	16"	buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 270x.
NGC 3650	gx	11h22m35s	+20°42.2'	q 146	Leo	16"	buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×20" (praticamente una edge-on) e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 3651	gx	11h22m26s	+24°17.9'	q 146	Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme alla successiva del gruppo denominato **Hickson 51** — poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; nota altresì come **Hickson 51A**. Una debole e piccola protuberanza estesa 12"-15" aggetta verso S, ma si tratta di **Hickson 51F** (quando avevo precedentemente osservato la 3651 col 16" mi aveva dato l'impressione che questa fosse di fatto allungata da N a S) — 450x.
NGC 3653	gx	11h22m30s	+24°16.7'	q 146	Leo	24"	m. buona / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", diffusa e con piccolo bulge brillante quasi stellare; nota altresì come **Hickson 51C** — 450x.
NGC 3654	gx	11h24m11s	+69°24.8'	q 25	UMa	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30", più brillante all'interno, ma con basso gradiente di luce; c'è una stellina percettibile solo a momenti subito a W — 450x.
NGC 3655	gx	11h22m55s	+16°35.4'	q 191	Leo	24"	m. buona / m. buono	bella, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40", con piccolo bulge brillante e un nucleo stellare leggermente decentrato verso E (già precedentemente osservata col 10" a 118x) — 450x.
NGC 3656	gx	11h23m38s	+53°50.5'	q 46	UMa	28"	ottima / m. buono	bella, rotonda con Ø di 1', diffusa, con alto gradiente di luce e di aspetto vagamente screziato, soprattutto verso l'interno; c'è una stellina brillante a ridosso W. Una sorta di debolissimo rigonfiamento al bordo S è dovuto a **MCG+9-19-64** che tende a fondersi con la gx principale *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
NGC 3657	gx	11h23m56s	+52°55.2'	q 46	UMa	10"	buona / mediocre	piccola e relativamente brillante, poco diffusa, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi; a 63x, se osservata in visione diretta, appare solo come una stellina leggermente sfocata — 178x.
NGC 3658	gx	11h23m58s	+38°33.8'	q 106	UMa	10"	ottima / buono	situata 15' SW di NGC 3665, osservata per prima — rotonda con Ø di ~ 1', relativamente compatta e con evidente condensazione centrale.
NGC 3659	gx	11h23m45s	+17°49.0'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, allungata da NE a SE con dimensioni 80"×40" e con basso gradiente di luce — 380x.
NGC 3660	gx	11h23m32s	−08°39.5'	q 281	Crt	16"	discreta / buono	facile, molto diffusa, estesa, con bassa luminanza superficiale, poco allungata da NW a SE con dimensioni 2.5'×2'; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
NGC 3661	gx	11h23m38s	−13°49.9'	q 281	Crt	16"	m. buona / discreto	debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; è situata a N di un piccolo arco di 3 stelline brillanti estesa per 2.5' e orientata da NE a SW — 270x.
NGC 3662	gx	11h23m46s	−01°06.2'	q 236	Leo	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina verso il bordo orientale e che in visione distolta appare ancora avviluppata nell'alone — 450x.

NGC 3663	gx	11h24m00s	−12°17.7'	q 281	Crt	16"	discreta / buono	è una debole gx diffusa facilmente visibile, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45", di luminosità uniforme, disturbata dalla luce di una stellina situata a ridosso del bordo orientale; c'è un'altra stellina debole a una 20-ina di secondi N di quest'ultima — 270x.
NGC 3664	gx	11h24m25s	+03°19.6'	q 236	Leo	16"	ottima / ottimo	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni ~ 2'×1' — 380x.
NGC 3664A	gx	11h24m25s	+03°13.3'	q 236	Leo	16"	ottima / ottimo	appare solo elusivamente in visione distolta a 270x, ma non dovrebbe essere più estesa di 30"; è situata 6' a S di NGC 3664 — 380x.
NGC 3665	gx	11h24m43s	+38°45.8'	q 106	UMa	10"	ottima / buono	approssim. rotonda con Ø di ∼ 3', molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con un nucleo molto luminoso.
NGC 3666	gx	11h24m26s	+11°20.5'	q 191	Leo	24"	m. buona / m. buono	è un bel fuso di aspetto abbastanza regolare, ma con basso gradiente di luce, screziato a 450x, orientato da E a W, esteso oltre 2' e spesso una 40-ina di secondi (era debolmente visibile nel 10" a 178x).
NGC 3667	gx	11h24m17s	−13°51.4'	q 281	Crt	16"	m. buona / discreto	relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 1', bulge evidente e nucleo abbastanza marcato; forma un triangolo equilatero con 2 stelline distanti 1.5' e situate a N della galassia — 270x.
NGC 3667A	gx	11h24m22s	−13°51.3'	q 281	Crt	16"	m. buona / discreto	situata a ridosso E di NGC 3667 — piccola, diffusa, molto allungata da NE a SW per una 30-ina di secondi con nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 3668	gx	11h25m30s	+63°26.8'	q 25	UMa	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 90"×60"; debolmente screziata a 450x; c'è una debole stellina al bordo NW.
NGC 3669	gx	11h25m27s	+57°43.3'	q 46	UMa	16"	buona / mediocre	molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 2'×30", ma poco definita ai bordi; il bulge è estesa , poco contrastato e a tratti appare all'interno un nucleo puntiforme — 188x.
NGC 3670	gx	11h24m50s	+23°56.7'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	è poco allungata da NE a SW,di dimensioni ~ 45"×30" con bulge visibile, ma appare nel complesso di forma piuttosto irregolare — 380x.
NGC 3671	gx	11h25m53s	+60°28.8'	q 46	UMa	16"	ottima / ottimo	molto piccola e compatta, rotonda, con Ø di una 20-ina di secondi25", con una stellina relativamente brillante a E — 270x.
NGC 3672	gx	11h25m02s	−09°47.7'	q 281	Crt	24"	m. buona / mediocre	allungata da N a S, di dimensioni almeno 3'×1', diffusa e con gradiente di luce molto basso; presenta un bulge molto tenue, estesa e appena percettibile; appare poco più sfilacciata verso S (era facilmente osservabile anche nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 3673	gx	11h25m13s	−26°44.1'	q 326	Hya	10"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW, con dimensioni 2'×1'; a poco più di 1' verso E c'è una stella doppia dalle componenti assai diseguali (quella orientale è più brillante).
NGC 3674	gx	11h26m27s	+57°02.9'	q 46	UMa	16"	ottima / ottimo	molto bella, è allungata da NNE a SSW, di dimensioni 2'×45", con un bulge molto evidente e nucleo brillante, marcato, di aspetto stellare — 270x.
NGC 3675	gx	11h26m08s	+43°35.1'	q 73	UMa	16"	ottima / m. buono	bella, luminosa, con bulge diffuso e un evidente condensazione centrale di aspetto stellare; è molto allungata da N a S con dimensioni 4'×1.5' e presenta una zona più netta, estesa per ~ 1.5' dalla parte orientale (forse in corrispondenza di una banda di polveri); c'è una stellina quasi a ridosso SSW e un'altra più debole poco più distante verso SSE — 270x.
NGC 3677	gx	11h26m17s	+46°58.4'	q 73	UMa	16"	mediocre / discreto	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45" con un nucleo puntiforme che appare a tratti anche in visione diretta — 270x.
NGC 3678	gx	11h26m16s	+27°52.0'	q 146	Leo	16"	buona / scarso	debole, di luminosità pressoché uniforme; solo a tratti appare appena più brillante verso l'interno, ma è di aspetto piuttosto confuso anche se probabilmente rotonda con Ø di 1' — 188x.
NGC 3679	gx	11h26m08s	−05°35.9'	q 281	Leo	16"	buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 40" NNE dal bordo settentrionale — 270x.
NGC 3681	gx	11h26m30s	+16°51.8'	q 146	Leo	24"	discreta / m. buono	fa parte, assieme a NGC 3684, 3686 e 3691 di un celebre quartetto con le componenti poste a "T", già precedentemente osservato col 10" a 118x; le prime 3, equidistanti e allineate in direzione NE-SW, erano facilmente visibili, mentre la quarta era piuttosto difficile e osservabile in visione distolta — presenta un piccolo nucleo luminoso di 20"×10" orientato da NW a SE all'interno di un disco uniforme, rotondo con Ø di 1' — 450x.
NGC 3682	gx	11h27m41s	+66°35.4'	q 25	Dra	16"	ottima / buono	è un bell'ovale di dimensioni 2'×1', orientata da E a W con dimensioni 90"×60" e un bulge molto brillante — 270x.
NGC 3683	gx	11h27m32s	+56°52.7'	q 46	UMa	10"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, a 86x appare orientata da NW a SE con dimensioni 90"×30" e di luminosità uniforme.
NGC 3683A	gx	11h29m12s	+57°08.0'	q 46	UMa	16"	buona / mediocre	situata 20' NE di NGC 3683 — è un ovale di dimensioni 1.5'×1' orientata grosso modo da E a W e di luminosità uniforme salvo un piccolo nucleo di aspetto stellare che appare a tratti — 270x.
NGC 3684	gx	11h27m11s	+17°01.8'	q 146	Leo	24"	discreta / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE, di dimensioni 100"×60" (l'asse maggiore sembra, cioè, di 2' scarsi) e con piccolo nucleo poco contrastato — 450x.
NGC 3686	gx	11h27m44s	+17°13.4'	q 146	Leo	24"	discreta / m. buono	già a 340x si nota un abbozzo di struttura spirale su un disco rotondo, diffuso, con Ø di 2' scarsi e con un nucleo stellare; c'è una debole stellina a ridosso verso S e una brillante subito a N della galassia.
NGC 3687	gx	11h28m00s	+29°30.7'	q 106	UMa	10"	ottima / buono	debole galassia con Ø poco superiore a 1' e con tenue condensazione centrale.
NGC 3688	gx	11h27m44s	−09°09.9'	q 281	Crt	16"	discreta / buono	debolissima e diffusa, di dimensioni non superiori a 40"; appare a tratti all'interno di un triangolo rettangolo di stelline con cateto maggiore lungo una dozzina di primi e quello minore di ~6'; c'è una stellina debole a 1'-1.5' verso E — 270x.
NGC 3689	gx	11h28m11s	+25°39.7'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	poco diffusa, con alto gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 80"×60" e nucleo stellare — 380x.
NGC 3690	gx	11h28m33s	+58°33.9'	q 46	UMa	16"	ottima / buono	forma un sistema doppio con **IC 694** situata a ridosso SW — relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, ma di luminosità un po' irregolare — 380x.
NGC 3691	gx	11h28m09s	+16°55.2'	q 146	Leo	24"	discreta / m. buono	poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
NGC 3692	gx	11h28m24s	+09°24.5'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	è un bel fuso orientata da E a W, di dimensioni 3'×30", con bulge diffuso e poco contrastato — 270x.
NGC 3693	gx	11h28m12s	−13°11.7'	q 282	Crt	16"	buona / buono	molto allungata da E a W con dimensioni 2'×45", con bulge evidente e diffuso — 270x.
NGC 3694	gx	11h28m54s	+35°24.8'	q 106	UMa	16"	buona / mediocre	debole, pressoché circolare, de Ø di 1' circa e con alto gradiente di luce — 188x.
NGC 3695	gx	11h29m17s	+35°34.5'	q 106	UMa	16"	buona / mediocre	molto debole, approssim. circolare con Ø poco inferiore a 1' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1.5' SE — 188x.
NGC 3696	gx	11h28m44s	−11°17.0'	q 282	Crt	16"	buona / buono	molto debole e piccola, visibile a tratti; appare rotonda con Ø max di 30"-40" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 3697	gx	11h28m50s	+20°47.7'	q 147	Leo	16"	velato / m. buono	molto debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con bulge poco più luminoso visibile in visione distolta — 270x.
NGC 3700	gx	11h29m39s	+35°30.9'	q 106	UMa	16"	buona / mediocre	debolissimo lucore di luminosità uniforme; a tratti appare allungata da NW a SE per poco più di 1'; c'è una stellina a un paio di primi scarsi verso E — 188x.
NGC 3701	gx	11h29m29s	+24°05.6'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	debole, estesa almeno 80"×40", allungata da NW a SE e con gradiente di luce molto basso; c'è una stellina a 30" dal margine settentrionale — 380x.
NGC 3702	gx	11h30m13s	−08°51.8'	q 282	Crt	24"	m. buona / buono	è una bella galassia diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 70"×30" e con una condensazione centrale osservabile solo a momenti; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline situate rispettivamente a 1' NW e a 2' W — 450x.
NGC 3704	gx	11h30m05s	−11°32.8'	q 282	Crt	16"	buona / buono	presenta un nucleo marcato di aspetto stellare e un alone circonfuso stemperato sul fondo cielo con Ø > di 1'; c'è una stellina evidente a 1' scarso E del nucleo — 270x.
NGC 3705	gx	11h30m07s	+09°16.6'	q 192	Leo	16"	buona / ottimo	molto diffusa e molto allungata da NW a SE, di dimensioni 4'×1.5', con piccolo bulge evidente e contrastato; c'è una stellina a ridosso del nucleo verso NW — 270x.
NGC 3707	gx	11h30m11s	−11°32.6'		Crt	16"	buona / buono	relativamente facile, appare come una stellina sfuocata a un paio di primi scarsi a E di NGC 3704 (non è riportata sull'Uranometria) — 270x.
NGC 3710	gx	11h31m07s	+22°46.1'	q 147	Leo	16"	ottima / ottimo	presenta una zona centrale ampia e diffusa di ~ 30" di Ø e un tenuissimo alone poco allungata in direzione E-W — 380x.
NGC 3711	gx	11h29m25s	−11°04.8'	q 282	Crt	16"	buona / buono	debole ovale di luminosità uniforme con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina al margine meridionale visibile a tratti — 270x.
NGC 3712	gx	11h31m09s	+28°34.1'	q 106	UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme orientata da N a S per 45" — 270x.
NGC 3713	gx	11h31m42s	+28°09.2'	q 106	Leo	16"	buona / scarso	piccola, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", bulge debole e abbastanza definita ai bordi — 188x.
NGC 3714	gx	11h31m54s	+28°21.5'	q 106	UMa	16"	ottima / m. buono	poco, compatta, rotonda, con Ø 30", abbastanza brillante e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 3715	gx	11h31m32s	−14°13.9'	q 282	Crt	16"	buona / buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 3716	gx	11h31m41s	+03°29.3'	q 237	Leo	16"	ottima / ottimo	poco diffusa, rotonda, con basso gradiente di luce e con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 3717	gx	11h31m32s	−30°18.4'	q 367	Hya	16"	m. buona / m. buono	è una gx piuttosto estesa, allungata da NE a SE, di dimensioni 4'×1' con bulge diffuso e ben contrastato su un disco molto tenue; c'è una stellina evidente all'estremità N del bulge — 270x.
NGC 3718	gx	11h32m35s	+53°04.1'	q 47	UMa	16"	m. buona / m. buono	è allungata da N a S, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con dimensioni 4'×3'; appaiono cenni di bracci sotto forma di tenuissimi "baffi" solo in visione distolta, ma bisogna scalare a 188x; c'è una coppia di stelline distanti 30"-35" situate subito a SSW e orientate quasi a perpendicolo con l'asse maggiore della gx — 270x.
NGC 3719	gx	11h32m13s	+00°49.1'	q 237	Leo	16"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 90"×60" e con basso gradiente di luce — 270x.
NGC 3720	gx	11h32m22s	+00°48.2'	q 237	Leo	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 3721	gx	11h34m08s	−09°28.0'	q 282	Crt	16"	buona / buono	fa parte di un quartetto situato a N di NGC 3732 — debolissima, appare solo a tratti in visione distolta di forma indistinta; nel campo sono presenti solo deboli stelline; ce n'è una doppia con componenti distanti una 30-ina di secondi 3' a N — 270x.
NGC 3722	gx	11h34m23s	−09°40.8'	q 282	Crt	24"	m. buona / m. buono	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno (già osservata, seppur debolmente, nel 16" a 270x) — 450x.
NGC 3723	gx	11h32m31s	−09°58.1'	q 282	Crt	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 1'; presenta un piccolo nucleo abbastanza brillante; leggermente screziata verso l'esterno; c'è un piccolo asterismo di stelline brillanti a W — 450x.
NGC 3724	gx	11h34m29s	−09°39.6'	q 282	Crt	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con tenue condensazione centrale, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" (già precedentemente osservata nel 16" a 270x) — 450x.
NGC 3725	gx	11h33m41s	+61°53.3'	q 25	UMa	16"	non registrati	rotonda, diffusa, con Ø maggiore di 1' e appena più brillante all'interno — 188x.
NGC 3726	gx	11h33m21s	+47°01.7'	q 73	UMa	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 4'×2'; presenta un piccolo nucleo brillante e rotondo con Ø di una 15-ina di secondi; il disco non è uniforme in brillanza, ma mostra una sorta di sfilacciatura verso S; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N (appariva debolmente anche nel 10" in ottime condizioni di visibilità) — 495x.
NGC 3727	gx	11h33m41s	−13°52.7'	q 282	Crt	16"	buona / buono	piccola e debole galassietta rotonda, di luminosità uniforme, estesa una 30-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' verso SE — 270x.
NGC 3728	gx	11h33m16s	+24°26.8'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	piccolo bozzolo rotondo di ~ 40" di Ø, poco diffusa e con nucleo stellare — 380x.
NGC 3729	gx	11h33m49s	+53°07.5'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	diffusa, poco allungata da NNW a SSE con dimensioni 2'×1.5' e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso verso SSW — 270x.
NGC 3731	gx	11h34m12s	+12°30.8'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, rotonda, di 45" di Ø e con nucleo stellare — 270x.
NGC 3732	gx	11h34m14s	−09°50.7'	q 282	Crt	16"	buona / buono	bella, rotonda con Ø di 1', poco diffusa, con alto gradiente di luce e nucleo brillante; sembra un piccolo ammasso globulare irrisolto (osservata anni fa anche col 10" a 178x) — 270x.
NGC 3733	gx	11h35m02s	+54°51.1'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	è molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 3'×1' e di luminosità pressoché uniforme; è molto disturbata dalla SAO 28064 di color giallo-arancio e di magnitudo 5.6 situata ad appena 4' a S e il cui alone lambisce la parte meridionale della galassia; c'è una stellina brillante un paio di primi a E — 270x.
NGC 3734	gx	11h34m41s	−14°04.9'	q 282	Crt	16"	buona / buono	più debole e diffusa di NGC 3727, forse rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme; appare con una certa difficoltà in visione distolta — 270x.
NGC 3735	gx	11h35m57s	+70°32.1'	q 25	Dra	10"	ottima / buono	è una edge-on orientata da NW a SE ed estesa per oltre 3', con bulge poco allungata e poco più brillante del disco.
NGC 3736	gx	11h35m42s	+73°26.1'	q 9	Dra	16"	ottima / discreto	è una gx difficile in quanto vi sono 2 stelline distanti ~ 30" ad essa sovrapposte; in visione distolta queste stelline, di cui quella orientale è più brillante, sembrano chiaramente immerse in una tenue chiazza lattescente estesa non più di 30" o 40" — 188x.
NGC 3737	gx	11h35m37s	+54°57.0'	q 47	UMa	16"	buona / mediocre	compatta, con alto gradiente di luce, relativamente brillante, poco allungata da E a W e di dimensioni 45"×30" — 188x.
NGC 3738	gx	11h35m48s	+54°31.5'	q 47	UMa	10"	ottima / buono	diffusa, approssim. rotonda con Ø di un paio di primi e basso gradiente di luce.
NGC 3739	gx	11h35m37s	+25°05.3'	q 147	UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da NE a SW, di luminosità uniforme e dimensioni 60"×20"; c'è una stellina ~ 1.5' a N — 380x.
NGC 3740	gx	11h36m13s	+59°58.6'	q 47	Leo	10"	buona / discreto	molto debole, di luminosità uniforme, visibile in visione distolta a 178x; a tratti appare orientata grosso modo da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile un paio di primi scarsi a SE — 178x.
NGC 3741	gx	11h36m06s	+45°17.1'	q 74	UMa	16"	mediocre / discreto	chiazza tondeggiante, debole, con gradiente di luce molto basso di luce e lievissime irregolarità di luce all'interno, di Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1.5' verso NE — 270x.
NGC 3743	gx	11h35m57s	+21°43.3'	q 147	Leo	16"	ottima / ottimo	dovrebbe essere quel debolissimo piccola galassia di aspetto confuso situato a poco più di 1' NW di una stellina brillante di 10ª magnitudo — 380x.
NGC 3744	gx	11h35m58s	+23°00.7'	q 147	Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole, in visione distolta appare come una piccola macchia lattescente orientata da N a S con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 3745	gx	11h37m44s	+22°01.3'	q 147	Leo	24"	ottima / m. buono	fa parte del **Settetto Copland** — molto piccola e compatta, in visione diretta è di aspetto quasi stellare a 340x; in visione distolta a 450x appare estesa 12"-15".
NGC 3746	gx	11h37m44s	+22°00.6'	q 147	Leo	24"	ottima / m. buono	fa parte del **Settetto Copland** — molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x
NGC 3748	gx	11h37m49s	+22°01.5'	q 147	Leo	24"	ottima / m. buono	fa parte del **Settetto Copland** — debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale molto tenue — 450x.
NGC 3750	gx	11h37m52s	+21°58.4'	q 147	Leo	24"	ottima / m. buono	fa parte del **Settetto Copland** — diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
NGC 3751	gx	11h37m54s	+21°56.2'	q 147	Leo	24"	ottima / m. buono	fa parte del **Settetto Copland** — debole, diffusa e luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
NGC 3752	gx	11h32m32s	+74°37.7'	q 9	Dra	16"	buona / discreto	relativamente facile, con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con un tenue e appena percettibile rigonfiamento centrale — 188x.
NGC 3753	gx	11h37m54s	+21°58.8'	q 147	Leo	24"	ottima / m. buono	fa parte del **Settetto Copland** — molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20", poco diffusa e di luminosità uniforme; è la componente più facile del gruppo — 450x.
NGC 3754	gx	11h37m55s	+21°59.1'	q 147	Leo	24"	ottima / m. buono	fa parte del **Settetto Copland** — tende a prima vista a fondersi con la 3753 situata a ridosso S; a 450x appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
NGC 3755	gx	11h36m33s	+36°24.6'	q 106	UMa	16"	buona / buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 3'×1', molto stemperata sul fondo cielo, gradatamente più brillante verso l'interno, ma con basso gradiente di luce; è visibile abbastanza facilmente un piccolo e debole nucleo diffuso — 270x.
NGC 3756	gx	11h36m48s	+54°17.8'	q 47	UMa	16"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 3.5'×2'; c'è una stellina brillante a > 3' verso NNW — 270x.
NGC 3757	gx	11h37m03s	+58°25.0'	q 47	UMa	16"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø < 1'; presenta bulge diffuso e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso ESE — 270x.
NGC 3758	gx	11h36m29s	+21°35.8'	q 147	Leo	16"	ottima / ottimo	piccola, debole, di luminosità uniforme, di dimensioni 30"×20", allungata da E a W e situata 1.5' E di una stella brillante — 380x.
NGC 3759	gx	11h36m54s	+54°49.4'	q 47	UMa	10"	buona / mediocre	debole e molto piccola, rotonda con Ø < 30"; presenta un nucleo stellare abbastanza marcato, tant'è che in visione diretta rimane di aspetto quasi stellare anche a 178x; c'è una stellina brillante un paio di primi a S.
NGC 3759A	gx	11h36m58s	+55°09.7'	q 47	UMa	16"	ottima / scarso	è approssim. circolare, con Ø di ~ 1' e basso gradiente di luce; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 188x.
NGC 3761	gx	11h36m44s	+22°59.5'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	debole, piccola, relativamente compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 20"-25" — 270x.
NGC 3762	gx	11h37m24s	+61°45.6'	q 25	UMa	16"	non registrati	appare come una classica spirale o lenticolare vista di 3/4; presenta un bulge luminoso, un nucleo puntiforme e un disco molto tenue e stemperato sul fondo cielo; è estesa da N a S per ~ 2' — 188x.
NGC 3763	gx	11h36m30s	−09°50.8'	q 282	Crt	16"	buona / buono	si riesce a vedere facilmente malgrado l'intenso alone causato dalla θ Crt di magnitudo 4.7 situata a neppure 4' NE; è rotonda, di luminosità pressoché uniforme, relativamente compatta e con Ø di40" (osservata anni fa col 10" a 178x) — 270x.
NGC 3764	gx	11h36m55s	+17°53.3'	q 147	Leo	16"	buona / buono	forma una coppia con NGC 3768 situata 6' a SE; la 1ª è debole allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30"e presenta un nucleo brillante stellare; la 2ª è più brillante, con alto gradiente di luce e condensazione centrale di aspetto stellare; è approssim. circolare con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a ~ 1' verso NE — 270x.
NGC 3765	gx	11h37m04s	+24°05.8'	q 147	Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' NW — 380x.
NGC 3767	gx	11h37m15s	+16°52.6'	q 192	Leo	16"	velato / m. buono	ha un piccolo nucleo abbastanza brillante quasi stellare e un debole alone stemperato sul fondo cielo, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 3768	gx	11h37m14s	+17°50.4'	q 147	Leo	16"	buona / buono	v. **NGC 3764**
NGC 3769	gx	11h37m43s	+47°53.7'	q 74	UMa	16"	m. buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 3'×45", poco diffusa e con gradiente di luce molto basso di luce — 380x.
NGC 3769A	gx	11h37m50s	+47°52.9'	q 74	UMa	16"	buona / m. buono	appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso di NGC 3769 verso SE (a prima vista sembra una semplice propaggine della gx); è molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 380x.
NGC 3770	gx	11h37m59s	+59°37.0'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	diffusa, poco più brillante all'interno e con nucleo stellare; è poco allungata all'incirca da NW a SW con dimensioni 60"×50" — 270x.
NGC 3771	gx	11h39m06s	−09°20.9'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	è di luminosità e dimensioni simili alla 3791, poco diffusa con condensazione centrale evidente quasi stellare; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' verso (N questa stellina è con tutta probabilità la MCG-1-30-17 — 270x.
NGC 3772	gx	11h37m48s	+22°41.5'	q 147	Leo	16"	ottima / ottimo	è di luminosità un poco irregolare, allungata da N a S con dimensioni 70"×35" — 380x.
NGC 3773	gx	11h38m13s	+12°06.8'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	di aspetto simile a NGC 3731, ma poco più brillante, rotonda, di Ø analogo e con condensazione centrale maggiormente marcata — 380x.
NGC 3774	gx	11h38m30s	−08°58.5'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso di luce, estesa ~ 1'; non riesco tuttavia a capire com'è orientata — 270x.
NGC 3775	gx	11h38m27s	−10°38.3'	q 282	Crt	24"	m. buona / buono	allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" e di luminosità uniforme — 450x.
NGC 3776	gx	11h38m18s	−03°21.2'	q 237	Vir	16"	mediocre / scarso	elusiva e molto piccola, visibile solo a momenti in visione distolta a 188x; si trova in mezzo a 2 stelline: una abbastanza brillante a 3' verso S e l'altra più debole a N.
NGC 3777	gx	11h36m07s	−12°34.1'	q 282	Crt	16"	buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 3779	gx	11h38m51s	−10°35.0'	q 282	Crt	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni che in visione distolta sono di ~ 80"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 3780	gx	11h39m23s	+56°16.3'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	brillante, ma di aspetto un po' irregolare a prima vista, poco allungata da E a W con dimensioni 2'×1.7'; c'è una stellina a un paio di primi verso E dal centro della gx — 270x.
NGC 3781	gx	11h39m04s	+26°21.7'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	rotondeggiante, con Ø di una30-ina di primi, basso gradiente di luce e molto diffusa; c'è una stellina a poco più di 1' verso ENE — 270x.
NGC 3782	gx	11h39m21s	+46°30.8'	q 74	UMa	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 80"×40" e con basso gradiente di luce; è praticamente delimitata da 3 stelline: una al bordo S, una più debole a ridosso N e la 3ª abbastanza brillante subito a W; visualmente appariva molto simile all'immagine RealSky del Megastar (era debolmente visibile nel 10" a 178x in una nottata con condizioni di cielo ottime) — 450x.
NGC 3784	gx	11h39m30s	+26°18.5'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	assieme a NGC 3785 forma una coppia di gx distanti ~ 1 in direzione NW-SE; la 1ª è di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30"; la 2ª presenta una condensazione centrale di aspetto stellare e un tenuissimo alone allungata da NE a SW di dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 3785	gx	11h39m33s	+26°18.1'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	v. **NGC 3784**
NGC 3786	gx	11h39m42s	+31°54.6'	q 106	UMa	16"	buona / mediocre	è un debole ovale di dimensioni 80"×40", orientata da E a W con un piccolo nucleo puntiforme visibile solo a tratti — 188x.
NGC 3787	gx	11h39m38s	+20°27.3'	q 147	Leo	16"	buona / buono	piccola galassietta di luminosità uniforme orientata da N a S e di dimensioni ~ 30"×20" — 270x.
NGC 3788	gx	11h39m45s	+31°55.8'	q 106	UMa	16"	buona / mediocre	è poco più brillante di NGC 3786 situata subito a S, e molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30" e con bulge evidente — 188x.
NGC 3789	gx	11h38m09s	−09°36.4'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	molto debole, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge evidente — 270x.
NGC 3790	gx	11h39m47s	+17°42.7'	q 147	Leo	28"	m. buona / ottimo	molto allungata da NNW a SSE, diffusa alle due estremità, di dimensioni 60"×20", con piccolo bulge brillante e contrastato — 495x.
NGC 3791	gx	11h39m41s	−09°22.0'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	facilmente visibile in visione distolta anche se debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di 45"; presenta un nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 3793	gx	11h39m27s	+31°51.2'	q 106	UMa	16"	buona / mediocre	elusiva! Appare solo a momenti in visione distolta come un baffo di luce che si diparte a N di una stellina a mo' di alone eccentrico — 188x.
NGC 3795	gx	11h40m07s	+58°36.8'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×30" — 270x.
NGC 3796	gx	11h40m31s	+60°17.9'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	facile, allungata da NW a SE, con dimensioni 60"×30", bulge luminoso e un brillante nucleo stellare — 270x.
NGC 3798	gx	11h40m14s	+24°41.8'	q 147	Leo	16"	velato / m. buono	poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×40", con nucleo brillante di aspetto stellare — 270x.
NGC 3799	gx	11h40m09s	+15°19.6'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	più debole di NGC 3800, situata quasi a ridosso verso NE, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
NGC 3800	gx	11h40m13s	+15°20.5'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", con basso gradiente di luce e di aspetto leggermente screziato a 380x.
NGC 3801	gx	11h40m17s	+17°43.7'	q 147	Leo	28"	m. buona / ottimo	bella, "vaporosa", allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1' e con basso gradiente di luce; meglio contrastata scalando a 388x.
NGC 3802	gx	11h40m19s	+17°46.0'	q 147	Leo	28"	m. buona / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×20", poco diffusa e di aspetto abbastanza uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E — 495x.
NGC 3803	gx	11h40m17s	+17°48.1'	q 147	Leo	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
NGC 3804	gx	11h40m55s	+56°12.2'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	è allungata da NW a SE con dimensioni 1.5'×1' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso verso W (altresì riportata come NGC 3794) — 270x.
NGC 3805	gx	11h40m42s	+20°20.6'	q 147	Leo	16"	buona / buono	è un oggetto abbastanza brillante, allungato da NE a SW, con dimensioni 60"×45" e bulge diffuso, ben evidente — 270x.
NGC 3807	gx	11h40m47s	+17°47.7'	q 147	Leo	28"	m. buona / ottimo	debole chiazza circolare con Ø di oltre 1' e di luminosità pressoché uniforme; meglio contrastata scalando a 388x; allineata e quasi equidistante con due stelline abbastanza brillanti (che assieme alla SAO 99729 di 9ª grandezza fanno parte di un piccolo triangolo quasi rettangolo.
NGC 3808	gx	11h40m44s	+22°25.7'	q 147	Leo	24"	ottima / m. buona	è grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con basso gradiente di luce; a 450x presenta qualche irregolarità di luminanza all'interno (era debolissima nel 10" a 178x).
NGC 3808A	gx	11h40m45s	+22°26.8'	q 147	Leo	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; situata 1' a N della precedente (questa galassietta non era visibile nel 10") — 450x.
NGC 3809	gx	11h41m16s	+59°53.2'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	presenta un nucleo stellare e marcato, circonfuso da un alone rotondo piuttosto stemperato e con Ø > 1' — 270x.
NGC 3810	gx	11h40m58s	+11°28.2'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	gx facile, ma con gradiente di luce molto basso, screziata a 380x, diffusa, leggermente ovale, orientata da N a S con dimensioni di 3'×2.5'; i bordi appaiono piuttosto irregolari a 270x.
NGC 3811	gx	11h41m16s	+47°41.5'	q 74	UMa	16"	buona / buono	leggermente ovale, orientata all'incirca da N a S, di dimensioni 90"×60", poco più brillante all'interno di luce e con piccolo nucleo puntiforme più evidente in visione distolta — 270x.
NGC 3812	gx	11h41m08s	+24°49.3'	q 147	Leo	16"	velato / m. buono	piccola, rotonda, compatta, brillante, di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 3813	gx	11h41m18s	+36°32.8'	q 107	UMa	10"	ottima / buono	poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 90"×45" e di luminosità pressoché uniforme.
NGC 3814	gx	11h41m28s	+24°48.3'	q 147	Leo	16"	velato / m. buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, osservabile in visione distolta a 178x ed estesa al massimo per una 20-ina di secondi — 270x.
NGC 3815	gx	11h41m40s	+24°48.1'	q 147	Leo	16"	velato / m. buono	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 3816	gx	11h41m48s	+20°06.2'	q 147	Leo	16"	buona / buono	presenta un nucleo stellare abbastanza brillante con un tenue alone circonfuso; allungata ~ da NE a SW di dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 3817	gx	11h41m53s	+10°18.3'	q 192	Vir	16"	buona / ottimo	fa parte di un quintetto posto a cavallo tra Vergine e Leone — debole, rotonda, diffusa, con basso gradiente di luce e con Ø di ~ 45" — 270x.
NGC 3818	gx	11h41m57s	−06°09.3'	q 282	Vir	10"	ottima / m. buono	approssim. circolare con Ø 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; il nucleo appare più evidente se osservato a 178x in visione indiretta.
NGC 3819	gx	11h42m06s	+10°21.0'	q 192	Leo	16"	buona / ottimo	rotonda, di dimensioni simili alla 3817, debole, poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 3820	gx	11h42m05s	+10°23.0'	q 192	Leo	16"	buona / ottimo	più debole e più piccola di NGC 3819 osservabile in visione distolta, rotonda con Ø di ~30" — 270x.
NGC 3821	gx	11h42m09s	+20°19.0'	q 147	Leo	16"	buona / buono	piccola, di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 270x.
NGC 3822	gx	11h42m11s	+10°16.7'	q 192	Vir	16"	buona / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con condensazione centrale evidente — 270x.
NGC 3823	gx	11h42m15s	−13°52.0'	q 282	Crt	16"	buona / buono	approssim. circolare con Ø di 45", diffusa e con condensazione centrale evidente — 270x.
NGC 3824	gx	11h42m45s	+52°46.8'	q 47	UMa	16"	buona / mediocre	abbastanza brillante e gradatamente più luminosa verso l'interno, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 188x.
NGC 3825	gx	11h42m24s	+10°15.9'	q 192	Vir	16"	buona / ottimo	rotonda, diffusa, con marcata condensazione centrale e Ø di 45" — 270x.
NGC 3826	gx	11h42m33s	+26°29.3'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	poco allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con piccolo nucleo evidente — 380x.
NGC 3827	gx	11h42m36s	+18°50.7'	q 147	Leo	16"	velato / m. buono	relativamente brillante, ma con gradiente di luce molto basso di luce, salvo una condensazione centrale di aspetto stellare visibile a tratti; è poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 3828	gx	11h42m58s	+16°29.3'	q 192	Leo	16"	velato / m. buono	molto debole e molto piccola; si vede in visione distolta a 1' NW di una stellina brillante — 270x.
NGC 3829	gx	11h43m27s	+52°42.7'	q 47	UMa	16"	buona / mediocre	situata 8' SE della 3824 è molto debole, approssim. circolare con Ø < 1', molto diffusa e appena più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 3830	gx	11h43m12s	+26°33.5'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	molto debole, piccola, rotonda, con Ø max di 20"-25" e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 3831	gx	11h43m19s	−12°52.7'	q 282	Crt	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 90"×30", con piccolo bulge bulge diffuso ed evidente (era debolmente visibile anche nel 16") — 450x.
NGC 3832	gx	11h43m31s	+22°43.5'	q 147	Leo	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di ~ 1'; è situata a un paio di primi SE di una stellina abbastanza brillante — 380x.
NGC 3833	gx	11h43m29s	+10°09.7'	q 192	Vir	16"	buona / ottimo	molto debole e molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ~ 45" a SW — 270x.
NGC 3834	gx	11h43m38s	+19°05.4'	q 147	Leo	16"	velato / m. buono	piccola, debole, di aspetto un po' confuso, di una 40-ina di secondi di Ø; non riesco a capire se presenta un nucleo puntiforme leggermente decentrato o una debole stellina a ridosso del centro — 270x.
NGC 3835	gx	11h44m05s	+60°07.2'	q 47	UMa	16"	ottima / m. buono	bella, abbastanza definita ai bordi, con alto gradiente di luce e nucleo stellare; è molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30" — 380x.
NGC 3836	gx	11h43m30s	−16°47.8'	q 282	Crt	10"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme; a 178x sembra tuttavia di aspetto un po' irregolare, ma forse è all'incirca rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina luminosa a ridosso verso N.
NGC 3837	gx	11h43m56s	+19°53.7'	q 147	Leo	16"	buona / buono	fa parte di un gruppo — abbastanza facile, circolare, con Ø di una 40-ina di secondi con evidente condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 3838	gx	11h44m14s	+57°56.9'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	bella, allungata da NW a SE con dimensioni 1.5'×30"; presenta un bulge diffuso abbastanza contrastato e un nucleo stellare — 380x.
NGC 3839	gx	11h43m54s	+10°47.1'	q 192	Leo	24"	m. buona / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 80"×30" (già precedentemente osservata, seppur molto debolmente, col 10" a 178x e in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 3840	gx	11h43m59s	+20°04.6'	q 147	Leo	16"	buona / buono	è di aspetto uniforme, rotondeggiante e diffusa, più brillante verso l'interno, con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 3841	gx	11h44m02s	+19°58.3'	q 147	Leo	16"	buona / buono	piccola, con condensazione centrale visibile a tratti, approssim. circolare di ~ 2" di Ø — 270x.
NGC 3842	gx	11h44m02s	+19°57.0'	q 147	Leo	16"	buona / buono	è un oggetto facile, rotondo, abbastanza brillante, con Ø 45" e poco più brillante all'interno; c'è una stellina a meno di 1' SE — 270x.
NGC 3843	gx	11h43m55s	+07°55.5'	q 192	Vir	16"	buona / mediocre	allungata da NE a SW di dimensioni 45"×30", relativamente compatta, e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 3844	gx	11h44m01s	+20°01.8'	q 147	Leo	16"	buona / buono	molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 45"×15", con piccola e marcata condensazione centrale — 270x.
NGC 3845	gx	11h44m05s	+19°59.7'	q 147	Leo	16"	buona / buono	osservata dopo la 3841 è, a prima vista, di aspetto simile, ma è in realtà un poco più brillante, di luminosità più uniforme e allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 270x.
NGC 3846	gx	11h44m29s	+55°39.1'	q 47	UMa	10"	buona / discreto	molto debole e assai diffusa, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme; poco meglio contrastata scalando a 118x.
NGC 3846A	gx	11h44m15s	+55°02.1'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' SE — 270x.
NGC 3847	gx	11h44m14s	+33°30.9'	q 107	UMa	16"	ottima / m. buono	relativamente brillante, rotonda, con Ø di ~ 40", abbastanza compatta e con alto gradiente di luce — 270x.
NGC 3848	gx	11h43m42s	+10°14.7'	q 192	Vir	16"	buona / ottimo	piccola e molto debole, approssim. circolare, Ø max 30" e luminosità uniforme — 270x.
NGC 3850	gx	11h45m36s	+55°53.1'	q 47	UMa	28"	m. buona / buono	allungata da NW a SE, diffusa, con dimensioni 90"×45" e con basso gradiente di luce; a tratti sembra di scorgere qualche nodulo luminoso, specie nella parte più interna della gx — 495x.
NGC 3851	gx	11h44m20s	+19°58.8'	q 147	Leo	16"	buona / buono	piccola e debole galassietta con Ø di una 20-ina di secondi, situata a una 30-ina di secondi a E di una stellina — 270x.
NGC 3853	gx	11h44m28s	+16°33.5'	q 192	Leo	24"	buona / ottimo	gx con alto gradiente di luce, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×40" e con nucleo stellare evidente a 400x (appariva di aspetto abbastanza simile anche nel 16" a 380x).
NGC 3855	gx	11h44m26s	+33°21.3'	q 107	UMa	16"	buona / m. buono	è la più evidente di un quintetto di gx molto difficili — questa è molto debole, diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' e una tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1.5' S e un'altra appena percettibile a 1.5' NE: quest'ultima, tuttavia, è poi risultata essere la MAC 1144+3322; meglio contrastata a 270x (a 380x il campo stellare è povero e ci si muove con difficoltà).
NGC 3857	gx	11h44m50s	+19°32.0'	q 147	Leo	16"	buona / buono	debole, di aspetto piuttosto confuso e di luminosità uniforme con dimensioni di 30" o 40" — 270x.
NGC 3859	gx	11h44m52s	+19°27.3'	q 147	Leo	16"	buona / buono	debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, con dimensioni 45"×15" — 270x
NGC 3860	gx	11h44m49s	+19°47.7'	q 147	Leo	16"	buona / buono	debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, dimensioni 60"×40' (dedotto in visione distolta), coi bordi molto diffusi — 270x.
NGC 3861	gx	11h45m04s	+19°58.4'	q 147	Leo	24"	m. buona / buono	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×1' e con un bulge ovale di 40"×20" orientato invece da N a S; forma una coppia ravvicinata con **MCG+3-30-94** situata a ridosso SE il campo è disturbato dalla SAO 81972 di magnitudo 7.5 situata 6.5' a SE — 450x
NGC 3862	gx	11h45m05s	+19°36.4'	q 147	Leo	16"	buona / buono	presenta un nucleo brillante stellare circonfuso da un tenue alone grosso modo circolare, con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 3863	gx	11h45m05s	+08°28.1'	q 192	Vir	16"	ottima / ottimo	è un fuso piuttosto debole e di luminosità pressoché uniforme, salvo un piccolo nucleo molto tenue; orientata all'incirca da E a W con dimensioni 2.5'×30" — 380x.
NGC 3865	gx	11h44m52s	−09°14.0'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	è relativamente brillante, diffusa, poco più brillante verso l'interno, approssim. circolare con Ø di 1.5' — 380x.
NGC 3866	gx	11h45m12s	−09°18.8'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	debole ovale di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×45" — 380x.
NGC 3867	gx	11h45m30s	+19°24.0'	q 147	Leo	16"	buona / buono	debole, di luminosità un po' irregolare, poco più brillante verso l'interno; è allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 3868	gx	11h45m30s	+19°26.7'	q 147	Leo	16"	buona / buono	è una debole galassietta di aspetto un po' confuso, di luminosità uniforme e con dimensioni di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 3869	gx	11h45m46s	+10°49.5'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, con bulge brillante e nucleo stellare; è molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×30" — 380x.
NGC 3870	gx	11h45m57s	+50°12.1'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	diffusa, poco allungata da NNE a SSW, di dimensioni 50"×40" e con nucleo stellare osservabile a 380x.
NGC 3871	gx	11h46m10s	+33°06.5'	q 107	UMa	16"	ottima / m. buono	molto debole, allungata ~ da e a W con dimensioni 40"×15" — 270x.
NGC 3872	gx	11h45m49s	+13°46.0'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	brillante e diffusa, di Ø > 1' e con nucleo puntiforme; a circa 2.5' NE appariva, seppure solo a momenti, un'elusiva stellina che da un controllo effettuato successivamente è risultata essere invece la **PGC 213878** di magnitudo 16.9! — 380x.
NGC 3873	gx	11h45m46s	+19°46.4'	q 147	Leo	16"	buona / buono	assieme a NGC 3875 forma una coppia galassiette separate da 1' in direzione E-W; la 1ª è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, con nucleo stellare; la 2ª è più uniforme, appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 270x.
NGC 3875	gx	11h45m49s	+19°46.1'	q 147	Leo	16"	buona / buono	v. **NGC 3873**
NGC 3876	gx	11h45m26s	+09°09.7'	q 192	Vir	16"	ottima / ottimo	diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45, poco più brillante verso l'interno, ma con basso gradiente di luce; c'è una debole stellina a 1' verso NE — 380x.
NGC 3877	gx	11h46m07s	+47°29.7'	q 74	UMa	16"	m. buona / m. buono	è un bel fuso orientata da NW a SE con dimensioni 6'×1'; ha un piccolo bulge diffuso che a 380x presenta una lieve irregolarità verso SW e un nucleo stellare.
NGC 3878	gx	11h46m18s	+33°12.3'	q 107	UMa	16"	ottima / m. buono	debole, piccola, di aspetto un po' confuso, grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 3879	gx	11h46m49s	+69°23.0'	q 25	Dra	16"	buona / scarso	è una debole lama di luce di luminosità uniforme, estesa per ~ 2.5' e orientata da NW a SE — 188x.
NGC 3880	gx	11h46m22s	+33°09.7'	q 107	UMa	16"	ottima / m. buono	rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e diffusa; c'è una stellina a ~ 1' verso N — 270x.
NGC 3881	gx	11h46m34s	+33°06.4'	q 107	UMa	16"	ottima / m. buono	poco più piccola di NGC 3880, debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 3883	gx	11h46m47s	+20°40.5'	q 147	Leo	16"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, circolare, con Ø di 1.5' e poco più brillante verso l'interno; in visione distolta appare a tratti un debole nucleo di aspetto stellare — 270x.
NGC 3884	gx	11h46m12s	+20°23.5'	q 147	Leo	16"	m. buona / ottimo	poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45", diffusa gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare visibile a 380x.
NGC 3885	gx	11h46m47s	−27°55.4'	q 327	Hya	16"	m. buona / m. buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1' e con bulge brillante, rotondo e diffuso; il nucleo è stellare; c'è una stellina brillante al bordo SE — 270x.
NGC 3886	gx	11h47m06s	+19°50.2'	q 147	Leo	16"	buona / buono	presenta un nucleo molto brillante, stellare, e un tenue alone; è allungata da NW a SE, con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 3887	gx	11h47m05s	−16°51.2'	q 282	Crt	24"	buona / buono	molto bella, finemente screziata a 340x, poco diffusa e contrastata sul fondo cielo, poco allungata da N a S, di dimensioni 2.5'×2' e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina molto debole al bordo NE e un'altra poco più evidente e distante a SE (la gx era già debolmente osservabile nel 10" a 118x).
NGC 3888	gx	11h47m34s	+55°58.0'	q 47	UMa	16"	m. buona / scarso	brillante, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenuissimo nucleo quasi stellare; è poco allungata da WNW a ESE con dimensioni 1.5'×1.2' — 380x.
NGC 3889	gx	11h47m48s	+56°01.1'	q 47	UMa	16"	m. buona / scarso	molto debole e piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; presenta una piccola condensazione centrale quasi stellare — 380x.
NGC 3890	gx	11h49m19s	+74°18.2'	q 9	Dra	20"	m. buona / ottimo	piuttosto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e appena più brillante all'interno (appariva elusivamente nel 10" a 178x) — 360x.
NGC 3891	gx	11h48m03s	+30°21.6'	q 107	UMa	16"	buona / m. buono	si vede facilmente: è di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30"e alquanto stemperata sul fondo cielo — 270x.
NGC 3892	gx	11h48m01s	−10°57.7'	q 282	Crt	10"	ottima / buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di un paio di primi e nucleo molto evidente; c'è una debole stellina a ridosso verso SW e un'altra più brillante a 1.5' NW — 178x.
NGC 3893	gx	11h48m38s	+48°42.6'	q 74	UMa	16"	m. buona / m. buono	rotonda, diffusa con Ø di un paio di primi; l'estesa bulge sembra situato in modo un po' asimmetrico verso W rispetto all'alone — 380x.
NGC 3894	gx	11h48m51s	+59°25.0'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con NGC 3895 — presenta un bulge brillante e contrastato su un alone diffuso di dimensioni 2'×1' e orientata da N a S — 380x.

NGC 3895	gx	11h49m04s	+59°26.0'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	poco più debole della precedente, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×45" e con tenue condensazione centrale evidente — 380x.
NGC 3896	gx	11h48m56s	+48°40.5'	q 74	UMa	16"	m. buona / m. buono	situata a poco più di 3' SW della 3893, è una chiazza di luce rotonda con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina al margine settentrionale — 380x.
NGC 3897	gx	11h48m59s	+35°01.0'	q 107	UMa	10"	ottima / m. buono	debole lucore di aspetto a prima vista un piuttosto confuso; a 118x in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di oltre 1' e di luminosità uniforme (a 178x diviene molto difficile).
NGC 3898	gx	11h49m15s	+56°05.0'	q 47	UMa	10"	ottima / buono	molto brillante, diffusa e con alto gradiente di luce, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 2.5'×1'.
NGC 3900	gx	11h49m09s	+27°01.3'	q 147	Dra	24"	m. buona / buono	bella e di aspetto molto regolare, diffusa, con bulge contrastato e nucleo stellare, allungata da N a S con dimensioni 2'×1' (già osservata nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3901	gx	11h42m49s	+77°22.4'	q 9	Cam	16"	ottima / buono	è allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 1', 5×1', con gradiente di luce molto basso di luce e assai stemperata ai bordi; c'è una stellina a ridosso verso SW — 270x.
NGC 3902	gx	11h49m19s	+26°07.3'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	debole, di luminosità pressoché uniforme; appare dapprima un po' confusa, dopodiché si capisce che è poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 380x.
NGC 3904	gx	11h49m13s	−29°16.6'	q 368	Hya	10"	buona / buono	debole e molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 2'×1.5' e con condensazione centrale visibile ma non molto contrastata — 178x.
NGC 3905	gx	11h49m05s	−09°43.8'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	debole macchia approssim. circolare, con Ø di oltre 1'; presenta lievi irregolarità di luce all'interno visibili in visione distolta — 270x.
NGC 3906	gx	11h49m40s	+48°25.5'	q 74	UMa	24"	m. buona / buono	diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di ~ 1.5', mentre in visione diretta salta fuori per prima una barra poco contrastata che corre diametralmente sul disco in direzione E-W; situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele di 3 stelline con vertice più acuto che punta a W (appariva debolmente nel 10" a 178x).
NGC 3907	gx	11h49m30s	−01°05.2'	q 237	Vir	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, poco più brillante all'interno, poco allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; presenta un nucleo stellare che appare a tratti a 380x.
NGC 3908	gx	11h49m53s	+12°11.1'	q 192	Leo	10"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a momenti a 178x a 3' SE di una stellina brillante, ma è difficile stabilire se trattasi della galassia o di una debolissima stellina di campo; se di fatto è la galassia non dovrebbe essere più estesa di una decina di secondi.
NGC 3910	gx	11h49m59s	+21°20.0'	q 147	Leo	16"	ottima / ottimo	compatta, relativamente brillante, rotonda, con Ø ~ 45" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso NW — 380x.
NGC 3911	gx	11h49m22s	+24°56.3'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare a tratti in visione distolta quasi a ridosso E di una stellina brillante; non ne capisco la forma, ma non è comunque più estesa di 30"; meglio osservabile a 380x.
NGC 3912	gx	11h50m05s	+26°28.8'	q 107	Leo	24"	m. buona / buono	brillante e poco diffusa, poco più brillante all'interno di luce, ma priva di nucleo, allungata da N a S con dimensioni 80"×40" (appariva debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3913	gx	11h50m39s	+55°21.2'	q 47	Leo	16"	m. buona / buono	debole e molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di un paio di primi; meglio contrastata a 270x.
NGC 3914	gx	11h50m33s	+06°34.1'	q 192	Vir	16"	ottima / ottimo	allungata da NE a SW, di dimensioni 70"×40", con basso gradiente di luce e piccolo bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina brillante 1.5' a N — 380x.
NGC 3916	gx	11h50m51s	+55°08.6'	q 47	UMa	16"	m. buona / discreto	fa parte di un terzetto coi appartengono NGC 3921 ed MCG+9-19-213 — è molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×30" e con bulge appena più brillante del disco — 270x.
NGC 3917	gx	11h50m45s	+51°49.5'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 5'×1' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una coppia di stelline subito a S distanti 1' e orientate da NE a SW — 270x.
NGC 3919	gx	11h50m41s	+20°00.9'	q 147	Leo	16"	buona / buono	piccola, abbastanza compatta, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi, poco più brillante all'interno; è seguita da una stellina di 12-esima a 1' di distanza — 270x.
NGC 3920	gx	11h50m06s	+24°55.2'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	rotonda, poco diffusa, Ø 40" e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 3921	gx	11h51m06s	+55°04.4'	q 47	UMa	16"	m. buona / discreto	fa parte di un terzetto cui appartengono NGC 3916 ed MCG+9-19-213 — presenta una brillante e marcata condensazione centrale circonfusa da un tenue alone diffuso approssim. poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60" — 270x.
NGC 3922	gx	11h51m14s	+50°09.5'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	in visione distolta appare molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30" e con bulge diffuso; c'è una stellina quasi a ridosso verso NNW — 380x.
NGC 3923	gx	11h51m01s	−28°48.3'	q 368	Hya	10"	buona / buono	presenta un bulge molto brillante, estesa almeno 1' e un alone circonfuso molto tenue e stemperato sul fondo cielo, orientata da NE a SW con dimensioni 5'×3'; c'è una stellina appena percettibile al bordo SW e un'altra di luminosità simile, ma poco più distante, verso NE; poco meglio contrastata a 118x.
NGC 3924	gx	11h52m39s	+50°02.3'	q 147	UMa	16"	buona / mediocre	decisamente elusiva, estesa probabilmente per oltre 1', ma di forma indistinta; appare solo a momenti a 7' o 8' NNE della SAO 28172, una stella arancione di 7ª grandezza — 188x.
NGC 3925	gx	11h51m21s	+21°53.3'	q 147	Leo	16"	buona / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme (salvo un piccolo nucleo stellare visibile, però, solo a tratti), poco allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×30" — 270x.
NGC 3926A	gx	11h51m27s	+22°01.7'	q 147	Leo	16"	buona / buono	assieme a **NGC 3926B** forma una coppia di galassiette con condensazione centrale abbastanza marcata, separate da una 30-ina di secondi in direzione E-W; quella più a E è poco più grande, ma l'altra ha il nucleo più luminoso — 270x.
NGC 3926B	gx	11h51m28s	+22°01.5'	q 147	Leo	16"	buona / buono	v. **NGC 3926A**
NGC 3928	gx	11h51m48s	+48°41.0'	q 74	UMa	16"	mediocre / discreto	presenta un nucleo puntiforme e un bulge relativamente brillante situato in posizione eccentrica rispetto a un disco diffuso molto tenue, circolare e con Ø poco superiore a 1' — 270x.
NGC 3929	gx	11h51m42s	+21°00.2'	q 147	Leo	16"	buona / buono	piccola, rotonda, di luminosità uniforme, Ø di ~ 20"; c'è una stellina a una 20-ina di secondi verso SE — 270x.
NGC 3930	gx	11h51m46s	+38°00.9'	q 107	UMa	24"	m. buona / buono	appare debole e diffusa a 340x, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 3'×2' (osservata, seppur al limite della visibilità, nel 10" a 63x).
NGC 3931	gx	11h51m13s	+52°00.0'	q 47	UMa	16"	buona / scarso	compatta, circolare con Ø di 1', gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo piccolo e brillante; ha una luminosità superficiale poco superiore alla vicina 3917; è situata 5' W di una stella arancione molto luminosa — 188x.
NGC 3932	gx	11h52m29s	+48°27.5'	q 74	UMa	16"	mediocre / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; è situata in un campo ove sono presenti solo deboli stelline — 270x.
NGC 3933	gx	11h52m02s	+16°48.6'	q 192	Leo	16"	buona / buono	assieme NGC 3934 forma una coppia di galassiette di luminosità uniforme distanti 3.5' in direzione NE-SW; la 1ª è allungata da E a W, dimensioni 40"×20" con debole bulge poco esteso e appena più brillante; la 2ª grosso modo circolare, con Ø di 45"; c'è una stellina brillante a 2' scarsi verso NE — 188x.
NGC 3934	gx	11h52m13s	+16°51.1'	q 192	Leo	16"	buona / buono	v. **NGC 3933**
NGC 3935	gx	11h52m24s	+32°24.2'	q 107	UMa	24"	m. buona / buono	allungata da ESE a WNW, di dimensioni 80"×40", con bulge estesa , luminoso e nucleo stellare visibile a tratti; appare molto diffusa alle 2 estremità (visibile come un oggetto debole e relativamente compatto anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3936	gx	11h52m20s	−26°54.4'	q 327	Hya	16"	ottima / m. buono	è una debolissima lama di luce, molto sottile, di luminosità uniforme, estesa almeno 4' e orientata da ENE a WSW — 270x.
NGC 3937	gx	11h52m43s	+20°37.8'	q 147	Leo	16"	buona / buono	relativamente facile e luminosa, poco più brillante all'interno e nucleo di aspetto stellare, brillante; approssim. circolare con Ø di 1' — 270x.
NGC 3938	gx	11h52m49s	+44°07.2'	q 74	UMa	16"	buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 3'; leggermente screziata a 380x; c'è una stellina a ridosso SW.
NGC 3940	gx	11h52m47s	+20°59.4'	q 147	Leo	16"	buona / buono	piccola, diffusa, rotonda, con Ø di ~40", con un nucleo di aspetto stellare abbastanza brillante — 270x.
NGC 3941	gx	11h52m55s	+36°59.2'	q 107	UMa	24"	m. buona / buono	molto bella e luminosa, orientata da N a S con dimensioni di almeno 3'×2'; presenta un nucleo molto brillante e un alone diffuso con gradiente di luce elevato e uniforme; c'è una debole stellina a ridosso verso E (appariva come un oggetto brillante anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3942	gx	11h51m30s	−11°25.5'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 3943	gx	11h52m56s	+20°28.8'	q 192	Leo	16"	buona / buono	debole, di luminosità uniforme e relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni di 60"×20" — 270x.
NGC 3944	gx	11h53m05s	+26°12.4'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	gx grosso modo rotonda, abbastanza compatta, Ø ~ 40"; presenta una condensazione centrale visibile senza difficoltà — 380x.
NGC 3945	gx	11h53m14s	+60°40.5'	q 47	UMa	24"	m. buona / buono	è una di quelle tipiche galassie che si presentano visualmente a isofote; un nucleo stellare situato all'interno di un bulge diffuso e brillante, di dimensioni 45"×30"; all'esterno di questo c'è un'ampia zona diffusa di dimensioni 2'×1.5', a sua volta circonfusa da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo, orientata da NW a SE con dimensioni che, in visione distolta, arrivano a 4'×3'; 3 stelline relativamente brillanti lambiscono l'alone a S, SW e NW; un'altra stellina appena percettibile si trova invece a SE (già osservata, seppur limitatamente alla zona più interna, anche nel 10" a 178x) — 340x.
NGC 3946	gx	11h53m21s	+21°01.3'	q 147	Leo	16"	buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, forse un poco allungati da E a W con dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 3947	gx	11h53m20s	+20°45.2'	q 147	Leo	16"	buona / buono	allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina di 13ª a ridosso verso E — 270x.
NGC 3949	gx	11h53m41s	+47°51.6'	q 74	UMa	24"	m. buona / buono	bella, molto brillante, ma con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 2.5'×1.5'; appare finemente screziata a 450x (facilmente osservabile anche nel 10" a 188x).
NGC 3950	gx	11h53m41s	+47°53.1'	q 74	UMa	24"	m. buona / buono	è situata a 1' N dal margine di NGC 3949; è molto debole, diffusa e molto piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (nel 16" appariva solo come una debolissima stellina sfuocata) — 450x.
NGC 3951	gx	11h53m41s	+23°22.9'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	debole ovale, di dimensioni 50"×25", orientata da N a S con una zona interna poco più brillante che sembra spostata verso il bordo orientale — 380x.
NGC 3952	gx	11h53m40s	−03°59.7'	q 237	Vir	16"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30" e con piccola condensazione centrale appena evidente — 270x.
NGC 3953	gx	11h53m49s	+52°19.6'	q 47	UMa	16"	m. buona / m. buono	bella, molto diffusa, presenta un bulge circonfuso da un alone di dimensioni 4'×2'; c'è una stellina a 1' verso W e un'altra molto debole a NE (ossia poco all'esterno dell'asse della galassia che è orientata da NNE a SSW — 270x.
NGC 3954	gx	11h53m42s	+20°53.0'	q 147	Leo	16"	buona / buono	probabilmente rotonda e diffusa, con un nucleo brillante, puntiforme immerso in tenue alone con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 3955	gx	11h53m57s	−23°09.8'	q 327	Crt	16"	ottima / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 4'×1', gradatamente più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso NNW — 270x.
NGC 3956	gx	11h54m01s	−20°34.0'	q 327	Crt	24"	buona / mediocre	estesa, poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, molto allungata da NE a SW con dimensioni 3'×1' (era visibile, seppure al limite, anche nel 10" a 118x in buone condizioni di trasparenza) — 340x.
NGC 3957	gx	11h54m01s	−19°34.1'	q 327	Crt	24"	buona / mediocre	bella, molto allungata da N a S, di dimensioni 3'×30", con bulge estesa oltre 1' e piccolo nucleo appena percettibile; a 340x appare, a tratti, leggermente screziata (osservabile molto debolmente anche nel 10" a 118x) — 340x.
NGC 3958	gx	11h54m33s	+58°22.0'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	è un bel fuso orientata da NE a SW, con dimensioni 1.5'×45" e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
NGC 3959	gx	11h54m38s	−07°45.3'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45" e con bulge diffuso appena percettibile; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate nella stessa direzione — 270x.
NGC 3961	gx	11h54m57s	+69°19.8'	q 25	Dra	16"	buona / scarso	molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta come una chiazza tondeggiante con Ø di 1' e di luminosità uniforme, situata tra 2 stelline molto deboli distanti poco più di 2' e orientate da NE a SW; è poco più spostata verso quella SW dalla quale dista ~ 1' — 188x.
NGC 3962	gx	11h54m40s	−13°58.5'	q 282	Crt	24"	buona / buono	molto bella, presenta un bulge luminoso con all'interno un nucleo stellare e un disco molto diffuso che in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 2'×1.5'; qualche lieve irregolarità del disco appare a momenti verso la parte più vicina al centro; forma un triangolo rettangolo con 2 stelle brillanti a S (facilmente visibile nel 10" a 178x).
NGC 3963	gx	11h54m59s	+58°29.6'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	appare leggermente screziata a 380x, rotonda con Ø di almeno 2', diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a SW situata all'interno dell'alone.
NGC 3964	gx	11h54m43s	+28°15.7'	q 107	Leo	16"	ottima / m. buono	rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, poco più brillante all'interno di luce e poco diffusa; c'è una stellina a ~ 1' NNE — 270x.
NGC 3966	gx	11h55m42s	+32°11.4'	q 107	UMa	16"	ottima / discreto	è un debole oggetto rotondo, di luminosità uniforme e con Ø max di 30" — 270x.
NGC 3967	gx	11h55m10s	−07°50.6'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	rotonda, relativamente compatta con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza brillante — 270x.
NGC 3968	gx	11h55m29s	+11°58.2'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	si presenta molto diffusa e di luminosità piuttosto irregolare; a 270x appare orientata da N a S, di dimensioni 2'×1.5' e con piccolo nucleo di aspetto quasi stellare.
NGC 3969	gx	11h55m09s	−18°55.6'	q 327	Crt	16"	m. buona / m. buono	debole, dai bordi abbastanza definiti, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45", appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 3970	gx	11h55m28s	−12°03.6'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	forma una coppia assieme a **NGC 3974** — questa è la più facile, orientata da E a W con dimensioni 50"×30", gradiente di luce medio e nucleo puntiforme visibile a tratti — 270x.
NGC 3971	gx	11h55m36s	+29°59.8'	q 107	UMa	16"	ottima / m. buono	relativamente brillante, allungata da E a W, dimensioni 40"×30" e con una condensazione centrale evidente di aspetto stellare — 270x.
NGC 3972	gx	11h55m46s	+55°19.1'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	fa parte di un piccolo gruppo di 5 galassie — molto allungata da NW a SE con dimensioni 3.5'×1' e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 3973	gx	11h55m37s	+11°59.8'	q 192	Vir	16"	ottima / ottimo	piccola galassietta rotonda, molto debole e condensata, estesa una 20-ina di secondi e disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso SE — 380x.
NGC 3974	gx	11h55m40s	−12°01.6'	q 282	Crt	16"	discreta / ottimo	più debole e diffusa della 3970, orientata circa da N a S con dimensioni 60"×45" e di luminosità più uniforme, salvo un nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina a 1.5' verso W — 270x.
NGC 3975	gx	11h55m54s	+60°31.8'	q 47	UMa	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; meglio definita scalando a 340x.
NGC 3976	gx	11h55m57s	+06°44.9'	q 192	Vir	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo stellare marcato su un disco molto diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno; molto allungata da NE a SW con dimensioni 3'×1' — 380x.
NGC 3977	gx	11h56m07s	+55°23.4'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	è la più debole del gruppetto della 3972; diffusa, rotonda con Ø < 1' e appena più brillante all'interno — 380x.
NGC 3978	gx	11h56m11s	+60°31.3'	q 47	UMa	24"	m. buona / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1.5'; qualche lieve discrepanza di luce sul disco appare a 450x (già osservata nel 10" a 178x).
NGC 3979	gx	11h56m01s	−02°43.2'	q 237	Vir	16"	buona / discreto	poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e poco più brillante verso l'interno; presenta un piccolo nucleo di aspetto quasi stellare ben visibile a 188x; c'è una stellina appena percettibile a meno di 1' verso N.
NGC 3981	gx	11h56m07s	−19°53.8'	q 327	Crt	24"	buona / mediocre	gx abbastanza brillante, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni che in visione distolta sono di 3'×1'; in visione diretta non sembra invece più larga di 40" (debolmente osservabile anche nel 10" a 118x) — 340x.
NGC 3982	gx	11h56m28s	+55°07.5'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	bella, brillante, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda e con Ø > 1.5' — 380x.
NGC 3983	gx	11h56m24s	+23°52.1'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	piccola gx compatta, molto allungata da NW a SE (come le 2 stelline situate 5' a NE), di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale tenue ma evidente — 380x.
NGC 3984	gx	11h57m52s	+29°02.3'	q 107	UMa	16"	ottima / m. buono	è un tenuissimo lucore estesa una 30-ina di secondi, quasi elusivo e che sembra come inglobato nel piccolo alone di diffusione di una stellina abbastanza brillante situata a ridosso verso W; si potrebbe altresì parlare di una sorta di prolungamento asimmetrico dell'alone — 270x.
NGC 3985	gx	11h56m41s	+48°20.1'	q 74	UMa	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, di luminosità non perfettamente regolare: si nota, infatti, una sorta di chiazza poco più luminosa decentrata verso SE); la gx è allungata da E a W con dimensioni 60"×40" (già osservata nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3986	gx	11h56m44s	+32°01.3'	q 107	UMa	24"	m. buona / buono	molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 3'×30" (praticamente una edge-on), con bulge diffuso e contrastato su un disco molto diffuso alle 2 estremità: quella occidentale arriva quasi a lambire una stellina appena percettibile; c'è una doppia stretta a ridosso verso S (la gx era già stata osservata nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 3987	gx	11h57m21s	+25°11.7'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	fa parte di un gruppo situato a cavallo tra Leo e Virgo — debole, estesa da NE a SW per oltre 2' e posta pressoché di taglio e un bulge appena evidente; c'è una stellina a ridosso dell'estremità di NE — 270x.
NGC 3988	gx	11h57m24s	+27°52.6'	q 147	Leo	16"	ottima / discreto	piccola, compatta, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi ed evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 3989	gx	11h57m27s	+25°14.0'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	piccola e molto debole, appare in visione distolta a 188x con un'estensione di 20" o 30", ma non riesco a capire com'è orientata (anche perché a causa del seeing non posso spingere di più gli ingrandimenti).
NGC 3990	gx	11h57m35s	+55°27.5'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; presenta un piccolo bulge diffuso e brillante — 380x.
NGC 3991	gx	11h57m30s	+32°20.1'	q 107	UMa	24"	m. buona / buono	fa parte, assieme a NGC 3994 ed NGC 3995, di un terzetto abbastanza serrato, purtroppo disturbato dalla presenza della SAO 62774 di 6ª grandezza situata nello stesso campo oculare; queste 3 gx erano già state precedentemente osservate col 10" a 178x in ottime condizioni di visibilità — relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15"; presenta un piccolo nodulo brillante al bordo NE: questo è di fatto **UGC 6933** che manca nel database del Megastar, ma è riportata sul catalogo **PGC** con la sigla **200277** — 450x.
NGC 3992	gx	11h57m36s	+53°22.5'	q 47	UMa	24"	m. buona / buono	presenta un piccolo nucleo rotondo, con Ø di una 40-ina di secondi situato all'interno di un disco molto diffuso, orientata da ENE a WSW con dimensioni 5'×3'; all'interno del disco notasi una barra poco contrastata orientata da NE a SW ed estesa circa la metà dell'asse maggiore della galassia; più interessante a 340x. È altresì nota come M109.
NGC 3993	gx	11h57m38s	+25°14.4'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 3994	gx	11h57m37s	+32°16.6'	q 107	UMa	24"	m. buona / buono	brillante, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
NGC 3995	gx	11h57m44s	+32°17.6'	q 107	UMa	24"	m. buona / buono	di aspetto un po' irregolare, diffusa, con una zona interna più luminosa e contrastata; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso N — 450x.
NGC 3996	gx	11h57m46s	+14°17.9'	q 192	Leo	16"	m. buona / buono	è una piccola galassia relativamente compatto e gradatamente più brillante verso l'interno, rotondeggiante con Ø poco superiore a 30"; c'è una stellina a poco più di 1' verso E — 188x.
NGC 3997	gx	11h57m48s	+25°16.2'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	relativamente facile, è un ovale di luminosità uniforme, allungata da E a W e di dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 3998	gx	11h57m57s	+55°27.3'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	ha un bulge molto brillante con all'interno un nucleo stellare, il tutto circonfuso da un alone via via più stemperato che in visione distolta appare di dimensioni 2.5'×1.5' e orientata da NW a SE — 380x.
NGC 3999	gx	11h57m56s	+25°04.1'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	molto debole e piccola, con Ø di una 20-ina di secondi; a tratti appare una debolissima stellina sovrapposta, o forse trattasi di un tenuissimo nucleo stellare — 270x.
NGC 4000	gx	11h57m57s	+25°08.7'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	è un debole baffo di luce molto piccolo, orientata da N a S per poco più di 30"; disturbato dalla SAO 82077 di 7ª grandezza situata ad appena 1.5' verso SE — 270x.
NGC 4001	gx	11h58m07s	+47°20.1'	q 74	UMa	16"	buona / buono	debolissima, di max 45" di dimensioni; una piccola condensazione centrale è visibile a tratti in visione distolta — 270x.
NGC 4002	gx	11h57m59s	+23°12.1'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	relativamente facile, ma basso gradiente di luce, orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina subito a SE — 270x.
NGC 4003	gx	11h57m59s	+23°07.5'	q 147	Leo	16"	buona / ottimo	poco più debole ed estesa di NGC 4002, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
NGC 4004	gx	11h58m05s	+27°52.7'	q 107	Leo	16"	ottima / ottimo	debole, estesa 1' in direzione N-S e di aspetto irregolare; c'è una stellina a 1' verso SE. Interessante, come riferimento, un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a "L"; a una 40-ina di secondi E dalla componente più orientale si trova **IC 2982**, una piccola e debole galassietta leggermente ovale, diffusa, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 270x.
NGC 4005	gx	11h58m10s	+25°07.3'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	relativamente facile, rotonda, con Ø di 45", diffusa e gradatamente più brillante all'interno (fa parte dello stesso gruppo di NGC 3987) — 270x.
NGC 4006	gx	11h58m06s	−02°07.2'	q 237	Vir	16"	buona / discreto	brillante, poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60" e alto gradiente di luce; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso SW — 188x.
NGC 4008	gx	11h58m17s	+28°11.6'	q 107	Leo	16"	m. buona / ottimo	è un ovale orientata da N a S, molto diffuso, di dimensioni 2'×1', con bulge brillante ben contrastato sul disco e nucleo stellare visibile a 270x.
NGC 4010	gx	11h58m38s	+47°15.6'	q 74	UMa	16"	buona / buono	è una lama di luce estesa per 4' scarsi, orientata da ENE a WSW e di luminosità superficiale molto bassa; c'è una stellina a un paio di primi dal centro della galassia verso NW — 188x.
NGC 4011	gx	11h58m25s	+25°05.8'	q 147	Leo	16"	discreta / scarso	molto debole, piccola, con dimensioni di 20" o 30" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 4012	gx	11h58m27s	+10°01.2'	q 192	Vir	16"	m. buona / buono	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×20" e con tenue rigonfiamento centrale poco contrastato — 188x.
NGC 4013	gx	11h58m32s	+43°56.8'	q 74	UMa	16"	buona / m. buono	è una gx molto diffusa che in visione distolta sembra quasi raddoppiare di dimensioni! È molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 5'×1' e con una stellina brillante proprio al centro in corrispondenza del nucleo; non si riesce a notare il bulge — 270x.
NGC 4014	gx	11h58m36s	+16°10.6'	q 192	Com	16"	buona / mediocre	allungata da WNW a ESE, di dimensioni 80"×40", con bulge evidente poco più brillante del disco — 270x.
NGC 4015	gx	11h58m43s	+25°02.2'	q 147	Com	16"	discreta / scarso	di aspetto simile a NGC 4014 come gradiente di luce e dimensioni, salvo il fatto che a tratti appare leggermente allungata verso S; l'alone appare asimmetrico rispetto al bulge — 270x.
NGC 4016	gx	11h58m29s	+27°31.7'	q 147	Com	16"	ottima / discreto	molto debole, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi, dai bordi molto stemperati e luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 4017	gx	11h58m45s	+27°27.2'	q 147	Com	16"	ottima / discreto	più estesa di NGC 4016 e più facile da vedere, pur restando un oggetto a bassissima luminosità superficiale; è allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 4018	gx	11h58m40s	+25°19.0'	q 147	Com	16"	discreta / scarso	è posta praticamente di taglio, di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa oltre 1' — 270x.
NGC 4020	gx	11h58m56s	+30°24.7'	q 74	UMa	16"	buona / discreto	debole e molto diffusa, con bulge tenue appena più brillante del disco, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina brillante a 3' WSW — 188x.
NGC 4021	gx	11h59m02s	+25°05.0'	q 147	Com	16"	discreta / scarso	debole e molto piccola, rotonda con Ø, con una lieve condensazione centrale abbastanza evidente — 270x.
NGC 4022	gx	11h59m01s	+25°13.4'	q 147	Com	16"	discreta / scarso	è una delle più brillanti del gruppo, rotonda, con Ø di 45", molto diffusa e con una marcata condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 4023	gx	11h59m05s	+24°59.3'	q 147	Com	16"	discreta / scarso	molto debole e diffusa, con una piccola zona centrale più brillante; è approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 4024	gx	11h58m31s	−18°20.8'	q 327	Crv	10"	ottima / m. buono	piuttosto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 1' e poco più brillante verso l'interno.
NGC 4025	gx	11h59m10s	+37°47.6'	q 107	UMa	16"	ottima / m. buono	è un debole lucore molto stemperato sul fondo cielo e di luminosità uniforme; allungata ~ da N a S e di dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 4026	gx	11h59m25s	+50°57.6'	q 47	UMa	24"	buona / m. buono	è una bella lama di luce estesa 4' in direzione N-S, con un piccolo nucleo molto brillante che a 340x è ancora di aspetto quasi stellare; appare tuttavia un po' meglio dettagliata a 450x (era facilmente visibile, nonché di aspetto simile, nel 10" a 178x).
NGC 4027	gx	11h59m30s	−19°15.7'	q 327	Crv	24"	buona / mediocre	è di aspetto molto irregolare: presenta una zona interna brillante di dimensioni 45"×30" e orientata da NE a SW, prolungando la quale verso NE si arriva a una stellina; una zona molto diffusa si estende a SE di questa parte brillante; dalla parte opposta un ampio braccio diffuso fa un arco di quasi 180° in senso antiorario per terminare quasi nei pressi della stellina (osservabile anche nel 10" che a 118x mostrava qualche discrepanza di luce all'interno) — 340x.
NGC 4027A	gx	11h59m29s	−19°19.9'		Crv	24"	buona / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme, di forma a tratti irregolare, solo approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata 4' a S di NGC 4027 (non riportata sull'Uranometria) — 340x.
NGC 4029	gx	12h00m03s	+08°10.9'	q 192	Vir	16"	m. buona / buono	molto diffusa con condensazione centrale di aspetto stellare; approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 2' scarsi verso NE — 188x.
NGC 4030	gx	12h00m23s	−01°06.0'	q 238	Vir	16"	buona / ottimo	molto diffusa, poco allungata da NNE a SSW con dimensioni 2.5'×2'; presenta un nucleo stellare visibile a tratti a 380x, mentre il sistema di bracci è molto tenue ed è osservabile solo in visione distolta; la gx è situata tra 2 stelline brillanti orientate da N a S e distanti ~ 3'.
NGC 4031	gx	12h00m31s	+31°56.8'	q 107	UMa	16"	buona / m. buono	fa parte di un terzetto di oggetti debolissimi assieme a UGC 6997 e CGCG 157-81 — molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE; un'altra stellina si trova a poco più di 30" verso N — 380x.
NGC 4032	gx	12h00m33s	+20°04.5'	q 147	Com	24"	ottima / buono	diffusa, rotonda con Ø di 1.5' scarso e un basso gradiente di luce; debolmente screziata a 450x, ma poco meglio contrastata scalando a 340x; un oggetto appena percettibile appare a 2' o 3' SE: probabilmente una stellina di campo (la gx era molto debole nel 10" in condizioni di cielo analoghe).
NGC 4033	gx	12h00m35s	−17°50.6'	q 328	Crv	24"	buona / mediocre	allungata da NE a SW con dimensioni 2'×1', diffusa e di aspetto molto regolare; presenta un alto gradiente di luce e un nucleo stellare che però risalta poco sul bulge molto brillante (già visibile nel 10" che a 118x mostrava anche una condensazione centrale abbastanza evidente) — 340x.
NGC 4034	gx	12h01m30s	+69°19.5'	q 25	Dra	16"	buona / scarso	è un lucore molto debole e stemperato sul fondo cielo e di luminosità uniforme; in visione distolta appare solo a momenti orientato da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30" è situata come nello schizzo riportato sul web — 188x.
NGC 4035	gx	12h00m29s	−15°56.9'	q 282	Crv	16"	discreta / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" — 270x.
NGC 4036	gx	12h01m27s	+61°53.8'	q 25	UMa	24"	buona / m. buono	bella, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 3'×1'; presenta un bulge di 30"×20" con all'interno un nucleo stellare; debolmente screziata verso il centro a 450x (era facilmente visibile nel 10").
NGC 4037	gx	12h01m24s	+13°24.1'	q 193	Com	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1.5'; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E; è poco disturbata dalla SAO 99915 di 9ª grandezza situata a soli 4' verso E — 270x.
NGC 4038	gx	12h01m53s	−18°52.0'	q 328	Crv	24"	buona / mediocre	fa parte, assieme a NGC 4039, della celebre coppia interagente denominata le Antenne — è di aspetto molto irregolare, con una forma che ricorda quella di un "6" (o di un "9") speculare, orientata da E a W con dimensioni 2.5'×1.5'; appare screziata a 340x; tre noduli luminosi allineati appaiono abbastanza facilmente all'interno: quello centrale è il più evidente.
NGC 4039	gx	12h01m53s	−18°53.5'	q 328	Crv	24"	buona / mediocre	situata a ridosso della precedente verso S e costituisce l'altra componente delle Antenne — è di aspetto più regolare, poco più piccola e debole, orientata da NE a SW con dimensioni 2'×1'; una condensazione centrale allungata appare a prima vista più evidente di quella della compagna quando si osserva la coppia nel suo insieme; anche questa appare screziata a 340x (entrambe già osservate nel 10" e separabili a 118x).
NGC 4040	gx	12h02m05s	+17°49.4'	q 148	Com	16"	buona / ottimo	piccola galassia circolare con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con basso gradiente di luce — 270x.
NGC 4041	gx	12h02m12s	+62°08.3'	q 25	UMa	24"	buona / m. buono	presenta una zona rotonda con Ø di 1' scarso, abbastanza regolare e con basso gradiente di luce circonfusa da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo che in visione distolta arriva a un paio di primi; nell'insieme è meglio contrastata scalando a 340x (già precedentemente osservata col 10").
NGC 4043	gx	12h02m23s	+04°19.8'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	piccolo e debole piccola galassia approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo puntiforme — 188x.
NGC 4044	gx	12h02m29s	−00°12.7'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	rotonda con di Ø 1' e gradatamente più brillante verso l'interno con un nucleo diffuso e brillante — 188x.
NGC 4045	gx	12h02m42s	+01°58.6'	q 238	Vir	10"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 90"×60"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso SE — 178x.
NGC 4045A	gx	12h02m43s	+01°57.1'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	debolissima salta fuori in visione distolta al vertice meridionale di un piccolo triangolo equilatero formato con una stellina brillante a NE e la 4045 a N; non ne distinguo la forma, ma non sembra più estesa di 20" (è situata 1.5' a S di NGC 4045 ed è altresì denominata CGCG 13-45) — 188x.
NGC 4047	gx	12h02m51s	+48°38.2'	q 74	UMa	16"	buona / m. buono	brillante e relativamente compatta, ma con basso gradiente di luce, rotonda con Ø > 1' — 380x.
NGC 4048	gx	12h02m50s	+18°00.9'	q 148	Com	16"	buona / ottimo	compatta, rotonda, di dimensioni simili a NGC 4047 e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 4049	gx	12h02m55s	+18°45.1'	q 148	Com	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 4050	gx	12h02m54s	−16°22.4'	q 283	Crv	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità un po' irregolare, allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1.5', con piccolo bulge poco contrastato; ci sono 2 stelline appena percettibili: una subito a E del nucleo e l'altra al margine N; un'altra debole stellina si trova poco più a N; sarebbe meglio contrastata scalando a 340x, ma in questo modo diventa più fastidiosa la SAO 157063 di 8ª grandezza situata a poco più di 5' SSE (già osservabile molto debolmente nel 10" a 118x).
NGC 4051	gx	12h03m10s	+44°31.9'	q 74	UMa	16"	buona / m. buono	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 4'×2' e con nucleo marcato; il disco è abbastanza uniforme, ma a tratti è più stemperato verso NE: in questa zona appaiono in visione distolta come delle deboli frastagliature. La galassia è situata tra 2 stelline: una brillante a WSW e l'altra debole a ENE; a 1' NE di quella brillante si vede un debole nodulo leggermente diffuso (probabilmente una zona H II dei bracci) — 270x.
NGC 4053	gx	12h03m12s	+19°43.7'	q 148	Com	16"	buona / ottimo	debole gx di luminosità uniforme, ma relativamente compatta, allungata ~ da E a W, di dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 4054	gx	12h03m12s	+57°53.6'	q 47	UMa	16"	buona / mediocre	molto debole e di forma indistinta, ma non dovrebbe comunque essere più estesa di 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SE — 188x.
NGC 4057	gx	12h05m15s	+20°18.7'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	elusiva, è una minuscola chiazza di forma indistinta, non più estesa di 10" o 15" e che appare solo a momenti in visione distolta a 270x.
NGC 4058	gx	12h03m59s	+03°32.9'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con un rigonfiamento centrale brillante; c'è una stellina appena percettibile a meno di 2' verso NW — 188x.
NGC 4060	gx	12h04m01s	+20°20.3'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	fa parte di un gruppo — debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 4061	gx	12h04m02s	+20°13.9'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" con evidente condensazione centrale e nucleo puntiforme — 270x.
NGC 4062	gx	12h04m03s	+31°53.7'	q 74	UMa	24"	ottima / buono	è un bel fuso orientato da E a W, di dimensioni 4'×1' e appena più brillante all'interno; c'è una stellina presso il margine W e una appena percettibile quasi a ridosso verso E (debolmente visibile nel 10" in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 4063	gx	12h04m06s	+01°50.8'	q 233	Vir	24"	buona / m. buono	molto diffusa, con piccolo bulge evidente, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 400x.
NGC 4064	gx	12h04m11s	+18°26.6'	q 148	Com	24"	ottima / buono	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 3'×1', con bulge diffuso e poco contrastato sul disco; c'è una stellina a ridosso del margine orientale del bulge (facilmente visibile anche nel 10" 178x) — 340x.
NGC 4065	gx	12h04m06s	+20°14.1'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	è situata a solo 1' E della 4061 — poco allungata da NW a SE, appare leggermente più estesa della 4061 e di dimensioni 50"×40" — 270x.
NGC 4066	gx	12h04m10s	+20°20.9'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	molto debole e diffusa, estesa una 40-ina di primi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 4067	gx	12h04m11s	+10°51.2'	q 193	Vir	16"	buona / mediocre	facile, estesa almeno 1', diffusa, poco più brillante all'interno, approssim. circolare; a tratti, in visione distolta, appare una specie di debole barra interna orientata da E a W — 270x.
NGC 4068	gx	12h04m02s	+52°35.3'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 2.5'×1'; c'è una stella brillante quasi al centro della gx (in realtà è poco spostata verso W), mentre un'altra stellina si trova verso il bordo SW; è meglio definita a 270x.
NGC 4069	gx	12h04m06s	+20°19.5'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	a 188x appare come una debole stellina sfuocata, estesa non più di 10"-15" (purtroppo il seeing non permette di spingere di più gli ingrandimenti).
NGC 4070	gx	12h04m11s	+20°24.6'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	relativamente facile, rotonda, con Ø di 45", gradatamente più brillante all'interno e con piccola condensazione centrale; ci sono 2 stelline a SSW: una a poco più di 1' e l'altra più debole a un paio di primi — 270x.
NGC 4072	gx	12h04m14s	+20°12.6'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	molto debole, allungata da NE a SW, con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 4073	gx	12h04m27s	+01°53.7'	q 238	Vir	24"	buona / m. buono	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 2'×1' e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a un paio di primi scarsi verso S; una coppia di stelle brillanti distanti una 40-ina di secondi in direzione NE-SW si trova a 6' verso N (già precedentemente osservata nel 10" a 178x) — 400x.
NGC 4074	gx	12h04m30s	+20°19.0'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	galassia debole, ma facile da vedere, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 4075	gx	12h04m38s	+02°04.4'	q 238	Vir	10"	buona / buono	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, con tenue condensazione centrale diffusa; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20", ma è possibile effettuare questa stima solo a 178x (a ingrandimenti inferiori rimane di aspetto più confuso); a 4' verso S c'è la stessa coppia di stelle brillanti di cui alla descrizione della 4073.
NGC 4076	gx	12h04m33s	+20°12.3'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	rotonda, con Ø poco superiore ai 30", di aspetto regolare e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 4077	gx	12h04m38s	+01°47.3'	q 238	Vir	24"	buona / m. buono	allungata da N a S, di dimensioni di 60"×30", con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina al bordo settentrionale — 400x.
NGC 4078	gx	12h04m48s	+10°35.8'	q 193	Vir	16"	buona / mediocre	fa parte, assieme a NGC 4079 ed NGC 4082 di un terzetto posto ai vertici di un triangolo rettangolo; è brillante, allungata da N a S, di dimensioni 30"×60", con alto gradiente di luce e una condensazione centrale marcata di aspetto stellare — 270x.
NGC 4079	gx	12h04m50s	−02°22.9'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	rotonda, con Ø di 1.5', molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' verso N — 188x.
NGC 4080	gx	12h04m52s	+26°59.5'	q 148	Com	16"	buona / ottimo	abbastanza facile, allungata da NW a SE, di dimensioni ~ 60"×40", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 4081	gx	12h04m33s	+64°26.1'	q 25	UMa	16"	non registrati	ovale di luminosità pressoché uniforme, relativamente brillante, di dimensioni 80"×30" e orientata da NW a SE — 188x.
NGC 4082	gx	12h05m11s	+10°40.2'	q 193	Vir	16"	buona / mediocre	fa parte, assieme a NGC 4078 e 4079 di un terzetto posto ai vertici di un triangolo rettangolo — molto debole, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" e una tenue condensazione centrale — 270x.
NGC 4083	gx	12h05m14s	+10°36.8'	q 193	Vir	16"	buona / mediocre	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale abbastanza evidente — 270x.
NGC 4084	gx	12h05m15s	+21°12.9'	q 148	Com	16"	buona / ottimo	rotonda, poco diffusa, con condensazione centrale quasi puntiforme visibile a momenti; è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 4085	gx	12h05m23s	+50°21.2'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	allungata da E a W, di dimensioni di 2.5'×40" e con tenue bulge diffuso appena più contrastato del disco — 380x.
NGC 4086	gx	12h05m29s	+20°14.8'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	debole, rotonda, con gradiente di luce molto basso di luce, con Ø di 45", con tenue nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 4087	gx	12h05m35s	−26°31.3'	q 328	Hya	16"	m. buona / m. buono	facile, rotonda, con alto gradiente di luce, poco diffusa ai bordi e con Ø superiore a 1' — 270x.
NGC 4088	gx	12h05m34s	+50°32.4'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	è orientata da NE a SW, poco diffusa e con dimensioni 5'×3'; appare vagamente screziata a 270x e sembra poco più brillante dalla parte NE.
NGC 4089	gx	12h05m37s	+20°33.3'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	fa parte di un piccolo gruppo di 6 galassie — approssim. circolare con Ø di ~ 30" e con condensazione centrale abbastanza evidente — 270x.
NGC 4090	gx	12h05m28s	+20°18.5'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 4091	gx	12h05m40s	+20°33.3'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	situata quasi a ridosso verso E di NGC 4089; è di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW per una 40-ina di secondi e, in generale, poco più debole della 4089 — 270x.
NGC 4092	gx	12h05m50s	+20°28.6'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	diffusa, di forma irregolare; in visione distolta arriva a lambire la stellina di 12-esima situata a ~ 45" NW; è di luminosità uniforme, con dimensioni di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 4093	gx	12h05m51s	+20°31.3'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	piccola, rotondeggiante, con Ø max di 30" e tenue condensazione centrale — 270x.
NGC 4094	gx	12h05m54s	−14°31.6'	q 283	Crv	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 3'×1', con piccolo bulge diffuso e poco contrastato; 2 stelle brillanti si trovano quasi a ridosso della gx rispettivamente a E e a N; un'altra stellina molto debole si trova a ridosso S; è in generale meglio contrastata scalando a 340x, ma a 450x appare, seppure a momenti, leggermente screziata (già debolmente osservabile nel 10") — 340x.
NGC 4095	gx	12h05m54s	+20°34.3'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	più luminosa ed estesa della 4093, ha un Ø di 45" e una condensazione centrale visibile e diffusa — 270x.
NGC 4096	gx	12h06m01s	+47°28.5'	q 74	UMa	16"	m. buona / m. buono	molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 8'×1.5', diffusa alle estremità del fuso e con bulge estesa , poco contrastato sul disco — 270x.
NGC 4097	gx	12h06m02s	+36°51.8'	q 107	UMa	24"	ottima / buono	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare evidente e contrastato; un poco disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a SSW (debolmente visibile nel 10" a 178x in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 4098	gx	12h06m04s	+20°36.5'	q 148	Com	16"	discreta / scarso	è l'ultima galassia del piccolo gruppo di NGC 4089 — è poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e gradatamente più brillante all'interno — 270x.
NGC 4100	gx	12h06m08s	+49°35.0'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	bella, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme salvo un piccolo nucleo di aspetto quasi stellare situato in un piccolo bulge diffuso e poco contrastato; è molto allungata da N a S, con dimensioni 4'×1' e leggermente screziata a 380x.
NGC 4101	gx	12h06m11s	+25°33.4'	q 148	Com	16"	buona / ottimo	di aspetto un po' irregolare, piccola, con condensazione centrale marcata; grosso modo rotonda con Ø max di 30" — 270x.

NGC 4102	gx	12h06m23s	+52°42.7'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	brillante, con nucleo stellare che appare all'interno di un bulge diffuso; è allungata da NE a SW con dimensioni 2.5'×1'; c'è una stellina brillante a ridosso verso W — 380x.
NGC 4104	gx	12h06m40s	+28°10.3'	q 107	Com	16"	ottima / ottimo	è orientata da NE a SW con dimensioni 2.5'×1', molto diffusa e con bulge evidente; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NE — 270x.
NGC 4105	gx	12h06m41s	−29°45.7'	q 368	Hya	10"	buona / buono	assieme alla seguente forma una coppia di piccoli galassie molto ravvicinate, con basso gradiente di luce e distanti tra loro circa 1' in direzione grosso modo E-W; la prima è più brillante e poco più estesa, grosso modo rotonda con Ø di 1.5'; la seconda è più piccola e sembra più compatta, rotonda con Ø di 1'; meglio visibili a 178x.
NGC 4106	gx	12h06m46s	−29°46.1'	q 368	Hya	10"	buona / buono	v. **NGC 4106**
NGC 4108	gx	12h06m45s	+67°09.8'	q 25	Dra	16"	m. buona / mediocre	brillante, rotonda, con alto gradiente di luce e Ø di ~ 1'; a tratti appaiono delle lievi irregolarità di luce all'interno — 270x.
NGC 4108A	gx	12h05m50s	+67°15.1'	q 25	Dra	16"	m. buona / mediocre	è un debole ovale di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S, con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 4108B	gx	12h07m11s	+67°14.1'	q 25	Dra	16"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, di dimensioni analoghe a NGC 4108, ma non riesco a stabilirne la forma — 270x.
NGC 4109	gx	12h06m51s	+42°59.7'	q 74	CVn	24"	buona / m. buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con basso gradiente di luce; presenta un tenue nucleo stellare meglio evidente scalando a 340x; c'è una stellina brillante a 1' verso N.
NGC 4110	gx	12h07m04s	+18°31.9'	q 148	Com	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso, situata al vertice meridionale di un triangolo isoscele formato con 2 stelle il cui angolo più acuto punta a W — 380x.
NGC 4111	gx	12h07m03s	+43°04.0'	q 74	CVn	24"	buona / m. buono	bellissimo fuso orientato da NNW a SSE esteso per almeno 4'; presenta un piccolo bulge brillante e molto contrastato di 30"×10" e un nucleo stellare visibile a momenti, in quanto è di fatto nascosto dalla luminosità del bulge (era facilmente visibile nel 10" a 126x) — 450x.
NGC 4114	gx	12h07m12s	−14°11.1'	q 283	Crv	16"	discreta / ottimo	molto diffusa, con bulge brillante e nucleo stellare, orientata da NW a SE (ossia come le 2 stelline situate a SE e distanti un paio di primi) con dimensioni 2'×1' — il fondo cielo, purtroppo, non è molto scuro — 270x.
NGC 4116	gx	12h07m37s	+02°41.5'	q 238	Vir	24"	ottima / buono	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, orientata da NNE a SSW con dimensioni 3'×1.5'; non presenta bulge apprezzabile; meglio contrastata scalando a 340x (osservabile molto debolmente anche nel 10" a 118x).
NGC 4117	gx	12h07m46s	+43°07.6'	q 74	CVn	24"	buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 80"×40" e con nucleo stellare evidente, anche se poco contrastato (già precedentemente osservata col 16" a 188x) — 450x.
NGC 4118	gx	12h07m53s	+43°06.7'	q 74	CVn	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
NGC 4120	gx	12h08m31s	+69°32.7'	q 25	Dra	16"	buona / scarso	posta praticamente di taglio, orientata ~ da N a S per un paio di primi, con alto gradiente di luce, bulge piccolo e luminoso; c'è un debole nodulo di luminosità verso S (forse una debole stellina sovrapposta) — 188x.
NGC 4121	gx	12h07m57s	+65°06.8'	q 25	Dra	24"	buona / m. buono	è visibile nello stesso campo di NGC 4125, dalla quale dista ~ 4' verso S; poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con un nucleo molto brillante che tende a offuscarne l'alone (già precedentemente osservata a 188x col 16" nel quale però mi appariva rotonda) — 450x.
NGC 4122	gx	12h07m08s	+32°59.7'	q 107	Com	16"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, allungata ~ da E a W, di dimensioni 30"×20" — 270x.
NGC 4123	gx	12h08m11s	+02°51.7'	q 238	Vir	24"	ottima / buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, allungata da NW a SE con dimensioni 3'×2'; presenta una barra poco contrastata sul disco, orientata da E a W al centro della quale appare un nucleo luminoso quasi stellare; lievi discrepanze di luce sul disco tradiscono la presenza di una struttura spirale che tuttavia non si riesce a risolvere nemmeno a 450x (era già osservabile nel 10" a 118x).
NGC 4124	gx	12h08m10s	+10°22.7'	q 193	Vir	24"	buona / ottimo	molto diffusa e molto allungata da WNW a ESE, dimensioni 3'×1' e con bulge evidente, molto sfumato di dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a NW (la gx era visibile senza problemi anche nel 10") — 400x.
NGC 4125	gx	12h08m05s	+65°10.5'	q 25	Dra	24"	buona / m. buono	molto diffusa, orientata da E a W con dimensioni 4.5'×1.5' (ossia con rapporto di assi 3:1) e gradatamente più brillante verso l'interno; presenta un bulge di ~ 60"×30" con un nucleo stellare brillante; c'è una stellina quasi a ridosso N e una brillante più o meno alla stessa distanza verso E che tende a interferire un po' con la parte più esterna della galassia; meglio contrastata scalando a 340x (già precedentemente osservata col 10").
NGC 4126	gx	12h08m37s	+16°08.6'	q 193	Com	16"	buona / mediocre	approssim. circolare, Ø 45", diffusa, con piccola condensazione centrale abbastanza marcata — 270x.
NGC 4127	gx	12h08m25s	+76°48.2'	q 9	Cam	24"	ottima / buono	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×45" e con basso gradiente di luce; è un po' meglio contrastata scalando a 340x (appariva molto debolmente nel 10" in buone condizioni di cielo).
NGC 4128	gx	12h08m32s	+68°46.1'	q 25	Dra	24"	buona / ottimo	molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 90"×30", molto diffusa alle estremità e con piccolo bulge particolarmente brillante (era osservabile senza difficoltà nel 10") — 450x.
NGC 4129	gx	12h08m53s	−09°02.2'	q 283	Vir	24"	m. buona / m. buono	è un bel fuso, ben definito e con bulge estesa e poco contrastato sul disco; molto allungata da E a W con dimensioni 90"×30" (già osservata, seppure molto debolmente, nel 10" a 118x — 450x.
NGC 4131	gx	12h08m47s	+29°18.3'	q 107	Com	16"	buona / discreto	costituisce, assieme a NGC 4132 ed NGC 4134, un terzetto di galassie fra loro equidistanti, separate 5' l'una dall'altra e poste leggermente ad arco — poco diffusa, relativamente brillante, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 188x.
NGC 4132	gx	12h09m02s	+29°15.1'	q 107	Com	16"	buona / discreto	molto debole, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 188x.
NGC 4133	gx	12h08m50s	+74°54.3'	q 9	Dra	16"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, con gradiente di luce molto basso, orientata da NW a SE con dimensioni 1.5'×1' — 270x.
NGC 4134	gx	12h09m10s	+29°10.6'	q 107	Com	16"	buona / discreto	fa parte del terzetto di NGC 4131 — debole e molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 90"×45" e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 4135	gx	12h09m09s	+44°00.2'	q 74	CVn	16"	buona / buono	assieme a NGC 4137 forma una coppia di galassiette molto deboli, di aspetto un po' confuso, molto stemperate sul fondo cielo e distanti 5.5' in direzione NNE-SSW; la 2ª delle 2 è più estesa, di ~ 1' di dimensioni, mentre la 1ª non supera i 45"; entrambe presentano una debole condensazione centrale visibile a momenti — 270x.
NGC 4136	gx	12h09m18s	+29°55.7'	q 107	Com	24"	ottima / buono	chiazza circolare molto diffusa, e sfilacciata con Ø di un paio di primi, debolmente screziata e con gradiente di luce molto basso; una stellina appena percettibile si trova a ridosso SE e si nota a 450x, anche se la galassia appare meglio contrastata scalando a 340x (era debolmente visibile nel 10" in condizioni di cielo analoghe).
NGC 4137	gx	12h09m18s	+44°05.4'	q 74	CVn	16"	buona / buono	v. **NGC 4135**
NGC 4138	gx	12h09m30s	+43°41.1'	q 74	CVn	24"	buona / m. buono	diffusa, poco allungata da NNW a SSE, di dimensioni 1.5'×1' e con piccolo bulge luminoso e contrastato di aspetto quasi stellare a ingrandimenti inferiori (era facilmente visibile nel 10" a 126x) — 450x.
NGC 4139	gx	12h04m34s	+01°48.1'	q 233	Vir	24"	buona / m. buono	diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare abbastanza evidente a 400x.
NGC 4141	gx	12h09m47s	+58°50.9'	q 47	UMa	24"	buona / m. buono	piuttosto debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 80"×60"; leggermente screziata a 450x, ma poco meglio contrastata scalando a 340x; ci sono tre deboli stelline allineate in direzione NNE-SSW subito a W della gx (appariva elusivamente nel 10" in visione distolta a 178x).
NGC 4142	gx	12h09m30s	+53°06.2'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 2'×1'; debolmente screziata a 380x.
NGC 4143	gx	12h09m36s	+42°32.0'	q 74	CVn	24"	buona / m. buono	bella, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1' e con piccolo bulge molto brillante; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso E (era facilmente visibile nel 10" a 126x) — 450x.
NGC 4144	gx	12h09m59s	+46°27.4'	q 74	UMa	16"	buona / m. buono	è un fuso orientata da E a W, di dimensioni 5'×1' e di luminosità pressoché uniforme; meglio contrastata a 270x; c'è una doppia stretta un paio di primi a SE.
NGC 4145	gx	12h10m02s	+39°53.0'	q 74	CVn	24"	ottima / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 4'×2'; c'è una stellina a 1' verso S (appariva debole, molto diffusa e stemperata nel 10" in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 4146	gx	12h10m18s	+26°25.9'	q 148	Com	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, stemperata sul fondo cielo, con una piccola condensazione centrale visibile a tratti; è approssim. circolare con Ø di 1' *(albeggia: questa era l'ultima galassia osservata nella notte)* — 380x.
NGC 4147	ag	12h10m06s	+18°32.5'	q 148	Com	16"	ottima / ottimo	appare fortemente screziato 380x, con Ø di 1.5' e abbastanza condensato; non è tuttavia perfettamente rotondo, ma presenta una protuberanza verso NE; ci sono 2 stelline a ridosso: una a SW e l'altra poco più distante verso NW.
NGC 4148	gx	12h10m08s	+35°52.7'	q 107	CVn	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, leggermente ovale, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" con nucleo abbastanza contrastato sull'alone — 270x.
NGC 4149	gx	12h10m33s	+58°18.2'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	poco diffusa molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20" e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 4150	gx	12h10m33s	+30°24.1'	q 107	Com	24"	ottima / buono	poco diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'×1' e con nucleo brillante quasi stellare (già precedente osservata nel 10" in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 4151	gx	12h10m32s	+39°24.3'	q 74	CVn	24"	ottima / buono	presenta un nucleo molto brillante decisamente stellare circonfuso da un alone molto esteso e stemperato sul fondo cielo; in visione distolta appaiono come due debolissime anse a NW e SE del nucleo che arrivano quasi a lambire le due stelline poste a 90° sul nucleo stesso; nel complesso è grosso modo circolare con Ø superiore a 2' (a parte le anse di cui sopra, le caratteristiche principali della gx erano facilmente osservabili anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4152	gx	12h10m38s	+16°02.0'	q 193	Com	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con Ø poco più di 1'; c'è una stellina a 1.5' SE — 270x.
NGC 4155	gx	12h10m46s	+19°02.5'	q 148	Com	24"	ottima / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø 45" e una marcata condensazione centrale quasi stellare — 450x.
NGC 4156	gx	12h10m49s	+39°28.4'	q 74	CVn	24"	ottima / buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø di 1' (appariva molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4157	gx	12h11m05s	+50°29.2'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 6'×1' e con tenue bulge diffuso estesa oltre 1'; arriva a lambire una stellina brillante al bordo WSW — 270x.
NGC 4158	gx	12h11m10s	+20°10.6'	q 148	Com	24"	ottima / buono	molto debole e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' (o poco più); c'è una stellina brillante a 1.5' SE (debolmente osservabile nel 10" in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 4159	gx	12h10m50s	+76°07.5'	q 9	Dra	24"	ottima / buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×20", con tenue bulge diffuso e poco contrastato sul disco; c'è una stellina subito a NE, sul prolungamento dell'asse della gx, e un'altra a poco più di 1' verso E (era a mala pena visibile come una debolissima lama di luce nel 10" 178x in buone condizioni di cielo) — 450x.
NGC 4161	gx	12h11m33s	+57°44.2'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	piuttosto debole e diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x, allungata da NE a SW e di dimensioni 70"×35".
NGC 4162	gx	12h11m52s	+24°07.4'	q 148	Com	16"	m. buona / m. buono	poco allungata da N a S, di dimensioni 1.5'×1', gradatamente più brillante verso l'interno, ma con basso gradiente di luce; leggermente screziata a 380x; c'è una stellina all'interno verso il bordo E e un'altra appena percettibile quasi a ridosso NW.
NGC 4163	gx	12h12m09s	+36°10.1'	q 74	CVn	16"	buona / buono	debole e diffusa rotondeggiante con Ø di oltre 1' e con gradiente di luce molto basso di luce — 188x.
NGC 4164	gx	12h12m05s	+13°12.3'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	quasi elusiva, visibile in visione distolta a 188x 3' a W della 4168 (osservata col 10" in altra data); è molto piccola, relativamente compatta e condensata — 380x.
NGC 4165	gx	12h12m12s	+13°14.8'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" (non è riportata sull'Uranometria) — 380x.
NGC 4166	gx	12h12m10s	+17°45.5'	q 148	Com	16"	ottima / ottimo	abbastanza compatta, con bulge diffuso poco più brillante dell'alone; forse è poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 4168	gx	12h12m17s	+13°12.3'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di 1.5'; presenta alto gradiente di luce ed è di aspetto molto regolare — 380x.
NGC 4169	gx	12h12m18s	+29°10.8'	q 107	Com	16"	ottima / ottimo	fa parte del celebre quartetto denominato The Box assieme a NGC 4170, 4174 e 4175 — allungata da NNW a SSE con dimensioni 90"×45", diffusa e con bulge brillante, contrastato sul disco; meglio contrastata a 270x.
NGC 4170	gx	12h12m20s	+29°12.7'		Com	16"	ottima / ottimo	altresì riportata come NGC 4171 o 4173 — è una debole lama di luce, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme che in visione distolta pare estesa per 2.5' e orientata in direzione NW-SE; meglio visibile a 270x (non è riportata sull'Uranometria) — 380x.
NGC 4172	gx	12h12m15s	+56°10.7'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	diffusa, in visione distolta a 270x appare poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" e con condensazione centrale quasi stellare; a 380x sembra invece più tondeggiante.
NGC 4174	gx	12h12m27s	+29°09.0'	q 107	Com	16"	ottima / ottimo	fa parte del quartetto The Box – presenta un nucleo brillante decisamente stellare circonfuso da un tenue alone di dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 4175	gx	12h12m31s	+29°10.1'	q 107	Com	16"	ottima / ottimo	fa parte del quartetto The Box – molto allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×20", con bulge diffuso ed evidente — 270x.
NGC 4176	gx	12h12m37s	−09°09.6'	q 283	Vir	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, ma essendo piccola salta fuori facilmente in visione distolta a 270x come una macchia estesa una 30-ina di secondi; la visione regge, sebbene un po' a fatica, anche a 380x.
NGC 4177	gx	12h12m41s	−14°00.9'	q 283	Crv	16"	discreta / ottimo	debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare chiaramente orientata da ENE a WSW con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 4178	gx	12h12m46s	+10°51.9'	q 193	Vir	10"	ottima / buono	diffusa, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 4'×1', basso gradiente di luce e con lievi discrepanze di luce all'interno che appaiono a tratti in visione distolta.
NGC 4179	gx	12h12m52s	+01°18.0'	q 238	Vir	24"	m. buona / ottimo	è un magnifico fuso orientata da NW a SE, di dimensioni almeno 2'×30", con piccolo bulge ben contrastato e nucleo stellare; c'è una stellina all'interno del disco verso il bordo NE — 570x.
NGC 4180	gx	12h13m03s	+07°02.3'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	di aspetto molto regolare, allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×30", gradatamente più brillante verso l'interno e poco diffusa — 380x.
NGC 4181	gx	12h12m49s	+52°54.2'		UMa	16"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, con condensazione centrale puntiforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (non è riportata sulla Uranometria) — 380x.
NGC 4183	gx	12h13m17s	+43°41.8'	q 74	CVn	24"	buona / m. buono	è una lama di luce orientata da N a S di luminosità pressoché uniforme ed estesa per oltre 4'; c'è una stellina evidente a ridosso E situata a circa 1/3 della lunghezza della gx a partire da S; un'altra stellina molto debole di trova subito a NE del centro; una terza stellina relativamente brillante si trova quasi a ridosso verso S: quest'ultima era visibile, anche se un po' al limite, nel 10" a 190x — 450x.
NGC 4185	gx	12h13m22s	+28°30.6'	q 107	Com	16"	ottima / discreto	debole ma facilmente visibile, estesa ~ 1'.5, molto stemperata sul fondo cielo, di aspetto un po' confuso e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 4186	gx	12h14m06s	+14°43.5'	q 193	Com	16"	discreta / scarso	debole, di luminosità pressoché uniforme, diffusa, approssim. circolare con Ø di 1' scarso — 188x.
NGC 4187	gx	12h13m29s	+50°44.5'	q 47	Com	16"	m. buona / buono	è un ovale orientato da NW a SE con dimensioni 60"×45" e poco più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' verso W — 380x.
NGC 4187B	gx	12h13m29s	+50°45.4'	q 47	Com	16"	m. buona / buono	appare solo in visione distolta a 380x come un'elusiva stellina leggermente sfocata (erroneamente riportata sull'Uranometria come NGC 4181).
NGC 4187C	gx	12h13m27s	+50°42.6'		Com	16"	m. buona / buono	è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (non è riportata sull'Uranometria).
NGC 4188	gx	12h14m07s	−12°35.2'	q 283	Crv	16"	discreta / ottimo	piccola galassia circolare di luminosità uniforme e Ø max di 30", situata a ridosso verso S di una stellina abbastanza brillante — 380x.
NGC 4189	gx	12h13m47s	+13°25.5'	q 193	Com	16"	ottima / ottimo	è un bel bozzolo rotondo, diffuso, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 1.5' — 270x.
NGC 4190	gx	12h13m44s	+36°38.0'	q 109	CVn	24"	ottima / buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1.5'; meglio contrastata scalando a 340x; (osservabile molto debolmente nel 10" a 118x).
NGC 4191	gx	12h13m50s	+07°12.1'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare; c'è una stellina brillante un paio di primi a NW — 380x.
NGC 4193	gx	12h13m54s	+13°10.4'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 80"×40" e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a un paio di primi scarsi verso NW; più interessante a 270x.
NGC 4194	gx	12h14m10s	+54°31.6'	q 47	UMa	24"	buona / m. buono	è di aspetto un po' irregolare: presenta un piccolo nucleo brillante, poco allungato da N a S di dimensioni 25"×20" con una debole "coda" che aggetta verso S; il tutto sembra avvolto in un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo, meglio contrastato a 340x e che in visione distolta si estende per un paio di primi (era visibile anche nel 10" a 118x, ma ero in dubbio se l'alone, allora stimato in una 40-ina di secondi, fosse reale o un effetto di diffusione del nucleo dovuta all'umidità elevatissima della notte).
NGC 4195	gx	12h14m18s	+59°37.0'	q 47	UMa	16"	buona / mediocre	debolissimo lucore di luminosità uniforme estesa poco più di 1'; allineata ed equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti di egual magnitudo orientate da NW a SE e distanti 3' o 4'; c'è una brillante stella di 8ª grandezza a 11' NW — 188x.
NGC 4196	gx	12h14m30s	+28°25.4'	q 107	Com	16"	ottima / discreto	brillante, di aspetto regolare, compatta, rotonda, con Ø di 45", con marcata condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 4197	gx	12h14m38s	+05°48.3'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NE a SW, estesa 2.5' e spessa neanche 30"; appare leggermente screziata a 380x; c'è una stellina a 1.5' S dal centro della gx.
NGC 4198	gx	12h14m22s	+56°00.7'	q 47	UMa	24"	buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; è situata tra due stelline brillanti orientate da NNW a SSE: quella a SSE è più luminosa (visibile, seppure molto debolmente, nel 10" a 118x e in condizioni di trasparenza analoghe).
NGC 4199	gx	12h14m49s	+59°54.4'	q 47	UMa	16"	buona / mediocre	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza chiaramente in visione distolta a ridosso S di una stellina — 188x.
NGC 4200	gx	12h14m44s	+12°10.8'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W, di dimensioni 90"×45", con un bulge abbastanza brillante e contrastato di 30"×20" (era visibile anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4201	gx	12h14m42s	−11°35.0'	q 283	Vir	16"	discreta / ottimo	piccola galassia rotonda relativamente compatta, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 deboli stelline — 380x.
NGC 4202	gx	12h18m08s	−01°03.8'	q 238	Vir	16"	discreta / scarso	debole, approssim. circolare, con Ø di una 40-ina di secondi e molto diffusa, poco più brillante verso l'interno; c'è una stellina a un paio di primi verso NNE — 188x.
NGC 4203	gx	12h15m05s	+33°11.9'	q 107	Com	24"	ottima / buono	presenta un piccolo nucleo brillante e una zona più esterna decisamente più debole circonfusa da una alone molto stemperato sul fondo cielo che in visione distolta arriva a 3' di Ø; all'interno dell'alone di nota una debole stellina verso W (facilmente visibile nel 10" in condizioni di cielo analoghe: a 6x l'avevo descritta di aspetto cometario) — 450x.
NGC 4204	gx	12h15m14s	+20°39.6'	q 148	Com	16"	ottima / ottimo	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme estesa per 1.5' e orientata da NW a SE; meglio evidente a 270x.
NGC 4205	gx	12h14m55s	+63°47.0'	q 25	Dra	16"	non registrati	molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20", di luminosità uniforme e abbastanza definita ai bordi; c'è una stellina brillante a ridosso verso N — 188x.
NGC 4206	gx	12h15m17s	+13°01.5'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	bella, molto allungata da N a S, con basso gradiente di luce, estesa 4' e spessa una 40-ina di secondi; più interessante a 340x.
NGC 4207	gx	12h15m30s	+09°35.1'	q 193	Vir	16"	m. buona / buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1' verso W — 188x.
NGC 4210	gx	12h15m16s	+65°59.1'	q 25	Dra	16"	ottima / m. buono	grossa e diffusa bolla ovale orientata da E a W con dimensioni quasi 2'×1.5' e di luminosità pressoché uniforme; solo a tratti sembra di vedere una debole screziatura al centro; più interessante a 270x; c'è una coppia di deboli stelline subito a NW.
NGC 4211	gx	12h15m36s	+28°10.6'	q 107	Com	16"	ottima / discreto	piccola, rotonda, con evidente condensazione centrale, con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 4211A	gx	12h15m37s	+28°10.0'		Com	16"	ottima / discreto	è situata 30" a SE di NGC 4211, molto difficile da vedere; appare a tratti come una stellina leggermente sfuocata (è altresì riportata come MCG+5-29-43, ma non è segnata sull'Uranometria) — 270x.
NGC 4212	gx	12h15m39s	+13°54.1'	q 193	Com	24"	m. buona / m. buono	molto estesa e leggermente screziata a 570x, allungata da E a W di dimensioni 2.5'×1.5' e con piccolo nucleo di aspetto quasi stellare leggermente decentrato verso W. Anche nel 10" appariva come un oggetto relativamente brillante, anche se non più esteso di 2'.
NGC 4213	gx	12h15m38s	+23°58.9'	q 148	Com	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 1' scarso, diffusa e con condensazione centrale evidente — 380x.
NGC 4214	gx	12h15m40s	+36°19.6'	q 107	CVn	24"	ottima / buono	bella, molto diffusa e finemente screziata a 450x, anche se con basso gradiente di luce; si nota una zona centrale brillante orientata da NW a SE di dimensioni 2'×1.5' e una sorta di frammento di 30"×20" che sembra staccarsi dal corpo principale verso SE; scalando a 340x la gx sembra circonfusa da un tenue alone molto stemperato grosso modo circolare con Ø di 4' (era a grandi linee osservabile nel 10" a 178x).
NGC 4215	gx	12h15m54s	+06°24.1'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S con bulge diffuso abbastanza contrastato e nucleo stellare — 380x.
NGC 4216	gx	12h15m54s	+13°09.0'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto bella ed estesa, orientata da NNE a SSW con dimensioni 8'×1'; finemente screziata a 340x; presenta un piccolo bulge molto brillante di 30"×10"; c'è una stellina al bordo orientale.
NGC 4217	gx	12h15m51s	+47°05.5'	q 74	CVn	16"	buona / buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 5'×1.5'; c'è una stellina brillante al bordo N; una stella molto brillante è situata un paio di primi a N, mentre una più debole è posta simmetricamente a S; se osservata a bassi ingrandimenti queste stelle possono influenzare la forma della gx; meglio contrastata a 270x.
NGC 4218	gx	12h15m46s	+48°07.9'	q 74	CVn	16"	mediocre / discreto	è un bell'ovale allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40", abbastanza definito ai bordi, con gradiente di luce molto basso; c'è una stellina a ~ 1' verso NW — 270x.
NGC 4220	gx	12h16m11s	+47°53.0'	q 74	CVn	24"	buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 3'×1', con bulge di 30"×20" poco contrastato sul disco e debolmente screziato a 450x; c'è una stellina a 1' SW (la gx era facilmente visibile nel 10" a 190x).
NGC 4221	gx	12h16m00s	+66°13.9'	q 25	Dra	16"	buona / buono	presenta un nucleo piccolo e brillante, abbastanza marcato e un tenuissimo alone circonfuso; forse rotonda con Ø di 2' scarsi — 188x.
NGC 4222	gx	12h16m22s	+13°18.4'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa oltre 2'; c'è una debole stellina sul prolungamento dell'asse a NE — 270x.
NGC 4224	gx	12h16m34s	+07°27.7'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto allungata da NE a SE, di dimensioni 2'×45", diffusa e con nucleo stellare — 270x.
NGC 4225	gx	12h16m38s	−12°19.6'	q 283	Crv	16"	discreta / ottimo	debole, piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina brillante a 2' verso S — 380x.
NGC 4226	gx	12h16m26s	+47°01.5'	q 74	CVn	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e poco più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 4227	gx	12h16m34s	+33°31.3'	q 107	CVn	24"	ottima / buono	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 80"×40" e con nucleo molto brillante; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE (già osservabile debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4229	gx	12h16m39s	+33°33.6'	q 107	CVn	24"	ottima / buono	poco più debole di NGC 4227, dalla quale dista 2.5' a NNE, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare (visibile molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4231	gx	12h16m49s	+47°27.5'	q 107	CVn	16"	mediocre / discreto	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti distanti tra loro poco più di 1' in direzione N-S, entrambe gradatamente più brillanti verso l'interno; la 1ª è rotonda con Ø di 1'; la 2ª pare invece leggermente allungata da NW a SE per 1' max; sono di luminosità simili — 270x.
NGC 4232	gx	12h16m49s	+47°26.3'	q 107	CVn	16"	mediocre / discreto	v. **NGC 4231**
NGC 4233	gx	12h17m08s	+07°37.4'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×40", diffusa alle estremità e con bulge molto marcato e di aspetto quasi stellare — 380x.
NGC 4234	gx	12h17m09s	+03°40.9'	q 238	Vir	24"	ottima / buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, perfettamente rotonda con Ø di 1' (osservabile elusivamente anche nel 10" in visione distolta) — 450x.
NGC 4235	gx	12h17m10s	+07°11.5'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 3'×30", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 4236	gx	12h16m43s	+69°27.8'	q 25	Dra	24"	buona / m. buono	è una gx molto estesa e con luminanza superficiale molto bassa, orientata da NNW a SSE con dimensioni grosso modo di 10'×2'; l'aspetto è un po' irregolare, anche perché ci sono alcune stelline a ridosso che ne confondono un po' la forma; una di queste, situata verso l'estremità meridionale e che a 450x si è dimostrata chiaramente sfuocata, era di fatto la piccola **PGC 39369** (riportata sul Megastar come **7ZW 446**); un'altra stellina significativa si trova a "metà" gx verso E e una terza all'estremità NNW; nel complesso appare meglio contrastata scalando a 210x; l'aggiunta del filtro desktop aumenta un po' il contrasto sul fondo cielo, ma non i particolari visibili (era osservabile molto debolmente nel 10" a 126x).
NGC 4237	gx	12h17m11s	+15°19.4'	q 193	Com	28"	m. buona / ottimo	è un bell'ovale diffuso, debolmente screziato, orientato da E a W, di dimensioni 90"×60", con piccolo bulge rotondo di 30" di Ø evidente ma poco contrastato sul disco (già osservata in passato col 10" a 178x) — 495x.
NGC 4238	gx	12h16m56s	+63°24.8'	q 25	Dra	16"	non registrati	molto debole, estesa da NE a SW, di dimensioni 60"×20", con un piccolo nucleo puntiforme visibile a tratti; si trova in una piccola zona di cielo depleta — 188x.
NGC 4239	gx	12h17m15s	+16°31.9'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	molto diffusa, stemperata sul fondo cielo, poco più brillante all'interno, allungata da ~ da E a W con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 4240	gx	12h17m24s	−09°57.1'	q 283	Vir	16"	discreta / ottimo	rotonda, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso verso W — 270x.
NGC 4241	gx	12h17m25s	+06°41.4'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	è un bell'ovale orientata da NW a SE, di dimensioni 2'×1', con nucleo molto marcato e un tenue alone circonfuso, stemperato sul fondo cielo — 188x.
NGC 4242	gx	12h17m30s	+45°37.3'	q 74	CVn	16"	buona / buono	allungata grosso modo da N a S, di dimensioni di 4'×3', con bassa luminanza superficiale e appena più brillante all'interno; c'è una stellina evidente al bordo S; un'altra abbastanza brillante si trova a circa 3' verso E — 188x.
NGC 4244	gx	12h17m30s	+37°48.5'	q 107	CVn	16"	m. buona / m. buono	è un bellissimo fuso estesa una dozzina di primi e spesso non più di 1.5', orientata da NE a SW e debolmente screziata a 270x; una zona centrale diffusa appare appena più evidente, ma poco contrastata; c'è una stellina verso il bordo NE; una doppia stretta si trova al margine N, a 1 / 4 della lunghezza della gx partendo da NE; notasi anche un nodulo, seppure appena percettibile, all'estremità SW.
NGC 4245	gx	12h17m37s	+29°36.5'	q 107	Com	24"	ottima / buono	presenta un nucleo brillante di aspetto quasi stellare circonfuso da una zona più debole orientata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; in visione distolta, poi, quest'ultima appare avvolta in un tenuissimo alone grosso modo rotondo ed esteso un paio di primi (già facilmente osservabile nel 10" in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 4246	gx	12h17m58s	+07°11.1'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 90"×60"; a 270x sembra di vederla a momenti poco più netta verso SE.
NGC 4247	gx	12h17m58s	+07°16.4'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	molto debole e piccola approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi a NW — 188x.
NGC 4248	gx	12h17m50s	+47°24.6'	q 74	CVn	16"	buona / buono	molto allungata da WNW a ESE, diffusa, di dimensioni 90"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina brillante al margine NW; è situata una dozzina di primi NW della bellissima M106 — 188x.
NGC 4249	gx	12h17m59s	+05°35.9'	q 193	Vir	24"	ottima / m. buono	presenta all'incirca lo stesso Ø, pari a ~ 40", di CGCG 41-72 (situata 5.5' a NNE) e osservata subito prima; è tuttavia decisamente più brillante, poco diffusa e con basso gradiente di luce — 450x.
NGC 4250	gx	12h17m26s	+70°48.1'	q 25	Dra	16"	buona / m. buono	presenta un bulge brillante, diffuso circolare di 30" di Ø e un tenue alone circonfuso orientata da N a S con dimensioni 2.5'×1.5' — 380x.
NGC 4251	gx	12h18m08s	+28°10.5'	q 107	Com	24"	ottima / buono	bella, debolmente screziata a 450x, molto allungata da E a W, dimensioni 3'×1' e con bulge brillante di 30"×20" ben contrastato sul disco; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW (era una gx facile anche nel 10" osservata in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 4252	gx	12h18m31s	+05°33.5'	q 193	Vir	24"	ottima / m. buono	molto allungata da NE a SW, con dimensioni 80"×20" e di luminosità uniforme; una stellina appena percettibile appare a 1' verso S: questa è in realtà la MAC 1218+0532; anche forzando a 580x l'aspetto di quest'ultima rimane quello di una stellina appena sfuocata.
NGC 4253	gx	12h18m26s	+29°48.8'	q 107	Com	16"	ottima / discreto	rotonda, compatta, con Ø di una 40-ina di secondi con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 1' verso N — 270x.
NGC 4255	gx	12h18m56s	+04°47.2'	q 238	Vir	16"	m. buona / m. buono	presenta un brillante nucleo stellare circonfuso da un tenue alone orientata da WNW a ESE di dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 4256	gx	12h18m43s	+65°54.0'	q 25	Dra	24"	buona / m. buono	è una bella gx posta di taglio, estesa per oltre 4' da NE a SW, molto diffusa alle estremità, con piccolo bulge contrastato e un nucleo brillante (già facilmente osservabile nel 10").
NGC 4257	gx	12h19m06s	+05°43.6'	q 193	Vir	24"	ottima / m. buono	è un bel fuso relativamente compatto, di aspetto molto regolare e poco più brillante al centro, orientato da E a W con dimensioni 60"×20"; la gx è allineata con due stelline a S — 450x.
NGC 4258	gx	12h18m57s	+47°18.5'	q 74	CVn	24"	m. buona / m. buono	bella, molto diffusa, allungata da NNW a SSE con dimensioni 8'×3'; presenta un piccolo bulge brillante di 30"×15" orientato da NW a SE (ossia leggermente "ruotato" rispetto all'asse della gx) con all'interno un evidente nucleo stellare; da questo bulge si diparte, verso SE, una piccola zona foggiata a ventaglio con apertura di una 30-ina di gradi; una sorta di protuberanza estesa un paio di primi si diparte verso NNW dalla zona interna più brillante; la gx era facile visibile nel cercatore 12×50 (altresì nota come **M106**) — 340x.
NGC 4259	gx	12h19m22s	+05°22.6'	q 193	Vir	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme; allungata da NW a SE e di dimensioni simili alla 4257; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso NE — 188x.
NGC 4260	gx	12h19m22s	+06°05.9'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×1', con piccolo bulge ben contrastato sul disco e nucleo stellare visibile a 400x; c'è una stellina a ridosso verso NE. Nel 10" appariva debole, delle stesse dimensioni e con tenue condensazione centrale.
NGC 4261	gx	12h19m23s	+05°49.5'	q 193	Vir	10"	ottima / discreto	brillante, rotonda, con alto gradiente di luce, poco diffusa ai bordi e con Ø di ~ 2.5'.
NGC 4262	gx	12h19m31s	+14°52.7'	q 193	Com	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto curioso: presenta un piccolo e brillante bulge rotondo con Ø di una 20-ina di secondi nel quale ammicca un nucleo stellare; questo è circonfuso da un alone rotondo, molto tenue e stemperato sul fondo cielo con Ø di almeno 1.5' — 400x. Nel 10", ad appena 63x, appariva a prima vista come una stellina sfuocata.
NGC 4263	gx	12h19m42s	−12°13.5'	q 283	Crv	16"	discreta / ottimo	deboluccia, ma relativamente compatta, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' verso SE — 270x.
NGC 4264	gx	12h19m36s	+05°50.9'	q 193	Vir	16"	m. buona / buono	relativamente compatta e brillante, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata 3' a NE della 4261 osservata in altra data col 10" — 188x.
NGC 4266	gx	12h19m42s	+05°32.3'	q 193	Vir	16"	m. buona / buono	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20"; c'è una stella brillante a ridosso verso NW che interferisce un po' con l'osservazione — 188x.
NGC 4267	gx	12h19m45s	+12°47.9'	q 193	Vir	24"	ottima / buono	presenta una piccola zona centrale molto brillante, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi con all'interno incastonato un nucleo stellare; questi sono circonfusi da un tenue alone circolare con Ø di un paio di primi che si stempera rapidamente sul fondo cielo; più interessante scalando a 340x (già precedentemente osservata nel 10" in ottime condizioni di visibilità).
NGC 4268	gx	12h19m47s	+05°17.0'	q 193	Vir	16"	m. buona / buono	facile, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30" e poco più brillante all'interno; c'è una debole stellina a una 30-ina di secondi verso NNW — 188x.
NGC 4269	gx	12h19m49s	+06°00.9'	q 193	Vir	16"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, all'incirca rotonda con Ø di 1'; disturbata dalla SAO 119333 di magnitudo 7.5 situata 1.5' a N; osservando a 188x appare, in visione distolta, un altro piccolo oggetto nebuloso subito a SW, orientato da NE a SW con dimensioni 40"×20"; non è riportato sull'Uranometria e da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la IC 3155.
NGC 4270	gx	12h19m49s	+05°27.8'	q 193	Vir	24"	m. buona / buono	molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 90"×30", con bulge marcato e nucleo stellare; sembra a prima vista una riproduzione in scala della 4281, situata 9' a SE (era visibile debolmente anche nel 10") — 450x.
NGC 4271	gx	12h19m33s	+56°44.2'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	sembra un piccolo ammasso globulare irrisolto, con nucleo stellare e Ø di 45"; ci sono 2 stelline: una a ridosso NNE e l'altra a 1' verso W — 380x.
NGC 4272	gx	12h19m48s	+30°22.4'	q 107	Com	16"	buona / discreto	debole, con nucleo piccolo, brillante di aspetto quasi stellare e un tenue alone di dimensioni 60"×45" orientata grosso modo da NW a SE — 188x.
NGC 4273	gx	12h19m56s	+05°20.5'	q 193	Vir	24"	m. buona / buono	è una delle più brillanti di un gruppo — molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 2'×1'; presenta un bulge abbastanza contrastato e a tratti leggermente screziato, osservandone a 450x (ben visibile anche nel 10").
NGC 4274	gx	12h19m51s	+29°36.8'	q 107	Com	16"	ottima / ottimo	è una bella gx estesa e molto diffusa, con alto gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 6'×2'; appare netta al margine meridionale (a quello opposto è maggiormente sfumata); ci sono 2 stelline evidenti: una al bordo NE e l'altra a quello SW — 270x.
NGC 4275	gx	12h19m52s	+27°37.3'	q 148	Com	16"	ottima / discreto	relativamente facile, rotonda, dai bordi sfumati, poco più brillante all'interno e con Ø di 45"; c'è una stellina a ~ 1' verso E — 270x.
NGC 4276	gx	12h20m08s	+07°41.5'	q 193	Vir	16"	buona / mediocre	chiazza rotonda molto debole con basso gradiente di luce e Ø di 1.5' — 270x.
NGC 4277	gx	12h20m04s	+05°20.5'	q 193	Vir	24"	m. buona / buono	rotonda con Ø di 45", poco diffusa e con basso gradiente di luce; situata tra 2 stelline: a 1' verso S e una appena percettibile a 1' dalla parte opposta; forma una coppia eterogenea con la 4273 situata un paio di primi a W (era facilmente osservabile anche nel 16").
NGC 4278	gx	12h20m07s	+29°16.8'	q 108	Com	24"	ottima / buono	bella, sembra fatta a isofote; in visione distolta appare molto diffusa, con Ø totale di quasi 3'; presenta una zona circolare più interna ed evidente con Ø di 1' con all'interno un nucleo luminoso debolmente screziato a 450x ed esteso una 20-ina di secondi (già visibile nel 10" in condizioni di cielo analoghe).
NGC 4279	gx	12h20m25s	−11°40.0'	q 283	Vir	16"	discreta / ottimo	assieme a NGC 4285 forma una coppia di gx molto deboli distanti 4' in direzione ENE-WSW; delle 2 questa è la più evidente, con nucleo stellare, ma di aspetto piuttosto confuso — 270x.
NGC 4281	gx	12h20m21s	+05°23.2'	q 193	Vir	24"	m. buona / buono	bella, allungata da E a W con dimensioni 2'×45" e molto diffusa alle estremità E e W; presenta un bulge brillante e un nucleo stellare (osservabile facilmente anche nel 10") — 450x.
NGC 4282	gx	12h20m24s	+05°34.3'	q 193	Vir	16"	m. buona / buono	debole, piccola e relativamente compatta, forse rotonda con Ø non superiore a 30" — 188x.
NGC 4283	gx	12h20m21s	+29°18.7'	q 108	Com	24"	ottima / buono	rotonda con Ø di oltre 1', molto diffusa e con piccolo nucleo di aspetto quasi stellare (già visibile nel 10" in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 4284	gx	12h20m13s	+58°05.6'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	molto allungata ~ da E a W con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso E e un'altra a poco più di 1' verso S — 270x.
NGC 4285	gx	12h20m40s	−11°38.5'	q 283	Vir	16"	discreta / ottimo	più debole della 4279 è più compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme; tra le 2 galassie si vedono a tratti 2 stelline molto deboli e ravvicinate, orientate da NW a SE — 270x.
NGC 4286	gx	12h20m42s	+29°20.7'	q 108	Com	16"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni che in visione distolta appaiono di circa 60"×40"; c'è una stellina abbastanza brillante verso SE; la gx è allineata verso NE con le più evidenti NGC 4278 e 4283 osservate col 10" in altra data — 188x.
NGC 4287	gx	12h20m49s	+05°38.4'	q 193	Vir	16"	m. buona / buono	è una gx molto debole, estesa forse per oltre 1', ma è difficile da studiare a causa di una stellina sovrapposta verso W che nonostante tutto riesce a interferire con l'osservazione! — 188x.
NGC 4288	gx	12h20m38s	+46°17.5'	q 74	CVn	28"	ottima / buono	è un bell'ovale molto diffuso, orientato da N a S, di dimensioni 90"×45" e con basso gradiente di luce — 495x.
NGC 4289	gx	12h21m02s	+03°43.3'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	è una lama di luce molto debole, orientata da N a S, estesa un paio di primi e appena più brillante all'interno; è situata 3' W della SAO 119347 di 8ª grandezza che interferisce un po' con l'osservazione — 188x.
NGC 4290	gx	12h20m48s	+58°05.6'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×60" e con nucleo stellare — 270x.
NGC 4291	gx	12h20m18s	+75°22.2'	q 9	Dra	24"	ottima / m. buono	molto bella e luminosa; presenta un bulge brillante di 20" di Ø immerso da un alone circolare poco diffuso di Ø 1.5'; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W e una debole a ridosso S; la gx si trova al vertice più occidentale di un piccolo rettangolo formato con 3 stelline brillanti (sia questa gx, sia la 4319 situata a 6' SE erano osservabili nel 10" a 178x: la seconda delle due molto debolmente) — 450x.
NGC 4292	gx	12h21m16s	+04°35.7'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante a 1' verso NNW — 188x.
NGC 4293	gx	12h21m13s	+18°23.0'	q 148	Com	16"	m. buona / m. buono	allungata da ENE a WSW, di dimensioni 4'×2' e coi bordi sfumati; il bulge è molto diffuso e poco contrastato; ci sono 2 stelline a ridosso della galassia: una a S e l'altra a E — 380x.
NGC 4294	gx	12h21m18s	+11°30.6'	q 193	Vir	24"	ottima / buono	molto bella, brillante, ma con basso gradiente di luce, allungata da NNW a SSE con dimensioni 2.5'×45"; debolmente screziata a 450x; c'è una stellina al bordo NNW; notasi una maggior caduta di luminosità nella parte meridionale della galassia (già precedentemente osservata col 10").
NGC 4295	gx	12h21m10s	+28°09.9'	q 108	Com	16"	ottima / discreto	debole, approssim. circolare, con Ø di ~ 30", con un'evidente e diffusa condensazione centrale — 270x.
NGC 4296	gx	12h21m28s	+06°39.2'	q 193	Com	16"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S — 380x.
NGC 4297	gx	12h21m27s	+06°40.3'	q 193	Com	16"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme; è osservabile in visione distolta a 380x; è situata 1' N di NGC 4296.
NGC 4298	gx	12h21m33s	+14°36.2'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	gx estesa, facile, ma con basso gradiente di luce, poco allungata da NW a SE con dimensioni 3'×2'; c'è una stellina verso NE; forma una coppia ravvicinata con NGC 4302 situata a poco più di 2' verso E — 380x.

NGC 4299	gx	12h21m41s	+11°30.1'	q 193	Vir	24"	ottima / buono	rotonda con Ø > 1', poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo qualche lievissima discrepanza visibile solo a momenti a 450x; c'è una stellina che appare elusivamente ogni tanto a ridosso verso N o NNW (già precedentemente osservata col 10").
NGC 4300	gx	12h21m41s	+05°23.1'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", con piccolo nucleo abbastanza brillante — 188x.
NGC 4301	gx	12h21m34s	+04°46.7'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	molto debole e di luminosità pressoché uniforme salvo una condensazione centrale molto tenue visibile però solo a momenti; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni di 40"×20" — 188x.
NGC 4302	gx	12h21m42s	+14°35.6'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	è una debole lama di luce d luminosità pressoché uniforme che in visione distolta si estende sino alla stellina situata a N; è estesa quindi 4' o 5' e spessa una 40-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con NGC 4298 situata a poco più di 2' verso W — 270x.
NGC 4303A	gx	12h22m27s	+04°34.0'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, molto stemperata sul fondo cielo, forse circolare con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a poco più di 2' verso W; è situata a 10' a NE di M61 — 188x.
NGC 4305	gx	12h22m03s	+12°44.5'	q 235	Sex	10"	discreta / buono	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme; solo a momenti, a 118x, appare orientata da NW a SE ed estesa per oltre 3'.
NGC 4306	gx	12h22m04s	+12°47.2'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	sono distanti 3' scarsi in direzione N-S ed entrambe diffuse; la 1ª è allungata da NE a SW, di dimensioni 1.5'×1' e con basso gradiente di luce; la 2ª è rotonda, con Ø di ~ 1' e di luminosità simile — 188x.
NGC 4307	gx	12h22m06s	+09°02.6'	q 193	Vir	28"	ottima / m. buono	è un bel fuso con basso gradiente di luce, orientato da NNE a SSW, con dimensioni che in visione distolta arrivano a 3'×30"; appare debolmente screziata e appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline a SW distanti 1.5' e orientate come la gx (quella più vicina ad essa è più debole) — 495x.
NGC 4308	gx	12h21m57s	+30°04.5'	q 108	Com	16"	buona / discreto	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno; presenta un piccolo nucleo relativamente brillante con l'aspetto di una stellina leggermente sfuocata — 188x.
NGC 4309	gx	12h22m12s	+07°08.6'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	piuttosto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 80"×40"; è seguita da una stellina situata a 3' verso E; meglio osservabile a 270x.
NGC 4310	gx	12h22m26s	+29°12.5'	q 108	Com	16"	buona / discreto	allungata da N a S, di dimensioni 90"×45", molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 4312	gx	12h22m31s	+15°32.2'	q 193	Com	24"	m. buona / discreto	molto allungata da N a S con dimensioni 4'×1', coi bordi abbastanza netti e di aspetto alquanto uniforme; non si nota un bulge centrale; c'è una coppia stretta di stelline a poco più di 2' verso W (visibile debolmente anche nel 10" a 178x) — 400x.
NGC 4313	gx	12h22m38s	+11°48.1'	q 193	Vir	24"	m. buona / discreto	molto bella, diffusa alle estremità, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 3.5'×1', con bulge contrastato 45"×30" e nucleo stellare (già precedentemente osservata nel 10") — 400x.
NGC 4314	gx	12h22m32s	+29°53.8'	q 108	Com	16"	m. buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 3'×45", con bulge rotondo, ben contrastato su un disco che pare immerso in un tenue alone — 270x.
NGC 4316	gx	12h22m43s	+09°19.9'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	posta praticamente di taglio, orientata da WNW a ESE, estesa un paio di primi e con bulge ben evidente a 188x; c'è una doppia abbastanza stretta con componenti di luminosità simile quasi a ridosso verso NW.
NGC 4318	gx	12h22m43s	+08°11.9'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	compatta, apparentemente circolare, con Ø non superiore a 30", con piccola e marcata condensazione centrale di aspetto stellare — 188x.
NGC 4319	gx	12h21m44s	+75°19.3'	q 9	Dra	24"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, debolmente screziata a 450x; tuttavia a un'ispezione accurata è di aspetto alquanto irregolare; la zona interna più brillante è orientata da NW a SE con dimensioni 90"×45"; da questa sembra "staccarsi" verso NW (in direzione di una stellina) una piccola parte molto debole; una sorta di filamento ricurvo appena percettibile si trova a ridosso N della gx; una stellina ben evidente che pare a sua volta immersa in un piccolo e tenue alone si trova a ridosso S del bulge, ma si tratta in effetti della quasar Mkn 205.
NGC 4320	gx	12h22m58s	+10°32.9'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 188x.
NGC 4322	gx	12h23m02s	+15°54.3'	q 193	Com	16"	m. buona / m. buono	è una delle galassie satelliti di M100 — piccola galassia molto debole, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e facilmente visibile in visione distolta a 188x.
NGC 4324	gx	12h23m06s	+05°15.0'	q 193	Vir	24"	discreta / buono	bella, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×1', con bulge contrastato su disco e un nucleo stellare evidente (il bulge appare a tratti debolmente screziato a 450x); nell'insieme appare tuttavia più interessante scalando a 340x.
NGC 4325	gx	12h23m07s	+10°37.3'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	situata 5' NNE di NGC 4324, ma poco più estesa (~ 40") e brillante; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' verso E — 188x.
NGC 4326	gx	12h23m12s	+06°04.3'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	è la più debole di un terzetto cui appartengono anche la 4333 e la 4339; piuttosto debole, molto diffusa, rotonda, di ~ 1' di Ø e con nucleo stellare; è situata sul lato occidentale di un triangolo di stelline brillanti — 380x.
NGC 4328	gx	12h23m20s	+15°49.2'	q 193	Com	16"	m. buona / m. buono	è l'altra satellite di M100 — poco più evidente della 4322, rotonda, con Ø simile e appena più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 4329	gx	12h23m21s	−12°33.5'	q 283	Crv	16"	discreta / ottimo	brillante, abbastanza compatta, poco allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; presenta un nucleo brillante stellare; c'è un asterismo di 4 stelline brillanti a 9' (la metà del campo dell'oculare da 270x) e NNW.
NGC 4330	gx	12h23m17s	+11°22.0'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	lama di luce molto debole, ma facilmente osservabile in visione distolta a 188x; è orientata da NE a SW, estesa per oltre 3' e di luminosità pressoché uniforme.
NGC 4331	gx	12h22m36s	+76°10.2'	q 9	Dra	16"	ottima / discreto	debolissima, allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20"; è situata tra 2 stelline molto deboli distanti ~ 1' e orientate da NE a SW; è spostata quasi a ridosso di quella settentrionale; si riesce a vedere solo in visione distolta — 188x.
NGC 4332	gx	12h22m47s	+65°50.7'	q 25	Dra	16"	buona / buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×45", con alto gradiente di luce e bulge estesa abbastanza evidente; c'è una stellina brillante a un paio di primi NE — 188x.
NGC 4333	gx	12h23m22s	+06°02.5'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare osservabile a tratti; situata sul lato meridionale di un triangolo di stelline brillanti (v. NGC 4326) — 380x.
NGC 4334	gx	12h23m24s	+07°28.4'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	molto diffusa e con marcata condensazione centrale, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso verso S — 188x.
NGC 4335	gx	12h23m02s	+58°23.7'	q 47	UMa	16"	m. buona / m. buono	bella, diffusa, con evidente condensazione centrale, rotonda e con Ø di 70" — 380x.
NGC 4336	gx	12h23m30s	+19°25.6'	q 148	Com	16"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", dai bordi definiti, luminosità uniforme, ma alquanto debole; è situata al vertice rettangolo di un triangolo rettangolo isoscele formato con 2 stelline deboli di 14ª grandezza — 380x.
NGC 4338	gx	12h23m14s	+28°53.6'	q 108	Com	16"	ottima / discreto	è una galassia elusiva che appare solo a momenti in visione distolta come un baffo di luce piccolo, allungata da N a S per una 40-ina di secondi; è situata in un campo relativamente depleto — 270x.
NGC 4339	gx	12h23m35s	+06°04.9'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	rotonda, molto diffusa, di 1.5' di Ø e con nucleo marcato di aspetto quasi stellare; c'è una stellina brillante a S (che fa parte dello stesso triangolo di cui a NGC 4333) — 380x.
NGC 4340	gx	12h23m35s	+16°43.4'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	grosso modo rotonda, diffusa, con Ø di 1.5' e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 4341	gx	12h23m53s	+07°06.4'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con tenue nucleo stellare — 380x.
NGC 4342	gx	12h23m39s	+07°03.2'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare marcato (sembra addirittura una stellina sovrapposta) — 380x.
NGC 4343	gx	12h23m39s	+06°57.2'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×30"; presenta un bulge diffuso, rotondo e poco contrastato sul disco — 380x.
NGC 4344	gx	12h23m37s	+17°32.5'	q 193	Com	16"	discreta / scarso	debole e diffusa, rotonda con Ø oltre 1' e di luminosità pressoché uniforme; è situata al vertice occidentale di un piccolo quadrilatero abbastanza regolare formato con tre stelline — 188x.
NGC 4346	gx	12h23m28s	+46°59.6'	q 74	CVn	10"	ottima / buono	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1' e con nucleo di aspetto stellare.
NGC 4348	gx	12h23m54s	−03°26.5'	q 238	Vir	16"	buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni almeno 2'×30", abbastanza netta ai bordi e con tenue bulge poco contrastato (a tratti sembra d'intravvedere qualcosa verso l'estremità NE: una stellina o una semplice irregolarità di luce?) — 380x.
NGC 4350	gx	12h23m58s	+16°41.7'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 2'×45", con bulge brillante, contrastato e nucleo stellare — 380x.
NGC 4351	gx	12h24m02s	+12°12.3'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	molto debole, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45", di luminosità pressoché uniforme e assai stemperata sul fondo cielo; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' verso N — 188x.
NGC 4352	gx	12h24m05s	+11°13.1'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno; il debole alone che circonda il bulge appare molto diffuso e stemperato sul fondo cielo — 188x.
NGC 4353	gx	12h24m00s	+07°47.1'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	molto debole, pressoché circolare con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a 1' S di una stellina abbastanza brillante — 188x.
NGC 4356	gx	12h24m15s	+08°32.2'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW ed estesa per oltre 2'; c'è una stellina brillante a ridosso del bordo sud-orientale — 188x.
NGC 4357	gx	12h23m58s	+48°46.8'	q 74	CVn	16"	buona / buono	è allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1', molto diffusa e con basso gradiente di luce — 270x.
NGC 4358	gx	12h23m57s	+58°22.8'	q 47	UMa	16"	m. buona / m. buono	appare come una debolissima stellina sfocata di 10" max di Ø; salta fuori in visione distolta a 380x una 40-ina di secondi SW di NGC 4364.
NGC 4359	gx	12h24m11s	+31°31.3'	q 108	Com	16"	m. buona / discreto	debole, molto allungata in direzione grosso modo da WNW a ESE, di dimensioni 3'×45" (ossia con rapporto degli assi 4:1), con una zona interna più brillante ed estesa per 1.5' — 188x.
NGC 4360	gx	12h24m22s	+09°17.6'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di 45", gradatamente più brillante verso l'interno e con piccolo n di aspetto quasi stellare; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NW (non è riportata sulla Uranometria: ci sono alcune debolissime galassiette nei dintorni) — 380x.
NGC 4361	np	12h24m31s	−18°47.0'	q 328	Crv	24"	m. buona / m. buono	molto bella, diffusa, rotonda con Ø di quasi 2'; la stellina centrale è molto brillante; due tenui anse appaiono ai margini NE e SW: quella a SW è poco più evidente — 340x.
NGC 4362	gx	12h24m11s	+58°21.6'	q 47	UMa	16"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale — 380x.
NGC 4363	gx	12h23m28s	+74°57.2'	q 9	Dra	28"	buona / ottimo	debole chiazza molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a 1' SE — 388x.
NGC 4364	gx	12h24m02s	+58°23.1'	q 47	UMa	16"	m. buona / m. buono	debole, rotonda, di 45" di Ø e con condensazione centrale molto tenue osservabile a 380x.
NGC 4365	gx	12h24m28s	+07°09.1'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto brillante, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni di almeno 4'×3'; presenta un piccolo bulge molto marcato, estesa una 30-ina di secondi all'interno del quale appare un nucleo stellare — 270x.
NGC 4366	gx	12h24m47s	+07°21.2'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 4369	gx	12h24m36s	+39°23.0'	q 75	CVn	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 1.5', poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 380x.
NGC 4370	gx	12h24m55s	+07°26.6'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 4371	gx	12h24m55s	+11°42.3'	q 193	Vir	24"	m. buona / discreto	presenta un'ampia zona centrale rotonda fatta a isofote, con bulge concentrico e nucleo stellare; scalando a 200x si notano in visione distolta 2 ali molto tenui che protrudono a E e a W; le dimensioni totali risultano pertanto di 3'×1.5' (nel 10" appariva con nucleo brillante e un tenue alone diffuso) — 400x.
NGC 4374	gx	12h25m04s	+12°53.2'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	molto brillante, rotonda e diffusa di Ø > 3', gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare molto marcato; c'è una stellina a ridosso verso il margine occidentale dell'alone — 270x.
NGC 4375	gx	12h25m00s	+28°33.5'	q 108	Com	16"	ottima / discreto	relativamente facile, gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ~ 1' verso NE; un'altra stellina situata 1.5' a N è percettibile solo a momenti: da un controllo successivamente effettuato, quest'ultima è in realtà risultata essere la MAC 1224+2834 — 270x.
NGC 4376	gx	12h25m18s	+05°44.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 4377	gx	12h25m12s	+14°45.8'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	molto diffusa, leggermente ovale, orientata da N a S, dimensioni 80"×60", con nucleo stellare brillante e molto contrastato — 270x.
NGC 4378	gx	12h25m18s	+04°55.5'	q 238	Vir	24"	discreta / buono	brillante, diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di un paio di primi e un nucleo di aspetto quasi stellare; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NNW; forma un triangolo isoscele schiacciato con due stelle brillanti di 9ª grandezza (la SAO 119386 a N e la SAO 119388 a SE) — 450x.
NGC 4379	gx	12h25m15s	+15°36.5'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	rotonda, con alto gradiente di luce, di Ø poco superiore a 1' e con nucleo stellare abbastanza evidente — 270x.
NGC 4380	gx	12h25m22s	+10°01.0'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	è un bell'ovale diffuso e a basso gradiente di luce, orientata da NNW a SSE, con dimensioni 2.5'×1.5'; c'è una stellina un paio di primi a S — 270x.
NGC 4383	gx	12h25m26s	+16°28.2'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", con nucleo stellare molto debole; c'è una stellina a 1.5' SW — 380x.
NGC 4384	gx	12h25m12s	+54°30.4'	q 47	UMa	16"	m. buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 4385	gx	12h25m43s	+00°34.4'	q 238	Vir	16"	buona / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 80"×40", molto diffusa, con bulge poco contrastato sul disco e nucleo stellare — 380x.
NGC 4386	gx	12h24m27s	+75°31.7'	q 9	Dra	24"	m. buona / m. buono	brillante, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1', con bulge luminoso, ben contrastato e debolmente screziato a 450x; forma un triangolo equilatero con 2 stelline brillanti situate rispettivamente 3' NNE e 3' a E (era facilmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4387	gx	12h25m42s	+12°48.6'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto brillante, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 70"×35" e con bulge luminoso; c'è una stellina a ridosso S e una più evidente a 1' NW — 450x.
NGC 4388	gx	12h25m47s	+12°39.7'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	magnifico fuso gradatamente più brillante verso l'interno e di aspetto screziato, orientato da E a W con dimensioni 5'×1' — 450x.
NGC 4389	gx	12h25m35s	+45°41.1'	q 75	CVn	16"	ottima / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 2'×1', diffusa e poco più brillante all'interno; a tratti appare leggermente screziata a 380x; c'è una stellina a ridosso verso SE e un'altra appena percettibile al bordo meridionale.
NGC 4390	gx	12h25m51s	+10°27.6'	q 193	Vir	16"	buona / mediocre	è di aspetto simile alla 4276, ma poco più piccola, più stemperata e di gradiente di luce minore; approssim. rotonda con Ø superiore a 1'; c'è una stellina a E — 270x.
NGC 4391	gx	12h25m19s	+64°56.0'	q 25	Dra	16"	ottima / buono	presenta un nucleo brillante circonfuso da un tenue alone di aspetto circolare e con Ø di 1' — 270x.
NGC 4392	gx	12h25m19s	+45°50.8'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	rotonda con Ø di 1', diffusa e con nucleo stellare — 270x.
NGC 4393	gx	12h25m51s	+27°33.6'	q 148	Com	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e poco contrastata sul fondo cielo, orientata da N a S con dimensioni 2'×1.5' e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SSW; meglio tuttavia scalare a 340x (appariva debolissima e molto stemperata sul fondo cielo nel 10" a 118x, rotonda con Ø di un paio di primi).
NGC 4394	gx	12h25m56s	+18°12.8'	q 148	Com	16"	m. buona / m. buono	è la compagna di M85 — presenta un bulge rotondo, marcato dal quale si dipartono i due tenui baffi che costituiscono la barra; questa appare poco contrastata su un debole alone circolare, diffuso e con Ø di un paio di primi — 270x.
NGC 4395	gx	12h25m50s	+33°32.8'	q 108	CVn	16"	m. buona / ottimo	è una gx molto debole, estesa e di aspetto assai irregolare; a 132x si nota una tenue zona centrale molto diffusa, orientata ~ da E a W con dimensioni 2'×1' e un paio di noduli brillanti; uno di questi, NGC 4401, è facilmente visibile a 380x e appare di aspetto un po' irregolare: allungata da NW a SE, di dimensioni 20"×10" e "ingrossato" verso SE; l'altro, NGC 4400 e situato a neppure 1' SSW, sembra una stellina leggermente diffusa, rotondeggiante con Ø di 10".
NGC 4396	gx	12h25m59s	+15°40.2'	q 193	Com	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30" e con basso gradiente di luce; c'è una stellina al bordo NW; una brillante si trova a 1' verso N — 450x.
NGC 4400	knot	12h25m58s	+33°31.7'		CVn	16"	m. buona / ottimo	**regione H II in NGC 4395** — è facilmente visibile a 380x e appare di aspetto un po' irregolare: allungato da NW a SE, di dimensioni 20"×10" e "ingrossato" verso SE.
NGC 4401	knot	12h25m54s	+33°31.0'		CVn	16"	m. buona / ottimo	**regione H II in NGC 4395** — situato a neppure 1' SSW del precedente sembra una stellina leggermente diffusa, rotondeggiante con Ø di una decina di secondi — 380x.
NGC 4402	gx	12h26m08s	+13°06.8'	q 193	Vir	16"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 3'×45"; c'è una stellina a 1' verso N situata a "metà galassia" — 270x.
NGC 4403	gx	12h26m13s	−07°41.1'	q 283	Vir	16"	discreta / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette abbastanza facili, distanti ~ 1' in direzione E-W; la 1ª è allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo evidente; la 2ª è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta una condensazione centrale con piccolo nucleo stellare visibile a momenti — 270x.
NGC 4404	gx	12h26m16s	−07°40.8'	q 283	Vir	16"	discreta / ottimo	v. NGC 4403
NGC 4405	gx	12h26m07s	+16°10.9'	q 193	Com	16"	discreta / scarso	debole e diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 90"×60" e con basso gradiente di luce — 188x.
NGC 4406	gx	12h26m12s	+12°56.8'	q 193	Vir	16"	buona / ottimo	molto diffusa e con bulge molto contrastato più piccolo di quello di NGC 4374 nel quale appare un nucleo stellare; è allungata da NW a SE con dimensioni 5'×3'; c'è una stellina a SW, sul prolungamento dell'asse della gx e una più debole a NE (ossia a perpendicolo col suddetto asse maggiore) — 270x.
NGC 4408	gx	12h26m17s	+27°52.3'	q 108	Com	16"	ottima / discreto	è una piccola galassia estesa non più di una 30-ina di secondi, relativamente facile da vedere e di luminosità pressoché uniforme, situata in un piccolo campo depleto; è di luminosità leggermente irregolare — 270x.
NGC 4410A	gx	12h26m30s	+09°01.1'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva; si separano facilmente a 450x, sono entrambe rotonde con Ø di una 30-ina di secondi; in visione distolta sembrano avviluppate in un alone comune; la 1a presenta un nucleo abbastanza brillante, mentre quello della 2a è poco più debole e stellare.
NGC 4410B	gx	12h26m28s	+09°01.3'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	v. NGC 4410B
NGC 4411A	gx	12h26m29s	+08°52.3'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto stemperata sul fondo cielo e con una stellina appena percettibile proprio al centro; in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di 1' — 450x.
NGC 4411B	gx	12h26m47s	+08°53.0'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	facile da vedere, ma molto diffusa e assai poco contrastata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di oltre 1'; c'è una stellina quasi a ridosso NW; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 4412	gx	12h26m36s	+03°58.0'	q 238	Vir	16"	buona / ottimo	rotonda con Ø > 1' e di luminosità pressoché uniforme (somiglia a NGC 4234, ma è di aspetto meno regolare) — 380x.
NGC 4413	gx	12h26m32s	+12°36.6'	q 193	Vir	16"	buona / ottimo	è di aspetto un po' più confuso rispetto alle altre della catena, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; situata a S di una coppia di stelline distanti 1.5 e orientate da NNW a SSE — 270x.
NGC 4414	gx	12h26m27s	+31°13.4'	q 108	Com	10"	ottima / buono	relativamente compatta, ovale, orientata da NW a SE, di dimensioni 3'×1.5' e con nucleo molto brillante.
NGC 4415	gx	12h26m41s	+08°26.2'	q 193	Vir	24"	buona / ottimo	rotonda con Ø di 1', molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a 2.5' NNW — 380x.
NGC 4416	gx	12h26m47s	+07°55.1'	q 193	Vir	28"	ottima / m. buono	rotonda con basso gradiente di luce e di luminosità uniforme, con Ø di oltre 1'; situata tra 2 stelline orientate da NW a SE; poco disturbata dalla SAO 119397 di 8ª grandezza situata 3.5' a WSW — 495x.
NGC 4417	gx	12h26m50s	+09°35.0'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	è un bel fuso orientata da NE a SW, di dimensioni 2'×30", con bulge diffuso e contrastato e nucleo stellare — 270x.
NGC 4418	gx	12h26m55s	−00°52.6'	q 238	Vir	24"	buona / m. buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30", diffusa e con bulge centrale poco contrastato; c'è una stellina a ridosso verso SSW — 450x.
NGC 4419	gx	12h26m56s	+15°02.9'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	bella, di aspetto molto regolare, allungata da NW a SE, di dimensioni 2.5'×1', con bulge diffuso, evidente e nucleo stellare — 380x.
NGC 4420	gx	12h26m58s	+02°29.7'	q 238	Vir	16"	buona / ottimo	relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; appare leggermente screziata a 380x.
NGC 4421	gx	12h27m03s	+15°27.7'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 90"×45", diffusa e con bulge evidente; c'è una stellina appena percettibile a N, situata all'interno dell'alone — 380x.
NGC 4422	gx	12h27m12s	−05°49.8'	q 283	Vir	16"	buona / ottimo	relativamente facile, compatta, rotonda con Ø poco superiore a 30" e condensazione centrale abbastanza evidente; si apprezza bene anche a 380x.
NGC 4423	gx	12h27m09s	+05°52.8'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	è una debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme, orientata all'incirca da N a S per un paio di primi — 188x.
NGC 4424	gx	12h27m11s	+09°25.2'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni di 2'×1' e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 4425	gx	12h27m13s	+12°44.1'	q 193	Vir	16"	buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30", con tenue bulge diffuso e poco contrastato — 270x.
NGC 4428	gx	12h27m28s	−08°10.0'	q 283	Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30" e con tenue bulge poco contrastato; qualche lieve screziatura appare a momenti nella zona più esterna (già debolmente osservabile nel 10") — 450x.
NGC 4429	gx	12h27m26s	+11°06.5'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	estesa e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 4'×1.5', con bulge evidente di dimensioni 45"×30" e nucleo stellare; c'è una stella brillante subito a N — 270x.
NGC 4430	gx	12h27m23s	+06°15.8'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	molto diffusa e di luminosità uniforme, estesa un paio di primi scarsi, ma di forma alquanto irregolare — 188x.
NGC 4431	gx	12h27m27s	+12°17.4'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a NGC 4436 ed NGC 4440 — debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso E — 270x.
NGC 4432	gx	12h27m33s	+06°14.0'	q 193	Vir	16"	buona / discreto	è un'elusiva e piccola galassia che si riesce a cogliere solo a momenti in visione distolta; ogni tanto salta fuori un nucleo puntiforme, ma forse trattasi di una stellina apparente sovrapposta alla galassia — 188x.
NGC 4433	gx	12h27m39s	−08°16.7'	q 283	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30" e con bulge poco contrastato sul disco; a 450x appare a tratti finemente screziata; c'è una stellina a ridosso N e un'altra di luminosità simile subito a SW (nel 10" appariva poco più evidente della 4428 situata a 7' NNW).
NGC 4434	gx	12h27m37s	+08°09.2'	q 193	Vir	28"	ottima / m. buono	brillante, è una tipica gx a "isofote": presenta un nucleo stellare evidente, un piccolo bulge rotondo con Ø di una 20-ina di secondi circonfuso da un alone con Ø di 1' scarso — 495x.
NGC 4435	gx	12h27m40s	+13°04.7'	q 193	Vir	16"	buona / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 2'×1', con tenue bulge diffuso e poco contrastato — 270x.
NGC 4436	gx	12h27m41s	+12°19.0'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso verso NW — 270x.
NGC 4438	gx	12h27m46s	+13°00.5'	q 193	Vir	16"	buona / ottimo	molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 5'×2', molto diffusa alle 2 estremità; presenta un bulge di dimensioni 60"×45", decentrato verso SE (rispetto all'asse della gx) e un tenue nucleo stellare — 270x.
NGC 4440	gx	12h27m54s	+12°17.6'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	è la più orientale del terzetto cui appartengono anche la NGC 4431 e la NGC 4436; allungata da N a S, diffusa, di dimensioni 1.5'×1' e con nucleo stellare — 270x.
NGC 4441	gx	12h27m20s	+64°48.1'	q 25	Dra	16"	ottima / buono	è un ovale di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W e di dimensioni 2'×1.5' — 270x.
NGC 4442	gx	12h28m03s	+09°48.3'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	brillante, molto allungata da E a W con dimensioni 3'×1' e un bulge evidente che si addensa in un nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso E e un'altra più debole a SSW — 270x.
NGC 4445	gx	12h28m15s	+09°26.2'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	molto allungata da E a W per un paio di primi, con una zona centrale appena più brillante e di luminosità un poco irregolare — 188x.
NGC 4446	gx	12h28m07s	+13°54.7'	q 193	Com	16"	discreta / scarso	molto debole, ma osservabile abbastanza facilmente in visione distolta a 188x, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale visibile a tratti.
NGC 4447	gx	12h28m12s	+13°54.0'	q 193	Com	16"	discreta / scarso	è situata 1.5' a SE di NGC 4446, ma più difficile da osservare; si nota una stellina molto debole che a tratti, in visione indiretta, appare circonfusa da un tenuissimo alone, forse rotondo ed esteso meno di 30"; non potendo tuttavia aumentare gli ingrandimenti a causa del cattivo seeing risulta difficile stabilirne a prima vista la vera natura — 188x.
NGC 4448	gx	12h28m16s	+28°37.2'	q 108	Com	16"	m. buona / m. buono	bella, molto allungata da E a W, di dimensioni 3'x1' e diffusa alle estremità; presenta un bulge evidente, di dimensioni 30"×20" e un nucleo stellare — 380x.
NGC 4449	gx	12h28m11s	+44°05.7'	q 75	CVn	16"	ottima / ottimo	di aspetto molto irregolare e screziata a 380x; la componente principale che appare in visione diretta è orientata da NE a SW con dimensioni 2'×1'; in visione distolta aumenta sensibilmente di dimensioni e spicca una zona che si protende verso N e che termina con un nodulo (non è cioè proprio puntiforme); un altro nodulo appena percettibile si trova a ridosso NE; una stellina evidente si trova invece al margine SE.
NGC 4450	gx	12h28m30s	+17°05.1'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	poco allungata da N a S con dimensioni 3'×2', molto diffusa e con piccolo bulge luminoso ben contrastato e di aspetto quasi stellare; più interessante a 270x; c'è una stella brillante 4' a SW.
NGC 4451	gx	12h28m41s	+09°15.5'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	relativamente compatta, con condensazione centrale evidente, allungata da N a S e dimensioni 45"×30" — 188x.
NGC 4452	gx	12h28m44s	+11°45.5'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	è una bella edge-on orientata da NE a SW ed estesa un paio di primi, con tenue bulge diffuso abbastanza evidente (nel 10" a 178x appariva delle stesse dimensioni, ma di luminosità uniforme) — 570x.
NGC 4454	gx	12h28m51s	−01°56.3'	q 238	Vir	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e con piccolo bulge abbastanza contrastato, rotonda con Ø di 80"; c'è una debole stellina al bordo meridionale; l'alone appare a tratti debolmente screziato a 450x.
NGC 4455	gx	12h28m44s	+22°49.3'	q 148	Com	24"	ottima / m. buono	bella, orientata da N a S, estesa un paio di primi e spessa < 40", con gradiente di luce molto basso; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S (era debolissima nel 10" a 118x in condizioni di cielo simili; a 178x pareva addirittura estinguersi sul fondo cielo) — 450x.
NGC 4456	gx	12h27m53s	−30°05.9'	q 369	Hya	16"	buona / buono	debolissima ed evanescente chiazza di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni grosso modo di 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 380x.
NGC 4457	gx	12h28m59s	+03°34.3'	q 193	Vir	10"	ottima / discreto	relativamente brillante, rotondeggiante con Ø di un paio di primi e con evidente condensazione centrale.
NGC 4458	gx	12h28m58s	+13°14.5'	q 193	Vir	16"	buona / ottimo	rotonda, di 1' circa di Ø, molto diffusa e con basso gradiente di luce e nucleo stellare; c'è una stellina brillante un paio di primi a ENE — 270x.
NGC 4459	gx	12h29m00s	+13°58.8'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	bella, rotonda, di un paio di primi di Ø, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare brillante; c'è una stella luminosa quasi a ridosso verso SE — 270x.
NGC 4460	gx	12h28m46s	+44°51.8'	q 75	CVn	16"	ottima / ottimo	è un bel fuso di aspetto molto regolare, orientata da NE a SW e di dimensioni 4'×1'; presenta un bulge diffuso e poco contrastato sul disco — 380x.
NGC 4461	gx	12h29m03s	+13°11.0'	q 193	Vir	16"	buona / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 2'×1', diffusa e con nucleo stellare brillante — 270x.
NGC 4462	gx	12h29m21s	−23°10.0'	q 328	Crv	16"	m. buona / m. buono	presenta un bulge evidente, nucleo stellare e un alone di dimensioni 3'×1', diffuso e orientata da NW a SE — 270x.
NGC 4464	gx	12h29m21s	+08°09.4'	q 193	Vir	10"	m. buona / buono	molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 30" o 40".
NGC 4466	gx	12h29m31s	+07°41.8'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	debolissima e di luminosità uniforme, appare in in visione distolta, a tratti allungata da E a W per 1' scarso — 188x.
NGC 4467	gx	12h29m30s	+07°59.6'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	(è una delle satelliti di M49) molto piccola e di aspetto quasi stellare, situata quasi a ridosso verso E di una stellina abbastanza brillante — 188x.
NGC 4468	gx	12h29m31s	+14°02.9'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	debole, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", diffusa, con basso gradiente di luce e nucleo stellare molto tenue — 270x.
NGC 4469	gx	12h29m28s	+08°45.0'	q 193	Vir	16"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 3'×45", con bulge diffuso poco contrastato sul disco; c'è una stellina molto debole subito a SE — 270x.
NGC 4470	gx	12h29m38s	+07°49.4'	q 193	Vir	24"	ottima / buono	è un bell'ovale finemente screziato se osservato a 450x, poco diffuso, orientata da N a S con dimensioni 80"×50" e con basso gradiente di luce (era già osservabile nel 10").
NGC 4473	gx	12h29m49s	+13°25.8'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	è allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1.5'; presenta un bulge piccolo e marcato, di dimensioni 30"×15" all'interno del quale appare un nucleo stellare — 380x.
NGC 4474	gx	12h29m54s	+14°04.1'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	più brillante ed estesa di NGC 4473, allungata da E a W, di dimensioni 80"×40", diffusa e con evidente nucleo stellare — 270x.
NGC 4475	gx	12h29m48s	+27°14.6'	q 148	Com	16"	ottima / discreto	è un debole ovale di luminosità pressoché uniforme, molto sfumato ai bordi; è allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 4476	gx	12h29m59s	+12°20.9'	q 193	Vir	24"	m. buona / discreto	(la compagna più esterna di M87) relativamente compatta, brillante, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×45" (ben visibile anche nel 10") — 400x.
NGC 4477	gx	12h30m02s	+13°38.2'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	approssim. rotonda, diffusa, con Ø di un paio di primi e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 4478	gx	12h30m17s	+12°19.7'	q 193	Vir	24"	m. buona / discreto	(una delle compagne di M87) presenta una zona centrale brillante estesa una 50-ina di secondi e un piccolo alone (quasi come una sorta di riverberazione luminosa) poco più estesa di 1'; c'è una stellina molto debole al bordo (N la gx è ben visibile anche nel 10") — 400x.
NGC 4479	gx	12h30m18s	+13°34.6'	q 193	Vir	16"	buona / ottimo	debole, allungata da N a S con dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 4480	gx	12h30m27s	+04°14.9'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	è un ovale poco diffuso e di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina a un paio di primi verso NW — 188x.
NGC 4481	gx	12h29m49s	+64°02.0'	q 25	Dra	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a E — 270x.
NGC 4482	gx	12h30m10s	+10°46.8'	q 193	Vir	16"	buona / mediocre	debole chiazza di luminosità uniforme, facilmente visibile in visione diretta, orientata da NW a SE, con dimensioni di 60"×45" — 270x.
NGC 4483	gx	12h30m41s	+09°00.9'	q 193	Vir	24"	m. buona / ottimo	brillante, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni di 80"×40", con bulge luminoso e a tratti screziato, all'interno del quale si nota un evidente nucleo stellare — 450x.
NGC 4484	gx	12h28m53s	−11°39.1'	q 283	Vir	16"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di aspetto un po' confuso, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 4485	gx	12h30m31s	+41°42.0'	q 75	CVn	16"	ottima / ottimo	forma una celebre coppia assieme a NGC 4490 — appare diffuse e finemente screziata a 380x, poco allungata da N a S, con dimensioni 80"×60"; c'è una coppia serrata di stelline appena percettibili a ridosso SSW.
NGC 4486A	gx	12h30m58s	+12°16.2'	q 193	Vir	16"	buona / discreto	gx satellite di M87 — a 188x appare in visione distolta come un alone circolare molto tenue e con Ø di 45" attorno a una stellina brillante che sembra perfettamente sovrapposta alla galassia.
NGC 4486B	gx	12h30m32s	+12°29.4'	q 193	Vir	16"	buona / discreto	gx satellite di M87 — facile e compatta, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 188x.
NGC 4487	gx	12h31m04s	−08°03.2'	q 283	Vir	10"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, con condensazione centrale evidente, poco allungata da E a W con di dimensioni 3'×2'; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo settentrionale — 178x.
NGC 4488	gx	12h30m51s	+08°21.6'	q 193	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'×40" e molto diffusa alle estremità dell'orientamento; presenta un bulge evidente ma poco contrastato di 30"× 15", all'interno del quale c'è un nucleo stellare — 450x.
NGC 4489	gx	12h30m52s	+16°45.5'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	rotonda, diffusa, di 1' di Ø e con nucleo stellare — 270x.
NGC 4490	gx	12h30m36s	+41°38.5'	q 75	CVn	16"	ottima / ottimo	forma una celebre coppia assieme a NGC 4485 — di aspetto un po' irregolare, molto screziata a 380x, allungata da WNW a ESE, di dimensioni grosso modo 5'×2' e con bulge diffuso orientato da NW a SE; c'è una debole stellina al bordo ESE; un'altra appena percettibile è situata a quello opposto; in visione distolta la gx tende a incurvarsi verso NW; la coppia appare tuttavia meglio contrastata a 270x.
NGC 4491	gx	12h30m57s	+11°29.0'	q 193	Vir	16"	m. buona / buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×40", poco diffusa e con bulge poco più brillante del disco — 188x.
NGC 4492	gx	12h31m00s	+08°04.6'	q 193	Vir	16"	buona / discreto	rotonda con Ø di 1.5', molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; presenta un piccolo nucleo luminoso e contrastato; c'è una stellina brillante a ridosso verso N e un'altra di luminosità simile a 1.5' SE — 188x.
NGC 4493	gx	12h31m08s	+00°36.8'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	molto debole, diffusa e poco più brillante verso l'interno; a 188x appare rotonda con Ø di 45"; c'è la SAO 119442 di 9ª grandezza a 4.5' NW.
NGC 4494	gx	12h31m24s	+25°46.5'	q 148	Com	16"	m. buona / m. buono	molto brillante, diffusa, rotonda con alto gradiente di luce e Ø > 2'; presenta un bulge evidente di 45" di Ø e un nucleo stellare; dà l'impressione di essere riprodotta a isofote; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NW — 380x.
NGC 4495	gx	12h31m23s	+29°08.2'	q 108	Com	16"	ottima / discreto	relativamente facile, allungata da NW a SE, con basso gradiente di luce e dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 4496A	gx	12h31m39s	+03°56.4'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	estesa per oltre 1', approssim. circolare, con Ø < 2' e un piccolo nucleo abbastanza marcato; è di luminosità piuttosto irregolare, forse imputabile alla presenza di bracci spirale che ne rendono disomogenea la luminanza superficiale — 188x.
NGC 4496B	gx	12h31m41s	+03°55.6'	q 238	Vir	16"	buona / discreto	situata a ridosso SE di NGC 4496A, è molto piccola, estesa forse una 20-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una debole stellina a 1' verso S — 188x.
NGC 4497	gx	12h31m32s	+11°37.5'	q 193	Vir	24"	m. buona / ottimo	bella, diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 90"×45" e con gradiente di luce molto basso; presenta un nucleo stellare molto tenue — 450x.
NGC 4498	gx	12h31m40s	+16°51.2'	q 193	Com	16"	buona / ottimo	piuttosto debole, allungata da NW a SE con dimensioni 90"×45" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 4500	gx	12h31m22s	+57°57.9'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	bella, relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con bulge molto brillante; c'è una stellina luminosa a meno di 1' verso E — 188x.
NGC 4502	gx	12h32m03s	+16°41.3'	q 194	Com	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
NGC 4503	gx	12h32m06s	+11°10.6'	q 194	Vir	24"	m. buona / buono	molto diffusa, con bulge brillante, screziato e nucleo stellare poco contrastato, molto allungata da N a S con dimensioni 3'×1' (era ben visibile anche nel 10") — 450x.
NGC 4504	gx	12h32m17s	−07°33.8'	q 284	Vir	10"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da NW a SE con dimensioni di 3'×2'; più interessante a 118x.
NGC 4506	gx	12h32m10s	+13°25.2'	q 193	Com	16"	m. buona / buono	debole e diffusa, pressoché circolare, con Ø di 1' scarso e poco più brillante verso l'interno; è situata un paio di primi E di una stellina brillante — 188x.
NGC 4509	gx	12h33m07s	+32°05.6'	q 108	CVn	16"	ottima / discreto	debole, rotonda, con Ø di ~ 30" e basso gradiente di luce; è situata ~ 5' NE di una stellina doppia brillante con le componenti serrate — 270x.
NGC 4510	gx	12h31m47s	+64°14.0'	q 25	Dra	16"	non registrati	molto compatta, brillante, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi, ma forse trattasi solo del bulge (l'alone, se presente, si perde nella foschia) — 188x.
NGC 4511	gx	12h32m08s	+56°28.3'	q 48	UMa	10"	ottima / buono	debolissima, quasi elusiva, visibile solo in visione distolta a 118x (a 178x si stempera troppo sul fondo cielo), estesa non più di 30"; c'è una debole stellina a poco più di 2' verso S.
NGC 4512	gx	12h32m33s	+63°52.7'	q 25	Dra	16"	ottima / buono	molto debole, con gradiente di luce molto basso di luce, visibile facilmente solo in visione distolta; è approssim. circolare con Ø di un paio di primi — 270x.
NGC 4513	gx	12h32m02s	+66°20.0'	q 25	Dra	16"	buona / buono	molto diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 60"×40" e con bulge abbastanza brillante (il primo particolare che salta all'occhio); l'alone tende effettivamente a stemperarsi sul fondo cielo a causa, probabilmente, dell'umidità che in questo momento sta sfiorando il 100% — 188x.
NGC 4514	gx	12h32m43s	+29°42.8'	q 108	Com	16"	ottima / discreto	è una galassia a bassissima luminanza superficiale, ma visibile facilmente anche in visione diretta; è approssim. circolare con Ø inferiore a 1' — 270x.
NGC 4515	gx	12h33m05s	+16°16.3'	q 194	Com	16"	buona / mediocre	rotonda, relativamente facile, abbastanza netta ai bordi, con Ø di 1' e poco più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 4516	gx	12h33m08s	+14°34.5'	q 194	Com	16"	buona / mediocre	di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; ricorda vagamente IC 810 — 270x.
NGC 4517	gx	12h32m44s	+00°07.0'	q 194	Vir	10"	discreta / buono	debole, molto estesa, notevolmente allungata da E a W per una decina di primi, ma di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare chiaramente come una edge-on; c'è una stellina brillante al margine settentrionale.
NGC 4517A	gx	12h32m28s	+00°23.4'	q 239	Vir	16"	buona / mediocre	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, estesa forse un paio di primi, ma di forma indistinta; appare a momenti in visione distolta al vertice SE di un piccolo triangolo formato con due stelle brillanti distanti 3' e orientate da NE a SW; meglio comunque scalare a 100x.
NGC 4518	gx	12h33m12s	+07°51.1'	q 194	Vir	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40", gradatamente più brillante verso l'interno e con piccolo bulge abbastanza contrastato — 450x.
NGC 4519	gx	12h33m30s	+08°39.3'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, piuttosto debole, meglio contrastata scalando a 340x; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 2'×1.5' (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10" a 118x).
NGC 4519A	gx	12h33m25s	+08°41.4'	q 193	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a ridosso SW; situata un paio di primi a NW di NGC 4519 osservata in altra data — 450x.
NGC 4520	gx	12h33m50s	−07°22.5'	q 284	Vir	16"	buona / ottimo	è una piccola macchiolina rotonda abbastanza compatta con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso E e un'altra poco più brillante a 1.5' verso S — 270x e 380x.

NGC 4521	gx	12h32m48s	+63°56.4'	q 25	Dra	16"	ottima / buono	piccola, orientata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso SE; la galassia è situata 4' NNE della 4512 — 270x.
NGC 4522	gx	12h33m40s	+09°10.5'	q 194	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da NNE a SSW, diffusa, di dimensioni 3'×1', con tenue bulge esteso poco contrastato; più interessante e poco meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 4523	gx	12h33m48s	+15°10.1'	q 194	Com	16"	m. buona / buono	appare abbastanza facilmente in visione distolta a 188x come un baffo di luce di luminosità uniforme che si diparte da una stellina brillante situata al bordo NE; c'è una coppia di stelline molto deboli a ridosso della parte opposta con componenti separate da una 20-ina di secondi.
NGC 4524	gx	12h33m54s	−12°01.7'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi o 45"; è situata in un campo ove sono presenti stelline molto deboli; ce n'è una a 1.5' SSW — 380x.
NGC 4525	gx	12h33m51s	+30°16.7'	q 108	Com	16"	buona / discreto	debole, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso di luce, orientata da NE a SW con dimensioni 2'×1'; situata tra una debole stellina a NE e un'altra poco più brillante un paio di primi a SE con le quali la gx forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele — 188x.
NGC 4526	gx	12h34m03s	+07°42.0'	q 194	Vir	16"	m. buona / m. buono	è un magnifico fuso regolare con bulge brillante e molto contrastato; la gx ha dimensioni 6'×1.5' ed è orientata da WNW a ESE; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso S; è situata all'interno di una losanga di stelle brillanti e col cielo terso si riesce a intravvedere in un 12x50 — 270x.
NGC 4527	gx	12h34m09s	+02°39.2'	q 239	Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 6'×1.5'; presenta un bulge di 80"×30" contrastato sul disco con nucleo stellare evidente; più interessante scalando a 340x.
NGC 4528	gx	12h34m06s	+11°19.3'	q 194	Vir	16"	discreta / scarso	poco diffusa, brillante, orientata da N a S con dimensioni 45"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 4529	gx	12h31m43s	+20°28.9'	q 148	Com	16"	buona / ottimo	gx molto piccola ed elusiva; appare solo a tratti in visione distolta in una zona depleta — 270x.
NGC 4531	gx	12h34m16s	+13°04.5'	q 194	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa, con basso gradiente di luce, forse un poco allungata da N a S con dimensioni 2'×1.5' — 270x.
NGC 4532	gx	12h34m19s	+06°28.2'	q 194	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto bella, di forma a prima vista rettangolare, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 2'×40"; è di luminosità pressoché uniforme e appare finemente screziata a 450x; c'è una stellina a ridosso E.
NGC 4533	gx	12h34m22s	+02°19.5'	q 239	Vir	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce, di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S ed estesa 1.5'; solo a momenti appare un tenue rigonfiamento centrale che non è comunque più brillante del resto — 450x.
NGC 4534	gx	12h34m06s	+35°31.1'	q 108	CVn	16"	buona / discreto	debole, dai bordi molto diffusi, forse poco allungata da NW a SE, con dimensioni che in visione distolta sono di 1.5'×1'; c'è una stellina debolissima visibile a tratti un paio di primi verso S o SE (è difficile stabilirlo); è situata in mezzo a 2 stelline brillanti distanti ~ 10' e orientate da NW a SE — 188x.
NGC 4535	gx	12h34m20s	+08°11.9'	q 194	Vir	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 5'×4' e con piccolo bulge evidente, ma poco contrastato; il disco appare con lievi discrepanze di luce (quasi si trattasse di un sistema di bracci irrisolto); diverse stelline saltano all'occhio: un paio si trovano rispettivamente a N e a SW del nucleo; una terza è situata all'estremità S, mentre un'altra, esterna all'alone, si trova subito a SW; un'ultima stellina salta fuori a E dell'alone; in visione distolta appare anche un debolissimo nodulo a ~ 1' SE del nucleo; la galassia è meglio evidente a 270x.
NGC 4536	gx	12h34m27s	+02°11.3'	q 239	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto bella, orientata da NW a SE con dimensioni 6'×2', ma di aspetto alquanto irregolare; presenta un piccolo bulge molto brillante con all'interno un nucleo stellare; due bracci leggermente arcuati si dipartono a NW e a SE: quest'ultimo è poco più evidente e spesso; la visione è più interessante scalando a 340x.
NGC 4538	gx	12h34m41s	+03°19.4'	q 239	Vir	16"	mediocre / scarso	debolissima, ma relativamente compatta e molto piccola; a momenti appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 188x.
NGC 4539	gx	12h34m35s	+18°12.1'	q 149	Com	24"	ottima / m. buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×45", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una coppia di stelline subito a SE (nel 10" di dimensioni un po' esagerate di 3'×1' e con tenue condensazione centrale osservabile solo a momenti a 118x) — 340x.
NGC 4540	gx	12h34m51s	+15°33.1'	q 194	Com	24"	m. buona / ottimo	è di forma e luminosità un poco irregolari, debolmente screziata e con basso gradiente di luce, grosso modo rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina al bordo W — 450x.
NGC 4541	gx	12h35m11s	−00°13.3'	q 239	Vir	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 80"×40"; debolmente screziata a 450x.
NGC 4542	gx	12h34m49s	+50°48.3'	q 48	CVn	16"	discreta / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta, a 188x, appare orientata da N a S con dimensioni di ~ 60"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno.
NGC 4543	gx	12h35m20s	+06°06.9'	q 194	Vir	16"	buona / mediocre	compatta, rotonda, relativamente brillante, con Ø inferiore a 1' — 270x.
NGC 4544	gx	12h35m36s	+03°02.2'	q 239	Vir	16"	mediocre / scarso	molto debole, di aspetto stranamente screziato a 188x (malgrado il seeing!), molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina a 1.5' verso E.
NGC 4545	gx	12h34m34s	+63°31.5'	q 25	Dra	16"	ottima / buono	ovale di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S, di dimensioni ~ 2'×1'; c'è una stellina brillante a ridosso verso NE — 270x.
NGC 4546	gx	12h35m29s	−03°47.5'	q 239	Vir	24"	discreta / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 2'×45" e molto diffusa alle estremità E e W; presenta un piccolo bulge molto brillante e un nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile al bordo E (già facilmente visibile nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 4547	gx	12h34m52s	+58°55.0'	q 48	UMa	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con MCG+10-18-70, molto piccola, rotonda con Ø di 10"-15" e di luminosità uniforme, situata a ridosso verso SE — 450x.
NGC 4549	gx	12h35m21s	+58°57.0'	q 48	UMa	24"	buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15".
NGC 4550	gx	12h35m31s	+12°13.2'	q 194	Vir	10"	buona / buono	assieme a NGC 4551 forma una coppia di gx facili, distanti ~ 3' in direzione NNE-SSW; la 1ª è molto allungata da N a S, con dimensioni 2'×30'' e con alto gradiente di luce; la 2ª è invece orientata da E a W, con dimensioni 60"×40" e con condensazione centrale meno marcata; nell'insieme appaiono poco meglio contrastate a 118x.
NGC 4551	gx	12h35m38s	+12°15.8'	q 194	Vir	10"	buona / buono	v. NGC 4550
NGC 4555	gx	12h35m41s	+26°31.4'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	brillante, rotonda, poco più brillante all'interno e bordi diffusi; presenta un Ø di ~ 1' e un nucleo piccolo, brillante di aspetto stellare — 270x.
NGC 4556	gx	12h35m46s	+26°54.5'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	fa parte, assieme a NGC 4558, 4563 e IC 3561 di un piccolo gruppo — è un ovale allungato da E a W , di dimensioni 60"×45", appena più brillante all'interno; c'è una stellina situata a una 30-ina di secondi verso S — 270x.
NGC 4558	gx	12h35m53s	+26°59.5'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	molto debole, visibile solo a momenti, allungata da E a W per 20" al massimo — 270x.
NGC 4559	gx	12h35m58s	+27°57.6'	q 149	Com	24"	ottima / m. buono	molto bella, orientata da NW a SE, di dimensioni 4.5'×2', ma con gradiente di luce piuttosto basso, la zona interna più luminosa è poco decentrata verso SE dove tende a "sfilacciarsi"; tre stelline abbastanza brillanti ne lambiscono il margine SE; più interessante scalando a 340x (era facilmente visibile nel 10" a 126x).
NGC 4561	gx	12h36m08s	+19°19.3'	q 179	Com	24"	ottima / m. buono	presenta una sorta di "barra" interna di luminosità un poco irregolare, orientata da E a W circondata da un alone molto diffuso, grosso modo circolare con Ø < 1'; c'è una stellina al bordo orientale; un'altra debole si trova subito a N (in condizioni di cielo simili, nel 10" a 118x appariva debole, rotonda con Ø di ~ 1' e di luminosità pressoché uniforme) — 450x.
NGC 4562	gx	12h35m35s	+25°51.0'	q 149	Com	16"	buona / buono	molto debole, orientata da NE a SW, con dimensioni di 90"×30"; a tratti appare un tenuissimo bulge diffuso, appena più contrastato del disco — 270x.
NGC 4563	gx	12h36m13s	+26°56.5'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	fa parte del gruppo di NGC 4556 — piccola, compatta, relativamente brillante, poco allungata da E a W e dimensioni 30"×20" — 270x.
NGC 4564	gx	12h36m27s	+11°26.3'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×40", poco diffusa e con piccolo nucleo abbastanza brillante; situata in mezzo a 2 stelline luminose orientate da NW a SE e distanti 6' o 7' (già facilmente osservabile nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 4565	gx	12h36m21s	+25°59.3'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	attraversa quasi completamente tutto il campo dell'oculare a 270x (18'); presenta un bulge evidente ed esteso con nucleo di aspetto quasi stellare; la banda di polveri è netta su una lunghezza di 4' o 5'; una zona "filiforme" più debole corre parallelamente alla banda dal lato NE della gx; sempre a NE c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' di distanza.
NGC 4566	gx	12h36m00s	+54°13.3'	q 48	UMa	16"	buona / buono	debole e molto diffusa, poco allungata da E a W, con dimensioni 60"×45" e con condensazione centrale di aspetto quasi stellare; meglio contrastata a 270x.
NGC 4567	gx	12h36m33s	+11°15.5'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	assieme a NGC 4568 forma una coppia interagente con componenti facilmente separabili a 340x; la 1ª è poco più diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 2'×1' e con piccolo bulge abbastanza contrastato; la 2ª è più estesa, orientata da NE a SW, di dimensioni 2.5'×1', ma con piccolo nucleo meno contrastato di quello della precedente; c'è una coppia di stelle brillanti a E (nel 10", a 118x, apparivano a prima vista come un unico oggetto a forma di cuore attraversato da una tenue banda scura).
NGC 4568	gx	12h36m34s	+11°14.4'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	v. NGC 4567
NGC 4570	gx	12h36m53s	+07°14.9'	q 194	Vir	16"	m. buona / m. buono	molto bella e contrastata sul fondo cielo, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 3'×30" e con bulge brillante — 380x.
NGC 4571	gx	12h36m56s	+14°13.0'	q 194	Com	24"	discreta / ottimo	estesa chiazza lattiginosa molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 3' scarsi e di luminosità uniforme, disturbata dalla luce della SAO 100177 di 8ª grandezza situata quasi a ridosso verso NE; meglio evidente a 340x; c'è una stellina molto debole al margine occidentale (già osservabile, seppure molto debolmente, nel 10" a 118x).
NGC 4572	gx	12h35m46s	+74°14.7'	q 9	Dra	20"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"× 15"; appare tuttavia rettilinea (e non leggermente sinuosa come è in realtà) — 360x.
NGC 4576	gx	12h37m34s	+04°22.0'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" (già visibile, seppur al limite, nel 10") — 450x.
NGC 4578	gx	12h37m30s	+09°33.4'	q 194	Vir	10"	buona / buono	molto diffusa, a 178x e in visione distolta appare poco allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 1.5'×1' e con marcata condensazione centrale.
NGC 4580	gx	12h37m48s	+05°22.1'	q 194	Vir	10"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 2'×1.5' — 178x.
NGC 4581	gx	12h38m05s	+01°20.7'	q 239	Vir	24"	ottima / ottimo	bella, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 80"×50" e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
NGC 4583	gx	12h38m04s	+33°27.5'	q 108	CVn	16"	ottima / discreto	debole, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, abbastanza compatta e di luminosità poco irregolare — 270x.
NGC 4584	gx	12h38m18s	+13°06.6'	q 194	Vir	16"	discreta / scarso	debole e molto diffusa, appena più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 188x.
NGC 4585	gx	12h38m13s	+28°56.2'	q 108	Com	16"	ottima / discreto	molto debole, di luminosità uniforme, assai stemperata sul fondo cielo, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 4586	gx	12h38m28s	+04°19.1'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	bella, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 3'×45", con bulge diffuso abbastanza contrastato e un piccolo nucleo quasi stellare; c'è una stellina al bordo occidentale; poco meglio contrastata scalando a 340x (già osservabile nel 10").
NGC 4587	gx	12h38m35s	+02°39.4'	q 239	Vir	16"	mediocre / scarso	diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con debole bulge ben evidente; si trova a SE di una stella doppia larga con separazione di ~ 30" e con componenti abbastanza brillanti — 188x.
NGC 4588	gx	12h38m45s	+06°46.1'	q 194	Vir	16"	buona / mediocre	molto debole e molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20"; stellina a ridosso verso S — 270x.
NGC 4589	gx	12h37m26s	+74°11.5'	q 9	Dra	20"	m. buona / ottimo	brillante, molto diffusa, rotonda con Ø di 1.5' e un piccolo bulge di una 20-ina di secondi di Ø (era un oggetto facile nel 10" a 188x, pur avendone sovrastimato il Ø) — 360x.
NGC 4591	gx	12h39m12s	+06°00.8'	q 194	Vir	16"	buona / mediocre	estesa 80"×40", orientata da ~ da NE a SW, con bulge evidente, ma molto diffusa ai 2 lati del disco; c'è una stellina praticamente a ridosso del bordo SW — 270x.
NGC 4592	gx	12h39m19s	−00°31.8'	q 239	Vir	24"	buona / m. buono	estesa, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, pur presentando nel complesso un gradiente di luce piuttosto basso; appare molto allungata da E a W con dimensioni 4'×1' (già debolmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 4593	gx	12h39m40s	−05°20.6'	q 284	Vir	10"	buona / buono	relativamente brillante, allungata da NE a SW, molto diffusa, di dimensioni 2'×1' e con condensazione centrale molto marcata — 178x.
NGC 4594	gx	12h40m00s	−11°37.6'	q 284	Vir	24"	m. buona / m. buono	**Sombrero (M104)** — è una gx stupenda osservata a 450x, in visione distolta appare estesa circa 8' in direzione E-W; si nota una sottile banda scura molto netta e a S di questa una debole banda luminosa spessa una 30-ina di secondi che corre parallelamente per 5' e si sfuma abbastanza rapidamente nelle direzioni E, W e S; al centro della gx c'è un piccolo bulge brillante di dimensioni grosso modo 45"×30".
NGC 4595	gx	12h39m52s	+15°18.0'	q 194	Com	16"	discreta / scarso	debole e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 4596	gx	12h39m56s	+10°10.5'	q 194	Vir	24"	m. buona / buono	si nota una zona centrale brillante, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 2'×1' immersa in una chiazza lattescente molto tenue, approssim. rotonda con Ø di ~ 3'; presenta un piccolo bulge rotondo estesa una 30-ina di secondi e un nucleo marcato di aspetto stellare; è situata tra 2 stelline: una a SSW e un'altra poco più distante e appena percettibile a dalla parte opposta (sono praticamente poste a perpendicolo con l'asse della barra); l'alone appare meglio evidente scalando a 340x (già osservata col 10").
NGC 4597	gx	12h40m13s	−05°48.0'	q 239	Vir	24"	m. buona / buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 4'×1.5'; è come delimitata da una stellina al bordo NE e da una coppia di stelline molto deboli all'estremità opposta; appare comunque meglio definita scalando a 280x (la gx appariva molto debole nel 10" a 178x).
NGC 4598	gx	12h40m12s	+08°23.0'	q 194	Vir	16"	buona / mediocre	diffusa, approssim. circolare con Ø di 1' , ma tratti appare, in visione distolta, una zona interna più brillante, leggermente ovale e orientata da N a S; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 270x.
NGC 4599	gx	12h40m27s	+01°11.8'	q 239	Vir	16"	mediocre / scarso	molto allungata da NE a SE, di dimensioni 90"×30", diffusa e con un bulge poco più brillante disco — 188x.
NGC 4600	gx	12h40m23s	+03°07.0'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; debolmente screziata a 450x; situata 3' a W di una coppia di stelle brillanti di 9ª grandezza (già debolmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 4602	gx	12h40m37s	−05°07.9'	q 284	Vir	24"	buona / m. buono	bella, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da E a W, dimensioni 3'×1' e con piccolo bulge poco contrastato; appare screziata a 450x — c'è una stellina a ridosso del bordo orientale (già debolmente visibile nel 10").
NGC 4604	gx	12h40m45s	−05°18.2'		UMa	24"	buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 4605	gx	12h40m00s	+61°36.6'	q 26	UMa	10"	buona / buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 4'×2' e di luminosità pressoché uniforme.
NGC 4606	gx	12h40m57s	+11°54.7'	q 194	Vir	16"	buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti circa 4' in direzione WNW-ESE; la 1ª è diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×45", con una stellina brillante al bordo di SW e un'altra più debole a pochi secondi nella stessa direzione; la 2ª è una lama di luce molto debole, orientata da N a S, estesa un paio di primi e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 4607	gx	12h41m12s	+11°53.1'	q 194	Vir	16"	buona / ottimo	v. **NGC 4606**
NGC 4608	gx	12h41m14s	+10°09.4'	q 194	Vir	24"	m. buona / buono	come nel caso di NGC 4596 si nota anche qui una barra relativamente brillante orientata da NNE a SSW di dimensioni 1.5'×1' immersa in una chiazza molto debole con Ø di un paio di primi; il nucleo appare stellare e più marcato della 4596 (anche questa gx era già precedentemente osservata nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 4611	gx	12h41m25s	+13°43.7'	q 194	Com	24"	ottima / m. buono	è una debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per 1' — 450x.
NGC 4612	gx	12h41m33s	+07°18.9'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	rotonda con Ø di 1', diffusa e con nucleo stellare molto luminoso; c'è una stellina quasi a ridosso verso E (quest'ultima fa parte di una stringa di 5 stelle che si dipartono a NE della gx: la più esterna è una doppia abbastanza stretta) — 450x.
NGC 4613	gx	12h41m29s	+26°05.3'	q 149	Com	24"	buona / buono	fa parte di un piccolo terzetto assieme a NGC 4614 e 4615 — questa è la più debole, rotonda, diffusa e con Ø < 30" e nucleo stellare — 400x.
NGC 4614	gx	12h41m31s	+26°02.5'	q 149	Com	24"	buona / buono	è la più evidente del terzetto, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30", diffusa e con condensazione centrale marcata nella quale appare a tratti un nucleo stellare — 400x.
NGC 4615	gx	12h41m37s	+26°04.4'	q 149	Com	24"	buona / buono	allungata da NW a SE con dimensioni a prima vista di 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appaiono a tratti 2 tenuissime protuberanze che le danno una forma a "S" schiacciata: quella orientale è un poco più evidente; con questi particolari la dimensione maggiore della gx arriva a quasi 1.5' — 400x.
NGC 4617	gx	12h41m06s	+50°23.5'	q 48	CVn	16"	buona / buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 2.5'×30" e con bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 270x.
NGC 4618	gx	12h41m32s	+41°09.0'	q 75	CVn	16"	ottima / ottimo	presenta una zona centrale brillante, orientata da NE a SW di dimensioni 1.5'×1' e un alone molto diffuso, grosso modo circolare con Ø di 3' scarsi; una sorta di esile banda arcuata che si estende da S a SE sembra separata dal corpo principale a 270x; c'è una stella brillante a meno di 4' verso S.
NGC 4619	gx	12h41m45s	+35°03.8'	q 108	CVn	16"	ottima / discreto	relativamente brillante, rotonda, con Ø inferiore a 1', gradatamente più brillante all'interno; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelline: quella al vertice rettangolo è brillante — 270x.
NGC 4620	gx	12h41m59s	+12°56.5'	q 194	Vir	16"	buona / mediocre	facile, ma piuttosto sfilacciata ai bordi, rotonda con Ø di 1' — 270x.
NGC 4621	gx	12h41m02s	+11°38.9'	q 194	Vir	24"	m. buona / buono	è una gx molto bella che sembra fatta a isofote: la zona più esterna è orientata da N a S, estesa 4'×2' e arriva a una stellina brillante al bordo N; una seconda zona più interna e poco più brillante ha dimensioni grosso modo 2'×1.5' e arriva a lambire una debole stellina situata a SW; si osserva successivamente un bulge brillante di circa 45"×30" con all'interno un nucleo puntiforme; più interessante a 340x (altresì nota come M59).
NGC 4623	gx	12h42m11s	+07°40.6'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30" e con basso gradiente di luce (già osservabile, seppur debolmente, nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 4625	gx	12h41m52s	+41°16.4'	q 75	CVn	16"	buona / buono	è di aspetto molto più regolare di NGC 4618 situata 8' a SSW; è rotonda con Ø di 1.5', poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; il nucleo appare stellare a 270x.
NGC 4626	gx	12h42m25s	−07°02.7'	q 284	CVn	24"	m. buona / discreto	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", poco diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a 1.5' verso S — 450x.
NGC 4627	gx	12h42m00s	+32°34.5'	q 108	CVn	16"	ottima / ottimo	è una galassia con basso gradiente di luce, diffusa, poco allungata da NNE a SSW e di dimensioni 90"×60" — 270x.
NGC 4628	gx	12h42m25s	−06°58.2'	q 284	Vir	24"	m. buona / discreto	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", con bulge evidente, ma poco contrastato; c'è una coppia di stelline a 1.5' N orientate da E a W e distanti 1" — 450x.
NGC 4629	gx	12h42m33s	−01°21.0'		Vir	24"	buona / m. buono	è una chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; poco meglio contrastata scalando a 340x (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 4630	gx	12h42m31s	+03°57.5'	q 239	Vir	24"	m. buona / ottimo	gx brillante, ma con basso gradiente di luce, molto diffusa, orientata da NW a SE con dimensioni 90"×60"; il bulge esteso e poco contrastato sembra leggermente decentrato verso N; nell'insieme è più interessante a 340x.
NGC 4631	gx	12h42m07s	+32°32.3'	q 108	CVn	16"	ottima / ottimo	molto estesa e di aspetto un po' irregolare: è orientata da E a W con dimensioni 12'×1.5' (nel punto più largo); presenta un piccolo bulge diffuso, evidente, ma decentrato verso E; un nodulo luminoso si trova a 3.5' W del bulge, ma è più debole; una stellina lambisce il bordo N a "metà galassia" e un'altra più debole è situata all'estremità occidentale, seppur spostata verso N — 270x.
NGC 4632	gx	12h42m32s	−00°04.8'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	molto diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 3'×1', con bulge esteso e debolmente contrastato (al momento dell'osservazione era ancora bassa. La gx era già visibile, seppur molto debolmente, nel 10") — 450x.
NGC 4633	gx	12h42m37s	+14°21.4'	q 194	Com	24"	m. buona / ottimo	piuttosto debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina brillante a ridosso verso NW; meglio contrastata comunque a 340x (appariva elusivamente anche nel 10" a 132x nelle stesse condizioni di visibilità).
NGC 4634	gx	12h42m41s	+14°17.8'	q 194	Com	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 2'×20" e di luminosità uniforme; ci dovrebbe essere una stellina appena percettibile (o un nodulo) al bordo NNW; una debole stellina si trova invece a 1' scarso ENE; la gx appare meglio contrastata scalando a 340x, ma il "nodulo" è più netto a 450x (era visibile, seppure molto debolmente, nel 10" a 178x nelle stesse condizioni di visibilità).
NGC 4635	gx	12h42m39s	+19°56.7'	q 149	Com	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60"; meglio contrastata scalando a 340x (nel 10", nelle stesse condizioni di cielo, era visibile solo in visione laterale a 118x, di aspetto uniforme e di forma indistinta).
NGC 4636	gx	12h42m50s	+02°41.3'	q 239	Vir	24"	discreta / ottimo	approssim. circolare con Ø che in visione distolta arriva a quasi 4', molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; non si nota la presenza di nucleo stellare; la dimensione della gx, tuttavia, si apprezza meglio scalando a 340x; è situata tra 2 stelle brillanti orientate da N a S e distanti circa 6' (già facilmente visibile nel 10" a 118x).
NGC 4637	gx	12h42m54s	+11°26.3'	q 194	Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa per ~ 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio contrastata a 340x.
NGC 4638	gx	12h42m47s	+11°26.5'	q 194	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto bella, diffusa e con alto gradiente di luce, orientata da NW a SE, di dimensioni 90"×45", con bulge evidente, contrastato all'interno del quale appare un nucleo stellare facilmente riconoscibile; debolmente screziata a 450x (già precedentemente osservata nel 10").
NGC 4639	gx	12h42m52s	+13°15.4'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 80"×60", poco diffusa e con condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE (debolmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4640	gx	12h42m58s	+12°17.2'	q 194	Vir	16"	buona / mediocre	lucore molto debole, di luminosità uniforme, di dimensioni 60"×30" e che in visione distolta appare orientata da E a W — 270x.
NGC 4641	gx	12h43m08s	+12°03.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di 45", diffusa, con gradiente di luce molto basso e piccola condensazione centrale poco contrastata sul disco; c'è una stellina brillante a SE e un'altra molto debole alla stessa distanza verso N (non è riportata sulla Uranometria) — 570x.
NGC 4642	gx	12h43m18s	−00°38.7'	q 239	Vir	24"	buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo orientale (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 4643	gx	12h43m20s	+01°58.7'	q 239	Vir	24"	discreta / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1' e con alto gradiente di luce; il bulge centrale appare leggermente screziato a 450x; in visione distolta, scalando a 340x, la galassia appare come avviluppata in un tenuissimo alone diffuso, grosso modo rotondo con Ø di 2.5' (già facilmente visibile nel 10" a 118x).
NGC 4644	gx	12h42m43s	+55°08.7'	q 48	UMa	24"	buona / ottimo	molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 80"×30" e con una condensazione centrale appena più evidente del disco (appariva molto debole e uniforme nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4646	gx	12h42m52s	+54°51.4'	q 48	UMa	24"	buona / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", diffusa e con condensazione centrale molto brillante; c'è una stellina al bordo NE (era facile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4647	gx	12h43m32s	+11°34.9'	q 194	Vir	10"	ottima / discreto	situata a ridosso NW di M60 — facile, brillante, rotonda, Ø ~ 1.5' e di luminosità pressoché uniforme.
NGC 4648	gx	12h41m45s	+74°25.3'	q 9	Dra	20"	m. buona / ottimo	poco diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45", con bulge evidente e un nucleo stellare; situata all'interno di un triangolo quasi rettangolo di stelline brillanti (era facile nel 10" a 178x e stimata con le stesse dimensioni) — 360x.
NGC 4651	gx	12h43m43s	+16°23.7'	q 194	Com	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 2'×1', gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare evidente; screziata a 450x; c'è una stellina a un paio di primi verso E (la gx era facilmente visibile anche nel 10" a 178x in buone condizioni di visibilità).
NGC 4652	gx	12h43m20s	+58°57.9'	q 238	UMa	16"	buona / mediocre	molto debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 4653	gx	12h43m51s	−00°33.6'	q 239	Vir	24"	buona / m. buono	rotonda con Ø di 1.5', molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso verso SE e un'altra brillante a un paio di primi sempre a SE (già osservabile nel 10") — 450x.
NGC 4654	gx	12h43m58s	+13°07.5'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 3'×1.5', diffusa e con gradiente di luce molto basso; c'è una debole stellina subito a NE e un'altra abbastanza luminosa a N; una brillante stella di 9ª si trova a poco più di 3' NW dal centro della gx (già debolmente osservabile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4655	gx	12h43m37s	+41°01.1'	q 75	CVn	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
NGC 4656	gx	12h43m57s	+32°10.0'	q 108	CVn	16"	ottima / ottimo	è molto irregolare, orientata da NE a SW con dimensioni 6'×1'; in visione diretta sembra come "troncata" a metà: qui presenta un evidente rigonfiamento e un nucleo stellare decentrato, però, verso W; in visione distolta sembra allungarsi improvvisamente: una zona debolissima e molto diffusa che dal bulge si protende per altrettanto verso SW; all'estremità NE presenta una sorta di "piedino" orientato da N a S, esteso per ~ 1' e di luminosità alquanto irregolare: quest'ultimo è a sua volta denominato NGC 4657 — 270x.
NGC 4657	gx	12h44m11s	+32°12.3'	q 108	CVn	16"	ottima / ottimo	costituisce l'estrema propaggine nord-orientale della 4656 assieme alla quale forma un unico oggetto di aspetto "uncinato", già visibile abbastanza facilmente anche nel 10" a 63x; questa sorta di "piedino" è allungato da N a S, esteso ~ 1' e di luminosità un po' irregolare — 270x.
NGC 4658	gx	12h44m38s	−10°05.0'	q 284	Vir	24"	m. buona / mediocre	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina al bordo NW; poco disturbata dalla SAO 138945 di 8ª grandezza situata ad appena 2.5' verso W (debolmente visibile anche nel 10"; in ottime condizione di trasparenza e seeing era anche possibile scorgere, a 178x, persino la stellina a NW) — 450x.
NGC 4659	gx	12h44m29s	+13°29.9'	q 194	Com	24"	discreta / ottimo	poco diffusa e con nucleo stellare, poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SW (già debolmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4660	gx	12h44m32s	+11°11.4'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	allungata da E a W con dimensioni 90"×45" e diffusa soprattutto alle estremità E e W; presenta un bulge brillante, contrastato sul disco e un nucleo stellare (già facilmente osservabile nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 4662	gx	12h44m26s	+37°07.2'	q 108	CVn	16"	m. buona / scarso	è una chiazza circolare di aspetto molto diffuso, con basso gradiente di luce e con Ø superiore a 1' — 270x.
NGC 4663	gx	12h44m47s	−10°11.9'	q 284	Vir	24"	m. buona / mediocre	poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" poco diffusa e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso SE (già osservata col 10" a 178x) — 450x.
NGC 4665	gx	12h45m06s	+03°03.3'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 2'×1', con piccolo bulge abbastanza contrastato; c'è una stellina al bordo N e un'altra più debole quasi a ridosso verso W; una stella brillante si trova invece subito a SW — 450x (già facilmente visibile nel 10" a 118x).
NGC 4666	gx	12h45m08s	−00°27.7'	q 239	Vir	24"	buona / m. buono	bella, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 4'×45", diffusa alle estremità NE e SW, con piccolo bulge contrastato e screziato di dimensioni 30"×10" (già facilmente osservabile nel 10") — 450x.
NGC 4668	gx	12h45m32s	−00°32.1'	q 239	Vir	24"	buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 70"×35" (già debolmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 4669	gx	12h44m47s	+54°52.5'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", molto diffusa alle estremità N e S, con bulge estesa e poco più brillante del disco — 188x.
NGC 4670	gx	12h45m17s	+27°07.5'	q 149	Com	24"	ottima / ottimo	brillante, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45",con bulge poco contrastato e nucleo stellare evidente (era già facilmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4671	gx	12h45m48s	−07°04.2'	q 284	Vir	16"	buona / buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di 45", alto gradiente di luce e nucleo marcato; c'è una stella doppia debolissima a ~ 2' NW — 270x.
NGC 4673	gx	12h45m35s	+27°03.7'	q 149	Com	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di 45"; presenta un bulge evidente con all'interno un nucleo stellare (anche questa era già facilmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4674	gx	12h46m03s	−08°38.3'	q 284	Vir	16"	buona / buono	debole ovale di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e relativamente compatta — 270x.
NGC 4675	gx	12h45m32s	+54°44.3'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", poco più brillante verso l'interno; è meglio definita di NGC 4669, situata una decina di primi a NW, pur restando comunque una gx piuttosto debole — 188x.
NGC 4676A	gx	12h46m11s	+30°44.6'	q 108	Com	16"	m. buona / scarso	forma una coppia serrata con NGC 4676B e si riescono a separare malgrado il seeing scarso; quella a S (4676B) è più brillante, presenta un piccolo nucleo leggermente più luminoso ed è grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; l'altra è molto debole e si presenta come un baffo di luce tenue allungata da N a S per ~ 1' — 270x.
NGC 4676B	gx	12h46m12s	+30°43.3'	q 108	Com	16"	m. buona / scarso	v. **NGC 4676A**
NGC 4678	gx	12h49m42s	−04°34.8'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità non proprio regolare; a tratti sembra divisa a metà: un nodulo più brillante a E e l'altro più tenue a W; c'è una stellina quasi a ridosso verso E e un'altra più debole e distante a NE (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 4680	gx	12h46m55s	−11°38.1'	q 284	Vir	16"	m. buona / scarso	facile, abbastanza compatta approssim. rotonda con Ø di 1', ma di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina al margine orientale — 188x.
NGC 4682	gx	12h47m16s	−10°03.7'	q 284	Vir	24"	m. buona / mediocre	è una gx facile, ma molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 2'×1', meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a 1.5' NE (nel 10" appariva estremamente debole, in buone condizioni di trasparenza e seeing; tuttavia la stellina di 14-esima a NE era visibile a 178x.
NGC 4684	gx	12h47m18s	−02°43.6'	q 239	Vir	24"	buona / m. buono	bella, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 2'×40", leggermente screziata all'interno e con nucleo di aspetto quasi stellare; si notano 3 stelline a 450x: una al bordo NNE, una subito a SSE del nucleo e una terza al bordo SE (già facilmente osservabile nel 10").
NGC 4685	gx	12h47m11s	+19°27.9'	q 149	Com	24"	ottima / m. buono	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccolo nucleo estremamente brillante (nel 10", nelle stesse condizioni di cielo, appariva debole, molto diffusa e con marcata condensazione centrale facilmente visibile anche in visione diretta a 178x) — 450x.
NGC 4686	gx	12h46m40s	+54°32.2'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	molto allungata da N a S, di dimensioni 2'×30", con bulge marcato, estesa e luminoso; è allineata con 2 deboli stelline distanti 1' e orientate da NE a SW — 188x.
NGC 4687	gx	12h47m24s	+35°21.1'	q 108	CVn	16"	buona / discreto	rotonda, con Ø di ~ 45", con brillante condensazione centrale di aspetto stellare e un tenue alone — 188x.
NGC 4688	gx	12h47m47s	+04°20.1'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	è una debole chiazza molto diffusa, rotonda con Ø di ~ 1.5' e di luminosità uniforme; appare poco più evidente scalando a 340x (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10").
NGC 4689	gx	12h47m46s	+13°45.8'	q 194	Com	24"	m. buona / ottimo	presenta un bulge rotondo, evidente, con Ø di una 40-ina di secondi circondato da un disco molto diffuso con Ø di 3' sul quale appaiono lievi discrepanze di luce (verosimilmente in corrispondenza dei bracci); meglio contrastata scalando a 340x; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso S; una coppia di stelle brillanti orientate da NW a SE si trova subito a N (era debolmente visibile anche nel 10" a 118x).
NGC 4690	gx	12h47m56s	−01°39.3'	q 239	Vir	16"	mediocre / scarso	molto debole e di aspetto un po' confuso, approssim. circolare con Ø di ~ 1' e appena più brillante verso l'interno; appare facilmente in visione indiretta a 188x.
NGC 4691	gx	12h48m13s	−03°20.0'	q 239	Vir	24"	discreta / ottimo	presenta una barra centrale brillante, screziata a 450x e orientata da E a W, circonfusa da un tenue alone che in visione distolta appare di dimensioni 2'×1' (già facilmente visibile nel 10" a 118x).
NGC 4692	gx	12h47m55s	+27°13.4'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	rotonda, brillante, diffusa ai bordi, con Ø di ~ 1'; presenta alto gradiente di luce e una condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 4693	gx	12h47m09s	+71°10.6'	q 26	Dra	16"	m. buona / buono	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30"; il bulge è poco più luminoso del disco e si nota come una frammentazione subito a SW di questo — 270x.
NGC 4694	gx	12h48m15s	+10°59.0'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1', gradatamente più brillante verso l'interno, con bulge diffuso e contrastato sul disco; c'è una stellina subito a W (già facilmente osservabile nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 4695	gx	12h47m32s	+54°22.5'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	debole, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con basso gradiente di luce e molto diffusa — 188x.
NGC 4697	gx	12h48m36s	−05°48.0'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	molto diffusa e luminosa, orientata da NE a SW, di dimensioni 4'×3', con un bulge molto evidente e un piccolo nucleo compatto; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 270x.
NGC 4698	gx	12h48m23s	+08°29.3'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni che in visione distolta arrivano a 3'×1.5'; presenta un piccolo bulge brillante, molto contrastato sul disco e un nucleo stellare è situata tra due stelline brillanti orientate da N a S (già precedentemente osservata nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 4699	gx	12h49m02s	−08°39.9'	q 284	Vir	10"	ottima / buono	bella, molto diffusa e con alto gradiente di luce; è orientata da NE a SW, di dimensioni 3'×2' e con piccolo nucleo molto luminoso di aspetto quasi stellare; il tenue alone si stempera abbastanza rapidamente sul fondo cielo — 178x.
NGC 4700	gx	12h49m08s	−11°24.7'	q 284	Vir	24"	m. buona / mediocre	è un magnifico fuso estesa per oltre 2' in direzione NE-SW, spesso non più di 30" e con tenue bulge poco contrastato; leggermente screziata a 450x, malgrado il seeing non sia dei migliori (nel 10" appariva come una debole lama di luce coi bordi abbastanza netti).
NGC 4701	gx	12h49m12s	+03°23.4'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	è un bell'ovale diffuso con basso gradiente di luce, orientata da NE a SW con dimensioni 90"×60"; più interessante a 340x (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10").
NGC 4702	gx	12h49m01s	+27°10.8'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	molto debole, piccola, di forma indistinta e di dimensioni non superiori a 30" — 270x.
NGC 4703	gx	12h49m19s	−09°06.5'	q 284	Vir	16"	buona / buono	è praticamente una edge-on orientata da NNW a SSE per ~ 3' e con bulge evidente — 270x.
NGC 4704	gx	12h48m46s	+41°55.3'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	molto debole, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 4705	gx	12h49m25s	−05°11.7'	q 284	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×45", diffusa e con nucleo evidente; c'è una debole stellina verso il margine SE — 380x.
NGC 4707	gx	12h48m23s	+51°09.8'	q 48	CVn	16"	buona / buono	è una sorta di alone rotondo di almeno 1.5' di Ø, molto diffuso e stemperato sul fondo cielo che circonda una stellina — 270x.
NGC 4708	gx	12h49m42s	−11°05.5'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	debole, ma visibile senza difficoltà, di aspetto un pò' confuso, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 4710	gx	12h49m39s	+15°09.9'	q 194	Com	16"	m. buona / m. buono	è un bellissimo fuso orientato da NNE a SSW che in visione distolta supera i 4' di estensione ed spesso una 40-ina di secondi; il bulge è molto tenue e appena più contrastato del disco; a 380x appare leggermente screziata verso l'interno; c'è una stellina brillante a 1.5' verso E.
NGC 4711	gx	12h48m46s	+35°20.0'	q 108	CVn	16"	buona / discreto	debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" — 188x.
NGC 4712	gx	12h49m34s	+25°28.2'	q 149	Com	24"	ottima / m. buono	poco contrastata sul fondo cielo, allungata da N a S, di dimensioni 2'×1' e con basso gradiente di luce; più interessante a 340x (era facilmente visibile in visione distolta nel 10" a 126x).
NGC 4713	gx	12h49m58s	+05°18.6'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	poco allungata da E a W con dimensioni 90"×60", poco diffusa e di luminosità quasi uniforme; leggermente screziata a 340x, mentre a 450x l'effetto è si più pronunciato, ma la galassia appare meno interessante (già debolmente osservabile nel 10" a 118x).
NGC 4714	gx	12h50m19s	−13°19.4'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	è la più debole di un quartetto diradato (le altre sono la 4722, 4723 e 4748); poco allungata da NW a SE, presenta un nucleo brillante quasi stellare circonfuso da un tenue alone di dimensioni 60"×45" — 380x.
NGC 4715	gx	12h49m58s	+27°49.3'	q 149	Com	16"	buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' e con una tenue e piccola condensazione centrale — 270x.
NGC 4716	gx	12h50m33s	−09°27.1'	q 284	Vir	16"	buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti 1' in direzione NW-SE; la 1ª è abbastanza brillante, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; la 2ª è più debole e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 70"×30" (ossia poco superiore); c'è da notare che visualmente appaiono posizionate con un'angolatura meno pronunciata rispetto alla realtà — 270x.
NGC 4717	gx	12h50m34s	−09°27.8'	q 284	Vir	16"	buona / buono	v. **NGC 4716**
NGC 4718	gx	12h50m33s	−05°16.9'	q 284	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ~ 45" verso N e un'altra più brillante un paio di primi a E — 380x.
NGC 4719	gx	12h50m09s	+33°09.6'	q 108	CVn	16"	ottima / discreto	abbastanza brillante, allungata da N a S, dimensioni 45"×30", con piccolo nucleo brillante di aspetto stellare; a tratti sembra apparire leggermente più brillante dalla parte occidentale — 270x.
NGC 4720	gx	12h50m43s	−04°09.3'	q 239	Vir	16"	m. buona / discreto	è un ovale relativamente compatto di dimensioni 45"×30", orientata da NW a SE e di luminosità pressoché uniforme; è situata al vertice occidentale di un triangolo isoscele formato con 2 stelline distanti 3' in direzione N-S — 270x.
NGC 4721	gx	12h50m20s	+27°19.4'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 4722	gx	12h51m32s	−13°19.8'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	relativamente facile, allungata da NE a SW, poco diffusa, di dimensioni 60"×30" e con bulge evidente — 380x.
NGC 4723	gx	12h51m03s	−13°14.2'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	debolissima, visibile a tratti in visione distolta, allungata da NE a SW per max 40"; c'è una stellina a ridosso verso NW — 270x.
NGC 4724	gx	12h50m54s	−14°19.9'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	assieme alla 4727 forma una coppia di galassie facili distanti 1' in direzione E-W; questa è piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" e nucleo stellare evidente — 380x.

NGC 4725	gx	12h50m27s	+25°30.0'	q 149	Com	24"	m. buona / m. buono	è una galassia molto bella, osservata a 210x; molto diffusa, orientata da NE a SW con dimensioni 5'×3'; evidente la barra a guisa di due baffi che si dipartono dal bulge centrale; due tenui lacune appaiono ai lati della barra con più evidenza per quella a NW; alle estremità NW e SW si notano 2 deboli anse, in corrispondenza dei bracci principali, che sembrano avvolgersi in senso antiorario; presenta un piccolo nucleo rotondo finemente screziato a 340x; un trapezio di 4 deboli stelline coronano la galassia verso N, all'interno dell'alone; a queste se ne aggiunge una quinta appena percettibile a 450x, situata a ridosso del bulge verso SE.
NGC 4726	gx	12h51m32s	−14°13.3'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	è un piccolo ovale relativamente compatto poco più brillante all'interno, orientata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 380x.
NGC 4727	gx	12h50m57s	−14°20.0'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	forma una coppia serrata assieme alla 4724; è pure rotonda, ma presenta un Ø quasi doppio ed è di luminosità più uniforme — 380x.
NGC 4728	gx	12h50m28s	+27°26.1'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	piccola gx circolare, debole, con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 4731	gx	12h51m00s	−06°23.6'	q 284	Vir	16"	buona / buono	è un'estesa chiazza ovale orientata da E a W con dimensioni 4'×2' e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante situata all'interno del disco verso SW (già osservata anni fa col 10" a 178x) — 270x.
NGC 4732	gx	12h50m07s	+52°51.0'	q 48	UMa	16"	discreta / buono	relativamente compatta, poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30"; presenta un nucleo brillante di aspetto stellare — 188x.
NGC 4733	gx	12h51m07s	+10°54.7'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	rotonda con Ø di 80", diffusa e di luminosità pressoché uniforme; vagamente screziata a 340x, ma poco contrastata a 450x; c'è una stellina al bordo occidentale e un'altra più debole a poco più di 1' verso E (già debolmente visibile nel 10" a 118x).
NGC 4734	gx	12h51m13s	+04°51.5'	q 239	Vir	24"	ottima / ottimo	facile, con basso gradiente di luce, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
NGC 4735	gx	12h51m02s	+28°55.7'	q 108	Com	16"	ottima / discreto	debole, leggermente ovale, allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 4737	gx	12h50m53s	+34°09.4'	q 108	CVn	16"	ottima / discreto	debole, compatta, abbastanza facile da vedere, forse poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 270x.
NGC 4738	gx	12h51m09s	+28°47.3'	q 108	Com	16"	ottima / discreto	più evidente di NGC 4735 dalla quale dista 8.5' verso S; è una lama di luce di luminosità pressoché uniforme, estesa per oltre 1' da NE a SW — 270x.
NGC 4739	gx	12h51m37s	−08°24.6'	q 284	Vir	16"	buona / buono	rotonda, diffusa, con Ø di 1' e con nucleo stellare evidente — 270x.
NGC 4741	gx	12h51m00s	+47°40.3'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	è un ovale di dimensioni 60"×40", orientata all'incirca da N a S, molto sfumato ai bordi e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 4742	gx	12h51m48s	−10°27.3'	q 284	Vir	24"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo stellare estremamente brillante circonfuso da un alone molto diffuso, orientata da E a W con dimensioni 2'×1'; stellina brillante a 1' SW (già facilmente osservabile nel 10") — 450x.
NGC 4745	gx	12h51m26s	+27°25.3'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo ovale di 30"×20" orientata da N a S, appena più brillante all'interno; è situata ~ 1' WSW di una stellina abbastanza brillante; osservata a 380x per tenere fuori campo la 31 Com di 5ª grandezza situata 8' a NNE.
NGC 4746	gx	12h51m56s	+12°04.9'	q 194	Vir	16"	discreta / scarso	lama di luce estesa un paio di primi, orientata da NW a SE e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 4747	gx	12h51m45s	+25°46.5'	q 149	Com	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e allungata da NE a SW, con dimensioni che in visione distolta arrivano a 2.5'×45"; presenta un bulge esteso e poco contrastato sul disco (nel 10" a 126x la gx era debole e sembrava posta praticamente di taglio) — 340x.
NGC 4748	gx	12h52m13s	−13°24.8'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	approssim. circolare, con nucleo stellare brillante e debole alone diffuso con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 4749	gx	12h52m13s	+71°38.1'	q 26	Dra	16"	m. buona / buono	un'altra lama di luce estesa ~ 2', orientata da NNW a SSE e di luminosità piuttosto irregolare — 270x.
NGC 4750	gx	12h50m07s	+72°52.5'	q 26	Dra	10"	ottima / buono	brillante, con nucleo luminoso e un alone diffuso, rotondo con Ø poco inferiore ai 2'.
NGC 4753	gx	12h52m22s	−01°12.0'	q 239	Vir	24"	discreta / ottimo	molto diffusa, orientata da E a W con dimensioni 3'×1.5'; presenta un bulge abbastanza contrastato e un nucleo stellare; l'alone è di gradiente di luce uniforme e senza strutture; meglio evidente scalando a 340x (già facilmente visibile nel 10" a 178x).
NGC 4754	gx	12h52m18s	+11°18.8'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	diffusa, orientata da NNE a SSW, di dimensioni che in visione distolta arrivano a 3'×1' e con un bulge rotondo con 1' di Ø molto brillante rispetto al disco; la galassia appare però meglio contrastata scalando a 340x; praticamente allineata ed equidistante con 2 stelline brillante a SW; altre stelline più deboli si trovano attorno alla gx verso N e verso E (già precedentemente osservata nel 10" a 118x).
NGC 4756	gx	12h52m53s	−15°24.8'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	situata al centro dell'ammasso AGC 1631 di cui rappresenta il membro più brillante — ha un bulge abbastanza evidente, un alone diffuso e un nucleo stellare; è poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 380x.
NGC 4757	gx	12h52m50s	−10°18.6'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30", ma di aspetto un po' irregolare; presenta un nucleo puntiforme visibile a tratti — 270x.
NGC 4758	gx	12h52m44s	+15°50.8'	q 194	Com	10"	buona / ottimo	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 90"×30" e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a ridosso verso verso N — 178x.
NGC 4760	gx	12h53m07s	−10°29.6'	q 284	Vir	10"	m. buona / buono	rotonda con Ø poco superiore a 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata in mezzo a 2 stelle brillanti orientate da NNE a SSW e distanti ~ 8' — 178x.
NGC 4761	gx	12h53m10s	−09°11.9'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	situata poco più di 1' E della coppia NGC 4776-78, è più debole di queste, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con bulge marcato — 270x.
NGC 4762	gx	12h52m56s	+11°13.8'	q 194	Vir	24"	discreta / ottimo	è una bellissima lama di luce orientata da NE a SW, estesa per oltre 4' e con un piccolo nucleo brillante molto contrastato. Nel 10", a 118x, la galassia sembrava a prima vista dipartirsi da una stellina abbastanza brillante (la quale occupa il vertice ottuso di un triangolo isoscele molto schiacciato formato con altre due stelle di 9ª grandezza orientate da E a W — 450x.
NGC 4763	gx	12h53m27s	−17°00.3'	q 284	Crv	16"	buona / ottimo	facile, con bulge evidente, diffusa, poco allungata da NW a SE e di dimensioni 80"×60" — 270x.
NGC 4764	gx	12h53m07s	−09°15.5'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, rotonda con Ø di 25"-30" e di luminosità uniforme; è situata a S del terzetto NGC 4761-76-78 osservato in altra data — 270x.
NGC 4765	gx	12h53m15s	+04°27.8'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 50"×30" (già debolmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 4766	gx	12h53m08s	−10°22.7'	q 284	Vir	16"	m. buono/ discreto	appare in visione distolta come una debolissima lama di luce estesa per ~ 1' e orientata NW a SE — 270x.
NGC 4770	gx	12h53m32s	−09°32.5'	q 284	Vir	16"	buona / buono	debole, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45", diffusa e con nucleo stellare marcato (mi era parso di vedere qualcosa a SE, a metà strada circa tra la gx e la stella brillante di 10a situata 3' a SSE) — 270x.
NGC 4771	gx	12h53m21s	+01°16.1'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	poco diffusa, relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da NW a SE con dimensioni 3'×45" (già osservabile, seppur molto debolmente, nel 10") — 450x.
NGC 4772	gx	12h53m29s	+02°10.1'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	è una bella gx orientata da NW a SE che sembra fatta a isofote: presenta una zona relativamente brillante di 2'×1' all'interno della quale si nota un bulge grosso modo rotondo, evidente e un nucleo stellare; il tutto circonfuso da un tenuissimo alone esterno che ne porta le dimensioni totali a 3'×1.5'; c'è una stellina appena percettibile al brodo W (già visibile nel 10") — 450x.
NGC 4773	gx	12h53m36s	−08°38.3'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 4774	gx	12h53m07s	+36°49.1'	q 108	CVn	16"	ottima / discreto	è una piccola galassia debole, di luminosità pressoché uniforme, estesa 30"×20" e orientata da E a W — 270x.
NGC 4775	gx	12h53m46s	−06°37.3'	q 284	Vir	10"	ottima / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 2' scarsi, di aspetto vagamente screziato a 178x; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW e un'altra distante un paio di primi verso E.
NGC 4776	gx	12h53m04s	−09°12.0'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	assieme a NGC 4778 forma una coppia di galassiette rotonde ben definite con piccola ed evidente condensazione centrale, con Ø di una 30-ina di secondi e molto ravvicinate; la stella brillante situata 1.5' a S non dà particolarmente fastidio; segnata sull'Uranometria come NGC 4759, mentre il Megastar riporta la doppia numerazione) — 270x.
NGC 4777	gx	12h53m58s	−08°46.5'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	allungata da N a S con dimensioni 90"×45", molto diffusa e con bulge evidente di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 4778	gx	12h53m06s	−09°12.3'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	v. **NGC 4776** (erroneamente riportata sull'Uranometria come NGC 4764, situata 3' più a S).
NGC 4780	gx	12h54m05s	−08°37.3'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	debole, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme con Ø di ~ 1'; c'è una stellina brillante a ridosso del margine occidentale — 270x.
NGC 4781	gx	12h54m23s	−10°32.1'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	bella, luminosa, ma con gradiente di luce molto basso, allungata da ESE a WNW con dimensioni 3'×1.5'; ci sono 3 stelline poste ad arco a W della gx di cui quella più a E ne lambisce il margine occidentale — 270x.
NGC 4782	gx	12h54m36s	−12°34.2'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	assieme NGC 4783 forma una coppia di galassie brillanti e relativamente compatte, ma di forma un po' irregolare, approssim. rotonde e con nucleo evidente quasi stellare; la 1ª è poco più estesa, con Ø di 45", contro i 40" della 2a — 270x.
NGC 4783	gx	12h54m36s	−12°33.5'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	v. **NGC 4782**
NGC 4784	gx	12h54m37s	−10°36.8'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	relativamente facile e compatta, con nucleo stellare evidente, molto allungata da E a W e dimensioni 60"×20" — 270x.
NGC 4786	gx	12h54m32s	−06°51.6'	q 284	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40", con bulge rotondo e nucleo stellare (già osservabile senza problemi nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4787	gx	12h54m06s	+27°04.1'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	debole, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 4788	gx	12h54m16s	+27°18.2'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	debole, piccola, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e tenue condensazione centrale; c'è una stella brillante a poco più di 1' verso W — 270x.
NGC 4789	gx	12h54m19s	+27°04.0'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	è una chiazza rotondeggiante dai bordi sfumati e di luminosità pressoché uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi; è situata quasi a ridosso, verso S, di una stellina brillante — 270x.
NGC 4789A	gx	12h54m06s	+27°08.9'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	è un diffuso lucore di forma indistinta assai stemperato sul fondo cielo e situato in un piccolo asterismo a forma di freccia (all'attacco della punta); è estesa circa 1.5', ma è meglio scalare a 270x; è situata 6' scarsi a NNW di NGC 4789.
NGC 4790	gx	12h54m52s	−10°14.9'	q 284	Vir	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e appena più evidente verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 90"×60"; c'è una stellina brillante quasi nel mezzo che a bassi ingrandimenti potrebbe anche essere scambiata per un nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso N e un'altra di luminosità simile poco più distante verso E (già debolmente osservabile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4791	gx	12h54m44s	+08°03.2'	q 194	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole bozzolo circolare o forse poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 4792	gx	12h55m04s	−12°26.8'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	piccola, compatta, poco allungata ~ da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo puntiforme — 270x.
NGC 4793	gx	12h54m41s	+28°56.3'	q 108	Com	16"	buona / buono	è una galassia ovale, di dimensioni 2'×1', orientata da NE a SW, relativamente netta ai bordi, brillante, ma a basso gradiente di luce; presenta un debolissimo nucleo stellare percepibile solo a tratti; c'è una stella brillante a una 30-ina di secondi a nord del bordo settentrionale — 270x.
NGC 4794	gx	12h55m11s	−12°36.5'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	presenta una zona interna rotonda, di luminosità uniforme racchiusa tra 2 stelline distanti 1' e orientate da E a W; in visione distolta, tuttavia, da questa zona sembrano protrudere come 2 tenuissimi baffi a NW e SE; non può trattarsi di un illusione, perché la gx è effettivamente allungata in questa direzione — 270x.
NGC 4795	gx	12h55m03s	+08°04.0'	q 194	Vir	16"	m. buona / ottimo	facile, rotonda, con nucleo brillante di aspetto quasi stellare e debole alone circonfuso con Ø superiore a 1'; c'è una stellina a ridosso verso E (altresì denominata NGC 4796 — 270x.
NGC 4798	gx	12h54m55s	+27°24.7'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	debole, con basso gradiente di luce, molto diffusa, con Ø di almeno 1'; c'è una stellina a ~ 1.5' verso S — 270x.
NGC 4799	gx	12h55m15s	+02°53.8'	q 239	Vir	16"	mediocre / scarso	molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20", abbastanza netta ai bordi N e S e con bulge brillante; c'è una stellina a 1' scarso verso SE — 188x.
NGC 4800	gx	12h54m38s	+46°31.8'	q 75	CVn	16"	ottima / ottimo	poco allungata da NNE a SSW, di dimensioni 90"×60", poco diffusa e con alto gradiente di luce, leggermente screziata a 380x; c'è una stellina brillante subito a W.
NGC 4801	gx	12h54m38s	+53°05.4'	q 48	UMa	16"	discreta / buono	presenta una piccola ed evidente condensazione centrale di aspetto stellare e un debole alone circonfuso, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 188x.
NGC 4802	gx	12h55m50s	−12°03.3'	q 284	Crv	24"	m. buona / mediocre	sarebbe una bella gx brillante se non fosse disturbata da una stella luminosa al bordo SE; diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 90"×60" e con tenue nucleo di aspetto stellare poco contrastato (appariva facilmente anche nel 10" a 178x) — 340x.
NGC 4803	gx	12h55m34s	+08°14.4'	q 194	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto piccola, compatta, relativamente brillante, situata 1' NW di una stellina brillante — 270x.
NGC 4806	gx	12h56m12s	−29°30.2'	q 369	Hya	16"	buona / buono	debolissima, appena più contrastata del fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 1' e di luminosità uniforme; c'è un piccolo triangolo di stelline un paio di primi verso SW — 270x.
NGC 4807	gx	12h55m29s	+27°31.3'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	piccola, compatta, circolare, con condensazione centrale evidente e con Ø di una 30-ina di secondi; appaiono a tratti lievi irregolarità di luce verso N — 270x.
NGC 4808	gx	12h55m49s	+04°18.3'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1' (già visibile nel 10") — 450x.
NGC 4809	gx	12h54m51s	+02°39.2'	q 239	Vir	16"	ottima / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx che si sdoppiano a 380x, oltre che per le ottime condizioni del cielo, anche perché le 2 gx sono disposte "perpendicolarmente" l'una all'altra; sono entrambe di luminosità uniforme; la 1ª è più debole, allungata da E a W con dimensioni 60"×30", mentre la 2ª meno diffusa, è orientata da N a S e ha dimensioni 45"×30".
NGC 4810	gx	12h54m51s	+02°38.4'	q 239	Vir	16"	ottima / ottimo	v. **NGC 4809**
NGC 4813	gx	12h56m36s	−06°49.0'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40", con bulge evidente e nucleo stellare — 270x.
NGC 4814	gx	12h55m22s	+58°20.7'	q 48	UMa	16"	buona / buono	allungata da NW a SE, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con dimensioni 2'×1' — 270x.
NGC 4816	gx	12h56m12s	+27°44.7'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, con piccola e marcata condensazione centrale, poco diffusa e con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a ridosso del bordo NE — 380x.
NGC 4818	gx	12h56m49s	−08°31.5'	q 284	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S con dimensioni di quasi 4'×1', molto diffusa alle 2 estremità N e S; presenta un bulge contrastato di 45"×30", ma poco "ruotato" in senso antiorario rispetto all'asse della gx; appare leggermente screziata a 450x; c'è una stellina quasi a ridosso verso S (già debolmente osservabile nel 10" a 178x: pareva come "mozzata" verso S.
NGC 4819	gx	12h56m28s	+26°59.2'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	presenta condensazione centrale evidente, piccolo nucleo stellare e un alone diffuso, approssim. rotondo con Ø > 1' — 380x.
NGC 4820	gx	12h57m01s	−13°43.2'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce orientata da E a W per ~ 1' e con tenue bulge abbastanza evidente — 270x.
NGC 4821	gx	12h56m29s	+26°57.4'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa, rotonda, con Ø ~ 30" con tenue condensazione centrale evidente — 380x.
NGC 4822	gx	12h57m04s	−10°45.7'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	diffusa, rotonda, con Ø di ~ 1' e nucleo stellare evidente — 270x.
NGC 4823	gx	12h57m24s	−13°44.3'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	è appena più brillante di NGC 4829 ed è un piccola chiazza rotonda con Ø di 20"-25" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 4824	gx	12h56m34s	+27°32.3'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, situata tra 2 stelline quasi al limitare del campo dell'oculare 4.8 mm (che dà 380x): a questi ingrandimenti, però, il campo è quasi depleto.
NGC 4825	gx	12h57m12s	−13°39.9'	q 284	Vir	16"	m. ottima / ottimo	bella, poco diffusa e con alto gradiente di luce, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×60" e con nucleo stellare visibile però solo a momenti; c'è una stellina a 1.5' verso W — 270x.
NGC 4827	gx	12h56m44s	+27°10.7'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	presenta un condensazione centrale marcata di aspetto quasi stellare circonfusa da un alone rotonda con Ø inferiore a 1' — 380x.
NGC 4828	gx	12h56m43s	+28°01.2'	q 108	Com	16"	m. buona / ottimo	piuttosto debole, diffusa rotonda con Ø di oltre 30" e un bulge abbastanza evidente — 380x.
NGC 4829	gx	12h57m26s	−13°41.9'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	debole, piccola, molto allungata da N a S, con dimensioni 45"×15"; in visione distolta appare a momenti una minuscola condensazione centrale — 270x.
NGC 4830	gx	12h57m28s	−19°41.4'	q 329	Vir	16"	m. buona / m. buono	presenta un brillante nucleo stellare circonfuso da un alone gradatamente più luminoso verso l'interno; è allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso SW; un'altra poco più brillante si trova a 20" verso SW (la gx si trova a ridosso, verso NNW, di un triangolo rettangolo isoscele di stelle brillanti; la più brillante è al vertice rettangolo) — 270x.
NGC 4831	gx	12h57m37s	−27°17.5'	q 329	Vir	16"	m. buona / m. buono	molto facile, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; presenta un piccolo nucleo stellare visibile anche in visione diretta — 270x.
NGC 4834	gx	12h56m25s	+52°17.7'	q 48	CVn	24"	buona / ottimo	allungata da E a W con dimensioni 50"×25", diffusa e appena più brillante all'interno — 450x.
NGC 4836	gx	12h57m34s	−12°44.6'	q 284	Vir	16"	m. buona / scarso	debole, ma facilmente osservabile in visione distolta, molto diffusa, poco più luminosa all'interno, rotonda con Ø di 45" — 188x.
NGC 4837	gx	12h56m49s	+48°17.8'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	debole, con basso gradiente di luce, allungata da ENE a WSW per ~ 1'; osservando a 380x sembra a momenti come spaccata in 2: e in effetti, da un controllo effettuato successivamente, forma una coppia serrata con la MAC 1256+4818 situata a ridosso di NE — 270x.
NGC 4838	gx	12h57m56s	−13°03.6'	q 284	Vir	16"	m. buona / discreto	debole, rotonda diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø 45" (è l'ultimo oggetto osservato nella nottata, perché è sorta la Luna) — 270x.
NGC 4839	gx	12h57m24s	+27°29.9'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	facile, allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×40", diffusa e con evidente condensazione centrale — 380x.
NGC 4840	gx	12h57m33s	+27°36.6'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	rotonda, poco diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale abbastanza marcata — 380x.
NGC 4841A	gx	12h57m32s	+28°28.6'	q 108	Com	16"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx che si sdoppia facilmente a 270x; sono diffuse e distanti una 30-ina di secondi in direzione NE-SW; la 1ª è poco più grande, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale evidente; la 2ª è rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e anch'essa con un nucleo evidente.
NGC 4841B	gx	12h57m34s	+28°28.9'	q 108	Com	16"	m. buona / ottimo	v. **NGC 4841A**
NGC 4842A	gx	12h57m36s	+27°29.5'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette molto ravvicinate; la 1ª è più facile, rotondo con Ø 20"-25" con condensazione centrale evidente; la 2ª è più debole e più piccola, estesa 15"-20" e di aspetto più diffuso — 380x.
NGC 4842B	gx	12h57m36s	+27°29.1'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	v. **NGC 4842A**
NGC 4843	gx	12h58m01s	−03°37.3'	q 239	Vir	24"	ottima / ottimo	è un fuso esteso per un paio di primi in direzione E-W con piccolo bulge evidente; c'è una stellina a ridosso S verso il bordo orientale — 450x.
NGC 4845	gx	12h58m01s	+01°34.5'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 5'×2', con bulge molto diffuso e poco contrastato sul disco; c'è una stellina all'interno subito a E del centro; la gx è situata tra due stelle brillante distanti 3' e orientate grosso modo da N a S (già visibile nel 10") — 450x.
NGC 4846	gx	12h57m48s	+36°22.2'	q 108	CVn	16"	m. buona / scarso	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", con un nucleo stellare debolissimo visibile a momenti — 270x.
NGC 4847	gx	12h58m29s	−13°08.4'	q 284	Vir	16"	m. buona / scarso	è una piccola galassia facile da vedere, orientata da NE a SW, di dimensioni 40"×30", con nucleo stellare; a prima vista sembra una stellina sfuocata — 188x.
NGC 4848	gx	12h58m06s	+28°14.5'	q 108	Com	16"	ottima / ottimo	è la componente nord-occidentale del **Grande Ammasso della Coma** — molto allungata da NE a SW, di luminosità uniforme e di dimensioni 80"×20" — 380x.
NGC 4849	gx	12h58m13s	+26°23.8'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	è un bel bozzolo circolare, diffuso, con Ø di ~ 1' e poco più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 4850	gx	12h58m22s	+27°58.0'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	rotonda, con Ø di 30"-35" e una condensazione centrale evidente di aspetto stellare — 380x.
NGC 4851	gx	12h58m22s	+28°08.9'	q 108	Com	16"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa, con Ø non superiore a 25" o 30", ma di aspetto un poco irregolare se osservata a 380x.
NGC 4853	gx	12h58m35s	+27°35.8'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	facile, abbastanza brillante, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una marcata condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
NGC 4854	gx	12h58m47s	+27°40.5'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	più debole, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 4855	gx	12h59m18s	−13°13.8'	q 284	Vir	16"	m. buona / scarso	relativamente brillante e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 80"×40", con bulge evidente ed estesa ; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 188x.
NGC 4856	gx	12h59m21s	−15°02.5'	q 284	Vir	16"	m, ottima / ottimo	presenta bulge brillante, nucleo stellare e un disco diffuso, allungata da NE a SW con dimensioni 3'×1'; c'è una stellina a ridosso del bulge verso E — 270x.
NGC 4857	gx	12h57m18s	+70°12.2'	q 26	Dra	16"	m, buona / buono	debole, con basso gradiente di luce, allungata ~ da E a W per 1'; c'è una stellina a neppure 1' verso SW — 270x.
NGC 4858	gx	12h59m02s	+28°06.9'	q 108	Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, visibile a tratti come una sorta appendice sud-occidentale della 4860; è molto piccola e non più estesa di una 15-ina di secondi — 380x.
NGC 4859	gx	12h59m02s	+26°48.9'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	è allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare abbastanza contrastato sul disco; c'è una stellina a un paio di primi verso SE — 380x.
NGC 4860	gx	12h59m04s	+28°07.4'	q 108	Com	16"	ottima / ottimo	compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 4861	gx	12h59m02s	+34°51.8'	q 108	CVn	10"	ottima / buono	debole lucore di luminosità uniforme situato tra 2 stelline deboli orientate da NNE a SSW e distanti 2.5'; sembra che la galassia occupi l'intero spazio compreso tra queste.
NGC 4862	gx	12h59m31s	−14°08.0'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, appare con relativa facilità in visione distolta a oltre 1' SE di un stellina; probabilmente rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 4863	gx	12h59m42s	−14°01.7'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme salvo un nucleo stellare che appare a tratti; è situata ~ 1' NW di una debole stellina — 270x.
NGC 4864	gx	12h59m13s	+27°58.6'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, rotonda, con Ø di 30-40 secondi, appena più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 4865	gx	12h59m20s	+28°05.0'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	piccola, compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" — 380x.
NGC 4866	gx	12h59m27s	+14°10.2'	q 194	Vir	24"	m. buona / buono	è un magnifico fuso orientato da E a W ed estesa almeno 5' o 6', con piccolo bulge molto luminoso e contrastato di dimensioni 30"×20" all'interno del quale si nota un nucleo stellare; c'è una stellina brillante a 45" WNW del nucleo (già osservata nel 10") — 450x.
NGC 4867	gx	12h59m15s	+27°58.2'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	molto piccola, quasi a ridosso di NGC 4866 verso SE, rotonda, con Ø di 15-20 secondi — 380x.
NGC 4868	gx	12h59m09s	+37°18.6'	q 108	CVn	16"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 1', poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso verso SW e un'altra brillante subito a N — 380x.
NGC 4869	gx	12h59m23s	+27°54.7'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	compatta, con condensazione centrale, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso a NE — 380x.
NGC 4870	gx	12h59m18s	+37°02.9'	q 149	CVn	16"	ottima / discreto	piccola galassia di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15", con una condensazione centrale puntiforme visibile a tratti è situata tra 2 stelline brillanti distanti 3' e orientate da WNW a ESE *(presenza di chiarore lunare)* — 270x.
NGC 4871	gx	12h59m30s	+27°57.3'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	è di dimensioni simili a NGC 4872 pur essendo più debole e di luminosità più uniforme — 380x.
NGC 4872	gx	12h59m34s	+27°56.8'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	compatta, molto piccola, con condensazione centrale evidente — 380x.
NGC 4873	gx	12h59m33s	+27°59.0'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	di aspetto simile alla 4871 e quindi piccola, rotonda, con Ø 15-20 secondi e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 4874	gx	12h59m36s	+27°57.5'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	assieme a NGC 4889 è una delle due gx più luminose del Grande Ammasso della Coma — rotonda, con Ø poco superiore a 1' con evidente condensazione centrale — 380x.
NGC 4875	gx	12h59m38s	+27°54.4'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, con Ø di una 15-ina di secondi — 380x.
NGC 4876	gx	12h59m44s	+27°54.7'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	poco più grande di NGC 4875 e poco più brillante, con dimensioni attorno a 20-30 secondi — 380x.
NGC 4877	gx	13h00m26s	−15°17.0'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 2'×45", stemperata alle 2 estremità del fuso e con bulge abbastanza evidente — 270x.
NGC 4878	gx	13h00m20s	−06°06.3'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una nucleo stellare visibile abbastanza facilmente — 270x.
NGC 4879	gx	13h00m36s	−06°04.5'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme; una coppia serrata di stelline brillanti e orientata nello stesso modo si trova subito a W — 270x.
NGC 4880	gx	13h00m10s	+12°29.0'	q 194	Vir	16"	discreta / scarso	debole, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di un paio di primi e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 4881	gx	12h59m58s	+28°14.8'	q 108	Com	16"	ottima / ottimo	rotonda, con Ø di ~ 1', diffusa; presenta lievi irregolarità di luce all'interno — 380x.
NGC 4883	gx	12h59m56s	+28°02.1'	q 108	Com	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e molto stemperata sul fondo cielo — 380x.
NGC 4885	gx	13h00m34s	−06°54.2'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	rotonda, poco diffusa, con Ø di una 40-ina di primi e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
NGC 4886	gx	13h00m04s	+27°59.2'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	debole ma facilmente. visibile, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 4887	gx	13h00m39s	−14°40.0'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	debole, allungata ~ da N a S, di dimensioni 60"×30", di luminosità un poco irregolare ma comunque poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 4889	gx	13h00m08s	+27°58.6'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	assieme a NGC 4874 è una delle due gx più luminose del **Grande Ammasso della Coma** — è orientata da E a W, di dimensioni 1.5'×1' e con alto gradiente di luce — 380x.
NGC 4890	gx	13h00m39s	−04°36.2'	q 239	Vir	24"	buona / m. buono	è un bell'ovale di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" e debolmente screziato a 450x (già debolmente visibile nel 10").
NGC 4892	gx	13h00m04s	+26°53.8'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	è un fuso di 80"×30", orientata da N a S, debole, ma facilmente visibile a 380x; è situata a W di una coppia di stelline distanti una 40-ina di secondi e orientate come la galassia.
NGC 4893	gx	13h00m00s	+37°11.6'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	debole, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20", più luminosa verso N; è situata tra 2 stelline distanti poco più di 1' in direzione NE-SW con quella NE più brillante — 380x.
NGC 4894	gx	13h00m16s	+27°58.0'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, visibile solo a momenti; non sembra più estesa di 20" — 380x.
NGC 4895	gx	13h00m18s	+28°12.1'	q 109	Com	16"	ottima / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20"; è debole, ma presenta un'evidente condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
NGC 4896	gx	13h00m31s	+28°20.8'	q 109	Com	16"	ottima / ottimo	è un debole ovale di dimensioni 30"×20", orientata N-S e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
NGC 4897	gx	13h00m53s	−13°27.0'	q 284	Vir	24"	m. buona / mediocre	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di un paio di primi; lievi discrepanze di luce appaiono sul disco, ma sono meglio evidenti scalando a 340x (nel 10" appariva solo come un debole lucore di luminosità uniforme che a 178x tendeva a stemperarsi sul fondo cielo).
NGC 4898	gx	13h00m18s	+27°57.3'	q 149	Com	16"	ottima / ottimo	piccola, compatta, di luminosità uniforme, orientata ~ NE-SW, di dimensioni 30"×20" — 380x.
NGC 4899	gx	13h00m56s	−13°57.7'	q 284	Vir	24"	m. buona / mediocre	allungata da N a S con dimensioni 2'×1', di luminosità uniforme e finemente screziata; c'è una stellina quasi a ridosso verso NNE e una abbastanza brillante poco più distante nella stessa direzione (osservabile molto debolmente anche nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4900	gx	13h00m39s	+02°30.0'	q 239	Vir	24"	discreta / ottimo	chiarore circolare di 1.5' di Ø e con gradiente di luce molto basso, all'interno del quale si nota una sorta di piccola barra orientata da NW a SE, di dimensioni 45"×15", ma poco contrastata sul disco; c'è una stellina brillante al bordo del SW (già visibile senza problemi nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 4901	gx	12h59m56s	+47°12.3'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	debole, circolare, di neppure 1' di Ø e con nucleo relativamente brillante — 270x.
NGC 4902	gx	13h00m59s	−14°30.8'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	presenta un piccolo bulge abbastanza brillante circonfuso da un tenue alone di aspetto leggermente screziato; è rotonda con Ø di Ø un paio di primi (poco meno della distanza delle due stelline brillanti situate a W — 270x.
NGC 4904	gx	13h00m59s	−00°01.6'	q 239	Vir	24"	mediocre / ottimo	appare per prima cosa una barra abbastanza brillante di dimensioni 40"×20" e orientata da E a W; il disco della gx è debole e diffuso, orientata a perpendicolo della barra (ossia da N a S) e ha dimensioni ~ 2'×1' (già debolmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 4906	gx	13h00m40s	+27°55.4'	q 149	Com	24"	ottima / ottimo	piccola, diffusa, rotonda con Ø poco maggiore di 20" e una tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
NGC 4907	gx	13h00m49s	+28°09.5'	q 109	Com	16"	ottima / ottimo	diffusa, di luminosità pressoché uniforme, pressoché circolare, con Ø di una 30-ina di secondi, piuttosto disturbata dalla luce di una stellina situata a ridosso di SW — 380x.
NGC 4908	gx	13h00m52s	+28°02.5'	q 109	Com	24"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare ben contrastato sul disco — 450x.
NGC 4911	gx	13h00m56s	+27°47.4'	q 149	Com	24"	ottima / ottimo	approssim. circolare con Ø di 45", molto diffusa e con gradiente di luce molto basso; debolmente screziata a 450x; c'è una stellina quasi a ridosso SE.
NGC 4911A	gx	13h00m54s	+27°47.0'		Com	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, estesa non più di 12"-15"; si separa facilmente dalla compagna anche a 340x, ma è meglio evidente a 450x.
NGC 4914	gx	13h00m43s	+37°19.0'	q 109	CVn	10"	ottima / buono	allungata ~ da N a S, di dimensioni 2'×1', diffusa e con condensazione centrale evidente.
NGC 4915	gx	13h01m28s	−04°32.8'	q 239	Vir	16"	m. buona / scarso	brillante, presenta un bulge marcato con evidente nucleo stellare circonfuso da un alone rotondo molto tenue, stemperato sul fondo cielo e con Ø di 1.5' — 188x.
NGC 4916	gx	13h00m40s	+37°23.5'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	elusiva, molto piccola, poco più che una stellina sfuocata; sono riuscito a catturarla solo a 380x grazie alla bontà del seeing, ma è visibile solo a momenti.
NGC 4917	gx	13h00m55s	+47°13.3'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	debole, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 4918	gx	13h01m51s	−04°30.1'	q 239	Vir	16"	m. buona / scarso	molto debole, piccola e diffusa; in visione distolta appare a tratti orientata ~ da E a W con dimensioni 40"×20" — 188x.
NGC 4919	gx	13h01m18s	+27°48.5'	q 149	Vir	24"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare poco contrastato — 450x.
NGC 4920	gx	13h02m04s	−11°22.7'	q 284	Vir	16"	m. buona / ottimo	sembra leggermente allungata da N a S, di dimensioni 50"×40", diffusa e appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 4921	gx	13h01m26s	+27°53.1'	q 149	Com	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø che in visione distolta arriva a 1.5' e con piccolo bulge quasi stellare; più interessante se si scala a 340x.
NGC 4922	gx	13h01m24s	+29°18.5'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	presenta un piccolo bulge abbastanza brillante che sembra leggermente spostato a W; un baffo si diparte verso N; nel complesso appare diffusa, allungata da N a S e con dimensioni 40"×20" — 380x.
NGC 4923	gx	13h01m32s	+27°50.8'	q 149	Com	24"	ottima / ottimo	allungata da E a W, molto diffusa alle due estremità, di dimensioni 70"×30" e con bulge quasi stellare abbastanza marcato — 450x.
NGC 4924	gx	13h02m13s	−14°58.2'	q 284	Vir	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di oltre 1' — 270x.
NGC 4925	gx	13h02m07s	−07°42.6'	q 284	Vir	16"	m. buona / ottimo	facile, abbastanza compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 4926	gx	13h01m54s	+27°37.5'	q 149	Com	16"	buona / buono	rotonda, diffusa, con Ø di ~ 1' (poco meno della distanza delle 2 stelline brillanti situate 4' a W) e con evidente condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 4926A	gx	13h02m08s	+27°38.9'	q 284	Com	16"	buona / buono	più piccola e debole di NGC 4926, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale visibile abbastanza facilmente a 270x.
NGC 4927	gx	13h01m58s	+28°00.3'	q 109	Com	24"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
NGC 4928	gx	13h03m00s	−08°05.1'	q 284	Vir	24"	m. buona / m. buono	brillante, poco diffusa e con basso gradiente di luce, a tratti leggermente screziata, rotonda con Ø di 45" (osservabile molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4929	gx	13h02m44s	+28°02.7'	q 109	Com	24"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con piccolo bulge abbastanza contrastato; c'è una stellina a 1' scarso verso W — 450x.
NGC 4931	gx	13h03m01s	+28°01.9'	q 109	Com	24"	ottima / ottimo	allungata da E a W, molto diffusa alle due estremità, di dimensioni 70"×30" e con nucleo stellare marcato — 450x.
NGC 4932	gx	13h02m38s	+50°26.3'	q 48	CVn	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stella brillante a 1.5' verso S e una debole quasi a ridosso SW (appariva elusivamente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4933A	gx	13h03m57s	−11°29.9'	q 284	Vir	24"	m. buona / mediocre	relativamente brillante, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40" — 450x.
NGC 4933B	gx	13h03m54s	−11°30.3'	q 284	Vir	24"	m. buona / mediocre	situata a ridosso SW della precedente, è allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×30", diffusa e con nucleo quasi stellare — 450x.
NGC 4933C	gx	13h04m01s	−11°29.4'	q 284	Vir	24"	m. buona / mediocre	è un'elusiva macchiolina rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e che appare solo a momenti in visione distolta a 450x.
NGC 4934	gx	13h03m16s	+28°01.8'	q 109	Com	24"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con gradiente di luce molto basso; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo orientale — 450x.
NGC 4935	gx	13h03m21s	+14°22.7'	q 194	Com	16"	m. buona / ottimo	debole, circolare, diffusa, con basso gradiente di luce e Ø di ~ 1', con un piccolo nucleo stellare visibile senza problemi — 270x.
NGC 4938	gx	13h02m57s	+51°19.1'	q 48	CVn	16"	discreta / buono	all'incirca rotonda con Ø < 40", presenta un nucleo puntiforme percettibile a tratti, un piccolo bulge diffuso e un alone molto tenue — 188x.
NGC 4939	gx	13h04m14s	−10°20.4'	q 284	Vir	24"	buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S, di dimensioni 4'×2', con piccolo nucleo di aspetto stellare; meglio contrastata scalando a 340x (era debolmente visibile anche nel 10" a 118x in ottime condizioni di visibilità).
NGC 4941	gx	13h04m13s	−05°33.1'	q 284	Vir	10"	buona / buono	presenta un bulge molto brillante che a 178x pare disuniforme in luminosità e un alone molto diffuso; è allungata da N a S con dimensioni 2'×1; c'è una stellina brillante a 2.5' verso S.
NGC 4942	gx	13h04m19s	−07°39.0'	q 285	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole chiazza diffusa, di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 1.5'×1' — 270x.
NGC 4943	gx	13h03m45s	+28°05.0'	q 109	Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, poco allungata da E a W, di dimensioni 30"×20", appena più brillante all'interno — 380x.
NGC 4944	gx	13h03m50s	+28°11.1'	q 109	Com	16"	m. buona / ottimo	abbastanza facile, molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×30", con bulge piccolo e marcato; c'è una stellina brillante 1.5' a NE — 380x.
NGC 4948	gx	13h04m56s	−07°56.8'	q 285	Vir	24"	buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20"; c'è un piccolo triangolo a ridosso verso SE — 450x.
NGC 4948A	gx	13h05m05s	−08°09.7'	q 285	Vir	24"	buona / ottimo	più debole della precedente situata 13' più a N, molto diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 60"×45"; meglio definita scalando a 340x (era abbastanza al limite della visibilità nel 16").
NGC 4949	gx	13h04m18s	+29°01.7'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	è la più evanescente di un terzetto di cui fanno parte NGC 4952 ed NGC 4966; debolissima e molto piccola; a tratti, a 380x, sembra mostrare una nucleo stellare; le 3 stelline poste ad arco situate a SE e a E sono tutte visibili.
NGC 4951	gx	13h05m08s	−06°29.6'	q 285	Vir	24"	buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 2'×1'; qualche lieve discrepanza di luce appare sul disco a 450x (era debolmente visibile anche nel 10" a 178x e in buone condizioni di visibilità).
NGC 4952	gx	13h04m59s	+29°07.4'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	poco più brillante e più piccola della 4966 osservata per prima; è un ovale di 30"×20" orientata da N a S e con una marcata condensazione centrale — 380x.
NGC 4954	gx	13h02m19s	+75°24.3'	q 10	Dra	24"	m. buona / buono	diffusa, poco allungata da E a W, dimensioni e con basso gradiente di luce e un nucleo stellare abbastanza evidente (era debolmente visibile anche nel 10" a 178x); altresì nota come NGC 4972 — 450x.
NGC 4955	gx	13h06m05s	−29°45.2'	q 370	Hya	16"	ottima / ottimo	debole, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45; c'è una stellina a poco più di 1' verso SW — 270x.
NGC 4956	gx	13h05m01s	+35°10.7'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	relativamente brillante, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, con alto gradiente di luce e nucleo brillante di aspetto stellare — 380x.
NGC 4957	gx	13h05m13s	+27°34.2'	q 150	Com	16"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di 1', poco diffusa e con piccolo nucleo brillante; c'è una debole stellina un paio di primi a SSE e un'altra più brillante più o meno alla stessa distanza verso NW — 380x.
NGC 4958	gx	13h05m49s	−08°01.2'	q 285	Vir	24"	buona / ottimo	bella, molto allungata da N a S con dimensioni 3'×45"; presenta un piccolo bulge marcato di dimensioni 30"×20", screziato a 450x, su un disco tutto sommato abbastanza uniforme; c'è una stellina brillante subito a W (facilmente visibile anche nel 10" a 178x).
NGC 4959	gx	13h05m41s	+33°10.7'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	molto debole, abbastanza compatta, rotonda, con Ø di ~ 20", osservabile anche in visione diretta; presenta un piccolo nucleo stellare osservabile a tratti — 380x.
NGC 4960	gx	13h05m53s	+27°33.1'	q 150	Com	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima galassietta rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o 25", diffusa e appena percettibile a 380x.
NGC 4961	gx	13h05m48s	+27°44.0'	q 150	Com	16"	buona / discreto	dimensioni poco superiori a NGC 4957, grosso modo circolare con Ø > 1', diffusa e poco più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 4963	gx	13h05m52s	+41°43.3'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	piccola galassia rotondo con Ø di 45", con marcata condensazione centrale e debole alone circonfuso; c'è una stellina a neppure 1' verso S (o SSE) — 270x.
NGC 4964	gx	13h05m25s	+56°19.3'	q 48	UMa	16"	buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40" e con condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE — 270x.
NGC 4965	gx	13h07m10s	−28°13.6'	q 370	Hya	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, di aspetto irregolare e dimensioni di almeno 3'; si vede comunque abbastanza facilmente il visione distolta; la gx si trova 7' a N di una stellina doppia dalle componenti brillanti separate da ~ 40" e orientate in direzione NW-SE — 270x.

NGC 4966	gx	13h06m17s	+29°03.8'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	è un ovale di luminosità pressoché uniforme, orientata da NW a SE, di dimensioni 40"×20", ma in parte disturbato dalla luce di una stella brillante di magnitudo 6.5 situata ~ 2' a SW — 380x.
NGC 4967	gx	13h05m36s	+53°33.8'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	molto debole e diffusa, rotonda con un Ø che in visione distolta arriva a una 40-ina di secondi e con nucleo di aspetto stellare; c'è una debole stellina a ridosso verso SW — 188x.
NGC 4968	gx	13h07m06s	−23°40.6'	q 330	Hya	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni ~ 60"×30"; un nucleo stellare appare abbastanza facilmente in visione diretta — 270x.
NGC 4969	gx	13h07m03s	+13°38.2'	q 195	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, forse allungata da E a W, con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 270x.
NGC 4970	gx	13h07m34s	−24°00.5'	q 330	Hya	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30", gradatamente più brillante all'interno e con nucleo stellare evidente — 270x.
NGC 4971	gx	13h06m55s	+28°32.9'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	molto piccola, rotonda, diffusa, con Ø massimo di 20" con piccola condensazione centrale; tutto sommato è un oggetto abbastanza facile — 380x.
NGC 4973	gx	13h05m32s	+53°41.1'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	molto debole, approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; è osservabile con un certa facilità solo in visione distolta — 188x.
NGC 4974	gx	13h05m56s	+53°39.5'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	situata a 4' SE di NGC 4973, appare molto diffusa, rotonda con Ø di 1' e tenue condensazione centrale abbastanza evidente a 188x.
NGC 4975	gx	13h07m50s	−05°01.1'	q 238	Vir	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale molto brillante [presenza di Giove a 1.5° verso W] — 450x.
NGC 4977	gx	13h06m05s	+55°39.3'	q 48	UMa	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' e un nucleo stellare abbastanza evidente; più interessante scalando a 340x (era visibile molto debolmente anche nel 10" a 178x).
NGC 4978	gx	13h07m50s	+18°24.9'	q 150	Com	16"	m. buona / discreto	debole, con nucleo stellare; presenta un alone diffuso, orientata da NW a SE e di dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 4979	gx	13h07m43s	+24°48.6'	q 150	Com	16"	buona / discreto	molto debole e di aspetto un po' confuso, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale; la gx è disturbata dalla luce della SAO 82666 di 7ª grandezza situata 4' ENE — 188x.
NGC 4980	gx	13h09m10s	−28°38.5'	q 370	Hya	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, appena più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 80"×40" a 188x.
NGC 4981	gx	13h08m49s	−06°46.7'	q 285	Vir	24"	buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 1'×1.5' e con nucleo stellare; il disco mostra qualche lieve discrepanza di luce all'interno; c'è una stellina brillante al bordo SSE (già precedentemente osservata nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4983	gx	13h08m27s	+28°19.2'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20", con condensazione centrale piccola visibile solo a momenti — 380x.
NGC 4984	gx	13h08m57s	−15°31.0'	q 285	Vir	24"	buona / ottimo	presenta un bulge rotondo con Ø di una 30-ina di secondi circonfuso da un tenue alone orientata da NNE a SSW con dimensioni 2.5'×1.5' (già precedentemente osservata nel 10" a 240x) — 450x.
NGC 4985	gx	13h08m12s	+41°40.6'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	presenta un nucleo abbastanza brillante e un debole alone circonfuso, molto stemperato sul fondo cielo ed estesa poco meno di 1'; c'è una debole stellina un paio di primi a E — 270x.
NGC 4986	gx	13h08m24s	+35°12.4'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	è una piccola gx di aspetto diffuso, grosso modo rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e un piccolo bulge quasi stellare appena più brillante; c'è una stellina molto evidente proprio al bordo meridionale — 380x.
NGC 4987	gx	13h07m59s	+51°55.8'	q 48	CVn	24"	buona / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con un bulge contrastato (appariva molto debole e tondeggiante nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 4989	gx	13h09m16s	−05°23.8'	q 285	Vir	24"	m. buona / buono	presenta un piccolo bulge rotondo e brillante con Ø di una 20-ina di secondi, al centro un nucleo stellare, il tutto circonfuso da un tenue alone molto stemperato sul fondo cielo, orientato da N a S ed esteso 80"×40" [presenza di Giove a 1.5° WNW] — 450x.
NGC 4990	gx	13h09m17s	−05°16.4'	q 285	Vir	24"	m. buona / buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare molto brillante [presenza di Giove a 1.5° verso W] — 450x.
NGC 4991	gx	13h09m15s	+02°20.8'	q 240	Vir	16"	ottima / discreto	molto debole e diffusa, appare a tratti con una debole condensazione centrale e con dimensioni max 45"; meglio scalare a 188x; nel campo sono presenti stelline molto deboli — sta finendo ora il crepuscolo: al momento dell'osservazione la gx non era più alta di 30° sull'orizzonte occidentale — 270x.
NGC 4992	gx	13h09m06s	+11°38.0'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente, contrastato e un nucleo stellare; più interessante scalando a 340x.
NGC 4993	gx	13h09m47s	−23°23.0'	q 330	Hya	16"	m. buona / m. buono	piccola e debole galassia circolare, relativamente compatto, estesa per max 25" o 30", con nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 4995	gx	13h09m41s	−07°50.0'	q 285	Vir	24"	buona / ottimo	diffusa e debolmente screziata a 450x, approssim. rotonda con Ø 80" e nucleo stellare ; si nota una sorta di "settore circolare" poco più brillante all'interno del disco verso NE; c'è una debole stellina quasi a ridosso E (era debolmente osservabile anche nel 10" a 178x).
NGC 4996	gx	13h09m32s	+00°51.5'	q 240	Vir	16"	discreta / scarso	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina brillante un paio di primi a ESE e un'altra ancora più luminosa a 4' verso E con le quali la galassia forma un piccolo triangolo isoscele molto schiacciato — 188x.
NGC 4997	gx	13h09m51s	−16°30.9'	q 285	Vir	16"	m. buona / buono	facile, presenta un nucleo stellare brillante e un alone allungata da E a W di dimensioni 60"×30"; è situata un paio di primi a E dalla SAO 157759 di magnitudo 6.8 (il cielo non è ancora completamente scuro) — 270x.
NGC 4998	gx	13h08m10s	+50°39.8'	q 48	CVn	16"	discreta / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, grosso modo circolare con Ø di 1' scarso; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso NW — 188x.
NGC 4999	gx	13h09m33s	+01°40.3'	q 240	Vir	24"	buona / m. buono	presenta un piccolo nucleo stellare brillante circonfuso da un alone rotondo con Ø < 2' e sul quale si notano a tratti alcune lievi discrepanze di luce; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E (la gx era osservabile, molto debolmente, anche nel 10"; una tenue condensazione centrale appariva in visione distolta a 118x) — 450x.
NGC 5000	gx	13h09m47s	+28°54.4'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	debole, con bassa luminanza superficiale, molto diffusa e di aspetto generale un po' confuso; è orientata da E a W con dimensioni 60"×40" e appena più brillante all'interno — 380x.
NGC 5001	gx	13h09m33s	+53°29.6'	q 48	UMa	24"	m. buona / buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina brillante a 1' verso NE (era già visibile, seppure molto debolmente, nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 5002	gx	13h10m38s	+36°38.0'	q 109	CVn	16"	buona / mediocre	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S, con dimensioni 1.5'×1'; c'è una stellina a ridosso verso NW — 188x.
NGC 5003	gx	13h08m38s	+43°44.2'	q 75	CVn	24"	m. buona / buono	diffusa rotonda con Ø di 45" e con una piccola condensazione centrale evidente; situata subito a S di una losanga di 4 stelline abbastanza brillanti — 450x.
NGC 5004	gx	13h11m02s	+29°38.2'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	è un piccolo ovale abbastanza facile con una marcata condensazione centrale, poco allungata da N a S e di dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 5004A	gx	13h11m02s	+29°34.7'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	debole, posta praticamente di taglio, orientata in direzione N-S per 45"; c'è una stellina brillante al margine meridionale — 380x.
NGC 5005	gx	13h10m56s	+37°03.5'	q 109	CVn	24"	ottima / m. buono	molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 5'×1.5', con bulge poco contrastato sul disco, nucleo stellare e un alone molto diffuso; appare screziata a 450x (era già una bella gx molto facile anche nel 10" a 126x).
NGC 5006	gx	13h11m46s	−19°15.7'	q 330	Vir	16"	m. buona / m. buono	allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e con condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 270x.
NGC 5007	gx	13h09m14s	+62°10.5'	q 26	UMa	16"	m. buona / mediocre	relativamente compatta, pressoché rotonda, con nucleo stellare e con Ø di una 40-ina di secondi; è disturbata dalla luce di una brillante stella di 6ª situata 4.5' NE; a 1' verso WNW, invece, c'è una stellina debole — 270x.
NGC 5009	gx	13h10m47s	+50°05.6'	q 48	CVn	16"	discreta / buono	è molto debole, ma appare facilmente in visione distolta a 188x grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 188x.
NGC 5010	gx	13h12m26s	−15°47.8'	q 285	Vir	16"	ottima / ottimo	è un debole ovale di luminosità quasi uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1.5' verso N — 270x.
NGC 5012	gx	13h11m37s	+22°54.9'	q 150	Com	16"	buona / discreto	bella, allungata da N a S, di dimensioni 2'×1', con bulge brillante e diffuso; c'è una stellina a una 30-ina di secondi dal nucleo verso N — 188x.
NGC 5013	gx	13h12m07s	+03°11.9'	q 240	Vir	16"	m. buona / buono	piccola, debole, di luminosità uniforme, poco diffusa e con dimensioni di ~ 30"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso E — 270x.
NGC 5014	gx	13h11m31s	+36°16.9'	q 109	CVn	16"	m. buona / scarso	relativamente compatta e brillante, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da E a W, con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina un paio di primi a SW — 188x.
NGC 5015	gx	13h12m23s	−04°20.2'	q 240	Vir	16"	discreta / scarso	è di forma piuttosto irregolare, all'incirca rotonda con Ø di 1.5' e appena più brillante all'interno; situata 4' SE di una stellina brillante — 188x.
NGC 5016	gx	13h12m07s	+24°05.7'	q 150	Com	16"	buona / discreto	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di 1' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una debole stellina a 1' verso N — 188x.
NGC 5017	gx	13h12m54s	−16°46.0'	q 285	Vir	16"	m. buona / buono	poco diffusa, approssim. rotonda, con Ø di 45" e con bulge evidente — il cielo non è ancora completamente scuro — 270x.
NGC 5018	gx	13h13m01s	−19°31.1'	q 330	Vir	16"	m. buona / m. buono	bella, presenta un bulge brillante e un nucleo stellare circonfuso da un alone rotondo, screziato con Ø di ~ 1.5'; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 270x.
NGC 5019	gx	13h12m43s	+04°43.8'	q 240	Vir	16"	discreta / scarso	debolissima ma visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 188x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme.
NGC 5020	gx	13h12m40s	+12°36.0'	q 195	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di un paio di primi, bulge marcato, e un brillante nucleo stellare; in visione diretta, tuttavia, sembra allungata da N a S, come se avesse dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 5021	gx	13h12m06s	+46°11.8'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di aspetto un po' irregolare, allungata da E a W con dimensioni che in visione distolta appaiono di 80"×30", gradatamente più brillante verso l'interno e con una piccola zona molto debole che aggetta verso S (forse una stellina o un nodulo galattico); una stellina brillante si trova a 1' NE — 450x.
NGC 5022	gx	13h13m31s	−19°32.8'	q 330	Vir	16"	m. buona / m. buono	è una lama di luce di aspetto un po' irregolare, estesa un paio di primi in direzione NNE-SSW — 270x.
NGC 5023	gx	13h12m12s	+44°02.3'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	è una bella lama di luce debolmente screziata a 450x, orientata da NNE a SSW, estesa 4', spessa non più di 30" e con gradiente di luce molto basso; c'è una stellina a "metà gx" a 1' verso NNW.
NGC 5025	gx	13h12m45s	+31°48.5'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", ma con basso gradiente di luce; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso N dall'estremità NW — 380x.
NGC 5027	gx	13h13m21s	+06°03.7'	q 195	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole lucore di luminosità uniforme, approssim. circolare, con Ø di ~ 1'; c'è una debole stellina a 1' circa verso SE — 270x.
NGC 5028	gx	13h13m46s	−13°02.5'	q 285	Vir	16"	m. buona / ottimo	brillante, relativamente compatta, allungata da NW a SE, con bulge evidente e di dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso verso W — 270x.
NGC 5029	gx	13h12m38s	+47°03.8'	q 76	CVn	16"	ottima / buono	rotonda con Ø di 1' con nucleo puntiforme relativamente brillante — 270x.
NGC 5030	gx	13h13m54s	−16°29.4'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	debole, allungata da N a S con dimensioni 60"×40", appena più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso SW e un'altra poco più in là del bordo NW — 188x.
NGC 5031	gx	13h14m03s	−16°07.4'	q 285	Vir	16"	ottima / ottimo	allungata da WNW a ESE, con dimensioni 60"×30"; presenta un bulge molto brillante e marcato di aspetto quasi stellare; c'è una stellina a 1' verso E — 270x.
NGC 5032	gx	13h13m27s	+27°48.1'	q 150	Com	16"	buona / ottimo	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, solo leggermente più luminosa all'interno e diffusa ai bordi, allungata da N a S, con dimensioni 60"×45"; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da NE a SW — 380x.
NGC 5033	gx	13h13m28s	+36°35.6'	q 109	CVn	24"	ottima / m. buono	molto diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 4'×1.5' e con nucleo stellare molto marcato; c'è una stellina brillante al bordo NNW e un'altra più debole a ridosso verso W; una 3ª stellina ancora più debole si trova invece a S; scalando a 340x la gx appare ancora più estesa, ~ 6'×2', ma coi bordi piuttosto confusi e sfilacciati (già osservata col 10" nel quale appariva diffusa e con un piccolo nucleo evidente).
NGC 5034	gx	13h12m19s	+70°39.0'	q 26	UMi	16"	m. buona / buono	approssim. circolare, con Ø di ~ 1', molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 5035	gx	13h14m49s	−16°29.5'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	debole, allungata da N a S con dimensioni 60"×40", appena più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso SW e un'altra poco più in là del bordo NW — fa parte di un interessante gruppo di galassie — 188x.
NGC 5036	gx	13h14m43s	−04°10.7'	q 240	Vir	24"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo evidente quasi stellare — 450x.
NGC 5037	gx	13h14m59s	−16°35.5'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30", diffusa alle estremità NW e SW, con bulge brillante rotondo e nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina abbastanza brillante proprio al bordo nord-orientale — 188x.
NGC 5038	gx	13h15m02s	−15°57.1'	q 285	Vir	16"	ottima / ottimo	è una brillante lama di luce estesa per poco meno di 2' da E a W e di luminosità quasi costante — 270x.
NGC 5039	gx	13h14m52s	−04°09.5'	q 240	Vir	24"	m. buona / buono	piuttosto debole e di aspetto uniforme, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; situata tra due stelline abbastanza brillanti distanti 3' in direzione N-S — 450x.
NGC 5040	gx	13h13m33s	+51°15.5'	q 48	CVn	16"	discreta / buono	diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 60"×40" e con marcata condensazione centrale — 188x.
NGC 5041	gx	13h14m33s	+30°42.3'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	debole, allungata da NW a SE, dimensioni 45"×30", con bulge diffuso e poco evidente rispetto all'alone — 380x.
NGC 5042	gx	13h15m31s	−23°59.0'	q 330	Hya	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e disturbata dalla luce di una stella brillante situata un paio di primi verso W; in visione distolta appare di dimensioni 4'×2' e orientata da NNE a SSW — 270x.
NGC 5044	gx	13h15m24s	−16°23.1'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	bella, rotonda, diffusa, con Ø di una paio di primi, gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina doppia dalle componenti deboli e ravvicinate a ~ 3' dal bordo SW — 188x.
NGC 5046	gx	13h15m45s	−16°19.6'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	rotonda, relativamente compatta, con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 5047	gx	13h15m48s	−16°31.1'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 80"×30" con bulge evidente estesa nella stessa direzione — 188x.
NGC 5048	gx	13h16m08s	−28°24.6'	q 370	Hya	16"	m. buona / m. buono	è poco più contrastata di NGC 5051 approssim. rotonda con Ø di ~ 40" e appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 5049	gx	13h15m59s	−16°23.9'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	poco allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo di aspetto quasi stellare — 188x.
NGC 5050	gx	13h15m42s	+02°52.7'	q 240	Vir	16"	m. buona / buono	piccola e compatta, con nucleo puntiforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline distanti una 30-ina di secondi a un paio di primi verso NW — 270x.
NGC 5051	gx	13h16m20s	−28°17.1'	q 370	Hya	16"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 5052	gx	13h15m35s	+29°40.5'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	abbastanza brillante, con un nucleo luminoso, ma di luminosità nel complesso un po' irregolare; è grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 5053	ag	13h16m27s	+17°41.9'	q 150	Com	16"	m. buona / buono	appare già fittamente granulato a 132x; diviene in gran parte risolto a 270x, pur restando alquanto deludente; è grosso modo rotondo con Ø di 6', ma le stelline più luminose sovrapposte gli conferiscono un aspetto un po' irregolare; c'è una stellina brillante subito a E.
NGC 5054	gx	13h16m58s	−16°38.1'	q 285	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo; presenta un piccolo bulge brillante e contrastato, ma il sistema di bracci è piuttosto confuso; a 340x appare di forma vagamente triangolare col vertice più acuto che punta a S; la gx è orientata da N a S con dimensioni grosso modo 3'×2'; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E (al momento dell'osservazione si trovava già oltre il meridiano; era comunque già debolmente osservabile nel 10" a 118x).
NGC 5056	gx	13h16m12s	+30°57.0'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	relativamente brillante, ma di luminosità uniforme; è un ovale di 60"×30" orientata da N a S; c'è una stellina a 1' verso SE — 380x.
NGC 5057	gx	13h16m28s	+31°01.9'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	presenta un nucleo brillante, marcato e un tenuissimo alone; probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 5058	gx	13h16m52s	+12°32.9'	q 195	Vir	16"	m. buona / ottimo	è un debole piccola galassia di luminosità uniforme, forma indistinta, ma non più estesa di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 5059	gx	13h16m58s	+07°50.7'	q 195	Vir	16"	buona / ottimo	elusiva, piccola, diffusa, visibile solo a momenti in visione distolta — 380x.
NGC 5060	gx	13h17m16s	+06°02.2'	q 195	Vir	16"	buona / ottimo	debole e con basso gradiente di luce, relativamente compatta, allungata da NE a SW, con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 5061	gx	13h18m05s	−26°50.2'	q 330	Hya	16"	m. buona / m. buono	presenta un marcato nucleo stellare, un bulge evidente circonfuso da un disco rotondo a tratti screziato che in visione distolta si estende per un paio di primi; c'è una stellina a ridosso di NE — 270x.
NGC 5065	gx	13h17m31s	+31°05.5'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
NGC 5066	gx	13h18m28s	−10°14.0'	q 285	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S e con dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 5068	gx	13h18m55s	−21°02.3'	q 330	Vir	16"	m. buona / m. buono	è una grossa bolla approssim. rotonda con Ø di 5'; appare all'interno una sorta di barra più luminosa orientata grosso modo da N a S; è lambita a N e a W da due stelline — 270x.
NGC 5070	gx	13h19m18s	−12°29.0'	q 285	Vir	16"	m. buona / discreto	debolissima, appare a tratti molto allungata da N a S per ~ 1' fissando lo sguardo sulla stellina situata subito a E; c'è una stellina brillante a 3' NNW che disturba l'osservazione — 270x.
NGC 5071	gx	13h18m37s	+07°56.1'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" o poco più — 450x.
NGC 5072	gx	13h19m12s	−12°32.4'	q 285	Vir	16"	m. buona / discreto	allungata più o meno nella stessa direzione della 5077, è relativamente compatta con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso del bordo meridionale (a meno che non si tratti di un semplice nodulo del disco) — 270x.
NGC 5073	gx	13h19m21s	−14°50.6'	q 285	Vir	16"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme ed estesa per almeno 3' in direzione NW-SE — 270x.
NGC 5074	gx	13h18m26s	+31°28.1'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	piccola e debole, rotondeggiante con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 5075	gx	13h19m06s	+07°49.9'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' ENE e una visibile solo a momenti a ridosso SW — 450x.
NGC 5076	gx	13h19m30s	−12°44.5'	q 285	Vir	16"	m. buona / discreto	più piccola della 5079, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e con nucleo stellare abbastanza evidente — 270x.
NGC 5077	gx	13h19m32s	−12°39.4'	q 285	Vir	16"	m. buona / discreto	facile, poco allungata ~ da N a S, di dimensioni 90"×60", con alto gradiente di luce e nucleo brillante — 270x.
NGC 5078	gx	13h19m50s	−27°24.6'	q 330	Hya	16"	m. buona / m. buono	bella, presenta un bel bulge brillante, estesa e un nucleo stellare; il disco è molto allungata da NW a SE con dimensioni 3.5'×1.5' — 270x.
NGC 5079	gx	13h19m38s	−12°41.9'	q 285	Vir	16"	m. buona / discreto	debole chiazza molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, estesa per ~ 1' e visibile facilmente anche in visione diretta; non si riesce però a capirne la forma — 270x.
NGC 5080	gx	13h19m19s	+08°25.7'	q 185	Vir	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, ma dai bordi confusi, approssim. circolare con Ø di ~ 45"; presenta un nucleo molto brillante di aspetto stellare (ma non si tratterà effettivamente una stellina sovrapposta?) — 270x.
NGC 5081	gx	13h19m08s	+28°30.4'	q 109	Com	16"	buona / ottimo	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30", con bulge poco più brillante, anche se poco contrastato sul disco; questo appare a momenti con lievi irregolarità di luce all'interno; c'è una stellina a ridosso verso NW. L'osservazione è stata fatta a 380x per tenere fuori campo una stella brillante di 7ª grandezza.
NGC 5083	gx	13h19m03s	+39°35.3'	q 76	CVn	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme e di aspetto nel complesso piuttosto confuso; è probabilmente rotonda, con Ø di ~ 1.5' — 270x.
NGC 5084	gx	13h20m17s	−21°49.6'	q 330	Vir	16"	ottima / m. buono	bella, estesa ~ 4', posta di taglio e orientata in direzione E-W; presenta un bulge luminoso esteso e un marcato nucleo di aspetto decisamente stellare — 270x.
NGC 5085	gx	13h20m18s	−24°26.4'	q 330	Hya	16"	ottima / m. buono	debole, di aspetto un po' confuso, approssim. circolare con Ø di ~ 3'; presenta basso gradiente di luce e presenta lievi irregolarità di luce — 270x.
NGC 5087	gx	13h20m25s	−20°36.6'	q 330	Vir	16"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30", con bulge brillante estesa e contrastato sul disco — 270x.
NGC 5088	gx	13h20m20s	−12°34.3'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	facile, molto allungata da N a S, di dimensioni 100"×40", abbastanza definita ai bordi e con piccolo bulge centrale evidente — 188x.
NGC 5089	gx	13h19m39s	+30°15.4'	q 285	Com	16"	buona / ottimo	gx relativamente facile, ma di aspetto un po' irregolare, estesa per ~ 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di SW — 380x.
NGC 5092	gx	13h19m51s	+23°00.0'	q 150	Com	16"	m. buona / buono	rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, debole condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina a ~ 1' SSE — 270x.
NGC 5093	gx	13h19m38s	+40°23.2'	q 76	CVn	16"	m. buona / m. buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con bulge brillante e nucleo marcato di aspetto stellare — 270x.
NGC 5094	gx	13h20m47s	−14°04.8'	q 285	Vir	24"	m. buona / discreto	diffusa e con elevato gradiente di luce, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" (essendo non proprio rotonda); c'è una stellina a 1' SE e una appena percettibile subito a E — 450x.
NGC 5095	gx	13h20m37s	−02°17.4'	q 240	Vir	16"	m. buona / buono	debole, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a un paio di primi verso SW — 270x.
NGC 5096	gx	13h20m09s	+33°05.3'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	rotonda, con Ø di ~ 40", luminosità regolare, con piccola condensazione centrale; a tratti la forma appare un po' irregolare — 380x.
NGC 5097	gx	13h21m00s	−12°28.3'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	piccolo ovale relativamente compatto, di dimensioni 40"×30", orientata da NE a SW con bulge evidente di aspetto quasi stellare — 188x.
NGC 5098	gx	13h20m09s	+33°05.5'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	situata a ridosso NE della 5096, è molto piccola e a ingrandimenti inferiori appare solo come una stellina leggermente sfuocata — 380x.
NGC 5099	gx	13h21m20s	−13°02.5'	q 285	Vir	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
NGC 5100	gx	13h20m59s	+08°58.7'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 50"×25" — 450x.
NGC 5101	gx	13h21m46s	−27°26.0'	q 330	Hya	16"	ottima / m. buono	è una gx luminosa con alto gradiente di luce e che presenta come 2 "baffi" che si dipartono in direzione opposta, uno a NW e l'altro a SE; le dimensioni totali dell'oggetto sono di 90"×45"; c'è una stellina a 1.5' verso W. Potrebbe darsi, tuttavia, che l'oggetto sia immerso in un alone molto tenue che, data la bassissima altezza sull'orizzonte, non sono riuscito a vedere — 270x.
NGC 5103	gx	13h20m30s	+43°05.0'	q 76	CVn	16"	buona / mediocre	relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40", con nucleo puntiforme e brillante; c'è una stellina subito a NE; disturbata in parte dalla SAO 44572 di magnitudo 7.6 situata a neanche 2' verso N — 188x.
NGC 5104	gx	13h21m23s	+00°20.5'	q 240	Vir	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" (o poco più) e con bulge diffuso, poco contrastato sul disco — 450x.
NGC 5105	gx	13h21m49s	−13°12.4'	q 285	Vir	16"	m. buona / scarso	è una bolla circolare molto evanescente, di luminosità uniforme, con Ø di almeno 1.5' che sembra come "accendersi" in visione distolta — 188x.
NGC 5107	gx	13h21m25s	+38°32.2'	q 109	CVn	16"	m. buona / scarso	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×20" e con bulge evidente, ma poco contrastato sul disco; è situata ~ 4' W di una stella abbastanza luminosa — 188x.
NGC 5109	gx	13h20m52s	+57°38.7'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 80"×20" e poco più brillante verso l'interno; appare debolmente screziata nei pochi, rari momenti di calma atmosferica — 188x.
NGC 5110	gx	13h22m37s	−13°04.0'	q 285	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, situata a ~ 1' SW di una stellina, a tratti appare orientata da E a W ed estesa una 20-ina di secondi; ho impiegato 380x per tenere fuori campo una doppia brillante situata 8' a S — 270x.
NGC 5111	gx	13h22m57s	−12°57.8'	q 285	Vir	16"	m. buona / ottimo	presenta una condensazione centrale molto marcata e un tenue alone circonfuso, stemperato sul fondo cielo, rotondo con Ø > di 1' — 270x.
NGC 5112	gx	13h21m56s	+38°44.1'	q 109	CVn	24"	ottima / m. buono	è di aspetto piuttosto irregolare, anche se abbastanza uniforme in brillanza; appare nel complesso orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 3'×2'; screziata a 450x; c'è una stellina al margine N; un debole nodulo diffuso protrude verso SE; sempre a SE e quasi a ridosso della gx c'è una stellina brillante (la galassia era già stata precedentemente osservata sia nel 10", sia nel 16").
NGC 5113	gx	13h21m24s	+57°41.7'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	debolissima e osservabile solo di sfuggita in visione distolta a 5' NE della 5109; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 188x.
NGC 5115	gx	13h23m00s	+13°57.0'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 5116	gx	13h22m56s	+26°58.9'	q 150	Com	16"	buona / discreto	poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a un paio di primi NW — 188x.
NGC 5117	gx	13h22m56s	+28°19.0'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, con bassissima luminanza superficiale, allungata da NNW a SSE e di dimensioni 80"×30" — 380x.
NGC 5118	gx	13h23m28s	+06°23.6'	q 195	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole lucore molto diffuso e stemperato, appena più brillante all'interno, circolare con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 5119	gx	13h24m00s	−12°16.6'	q 285	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 60"×20", con condensazione centrale marcata e nucleo stellare — 270x.
NGC 5122	gx	13h24m15s	−10°39.3'	q 285	Vir	16"	m. buona / ottimo	piccola, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20", con evidente condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina a ridosso verso NW — 270x.
NGC 5123	gx	13h23m10s	+43°05.2'	q 76	CVn	16"	buona / mediocre	macchia tondeggiante di poco meno di 1' di Ø, relativamente brillante e appena più luminosa verso l'interno — 188x.
NGC 5125	gx	13h24m01s	+09°42.6'	q 195	Vir	16"	m. buona / ottimo	abbastanza luminosa, ma di aspetto un po' confuso, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø > di 1' — 270x.
NGC 5127	gx	13h23m45s	+31°33.9'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	è un ovale abbastanza facile, dai bordi molto stemperati, con un bulge brillante, orientata da E a W e di dimensioni 60"×45" — 380x.
NGC 5129	gx	13h24m10s	+13°58.6'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	bella, molto brillante e diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni che in visione distolta sono di 80"×60" e con bulge evidente di 30"×20"; c'è una stella brillante a 1.5' verso E — 450x.
NGC 5130	gx	13h24m27s	−10°12.6'	q 195	Vir	24"	m. buona / discreto	diffusa e relativamente brillante, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con bulge evidente — 450x.
NGC 5131	gx	13h23m57s	+30°59.3'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	è la classica galassia edge-on; è orientata da E a W per oltre 1' e con bulge brillante — 380x.
NGC 5132	gx	13h24m29s	+14°05.5'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
NGC 5133	gx	13h24m53s	−04°05.0'	q 240	Vir	16"	discreta / scarso	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, con tenui irregolarità di luce all'interno orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 188x.
NGC 5134	gx	13h25m19s	−21°08.1'	q 330	Vir	16"	m. buona / m. buono	allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'×1', diffusa e con bulge evidente, ma piuttosto "sfuocato" — 270x.
NGC 5135	gx	13h25m44s	−29°50.0'	q 370	Hya	16"	buona / buono	relativamente facile, con alto gradiente di luce e nucleo quasi stellare a 270x; è allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40".
NGC 5136	gx	13h24m51s	+13°44.3'	q 195	Vir	16"	m. buona / ottimo	piccola, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e relativamente compatta; appare facilmente a 270x.
NGC 5137	gx	13h24m53s	+14°04.6'	q 195	Vir	16"	buona / ottimo	è debolissima, ma nonostante tutto appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, poco allungata da E a W, con dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 5141	gx	13h24m52s	+36°22.7'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	è la più brillante di un quartetto cui appartengono NGC 5142, 5143 e UGC 8440 — rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, con alto gradiente di luce e nucleo di aspetto stellare — 380x.
NGC 5142	gx	13h25m01s	+36°24.0'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	poco più piccola della precedente, ma con nucleo ugualmente brillante, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 5143	gx	13h25m01s	+36°26.3'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	molto piccola, debole e stemperata sul fondo cielo, estesa non più di 20"-30"; è visibile solo a momenti, perché se si fissa a lungo il bersaglio tende a svanire — 380x.
NGC 5144	gx	13h22m54s	+70°30.9'	q 26	UMi	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, ma con gradiente di luce molto basso, estesa per max 1'; a tratti risaltano delle tenui irregolarità di luce all'interno — 270x.
NGC 5145	gx	13h25m14s	+43°16.0'	q 76	CVn	16"	buona / buono	relativamente brillante, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 1.5' e molto diffusa ai bordi — 270x.
NGC 5146	gx	13h26m37s	−12°19.4'	q 285	Vir	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta arrivano a 80"×60"; c'è una doppia stretta e sbilanciata in luminosità subito a N, mentre un'altra stellina si trova a ridosso S; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 5147	gx	13h26m20s	+02°06.0'	q 240	Vir	24"	buona / m. buono	è una chiazza pressoché circolare con Ø di 1.5', molto evidente, ma di luminosità pressoché uniforme (di fatto mostra a tratti qualche lieve irregolarità di luce); c'è una stella abbastanza brillante all'interno verso NW e un'altra più debole a ridosso di questa verso SW (debolmente osservabile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 5148	gx	13h26m39s	+02°18.8'	q 240	Vir	16"	m. buona / buono	è una debole galassietta circolare di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo NE — 270x.
NGC 5149	gx	13h26m09s	+35°56.1'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni. 80"×30", poco più brillante all'interno, ma di luminosità piuttosto irregolare; c'è una stellina al bordo NW — 380x.
NGC 5150	gx	13h26m36s	−29°33.7'	q 370	Hya	16"	buona / buono	fa parte di un terzetto assieme a NGC 5152-3 — poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45", diffusa con piccolo nucleo evidente — 270x.
NGC 5151	gx	13h26m41s	+16°52.4'	q 195	Com	16"	m. buona / ottimo	piccolo e debole galassietta rotonda con Ø non superiore a 30" e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 5152	gx	13h27m50s	−29°37.1'	q 370	Hya	16"	buona / buono	presenta un nucleo stellare abbastanza brillante e un tenuissimo alone di aspetto a prima vista un po' confuso; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×30" — 270x.
NGC 5153	gx	13h27m54s	−29°37.1'	q 370	Hya	16"	buona / buono	situata a ridosso E della precedente, è rotonda con Ø di ~ 45", molto diffusa e con piccolo nucleo ben contrastato sul disco — 270x.
NGC 5154	gx	13h26m29s	+36°00.6'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	debole, rotondeggiante, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di 45" — 380x.
NGC 5157	gx	13h27m17s	+32°01.8'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	diffusa ai bordi, approssim. circolare con Ø di 45", gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 5158	gx	13h27m47s	+17°46.7'	q 150	Com	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, approssim. circolare, poco più brillante all'interno e con Ø di 45" — 270x.
NGC 5159	gx	13h28m16s	+02°59.0'	q 109	Vir	16"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare allungata all'incirca da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 270x.
NGC 5162	gx	13h29m14s	+11°16.6'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con gradiente di luce molto basso — 450x.
NGC 5163	gx	13h26m54s	+52°45.2'	q 48	UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, di piccole dimensioni, probabilmente allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; presenta un bulge abbastanza marcato e brillante — 270x.
NGC 5164	gx	13h27m12s	+55°29.2'	q 48	UMa	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45", condensazione centrale marcata e un bulge poco più brillante dell'alone — 270x.
NGC 5165	gx	13h28m39s	+11°23.2'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
NGC 5166	gx	13h28m16s	+32°02.0'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	posta praticamente di taglio, orientata da ENE a WSW per oltre 1' e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 5167	gx	13h28m40s	+12°42.7'	q 195	Vir	16"	mediocre / discreto	debolissima, osservabile in visione distolta a 270x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da all'incirca da E a W.
NGC 5169	gx	13h28m10s	+46°40.3'	q 76	CVn	16"	buona / mediocre	debole, con gradiente di luce molto basso di luce, ma molto facile da trovare; è un bell'ovale orientata da E a W, di dimensioni 2'×1' — 188x.
NGC 5170	gx	13h29m49s	−17°58.0'	q 330	Vir	16"	ottima / m. buono	è una bella lama di luce estesa da NW a SE per almeno 7' o 8' con un brillante rigonfiamento, ma privo di nucleo; è poco più contrastata dalla parte meridionale — 270x.
NGC 5171	gx	13h29m22s	+11°44.1'	q 195	Vir	24"	buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40"; c'è una stellina evidente al margine NW — 450x.
NGC 5172	gx	13h29m19s	+17°03.2'	q 150	Com	24"	m. buona / mediocre	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, ma con basso gradiente di luce, leggermente screziata a 450x, allungata da E a W con dimensioni 2'×1.5'; c'è una stellina al bordo N (già osservata nel 10" a 178x).
NGC 5173	gx	13h28m25s	+46°35.5'	q 76	CVn	16"	buona / mediocre	situata ~ 5' SSE della 5169, presenta un bulge molto brillante e un debole alone circonfuso, rotondo, con Ø di 1' — 188x.
NGC 5174	gx	13h29m26s	+11°00.4'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 90"×45" e gradatamente più brillante verso l'interno; debolmente screziata a 450x; c'è una stellina al bordo meridionale; altresì denominata NGC 5175.
NGC 5176	gx	13h29m25s	+11°46.9'	q 195	Vir	24"	buona / buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
NGC 5177	gx	13h29m24s	+11°47.8'	q 195	Vir	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
NGC 5178	gx	13h29m29s	+11°37.5'	q 195	Vir	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso N; è molto disturbata dalla SAO 100591 di magnitudo 7.6 situata 5.5' a W — 450x.
NGC 5179	gx	13h29m31s	+11°44.7'	q 195	Vir	24"	buona / buono	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un alone molto diffuso, grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
NGC 5180	gx	13h29m27s	+16°49.5'	q 195	Com	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa e più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ridosso verso SE; screziata a 450x (debolmente osservabile anche nel 10" a 178x; anche la stellina a SE era visibile in ottime condizioni di seeing).
NGC 5181	gx	13h29m42s	+13°18.2'	q 195	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole piccola galassia approssim. circolare, diffuso e di aspetto un po' irregolare, con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti — 188x.
NGC 5182	gx	13h30m41s	−28°09.0'	q 370	Hya	16"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, salvo un piccolo nucleo stellare che però appare solo a momenti; è allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 5183	gx	13h30m06s	−01°43.2'	q 240	Vir	16"	discreta / scarso	assieme alla successiva forma una coppia di gx di dimensioni simili distanti 4' scarsi in direzione NNE-SSW, con basso gradiente di luce, ed entrambe orientate da NW a SE; la 1ª è di dimensioni 90"×30", mentre la 2ª è più cicciotta, con dimensioni 90"×45" — 188x.
NGC 5184	gx	13h30m11s	−01°39.8'	q 240	Vir	16"	discreta / scarso	v. **NGC 5183**
NGC 5185	gx	13h30m02s	+13°25.0'	q 195	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", stemperata sul fondo cielo, con bulge debole ma evidente — 270x.
NGC 5186	gx	13h30m04s	+12°10.5'	q 195	Vir	16"	buona / ottimo	galassietta elusiva, molto piccola osservabile solo a momenti in visione distolta a 380x.
NGC 5187	gx	13h29m48s	+31°07.8'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	piccolo galassia di luminosità pressoché uniforme, rotondeggiante con Ø di max 30" — 380x.
NGC 5190	gx	13h30m39s	+18°08.1'	q 150	Com	16"	m. buona / buono	debole, rotonda, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a ridosso verso NE — 270x.
NGC 5191	gx	13h30m47s	+11°12.0'	q 195	Vir	16"	mediocre / discreto	debole piccola galassia rotonda, di luminosità pressoché uniforme e di Ø inferiore a 1' — 270x.
NGC 5192	gx	13h30m52s	−01°46.7'	q 240	Vir	16"	m. buona / buono	è una piccola gx piuttosto diffusa, estesa per max 40" che salta fuori con una certa facilità in visione distolta a 270x.
NGC 5196	gx	13h31m20s	−01°36.9'	q 240	Vir	16"	m. buona / buono	relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o 35" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5197	gx	13h31m25s	−01°41.6'	q 240	Vir	16"	m. buona / buono	più debole e piccola di NGC 5196, diffusa ed estesa 20" o 30" — 270x.
NGC 5198	gx	13h30m11s	+46°40.2'	q 76	CVn	16"	buona / discreto	rotonda coi bordi molto sfumati, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a ridosso verso W — 380x.
NGC 5199	gx	13h30m43s	+34°49.8'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	rotonda, poco diffusa, di aspetto molto regolare, gradatamente più brillante all'interno e con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 5201	gx	13h29m17s	+53°04.9'	q 48	UMa	16"	ottima / ottimo	è una gx ad alto gradiente di luce, rotonda, con Ø di 1', con delle evidenti irregolarità di luce all'interno — 270x.
NGC 5202	gx	13h32m00s	−01°42.0'	q 240	Vir	16"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori solo a momenti in visione distolta in un piccolo campo depleto (di fatto l'unica stellina vicina molto debole che si nota è situata a ~ 3' NW); la galassia si nota meglio scalando a 188x.
NGC 5203	gx	13h32m13s	−08°47.1'	q 285	Vir	16"	m. buona / ottimo	è allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", diffusa, con bulge evidente e nucleo stellare abbastanza marcato; c'è una stellina appena percettibile a meno di 1' verso N — 270x.
NGC 5204	gx	13h29m36s	+58°25.1'	q 48	UMa	16"	buona / buono	debole e molto diffusa, con gradiente di luce basso, allungata all'incirca da N a S, con dimensioni 3'×1.5' e a tratti leggermente screziata; c'è una debole stellina a ridosso SW; più interessante scalando a 188x.
NGC 5205	gx	13h30m03s	+62°30.7'	q 26	UMa	16"	buona / discreto	piuttosto estesa, con bulge poco più brillante di un disco molto stemperato sul fondo cielo e poco allungata da N a S con dimensioni 1.5'×1' — 188x.
NGC 5207	gx	13h32m14s	+13°53.5'	q 195	Vir	16"	buona / ottimo	debole macchia con gradiente di luce molto basso di luce, orientata da NW a SE, di dimensioni 1.5'×1'; c'è una stellina brillante a ridosso di NW — 380x.
NGC 5208	gx	13h32m28s	+07°19.0'	q 195	Vir	16"	mediocre / discreto	allungata ~ da N a S, di dimensioni 60"×30" con bulge abbastanza brillante e diffuso — 270x.
NGC 5209	gx	13h32m43s	+07°19.6'	q 195	Vir	16"	mediocre / discreto	poco più debole di NGC 5208, con tenue condensazione centrale, approssim. circolare con Ø di ~ 1' — 270x.

NGC 5210	gx	13h32m49s	+07°10.2'	q 195	Vir	16"	mediocre / discreto	debole, molto diffusa, rotonda, estesa per ~ 1.5', con debole condensazione centrale — 270x.
NGC 5211	gx	13h33m06s	−01°02.1'	q 240	Vir	16"	discreta / scarso	debole, molto diffusa e con tenue condensazione centrale, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45" — 188x.
NGC 5212	gx	13h32m32s	+07°17.6'	q 195	Vir	16"	mediocre / discreto	piccola ed elusiva, appare a solo a momenti in visione distolta a ~ 1.5' SE della 5208 — 270x.
NGC 5213	gx	13h34m39s	+04°07.8'	q 240	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole, stemperata sul fondo cielo, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; è situata in un campo ove sono presenti solo deboli stelline — 270x.
NGC 5214	gx	13h32m49s	+41°52.3'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e con basso gradiente di luce una sorta di baffo molto debole che aggetta a SW per una 30-ina di secondi è la **MCG+7-29-29** — 450x.
NGC 5216	gx	13h32m07s	+62°42.0'	q 26	UMa	16"	buona / discreto	presenta un piccolo nucleo abbastanza luminoso e un tenuissimo alone circonfuso estesa ~ 1.5' — 188x.
NGC 5217	gx	13h34m06s	+17°51.4'	q 150	Com	16"	m. buona / buono	gx rotonda, con basso gradiente di luce, con Ø poco inferiore a 1'; la stellina situata ~ 2' a E è visibile, ma è molto debole — 270x.
NGC 5218	gx	13h32m09s	+62°45.9'	q 26	UMa	16"	buona / discreto	relativamente brillante, allungata da E a W, di dimensioni 2'×1' e poco più brillante all'interno di luce — 188x.
NGC 5221	gx	13h34m56s	+13°50.0'	q 195	Vir	16"	mediocre / discreto	debolissima, stemperata sul fondo cielo, poco allungata da E a W per poco più di 1' e con nucleo puntiforme visibile a tratti — 270x.
NGC 5222	gx	13h34m56s	+13°44.5'	q 195	Vir	16"	mediocre / discreto	lucore molto debole, diffuso, estese per circa 1' ma di forma indistinta e solo appena più evidente di NGC 5221 — 270x.
NGC 5223	gx	13h34m25s	+34°41.7'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	costituisce assieme a NGC 5228 ed NGC 5233 un terzetto di galassie facili e relativamente brillanti; questa è leggermente ovale, di dimensioni 40"×30", allungata da N a S, gradatamente più brillante all'interno e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SW — 380x.
NGC 5224	gx	13h35m09s	+06°28.9'	q 195	Vir	24"	buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; situata tra due stelle molto brillanti che ne offuscano un po' la visione — 450x.
NGC 5225	gx	13h33m20s	+51°29.5'	q 49	CVn	16"	buona / discreto	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale evidente anche se poco marcata — 188x.
NGC 5226	gx	13h35m04s	+13°55.3'	q 195	Vir	20"	buona / m. buono	sono riuscito a intravederla nel 50 cm di Michele a ca. 300x dove, però, appare solo in visione distolta; a tratti spunta la stellina situata una 20-ina di secondi a SE; nel 40 cm appare, come una debolissima macchia irrisolta, quel piccolo triangolo serrato di stelline situato 1.5' a W.
NGC 5227	gx	13h35m24s	+01°24.7'	q 240	Vir	16"	m. buona / ottimo	diffusa, di aspetto un po' irregolare, vagamente rotonda con Ø di 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata all'interno di un triangolo isoscele esteso ~ 3' col vertice più acuto che punta ad E — 270x.
NGC 5228	gx	13h34m35s	+34°46.7'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	poco più debole NGC 5223, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e con basso gradiente di luce; è situata tra 2 stelline di 13-esima distanti 3' e orientate da NNE a SSW — 380x.
NGC 5229	gx	13h34m03s	+47°54.8'	q 76	CVn	16"	buona / discreto	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S, con dimensioni 1.5'×30"; c'è una stellina brillante un paio di primi verso S (o SSE); una coppia di stelle brillanti denominate SAO 44659 e 44661 di 9ª e 10ª grandezza rispettivamente si trova a 5' o 6' NNW — 188x.
NGC 5230	gx	13h35m32s	+13°40.6'	q 195	Vir	24"	m. buona / ottimo	bella, diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1.5' e con nucleo stellare; meglio contrastata scalando a 340x (già precedentemente osservata col 10" a 178x in condizioni di cielo analoghe).
NGC 5231	gx	13h35m48s	+02°59.9'	q 240	Vir	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, poco più brillante al centro, rotonda con Ø di 1' scarso — 270x.
NGC 5232	gx	13h36m08s	−08°20.8'	q 286	Vir	16"	m. buona / scarso	facile, di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' — 188x.
NGC 5233	gx	13h35m13s	+34°40.6'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	molto allungata da E a W per poco meno di 1', presenta un piccolo nucleo di aspetto stellare — 380x.
NGC 5235	gx	13h36m02s	+06°35.1'	q 196	Vir	24"	buona / buono	gx facile, ma con basso gradiente di luce, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
NGC 5238	gx	13h34m43s	+51°36.8'	q 49	CVn	16"	buona / discreto	molto debole, di forma a prima vista indistinta e dimensioni di 1.5'; in visione distolta appare solo a momenti poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 90"×60"; è situata come nello schizzo riportato sul web — 188x.
NGC 5239	gx	13h36m26s	+07°22.2'	q 196	Boo	16"	buona / m. buono	lucore molto debole e diffuso, estesa ~ 2' e appena più brillante all'interno; è più contrastata a 188x.
NGC 5240	gx	13h35m55s	+35°35.3'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 90"×60" — 380x.
NGC 5241	gx	13h36m40s	−08°24.1'	q 286	Vir	16"	m. buona / scarso	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20", ma è molto disturbata dalla luce di un stellina brillante quasi a ridosso verso E — 188x.
NGC 5243	gx	13h36m15s	+38°20.6'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	è un debole fuso di luce allungata per almeno 1' in direzione NW-SE — 380x.
NGC 5245	gx	13h37m23s	+03°53.8'	q 241	Vir	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo ovale di 30"×20" orientata da E a W, abbastanza compatto e con nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 5246	gx	13h37m29s	+04°06.3'	q 241	Vir	16"	m. buona / ottimo	poco più grande e più brillante di NGC 5245, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradiente di luce molto basso — 270x.
NGC 5247	gx	13h38m03s	−17°53.0'	q 331	Vir	16"	m. buona / m. buono	presenta un evidente con Ø di ~ 1' circonfuso da un alone grosso modo rotondo, estesa 5', molto diffuso e con alcune irregolarità di luce all'interno quali cenni dei bracci spirale; uno di questi sembra protendersi verso W; i bracci si svolgono in senso antiorario — 270x.
NGC 5248	gx	13h37m32s	+08°53.1'	q 196	Boo	24"	buona / buono	molto bella, presenta un bulge brillante orientato da E a W di 30"×20" e 2 bracci che si dipartono dall'estremità W verso N e da quella E verso S: il braccio che punta verso N è il più evidente ed è praticamente rettilineo; l'altro è leggermente curvo e più diffuso; queste strutture sono immerse in una chiazza lattiginosa di dimensioni grosso modo di 3'×2' con orientamento NW-SE; una debole stellina è situata a ridosso N del bulge, mentre una più brillante si trova subito a S; la gx è comunque più interessante scalando a 340x.
NGC 5249	gx	13h37m37s	+15°58.3'	q 196	Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45" e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
NGC 6641	gx	13h36m07s	+51°14.2'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	rotonda, diffusa, con Ø di 45" e condensazione centrale brillante; la visione è un poco disturbata dalla SAO 28814 di 7ª grandezza situata 5.5' a NE — 188x.
NGC 5251	gx	13h37m25s	+27°25.1'	q 151	Boo	16"	m. buona / buono	rotonda, con Ø di ~ 1', molto diffusa e di gradiente di luce molto basso; a tratti sembrano apparire lievi discrepanze di luminosità all'interno — 270x.
NGC 5252	gx	13h38m16s	+04°32.5'	q 241	Vir	16"	m. buona / ottimo	diffusa, con bulge evidente e nucleo stellare visibile a tratti; è allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 5254	gx	13h39m38s	−11°29.6'	q 286	Vir	16"	buona / ottimo	relativamente facile, ma con bassissima luminanza superficiale e di luminosità uniforme, orientata da NE a SE con dimensioni 3'×1' — 270x.
NGC 5255	gx	13h37m18s	+57°06.6'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	piccola e relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo a tratti puntiforme; c'è una stella brillante a meno di 2' verso E — 188x.
NGC 5256	gx	13h38m17s	+48°16.7'	q 76	UMa	16"	buona / discreto	sembra a prima vista di forma piuttosto irregolare, ma è grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina debole a circa 1' verso NW; una coppia serrata di stelline brillanti si trova a 5' verso WSW — 188x.
NGC 5257	gx	13h39m53s	+00°50.4'	q 241	Vir	16"	discreta / scarso	assieme a NGC 5258 forma una coppia di dimensioni simili, distanti poco più di 1' in direzione NW-SE; sono entrambe di dimensioni 60"×30" con i rispettivi assi maggiori posti tra loro a perpendicolo; la prima delle 2 ha una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NW — 188x.
NGC 5258	gx	13h39m58s	+00°49.9'	q 241	Vir	16"	discreta / scarso	v. **NGC 5257**
NGC 5259	gx	13h39m25s	+30°59.4'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	debole, allungata da E a W per una 40-ina di secondi; c'è una sorta di nodulo luminoso verso la parte occidentale che appare ogni tanto a 380x (da un controllo successivamente effettuato, questo è risultato essere la **MAC 1339+3059**, una gx di magnitudo 15.5!) — 380x.
NGC 5260	gx	13h40m20s	−23°51.5'	q 331	Hya	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda, di luminosità uniforme e Ø di ~ 1'; c'è una stellina brillanti a ridosso verso E — 270x.
NGC 5261	gx	13h40m16s	+05°04.6'	q 196	Vir	16"	m. buona / ottimo	è una galassietta rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, debole ma relativamente compatta e visibile abbastanza facilmente a 270x.
NGC 5262	gx	13h35m39s	+75°02.4'	q 10	UMi	16"	ottima / discreto	relativamente facile, gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S e con dimensioni 60"×45" — 188x.
NGC 5263	gx	13h39m56s	+28°24.0'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	debole lama di luce estesa 1.5' orientata da NNE a SSW e situata 4' o 5' N di una stellina brillante — 380x.
NGC 5264	gx	13h41m36s	−29°54.7'	q 371	Hya	16"	buona / buono	è una debolissima chiazza di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 1.5×1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso E e un'altra molto debole subito a S — 270x.
NGC 5265	gx	13h40m09s	+36°51.7'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, aspetto un po' irregolare, ma grosso modo rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi; c'è è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
NGC 5267	gx	13h40m40s	+38°47.7'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	è un ovale a basso gradiente di luce orientata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e di luminosità non perfettamente regolare — 380x.
NGC 5270	gx	13h42m11s	+04°15.7'	q 241	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa, di luminosità uniforme e con bassissima luminanza superficiale; è approssim. rotonda con Ø inferiore a 1' — 270x.
NGC 5271	gx	13h41m42s	+30°07.5'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	debole chiazza rotondeggiante di 45" di Ø, molto stemperata sul fondo cielo, situata a circa 1.5' E di una stellina abbastanza brillante — 380x.
NGC 5273	gx	13h42m08s	+35°39.3'	q 110	CVn	24"	ottima / m. buono	presenta un nucleo stellare molto brillante circonfuso da un alone assai stemperato sul fondo cielo, rotondo con Ø di un paio di primi; appare meglio contrastata scalando a 340x (già facilmente visibile nel 10": a bassi ingrandimenti sembrava un piccolo ammasso globulare).
NGC 5274	gx	13h42m23s	+29°50.8'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette molto deboli, distanti poco più di 1' in direzione N-S; la 1ª è piuttosto confusa ed estesa ~ 40"; sembra un poco allungata da NE a SW, con una stellina a 40 o 50 secondi verso NW; anche la 2ª , pure di aspetto confuso, sembra poco allungata da NE a SW, ma forse è solo un effetto prodotto da una debolissima stellina che a tratti appare al bordo SW ed è inglobata nell'alone — 380x.
NGC 5275	gx	13h42m24s	+29°49.5'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	v. **NGC 5274**
NGC 5276	gx	13h42m22s	+35°37.4'	q 110	CVn	24"	ottima / m. buono	ovale diffuso con basso gradiente di luce, orientata da WNW a ESE con dimensioni 50"×25"; è situata a 3' SE di NGC 5273 (già osservata col 16" in altra data).
NGC 5277	gx	13h42m38s	+29°54.3'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	molto debole, ma in visione distolta appare chiaramente allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi dal bordo orientale — 380x.
NGC 5278	gx	13h41m39s	+55°40.2'	q 49	UMa	16"	m. buona / ottimo	assieme a NGC 5279 forma una coppia di gx separate da meno di 1' in direzione E-W; la 1ª è rotonda, diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; la 2ª è anch'essa rotonda, ma più debole e molto piccola, con Ø sì e no di 20"; a prima vista pare come una semplice propaggine orientale della precedente; si separa facilmente a 380x.
NGC 5279	gx	13h41m44s	+55°40.4'	q 49	UMa	16"	m. buona / ottimo	v. **NGC 5278**
NGC 5280	gx	13h42m56s	+29°52.1'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	è la più brillante di un piccolo gruppo cui appartiene la 5277 e la coppia 5274-5; è rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, con basso gradiente di luce e poco diffusa — 380x.
NGC 5282	gx	13h43m25s	+30°04.2'	q 110	CVn	16"	m. buona / ottimo	piccola galassia compatta, circolare con Ø di una 20-ina di secondi o 30", situata un paio di primi SE di una stellina brillante — 270x.
NGC 5283	gx	13h41m06s	+67°40.3'	q 26	Dra	16"	ottima / buono	compatta, circolare, con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale marcata di aspetto stellare — 270x.
NGC 5285	gx	13h44m26s	+02°06.6'	q 241	Vir	16"	m. buona / ottimo	piccola galassietta rotonda, diffusa e con basso gradiente di luce, con Ø di max di 30" — 270x.
NGC 5287	gx	13h45m00s	+29°49.0'	q 110	CVn	16"	m. buona / ottimo	debolissima, ma una volta localizzata si vede senza grandi difficoltà a 270x; ha dimensioni di 20" e a momenti appare leggermente condensata.
NGC 5289	gx	13h45m09s	+41°30.2'	q 76	CVn	16"	buona / mediocre	allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con nucleo marcato e puntiforme — 188x.
NGC 5290	gx	13h45m19s	+41°42.8'	q 76	CVn	16"	buona / mediocre	bella, molto allungata da E a W per 3', con bulge ben evidente, estesa e di luminosità non proprio uniforme; in visione distolta sembra posta pressoché di taglio — 188x.
NGC 5291	gx	13h47m24s	−30°24.5'	q 381	Cen	16"	buona / buono	fa parte di un gruppo di oggetti molto bassi — relativamente facile, allungata da N a S, con dimensioni 45"×30" e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 5293	gx	13h46m53s	+16°16.4'	q 196	Boo	16"	buona / ottimo	debole lucore a bassissima luminanza superficiale e di aspetto un po' confuso, approssim. circolare con Ø di 1.5' — 380x.
NGC 5294	gx	13h45m18s	+55°17.4'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	è una galassietta molto piccola e debole, di luminosità uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi — 188x.
NGC 5295	gx	13h38m37s	+79°27.6'	q 10	Cam	16"	ottima / discreto	approssim. circolare, Ø inferiore a 1', con condensazione centrale piccola, diffusa ed evidente — 188x.
NGC 5296	gx	13h46m19s	+43°51.0'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	è situata a 1.5' SW di NGC 5297 e per contrasto appare debole, con basso gradiente di luce, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" (già precedentemente osservata nel 16") — 450x.
NGC 5297	gx	13h46m24s	+43°52.3'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 4'×1', con bulge diffuso, estesa e poco contrastato sul disco; la galassia arriva quasi a lambire una stella abbastanza brillante situata a NW; al bordo opposto si trova un piccolo triangolo isoscele col vertice più acuto, appena percettibile, che punta a E (era già facilmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 5298	gx	13h48m36s	−30°25.7'	q 371	Cen	16"	buona / buono	molto debole, allungata da E a W con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina a 1' NW — 270x.
NGC 5300	gx	13h48m16s	+03°57.1'	q 241	Vir	16"	buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 2.5'×1.5'; c'è una stellina a ridosso verso S — 270x.
NGC 5301	gx	13h46m24s	+46°06.5'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	estesa, poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, molto allungata da NW a SE con dimensioni 3.5'×1'; 2 stelle brillanti a SE sono orientate a perpendicolo con l'asse della gx; una stellina appena percettibile si trova subito all'esterno del bordo N; altre 3 deboli stelline poste ad arco si trovano a NW: quella più a N è più facile, mentre quella nel mezzo è debolissima (era già facilmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 5302	gx	13h48m49s	−30°30.7'	q 371	Cen	16"	buona / buono	debole, poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a poco più di 1' verso W — 270x.
NGC 5303	gx	13h47m45s	+38°18.3'	q 110	CVn	16"	buona / buono	brillante, compatta, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso NW — 270x.
NGC 5304	gx	13h50m01s	−30°34.7'	q 371	Cen	16"	buona / buono	è di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso S — 270x.
NGC 5305	gx	13h47m56s	+37°49.6'	q 110	CVn	16"	ottima / m. buono	è di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40" e diffusa — 188x.
NGC 5306	gx	13h49m11s	−07°13.4'	q 286	Vir	24"	buona / ottimo	(è la componente principale del sistema multiplo denominato **Hickson 67**) rotonda con Ø di 45", poco diffusa e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina a ridosso verso NW (era facilmente osservabile nel 10" a 240; visibile anche la stellina di 14-esima a NW) — 450x.
NGC 5308	gx	13h47m00s	+60°58.4'	q 49	UMa	16"	buona / buono	è posta praticamente di taglio, orientata da NE a SW; in visione distolta appare estesa almeno 3'; presenta un piccolo bulge brillante, contrastato e un nucleo stellare; c'è una stellina a 1.5' verso E dal centro — 380x.
NGC 5311	gx	13h48m56s	+39°59.1'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con piccolo bulge brillante, poco allungata da E a W con dimensioni 2'×1.5'; è più interessante scalando a 340x — 450x.
NGC 5312	gx	13h49m50s	+33°37.3'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	poco allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", poco diffusa e con piccola condensazione centrale visibile a tratti; una debolissima stellina ammicca tratti a 1' scarso verso S *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 5313	gx	13h49m44s	+39°59.1'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×45" e con nucleo stellare; appare screziata a 450x (già precedentemente osservata col 10" in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 5314	gx	13h46m11s	+70°20.4'	q 26	UMi	16"	m. buona / buono	è allungata da E a W per 1', con bulge evidente; c'è una stellina una 30-ina di secondi verso SE — 270x.
NGC 5318	gx	13h50m36s	+33°42.3'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	relativamente brillante, allungata ~ da N a S, dimensioni 60"×30", molto sfumata ai brodi, con alto gradiente di luce e nucleo luminoso di aspetto stellare *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 5319	gx	13h50m41s	+33°45.7'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	appare elusivamente e solo a tratti a 380x, spazzando con l'occhio la zona, poco a N di NGC 5318 pur avendo aspettato il tramonto della Luna per individuarla; è comunque molto piccola ed estesa una 15-ina di secondi.
NGC 5320	gx	13h50m20s	+41°22.1'	q 76	CVn	16"	m. buona / m. buono	è un oggetto piuttosto estesa , relativamente luminoso, ma con gradiente di luce molto basso; è allungata da NNE a SSW con dimensioni 3'×2' — 270x.
NGC 5321	gx	13h50m47s	+33°38.0'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	piccola, grosso modo rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi con condensazione centrale evidente, stellare; c'è una stellina a poco più di 1 grado WSW *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 5322	gx	13h49m45s	+60°11.4'	q 49	UMa	24"	m. buona / buono	bella, allungata da E a W con dimensioni 4'×2', molto diffusa e con piccolo bulge ovale molto marcato di 30"×20" all'interno del quale si nota un nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso S e un'altra al bordo orientale; entrambe queste stelline sono ancora immerse nell'alone della gx se si scala a 340x (a 450x le regioni più esterne si stemperano troppo sul fondo cielo — già facilmente osservabile nel 10").
NGC 5323	gx	13h45m37s	+76°49.7'	q 10	UMi	16"	discreta / buono	debole, assai stemperata sul fondo cielo e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina doppia stretta 5' a NW — 188x.
NGC 5324	gx	13h52m06s	−06°03.5'	q 286	Vir	24"	buona / ottimo	è una bella chiazza circolare con gradiente di luce molto basso, diffusa, leggermente screziata a 450x con Ø di 1.5' (debolmente visibile nel 10" a 178x).
NGC 5325	gx	13h50m54s	+38°16.5'	q 110	CVn	16"	buona / buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, osservabile in visione distolta a 270x, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 5326	gx	13h50m51s	+39°34.5'	q 76	CVn	16"	buona / buono	è una bella gx ad alto gradiente di luce e con un nucleo di aspetto stellare, brillante; è di dimensioni 2'×1', con orientamento NW-SE — 270x.
NGC 5327	gx	13h52m04s	−02°12.1'	q 241	Vir	16"	ottima / discreto	chiazza rotonda abbastanza facile, molto diffusa con gradiente di luce molto basso di luce e con Ø di ~ 1.5'(grosso modo la distanza delle 2 stelline brillanti situate a W) — 270x.
NGC 5328	gx	13h52m53s	−28°29.3'	q 371	Hya	16"	m. buona / m. buono	presenta un bulge ben evidente e un tenue alone molto diffuso, rotondo con Ø stimato in visione distolta di 1' — 270x.
NGC 5329	gx	13h52m10s	+02°19.6'	q 241	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo quasi stellare contrastato, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a 1' verso E e un'altra appena percettibile a ridosso verso SSE (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
NGC 5330	gx	13h52m59s	−28°28.2'	q 371	Hya	16"	m. buona / m. buono	situata ~ 1.5' a NE di NGC 5328 è una debole gx rotonda di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 5331	gx	13h52m16s	+02°06.1'	q 241	Vir	24"	buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con PGC 49266 — debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
NGC 5332	gx	13h52m08s	+16°58.2'	q 196	Boo	16"	m. buona / buono	rotonda, relativamente compatta, poco più brillante all'interno e Ø di 40", situata tra 2 deboli stelline orientate da NNW a SSE: la 2ª è più debole — 270x.
NGC 5334	gx	13h52m54s	−01°06.8'	q 241	Vir	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con gradiente di luce molto basso, orientata da N a S con dimensioni 3'×2'; c'è una stellina molto debole al bordo meridionale; una brillante si trova 1' a S di quest'ultima; la galassia è meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 5335	gx	13h52m57s	+02°48.9'	q 241	Vir	16"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NNW a SSE con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 270x.
NGC 5336	gx	13h52m10s	+43°14.6'	q 76	CVn	16"	m. buona / m. buono	approssim. circolare, di poco più di 1' di Ø, molto sfumata sul fondo cielo e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 5337	gx	13h52m23s	+39°41.3'	q 76	CVn	16"	m. buona / discreto	relativamente brillante, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'×45", gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 5338	gx	13h53m26s	+05°12.5'	q 241	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 90"×45" e gradatamente più brillante verso l'interno.
NGC 5339	gx	13h54m00s	−07°55.8'	q 286	Vir	16"	buona / ottimo	debole chiazza circolare poco più brillante all'interno con Ø poco superiore a 1'; è relativamente compatta e situata tra 2 stelline distanti un paio di primi — 380x.
NGC 5340	gx	13h49m00s	+72°39.2'	q 27	UMi	16"	ottima / buono	debole, stemperata sul fondo cielo, nucleo piccolo, diffuso e brillante; è rotonda con Ø di ~ 1'; subito a SW c'è un quadrilatero di stelle abbastanza regolare coi lati di ~ 4' e le diagonali orientate grosso modo come i punti cardinali; (la componente più occidentale è una doppia stretta); all'interno di questo quadrilatero notasi un piccolo oggetto e debolissimo oggetto diffuso esteso non più di 20": da un controllo successivamente fatto dovrebbe trattarsi di **MAC 1349+7239** (anche se il Megastar riporta, forse erroneamente, le reciproche posizioni scambiate) — 188x.
NGC 5341	gx	13h52m32s	+37°49.0'	q 110	CVn	24"	ottima / m. buono	allungata da N a S, di dimensioni 70"×35" e con tenue bulge poco contrastato — 450x.
NGC 5342	gx	13h51m26s	+59°51.8'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	brillante e relativamente compatta, allungata all'incirca da NNA a SSE, di dimensioni 60"×30" e con nucleo marcato, di aspetto quasi stellare — 188x.
NGC 5343	gx	13h54m12s	−07°35.3'	q 286	Vir	16"	buona / ottimo	facile, abbastanza brillante e compatta, gradatamente più brillante all'interno con Ø di ~ 1' (pari cioè alla distanza di quella coppia di stelline brillanti situate 3' o4' verso W) — 380x.
NGC 5344	gx	13h50m12s	+73°57.2'	q 10	UMi	16"	ottima / discreto	debole, approssim. circolare, con Ø di ~ 1', con condensazione centrale piccola e abbastanza marcata — 188x.
NGC 5345	gx	13h54m14s	−01°26.2'	q 241	Vir	16"	buona / discreto	rotonda con Ø di 1', gradatamente più brillante verso l'interno, ma di luminosità piuttosto irregolare; è un poco disturbata dalla SAO 139613 di di 5ª grandezza situata ad appena 8' SE — 188x.
NGC 5346	gx	13h53m02s	+39°34.9'	q 76	CVn	16"	m. buona / discreto	è poco più che una lama di luce molto debole, di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE per almeno un paio di primi — 270x.
NGC 5347	gx	13h53m18s	+33°29.4'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 2'×1.5' e molto stemperata sul fondo cielo; presenta un bulge appena più brillante dell'alone e un piccolo nucleo puntiforme visibile a momenti — 270x.
NGC 5348	gx	13h54m11s	+05°13.6'	q 241	Vir	24"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce di luminosità uniforme che in visione distolta si estende per quasi 3' in direzione N-S; c'è una stellina a 1' verso E; poco meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 5349	gx	13h53m13s	+37°53.0'	q 109	CVn	24"	ottima / m. buono	molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20" e poco più brillante all'interno — 450x.
NGC 5350	gx	13h53m21s	+40°21.8'	q 76	CVn	16"	buona / ottimo	fa parte, assieme a NGC 5353 ed NGC 5354 di un celebre terzetto di galassie brillanti allineate da N a S, purtroppo disturbate dalla luce di una stella brillante situata subito a W; a queste se ne aggiungono alcune altre più deboli — molto diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da NE a SW con dimensioni 2'×1.5'; è disturbata da una brillante stella di 6ª grandezza situata a 3' scarsi SW; meglio contrastata a 270x.
NGC 5351	gx	13h53m28s	+37°54.9'	q 109	CVn	24"	ottima / m. buono	è una gx con basso gradiente di luce, allungata da E a W, di dimensioni 2'×1' e con tenue condensazione centrale diffusa e poco contrastata — 450x.
NGC 5352	gx	13h53m38s	+36°08.0'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	relativamente brillante, abbastanza compatta, ovale, di dimensioni 45"×30" e orientata da E a W — 380x.
NGC 5353	gx	13h53m27s	+40°17.0'	q 76	CVn	16"	buona / ottimo	e luminosa, allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1', con bulge diffuso, molto contrastato e nucleo stellare; HD 121197 di 6ª grandezza a 5' scarsi verso NW — 380x.
NGC 5354	gx	13h53m27s	+40°18.1'	q 76	CVn	16"	buona / ottimo	diffusa, con bulge evidente poco contrastato, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 1.5'×1'; la HD 121197 brilla a 4' NW; più interessante a 270x.
NGC 5355	gx	13h53m46s	+40°20.3'	q 76	CVn	16"	buona / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", poco diffusa e con nucleo di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 5356	gx	13h54m59s	+05°20.1'	q 241	Vir	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, molto allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 3'×45" e di luminosità pressoché uniforme a 450x; solo scalando a 340x appare leggermente più brillante verso l'interno; c'è una coppia di stelline brillanti distanti 1' (utile come distanza di riferimento) in direzione NW-SE a NNE della gx.
NGC 5357	gx	13h56m00s	−30°20.4'	q 371	Cen	16"	buona / buono	relativamente facile, poco più brillante all'interno di luce, rotonda di 40"-45" di Ø e con piccolo bulge abbastanza contrastato; è situata sul lato orientale di un piccolo triangolo rettangolo formato da stelle di luminosità simile — 270x.
NGC 5358	gx	13h54m00s	+40°16.6'	q 76	CVn	16"	buona / ottimo	più piccola della 5355 e poco più debole; è allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×45" e presenta una debole condensazione centrale — 270x.
NGC 5360	gx	13h55m38s	+04°59.0'	q 241	Vir	16"	buona / discreto	debolissima, quasi elusiva; ciò nonostante in visione distolta appare a tratti allungata da E a W per ~ 1'; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' NE e un'altra più evidente a ridosso verso W — 188x.
NGC 5361	gx	13h54m35s	+38°27.0'	q 110	CVn	16"	buona / buono	debole, allungata da ENE a WSW, di luminosità uniforme, dimensioni 40"×20"; c'è una stella brillante a 1' verso NE — 270x.
NGC 5362	gx	13h54m54s	+41°18.8'	q 76	CVn	16"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 2'×1' — 270x.
NGC 5363	gx	13h56m07s	+05°15.4'	q 196	Vir	24"	m. buona / mediocre	bella, molto diffusa e con alto gradiente di luce, finemente screziata a 450x; presenta un bulge contrastato che sembra protrudere leggermente verso SW; allungata da NW a SE con dimensioni 3'×2'; appare tuttavia meglio contrastata scalando a 340x (facilmente osservabile anche nel 10").
NGC 5364	gx	13h56m12s	+05°00.9'	q 196	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da N a S, di dimensioni 3.5'×2' e con piccolo nucleo quasi stellare poco contrastato; qualche lieve discrepanza di luce appare sul disco; due tenuissimi baffi in corrispondenza dei bracci spirale appaiono solo a momenti in visione distolta: uno si trova tra il corpo principale della gx e la coppia di stelline brillanti a NW di essa; l'altro dalla parte opposta (ossia verso SE); meglio contrastata scalando a 340x (debolmente visibile nel 10" a 63x; a 178x era visibile a tratti anche il nucleo).
NGC 5366	gx	13h56m25s	−00°14.9'	q 241	Vir	16"	m. buona / ottimo	piccolo ovale di luminosità uniforme, orientata da NE a SW; c'è una stellina brillante al bordo NE — 270x.
NGC 5368	gx	13h54m29s	+54°19.8'	q 49	UMa	16"	buona / mediocre	relativamente compatta e brillante, con alto gradiente di luce, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina luminosa a 1.5' verso NNE — 188x.
NGC 5369	gx	13h56m38s	−05°28.2'	q 286	Vir	16"	buona / ottimo	rotonda, poco diffusa, con Ø di 45" e con nucleo stellare facilmente visibile in visione diretta — 380x.
NGC 5370	gx	13h54m09s	+60°40.7'	q 49	UMa	16"	mediocre / buono	relativamente compatta e brillante, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20", ma di luminosità piuttosto irregolare come se ci fossero una o più stelline sovrapposte non risolvibili — 188x.
NGC 5371	gx	13h55m40s	+40°27.7'	q 76	CVn	16"	buona / discreto	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un tenue alone uniforme e stemperato sul fondo cielo; allungata da N a S con dimensioni 3'×2'; c'è stella brillante quasi a ridosso NE e coppia di stelline subito a W — 270x.
NGC 5372	gx	13h54m46s	+58°40.0'	q 49	UMa	16"	mediocre / buono	facile, compatta, allungata da NW a SE di con dimensioni 30"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 5373	gx	13h57m07s	+05°15.1'	q 196	Vir	16"	buona / discreto	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta a 188x; dovrebbe avere un nucleo puntiforme (a meno che non si tratti della solita stellina sovrapposta); è comunque molto piccola, di dimensioni non superiori ai 20".
NGC 5374	gx	13h57m30s	+06°05.5'	q 196	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina brillante a ridosso W — 450x.
NGC 5375	gx	13h56m56s	+29°09.9'	q 110	CVn	16"	buona / mediocre	approssim. circolare,con Ø di un paio di primi, molto stemperata ai bordi e gradatamente più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 5376	gx	13h55m16s	+59°30.4'	q 49	UMa	16"	buona / buono	abbastanza brillante, ma con gradiente di luce molto basso, allungata da ENE a WSW con dimensioni 2'×1'; appare vagamente screziata a 380x.
NGC 5377	gx	13h56m17s	+47°14.1'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 3'×1', con piccolo bulge molto contrastato e nucleo stellare (già facilmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 5378	gx	13h56m51s	+37°42.8'	q 110	CVn	16"	buona / buono	ha un nucleo piccolo, brillante circonfuso da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo, esteso un paio di primi; presenta una zona interna molto debole, orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 40"×20" (da un controllo effettuato successivamente questo allungamento era effettivamente dovuto alla barra centrale) — 270x.
NGC 5379	gx	13h55m34s	+59°44.6'	q 49	UMa	16"	buona / buono	piuttosto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×30" — 270x.
NGC 5380	gx	13h56m57s	+37°36.6'	q 110	CVn	16"	buona / buono	a prima vista è abbastanza compatta, ma trattasi, probabilmente, solo del bulge perché in visione distolta appare un tenuissimo alone estesa per oltre 1' — 270x.
NGC 5382	gx	13h58m15s	+06°15.5'	q 196	Vir	16"	m. buona / discreto	approssim. circolare, con Ø di 45" e una marcata condensazione centrale — 270x.
NGC 5383	gx	13h57m05s	+41°50.8'	q 76	CVn	24"	buona / ottimo	molto diffusa, con bulge brillante, rotondo, di una 30-ina di secondi di Ø, circonfusa da un tenue alone che in visione distolta arriva a lambire una doppia stretta situata a E; la gx appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1.5', ma a tratti appare all'interno una zona appena più brillante e più stretta (una sorta di barra) orientata nello stesso modo — 450x.
NGC 5384	gx	13h58m13s	+06°31.1'	q 196	Vir	16"	m. buona / discreto	relativamente brillante, diffusa e con elevato gradiente di luce, poco allungata da NE a SW (alla prima occhiata appare circolare), con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina brillante di 10ª grandezza situata 3' a NW — 270x.
NGC 5386	gx	13h58m22s	+06°20.4'	q 196	Vir	16"	m. buona / discreto	più debole di NGC 5382, dalla quale dista 5' a NNE; è di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW, con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante proprio all'estremità SW — 270x.
NGC 5387	gx	13h58m25s	+06°04.2'	q 196	Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge diffuso poco contrastato; c'è una debole stellina quasi a ridosso SW — 450x.
NGC 5389	gx	13h56m06s	+59°44.5'	q 49	UMa	16"	buona / buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 4'×1', con bulge contrastato e nucleo stellare — 380x.
NGC 5391	gx	13h57m05s	+46°15.8'	q 76	CVn	16"	m. buona / m. buono	è una galassietta elusiva che appare solo a momenti e con gran difficoltà; non sembra più estesa di 30"; sono riuscito a scovarla solo a 380x grazie al buon seeing — 380x.
NGC 5392	gx	13h59m25s	−03°12.5'	q 241	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole galassietta di una 30-ina di secondi di Ø, diffusa e appena più brillante verso l'interno (nel cielo è presente un crescente lunare di 6 giorni a ~ 30° di distanza); c'è una stellina un paio di primi a SE — 380x.
NGC 5393	gx	14h00m32s	−28°52.5'	q 371	Hya	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, gradatamente più brillante all'interno, rotonda con Ø di un 1' scarso — 270x.
NGC 5394	gx	13h58m34s	+37°27.2'	q 110	CVn	24"	ottima / m. buono	costituisce assieme a NGC 5395 una coppia interagente denominata Arp 84 — poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale marcata; 2 tenuissimi baffi estesi una 20-ina di secondi si dipartono a N e a S della galassia; c'è una stellina quasi a ridosso verso E (già precedentemente osservata nel 16", ma erano comunque separabili, seppure al limite, nel 10" a 126x) — 450x.
NGC 5395	gx	13h58m38s	+37°25.5'	q 110	CVn	24"	ottima / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S di dimensioni 2'×1' abbondanti e con piccola condensazione centrale; due deboli anse appaiono a N e a S della gx e sono probabilmente dovute a una sorta di anello scuro schiacciato situato concentricamente all'interno del disco, più marcato a N e a W; la gx si trova da 2 stelline orientate da N a S e distanti 3.5'.
NGC 5399	gx	13h59m32s	+34°46.4'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con piccolo bulge poco più brillante del disco — 380x.
NGC 5400	gx	14h00m37s	−02°51.5'	q 241	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole lucore rotondo molto stemperato sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 5401	gx	13h59m44s	+36°14.3'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	facile, brillante, sembra una quasi una edge-on, allungata per 45" e con una debole stellina a ridosso verso NW — 380x.
NGC 5402	gx	13h58m16s	+59°48.9'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15", con bulge estesa ed evidente; c'è una stellina a 1' verso S — 188x.
NGC 5403	gx	13h59m51s	+38°11.0'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	è un estesa fuso di luminosità pressoché uniforme, di dimensioni 2'×30" e orientata da NW a SE; a tratti appare un bulge diffuso leggermente più brillante — 380x.
NGC 5405	gx	14h01m09s	+07°42.2'	q 196	Boo	16"	m. buona / discreto	è una piccola chiazza molto debole e di aspetto un po' confuso; approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 5406	gx	14h00m20s	+38°54.9'	q 110	CVn	24"	m. buona / buono	molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 1.5'×1'; presenta una piccola barra poco contrastata orientata in direzione opposta all'interno della quale appare un nucleo marcato quasi stellare; meglio contrastata scalando a 340x (già precedentemente osservata nel 10" a 126x).
NGC 5407	gx	14h00m50s	+39°09.4'	q 77	CVn	16"	m. buona / discreto	è probabilmente allungata da E a W, con bulge relativamente brillante circonfuso da un alone molto tenue, di dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 5409	gx	14h01m46s	+09°29.4'	q 196	Boo	16"	buona / discreto	piccola galassia molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno (a tratti appare un nucleo puntiforme), allungata da NE a SW, con dimensioni 30"×20". Fa parte di un gruppo — 270x.
NGC 5410	gx	14h00m55s	+40°59.3'	q 77	CVn	28"	buona / ottimo	molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da ENE a WSW con dimensioni 80"×40" — 388x.
NGC 5411	gx	14h01m59s	+08°56.3'	q 196	Boo	24"	buona / buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 70"×35" e con piccolo bulge marcato di aspetto quasi stellare; c'è una stellina molto debole al bordo NW — 400x.
NGC 5412	gx	13h57m13s	+73°37.0'	q 10	UMi	16"	discreta / buono	pressoché circolare, con Ø di ~ 1', con brillante condensazione centrale e un alone molto tenue; c'è una debole stellina un paio di primi a W — 188x.
NGC 5413	gx	13h57m53s	+64°54.7'	q 27	Dra	16"	m. buona / buono	compatta, con bulge brillante di forma alquanto irregolare, approssim. circolare con Ø di 1'; è molto disturbata dalla luce di una stella brillante situata 4' a E — 270x.
NGC 5414	gx	14h02m03s	+09°55.8'	q 196	Boo	16"	m. buona / discreto	gx compatta, con gradiente di luce medio, allungata in direzione N-S con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 5415	gx	13h56m57s	+70°45.3'	q 27	UMi	16"	m. buona / mediocre	oggetto circolare, diffuso, con una evidente condensazione centrale e con Ø inferiore a 1' — 270x.
NGC 5416	gx	14h02m11s	+09°26.4'	q 196	Boo	16"	buona / discreto	debole, ma decisamente più evidente della 5409, diffusa, con basso gradiente di luce, approssim. rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 5417	gx	14h02m13s	+08°02.2'	q 196	Boo	16"	m. buona / discreto	relativamente luminosa con un bel bulge brillante; è allungata da ESE a WNW, di dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 5418	gx	14h02m18s	+07°41.0'	q 196	Boo	16"	m. buona / discreto	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5420	gx	14h04m00s	−14°37.0'	q 286	Vir	16"	m. buona / scarso	debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; è situata tra 2 deboli stelline orientate da N a S e distanti 3': è poco più spostata verso quella meridionale — 188x.
NGC 5421	gx	14h01m41s	+33°49.5'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	debole, di aspetto un poco irregolare a 270x, grosso modo allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di SE e un'altra a 30" o 40" verso S — 380x.
NGC 5422	gx	14h00m42s	+55°09.9'	q 49	UMa	16"	buona / buono	bella, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 3'×30" (quasi un edge-on), con piccolo bulge contrastato e un nucleo stellare facilmente visibile; l'estensione si contempla meglio scalando a 270x.
NGC 5423	gx	14h02m49s	+09°20.5'	q 196	Boo	16"	buona / discreto	è una delle più brillanti del gruppo della 5409; diffusa, allungata da E a W, con dimensioni 40"×30" e nucleo evidente, abbastanza marcato e puntiforme — 270x.
NGC 5424	gx	14h02m56s	+09°25.2'	q 196	Boo	16"	buona / discreto	rotondeggiante, ma dai bordi poco definiti, Ø 45", con basso gradiente di luce; c'è una stellina a 1' verso S — 270x.
NGC 5425	gx	14h00m49s	+48°26.5'	q 77	UMa	16"	m. buona / discreto	debole, allungata da SE a NW, di dimensioni 2'×30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5426	gx	14h03m25s	−06°04.2'	q 286	Vir	24"	buona / ottimo	forma una coppia interagente con NGC 5427: denominate Arp 271 — diffusa, con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso N — 450x.
NGC 5427	gx	14h03m26s	−06°01.9'	q 286	Vir	24"	buona / ottimo	diffusa, screziata a 450x, con condensazione centrale evidente, ma poco contrastata, rotonda con Ø di 1.5' (già precedentemente osservate col 10" a 178x).
NGC 5430	gx	14h00m45s	+59°19.7'	q 196	UMa	16"	buona / buono	è di aspetto un po' irregolare, allungata ~ da NNW a SSE e poco più brillante all'interno; c'è l'impressione che l'estremità meridionale sia separata dal corpo centrale (quasi si trattasse di una coppia di galassie interagenti!) — 380x.
NGC 5431	gx	14h05m07s	+09°21.8'	q 196	Boo	16"	buona / discreto	debole, molto diffusa, basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 5433	gx	14h02m36s	+32°30.6'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	posta praticamente di taglio, orientata da N a S con bulge diffuso più brillante dell'alone ed estesa per 1.5' — 380x.
NGC 5434	gx	14h03m23s	+09°26.9'	q 196	Boo	16"	buona / discreto	debole, molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' — 270x.
NGC 5436	gx	14h03m41s	+09°34.4'	q 196	Boo	16"	buona / discreto	allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con un nucleo stellare molto evidente — 270x.
NGC 5437	gx	14h03m47s	+09°31.4'	q 196	Boo	16"	buona / discreto	di dimensioni simili, ma allungata da N a S e con piccolo nucleo stellare meno evidente — 270x.
NGC 5438	gx	14h03m48s	+09°36.6'	q 196	Boo	16"	buona / discreto	approssim. circolare, con piccolo nucleo abbastanza evidente circonfuso da un tenue alone con Ø di 45" — 270x.
NGC 5439	gx	14h01m58s	+46°18.7'	q 77	CVn	16"	m. buona / discreto	è un debole ovale di luminosità uniforme, orientata da N a S, con dimensioni 90"×30" — 270x.
NGC 5440	gx	14h03m01s	+34°45.5'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	bella, luminosa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×45" con bulge brillante e nucleo di aspetto stellare" — 380x.
NGC 5441	gx	14h03m12s	+34°41.1'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	molto debole e piccola, estesa una 20-ina di secondi, di aspetto un po' confuso; visibile anche in visione diretta a 380x.
NGC 5442	gx	14h04m43s	−09°42.7'	q 286	Vir	16"	buona / ottimo	debole e di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 270x.

NGC 5443	gx	14h02m12s	+55°48.9'	q 49	UMa	16"	m. buona / discreto	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×45", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; il bulge appare a tratti screziato a 270x; ci sono 2 stelline quasi a ridosso NE e un'altra quasi a ridosso verso S.
NGC 5444	gx	14h03m24s	+35°07.9'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	brillante, rotonda, con Ø superiore a 1' e marcata condensazione centrale — 380x.
NGC 5445	gx	14h03m31s	+35°01.5'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	molto allungata da NE a SW per 1.5', con bulge molto brillante; la stellina situata a SW è contenuta nell'alone della galassia' — 380x.
NGC 5446	gx	14h05m18s	+09°38.2'	q 196	Boo	16"	m. buona / scarso	è una piccola galassietta circolare molto debole, con Ø non superiore a una 20"; è situata a ~ 1' E di una stellina debole — 270x.
NGC 5447	knot	14h02m29s	+54°16.2'	q 49	UMa	16"	buona / mediocre	**regione H II in M101** — appare allungata per ~ 1' da NNW a SSE e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a una 20-ina di secondi verso N — 188x.
NGC 5448	gx	14h02m50s	+49°10.4'	q 77	UMa	16"	m. buona / discreto	molto allungata da WNW a SSE, di dimensioni 3'×1', con un bulge evidente e piccolo nucleo appena percettibile di aspetto stellare — 270x.
NGC 5452	gx	13h54m24s	+78°13.2'	q 10	UMi	16"	discreta / buono	è un lucore molto debole, dai bordi indistinti ed estesa ~ 1.5'; è situata un paio di primi a S di una stellina brillante — 188x.
NGC 5454	gx	14h04m46s	+14°23.0'	q 196	Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
NGC 5455	knot	14h03m01s	+54°14.5'	q 49	UMa	16"	buona / mediocre	**regione H II in M101** — debole e molto piccola, di aspetto quasi stellare se osservata in visione diretta a 100x, mentre appare leggermente diffusa a 188x, anche se non è più estesa di 10"-15".
NGC 5456	gx	14h04m59s	+11°52.4'	q 196	Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45" e con tenue nucleo stellare; equidistante con due stelline: una abbastanza brillante a 1' NE e l'altra più debole a un paio di primi verso E; la parte più esterna dell'alone si apprezza meglio scalando a 340x.
NGC 5459	gx	14h05m00s	+13°07.9'	q 196	Boo	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale quasi stellare — 450x.
NGC 5461	knot	14h03m41s	+54°19.0'	q 49	UMa	16"	buona / mediocre	**regione H II in M101** — piccola e relativamente compatta, molto brillante al centro, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 188x.
NGC 5462	knot	14h03m53s	+54°21.9'	q 49	UMa	16"	buona / mediocre	**regione H II in M101** — facilmente visibile in visione distolta a 188x, estesa da NE a SW, con dimensioni grosso modo di 60"×30", ma molto diffusa e di aspetto a tratti irregolare.
NGC 5463	gx	14h06m11s	+09°21.2'	q 196	Boo	16"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con bulge molto brillante; c'è una stellina debolmente sfuocata all'estremità NE visibile con una certa difficoltà: da un controllo successivamente effettuato, questa è risultata essere la MAC 1406+0921 — 270x.
NGC 5464	gx	14h07m04s	−30°01.0'	q 371	Hya	16"	buona / buono	galassietta compatta di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 5466	ag	14h05m27s	+28°32.1'	q 110	Boo	16"	ottima / m. buono	appare già finemente screziato a 132x e parzialmente risolto a 270x; è rotondo con Ø di 5' o 6'; le stelline non sono di luminosità uniforme e non è presente una condensazione centrale apprezzabile.
NGC 5468	gx	14h06m35s	−05°27.1'	q 286	Vir	24"	buona / m. buono	diffusa, a tratti leggermente screziata, con piccola condensazione centrale poco contrastata sul disco, rotonda con Ø > 1.5' — 450x.
NGC 5469	gx	14h06m18s	+09°24.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x tra NGC 5463 situata 3' a SE (e già osservata col 16" in altra data) e una stellina brillante a NE; forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 5470	gx	14h06m32s	+06°01.7'	q 196	Vir	16"	m. buona / discreto	è una edge-on, debole, di luminosità uniforme, orientata da ENE a WSW per circa un paio di primi — 270x.
NGC 5471	knot	14h04m29s	+54°23.8'	q 49	UMa	16"	buona / mediocre	**regione H II in M101** — molto brillante e compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 188x.
NGC 5472	gx	14h06m55s	−05°27.6'	q 286	Vir	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; è situata tra 2 stelline orientate perpendicolarmente alla gx di cui una quasi a ridosso SE — 450x.
NGC 5473	gx	14h04m43s	+54°53.6'	q 49	UMa	16"	m. buona / m. buono	rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con Ø di ~ 1'; c'è una stellina molto debole a ridosso verso NE — 270x.
NGC 5474	gx	14h05m02s	+53°39.6'	q 49	UMa	24"	m. buona / buono	presenta un bulge rotondo, di una 40-ina di secondi di Ø, debolmente screziato a 340x circonfuso da un alone molto tenue che in visione distolta appare decisamente asimmetrico, in quanto si estende maggiormente verso S; c'è una stellina a ridosso NE; la gx nel complesso è grosso modo rotonda con Ø di 2.5' (debolmente visibile anche nel 10", anche se la condensazione centrale era appena percettibile).
NGC 5475	gx	14h05m12s	+55°44.5'	q 49	UMa	16"	m. buona / discreto	molto allungata da N a S con dimensioni 2'×30"; presenta un bulge diffuso abbastanza contrastato e un nucleo stellare — 270x.
NGC 5476	gx	14h08m09s	−06°05.5'	q 287	Vir	16"	buona / ottimo	chiazza circolare abbastanza facile, ma con luminanza superficiale molto bassa; è rotonda con Ø superiore a 1'; meglio osservabile a 270x.
NGC 5477	gx	14h05m33s	+54°27.7'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	molto debole, rotonda, con Ø di ~ 1', molto diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina debolissima a ridosso verso S e un'altra appena più brillante e poco più distante verso SW — 188x.
NGC 5478	gx	14h08m09s	−01°42.1'	q 242	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 5479	gx	14h05m57s	+65°41.4'	q 27	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
NGC 5480	gx	14h06m21s	+50°43.6'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti 3' in direzione E-W, entrambe con alto gradiente di luce e prima vista di aspetto simile; la 1ª è però poco allungata da N a S con dimensioni 1.5'×1', mentre la 2ª è grosso modo rotonda con Ø di 1' — 188x.
NGC 5481	gx	14h06m41s	+50°43.4'	q 49	Boo	16"	discreta / buono	v. NGC 5480
NGC 5482	gx	14h08m31s	+08°55.9'	q 197	Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×40", con piccolo bulge contrastato e nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' W — 450x.
NGC 5484	gx	14h06m48s	+55°01.8'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	debolissima e molto piccola, forse circolare con Ø non superiore a 20"; è situata a poco più di 3' NW di NGC 5485 (osservata però in altra data) — 188x.
NGC 5485	gx	14h07m11s	+55°00.1'	q 49	UMa	16"	m. buona / discreto	orientata da N a S, di dimensioni 2'×1.5', con alto gradiente di luce, ma dai bordi non definiti in quanto è molto diffusa; presenta nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ridosso verso N appena percettibile a 270x.
NGC 5486	gx	14h07m25s	+55°06.2'	q 49	UMa	16"	m. buona / discreto	molto deboIe e molto stemperata sul fondo cielo, allungata da E a W con dimensioni 90"×45" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 5487	gx	14h09m44s	+08°04.1'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	debole, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W per poco meno di 1'; è disturbata dalla luce di una stella brillante di 9ª situata 3' a NE — 270x.
NGC 5490	gx	14h09m57s	+17°32.4'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	brillante, compatta, rotonda, con alto gradiente di luce, Ø di 45" e con condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 5490C	gx	14h10m07s	+17°37.0'	q 152	Boo	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda con Ø di 45", diffusa e di luminosità pressoché uniforme (altresì denominata **CGCG 103-100**) — 380x.
NGC 5491	gx	14h10m57s	+06°21.9'	q 197	Vir	16"	buona / ottimo	facilmente visibile, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45"; c'è una debole stellina 1' ENE — 380x.
NGC 5492	gx	14h10m35s	+19°36.7'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 1.5'×30" ma con basso gradiente di luce — 270x.
NGC 5493	gx	14h11m29s	−05°02.6'	q 287	Vir	24"	m. buona / ottimo	sembra fatta a isofote: presenta una piccola zona interna brillante estesa 30"×15" con al centro un nucleo stellare circonfusa da un disco ovale molto allungato da NE a SW con dimensioni 60"×20"; in visione distolta il tutto appare avviluppato in un tenue alone lungo come la gx e spesso ~ 45" e poco più accentuato verso N (già osservata col 10" a 240x in condizioni di cielo buone) — 450x.
NGC 5495	gx	14h12m23s	−27°06.5'	q 332	Hya	16"	m. buona / m. buono	è una debole bolla circolare di luminosità pressoché uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi e con una stellina brillante a ridosso di NE — 270x.
NGC 5496	gx	14h11m38s	−01°09.5'	q 242	Vir	16"	buona / ottimo	debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 3'× 30"; c'è una stellina verso l'estremità N — 380x.
NGC 5497	gx	14h10m32s	+38°53.6'	q 110	Boo	16"	m. buona / discreto	molto deboIe e diffusa approssim. Circolare, con Ø max di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 5498	gx	14h11m04s	+25°41.8'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45", diffusa e con piccolo bulge evidente — 270x.
NGC 5499	gx	14h10m48s	+35°54.8'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	rotonda con Ø di 45" poco diffusa e con basso gradiente di luce — 380x.
NGC 5500	gx	14h10m15s	+48°32.8'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	debole e diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso — 270x.
NGC 5501	gx	14h12m20s	+01°16.3'	q 242	Vir	16"	ottima / discreto	molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta, di luminosità uniforme, diffusa, probabilmente rotonda con Ø inferiore a 1'; c'è una stellina a 1' NW — 270x.
NGC 5503	gx	14h09m34s	+60°24.6'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	è di aspetto stellare se osservato in visione diretta a 188x; solo in visione distolta appare a tratti un alone molto tenue e piccolo, estesa forse una dozzina di secondi; ci sono 3 stelline di luminosità crescente nelle immediate vicinanze: a 1.5' W, a poco più di 1' SW e a un paio di primi SE — 188x.
NGC 5504	gx	14h12m16s	+15°50.6'	q 197	Boo	24"	ottima / ottimo	bella, di aspetto molto regolare, rotonda con Ø di 1' scarso, diffusa, con gradiente di luce molto basso e un debole nucleo stellare; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 5505	gx	14h12m32s	+13°18.3'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	debole gx allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5506	gx	14h13m15s	−03°12.5'	q 242	Vir	16"	ottima / discreto	diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 2'×30" e con bulge poco più evidente del disco — 270x.
NGC 5507	gx	14h13m20s	−03°08.9'	q 242	Vir	16"	ottima / discreto	presenta un nucleo stellare molto brillante e marcato circonfuso da un tenue alone poco allungata da NE a SW di dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 5508	gx	14h12m29s	+24°38.1'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	presenta una bassissima luminanza superficiale e appena più brillante all'interno; un piccolissimo nucleo puntiforme appare a tratti; è estesa attorno a 1' — 270x.
NGC 5509	gx	14h12m40s	+20°23.3'		Boo	16"	m. buona / ottimo	diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 50"×40" e con condensazione centrale evidente (non è riportata sull'Uranometria) — 380x.
NGC 5510	gx	14h13m37s	−17°59.0'	q 332	Vir	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1', poco più brillante all'interno; c'è una stellina situata a poco più di 1' verso SSE — 270x.
NGC 5511	gx	14h13m08s	+08°37.2'	q 197	Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
NGC 5512	gx	14h12m41s	+30°51.3'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	elusiva e molto piccola, appare solo a momenti; non dovrebbe essere più estesa di 10" o 15"; si riesce a catturare soltanto a 380x.
NGC 5513	gx	14h13m09s	+20°25.1'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	presenta una marcata condensazione centrale e un alone diffuso orientata all'incirca da E a W con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 5514	gx	14h13m39s	+07°39.6'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	diffusa e stemperato a basso gradiente di luce e di forma piuttosto irregolare, allungata da E a W per ~ 1'; ci sono, a nord, 2 stelline di eguale luminosità distanti un paio di primi di cui una a ~ 1' NE della gx — 270x.
NGC 5515	gx	14h12m38s	+39°18.6'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	ha un bulge leggermente ovale, un piccolo nucleo appena percettibile e 2 deboli baffi che si dipartono dal nucleo in direzione E-W; dimensioni totali: 90"×45" — 270x.
NGC 5517	gx	14h12m51s	+35°42.7'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con un nucleo stellare evidente e ben contrastato — 380x.
NGC 5518	gx	14h13m48s	+20°50.9'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	gx circolare, abbastanza compatta e con basso gradiente di luce, con Ø di una 40-ina di secondi; è situata a 1' SE di una stellina brillante — 270x.
NGC 5519	gx	14h14m21s	+07°31.0'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	piccola gx debole e rotonda,con Ø di una 30-ina di secondi con una stellina a ridosso verso E — 270x.
NGC 5520	gx	14h12m23s	+50°21.0'	q 49	Boo	16"	m. buona / buono	bella, luminosa, orientata da ENE a WSW, di dimensioni 2'×1', con bulge brillante circonfuso da un alone via via più tenue — 270x.
NGC 5521	gx	14h15m24s	+04°24.5'	q 242	Vir	16"	ottima / discreto	debole, rotonda, di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso del margine N — 270x.
NGC 5522	gx	14h14m50s	+15°08.8'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	è una tenue lama di luce di luminosità uniforme orientata da NE a SW ed estesa ~ 1.5' — 270x.
NGC 5523	gx	14h14m52s	+25°19.1'	q 152	Boo	24"	m. buon / m. buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 4'×1' scarse e con basso gradiente di luce; il bulge è molto diffuso e poco contrastato sul disco; appare debolmente screziata a 450x; c'è una stellina brillante un paio di primi a NW (già debolmente osservabile nel 10" a 178x, nel quale, tra l'altro, avevo stimato le stesse dimensioni).
NGC 5524	gx	14h14m27s	+36°24.3'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	debole, rotonda, di luminosità uniforme, con Ø 45" e poco diffusa — 380x.
NGC 5525	gx	14h15m39s	+14°17.0'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	ovale, con bulge brillante, ma di luminosità un po' irregolare, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 5526	gx	14h13m53s	+57°46.3'	q 49	UMa	16"	mediocre / buono	è una lama di luce molto debole, orientata da NW a SE ed estesa per 1.5'; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso N; a 188x, in visione distolta, appare, subito a SW, una piccola galassia molto tenue che da un controllo successivo è poi risultato essere la **MCG+10-20-84** di 15-esima grandezza.
NGC 5527	gx	14h15m19s	+36°12.1'	q 110	Boo	24"	ottima / m. buono	debolissima e di aspetto un po' confuso, grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi (o poco più); appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 450x.
NGC 5528	gx	14h16m20s	+08°17.6'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	piccolo e debole ovale orientato da N a S, di dimensioni 30"×20" e con un nucleo puntiforme visibile abbastanza facilmente; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 270x.
NGC 5529	gx	14h15m34s	+36°13.6'	q 110	Boo	24"	ottima / m. buono	è un bel fuso orientato da WNW a ESE, esteso per oltre 4' e con basso gradiente di luce; più interessante e meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 5531	gx	14h16m43s	+10°53.2'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	piccola, diffusa, forse leggermente ovale, orientata da N a S, di dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 5532	gx	14h16m53s	+10°48.5'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	è un bella gx rotonda con alto gradiente di luce, ma molto diffusa, con Ø superiore a 1'; la 5532B, situata a ridosso verso S, appare alla 1ª occhiata come una stellina abbastanza brillante; tuttavia la si osserva ad alti ingrandimenti e col seeing buono, come stasera, si vede chiaramente che si tratta di una macchiolina diffusa, estesa una 15-ina di secondi — 270x.
NGC 5533	gx	14h16m08s	+35°20.7'	q 110	Boo	16"	buona / buono	è un ovale diffuso orientato da NE a SW e di dimensioni 2'×1.5'; presenta un piccolo bulge e un nucleo stellare — 270x.
NGC 5534	gx	14h17m40s	−07°25.0'	q 287	Vir	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia ravvicinata (o forse interagente) con Mkn 1379A situata a ridosso verso E — diffusa, con bulge brillante e abbastanza contrastato, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; la Mkn è molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
NGC 5535	gx	14h17m38s	+08°10.7'	q 197	Boo	16"	buona / buono	debole, diffusa, con bassa luminanza superficiale, a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30", anche se la forma non è molto definita — 270x.
NGC 5536	gx	14h16m24s	+39°30.1'	q 77	Boo	16"	buona / buono	debole gx molto diffusa, probabilmente circolare con Ø di 1'; presenta un nucleo puntiforme — 270x.
NGC 5537	gx	14h17m37s	+07°03.3'	q 197	Vir	16"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme; solo a momenti appare poco allungata da NE a SW per una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ~ 1' verso SW — 380x.
NGC 5538	gx	14h17m42s	+07°28.6'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	molto debole, solo a momenti appare allungata da NE a SW per 30" o 40"; presenta tuttavia un piccolo bulge poco più brillante — 270x.
NGC 5540	gx	14h14m54s	+60°00.7'	q 49	UMa	16"	discreta / buono	approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare evidente a 188x.
NGC 5541	gx	14h16m32s	+39°35.4'	q 77	Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante e con alto gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni poco superiori a 30"×20"; appare a tratti poco più "sfilacciata" verso N; c'è una stellina appena percettibile al bordo meridionale; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a SW — 450x.
NGC 5542	gx	14h17m53s	+07°33.5'	q 197	Boo	16"	m. buona / discreto	relativamente facile, leggermente allungata ~ da N a S per una 30-ina max di secondi, con condensazione centrale evidente — 270x.
NGC 5543	gx	14h18m04s	+07°39.3'	q 286	Boo	16"	m. buona / discreto	debole, compatta, piccola, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20", allineata con 2 stelline orientate da N a S — 270x.
NGC 5544	gx	14h17m02s	+36°34.3'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx che si riescono a separare facilmente a causa della bontà del seeing; in visione distolta, si fondono in un'unica chiazza allungata da NE a SW; in realtà la 1ª è rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale abbastanza brillante; la 2ª è di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW per una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 5545	gx	14h17m05s	+36°34.6'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	v. NGC 5544
NGC 5546	gx	14h18m09s	+07°33.9'	q 197	Boo	16"	m. buona / discreto	abbastanza brillante, rotonda,diffusa, con marcata condensazione centrale e Ø di 45" — 270x.
NGC 5547	gx	14h09m45s	+78°36.1'	q 10	UMi	16"	discreta / buono	molto debole, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare molto tenue visibile solo a momenti; è situata tra 2 stelline appena percettibili orientate in direzione N-S — 188x.
NGC 5548	gx	14h17m59s	+25°08.2'	q 152	Boo	24"	m. buon / m. buono	presenta un brillante nucleo stellare (ma potrebbe in effetti anche trattarsi di una stellina sovrapposta) circonfuso da un alone circolare molto stemperato sul fondo cielo ed esteso quasi 1.5' (già precedentemente osservata nel 10" a 178x).
NGC 5549	gx	14h18m39s	+07°22.6'	q 197	Vir	16"	m. buona / discreto	bell'ovale abbastanza luminoso orientata da NW a SE, di dimensioni 60"×45", con alto gradiente di luce e condensazione centrale puntiforme visibile a momenti — 270x.
NGC 5550	gx	14h18m28s	+12°53.0'	q 197	Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso SW; più interessante e meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 5551	gx	14h18m55s	+05°27.1'	q 197	Vir	16"	buona / ottimo	piccola, compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
NGC 5552	gx	14h19m04s	+07°01.9'	q 197	Vir	16"	buona / ottimo	assieme a NGC 5534 forma una coppia di deboli galassiette di luminosità uniforme e distanti 3' scarsi in direzione NNW-SSE; la 1ª è poco più evidente, orientata da N a S, con dimensioni 30"×15"; la 2ª, poco più piccola, è una macchiolina che in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 380x.
NGC 5553	gx	14h18m30s	+26°17.3'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" con condensazione centrale abbastanza evidente — 270x.
NGC 5554	gx	14h19m15s	+07°01.3'	q 197	Vir	16"	buona / ottimo	v. NGC 5552
NGC 5555	gx	14h18m48s	−19°08.3'	q 332	Vir	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima galassietta di luminosità uniforme estesa una 40-ina di secondi che salta fuori in visione distolta quando si osserva la stellina situata un paio di primi verso NE — 270x.
NGC 5556	gx	14h20m34s	−29°14.5'	q 372	Hya	16"	buona / buono	debolissimo lucore a prima vista indistinto, mentre in visione distolta appare orientata ~ da N a S con dimensioni 3'×2'; bisogna tuttavia scendere di potenza sino a 132x per avere la visione migliore; ci sono 5 stelline ravvicinate a ridosso verso S di cui una abbastanza brillante a NW.
NGC 5557	gx	14h18m26s	+36°29.6'	q 110	Boo	24"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo molto brillante, rotondo con Ø di una 20-ina di secondi circonfuso da un alone che si stempera abbastanza rapidamente sul fondo cielo; la gx è rotonda con Ø > 2'; la parte più interna appare vagamente screziata anche a 340x; c'è una stellina brillante a ridosso del nucleo verso S (era facilmente osservabile anche nel 10" a 126x).
NGC 5559	gx	14h19m12s	+24°47.9'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	molto debole, orientata da ENE a WSW, di dimensioni 80"×20" e appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 5560	gx	14h20m04s	+03°59.5'	q 242	Vir	16"	buona / discreto	debole e diffusa, molto allungata da ESE a WNW, di dimensioni 2'×30" e con gradiente di luce molto basso; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 188x.
NGC 5561	gx	14h17m16s	+58°42.6'	q 49	UMa	24"	m. buona / discreto	appare solo in visione distolta come una debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; poco meglio definita restando a 450x (a 340x sembra più difficile).
NGC 5562	gx	14h20m11s	+10°15.8'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	rotonda, dai bordi molto diffusi, alto gradiente di luce, grosso modo circolare con Ø 45"; c'è una stellina a ~ 1' SE — 270x.
NGC 5563	gx	14h20m13s	+07°03.3'	q 197	Vir	16"	buona / m. buono	piccola galassietta rotonda, diffusa, con evidente condensazione centrale e Ø di una 30-ina di secondi; a 270x sembra un piccolo ammasso globulare.
NGC 5566	gx	14h20m20s	+03°56.0'	q 242	Vir	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa, poco allungata da NNE a SSW con dimensioni 1.5'×1'; presenta un bulge piccolo e marcato e un nucleo stellare osservabile a 270x.
NGC 5567	gx	14h19m18s	+35°08.3'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi, con condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti; c'è una stellina a 30"-40" verso S' — 380x.
NGC 5568	gx	14h19m21s	+35°05.5'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, di aspetto confuso, molto stemperata ai bordi ed estesa per una 30-ina di secondi' — 380x.
NGC 5569	gx	14h20m32s	+03°59.0'	q 242	Vir	16"	buona / discreto	debolissima e molto piccola; rimane a prima vista di aspetto quasi stellare a 188x, forse a causa di un nucleo puntiforme presente all'interno; solo a momenti, in visione distolta, appare un elusivo alone circolare con Ø di una 20-ina di secondi-30"; è situata subito a NE della 5566 osservata in altra data.
NGC 5570	gx	14h19m30s	+07°27.3'	q 197	Boo	24"	buona / ottimo	è una piccola gx molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; a 450x appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
NGC 5572	gx	14h19m36s	+36°08.3'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e a bassa luminanza superficiale, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi' — 380x.
NGC 5573	gx	14h20m42s	+06°54.4'	q 197	Vir	16"	buona / m. buono	debole gx di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; solo a momenti appare una condensazione centrale puntiforme — 270x.
NGC 5574	gx	14h20m56s	+03°14.3'	q 242	Vir	16"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
NGC 5575	gx	14h21m00s	+06°12.1'	q 197	Vir	16"	buona / ottimo	approssim. circolare, con Ø di ~ 1', con piccola ed evidente condensazione centrale che appare chiaramente in visione diretta, mentre l'alone si apprezza bene solo in visione distolta — 380x.
NGC 5576	gx	14h21m04s	+03°16.3'	q 242	Vir	16"	m. buona / m. buono	diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 2'×1.5 e con alto gradiente di luce; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW — 380x.
NGC 5577	gx	14h21m13s	+03°26.1'	q 242	Vir	16"	buona / discreto	molto debole e diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a un paio di primi verso NW — 188x.
NGC 5579	gx	14h20m27s	+35°11.3'	q 197	Boo	16"	m. buona / buono	debole lucore molto diffuso esteso 1.5', di aspetto un po' confuso, con tenue condensazione centrale abbastanza evidente in visione distolta — 270x.
NGC 5581	gx	14h21m16s	+23°28.8'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	approssim. circolare con Ø di 45", poco più brillante verso l'interno e con nucleo stellare visibile a momenti; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso S — 270x.
NGC 5582	gx	14h20m43s	+39°41.6'	q 77	Boo	28"	m. buona / buono	bella, presenta un bulge pressoché circolare, brillante con Ø di una 30-ina di secondi circonfuso da un tenue alone ovale orientato da NNE a SSW con dimensione complessiva di 90"×60"; ci sono 2 stelline quasi a ridosso della gx: a E e l'altra abbastanza brillante a SW — 495x.
NGC 5583	gx	14h21m40s	+13°13.9'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	abbastanza compatta, rotonda,con Ø di una 30-ina di secondi gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 5584	gx	14h22m24s	−00°23.2'	q 242	Vir	16"	buona / ottimo	chiazza diffusa poco allungata da N a S con dimensioni 2.5'×2' e con basso gradiente di luce; lievi discrepanze di luce appaiono sul disco a 380x; è situata a ridosso di un piccolo asterismo foggiato a "Y" e formato da 4 stelle: la componente più orientale è brillante.
NGC 5585	gx	14h19m48s	+56°43.7'	q 49	UMa	24"	m. buona / buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, alquanto sfilacciata, orientata da NNE a SSW con dimensioni 4'×2'; c'è una debole stellina a 1' dal bordo orientale e un'altra di luminosità simile al margine S; una 3ª più brillante si trova subito a NE della gx (era debolmente visibile anche nel 10") — 340x.
NGC 5587	gx	14h22m11s	+13°55.1'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	è una bella gx di aspetto regolare, molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", con bulge diffuso e un piccolo nucleo stellare — 270x.
NGC 5589	gx	14h21m25s	+35°16.2'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	rotonda con Ø di ~ 1', molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme' — 380x.
NGC 5590	gx	14h21m38s	+35°12.3'	q 110	Boo	16"	buona / ottimo	situata a ~ 5' SSE di NGC 5589, è più brillante, poco più brillante all'interno, rotonda, con Ø simile e molto diffusa' — 380x.
NGC 5591	gx	14h22m34s	+13°43.1'	q 197	Boo	16"	buona / discreto	molto debole, allungata da E a W per 1' scarso, con bulge diffuso; un debolissimo nucleo puntiforme appare solo a momenti a 270x.
NGC 5592	gx	14h23m55s	−28°41.3'	q 372	Hya	16"	m. buona / m. buono	è di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è un piccolo triangolo isoscele di stelle brillanti subito a E: il vertice più acuto sembra quasi puntare verso la gx — 270x.
NGC 5594	gx	14h23m10s	+26°16.0'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	è una debole gx molto diffusa, poco più brillante all'interno, orientata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e situata a un paio di primi NNW di una stellina brillante — 270x.
NGC 5595	gx	14h24m13s	−16°43.4'	q 287	Lib	16"	m. buona / discreto	è una chiazza di luminosità abbastanza uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 80"×60" — 270x.
NGC 5596	gx	14h22m29s	+37°07.3'	q 111	Boo	16"	buona / ottimo	debole, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e con tenue condensazione centrale — 380x.
NGC 5597	gx	14h24m28s	−16°45.8'	q 287	Lib	16"	m. buona / discreto	più debole e di aspetto più confuso di NGC 5595, dalla quale dista 4' a SE, in quanto appare molto stemperata sul fondo cielo; è estesa quasi 2' e presenta un nucleo quasi stellare piuttosto marcato, tant'è che alla prima occhiata, a bassi ingrandimenti, l'avevo scambiata per una stellina — 270x.
NGC 5598	gx	14h22m28s	+40°19.2'	q 77	Boo	16"	ottima / m. buono	fa parte, assieme a NGC 5601, 5603 e UGC 9216 di un quartetto — questa è la più brillante, approssim. rotonda con Ø di 45", di aspetto un po' irregolare e con una marcata condensazione centrale — 270x.
NGC 5599	gx	14h23m51s	+06°34.5'	q 197	Vir	16"	buona / ottimo	è una debole chiazza diffusa,appena più brillante all'interno, allungata da N a S, con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante 3' o 4' SSE — 380x.
NGC 5600	gx	14h23m49s	+14°38.3'	q 197	Boo	24"	m. buona / ottimo	bella, molto brillante, rotonda con Ø di oltre 1', gradatamente più brillante verso l'interno e con tenue nucleo stellare; il disco non sembra perfettamente regolare e appaiono su di esso alcune discrepanze di luce abbastanza evidenti a 450x (già precedentemente osservata col 10" a 178x in condizioni di cielo analoghe).
NGC 5601	gx	14h22m53s	+40°18.6'	q 77	Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole, ma in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S, con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 5602	gx	14h22m19s	+50°30.1'	q 49	Boo	16"	m. buona / buono	allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 80"×40", con bulge luminoso, mentre il disco è molto tenue e si nota solo in visione distolta; presenta un piccolo nucleo stellare — 270x.
NGC 5603	gx	14h23m02s	+40°20.7'	q 77	Boo	16"	ottima / m. buono	è poco più debole di NGC 5598 e di aspetto più "morbido" e regolare; è rotonda, un poco diffusa, di Ø simile e presenta una nucleo stellare — 270x.
NGC 5604	gx	14h24m43s	−03°12.7'	q 242	Vir	16"	m. buona / ottimo	si vede abbastanza facilmente malgrado la Luna di età 6 giorni; è allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
NGC 5605	gx	14h25m08s	−13°09.8'	q 287	Lib	16"	m. buona / discreto	facile, ma molto diffusa e con bassa luminanza superficiale; forse rotonda con Ø di almeno 1.5' — 270x.
NGC 5607	gx	14h19m27s	+71°35.3'	q 27	UMi	16"	buona / discreto	presenta un nucleo di aspetto stellare, bulge abbastanza contrastato e un piccolo alone molto tenue e di forma indistinta — 270x.
NGC 5608	gx	14h23m18s	+41°46.5'	q 77	Boo	16"	buona / discreto	molto diffusa, orientata da E a W con dimensioni 1.5'×1' e di luminosità pressoché uniforme; è situata tra 2 stelline debolissime orientate da N a S e distanti ~ 5' — 188x.
NGC 5609	gx	14h23m48s	+34°50.6'	q 111	Boo	16"	ottima / discreto	debolissima, quasi elusiva, molto piccola (anche in visione distolta appare a tratti di aspetto quasi stellare); è la più debole di un quartetto che non ho ancora osservata; forma una sorta di losanga con tre stelline situate a SW, S e SE; NGC 5613, situata 5' NE e che in visione diretta è anch'essa di aspetto stellare, è più facile e appare nebulosa in visione laterale — 270x.
NGC 5610	gx	14h24m23s	+24°36.9'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	è una gx a basso gradiente di luce, orientata da E a W, dimensioni 80"×30" ed è molto diffusa a entrambi i lati E e W; a un'osservazione protratta appare di forma leggermente irregolare — 270x.
NGC 5611	gx	14h24m05s	+33°02.9'	q 76	Boo	16"	buona / m. buono	brillante, posta praticamente di taglio, con un bulge luminoso e nucleo molto marcato, quasi stellare; è estesa per ~ 1' e orientata da ENE a WSW — 270x.
NGC 5613	gx	14h24m06s	+34°53.5'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	fa parte di un terzetto assieme a NGC 5614 e 5615 — è molto debole, con dimensioni di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale visibile a momenti — 270x.
NGC 5614	gx	14h24m07s	+34°51.5'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	relativamente brillante, rotonda, con Ø poco superiore a 1', con alto gradiente di luce e marcata condensazione centrale — 270x.
NGC 5615	gx	14h24m05s	+34°52.3'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	debolissima, appare solo in visione distolta come una sorta di elusiva protuberanza immersa nell'alone della 5614 — 270x.
NGC 5616	gx	14h24m21s	+36°27.6'	q 111	Boo	16"	buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, molto allungata ~ da N a S per oltre 1.5' — 380x.
NGC 5618	gx	14h27m12s	−02°15.7'	q 242	Vir	16"	m. buona / ottimo	in visione diretta si vede a tratti un nucleo stellare; in visione distolta appare invece chiaramente nebulosa con Ø di una 40-ina di secondi; a 380x è di luminosità uniforme e si vede più distintamente (presenza della Luna di età 6 giorni a circa 40° di distanza).
NGC 5619	gx	14h27m18s	+04°48.2'	q 242	Vir	24"	buona / m. buono	forma un terzetto con IC 4424 e UGC 9258 — diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 80"×40" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a 1.5' verso NW — 450x.
NGC 5620	gx	14h22m40s	+69°35.7'	q 27	UMi	16"	buona / discreto	piccola galassia abbastanza brillante, compatto, di dimensioni non superiori ai 30"; c'è una stella brillante a neppure 1' verso N — 270x.
NGC 5622	gx	14h26m12s	+48°33.8'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1' e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5623	gx	14h27m09s	+33°15.2'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	è un ovale di dimensioni 60"×45", orientata da NE a SW che presenta una condensazione centrale molto luminosa di aspetto quasi stellare e un tenue alone circonfuso — 270x.
NGC 5624	gx	14h26m35s	+51°35.1'	q 49	Boo	16"	m. buona / buono	debole, con basso gradiente di luce, di dimensioni 60"×30" e orientata all'incirca da N a S — 270x.
NGC 5625	gx	14h27m02s	+39°57.5'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	molto debole, di luminosità uniforme e di aspetto circolare, con Ø superiore a 1' — 270x.
NGC 5627	gx	14h28m34s	+11°22.7'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	molto diffusa, con bulge evidente e condensazione centrale puntiforme; è allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 5628	gx	14h28m26s	+17°55.5'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	all'incirca rotonda, diffusa e con Ø di una 40-ina di secondi; presenta una piccola condensazione centrale quasi stellare che a tratti appare leggermente decentrata verso S — 270x.
NGC 5629	gx	14h28m16s	+25°50.9'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	rotonda, con alto gradiente di luce, molto diffusa e con Ø di 1.5' — 270x.
NGC 5630	gx	14h27m36s	+41°15.5'	q 77	Boo	16"	buona / mediocre	gx ovale di dimensioni 90"×30", orientata da E a W e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 5631	gx	14h26m33s	+56°35.0'	q 49	UMa	16"	m. buona / discreto	rotonda, molto diffusa e con Ø di un paio di primi; presenta un nucleo brillante di aspetto stellare, un bulge estesa una 40-ina di secondi e circonfuso da un alone via via più tenue — 380x.
NGC 5632	gx	14h28m20s	−00°12.3'		Vir	16"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa; salta fuori in visione distolta di 30" o 40" a 8' NW di un arco di stelline brillanti che costituisce l'unico riferimento; una stellina appare a tratti a ridosso verso E (non è riportata sull'Uranometria) — 270x.
NGC 5633	gx	14h27m28s	+46°08.3'	q 77	CVn	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; appare a tratti leggermente screziata all'interno a 450x.
NGC 5634	ag	14h29m37s	−05°58.6'	q 287	Vir	6"	buona / buono	piccolo, esteso non più di 1' e situato a circa 1' W di una brillante stellina arancione.
NGC 5635	gx	14h28m31s	+27°24.5'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	è un fuso orientata da NE a SW, di dimensioni 80"×40", con bulge estesa ed evidente e alone molto stemperato alle 2 estremità — 270x.
NGC 5636	gx	14h29m39s	+03°16.0'	q 242	Vir	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto piuttosto uniforme, a 450x, appena più brillante all'interno, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×50"; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 5637	gx	14h29m00s	+23°11.5'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	abbastanza compatta, di luminosità uniforme, ovale, orientata da N a S e con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 5638	gx	14h29m40s	+03°14.0'	q 242	Vir	24"	m. buona / m. buono	molto brillante, presenta un disco rotondo molto diffuso di Ø 1.5' scarso con all'interno un piccolo bulge molto contrastato e un nucleo stellare (già facilmente osservabile nel 10") — 450x.
NGC 5639	gx	14h28m46s	+30°24.8'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	molto debole, a tratti allungata da E a W, di dimensioni 60"×45" e di luminosità uniforme; è situata a ~ 1' N di una stellina brillante — 270x.
NGC 5640	gx	14h20m41s	+80°07.4'	q 10	Cam	20"	buona / scarso	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare molto tenue; ci sono due stelline molto deboli 1' a S e orientate come la gx — 360x.
NGC 5641	gx	14h29m17s	+28°49.3'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	è una gx diffusa, con basso gradiente di luce, bulge evidente e un alone un po' irregolare orientata da NNW a SSE di dimensioni 1.5'×1' — 270x.
NGC 5642	gx	14h29m13s	+30°01.6'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e condensazione centrale evidente; l'alone arriva a lambire una stellina situata a SE — 270x.
NGC 5644	gx	14h30m26s	+11°55.7'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	presenta una marcata condensazione centrale e un alone rotondo molto tenue e stemperato con Ø di almeno 1'; la condensazione sembra leggermente decentrata verso N — 270x.
NGC 5645	gx	14h30m39s	+07°16.5'	q 197	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità non proprio regolare se osservata a 450x; è gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da E a W con dimensioni 2'×1' (già precedentemente osservata col 10" a 178x in condizioni di cielo analoghe).
NGC 5646	gx	14h29m34s	+35°27.7'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, molto allungata, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 270x.
NGC 5647	gx	14h30m36s	+11°52.6'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a 1' SW — 270x.
NGC 5648	gx	14h30m33s	+14°01.3'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	di luminosità uniforme, poco allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×45" (altresì riportata come NGC 5649) — 270x.
NGC 5652	gx	14h31m01s	+05°58.7'	q 197	Vir	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, poco allungata all'incirca da NW a SE, di dimensioni 1.5'×1' e luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile al bordo orientale — 270x.
NGC 5653	gx	14h30m10s	+31°12.9'	q 111	Boo	24"	m. buona / m. buono	poco allungata da NW a SE con dimensioni 80"×60", brillante, ma con basso gradiente di luce; appare screziata a 450x; c'è una stellina a 1' verso N e un'altra più debole a 1.5' SE (debolmente visibile e di aspetto uniforme nel 10") — 450x.
NGC 5654	gx	14h30m01s	+36°21.6'	q 111	Boo	16"	buona / ottimo	è un ovale allungata da NNW a SSE, di dimensioni 45"×30"; appare qualcosa di puntiforme verso l'estremità NW (o NNW): o un nodulo o una stellina *(inizia ad albeggiare)* — 380x.
NGC 5655	gx	14h30m51s	+13°58.1'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	più brillante della 5648, dalla quale dista 5.5' a SE, di luminosità uniforme, molto diffusa, rotonda e con Ø di ~ 45"; è situata tra 2 deboli stelline distanti 3' e orientate da NNW a SSE — 270x.
NGC 5656	gx	14h30m25s	+35°19.2'	q 197	Boo	16"	buona / ottimo	un'altra galassia ovale, orientata da NE a SW, di dimensioni 60"×45" e con bulge poco più luminoso dell'alone; c'è una stellina a 1' SE *(inizia ad albeggiare)* — 380x.
NGC 5657	gx	14h30m44s	+29°10.9'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	molto allungata da NNW a SSE,di dimensioni 80"×30", con bulge poco più evidente dell'alone — 270x.
NGC 5658	gx	14h32m28s	+00°17.6'	q 242	Vir	16"	m. buona / ottimo	debolissima, situata in una piccola zona quasi depleta (un'unica stella brillante di 12-esima si trova 5' SE); sono riuscito a coglierla a 380x e appariva molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30".
NGC 5659	gx	14h31m06s	+25°21.3'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30" — 270x.
NGC 5660	gx	14h29m49s	+49°37.4'	q 77	Boo	16"	buona / discreto	diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 2' scarsi, anche si aspetto non perfettamente regolare; meglio contrastata a 270x.
NGC 5661	gx	14h31m57s	+06°15.1'	q 197	Vir	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme salvo una lieve discrepanza di luce che a tratti appare verso S; molto allungata da N a S per oltre 1'; c'è una stellina a pochi secondi dal bordo settentrionale — 270x.
NGC 5663	gx	14h33m56s	−16°34.9'	q 287	Lib	16"	m. buona / discreto	debole, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 45" (molte stelline brillanti sono presenti nel campo) — 270x.
NGC 5664	gx	14h33m44s	−14°37.2'	q 287	Lib	16"	m. buona / discreto	relativamente facile, ma di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina ben evidente 1' a SE — 270x.
NGC 5665	gx	14h32m26s	+08°04.7'	q 197	Boo	24"	buona / buono	a 400x appare grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso, diffusa e leggermente screziata; a tratti salta fuori un tenue nucleo stellare; a 200x sembra invece poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×50" (era visibile anche nel 10" a 118x come un oggetto rotondo, debole e diffuso).
NGC 5665A	gx	14h21m30s	+05°04.4'	q 197	Boo	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue nucleo stellare osservabile ogni tanto a 400x (è altresì denominata **UGC 9190**).
NGC 5666	gx	14h33m09s	+10°30.6'	q 197	Boo	16"	ottima / ottimo	rotonda, compatta, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 5667	gx	14h30m23s	+59°28.2'	q 50	Dra	16"	buona / buono	orientata ~ da N a S, di dimensioni 90"×45", poco più brillante all'interno, ma coi bordi poco definiti; presenta un nucleo puntiforme visibile a tratti; c'è una debole stellina a ridosso verso NE — 270x.
NGC 5668	gx	14h33m25s	+04°27.0'	q 242	Vir	16"	m. buona / ottimo	rotonda, di Ø 1.5', diffusa, poco più brillante verso l'interno, ma con basso gradiente di luce; c'è una stellina al bordo orientale che in visione distolta, a ingrandimenti inferiori, sembra trovarsi all'interno dell'alone — 380x.
NGC 5669	gx	14h32m44s	+09°53.5'	q 197	Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, con bulge esteso e poco contrastato sul disco, debolmente screziata a 340x; nel complesso è orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 3'×1.5'; c'è una debole stellina a ridosso verso N (già osservabile molto debolmente nel 10" at 118x).

NGC 5671	gx	14h27m42s	+69°41.7'	q 27	UMi	16"	buona / discreto	poco allungata da NE a SW, di dimensioni 1.5'×1', con bulge evidente e poco contrastato sul disco — 270x.
NGC 5672	gx	14h32m38s	+31°40.2'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 5673	gx	14h31m31s	+49°57.4'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	di luminosità uniforme, molto allungata da SE a NW, di dimensioni 2.5'×30"; c'è una stellina brillante al bordo NW — 270x.
NGC 5674	gx	14h33m52s	+05°27.5'	q 197	Vir	16"	buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda, con basso gradiente di luce e Ø di 1'; presenta una tenue condensazione centrale quasi stellare visibile a momenti — 270x.
NGC 5675	gx	14h32m40s	+36°18.2'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, molto allungata da NW a SE , di dimensioni 90"×30" e con un bulge estesa poco più brillante dell'alone — 270x.
NGC 5676	gx	14h32m47s	+49°27.5'	q 77	Boo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, screziata a 450x, allungata da NE a SW con dimensioni 3'×1.5' e nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile al bordo W (era già facilmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 5677	gx	14h34m12s	+25°28.1'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	è una debole chiazza lattiginosa di luminosità uniforme, diffusa e con dimensioni di ~ 1' — 270x.
NGC 5678	gx	14h32m06s	+57°55.4'	q 50	Dra	24"	m. buona / buono	bella, poco diffusa e con basso gradiente di luce, screziata a 450x, allungata da N a S con dimensioni 2'×1'; è situata all'interno di un trapezio formato da 4 stelline con le basi orientate da N a S: la componente più a N è la più brillante (era facilmente osservabile anche nel 10").
NGC 5679A	gx	14h35m06s	+05°21.3'	q 197	Vir	16"	buona / m. buono	debolissima, estesa non più di 20" e situata a ridosso S di una stellina relativamente brillante; in visione distolta sembra una sorta di piccolo alone asimmetrico della stella; quest'ultima, tra l'altro, presenta uno strano aspetto diffuso — 270x.
NGC 5679B	gx	14h35m09s	+05°21.5'	q 197	Vir	16"	buona / m. buono	più facile e poco più estesa di NGC 5679A, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; è ben separata, verso E, dalla stellina di riferimento della gx precedente — 270x.
NGC 5680	gx	14h35m45s	−00°00.8'	q 242	Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, diffusa, con condensazione centrale di aspetto quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o poco più; c'è una stellina brillante a ridosso verso N che fa parte di un piccolo triangolo isoscele rettangolo: la componente occidentale è la più brillante; c'è una stellina o un nodulo appena percettibile a ridosso di NE (già osservabile molto debolmente nel 10" a 178x in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 5681	gx	14h35m43s	+08°12.0'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	è di aspetto confuso, ma approssim. circolare, con Ø di ~ 1' e appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 5682	gx	14h34m45s	+48°40.2'	q 77	Boo	16"	buona / mediocre	molto allungata da NW a SE per 1.5' e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 5683	gx	14h34m52s	+48°39.7'	q 77	Boo	16"	buona / mediocre	situata a ridosso SE della precedente è una piccola galassia circolare, con Ø di neppure 30"; presenta una debole condensazione centrale visibile a momenti — 188x.
NGC 5684	gx	14h35m50s	+36°32.6'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	assieme a NGC 5686 forma una coppia di gx distanti 4' in direzione NW-SE; la 1ª è ovale, di gradiente di luce medio, diffusa ai bordi, orientata da E a W con dimensioni 60"×45"; la 2ª è più debole e piccola, circolare, con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5685	gx	14h35m15s	+29°54.5'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o 40", con condensazione evidente di aspetto stellare — 270x.
NGC 5686	gx	14h36m03s	+36°30.2'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	v. **NGC 5684**
NGC 5687	gx	14h34m52s	+54°28.6'	q 50	Boo	24"	m. buona / buono	presenta un bulge rotondo con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare molto contrastato su un disco molto diffuso orientata da E a W e di dimensioni 90"×60"; ci sono 3 stelline allineate che si protendono verso S a partire da una presso il bordo W; un'altra stellina molto debole si trova invece verso il bordo orientale (era debolmente osservabile anche nel 10") — 450x.
NGC 5689	gx	14h35m30s	+48°44.6'	q 77	Boo	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da E a W con dimensioni quasi 4'×1' e molto diffusa alle estremità del fuso; presenta un bulge estesa , contrastato con all'interno un nucleo stellare (già facilmente visibile nel 10") — 450x.
NGC 5690	gx	14h37m41s	+02°17.5'	q 242	Vir	16"	buona / ottimo	molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'×30", di luminosità pressoché uniforme e leggermente screziata a 380x; c'è una stellina al bordo SE; la gx è disturbata dalla brillante SAO 120569 di magnitudo 6.4 situata ad appena 3' WSW e che non si riesce quindi a tenere fuori campo.
NGC 5691	gx	14h37m53s	−00°23.8'	q 242	Vir	16"	buona / ottimo	brillante, relativamente compatta, ma con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 80"×50" — 380x.
NGC 5692	gx	14h38m18s	+03°24.6'	q 242	Vir	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e di aspetto molto regolare; c'è una stellina a 1.5' verso N — 270x.
NGC 5693	gx	14h36m12s	+48°35.2'	q 77	Boo	16"	buona / mediocre	rotonda, con Ø poco superiore a 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso S — 188x.
NGC 5694	ag	14h39m36s	−26°32.3'	q 332	Hya	10"	buona / buono	piccolo e relativamente compatto, con Ø 1.5'; c'è qualche lieve irregolarità di luce all'interno, ma non si riesce a risolvere neppure a 178x; c'è una stellina brillante a ridosso verso SSW.
NGC 5695	gx	14h37m22s	+36°34.1'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	relativamente facile, orientata da NW a SE, di dimensioni 60"×45", con una piccola condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina a ridosso del nucleo verso N — 270x.
NGC 5696	gx	14h36m57s	+41°49.7'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	è un ovale di luminosità un po' irregolare, con basso gradiente di luce, di dimensioni 1.5'×1' e orientata da NE a SW — 270x.
NGC 5697	gx	14h36m32s	+41°41.2'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	più debole di NGC 5696 e più piccola, di dimensioni 60"×45" e pure orientata grossomodo da NE a SW — 270x.
NGC 5698	gx	14h37m15s	+38°27.2'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	diffusa, di aspetto un po' irregolare, allungata all'incirca da E a W, dimensioni 2'×1' e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5700	gx	14h37m02s	+48°32.7'	q 77	Boo	16"	buona / mediocre	più debole e più piccola della 5693 , orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 188x.
NGC 5701	gx	14h39m11s	+05°21.8'	q 197	Vir	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo molto brillante di aspetto quasi stellare circonfuso da un alone ovale orientato da N a S con dimensioni 90"×60"; c'è una stellina a poco più di 1' NNE; scalando a 340x sembra di vedere, seppure a momenti, una tenuissima banda a E della gx che arriva a lambire una stellina abbastanza luminosa situata 2.5' a NE (già precedentemente osservata col 10" a 178x in condizioni di cielo buone).
NGC 5702	gx	14h38m55s	+20°30.5'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	di aspetto un po' confuso, ma è grosso modo rotonda, con basso gradiente di luce, con Ø di una 40-ina di secondi e presenta una piccola condensazione centrale — 270x.
NGC 5705	gx	14h39m50s	−00°43.1'	q 242	Vir	16"	m. buona / ottimo	debole lucore molto stemperato sul fondo cielo e con bassissima luminanza superficiale; è orientata da NE a SW con dimensioni ~ 2'×1' (presenza della Luna di età 6 giorni; al momento dell'osservazione non era più alta di 30° sull'orizzonte) — 270x.
NGC 5706	gx	14h38m42s	+30°28.0'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	assieme a NGC 5709 forma una coppia di gx deboli distanti un paio di primi in direzione NW-SE; la 1ª è piccola, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; la 2ª è pure di luminosità uniforme, allungata da E a W e di dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 5707	gx	14h37m31s	+51°33.7'	q 50	Boo	24"	ottima / ottimo	è un bel fuso orientato da NE a SW esteso un paio di primi e spesso una 20-ina di secondi (o poco più), con bulge brillante di 20"×15" e nucleo stellare — 450x.
NGC 5708	gx	14h38m16s	+40°27.6'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	molto allungata da N a S, di luminosità uniforme e dimensioni 60"×30"; c'è una stellina al margine meridionale — 270x.
NGC 5709	gx	14h38m50s	+30°26.6'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	v. **NGC 5706**
NGC 5710	gx	14h39m16s	+20°02.6'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda, con Ø di 1' scarso, con bulge piccolo ed evidente — 270x.
NGC 5711	gx	14h39m23s	+19°59.5'	q 152	Boo	16"	m. buona / buono	più debole e poco più piccola di NGC 5710, con Ø di 45" e di luminosità pressoché uniforme; è situata 1' SE di una stellina doppia con le componenti serrate — 270x.
NGC 5712	gx	14h29m42s	+78°51.8'	q 10	UMi	16"	ottima / discreto	debole, diffusa, approssim. circolare, con Ø di una 40-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 188x.
NGC 5713	gx	14h40m12s	−00°17.4'	q 243	Vir	16"	m. buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, approssim. rotonda con Ø di un paio di primi; presenta come una "spaccatura" o una discrepanza di luminosità verso SW — 380x.
NGC 5714	gx	14h38m11s	+46°38.3'	q 77	Boo	16"	m. buona / m. buono	debole lama di luce estesa 3', orientata da E a W e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5716	gx	14h41m06s	−17°28.5'	q 333	Lib	16"	buona / ottimo	è un debole lucore diffuso esteso per ~ 1', ma di forma indistinta e di luminosità pressoché uniforme; c'è una coppia di stelline a ridosso del bordo di NE (al momento dell'osservazione la gx era molto bassa sull'orizzonte) — 270x.
NGC 5717	gx	14h38m38s	+46°38.8'	q 77	Boo	16"	m. buona / m. buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×45"; è debole, ma presenta un nucleo stellare evidente — 270x.
NGC 5718	gx	14h40m43s	+03°28.0'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	fa parte di un piccolo gruppo di oggetti deboli — diffusa, rotonda, Ø di 45", poco più luminosa all'interno; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso NE. La stella brillante situata a sinistra nella figura è di 8ª grandezza — 270x.
NGC 5719	gx	14h40m56s	−00°19.0'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, allungata da E a W, di dimensioni 2'×1' con bulge evidente, diffuso, estesa 60"×30"; è situata tra 2 stelle brillanti distanti 7' (ma spostata verso quella a N) — 270x.
NGC 5720	gx	14h38m33s	+50°48.9'	q 50	Boo	16"	m. buona / discreto	di aspetto un po' confuso, ma vagamente circolare, con Ø di 1.5' e poco più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 5721	gx	14h38m53s	+46°40.4'	q 77	Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta a 450x a ridosso NNW di NGC 5722; è rotonda con Ø di 10"-15".
NGC 5722	gx	14h38m54s	+46°39.9'	q 77	Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccola condensazione centrale evidente — 450x.
NGC 5723	gx	14h38m58s	+46°41.3'	q 77	Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 15"×10" e con condensazione centrale abbastanza marcata — 450x.
NGC 5725	gx	14h40m58s	+02°11.2'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	approssim. rotonda, anche si di aspetto un po' irregolare; ha Ø di 45" ed è di luminosità uniforme — 270x.
NGC 5727	gx	14h40m26s	+33°59.4'	q 111	Boo	16"	buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, orientata da NW a SE, di dimensioni 2'×1', appena poco più brillante verso l'interno; si nota meglio in visione distolta — 188x.
NGC 5728	gx	14h42m24s	−17°15.1'	q 333	Lib	16"	buona / ottimo	facile, allungata da NNE a SSW con nucleo stellare e dimensioni 90"×45"; c'è una stellina a 20" dal nucleo sull'asse della galassia verso NE — 270x.
NGC 5729	gx	14h42m07s	−09°00.7'	q 288	Lib	16"	m. buona / discreto	molto allungata da N a S con dimensioni 2.5'×30"; non ho visto un bulge vero e proprio, ma il fuso appare solo gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso verso E e un'altra più debole a SE distante ~ 1' dalla stellina precedente — 270x.
NGC 5730	gx	14h39m52s	+42°44.5'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	debole lama di luce estesa per ~ 2', orientata da E a W con piccolo e debole bulge appena visibile — 270x.
NGC 5731	gx	14h40m09s	+42°46.7'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	più evidente di NGC 5730 dalla quale dista 4' a NE; è allungata da ESE a WNW e di dimensioni 90"×45" — 270x.
NGC 5732	gx	14h40m39s	+38°38.3'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	gx debole, di luminosità pressoché uniforme, salvo lievi discrepanze di luce all'interno avvertibili a tratti; è orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 5733	gx	14h42m46s	−00°21.0'	q 243	Vir	16"	ottima / discreto	è una debole lama di luce estesa per 1', orientata da NE a SW e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 5734	gx	14h45m09s	−20°52.2'	q 333	Lib	16"	m. buona / m. buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×25" con bulge abbastanza evidente, ma di luminosità un poco irregolare; c'è una stellina a ridosso del bordo NE — 270x.
NGC 5735	gx	14h42m33s	+28°43.6'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	facile, diffusa, rotonda, con Ø di ~ 1.5' e di luminosità pressoché uniforme salvo lievi discrepanze di luce all'interno avvertibili a tratti — 270x.
NGC 5736	gx	14h43m31s	+11°12.2'	q 198	Boo	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, approssim. circolare, con Ø di una 40-ina di secondi, gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 5737	gx	14h43m12s	+18°52.8'	q 153	Boo	16"	buona / mediocre	gx debole, molto diffusa e di aspetto un po' irregolare, di luminosità pressoché uniforme ed estesa per poco meno di 1' — 270x.
NGC 5738	gx	14h43m57s	+01°36.2'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15", con piccolo nucleo luminoso abbastanza marcato; c'è una stellina a poco più di 1' verso ESE — 188x.
NGC 5739	gx	14h42m29s	+41°50.6'	q 77	Boo	16"	m. buona / discreto	presenta un bulge brillante e un tenue alone circonfuso di aspetto un po' irregolare, di poco più di 1' di dimensioni; c'è una stellina a ridosso verso NE — 270x.
NGC 5740	gx	14h44m24s	+01°40.8'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'×1' (o poco superiori) e con un bulge brillante, stemperato nell'alone circostante; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso W — 188x.
NGC 5741	gx	14h45m52s	−11°54.8'	q 288	Lib	16"	m. buona / discreto	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, con una tenue condensazione centrale visibile però solo a momenti; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE. — 270x.
NGC 5742	gx	14h45m37s	−11°48.5'	q 288	Lib	16"	m. buona / discreto	brillante, abbastanza compatta, allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1.5' SSW — 270x.
NGC 5743	gx	14h45m11s	−20°54.8'	q 333	Lib	16"	m. buona / m. buono	poco più grande di NGC 5734, dalla quale dista 2.5' a S, ma di luminosità più uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 5745	gx	14h45m02s	−13°56.3'	q 288	Lib	16"	m. buona / discreto	debole gx molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, forse un poco allungata da E a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a 1' SW dal margine — 270x.
NGC 5746	gx	14h44m56s	+01°57.2'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	è una edge-on situata subito a S di un piccolo arco di 4 stelline, orientata da N a S ed estesa per ~ 6'; è molto affilata alle estremità, con bulge diffuso e poco contrastato; la .. metà verso N è più evidente; un accenno alla banda di polveri si manifesta come una tenue caduta di luce verso la parte orientale della gx; c'è una stellina presso il bordo meridionale; meglio contrastata a 270x.
NGC 5747	gx	14h44m21s	+12°07.9'	q 198	Boo	16"	buona / m. buono	è un debole ovale orientata da N a S, di dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ~ 1' NW — 270x.
NGC 5748	gx	14h45m05s	+21°55.0'	q 153	Boo	16"	discreta / ottimo	è una piccola galassia rotonda molto debole e di luminosità uniforme, diffusa e poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; una debolissima stellina appare a momenti quasi a ridosso verso E — 380x.
NGC 5750	gx	14h46m11s	−00°13.4'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	molto bella, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina molto debole a 1' N — 188x.
NGC 5751	gx	14h43m49s	+53°24.1'	q 50	Boo	16"	m. buona / scarso	allungata da NE a SW, diffusa, con dimensioni 80"×40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 2.5' verso W e un'altra di luminosità simile a 3' SE; tre deboli stelline poste ad arco si trovano a N della galassia — 188x.
NGC 5752	gx	14h45m14s	+38°43.7'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	fa parte di un quartetto cui appartengono le 3 successive — è molto debole, ma tratti, in visione distolta, appare chiaramente allungata ~ da NW a SE con dimensioni 30"×15"; è situata a ridosso W di NGC 5454 — 270x.
NGC 5753	gx	14h45m19s	+38°48.4'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	grosso modo circolare, con Ø di ~ 1'; presenta un nucleo brillante, quasi stellare e un tenue alone circonfuso di luminosità uniforme — 270x.
NGC 5754	gx	14h45m20s	+38°44.0'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso — 270x.
NGC 5755	gx	14h45m24s	+38°46.8'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, di dimensioni 20" o 30" e con marcata condensazione centrale — 270x.
NGC 5756	gx	14h47m34s	−14°51.2'	q 288	Lib	16"	m. buona / discreto	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2.5'×1', diffusa alle 2 estremità, con bulge poco più evidente del disco e nucleo stellare visibile a tratti in visione distolta — 270x.
NGC 5757	gx	14h47m46s	−19°04.8'	q 333	Lib	16"	m. buona / discreto	diffusa, allungata da N a S con dimensioni 1.5'×1'; presenta un nucleo di aspetto stellare — 270x.
NGC 5758	gx	14h47m02s	+13°40.1'	q 198	Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina a 1' scarso S; un piccolo oggetto diffuso e condensato situato quasi a ridosso E è invece risultato essere PGC 2800991 — 450x.
NGC 5759	gx	14h47m15s	+13°27.4'	q 198	Boo	24"	ottima / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; quasi allineata ed equidistante con 2 stelline a N — 450x.
NGC 5760	gx	14h47m43s	+18°30.1'	q 153	Boo	16"	buona / mediocre	ovale a basso gradiente di luce,orientata da E a W, di dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 5761	gx	14h49m08s	−20°22.5'	q 333	Lib	16"	m. buona / discreto	diffusa, pressoché rotonda con Ø di ~ 1' e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 5762	gx	14h48m42s	+12°27.4'	q 198	Boo	16"	m. buona / m. buono	compatta, circolare, con alto gradiente di luce e Ø 30" — 270x.
NGC 5763	gx	14h48m59s	+12°29.4'	q 198	Boo	16"	buona / m. buono	molto debole, allungata da NE a SW, di dimensioni; a prima vista appare di luminosità uniforme, ma un'osservazione più prolungata mostra una debole condensazione centrale — 270x.
NGC 5765A	gx	14h50m51s	+05°07.2'	q 243	Vir	24"	buona / ottimo	assieme a NGC 5765B forma una coppia di galassiette "appiccicate" in direzione N-S che si separano a 400x; la 2ª è relativamente facile, rotonda, diffusa e con nucleo stellare, mentre la 1ª è molto difficile (forse in parte anche sovrastata dalla luce della compagna) e di luminosità uniforme; solo a momenti appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20".
NGC 5765B	gx	14h50m51s	+05°06.9'	q 243	Vir	24"	buona / ottimo	v. **NGC 5765A**
NGC 5766	gx	14h53m09s	−21°23.6'	q 333	Lib	16"	m. buona / discreto	molto debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare facilmente in visione distolta a 270x osservando la coppia di stelline situate 2' a NE — 270x.
NGC 5767	gx	14h49m34s	+47°22.5'	q 78	Boo	16"	discreta / ottimo	diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a ~ 1' verso NW — 380x.
NGC 5768	gx	14h52m08s	−02°31.8'	q 243	Lib	16"	buona / discreto	debole, di forma un po' irregolare e di aspetto screziato a 188x, approssim. rotonda con Ø < 1'; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso S — 188x.
NGC 5769	gx	14h52m41s	+07°55.9'	q 198	Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco più brillante all'interno e con nucleo stellare evidente — 450x.
NGC 5770	gx	14h53m15s	+03°57.6'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. circolare con Ø di 1' e un nucleo stellare evidente a 188x.
NGC 5771	gx	14h52m14s	+29°50.7'	q 111	Boo	16"	ottima / buono	assieme a NGC 5773 forma una coppia di gx deboli galassie, piccole e di aspetto simile, approssim. circolari, con Ø di una 30-ina di secondi; la 1ª è di luminosità uniforme, mentre la 2ª presenta una piccola condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 5772	gx	14h51m39s	+40°35.9'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	estesa 2'×1', orientata all'incirca da NE a SW, con alto gradiente di luce, bulge rotondo e piccolo nucleo di aspetto stellare; l'alone è molto sfumato e all'interno della galassia appaiono delle deboli irregolarità di luce — 285x.
NGC 5773	gx	14h52m30s	+29°48.4'	q 111	Boo	16"	ottima / buono	v. **NGC 5771**
NGC 5774	gx	14h53m43s	+03°35.0'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di 1.5', molto diffusa e di aspetto uniforme; c'è una stellina a poco più di 1' verso NE — 380x.
NGC 5775	gx	14h53m57s	+03°32.7'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 4'×45", con tenue bulge diffuso appena contrastato sul disco; appare leggermente screziata a 380x.
NGC 5776	gx	14h54m33s	+02°58.0'	q 243	Vir	16"	discreta / scarso	debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e con tenue condensazione centrale — 188x.
NGC 5777	gx	14h51m18s	+58°58.6'	q 50	Dra	16"	m. buona / scarso	è una lama di luce orientata da NW a SE ed estesa per 2.5', con piccolo bulge diffuso evidente; c'è una debole stellina a ridosso verso N — 188x.
NGC 5778	gx	14h54m31s	+18°38.5'	q 153	Boo	16"	m. buona / mediocre	gx molto debole, rotondeggiante, di una 40-ina di secondi di Ø e di luminosità uniforme situata a ridosso verso W di una stellina abbastanza brillante — 270x.
NGC 5779	gx	14h52m09s	+55°54.0'	q 50	Dra	16"	m. buona / scarso	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø < 30"; in visione distolta appare ogni tanto una tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SW — 188x.
NGC 5780	gx	14h54m23s	+28°56.4'	q 111	Boo	16"	m. buona / buono	è un debole ovale di 40"×20", orientata da NW a SE e di luminosità uniforme; è situata a ~ 2' NNE di una stellina brillante — 270x.
NGC 5781	gx	14h56m41s	−17°14.6'	q 333	Lib	16"	buona / ottimo	debole, isolata, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina molto debole a ridosso del bordo SW — 270x.
NGC 5782	gx	14h55m55s	+11°51.7'	q 198	Boo	16"	m. buona / m. buono	piccola, presenta un nucleo stellare abbastanza brillante e un tenue alone di aspetto confuso esteso non più di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 5783	gx	14h53m28s	+52°04.6'	q 50	Boo	16"	m. buona / scarso	relativamente brillante, poco allungata da N a S, di dimensioni 90"×45", molto diffusa e appena più brillante all'interno; c'è una debole stellina all'interno del disco verso N e un'altra brillante a poco più di 1' verso NE — 188x.
NGC 5784	gx	14h54m16s	+42°33.5'	q 78	Boo	16"	m. buona / discreto	dovrebbe essere rotonda, con Ø di ~ 1.5' e bulge luminoso che risalta nettamente sul debole alone — 270x.
NGC 5787	gx	14h55m15s	+42°30.4'	q 78	Boo	16"	m. buona / discreto	presenta un bulge relativamente brillante circonfuso da un tenuissimo alone assai stemperato sul fondo cielo; estesa probabilmente per ~ 1' — 270x.
NGC 5788	gx	14h53m17s	+52°02.7'	q 50	Boo	16"	m. buona / m. buono	è una debole galassietta rotonda, diffusa, con Ø max di 30" e una tenue condensazione centrale puntiforme visibile a momenti — 270x
NGC 5789	gx	14h56m35s	+30°14.1'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	è una debole chiazza di luminosità uniforme, stemperata sul fondo cielo, con Ø di 45" e situata in un campo ove sono presenti stelline molto deboli — 270x.
NGC 5790	gx	14h57m36s	+08°17.1'	q 198	Boo	24"	buona / ottimo	molto diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 45"×30", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
NGC 5791	gx	14h58m46s	−19°16.0'	q 333	Lib	16"	m. buona / discreto	diffusa, allungata da N a S con dimensioni ~ 90"×45"; presenta un bulge brillante e un nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
NGC 5792	gx	14h58m23s	−01°05.5'	q 243	Lib	16"	buona / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 3'×1', con piccolo bulge ben evidente su un disco molto diffuso, soprattutto alle estremità E e W; c'è una stellina brillante a ridosso verso NW; meglio contrastata a 270x.
NGC 5793	gx	14h59m25s	−16°41.6'	q 288	Lib	16"	buona / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5794	gx	14h55m54s	+49°43.6'	q 78	Boo	28"	m. buona / discreto	presenta una condensazione centrale molto brillante di 15"-20" di Ø circonfusa da un alone tenue, rotondo con Ø di almeno 45" — 495x.
NGC 5795	gx	14h56m20s	+49°24.0'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	è posta di taglio, estesa per un paio di primi in direzione NE-SW, con bulge appena evidente; c'è una stellina brillante a ridosso verso E — 285x.
NGC 5796	gx	14h59m24s	−16°37.5'	q 288	Lib	16"	buona / ottimo	brillante, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 80"×60"; presenta bulge evidente e un nucleo stellare — 270x.
NGC 5797	gx	14h56m24s	+49°41.8'	q 78	Boo	28"	m. buona / discreto	allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×30" e con bulge brillante esteso 20"×15"; non sembra affatto disturbata dalla SAO 45288 di magnitudo 5.6 situata ad appena 4' verso S — 495x.
NGC 5798	gx	14h57m38s	+29°58.1'	q 111	Boo	16"	buona / m. buono	è poco più brillante della 5789,di forma un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una debole stellina a ridosso verso SW e un'altra brillante a 1' NE — 270x.
NGC 5801	gx	15h00m26s	−13°54.2'	q 288	Lib	16"	buona / ottimo	assieme alle due successive forma un terzetto di galassiette molto ravvicinate: la 1ª è la più debole, piccola, estesa una 20-ina di secondi e appare a tratti a ~ 1' NW della successiva; la 2ª è invece la più brillante, estesa ~ 30" ed è l'unica a mostrare una condensazione centrale; la 3ª, infine, è compatta, visibile in visione distolta come una macchiolina rotonda con Ø anch'essa di ~ 20" — 380x.
NGC 5802	gx	15h00m30s	−13°55.1'	q 288	Lib	16"	buona / ottimo	v. **NGC 5801**
NGC 5803	gx	15h00m35s	−13°53.7'	q 288	Lib	16"	buona / ottimo	v. **NGC 5801**
NGC 5804	gx	14h56m07s	+49°40.2'	q 78	Boo	28"	m. buona / discreto	di aspetto più uniforme rispetto a NGC 5797 — osservata subito prima — allungata da E a W, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 495x.
NGC 5805	gx	14h56m12s	+49°37.7'	q 78	Boo	28"	m. buona / discreto	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso S — 495x.
NGC 5806	gx	15h00m00s	+01°53.5'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	allungata da N a S, di dimensioni 2'×1' e gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo brillante di aspetto stellare e un alone diffuso, stemperato sul fondo cielo — 188x.
NGC 5807	gx	14h55m49s	+63°54.2'	q 27	Dra	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, ma molto compatta e piccola, con Ø di una 20-ina di secondi o 30"; a bassi ingrandimenti è di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 5809	gx	15h00m52s	−14°09.9'	q 288	Lib	16"	buona / ottimo	è più facile delle 3 gx del terzetto 5801-2-3, dalle quali dista 16' SSE, anche se appare come una debole macchia informe, poco allungata ~ da N a S, con dimensioni 45"×30" — 380x.
NGC 5810	gx	15h02m43s	−17°52.0'	q 333	Lib	16"	m. buona / discreto	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; è situata tra 2 stelline orientate da N a S e distanti 1.5' — 270x.
NGC 5811	gx	15h00m27s	+01°37.4'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	è un debole gx di luminosità uniforme, ma tutto sommato relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi a SW — 188x.
NGC 5812	gx	15h00m56s	−07°27.5'	q 288	Lib	16"	m. buona / discreto	presenta un bulge brillante, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta un nucleo stellare visibile a tratti e un tenue alone circonfuso, rotondo ed estesa quasi 2' — 270x.
NGC 5813	gx	15h01m11s	+01°42.2'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	presenta un nucleo brillante, estesa , abbastanza contrastato sul disco e un tenue alone rotondeggiante che si estende uniformemente per oltre 2'; è situata nel mezzo dell'ipotenusa di un triangolo rettangolo isoscele formato con 3 stelline abbastanza brillanti e di luminosità simile — 188x.
NGC 5814	gx	15h01m21s	+01°38.2'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	situata 4.5' a SE di NGC 5813, è molto debole, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 188x.
NGC 5815	gx	15h00m29s	−16°50.0'	q 288	Lib	16"	buona / ottimo	piuttosto debole e di luminosità uniforme, allungata ~ da N a S con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina brillante a 1' dal bordo settentrionale (proseguendo, cioè, lungo l'asse della gx) — 270x.
NGC 5817	gx	14h59m41s	−16°10.8'	q 288	Lib	16"	buona / ottimo	piccola chiazza debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 5818	gx	14h58m58s	+49°49.3'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta, forse allungata ~ in direzione N-S, di dimensioni 45"×30", con nucleo brillante e marcato — 285x.
NGC 5819	gx	14h54m03s	+73°07.9'	q 10	UMi	16"	discreta / buono	relativamente facile, ma di aspetto piuttosto confuso, approssim. circolare con Ø di ~ 1' e poco più brillante all'interno; è situata tra 2 stelline brillanti distanti 4' e orientate da NW a SE — 188x.
NGC 5820	gx	14h58m40s	+53°53.2'	q 50	Boo	16"	buona / mediocre	brillante, di aspetto screziato e con nucleo stellare, allungata da E a W con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 5821	gx	14h59m00s	+53°55.4'	q 50	Boo	16"	buona / mediocre	molto debole, orientata da NW a SE, di dimensioni simili a NGC 5820, diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5827	gx	15h01m53s	+25°57.8'	q 153	Boo	16"	buona / mediocre	grosso modo circolare con Ø di 1' scarso, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una debole stellina a ridosso verso NW — 270x.
NGC 5828	gx	15h00m46s	+49°59.6'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi o40", con basso gradiente di luce e poco diffusa; si trova tra 2 stelline appena percettibili situate quasi a ridosso in direzione N-S; quella N è la più brillante — 285x.
NGC 5829	gx	15h02m42s	+23°20.0'	q 153	Boo	16"	buona / mediocre	chiazza lattiginosa molto debole, di luminosità uniforme, approssim. circolare, con Ø forse superiore a 1', situata tra 2 stelline distanti 2.5' e orientate da E a W; quella a W è la più brillante — 270x.
NGC 5830	gx	15h01m51s	+47°52.5'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, poco più brillante verso l'interno, orientata ~ da N a S e con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 5831	gx	15h04m07s	+01°13.2'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	presenta un nucleo brillante, diffuso e un tenuissimo alone rotondo, molto stemperato sul fondo cielo con Ø di ~ 1.5'; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso N — 188x.
NGC 5832	gx	14h57m46s	+71°41.0'	q 27	UMi	16"	buona / discreto	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 1.5'×1'; una stellina appena percettibile si trova quasi a ridosso NE — 188x.
NGC 5835	gx	15h02m25s	+48°52.7'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	debole, di aspetto un po' irregolare, con basso gradiente di luce, forse un poco allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a ridosso verso NW — 285x.
NGC 5836	gx	14h59m31s	+73°53.6'	q 10	UMi	16"	ottima / discreto	debole, presenta un nucleo stellare, e un alone di luminosità uniforme abbastanza netto e leggermente ovale, di dimensioni 40"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso del bordo meridionale — 188x.
NGC 5837	gx	15h04m40s	+12°38.0'	q 198	Boo	16"	buona / m. buono	è allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente e 2 anse molto tenui ai lati E e W — 270x.
NGC 5838	gx	15h05m26s	+02°05.6'	q 243	Vir	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da NE a SW con dimensioni 4'×1' (in visione distolta arriva a lambire la stellina a SW); presenta un bulge ovale di 45"×30" talmente brillante che in visione diretta arriva quasi a cancellare l'alone galattico negli immediati dintorni; la SAO 120829 di magnitudo 8.7, situata 5' a SSW, si riesce a tenere fuori campo a 450x (già precedentemente osservata col 10" a 178x in condizioni di cielo analoghe).
NGC 5839	gx	15h05m27s	+01°38.1'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo marcato quasi stellare circonfuso da un tenue alone rotondo di 1' di Ø — 380x.
NGC 5842	gx	15h04m52s	+21°04.2'	q 153	Boo	16"	discreta / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare visibile a tratti; salta fuori in visione distolta fissando una stellina situata 1' scarso verso N — 380x.
NGC 5845	gx	15h06m00s	+01°38.0'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	appare come un piccolo e tenue alone circolare di una 30-ina di secondi di Ø attorno a una stellina brillante (a meno che non si tratti del nucleo insolitamente brillante della gx) — 380x.
NGC 5846	gx	15h06m29s	+01°36.4'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	bella, diffusa, con ampio gradiente di luce, rotonda con Ø di un paio di primi; screziata a 380x.
NGC 5846A	gx	15h06m29s	+01°35.7'	q 243	Vir	16"	m. buona / ottimo	molto piccola e condensata, relativamente compatta, con Ø di una 20-ina di secondi; a 270x sembra a prima vista una stellina sfuocata all'interno del disco della 5846 — 380x.
NGC 5847	gx	15h06m22s	+06°22.8'	q 198	Vir	16"	buona / m. buono	oggetto molto debole e molto piccolo, rotondo, con Ø di una 20-ina di secondi-30", con piccola nucleo stellare che salta subito all'occhio quando s'impiega la visione distolta — 270x.
NGC 5848	gx	15h06m35s	+02°00.3'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	molto piccola e debole, relativamente compatta e con piccolo nucleo puntiforme visibile a momenti a 188x; è allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20".
NGC 5849	gx	15h06m50s	−14°34.3'	q 288	Lib	16"	m. buona / ottimo	galassietta molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (a 188x appare poco più di una stellina sfuocata); una stellina appare a momenti a ridosso verso S — 270x.
NGC 5850	gx	15h07m07s	+01°32.6'	q 243	Vir	24"	m. buona / ottimo	presenta un piccolo nucleo molto brillante rotondo con Ø < 30" dal quale di dipartono simmetricamente 2 tenui baffi a WNW e ESE estesi per oltre 1' e molto stemperati sul fondo cielo; un nodulo (o forse una stellina) appena percettibile si trova all'estremità del baffo orientale; meglio comunque contrastata scalando a 340x (già osservabile molto debolmente nel 10" a 178x in condizioni di cielo discrete).
NGC 5851	gx	15h06m53s	+12°51.5'	q 198	Boo	24"	ottima / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
NGC 5852	gx	15h06m56s	+12°50.8'	q 198	Boo	24"	ottima / buono	situata 1' a SE di NGC 5851 e orientata a perpendicolo, è più brillante ed estesa, di dimensioni 60"×30" e con un bulge diffuso poco contrastato — 450x.
NGC 5853	gx	15h05m53s	+39°31.5'	q 78	Boo	16"	m. buona / discreto	è un debole ovale di dimensioni 1.5'×1', orientata da SE a NW con bulge visibile in visione distolta, appena più brillante dell'alone — 270x.
NGC 5854	gx	15h07m48s	+02°34.1'	q 243	Vir	24"	buona / buono	bella, brillante, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30", con piccolo bulge contrastato e un nucleo stellare evidente — 450x.
NGC 5855	gx	15h07m49s	+03°59.0'	q 243	Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi scarsi — 450x.
NGC 5857	gx	15h07m27s	+19°35.9'	q 153	Boo	16"	buona / discreto	assieme a NGC 5859 forma una coppia di gx separate da un paio di primi in direzione NW-SE; sono entrambe allungate lungo questa direzione; la 1ª è di dimensioni 60"×30", mentre la 2ª, di 2'×45", presenta un bulge esteso e poco più brillante dell'alone — 188x.
NGC 5858	gx	15h08m49s	−11°12.4'	q 288	Lib	16"	m. buona / discreto	brillante, abbastanza compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×60" e con nucleo marcato quasi stellare — 270x.
NGC 5859	gx	15h07m35s	+19°35.0'	q 153	Boo	16"	buona / discreto	v. **NGC 5857**
NGC 5860	gx	15h06m33s	+42°38.5'	q 78	Boo	16"	m. buona / discreto	piccolo ovale abbastanza compatto, di dimensioni 45"×30", orientata da N a S e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 5861	gx	15h09m16s	−11°19.3'	q 288	Lib	16"	m. buona / discreto	facile, estesa, ma con gradiente di luce molto basso; è un ovale diffuso, di dimensioni 3'×2' e orientata da NNW a SSE — 270x.
NGC 5862	gx	15h06m03s	+55°34.4'	q 50	Dra	16"	m. buona / scarso	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø max di 30" e una condensazione centrale puntiforme appena osservabile in visione distolta a 188x.
NGC 5863	gx	15h10m48s	−18°25.8'	q 333	Lib	16"	m. buona / m. buono	è una gx relativamente compatta, rotonda, con nucleo stellare e con Ø di 45" — 270x.
NGC 5864	gx	15h09m34s	+03°03.2'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	orientata all'incirca da E a W con dimensioni del tutto simili a NGC 5854, ma con alto gradiente di luce; c'è una stellina a ridosso di SE e un'altra appena percettibile a ~ 1' verso SW — 188x.
NGC 5865	gx	15h09m49s	+00°31.8'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	è molto debole, ma facilmente osservabile a 188x; presenta una piccola e tenue condensazione centrale e un alone diffuso approssim. rotondo con Ø di 45"; c'è una stella abbastanza brillante a 4' verso E.
NGC 5866	gx	15h06m29s	+55°45.8'	q 50	Dra	24"	m. buona / m. buono	è un magnifico fuso orientato da NW a SE, di dimensioni di 4'×1.5', con bulge diffuso e poco contrastato di 60"×45"; c'è una stellina brillante al bordo N; da questa si dipartono altre 3 stelline allineate grosso modo verso E: la prima di queste è appena percettibile a 450x; una 5ª stellina, brillante, si trova al bordo SW (la gx s'intravedeva, in visione distolta, nel cercatore 12x50, quasi a ridosso NE di una stella di 8ª grandezza.
NGC 5869	gx	15h09m49s	+00°28.2'	q 243	Vir	16"	buona / discreto	situata poco più di 3' a S della 5865, è molto diffusa, pressoché circolare con Ø di 1.5', gradatamente più brillante verso l'interno e con un piccolo nucleo di aspetto quasi stellare — 188x.
NGC 5870	gx	15h06m34s	+55°28.7'	q 50	Dra	16"	m. buona / scarso	debolissima, molto diffusa e di forma indistinta; forse rotonda con Ø di 1' scarso; malgrado il seeing, è comunque visibile, seppure a tratti, una condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 188x.
NGC 5872	gx	15h10m56s	−11°28.8'	q 288	Lib	16"	m. buona / discreto	molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", con bulge rotondeggiante e molto evidente; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso E — 270x.
NGC 5874	gx	15h07m52s	+54°45.2'	q 50	Boo	16"	m. buona / scarso	allungata da NE a SW, con dimensioni 2'×1' scarsi, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; si trova al vertice ottuso di un triangolo isoscele molto schiacciato formato con 2 stelle brillanti orientate da NE a SW e distanti una decina di primi — 188x.
NGC 5875	gx	15h09m13s	+52°31.7'	q 50	Boo	24"	ottima / ottimo	poco contrastata, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 90"×45"; più interessante scalando a 340x.
NGC 5876	gx	15h09m32s	+54°30.5'	q 50	Boo	16"	m. buona / scarso	presenta un piccolo bulge molto brillante e un tenue alone circonfuso assai stemperato sul fondo cielo; è orientata da NE a SW con dimensioni ~ 2'×1' — 188x.
NGC 5878	gx	15h13m46s	−14°16.2'	q 289	Lib	16"	m. buona / discreto	appare come una tipica galassia vista di 3/4; presenta un bulge brillante di aspetto un po' irregolare circonfuso da un alone molto allungata ~ da N a S e di dimensioni 3'×1'; c'è una stellina a 1' del nucleo verso S — 270x.
NGC 5879	gx	15h09m47s	+57°00.1'	q 50	Dra	24"	m. buona / buono	molto allungata da N a S con dimensioni 3'×1', gradatamente più brillante verso l'interno e diffusa alle estremità N e S; il bulge è evidente, ma poco contrastato; c'è una debole stellina a ridosso verso W (era facilmente osservabile anche nel 10") — 450x.
NGC 5880	gx	15h15m01s	−14°34.7'	q 289	Lib	16"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma una coppia con la 5883 situata 3' SE — 270x.
NGC 5881	gx	15h10m38s	+64°53.9'	q 28	Dra	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×40"; meglio definita scalando a 340x (riportata sulla Uranometria come UGC 9764).
NGC 5883	gx	15h15m10s	−14°37.0'	q 289	Lib	16"	m. buona / buono	rotonda e di Ø simile a NGC 5880, ma è più facile e presenta un'evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 5885	gx	15h15m04s	−10°05.2'	q 289	Lib	16"	m. buona / discreto	è un'estesa chiazza lattescente di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø poco inferiore ai 3'; c'è una stella brillante proprio al margine NE — 270x.
NGC 5886	gx	15h12m45s	+41°14.0'	q 78	Boo	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge marcato quasi stellare; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
NGC 5887	gx	15h14m44s	+01°09.3'	q 244	Ser	16"	m. buona / ottimo	approssim. circolare con Ø di 1' scarso e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1.5' NNE — 270x.
NGC 5888	gx	15h13m07s	+41°15.9'	q 78	Boo	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina appena percettibile al bordo SE; una stellina abbastanza brillante si trova 1.5' a SE — 450x.
NGC 5889	gx	15h13m16s	+41°19.7'	q 78	Boo	20"	buona / m. buono	è una gx elusiva, visibile solo a momenti, molto difficile da individuare anche nel 50 cm di Michele Bini a circa 300x, estesa max 30" (fa parte del terzetto cui appartiene la coppia NGC 5886-88 osservata in altra data col 16").
NGC 5890	gx	15h17m51s	−17°35.3'	q 334	Lib	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 1' scarso; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 270x.
NGC 5891	gx	15h16m13s	−11°29.6'	q 289	Lib	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, approssim. rotonda e appena più brillate all'interno — 270x.
NGC 5892	gx	15h13m48s	−15°27.9'	q 289	Lib	16"	buona / m. buono	è un debole lucore molto diffuso e stemperato sul fondo cielo, rotondo con Ø superiore a 2' e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 5893	gx	15h13m34s	+41°57.5'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	è un bel bozzolo rotondo, relativamente brillante, ma di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, con Ø di ~ 1' — 285x.
NGC 5894	gx	15h11m41s	+59°48.4'	q 50	Dra	16"	m. buona / scarso	una edge-on estesa per ~ 3' e orientata all'incirca da N a S, poco più brillante verso l'interno e con piccolo nucleo quasi stellare; è situata a poco più di 5' SE di una stella brillante; una stellina debole si trova invece un paio di primi a SW — 188x.
NGC 5895	gx	15h13m50s	+42°00.5'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di galassie distanti poco più di 1' in direzione N-S; la 1ª è allungata da NNE a SSW per 1' scarso ed è di luminosità uniforme; la 2ª è debolissima, rotonda,con Ø max di 20"-30"; a ~ 1' E dalla 1ª trovasi una stellina abbastanza brillante — 285x.
NGC 5896	gx	15h13m51s	+42°01.5'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	v. **NGC 5895**

NGC 5897	ag	15h17m24s	−21°00.6'	q 334	Lib	6"	buona / buono	debole, molto diffuso ed esteso per ~ 6' (v. disegno).
NGC 5898	gx	15h18m14s	−24°05.9'	q 334	Lib	16"	m. buona / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a NGC 5903 e a ESO 514-3 — presenta un piccolo bulge brillante circonfuso da un alone rotondo con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 5899	gx	15h15m03s	+42°02.8'	q 78	Boo	24"	m. buona / mediocre	molto allungata da N a S, di dimensioni 2'×40", con bulge evidente ma poco contrastato (era facilmente osservabile anche nel 10") — 450x.
NGC 5900	gx	15h15m05s	+42°12.6'	q 78	Boo	16"	m. buona / discreto	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da SE a NW con dimensioni 90"×45" — 270x.
NGC 5902	gx	15h14m22s	+50°19.8'	q 50	Boo	16"	buona / buono	è una macchiolina di luce molto piccola, con Ø massimo pari a 20"-30", con una stellina a ridosso del nucleo verso NW — 270x.
NGC 5903	gx	15h18m36s	−24°04.1'	q 334	Lib	16"	m. buona / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a NGC 5998 e a ESO 514-3 — poco allungata da NNW a SSE, di gradiente di luce minore e bulge meno marcato; presenta un alone molto diffuso di dimensioni 80"×60"; c'è una stellina brillante a 1.5' NW — 270x.
NGC 5905	gx	15h15m23s	+55°31.1'	q 50	Dra	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e di aspetto a prima vista un po' irregolare, forse a causa di due deboli stelline situate nell'alone e vicine al nucleo che tendono a modificarne un po' la forma (altre due stelline a S e a E si trovano all'esterno dell'alone); la gx nel complesso appare rotonda con Ø poco superiore a 1'; due elusivi cenni di bracci appaiono solo a momenti alle estremità SW e NE dell'alone — 450x.
NGC 5907	gx	15h15m54s	+56°19.6'	q 50	Dra	16"	m. buona / discreto	è una bellissima lama di luce che a 270x sembra estendersi per quasi 2/3 del campo dell'oculare, ossia per una decina di primi; è orientata da NNW a SSE e al centro non è più spessa di 1'; abbastanza netta nella zona centrale verso WSW in corrispondenza di una presunta banda di polvere; il bulge appare molto diffuso e poco contrastato; c'è una stellina a ridosso verso W proprio a metà della gx.
NGC 5908	gx	15h16m43s	+55°24.5'	q 50	Dra	16"	m. buona / discreto	è un bel fuso orientata da NNW a SSE, di dimensioni 3'×1', con bulge diffuso abbastanza contrastato, ma senza nucleo — 270x.
NGC 5909	gx	15h11m28s	+75°23.0'	q 11	UMi	16"	ottima / buono	assieme a NGC 5912 forma una coppia di galassiette relativamente brillanti e facili da individuare, separate da poco più di 1' in direzione E-W; la 1ª è orientata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×45" e con condensazione centrale abbastanza marcata; la 2ª è invece allungata da E a W, con dimensioni 60"×40" e di luminosità più uniforme — 270x.
NGC 5910	gx	15h19m25s	+20°53.8'	q 154	Ser	16"	buona / mediocre	debole, relativamente compatta, di forma e luminosità piuttosto irregolare, estesa oltre 1'; una sorta di protuberanza che a tratti si separa verso S è dovuta a Hickson 74 — 270x.
NGC 5911	gx	15h20m18s	+03°31.0'	q 244	Ser	24"	discreta / m. buono	presenta un nucleo brillante di aspetto quasi stellare e un tenue alone diffuso, poco orientata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
NGC 5912	gx	15h11m41s	+75°23.1'	q 11	UMi	16"	ottima / buono	v. **NGC 5909**
NGC 5913	gx	15h20m15s	−02°34.7'	q 244	Ser	16"	discreta / scarso	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' verso E — 188x.
NGC 5914A	gx	15h18m44s	+41°51.9'	q 78	Boo	16"	buona / ottimo	è un piccolo ovale di 40"×30" orientato da N a S con nucleo stellare puntiforme — 380x.
NGC 5914B	gx	15h18m45s	+41°53.5'	q 78	Boo	16"	buona / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta a 1.5' a N di NGC 5914A, ma è molto piccola con dimensioni max di 20" o 30" — 380x.
NGC 5915	gx	15h21m33s	−13°05.6'	q 289	Lib	16"	m. buona / discreto	facile, poco diffusa, gradatamente più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 270x.
NGC 5916	gx	15h21m38s	−13°10.1'	q 289	Lib	16"	m. buona / discreto	molto debole, appena più brillante all'interno, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 5916A	gx	15h21m14s	−13°06.0'	q 289	Lib	16"	m. buona / discreto	appare come un debole baffo di luce che aggetta verso SE per una 40-ina di secondi da una stellina brillante — 270x.
NGC 5917	gx	15h21m33s	−07°22.6'	q 289	Lib	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
NGC 5918	gx	15h19m25s	+45°52.8'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso di luce; è allungata da E a W, poco diffusa e con dimensioni 2'×45" — 285x.
NGC 5919	gx	15h21m37s	+07°43.1'	q 199	Ser	16"	buona / m. buono	debolissima, quasi elusiva, appare solo a momenti in visione distolta, piccola e rotonda con Ø di una 20-ina di secondi-30" — 270x.
NGC 5920	gx	15h21m52s	+07°42.5'	q 199	Ser	16"	buona / m. buono	più evidente, pur restando una gx molto debole; è di luminosità uniforme, poco allungata all'incirca da E a W con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 5921	gx	15h21m56s	+05°04.2'	q 199	Ser	24"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo stellare molto brillante circonfuso da un alone uniforme molto diffuso orientato da N a S con dimensioni 2'×1' in quale, in visione distolta, arriva a lambire una stellina brillante situata a SW; nel complesso è comunque meglio contrastata se si scala a 340x (già debolmente osservabile nel 10" a 178x).
NGC 5923	gx	15h21m14s	+41°43.6'	q 78	Boo	16"	m. buona / discreto	gx molto debole e diffusa,di aspetto un po' irregolare e di luminosità uniforme che appare in modo netto in visione distolta; è estesa poco più di 1' — 270x.
NGC 5924	gx	15h22m02s	+31°14.0'	q 112	CrB	16"	buona / ottimo	è una piccola e debole gx poco diffusa e con evidente condensazione centrale, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole a ridosso verso S — 270x.
NGC 5926	gx	15h23m25s	+12°43.0'	q 199	Ser	16"	buona / m. buono	facile, compatta, più brillante all'interno, forse poco allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" — 270x.
NGC 5928	gx	15h26m03s	+18°04.5'	q 154	Ser	16"	buona / mediocre	presenta un bulge brillante e un tenuissimo alone orientata ~ da E a W che appare più pronunciato verso la parte occidentale; c'è una stellina a poco più di 1' SE — 270x.
NGC 5929	gx	15h26m06s	+41°40.3'	q 78	Boo	16"	buona / discreto	assieme alla successiva forma una coppia di gx separate da neppure 1' in direzione NE-SW; la 1ª è pressoché circolare, con Ø di ~ 1'; la 2ª è invece allungata da N a S, di dimensioni 2'×1'; presentano entrambe un piccolo nucleo stellare — 188x.
NGC 5930	gx	15h26m08s	+41°40.6'	q 78	Boo	16"	buona / discreto	v. **NGC 5929**
NGC 5931	gx	15h29m30s	+07°34.4'	q 199	Ser	16"	buona / discreto	è un piccolo oggetto molto debole estesa una 40-ina di secondi, ma senza particolari di rilievo; c'è una stellina brillante un paio di primi verso W — 188x.
NGC 5932	gx	15h26m48s	+48°36.9'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti un paio di primi in direzione E-W; la 1ª è rotonda, con Ø di ~ 1', molto diffusa e poco più brillante all'interno di luce; la 2ª è più debole, con un piccolo nucleo puntiforme visibile anche in visione diretta e un tenuissimo alone; forse è allungata ~ N-S per poco più di 1' — 285x.
NGC 5933	gx	15h27m01s	+48°36.8'	q 78	Boo	16"	ottima / ottimo	v. **NGC 5932**
NGC 5934	gx	15h28m13s	+42°55.8'	q 78	Boo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
NGC 5935	gx	15h28m17s	+42°56.6'	q 78	Boo	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20", con bulge brillante e contrastato (situata 1' a NE della precedente) — 450x.
NGC 5936	gx	15h30m01s	+12°59.4'	q 199	Ser	16"	ottima / ottimo	facile e relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1' — 380x.
NGC 5937	gx	15h30m46s	−02°49.7'	q 244	Ser	16"	ottima / discreto	relativamente brillante, ma di aspetto un po' irregolare; il disco, poco allungata da NE a SW con dimensioni 80"×60", presenta basso gradiente di luce; una piccola condensazione centrale è visibile solo a momenti — 270x.
NGC 5939	gx	15h24m46s	+68°43.9'	q 28	UMi	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×30" e con basso gradiente di luce — 450x.
NGC 5940	gx	15h31m18s	+07°27.5'	q 199	Ser	16"	buona / discreto	molto debole e piccola, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso W — 188x.
NGC 5941	gx	15h31m37s	+07°18.7'	q 199	Ser	24"	buona / m. buono	costituisce assieme a NGC 5942, 5944 e CGCG 50-11 un quartetto abbastanza serrato di debolissime galassiette riportate al q 199 dell'Uranometria — diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e tenue condensazione centrale osservabile a 450x; c'è una stellina a ~ 45" verso NW.
NGC 5942	gx	15h31m42s	+07°17.2'	q 199	Ser	24"	buona / m. buono	è di aspetto del tutto simile a NGC 5941, dalla quale dista ~ 2' a SW, anch'essa debolmente condensata, ma forse leggermente più piccola — 450x.
NGC 5943	gx	15h29m44s	+42°46.7'	q 78	Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
NGC 5944	gx	15h31m48s	+07°18.5'	q 199	Ser	24"	buona / m. buono	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale — 450x.
NGC 5945	gx	15h29m45s	+42°55.1'	q 78	Boo	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, con piccolo nucleo rotondo e contrastato, leggermente decentrato verso S; ci sono due stelline a ridosso di questo, a NE e SW; il tutto è circonfuso da una chiazza grosso modo circolare con Ø di 1.5'; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 5947	gx	15h30m37s	+42°43.0'	q 78	Boo	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
NGC 5949	gx	15h28m00s	+64°45.8'	q 28	Dra	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, leggermente screziata a 450x, ma meglio contrastata scalando a 340x, allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1' (debolmente visibile anche nel 10").
NGC 5950	gx	15h31m31s	+40°25.8'	q 78	Boo	16"	m. buona / discreto	è una galassia a gradiente di luce molto basso di luce e di aspetto un po' confuso situata praticamente in mezzo a 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da SE a NW; forse rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 5951	gx	15h33m43s	+15°00.4'	q 199	Ser	16"	buona / discreto	debole, molto allungata da N a S per almeno 2' e con gradiente di luce molto basso di luce — 188x.
NGC 5952	gx	15h34m56s	+04°57.5'	q 244	Ser	16"	ottima / discreto	debolissima, appare a tratti piccola e molto diffusa, estesa per 20" o 25" (la 5955, già osservata e situata 7.5' a NE, è più facile, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi o 40") — 270x.
NGC 5953	gx	15h34m32s	+15°11.7'	q 199	Ser	16"	buona / discreto	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette separate da meno di 1' in direzione NE-SW; la 1ª è circolare con Ø di 45" e presenta una marcata condensazione centrale; la 2ª è allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; entrambe sembrano avvolte in un bozzolo di luce comune — 188x.
NGC 5954	gx	15h34m45s	+15°12.2'	q 199	Ser	16"	buona / discreto	v. **NGC 5953**
NGC 5955	gx	15h35m12s	+05°03.8'	q 244	Ser	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
NGC 5956	gx	15h34m59s	+11°45.0'	q 199	Ser	16"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa con piccola ed evidente condensazione centrale di aspetto stellare e con Ø di ~ 1'; si trova tra 2 stelline orientate da E a W di cui quella orientale sembra lambirne il bordo; quella a W è poco più distante — 380x.
NGC 5957	gx	15h35m23s	+12°02.8'	q 199	Ser	16"	buona / discreto	rotonda con Ø di almeno 1.5', molto diffusa e con alto gradiente di luce; presenta un nucleo luminoso abbastanza contrastato sul disco — 188x.
NGC 5958	gx	15h34m49s	+28°39.3'	q 112	CrB	16"	discreta / ottimo	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, diffusa, rotonda con Ø di 1', anche se la forma non ben regolare — 270x.
NGC 5959	gx	15h37m22s	−16°37.4'	q 289	Ser	16"	m. buona / ottimo	facile, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con alto gradiente di luce, rotonda e con Ø di 1.5' — 270x.
NGC 5960	gx	15h36m18s	+05°39.9'	q 199	Ser	16"	buona / m. buono	piccola, rotonda, con basso gradiente di luce, abbastanza compatta, Ø di ~ 30"; c'è una stellina a 1' circa verso NNW — 270x.
NGC 5961	gx	15h35m16s	+30°51.8'	q 112	CrB	16"	ottima / buono	piccola, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", dai bordi abbastanza netti e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a ~ 1' verso NE — 188x.
NGC 5962	gx	15h36m32s	+16°36.5'	q 199	Ser	16"	ottima / ottimo	poco allungata da WNW a ESE con dimensioni 2'×1.5', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è un minuscolo piccolo triangolo di stelline molto deboli a ridosso verso SW — 380x.
NGC 5963	gx	15h33m28s	+56°33.6'	q 51	Dra	16"	buona / discreto	allungata da NE a SW, diffusa e con dimensioni ~ 90"×45"; presenta un bulge centrale abbastanza contrastato; è allineata ed equidistante con due stelline orientate a perpendicolo (ossia da NW a SE): quella più vicina alla galassia è la più brillante — 188x.
NGC 5964	gx	15h37m36s	+05°58.3'	q 199	Ser	16"	buona / discreto	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, estesa per oltre 2' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso N — 188x.
NGC 5965	gx	15h34m02s	+56°41.1'	q 51	Dra	16"	mediocre / discreto	bella, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 4'×1' con bulge brillante; in visione distolta sembra una classica edge-on — 270x.
NGC 5966	gx	15h35m52s	+39°46.1'	q 78	Boo	16"	m. buona / m. buono	presenta un piccolo bulge marcato circonfuso da un alone tenue, stemperato sul fondo cielo, orientata da E a W con dimensioni 60"×45" — 380x.
NGC 5969	gx	15h34m51s	+56°27.1'	q 51	Dra	16"	mediocre / discreto	debole, abbastanza compatta,estesa max 30", con condensazione centrale marcata e stellare — 270x.
NGC 5970	gx	15h38m30s	+12°11.3'	q 199	Ser	16"	ottima / ottimo	bella, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1.5', gradatamente più brillante all'interno e con tenue condensazione centrale appena percettibile — 380x.
NGC 5971	gx	15h35m37s	+56°27.6'	q 51	Dra	16"	mediocre / discreto	è più brillante di NGC 5969, allungata da NW a SE di dimensioni 60"×30" e poco più brillante all'interno di luce — 270x.
NGC 5972	gx	15h38m54s	+17°02.6'	q 154	Ser	16"	buona / mediocre	gx debole e diffusa, a basso gradiente di luce di cui si fa un po' fatica all'inizio a capirne l'orientamento; alternando gli occhi appare effettivamente allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 5973	gx	15h40m16s	−08°36.1'	q 289	Lib	16"	buona / ottimo	molto debole, allungata da NW a SE, di luminosità uniforme e dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 5974	gx	15h39m02s	+31°45.6'	q 112	CrB	16"	buona / ottimo	relativamente. compatta, con basso gradiente di luce, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 5975	gx	15h39m58s	+21°28.2'	q 154	Ser	16"	buona / mediocre	è un piccolo fuso di luce facile da vedere, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", ma di luminosità uniforme — 270x.
NGC 5976	gx	15h36m48s	+59°23.8'	q 51	Dra	16"	mediocre / discreto	gx quasi elusiva, relativamente compatta, estesa una 40-ina di secondi, con piccolo nucleo stellare — 270x.
NGC 5977	gx	15h40m33s	+17°07.7'	q 154	Ser	16"	buona / mediocre	come la 5972,e debole, diffusa, dai bordi indistinti, poco più luminosa all'interno; appare a tratti qualcosa di puntiforme, ma non riesco a capire se se trattasi del nucleo o di una stellina a ridosso — 270x.
NGC 5978	gx	15h42m27s	−13°14.1'	q 289	Lib	16"	buona / ottimo	è un lucore molto debole, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 270x.
NGC 5980	gx	15h41m30s	+15°47.3'	q 199	Ser	16"	buona / ottimo	facile, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 90"×30" e con tenue bulge diffuso appena più evidente del disco; la visione è poco più contrastata a 270x.
NGC 5981	gx	15h37m53s	+59°23.5'	q 51	Dra	24"	m. buona / mediocre	lama di luce relativamente compatta, orientata da NW a SE, estesa per oltre 2' e poco più brillante verso l'interno (già osservata, seppure molto debolmente, col 10" a 178x) — 450x.
NGC 5982	gx	15h38m40s	+59°21.3'	q 51	Dra	24"	m. buona / mediocre	è una di quelle gx che sembrano fatte a isofote: presenta un nucleo brillante, quasi stellare al centro di un bulge rotondo, luminoso con Ø di una 40-ina di secondi e un alone più tenue, diffuso di dimensioni 90"×60" orientata da E a W; debolmente screziata a 450x; c'è una debole stellina a ~ 1' verso W (già osservata nel 10" a 178x).
NGC 5983	gx	15h42m46s	+08°14.5'	q 199	Ser	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda, con Ø < 1' con condensazione centrale visibile a tratti a 380x; c'è una stellina a poco più di 1' verso W.
NGC 5984	gx	15h42m53s	+14°13.9'	q 199	Ser	16"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce estesa 3' e spessa una 30-ina di secondi, di luminosità pressoché uniforme e orientata da NE a SW — 270x.
NGC 5985	gx	15h39m37s	+59°19.9'	q 51	Dra	24"	m. buona / mediocre	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 4'×2', con piccolo bulge di 30"×20" poco contrastato su un disco abbastanza uniforme; meglio contrastata scalando a 340x (già osservata nel 10" a 178x).
NGC 5986	ag	15h46m03s	−37°47.2'	q 374	Lup	10"	buona / buono	molto basso sull'orizzonte — a 118x appariva come una chiazza rotondeggiante, lattescente, di luminosità pressoché uniforme, diffusa ed estesa per 5'.
NGC 5987	gx	15h39m57s	+58°04.8'	q 51	Dra	16"	mediocre / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30", con bulge diffuso relativamente brillante e contrastato sull'alone; c'è una stellina brillante 1.5' verso WNW — 188x.
NGC 5988	gx	15h44m34s	+10°17.6'	q 199	Ser	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda don Ø di ~ 1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
NGC 5989	gx	15h41m33s	+59°45.2'	q 51	Dra	24"	m. buona / mediocre	rotonda con Ø di 45", poco diffusa e con basso gradiente di luce (già precedentemente osservata, seppure molto debolmente, col 10") — 450x.
NGC 5990	gx	15h46m16s	+02°24.9'	q 245	Ser	16"	discreta / scarso	diffusa, orientata all'incirca da E a W, di dimensioni 60"×45", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo luminoso; c'è una stellina a poco più di 1' verso NE — 188x.
NGC 5992	gx	15h44m21s	+41°05.2'	q 79	Boo	16"	discreta / buono	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti un paio di primi in direzione NNE-SSW; la 1ª è piuttosto debole, leggermente più brillante all'interno e con una stellina a ridosso verso E; la 2ª è più brillante ed estesa, con piccola e marcata condensazione centrale; forse è allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" — 188x.
NGC 5993	gx	15h44m28s	+41°07.2'	q 79	Boo	16"	discreta / buono	v. **NGC 5992**
NGC 5994	gx	15h46m53s	+17°52.4'	q 155	Ser	16"	buona / mediocre	è una piccola e debole galassietta diffusa, estesa una 20-ina di secondi e situata a ~ 1' SW di NGC 5996 — 270x.
NGC 5995	gx	15h48m25s	−13°45.4'	q 290	Lib	16"	m. buona / buono	rotonda, diffusa con piccolo nucleo evidente e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' verso NW — 270x.
NGC 5996	gx	15h46m59s	+17°53.1'	q 155	Ser	16"	buona / mediocre	luminosa; presenta una barra evidente allungata in direzione E-W con un tenue alone molto diffuso, specialmente verso sud ed estesa circa 1.5' — 270x.
NGC 5997	gx	15h47m28s	+08°19.3'	q 200	Ser	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
NGC 6000	gx	15h49m49s	−29°23.2'	q 374	Sco	16"	m. buona / ottimo	in visione diretta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; in visione distolta questa sorta di "barra" sembra immersa in una chiazza lattescente approssim. rotonda con Ø di oltre 1' che arriva a lambire una stellina situata a NW; la barra è leggermente decentrata verso S dando alla galassia un aspetto un po' irregolare — 270x.
NGC 6001	gx	15h47m46s	+28°38.5'	q 113	CrB	16"	discreta / m. buono	molto debole, approssim. circolare, con Ø di almeno 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1.5' verso E; è situata in una piccola zona depleta — 270x.
NGC 6003	gx	15h49m25s	+19°01.9'	q 155	Ser	16"	buona / mediocre	piccola gx diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco più brillante all'interno, con condensazione centrale evidente di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 6004	gx	15h50m23s	+18°56.3'	q 155	Ser	16"	buona / mediocre	gx facile, ma con bassa luminanza superficiale, di luminosità pressoché uniforme, diffusa, approssim. circolare con Ø superiore a 1' — 270x.
NGC 6006	gx	15h53m03s	+12°00.3'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	è la più elusiva di un terzetto, più o meno delle stesse dimensioni della 6009, ma più diffusa — 380x.
NGC 6007	gx	15h53m23s	+11°57.5'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	è invece la più evidente del trio, ma di aspetto un po' confuso, luminosità uniforme ed estesa una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 6008	gx	15h52m56s	+21°06.1'	q 155	Ser	16"	m. buona / buono	debole chiazza rotonda di Ø > 1', molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare ancora più estesa, arrivando a un Ø di 1.5'; meglio contrastata a 270x.
NGC 6009	gx	15h53m24s	+12°03.5'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	debole, compatta, circolare con Ø max 30" e condensazione centrale visibile a momenti; situata 6' a N della 6007 — 380x.
NGC 6010	gx	15h54m19s	+00°32.6'	q 245	Ser	16"	discreta / scarso	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30", con bulge esteso e luminoso — 188x.
NGC 6011	gx	15h46m33s	+72°10.1'	q 28	UMi	16"	m. buona / buono	bella, molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×30", con basso gradiente di luce e un bulge debolmente contrastato sul disco — 270x.
NGC 6012	gx	15h54m14s	+14°36.1'	q 200	Ser	16"	buona / mediocre	piuttosto debole e molto diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 80"×40" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stella brillante (la SAO 101806 di 9ª grandezza a 2' scarsi verso S — 188x.
NGC 6013	gx	15h52m53s	+40°38.8'	q 79	Her	16"	discreta / buono	allungata da N a S, dimensioni 60"×30"; presenta un bulge evidente e poco più brillante di un disco molto stemperato sul fondo cielo — 188x.
NGC 6015	gx	15h51m25s	+62°18.6'	q 28	Dra	24"	m. buona / mediocre	diffusa e di aspetto un poco irregolare, molto allungata da NE a SW, di dimensioni poco superiori a 3'×1' e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a ridosso verso S e una coppia a un paio di primi SSW da quest'ultima (già precedentemente osservata col 10") — 450x.
NGC 6016	gx	15h55m55s	+26°58.0'	q 155	CrB	16"	discreta / ottimo	è un debole lucore molto diffuso che in visione distolta appare chiaramente orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 6018	gx	15h57m30s	+15°52.4'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	allungata all'incirca da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e irregolarmente luminosa al centro; c'è una stellina a ~ 1' verso S — 380x.
NGC 6019	gx	15h52m09s	+64°50.4'	q 28	Dra	16"	m. buona / buono	molto debole e piccola, approssim. circolare, con Ø di una 20-ina di secondi; è visibile a tratti un piccolo nucleo di aspetto stellare — 270x.
NGC 6020	gx	15h57m08s	+22°24.2'	q 155	Ser	16"	buona / mediocre	ovale orientata da NW a SE, di dimensioni 45"×30"; c'è qualcosa di puntiforme a ridosso verso SE (N nucleo decentrato o stellina?) — 270x.
NGC 6021	gx	15h57m31s	+15°57.4'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	è poco più brillante della 6018, rotonda con Ø di ~ 1' e con piccola ed evidente condensazione centrale — 380x.
NGC 6022	gx	15h57m48s	+16°17.0'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	è molto debole (sono riuscito a individuarla a 380x), pressoché circolare, diffusa e con Ø di una 20-ina di secondi o 30" — 380x.
NGC 6023	gx	15h57m50s	+16°18.6'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	situata 1.5' a N di NGC 6022, è debole, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con tenue condensazione centrale visibile a momenti — 380x.
NGC 6024	gx	15h53m08s	+64°55.1'	q 28	Dra	16"	m. buona / buono	è più brillante della 6019, compatta, circolare, di una 30-ina di secondi di Ø e abbastanza netta ai bordi; c'è una debole stellina a ridosso verso N e un'altra più brillante a ~ 30" W — 270x.
NGC 6027	gx	15h59m12s	+20°45.8'	q 155	Ser	24"	ottima / buono	fa parte assieme alle 5 seguenti del Sestetto Seyfert (a parte la 6027E, tutte le altre componenti erano visibili, sia pur con un po' di fatica, anche nel 16" a 270x) — è la 2ª componente più brillante del gruppo, relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 340x e 450x.
NGC 6027A	gx	15h59m11s	+20°45.3'	q 155	Ser	24"	ottima / buono	è forse la componente più brillante del **Sestetto Seyfert**, approssim. rotonda con Ø > 30" ed evidente condensazione centrale — 340x e 450x.
NGC 6027B	gx	15h59m11s	+20°45.7'	q 155	Ser	24"	ottima / buono	f(**Sestetto Seyfert**) — anche questa è abbastanza brillante, allungata grosso modo da N a S con dimensioni 20"×10" — 340x e 450x.
NGC 6027C	gx	15h59m12s	+20°44.8'	q 155	Ser	24"	ottima / buono	(**Sestetto Seyfert**) — debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare come un pendaglio molto allungato della 6027A che aggetta verso S con dimensioni 30"×10" — 340x e 450x.
NGC 6027D	gx	15h59m13s	+20°45.6'	q 155	Ser	24"	ottima / buono	(**Sestetto Seyfert**) — piccola galassietta rotonda molto debole e poco diffusa con Ø di 10" o 15" — 340x e 450x.
NGC 6027E	gx	15h59m15s	+20°46.0'	q 155	Ser	24"	ottima / buono	è la più evanescente del **Sestetto Seyfert**, debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; appare facilmente in visione distolta col cielo scuro, ma è meglio non eccedere i 340x.
NGC 6028	gx	16h01m29s	+19°21.6'	q 155	Her	16"	buona / mediocre	piccola, abbastanza compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta condensazione centrale evidente, quasi stellare — 270x.
NGC 6029	gx	16h01m59s	+12°34.4'	q 200	Ser	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale molto evidente; c'è una debole stellina a 1' NNW; c'è un piccolo e debolissimo oggetto esteso una 10-ina di secondi subito a S, ma questo è risultato essere la **2MASS 16015919+1233447** — 450x.
NGC 6030	gx	16h01m51s	+17°57.5'	q 155	Her	16"	buona / mediocre	presenta un bulge diffuso, luminoso e un tenue alone molto stemperato sul fondo cielo; è allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 6032	gx	16h03m01s	+20°57.4'	q 155	Her	16"	buona / mediocre	molto debole e molto allungata da N a S, con bulge appena più evidente del disco e dimensioni 90"×30" — 270x.
NGC 6033	gx	16h04m28s	−02°07.2'	q 245	Ser	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti, estesa 40"; c'è una stellina doppia serrata a ~ 1' SW; un'altra stellina più debole si trova a poco più di 1' verso W — 270x.
NGC 6034	gx	16h03m32s	+17°11.9'	q 155	Her	16"	buona / mediocre	poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale evidente — 270x.
NGC 6035	gx	16h03m24s	+20°53.5'	q 155	Her	16"	buona / mediocre	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, relativamente compatta e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 6036	gx	16h04m31s	+03°52.1'	q 245	Ser	16"	buona / m. buono	relativamente facile, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina subito a NE — 270x.
NGC 6037	gx	16h04m30s	+03°48.9'	q 245	Ser	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, approssim. circolare, con basso gradiente di luce e Ø di 30" o 40"; è situata 3.5' a S di NGC 6036 — 270x.
NGC 6038	gx	16h02m40s	+37°21.5'	q 113	CrB	16"	m. buona / m. buono	debole, poco estesa e stemperata, leggermente più, brillante all'interno e con bulge evidente, allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina brillante a 1' SE — 270x.
NGC 6040A	gx	16h04m26s	+17°45.0'	q 155	Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme a NGC 6040B e ad alcune altre seguenti, fra cui la coppia NGC 6041A e B, del celebre ammasso **AGC 2151** — con la componente B forma una coppia ravvicinata e separata da 30" in direzione N-S; la 1ª è molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme; la 2ª è poco più evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e debolmente condensata (la coppia era già stata precedentemente osservata col 16" a 270x, ma non ero riuscito a risolverla) — 450x.
NGC 6040B	gx	16h04m26s	+17°44.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	v. **NGC 6040A**
NGC 6041A	gx	16h04m36s	+17°43.3'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	si vedono 2 nuclei (il secondo è dovuto alla componente B) distanti una 40-ina di secondi e immersi in un unico tenue alone ovale, orientata da NE a SW e con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 6041B	gx	16h04m35s	+17°43.3'		Her	16"	discreta / m. buono	v. **NGC 6041A**
NGC 6042	gx	16h04m40s	+17°42.0'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	debole, di aspetto diffuso, rotondeggiante, Ø di 30" e con condensazione centrale visibile — 270x.
NGC 6043	gx	16h05m01s	+17°46.5'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	debole, diffusa, approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ~ 1' verso S — 270x.
NGC 6044	gx	16h05m00s	+17°52.2'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 6045	gx	16h05m08s	+17°45.5'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	molto allungata da ENE a WSW per 1' abbondante, di luminosità uniforme — 270x.
NGC 6047	gx	16h05m09s	+17°43.8'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	situata a ridosso, verso SE, di una stellina, è un ovale di 45"×30" orientata da E a W e appena più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 6048	gx	15h57m30s	+70°41.4'	q 28	UMi	16"	m. buona / buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1', con bulge relativamente brillante e contrastato su un disco molto tenue e sfumato — 270x.
NGC 6050	gx	16h05m23s	+17°45.5'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	è un debole lucore lattiginoso molto stemperato, di luminosità uniforme ed estesa poco meno di 1' — 270x.
NGC 6051	gx	16h04m57s	+23°56.0'	q 155	Ser	16"	buona / mediocre	debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante di 11-esima situata a SSE — 270x.
NGC 6052	gx	16h05m13s	+20°32.5'	q 155	Her	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata e forse interagente con MAC 1605+2032; non si riescono a separare neppure a 570x, ma anche a 450x si riesce comunque a notare la differenza di luminosità e dimensioni; la NGC è diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; la MAC è invece chiaramente più debole e pure di luminosità uniforme, orientata anch'essa da N a S con dimensioni 25"×15"; c'è una stellina debole subito a W (era visibile, seppure molto debolmente e come oggetto singolo, nel 10" a 178x in condizioni non ottimali).
NGC 6054	gx	16h05m31s	+17°46.1'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	debolissima, quasi elusiva, molto piccola, estesa non più di 20"; è situata a meno di 1' NW di una stellina abbastanza brillante; tuttavia quando s'impiega la visione distolta, saltano subito all'occhio dapprima le 2 galassiette limitrofe, ossia IC 1182 e IC 1183: sono di aspetto simile, rotonde con Ø < 30" e distanti un paio di primi in direzione N-S — 270x.
NGC 6055	gx	16h05m33s	+18°09.6'	q 155	Her	16"	m. buona / discreto	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti poco meno di 2' in direzione E-W; la 1ª è ovale, di dimensioni 45"×30", orientata da NE a SW con piccola condensazione centrale puntiforme visibile abbastanza facilmente; la 2ª è più debole, rotondeggiante, con Ø di ~30", diffusa e appena più brillante all'interno — 270x.
NGC 6056	gx	16h05m31s	+17°57.8'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	galassia debole, leggermente ovale, orientata da NE a SW, dimensioni 45"×30", molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 6057	gx	16h05m40s	+18°09.8'	q 155	Her	16"	m. buona / discreto	v. **NGC 6055**
NGC 6058	np	16h04m27s	+40°41.0'	q 79	Her	24"	buona / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, di aspetto regolare e leggermente screziata a 450x; la stella centrale è abbastanza brillante; c'è invece una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso N (già osservata nel 10" a 178x).
NGC 6060	gx	16h05m52s	+21°29.1'	q 155	Her	16"	m. buona / buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 90"×45"; meglio contrastata a 270x.
NGC 6061	gx	16h06m16s	+18°15.0'	q 155	Her	16"	m. buona / discreto	debole, rotonda, diffusa, con Ø di 45" e con condensazione centrale molto evidente — 270x.
NGC 6062	gx	16h06m23s	+19°46.7'	q 155	Her	16"	buona / mediocre	debole, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW e di dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 6062B	gx	16h06m19s	+19°45.8'		Her	16"	buona / mediocre	debolissima, diffusa e piccola; appare a momenti in visione distolta a ~ 1'.5 SW di NGC 6062; non è comunque più estesa di 20" o 30" (non è riportata sulla Uranometria) — 270x.
NGC 6063	gx	16h07m13s	+07°58.7'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	è una debole chiazza lattiginosa, di luminosità pressoché uniforme, salvo lievi discrepanze visibili a tratti, orientata all'incirca da N a S con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina brillante un paio di primi verso NE — 380x.
NGC 6065	gx	16h07m23s	+13°53.2'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	molto debole, di aspetto e luminosità un po' irregolare, nel senso che appare qualcosa a ENE se si osserva a 380x; a 270x sembra, alla prima occhiata, semplicemente poco allungata da ENE a WSW per ~ 45".
NGC 6066	gx	16h07m35s	+13°56.6'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	appena più debole di NGC 6065, è una chiazza approssim. circolare, di una 40-ina di secondi di Ø e poco più brillante all'interno — 380x.
NGC 6068	gx	15h55m25s	+78°59.8'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e con basso gradiente di luce; cenni di bracci spirale appaiono protendersi a N e a S della gx; c'è una stellina a poco più di 1' NW e un'altra a 1' scarso SW — 450x.
NGC 6068A	gx	15h54m47s	+78°59.1'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW; allineata ed equidistante con una coppia di stelline a E — 450x.
NGC 6069	gx	16h07m42s	+38°55.9'	q 113	CrB	16"	buona / ottimo	presenta un nucleo stellare poco più debole della stellina situata a ~ 1' SW circonfusa da un tenue alone molto stemperato e con Ø di 45" — 270x.
NGC 6070	gx	16h09m59s	+00°42.5'	q 245	Ser	16"	buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW, di dimensioni 3'×1.5' e con lievi discrepanze di luce all'interno — 380x.
NGC 6071	gx	16h00m59s	+70°36.0'	q 28	UMi	16"	m. buona / buono	debole, ma facilmente visibile in visione distolta; presenta un nucleo piccolo, relativamente brillante e un tenuissimo alone con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 6073	gx	16h10m11s	+16°42.0'	q 200	Her	16"	buona / mediocre	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE, con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 6074	gx	16h11m17s	+14°15.5'	q 200	Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con MCG+2-41-15, la quale appare come una sorta di debolissima pendice meridionale e molto piccola; anche a 450x si separa a fatica dalla gx principale; a 340x pare a prima vista un unico oggetto orientato da NNE a SSW; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso W.
NGC 6075	gx	16h11m23s	+23°57.9'	q 155	Her	16"	buona / mediocre	debole, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", appena più brillante all'interno (ultima gx osservata: albeggia) — 270x.
NGC 6076	gx	16h11m13s	+26°52.3'	q 155	CrB	16"	discreta / m. buono	molto debole, ma è in parte disturbata dalla SAO 84233 di 7ª grandezza situata 1.5' a NW; è di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 270x.
NGC 6077	gx	16h11m14s	+26°55.4'	q 155	CrB	16"	discreta / m. buono	più brillante di NGC 6076, dalla quale dista 3' a N, approssim. circolare, con Ø di 45", diffusa e con marcata condensazione centrale — 270x.
NGC 6078	gx	16h12m05s	+14°12.5'	q 200	Her	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MCG+2-41-18 situata a ridosso verso S e dalla quale si separa facilmente a 450x; la NGC è diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e presenta una condensazione centrale evidente; la MCG è molto debole, rotonda con Ø di 10"-15" e di luminosità pressoché uniforme.
NGC 6079	gx	16h04m29s	+69°40.0'	q 28	Dra	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45" e con piccolo bulge molto brillante; c'è una stellina a 1' SSE — 450x.
NGC 6080	gx	16h12m59s	+02°10.6'	q 245	Ser	24"	ottima / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
NGC 6081	gx	16h12m57s	+09°52.0'	q 200	Her	16"	buona / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con bulge diffuso poco contrastato sul disco visibile a 380x; c'è una debole doppia stretta un paio di primi a W.
NGC 6083	gx	16h13m13s	+14°11.1'	q 200	Her	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da NE a SW, ci dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele di stelline abbastanza brillanti col vertice più acuto che punta a WSW — 450x.
NGC 6084	gx	16h14m17s	+17°45.5'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	molto debole, allungata da NE a SW, dimensioni 40"×20", con piccolo nucleo visibile a tratti — 270x.
NGC 6085	gx	16h12m35s	+29°21.9'	q 113	CrB	16"	m. buona / m. buono	piccola gx compatta, circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; è allineata ed equidistante con 2 deboli stelline — 270x.
NGC 6086	gx	16h12m36s	+29°29.1'	q 113	CrB	16"	m. buona / m. buono	situata 7' a N di NGC 6085, è più diffusa, con condensazione centrale ben evidente e pressoché circolare con Ø di 45"; è a ridosso di una stellina brillante situata al bordo NW — 270x.
NGC 6088	gx	16h10m42s	+57°28.0'	q 51	Dra	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **MCG+10-23-29** situata a ridosso SE — relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" (era osservabile elusivamente nel 10" a 178x, anche se non riuscivo a capirne la forma); la compagna è molto debole, ma si separa facilmente a 450x, è orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15".
NGC 6089	gx	16h12m40s	+33°02.1'	q 113	CrB	16"	m. buona / m. buono	debole, poco più brillante all'interno, stemperata sul fondo cielo e allungata da NE a SW per poco più di 1'; due stelline distanti ~ 1' e orientate ortogonalmente all'asse maggiore della gx si trovano a 1.5' verso SW — 270x.
NGC 6090	gx	16h11m41s	+52°27.4'	q 51	Dra	28"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, debolmente screziata all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale molto evidente; una sorta di lieve protuberanza si trova a SW del nucleo; c'è una stellina quasi a ridosso a SE; un'altra percettibile però solo a momenti appare subito a S, ma si tratta in realtà di **PGC 2415197**. Questa galassia, CGCG 275-28, UGC 10261 e MAC 1610+5226 sono tra loro allineate ed equidistanti in direzione E-W — 495x.
NGC 6091	gx	16h07m53s	+69°54.3'	q 28	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×40", con bulge evidente ma poco contrastato sul disco; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso W — 450x.
NGC 6092	gx	16h12m47s	+27°59.2'	q 155	CrB	16"	discreta / m. buono	debole e diffusa, con basso gradiente di luce; mi sembra leggermente ovale, con dimensioni 50"×40" e orientata da N a S — 270x.
NGC 6094	gx	16h06m34s	+72°29.6'	q 28	UMi	16"	m. buona / buono	poco diffusa, approssim. circolare con Ø di 1' scarso; appare una tenue irregolarità di luce nel bulge forse dovuta a un nodulo luminoso nella sua parte occidentale — 270x.
NGC 6095	gx	16h11m11s	+61°16.1'	q 28	Dra	16"	m. buona / buono	approssim. circolare con Ø di 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x
NGC 6096	gx	16h14m47s	+26°33.5'	q 155	CrB	16"	discreta / buono	è una piccola galassia compatta, di 20" di dimensioni e con una piccola zona centrale brillante — 270x.
NGC 6097	gx	16h14m26s	+35°06.5'	q 113	CrB	16"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo piccolo, stellare facilmente visibile, ma un alone molto debole, indistinto, forse allungata da N a S per 30" o poco più — 270x.
NGC 6098	gx	16h15m34s	+19°27.7'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette rotonde con Ø di una 30-ina di secondi e distanti ~ 1' in direzione NW-SE; presentano entrambe una condensazione centrale evidente di aspetto stellare — 270x.
NGC 6099	gx	16h15m35s	+19°27.2'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	v. **NGC 6098**
NGC 6100	gx	16h16m52s	+00°50.5'	q 245	Ser	16"	discreta / scarso	molto piccola e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata a poco più di 1' SE di una stella doppia con componenti orientate da E a W; quella a W è più brillante — 188x.
NGC 6102	gx	16h15m37s	+28°09.5'	q 113	CrB	16"	discreta / buono	gx molto debole e bassissima luminanza superficiale, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 6103	gx	16h15m45s	+31°57.8'	q 113	CrB	16"	m. buona / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W e di dimensioni 45"×30" e situata in un campo di stelline molto deboli — 270x.
NGC 6104	gx	16h16m31s	+35°42.5'	q 113	CrB	16"	m. buona / m. buono	approssim. circolare, con Ø di 45", di luminosità uniforme e dai bordi indistinti — 270x.
NGC 6105	gx	16h17m09s	+34°52.7'	q 113	CrB	16"	buona / m. buono	fa parte di una piccola stringa di galassie — debole e piccola, appare a tratti allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ~ 40" NE — 270x.
NGC 6106	gx	16h18m47s	+07°24.7'	q 201	Her	16"	ottima / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1' con bulge rotondo poco contrastato sul disco; c'è una stellina quasi a ridosso verso S e un'altra appena percettibile all'interno del disco verso il bordo N; meglio visibile a 270x.
NGC 6107	gx	16h17m20s	+34°54.1'	q 113	CrB	16"	buona / m. buono	più luminosa e grande di NGC 6105, è situata a 45" SE di una stella brillante; è una macchiolina ovale facile da vedere, allungata da NE a SW e di dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 6108	gx	16h17m26s	+35°08.1'	q 113	CrB	16"	buona / m. buono	debole lucore estesa ~ 45", di luminosità uniforme, molto stemperato sul fondo cielo e di aspetto un po' confuso; si vede tuttavia facilmente in visione distolta — 270x.
NGC 6109	gx	16h17m41s	+35°00.3'	q 113	CrB	16"	buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti — 270x.
NGC 6110	gx	16h17m44s	+35°05.2'	q 113	CrB	16"	buona / m. buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 270x.

NGC 6111	gx	16h14m22s	+63°15.7'	q 113	Dra	16"	buona / discreto	debole, ma facilmente visibile, poco diffusa, approssim. circolare, con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 6112	gx	16h18m01s	+35°06.6'	q 113	CrB	16"	buona / m. buono	è di dimensioni simili a NGC 6109, circolare e gradatamente più brillante all'interno — 270x.
NGC 6113	gx	16h19m11s	+14°08.0'	q 201	Her	16"	discreta / ottimo	debole, relativamente compatta, poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti. quel piccolo oggetto che appare senza difficoltà a poco più di 1' NNE, molto piccolo, dotato di nucleo stellare e di dimensioni max 10" o 15" è risultato essere la **MCG+2-21-45** — 380x.
NGC 6114	gx	16h18m24s	+35°10.5'	q 113	CrB	16"	buona / m. buono	è una debole e piccola chiazza lattescente ovale, orientata da E a W, con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme che sembra dipartirsi da una stellina di 14-esima grandezza — 270x.
NGC 6116	gx	16h18m55s	+35°09.2'	q 113	CrB	16"	buona / m. buono	galassia ovale a basso gradiente di luce, di dimensioni 40"×20" e orientata da N a S — 270x.
NGC 6117	gx	16h19m19s	+37°05.7'	q 113	CrB	16"	buona / ottimo	è un debole lucore a bassissima luminanza superficiale, appena più brillante all'interno, approssim. rotondo con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 6118	gx	16h21m49s	−02°17.0'	q 246	Ser	16"	buona / ottimo	debole e diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 4'×1.5' e con un bulge molto tenue; ci sono alcune deboli stelline ai bordi o nelle immediate vicinanze: la più brillante si trova a quello NE; un'altra è quasi a ridosso della gx verso E; una appena percettibile si trova al bordo NW; infine una coppia ne delimita quello a SW — 270x.
NGC 6119	gx	16h19m42s	+37°48.4'	q 114	Her	16"	m. buona / ottimo	assieme alle due seguenti forma un terzetto di piccole gx relativamente facili; la 1ª è debole, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con una stellina a ridosso verso SW; la 2ª è la più facile, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; ci sono 2 stelline brillanti un paio di primi a S; la 3ª è forse la più debole, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e presenta una nucleo stellare — 380x.
NGC 6120	gx	16h19m48s	+37°46.5'	q 114	Her	16"	m. buona / ottimo	v. **NGC 6119**
NGC 6122	gx	16h20m10s	+37°47.9'	q 114	Her	16"	m. buona / ottimo	v. **NGC 6119**
NGC 6123	gx	16h17m20s	+61°56.3'	q 29	Dra	16"	m. buona / mediocre	piccola gx molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", con bulge marcato e nucleo puntiforme visibile a tratti — 270x.
NGC 6126	gx	16h21m28s	+36°22.6'	q 114	CrB	16"	m. buona / m. buono	molto piccola, di luminosità piuttosto irregolare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a poco più di 1' SSE di una stellina brillante — 270x.
NGC 6127	gx	16h19m11s	+57°59.0'	q 51	Dra	24"	ottima / m. buono	presenta un piccolo bulge molto brillante con Ø di una 15-ina di secondi circonfuso da un alone molto diffuso con Ø di oltre 1' (era facilmente visibile nel 10" a 178x; aumentando il campo oculare a 63x saltava all'occhio un esagono irregolare di stelline brillanti situato subito a W della galassia) — 450x.
NGC 6129	gx	16h21m43s	+37°59.8'	q 114	Her	16"	m. buona / ottimo	è una galassietta rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, abbastanza facile e con nucleo stellare visibile a momenti — 380x.
NGC 6130	gx	16h19m33s	+57°36.9'	q 51	Dra	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×40"; poco disturbata dalla SAO 29889 di magnitudo 8.7 situata 3' scarsi a WSW (in buone condizioni di cielo appariva molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6131	gx	16h21m52s	+38°56.1'	q 114	CrB	16"	buona / ottimo	debole, con basso gradiente di luce, diffusa e di aspetto un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso di NW percettibile solo a momenti *(è appena sorta la Luna all'ultimo quarto)* — 270x.
NGC 6132	gx	16h23m39s	+11°47.2'	q 201	Her	16"	discreta / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme; a tratti, in visione distolta, appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30" — 380x.
NGC 6136	gx	16h20m59s	+55°58.2'	q 51	Dra	16"	mediocre / ottimo	debolissima, di dimensioni inferiori a 1', con tenue condensazione centrale; appare a tratti in visione distolta ~ 2' a W della più meridionale di 5 stelle poste ad arco, la più settentrionale delle quali è molto brillante ed è riportata sulla Uranometria — 188x.
NGC 6137	gx	16h23m03s	+37°55.4'	q 114	Her	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante e con alto gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45", ma molto diffusa ai bordi — 380x.
NGC 6138	gx	16h24m54s	+41°03.1'		Her	16"	buona / m. buono	debolissima, è osservabile in visione distolta, ma solo a momenti appare molto allungata ~ da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×15" e di luminosità uniforme (non è riportata sulla Uranometria) — 270x.
NGC 6140	gx	16h20m58s	+65°23.5'	q 29	Dra	24"	m. buona / ottimo	poco estesa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 2.5'×2' e di luminosità a tratti irregolare; è situata all'interno di un asterismo irregolare formato da 4 stelline molto deboli; una stellina brillante si trova invece subito a NW; scalando a 340x la gx appare poco più contrastata e in visione distolta arriva a lambire le stelline del quadrangolo (era visibile facilmente anche nel 10" a 63x).
NGC 6141	gx	16h23m06s	+40°51.5'	q 79	Her	16"	m. buona / m. buono	piccola galassietta molto debole, di forma indistinta, di dimensioni forse non superiori a 20" — 270x.
NGC 6142	gx	16h23m21s	+37°15.5'	q 114	CrB	16"	discreta / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, orientata all'incirca da N a S, con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina debolissima a ~ 30" verso SW — 270x.
NGC 6143	gx	16h21m42s	+55°05.2'	q 51	Dra	10"	buona / mediocre	poco diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e un gradiente di luce molto basso; si trova quasi nel mezzo di due stelle brillanti: quella situata 4' a W è la SAO 29911 di 9ª grandezza; è comunque meglio contrastata scalando a 340x (appariva debolmente nel 10" a 178x).
NGC 6144	ag	16h27m14s	−26°01.5'	q 336	Sco	16"	m. buona / m. buono	solo approssim. rotondo ed esteso per 3' scarsi, poco concentrato, finemente screziato a 270x e parzialmente risolto; c'è una stellina brillante al margine occidentale. Si contano una decina di componenti disposte irregolarmente e forse non appartenenti all'ammasso.
NGC 6145	gx	16h25m02s	+40°56.8'	q 80	Her	16"	m. buona / m. buono	facilmente visibile, di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25" e abbastanza definita; è allineata con NGC 6146 e 6147 in direzione NNW-SSE — 270x.
NGC 6146	gx	16h25m10s	+40°53.6'	q 80	Her	16"	m. buona / m. buono	è la più facile di un terzetto di gx allineate e orientate da NNW a SSE (la 6147 sono però riuscito a scorgerla solo in seguito col 24"); si presenta come un ovale di dimensioni 80"×50", orientata da ENE a WSW, con alto gradiente di luce e nucleo brillante, diffuso; una debole stellina si trova a 1' verso E — 270x.
NGC 6147	gx	16h25m06s	+40°55.7'	q 80	Her	24"	buona / ottimo	è una debolissima galassietta rotonda, diffusa e con Ø di una 20-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 1' SSE della 6145 (una gx già precedentemente osservata col 16": diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare); solo a momenti, e in visione distolta, appare una stellina debolmente sfuocata a meno di 1' SW; quest'ultima è poi risultata essere la **MCG+7-34-22** — 450x.
NGC 6148	gx	16h27m04s	+24°05.6'	q 156	Her	16"	discreta / ottimo	galassia elusiva e molto piccola visibile solo a momenti in visione distolta a 380x; non si può sbagliare, perché appare nel mezzo di un piccolo asterismo di 6 stelline deboli nel quale non è presente altro.
NGC 6149	gx	16h27m24s	+19°35.8'	q 156	Her	16"	discreta / m. buono	relativamente brillante, diffusa, poco allungata da NNE a SSW, dimensioni 45"×30", diffusa e con condensazione centrale evidente — 270x.
NGC 6150	gx	16h25m50s	+40°29.3'	q 80	Her	28"	ottima / buono	diffusa, allungata da ENE a WSW, dimensioni 60"×30", con bulge brillante e un nucleo stellare (forma una coppia con **MCG+7-34-27** situata 1' a SW) — 495x.
NGC 6154	gx	16h25m31s	+49°50.4'	q 80	Her	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, poco più brillante all'interno e poco allungata da NW a SE (più o meno come le 2 stelline situate a NW) con dimensioni ~ 60"×45" — 380x.
NGC 6155	gx	16h26m08s	+48°22.0'	q 80	Her	16"	buona / ottimo	diffusa, poco più brillante all'interno, con basso gradiente di luce, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×45" (è grosso modo orientata come le componenti della stella doppia brillante situata a ~ 3.5' SE) — 380x.
NGC 6157	gx	16h25m48s	+55°21.6'	q 51	Dra	16"	mediocre / ottimo	gx molto debole che a tratti, in visione distolta, appare poco più brillante verso l'interno; è situata 1' NW della più settentrionale di una coppia di stelline deboli distanti poco più di 1' in direzione N-S — 188x.
NGC 6158	gx	16h27m41s	+39°23.0'	q 80	Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare evidente — 450x.
NGC 6159	gx	16h27m25s	+42°40.8'	q 80	Her	16"	discreta / buono	debole, approssim. circolare, ma di aspetto un po' confuso, con Ø di ~ 1' e poco più brillante all'interno — 188x.
NGC 6160	gx	16h27m41s	+40°55.6'	q 80	Her	28"	m. buona / discreto	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — molto diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×45" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una coppia serrata di stelline di luminosità abbastanza simile a ridosso NE — 495x.
NGC 6161	gx	16h28m21s	+32°48.6'	q 114	Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme alle due successive e a **PGC 58231**, del quartetto **Hickson 82** — poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina molto debole al bordo meridionale — 450x.
NGC 6162	gx	16h28m22s	+32°51.0'	q 114	Her	24"	m. buona / m. buono	è la componente più brillante del quartetto **Hickson 82** — poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30", diffusa e con evidente condensazione centrale — 450x.
NGC 6163	gx	16h28m28s	+32°50.8'	q 114	Her	24"	m. buona / m. buono	diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale meno evidente — 450x.
NGC 6166	gx	16h28m38s	+39°33.1'	q 80	Her	24"	m. buona / ottimo	è la componente più brillante dell'ammasso **AGC 2199** — diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, debolmente screziata nella parte centrale, allungata da NNE a SSW con dimensioni 90"×60" — 450x.
NGC 6168	gx	16h31m22s	+20°11.1'	q 156	Her	16"	discreta / m. buono	debole lama di luce di luminosità uniforme, estesa 1'.5, orientata da ESE a WNW, con una stellina a ridosso al bordo ESE — 270x.
NGC 6172	gx	16h22m10s	−01°30.9'		Ser	16"	buona / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare (non è riportata sull'Uranometria) — 270x.
NGC 6173	gx	16h29m45s	+40°48.7'	q 80	Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×60" e con nucleo stellare abbastanza evidente; più interessante scalando a 340x.
NGC 6174	gx	16h29m48s	+40°52.3'	q 80	Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con **PGC 58350** che è di aspetto simile, ma più piccola — 450x.
NGC 6175	gx	16h29m58s	+40°37.8'	q 80	Her	28"	m. buona / discreto	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; in visione distolta si nota una piccola zona molto tenue che sembra aggettare verso S; c'è una stellina a ridosso W; due stelline sembrano poste simmetricamente a 1' di distanza dalla gx: una abbastanza brillante a SE e un'altra più debole a SW; è un po' meglio contrastata se si scala a 388x.
NGC 6176	gx	16h27m37s	+59°33.8'	q 51	Dra	16"	discreta / scarso	molto debole, piccola, appena più brillante verso l'interno, con Ø di ~ 30"; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' verso N — 188x.
NGC 6177	gx	16h30m39s	+35°03.3'	q 114	Her	16"	buona / ottimo	è allungata da N a S con dimensioni 50"×25" e con un bulge evidente; c'è una stellina quasi a ridosso all'estremità NE e un'altra poco più evidente e poco più distante sempre a NE — 270x.
NGC 6179	gx	16h30m47s	+35°06.1'	q 114	Her	16"	buona / ottimo	è di aspetto quasi stellare se osservata in visione diretta; in visione distolta è invece chiaramente nebulosa, ma piccola, con Ø 10"-15" al massimo e condensata — 270x.
NGC 6180	gx	16h30m34s	+40°32.3'	q 80	Her	16"	discreta / buono	piccola, compatta, circolare, poco diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi — 188x.
NGC 6181	gx	16h32m21s	+19°49.5'	q 156	Her	24"	buona / ottimo	allungata da N a S con dimensioni 90"×60", poco diffusa e con basso gradiente di luce; si nota abbastanza facilmente un baffo che si estende verso N in corrispondenza del braccio orientale, mentre quello opposto appare più debole e impastato; la gx forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline: una a SW e l'altra, brillante, un paio di primi a W (già precedentemente osservata nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 6182	gx	16h29m34s	+55°31.1'	q 51	Dra	24"	ottima / m. buona	poco diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e un gradiente di luce molto basso; si trova quasi nel mezzo di due stelle brillanti: quella situata 4' a W è la SAO 29911 di 9ª grandezza; è comunque meglio contrastata scalando a 340x (appariva debolmente nel 10" a 178x).
NGC 6184	gx	16h31m34s	+40°33.9'	q 80	Her	16"	discreta / buono	piccola galassietta circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso N — 188x.
NGC 6185	gx	16h33m18s	+35°20.5'	q 114	Her	16"	m. buona / m. buono	è un piccolo ovale relativamente compatto, di luminosità uniforme, orientata da N a S e di dimensioni 40"×30"; è situata ~ 45" a S di una stellina brillante — 270x.
NGC 6186	gx	16h34m25s	+21°32.5'	q 156	Her	16"	discreta / m. buono	debole, ma facile da vedere, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con gradiente di luce molto basso, di dimensioni 90"×45" e orientata da NE a SW — 270x.
NGC 6187	gx	16h31m37s	+57°42.4'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buona	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; anche a 580x la visione rimane un po' disturbata da una stella brillante di 8ª grandezza situata 3.5' a N (la gx appariva elusivamente e solo a momenti nel 10" a 178x).
NGC 6189	gx	16h31m41s	+59°37.6'	q 52	Dra	16"	mediocre / ottimo	debole, di aspetto screziato a 188x, con un piccolo bulge poco più brillante dell'alone; è allungata da NNE a SSW con dimensioni 90"×45"; subito a E c'è una coppia di stelline distanti 1' in direzione N-S.
NGC 6190	gx	16h32m06s	+58°26.3'	q 52	Dra	16"	mediocre / ottimo	approssim. circolare con Ø di ~ 1', molto diffusa e con piccola condensazione centrale, debole ma evidente; c'è una stellina a poco più di 1' verso NE — 188x.
NGC 6194	gx	16h36m37s	+36°12.0'	q 114	Her	16"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo brillante puntiforme circonfuso da un alone di 1' max di Ø — 270x.
NGC 6195	gx	16h36m33s	+39°01.7'	q 80	Her	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 70"×35"; situata tra due stelline abbastanza brillanti distanti un paio di primi e orientate da ENE a WSW; poco più interessante scalando a 340x.
NGC 6196	gx	16h37m54s	+36°04.4'	q 114	Her	24"	m. buona / mediocre	molto diffusa, allungata da NNW a SSE, dimensioni 80"×40" e con piccolo bulge molto marcato — 450x.
NGC 6197	gx	16h38m00s	+35°59.7'	q 114	Her	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e con tenue bulge poco contrastato, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' SE; situata 5' scarsi a SSE di NGC 6196 — 450x.
NGC 6198	gx	16h35m31s	+57°29.2'	q 52	Dra	16"	discreta / scarso	molto debole, forse allungata da E a W per ~ 1', assai stemperata sul fondo cielo (era molto bassa sull'orizzonte); un piccolo nucleo è visibile solo a momenti a 188x.
NGC 6201	gx	16h40m14s	+23°45.9'	q 156	Her	16"	discreta / m. buono	è un lucore molto debole quasi al limite della visibilità, ma abbastanza compatto e rotondeggiante, con Ø di una 20-ina di secondi o 30"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso NE — 270x.
NGC 6203	gx	16h40m27s	+23°46.5'	q 156	Her	16"	discreta / m. buono	poco più grande di NGC 6201 con Ø di una 30-ina di secondi o 40", poco diffusa, con tenue condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina a ridosso verso N — 270x.
NGC 6206	gx	16h40m08s	+58°37.0'	q 52	Dra	28"	ottima / buono	presenta un piccolo nucleo brillante circonfuso da un tenue disco rotondo con Ø < 40" — 495x.
NGC 6207	gx	16h43m04s	+36°49.9'	q 114	Her	24"	ottima / m. buono	bella, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni che in visione distolta arrivano a 2.5'×1'; a prima vista sembra presentare un nucleo stellare molto brillante, ma in realtà si tratta di una stellina sovrapposta; una condensazione centrale molto tenue appare solo a momenti subito a S della stellina; scalando a 340x la gx appare leggermente arcuata, con la concavità rivolta verso ESE (era facilmente visibile anche nel 10" a 118x).
NGC 6210	np	16h44m30s	+23°48.0'	q 156	Her	24"	buona / ottimo	è già visibile come una stellina nel cercatore 12x60; a 450x è un piccolo disco molto brillante, di circa 30" di Ø, leggermente diffuso, di colore verde-azzurro pallido e di aspetto uniforme; non ho stranamente notato la stellina centrale (che era invece visibile anche nel 10" a 118x).
NGC 6211	gx	16h41m28s	+57°47.0'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buona	molto diffusa, rotonda con Ø di 1'; presenta un bulge molto contrastato e un nucleo stellare brillante; c'è una debole stellina quasi a ridosso SE (appariva debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6212	gx	16h43m23s	+39°48.4'	q 80	Her	16"	ottima / ottimo	rotonda, con un piccolo nucleo abbastanza marcato e un tenue alone circonfuso con Ø di una 30-ina di secondi — 285x.
NGC 6213	gx	16h41m37s	+57°48.9'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buona	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" (non era visibile nel 10" e appariva molto debolmente nel 16" a 188x) — 450x.
NGC 6214	gx	16h39m32s	+66°02.4'	q 29	Dra	16"	buona / ottimo	approssim. circolare, con alto gradiente di luce; presenta un nucleo brillante e un alone circonfuso ben evidente con Ø di ~ 45" — 188x.
NGC 6217	gx	16h32m39s	+78°11.9'	q 11	UMi	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e meglio contrastata scalando a 340x, orientata da N a S con dimensioni 2'×1.5'; presenta un nucleo stellare molto brillante con una stellina quasi a ridosso verso N; un evidente baffo corre lungo l'asse maggiore, più rinforzato dalla parte meridionale (si tratta presumibilmente della barra centrale); altri 2 baffi fortemente arcuati in corrispondenza dei bracci appaiono abbastanza facilmente alle estremità N e S; c'è una stellina subito a NW della gx (già precedentemente osservata col 10" a 126x) — 450x.
NGC 6219	gx	16h46m22s	+09°02.3'	q 201	Her	16"	discreta / ottimo	piccola, compatta, con condensazione centrale evidente e puntiforme e con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 30" verso E e un'altra ancora più debole a poco più di 1' a ENE — 380x.
NGC 6220	gx	16h47m13s	−00°16.5'	q 246	Oph	24"	buona / ottimo	molto debole e con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
NGC 6223	gx	16h43m04s	+61°34.7'	q 29	Dra	16"	buona / m. buono	brillante, allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1.5' con bulge evidente e un piccolo nucleo ben marcato; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' a E del nucleo — 188x.
NGC 6224	gx	16h48m18s	+06°18.7'	q 202	Her	16"	discreta / ottimo	debole, rotonda con Ø di 45", diffusa; presenta un nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N — 380x.
NGC 6225	gx	16h48m22s	+06°13.4'	q 202	Her	16"	discreta / ottimo	poco più brillante di NGC 6224, ma di luminosità più irregolare; sembra a tratti poco allungata da NW a SE, con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 380x.
NGC 6226	gx	16h43m23s	+61°59.0'	q 29	Dra	24"	m. buona / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 50"×30", con bulge molto diffuso e debolmente screziato a 450x; c'è una debole stellina a 1' scarso verso NW.
NGC 6228	gx	16h48m03s	+26°12.8'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	molto debole, resa probabilmente elusiva dall'umidità elevatissima; appare di luminosità uniforme con un'estensione di ~ 1' — 270x.
NGC 6229	ag	16h46m59s	+47°31.7'	q 80	Her	24"	m. buona / ottimo	molto bello a 580x, anche se non si riesce propriamente a risolvere se non nell'alone esterno; la zona centrale, molto brillante, ha Ø di 1' e appare fortemente screziata; questa contrasta su un alone più debole di Ø doppio; alcune deboli stelline si protendono verso l'esterno; l'ammasso è già visibile nel cercatore 12×60 come una stellina che forma un minuscolo triangolo equilatero con altre 2 stelline brillanti situate a W e a SW (facilmente visibile nel 10" a 188x) — 450x.
NGC 6230	gx	16h50m47s	+04°36.3'	q 247	Her	16"	ottima / discreto	è una piccola galassietta rotonda di luminosità uniforme, estesa 25"-30", situata tra 2 stelline di cui una proprio a ridosso del margine SE — 270x.
NGC 6231	aa	16h54m10s	−41°50.0'	q 407	Sco	6"	buona / buono	piccolo gruppo stellare abbastanza serrato nel quale, a 30x, si contano circa 50 componenti di cui una decina brillanti bianco-azzurre (a questa declinazione il fondo cielo è piuttosto chiaro; ciò vale anche per NGC 6242).
NGC 6232	gx	16h43m20s	+70°38.0'	q 29	Dra	16"	buona / buono	presenta un nucleo molto compatto, brillante che offusca alquanto le regioni periferiche; dovrebbe essere estesa ~ 1'; c'è una stellina a una 30-ina di secondi NW — 188x.
NGC 6233	gx	16h50m16s	+23°34.8'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	debole, stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 6234	gx	16h51m57s	+04°23.0'	q 247	Oph	16"	ottima / discreto	relativamente facile, diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 6235	ag	16h53m25s	−22°10.6'	q 337	Oph	24"	buona / buono	è di forma un po' irregolare a causa di un paio di stelline sovrapposte: la più brillante è verso il bordo NW ed è in realtà una doppia stretta e molto sbilanciata; l'altra si trova a SE; l'oggetto è finemente screziato a 450x e ha un Ø di un paio di primi (era facilmente visibile nel 10" a 178x e appariva di forma vagamente triangolare).
NGC 6236	gx	16h44m34s	+70°46.9'	q 29	Dra	16"	buona / buono	molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata all'incirca da N a S con dimensioni 1.5'×1' — 188x.
NGC 6238	gx	16h47m17s	+62°08.8'	q 29	Dra	16"	buona / m. buono	poco più debole di NGC 6244 — che avevo osservato prima sempre col 16" — e di luminosità più uniforme; è allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 188x.
NGC 6239	gx	16h50m06s	+42°44.4'	q 80	Her	16"	m. buona / scarso	bella, relativamente brillante, orientata da WNW a ESE, poco diffusa, di dimensioni ~ 2'×1' poco più brillante all'interno-alto; è situata all'interno di un parallelogramma di stelline — 188x.
NGC 6240	gx	16h52m59s	+02°24.0'	q 247	Oph	16"	ottima / discreto	facile e di luminosità pressoché uniforme, salvo lievi discrepanze che si osservano a tratti in visione distolta; è allungata da NE a SW, ma sempre in visione laterale appare quasi di forma alquanto irregolare; c'è una stellina brillante a ridosso verso E — 270x.
NGC 6241	gx	16h50m11s	+45°25.2'	q 80	Her	28"	m. buona / m. buono	è una bella gx non particolarmente vistosa, ma di aspetto molto regolare, rotonda con Ø di 45", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 495x.
NGC 6242	aa	16h55m31s	−39°28.0'	q 407	Sco	6"	buona / ottimo	debole chiazza lattescente, poco orientata da N a S con sovrapposte alcune stelline.
NGC 6243	gx	16h52m26s	+23°20.0'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 6244	gx	16h48m04s	+62°12.1'	q 29	Dra	24"	m. buono / ottima	allungata da E a W, di dimensioni 50"×30", con bulge molto diffuso e debolmente screziato a 450x; c'è una debole stellina a 1' scarso verso NW.
NGC 6246	gx	16h49m53s	+55°32.6'	q 52	Dra	16"	discreta / scarso	debole, con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 188x.
NGC 6246A	gx	16h50m14s	+55°23.1'	q 52	Boo	16"	m. buona / m. buono	di luminosità uniforme, poco allungata da N a S, di dimensioni 1.5'×1', situata a ridosso, verso S, di una stellina brillante che interferisce; un'altra stellina è invece a ridosso del margine NE — 188x.
NGC 6247	gx	16h48m20s	+62°58.7'	q 29	Dra	24"	m. buona / discreto	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", con bulge relativamente brillante e nucleo puntiforme; a 340x sembrava a prima vista una miniatura di M82 — 450x.
NGC 6248	gx	16h46m22s	+70°21.4'	q 29	Dra	16"	buona / buono	debole, molto stemperata sul fondo cielo, con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso W — 188x.
NGC 6251	gx	16h32m30s	+82°32.3'	q 11	UMi	16"	ottima / discreto	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti un paio di primi in direzione N-S; la 1ª presenta una brillante condensazione centrale poco diffusa e un tenue alone esteso per oltre 1' e approssim. rotondo; la 2ª è debole, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e di luminosità un poco irregolare — 188x.
NGC 6252	gx	16h32m40s	+82°34.6'	q 11	UMi	16"	ottima / discreto	v. **NGC 6251**
NGC 6255	gx	16h54m47s	+36°30.2'	q 114	Her	16"	m. buona / scarso	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W e con dimensioni di 3'×1'. Il campo circostante è abbastanza ricco di stelline — 188x.
NGC 6257	gx	16h56m03s	+39°38.7'	q 80	Her	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore osservabile in visione distolta; a 380x appare solo a momenti orientata da NW a SE per 1' scarso; a un paio di primi a W notavo un allineamento di 4 stelline quasi equidistanti e di magnitudine compresa tra la 12 e la 13; la galassia forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con le 2 più a SE — 285x.
NGC 6258	gx	16h52m30s	+60°30.9'	q 52	Dra	16"	discreta / scarso	approssim. circolare con Ø di ~ 40", con piccola condensazione centrale visibile, però, solo a momenti — 188x.
NGC 6260	gx	16h51m50s	+63°42.9'	q 29	Dra	16"	buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, di forma irregolare e con dimensioni poco inferiori a 1'; è situata ~ 3' WNW di una stellina brillante — 188x.
NGC 6261	gx	16h56m30s	+27°58.6'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 6263	gx	16h56m43s	+27°49.3'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	poco diffusa, con Ø di ~ 40", appena più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 270x.
NGC 6264	gx	16h57m16s	+27°51.0'	q 157	Her	16"	m. buona / discreto	debole, ma facilmente visibile, piccola, diffusa, allungata ~ da N a S, di dimensioni 30"×15" — 270x.
NGC 6265	gx	16h57m29s	+27°50.6'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	debole, piccola, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta un piccolo nucleo visibile anche in visione diretta — 270x.
NGC 6267	gx	16h58m09s	+22°59.1'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	è un'estesa chiazza circolare di luminosità uniforme, con Ø superiore a 1', diffusa, con una stellina a ridosso del bordo meridionale — 380x.
NGC 6269	gx	16h57m58s	+27°51.2'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' e poco più brillante all'interno di luce — 270x.
NGC 6270	gx	16h58m32s	+27°35.1'	q 157	Her	16"	discreta / ottimo	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø max di 30"; è meglio osservabile a 270x; a 380x si vedono distintamente quelle 2 stelline distanti ~ 30" situate a E (è riportata sul Megastar come **MCG+5-40-15**).
NGC 6271	gx	16h58m51s	+27°57.9'	q 157	Her	16"	m. buona / discreto	è una piccola galassietta rotonda di luminosità uniforme, abbastanza compatto, circolare, con Ø max di 20" o 25" — 270x.
NGC 6272	gx	16h58m58s	+27°55.8'	q 157	Her	16"	m. buona / discreto	è ancora più piccola della precedente, compatta, di dimensioni max 15"; sembra una piccola nebulosa planetaria. Torna comodo il confronto con 2 deboli stelline: una sud e l'altra, ancora più debole, a W — 270x.
NGC 6274	gx	16h59m20s	+29°56.8'	q 114	Her	16"	ottima / buono	di aspetto un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare; la **MCG+5-40-20**, situata a ridosso verso S, appare solo a momenti in visione distolta come un baffo in direzione SE, estesa per una 30-ina di secondi, ma non si riesce a separare dalla galassia principale neanche a 380x.
NGC 6275	gx	16h55m34s	+63°14.6'	q 29	Dra	16"	buona / buono	debole, molto piccola, di 20" o 30" max di dimensioni, situata in una piccola zona depleta — 188x.
NGC 6276	gx	17h00m45s	+23°02.6'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; è situata 2.5' a NW di NGC 6278; è altresì riportata come 6277 — 270x.
NGC 6278	gx	17h00m50s	+23°00.6'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	gx brillante, ad alto gradiente di luce, allungata da NW a SE, con bulge marcato e nucleo puntiforme; sembra come immersa in un alone — 270x.
NGC 6279	gx	16h59m01s	+47°14.2'	q 80	Her	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con bulge relativamente brillante e contrastato; equidistante, ma non allineata, con 2 stelline brillanti a NNE — 495x.
NGC 6280	gx	17h01m57s	+06°40.0'	q 202	Oph	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, con bassissima luminanza superficiale, probabilmente non più estesa di 30"; disturbata dalla SAO 122019 di magnitudo 8.7 a 4' SW — 380x.
NGC 6281	aa	17h04m47s	−37°53.0'	q 376	Sco	10"	m. buona / m. buono	gruppo di una 20-ina di stelle di luminosità piuttosto varia e di forma alquanto irregolare; a 63x sembra di forma trapezoidale, allungato da N a S con dimensioni grosso modo di 8'×6'.
NGC 6282	gx	17h00m47s	+29°49.2'	q 115	Her	16"	ottima / buono	relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo orientale — 270x.
NGC 6283	gx	16h59m26s	+49°55.3'	q 80	Her	16"	buona / ottimo	debole, diffusa e con basso gradiente di luce; sembra perfettamente rotonda con Ø di 1' — 380x.
NGC 6284	ag	17h04m29s	−24°45.9'	q 337	Oph	6"	m. buona / m. buono	piccolo, debole e condensato, con Ø non superiore a 1'.
NGC 6285	gx	16h58m24s	+58°57.3'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buona	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" (s'intravvedeva a mala pena nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6286	gx	16h58m32s	+58°56.3'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buona	molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina molto debole subito a E (anche questa, situata 1.5' a SE della precedente, era visibile al limite nel 10" a 176) — 450x.
NGC 6287	ag	17h05m09s	−22°42.5'	q 337	Oph	24"	buona / buono	bello, con Ø di 1.5', fortemente screziato a 450x (l'effetto è molto vistoso in visione distolta), ma non propriamente risolto; alcune deboli stelline si staccano all'esterno dell'ammasso (appariva in modo simile anche nel 10" a 178x).
NGC 6288	gx	16h57m25s	+68°27.4'	q 29	Dra	24"	m. buona / ottimo	presenta un bulge abbastanza brillante circonfuso da un alone molto tenue orientato da E a W con dimensioni 40"×20" o poco più — 450x.
NGC 6289	gx	16h57m45s	+68°30.8'	q 29	Dra	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con bulge evidente; c'è una coppia di stelline brillanti a 1' N e una debole al bordo S della gx — 450x.
NGC 6290	gx	17h00m57s	+58°58.2'	q 110	Dra	16"	discreta / scarso	assieme alla successiva forma una coppia di gx separate da un paio di primi in direzione N-S; la 1ª è approssim. circolare, di 1' di Ø, poco più brillante all'interno ed è molto diffusa; la 2ª è più piccola, con nucleo più marcato e molto diffusa — 188x.
NGC 6291	gx	17h00m56s	+58°56.2'	q 52	Dra	16"	discreta / scarso	v. **NGC 6290**
NGC 6292	gx	17h03m03s	+61°02.6'	q 29	Dra	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina al bordo orientale; un'altra poco più debole si trova una 30-ina di secondi a S; c'è un piccolo asterismo irregolare di 4 stelline, di cui 3 abbastanza brillanti, a un paio di primi verso E (osservabile elusivamente nel 10" a 178x).
NGC 6293	ag	17h10m10s	−26°34.9'	q 337	Oph	24"	buona / buono	bello, di aspetto un po' irregolare ed esteso un paio di primi; presenta una zona interna molto granulata estesa una 30-ina di secondi e di forma vagamente triangolare; l'alone è fittamente punteggiato di stelline, ma non tutte si riescono a risolvere a 340x; c'è una doppia stretta a ridosso N; verso N è lambito da un asterismo di 4 deboli stelline di cui 3 allineate in direzione NE-SW (era facilmente visibile nel Comet-Catcher da 6" a 57x).
NGC 6295	gx	17h03m15s	+60°20.3'	q 52	Dra	16"	discreta / ottimo	elusiva, osservabile in visione distolta a 380x subito a S di una coppia di deboli stelline distanti una 20-ina di secondi e orientate da NE a SW (quella a SW è più brillante); solo a momenti appare allungata da E a W per una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 6296	gx	17h08m44s	+03°53.7'	q 247	Oph	16"	ottima / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso — 270x.
NGC 6297	gx	17h03m37s	+62°01.5'	q 29	Dra	16"	buona / m. buono	piccola galassietta rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi, abbastanza brillante e compatto, situata tra 2 stelline luminose orientate ~ da E a W: la gx si trova 1' E di quella occidentale — 188x.
NGC 6299	gx	17h05m04s	+62°27.5'	q 29	Dra	16"	buona / buono	debole, piccola, con nucleo relativamente brillante di aspetto stellare e un tenue alone molto diffuso; forse rotonda con Ø max di una 30-ina di secondi — 188x.
NGC 6301	gx	17h08m33s	+42°20.3'	q 80	Her	28"	ottima / ottimo	è un ovale molto diffuso e con basso gradiente di luce, orientato da WNW a ESE con dimensioni 90"×60"; c'è una stellina brillante al bordo meridionale — 495x.
NGC 6302	np	17h13m44s	−37°06.2'	q 376	Sco	10"	m. buona / m. buono	**Bug Nebula** — presenta una zona centrale molto luminosa, allungata da N a S per un 30-ina di secondi con due baffi molto tenui e diffusi, orientati in direzione E-W ed estesi 1.5' da parte a parte; meglio evidente e contrastata a 118x con filtro O III.
NGC 6303	gx	17h05m02s	+68°49.6'	q 29	Dra	16"	buona / buono	presenta nucleo brillante, puntiforme e un debole alone orientata da NE a SW di dimensioni 60"×30" — 188x.
NGC 6304	ag	17h14m32s	−29°27.7'	q 376	Oph	6"	buona / buono	relativamente brillante, di luminosità uniforme ed esteso un paio di primi.
NGC 6306	gx	17h07m37s	+60°43.8'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buono	diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e poco più brillante all'interno (già precedente osservata col 16" a 270x) — 450x.
NGC 6307	gx	17h07m40s	+60°45.1'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buono	molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", con piccolo bulge evidente e contrastato sul disco; c'è una stellina brillante a ridosso N (già visibile nel 10" a 178x, anche se appariva rotonda) — 450x.
NGC 6308	gx	17h12m00s	+23°22.7'	q 157	Her	24"	buona / ottimo	rotonda con Ø di 1', diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una debole stellina a ridosso verso N (appariva solo elusivamente e in visione distolta nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6309	np	17h14m04s	−12°54.7'	q 292	Oph	24"	ottima / discreto	brillante, compatta, finemente screziata a 570x, a prima vista appare come bilobata, orientata da NNW a SSE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso verso NNW e una appena percettibile a ridosso SSW (già precedentemente osservata nel 10" a 240x).
NGC 6310	gx	17h07m57s	+60°59.4'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 90"×30" (appariva debolmente nel 10" a 178x e con dimensioni 80"×20") — 450x.
NGC 6311	gx	17h10m44s	+41°39.0'	q 80	Her	16"	m. buona / scarso	debole, molto diffusa e con condensazione centrale evidente; approssim. circolare con Ø poco inferiore a 1'; c'è una stellina a ~ 1' S del nucleo — 188x.
NGC 6312	gx	17h10m48s	+42°17.3'	q 80	Her	28"	ottima / m. buono	molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NNW — 495x.
NGC 6313	gx	17h10m21s	+48°19.9'	q 80	Her	28"	m. buona / ottimo	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×20", diffusa alle 2 estremità e con bulge evidente abbastanza contrastato; situata tra 2 stelline orientate da N a S che ne delimitano le dimensioni; una stellina brillante si trova a 1' verso W — 495x.
NGC 6314	gx	17h12m39s	+23°16.2'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	facilmente visibile, allungata da N a S, dimensioni 60"×30" e con debole condensazione centrale — 270x.
NGC 6315	gx	17h12m46s	+23°13.4'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	molto debole e diffusa, piccola, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 6316	ag	17h16m37s	−28°08.4'	q 376	Oph	24"	buona / buono	piccolo e relativamente compatto, con basso gradiente di luce, finemente screziato a 450x e con Ø di 1'; è situato a ridosso N di 3 stelline orientate da WNW a ESE (era debolmente visibile nel Comet-Tracker da 6" a 57x) — 450x.
NGC 6317	gx	17h08m59s	+62°53.9'	q 29	Dra	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina debole a meno di 1' verso N — 188x.
NGC 6319	gx	17h09m44s	+62°58.4'	q 29	Dra	16"	buona / m. buono	pressoché circolare, con ~ 45" di Ø, diffusa e con alto gradiente di luce; c'è una stellina a 1.5' verso N — 188x.
NGC 6320	gx	17h12m56s	+40°16.0'	q 81	Her	28"	m. buona / m. buono	è una gx piuttosto debole, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso S e una appena percettibile al bordo NE — 495x.
NGC 6321	gx	17h14m24s	+20°18.9'	q 157	Her	16"	m. buona / discreto	galassia debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso; c'è una stellina quasi a ridosso verso W e una più brillante a 1' SE — 270x.
NGC 6323	gx	17h13m18s	+43°46.9'	q 81	Her	28"	ottima / ottimo	poco diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20", a tratti debolmente screziata a 495x.
NGC 6324	gx	17h05m26s	+75°24.5'	q 12	UMi	16"	discreta / buono	molto piccola, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi, di luminosità pressoché uniforme, ma di aspetto un po' confuso se osservata 208x; c'è una stellina a 1.5' verso S.
NGC 6325	ag	17h17m59s	−23°46.0'	q 337	Oph	24"	buona / buono	appare debolmente screziato, ma non risolto neppure a 450x, rotondo con Ø di 1' (era visibile molto debolmente nel 10" a 178x).
NGC 6327	gx	17h14m02s	+43°39.0'	q 81	Her	28"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 20"-25" e una condensazione centrale evidente; situata tra due stelline brillanti orientate da N a S (fanno parte di un piccolo triangolo) — 495x.
NGC 6329	gx	17h14m15s	+43°41.1'	q 81	Her	28"	ottima / ottimo	presenta un piccolo bulge rotondo di una 20-ina di secondi molto brillante, circonfuso da un tenue alone orientato da NE a SW con dimensioni che in visione distolta arrivano a 80"×40" — 495x.
NGC 6330	gx	17h15m44s	+29°24.2'	q 115	Her	16"	discreta / ottimo	debolissima, ma in visione distolta appare, seppure a momenti, poco allungata da N a S per ~ 45" — 270x.
NGC 6331	gx	17h03m35s	+78°37.8'	q 12	UMi	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, orientata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con basso gradiente di luce; forma una coppia ravvicinata con MAC 1703+7837, situata a ridosso NW, la quale tuttavia appare solo come una debole stellina sfuocata ed estesa forse una decina di secondi — 450x.
NGC 6332	gx	17h15m03s	+43°39.6'	q 81	Her	16"	m. buona / scarso	allungata da NE a SW, di dimensioni ~ 60"×30", molto diffusa e con condensazione centrale evidente; appare come una tipica galassia Sa o Sb vista di tre quarti — 188x.
NGC 6336	gx	17h16m16s	+43°49.2'	q 81	Her	28"	ottima / ottimo	diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a 1' NW — 495x.
NGC 6338	gx	17h15m23s	+57°24.7'	q 52	Dra	28"	m. buona / ottimo	diffusa e con alto gradiente di luce, in visione distolta appare leggermente allungata da N a S con dimensioni di 60"×50"; c'è una stellina a SW e un nodulo luminoso molto tenue verso il margine N. Forma una coppia ravvicinata con CGCG 299-67, situata subito a N, una gx debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø < 40" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso NNE — 495x.
NGC 6339	gx	17h17m07s	+40°50.7'	q 81	Her	28"	m. buona / m. buono	presenta una zona interna relativamente brillante, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" circonfusa da un disco molto tenue e stemperato sul fondo cielo, allungato da NW a SE che in visione distolta arriva come dimensioni a 2'×1' — 495x.
NGC 6340	gx	17h10m25s	+72°18.3'	q 29	Dra	24"	buona / ottimo	molto diffusa, con piccolo bulge luminoso e marcato all'interno del quale si nota un nucleo stellare; l'alone è rotondo con Ø di un paio di primi; c'è una coppia di stelline brillanti di luminosità diseguale a ridosso NNW; più interessante a 450x (era facilmente visibile anche nel 10").
NGC 6342	ag	17h21m10s	−19°35.2'	q 338	Oph	24"	buona / m. buono	esteso 45" e debolmente screziato a 450x, con piccolo e tenue alone circonfuso; più che un globulare sembra una galassia; è situato all'interno di un piccolo triangolo rettangolo isoscele formato con 3 deboli stelline (era debolmente visibile anche nel 10" a 178x).
NGC 6343	gx	17h17m16s	+41°03.2'	q 81	Her	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso; equidistante, ma non allineata, con due stelline brillanti a N con le quali forma un piccolo arco — 450x.
NGC 6344	gx	17h17m19s	+42°27.0'	q 81	Her	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; molto disturbata dalla SAO 43612 di 8ª grandezza situata un paio di primi a NNE; c'è una coppia si stelline brillanti a 1' scarso verso S — 495x.
NGC 6345	gx	17h15m24s	+57°21.0'	q 52	Dra	28"	m. buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", poco diffusa e con piccolo bulge brillante contrastato; una stellina molto debole e leggermente sfuocata situata a 1' verso E è risultata essere la **PGC 2563604** — 495x.
NGC 6346	gx	17h15m24s	+57°19.4'	q 52	Dra	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 495x.
NGC 6347	gx	17h19m55s	+16°39.6'	q 202	Her	16"	discreta / ottimo	la vedo rotonda, debole, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 45"; c'è una stellina a ridosso verso N. Subito a N ci sono 3 stelline equidistanti orientate da NE a SW e di luminosità crescente — 380x.
NGC 6348	gx	17h18m21s	+41°38.8'	q 81	Her	16"	m. buona / scarso	galassietta molto debole, estesa meno di 1' e situata 5' SW della 6350; c'è una debole stellina una 30-ina di secondi verso S — 188x.
NGC 6349	gx	17h19m07s	+36°03.6'	q 115	Her	16"	discreta / ottimo	assieme a NGC 6351 forma una coppia di galassiette di luminosità e dimensioni simili; la 1ª è orientata da E a W, di dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme la 2ª è poco più debole e orientata da ENE a WSW, con una stellina quasi a ridosso verso S — 270x.
NGC 6350	gx	17h18m42s	+41°41.7'	q 81	Her	16"	m. buona / scarso	rotonda con Ø di 1' scarso, diffusa e con condensazione centrale evidente — 188x.
NGC 6351	gx	17h19m11s	+36°03.5'	q 115	Her	16"	discreta / ottimo	v. **NGC 6349**
NGC 6355	ag	17h23m59s	−26°21.2'	q 338	Oph	24"	buona / m. buono	è un oggetto facile e brillante, molto diffuso con Ø di un paio di primi e gradatamente più brillante verso l'interno; non è tuttavia risolvibile neppure a 240x.
NGC 6356	ag	17h23m35s	−17°48.8'	q 338	Oph	24"	buona / m. buono	stupendo, presenta un elevato gradiente di luce e un Ø complessivo di oltre 4'; presenta una zona interna finemente screziata estesa un paio di primi e un alone esterno di Ø più che doppio e quasi totalmente risolto in singole stelle (era un oggetto molto brillante anche nel 10" a 178x) — 450x.

NGC 6357	neb	17h24m56s	−34°12.2'	q 376	Sco	10"	ottima / discreto	a 63x col filtro OIII appare soltanto un nodulo relativamente brillante, orientato da E a W con dimensioni di circa 2'×1'; questo è situato subito a N di un minuscolo asterismo di 4 stelline allineate fatto a "Y" molto stretta le quali sono le componenti più brillanti di un piccolo e insignificante ammasso stellare che sia l'Uranometria, sia il Megastar denominano Pismis 24; a E di quest'ultimo si diparte verso S una stringa di 4 stelle brillanti della stessa luminosità estesa per circa mezzo grado.
NGC 6358	gx	17h18m53s	+52°36.9'	q 52	Dra	16"	mediocre / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; è situata un paio di primi a SE di una stellina doppia con componenti brillanti separate da una 20-ina di secondi — 188x.
NGC 6359	gx	17h17m53s	+61°46.8'	q 29	Dra	16"	buona / m. buono	rotonda, di ~ 1' di Ø, con condensazione centrale molto luminosa, nucleo stellare e un alone molto tenue — 188x.
NGC 6361	gx	17h18m41s	+60°36.5'	q 52	Dra	16"	buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", con bulge evidente, ma poco contrastato sul disco; sembra più interessante a 380x; c'è una debole stellina 1' verso NW.
NGC 6363	gx	17h22m40s	+41°06.1'	q 81	Her	16"	m. buona / scarso	relativamente facile, rotonda con Ø inferiore a 1', con nucleo brillante, molto piccolo e diffusa — 188x.
NGC 6364	gx	17h24m27s	+29°23.4'	q 115	Her	16"	buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 45" e un bulge brillante; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso N — 270x.
NGC 6365A	gx	17h22m44s	+62°09.9'	q 29	Dra	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, assai poco contrastata sul fondo cielo, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" (l'Uranometria riporta un unico oggetto) — 450x.
NGC 6365B	gx	17h22m43s	+62°10.6'	q 29	Dra	24"	buona / ottimo	è una sorta di debolissimo aggetto che si diparte dalla gx precedente, ma è molto difficile e appare solo a momenti in visione distolta a 450x; c'è una doppia stretta quasi a ridosso verso E.
NGC 6366	ag	17h27m44s	−05°04.6'	q 293	Oph	24"	buona / m. buono	è un oggetto povero e diradato, assai differente da come compare in fotografia; è totalmente risolto a 450x, ma a quest'ingrandimento si fatica un po' a riconoscerlo dal background stellare; una doppia serrata si trova all'estremità N; nel complesso appare più simile a un ammasso aperto; c'è un asterismo di riferimento foggiato a "L" molto stretta o a uncino a ridosso verso W (era molto debole nel 10" e mostrava una leggera granulazione a 178x).
NGC 6367	gx	17h25m09s	+37°45.6'	q 115	Her	16"	m. buona / m. buono	molto piccola e molto debole; e molto debole; è poco più brillante all'interno; una visione protratta mostra alcune discrepanze di luce appena percettibili — 270x.
NGC 6368	gx	17h27m11s	+11°32.6'	q 203	Oph	16"	buona / discreto	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 3'×30", poco diffusa e con condensazione centrale ben evidente in visione distolta a 188x; c'è una stellina debole a ridosso del bordo E e un'altra abbastanza brillante all'interno verso il margine occidentale.
NGC 6369	np	17h29m20s	−23°45.6'	q 338	Oph	24"	buona / m. buono	relativamente compatta e di aspetto regolare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta una zona scura all'interno, anche se poco contrastata, che le conferisce la caratteristica forma ad anello; non presenta traccia della stellina centrale (si vedeva in modo del tutto simile nel 10" a 178x; osservata a 118x col filtro O III appariva più contrastata sul fondo cielo, ma di luminosità uniforme) — 450x.
NGC 6370	gx	17h23m25s	+56°58.5'	q 52	Dra	28"	m. buona / ottimo	bella, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso; poco disturbata dalla SAO 30366 di magnitudo 6.6 situata un paio di primi a N — 495x.
NGC 6371	gx	17h27m20s	+26°30.3'	q 158	Her	16"	buona / ottimo	debole, ma visibile senza difficoltà in visione distolta; è estesa una 40-ina di secondi e presenta una tenue condensazione centrale — 380x.
NGC 6372	gx	17h27m32s	+26°28.5'	q 158	Her	16"	buona / ottimo	situata 3' a SE di NGC 6371 e decisamente più brillante, è diffusa, di aspetto e luminosità un po' irregolari, estesa almeno 1' e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso verso NE — 380x.
NGC 6373	gx	17h24m08s	+58°59.7'	q 52	Dra	16"	discreta / scarso	debolissima e di forma indistinta, estesa forse per 1'; è situata a 4' NE di una stella brillante; c'è una debole stellina subito a N — 188x.
NGC 6375	gx	17h29m22s	+16°12.4'	q 203	Her	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso e un nucleo di aspetto quasi stellare; c'è una stellina a ridosso E e una a NE che in visione distolta sembra lambire la parte più esterna dell'alone; poco meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 6376	gx	17h25m19s	+58°49.0'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buono	forma una coppia serrata con NGC 6377 situata a ridosso NE — è un debole batuffolo rotondo, diffuso e di luminosità uniforme con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
NGC 6377	gx	17h25m23s	+58°49.4'	q 52	Dra	24"	ottima / m. buono	forma una coppia serrata con la precedente situata a ridosso SW — poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge brillante — 450x.
NGC 6378	gx	17h30m42s	+06°16.9'	q 203	Oph	24"	m. buona / ottimo	piuttosto debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante subito a S e un'altra a poco più di 1' verso W — 450x.
NGC 6379	gx	17h30m35s	+16°17.3'	q 203	Her	16"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, pressoché circolare con Ø di 1' scarso; tuttavia è meglio visibile scalando a 132x.
NGC 6381	gx	17h27m17s	+60°00.8'	q 52	Dra	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; debolmente screziata anche a 340x; c'è una stellina a ridosso SW.
NGC 6382	gx	17h27m55s	+56°52.2'	q 52	Dra	16"	mediocre / ottimo	approssim. circolare, con Ø di 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; presenta un nucleo abbastanza evidente di aspetto stellare; c'è una stellina brillante a 1' verso SE — 188x.
NGC 6383	aa	17h34m40s	−32°34.5'	q 376	Sco	6"	buona / buono	è un gruppo molto disperso di stelle che ricordano vagamente una farfalla; non è facilmente distinguibile dalle stelle di campo.
NGC 6384	gx	17h32m25s	+07°03.6'	q 203	Oph	24"	buona / ottimo	presenta un bulge molto brillante, di dimensioni 60"×30" e orientata da NE a SW su un disco molto diffuso estesa più del doppio; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso NW; la gx si trova sull'ipotenusa di un piccolo triangolo rettangolo formato da 3 stelline brillanti di luminosità simile (era debolmente visibile anche nel 10") — 450x.
NGC 6385	gx	17h28m01s	+57°31.3'	q 52	Dra	16"	buona / ottimo	assieme a NGC 6387 forma una coppia di gx relativamente brillanti, con piccola ed evidente condensazione centrale; la 1ª è più facile e presenta, in visione distolta, un alone circolare di ~ 40" di Ø; è altresì disturbata dalla luce di una stella di 8ª situata 3' W; la 2ª è più piccola ed estesa una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 6386	gx	17h28m52s	+52°43.4'	q 52	Dra	16"	mediocre / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di 45", appena più brillante all'interno; c'è una stellina a ~ 3' verso N — 188x.
NGC 6387	gx	17h28m24s	+57°32.7'	q 52	Dra	16"	buona / ottimo	v. **NGC 6385**
NGC 6389	gx	17h32m40s	+16°24.1'	q 203	Her	16"	buona / discreto	è un bell'ovale di dimensioni 2.5'×1', orientata da NW a SE, gradatamente più brillante verso l'interno e con piccolo nucleo luminoso — 188x.
NGC 6390	gx	17h28m28s	+60°05.6'	q 52	Dra	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S con dimensioni 80"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
NGC 6391	gx	17h28m49s	+58°51.0'	q 52	Dra	16"	discreta / scarso	debole e galassietta situata tra due stelline di uguale luminosità, distanti 6' e orientate da NNW a SSE; rispetto alla congiungente di queste la galassia è appena spostata verso NE — 188x.
NGC 6393	gx	17h30m21s	+59°38.4'	q 53	Dra	16"	buona / ottimo	è chiaramente allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme; distinto il piccolo triangolo di stelline situato a ridosso di NE — 380x.
NGC 6394	gx	17h30m08s	+59°31.9'	q 53	Dra	16"	buona / ottimo	molto piccola e debole, osservabile a tratti, relativamente compatta con dimensioni max di 20"; è quasi equidistante con 2 stelline deboli situate a W — 380x.
NGC 6395	gx	17h26m31s	+71°05.8'	q 30	Dra	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con gradiente di luce molto basso, molto allungata da N a S con dimensioni 2'×40"; c'è una stellina a ridosso NE e una appena percettibile al bordo SW; una coppia di stelline brillanti si trova N; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 6399	gx	17h31m50s	+59°36.9'	q 53	Dra	16"	discreta / scarso	debole, poco diffusa, poco più brillante all'interno, allungata all'incirca da N a S per una 40-ina di secondi — 188x.
NGC 6400	aa	17h40m12s	−36°58.0'	q 377	Sco	6"	buona / buono	molto debole, pare allungato da N a S con dimensioni grosso modo 6'×4'; a tratti, in visione distolta, appare qualche debole condensazione.
NGC 6401	ag	17h38m37s	−23°54.5'	q 338	Oph	24"	buona / m. buono	è una piccola chiazza circolare con Ø di ~ 1' e un basso gradiente di luce; l'aspetto è più simile a quello di una gx; c'è una stellina brillante a ridosso SE (visibile anche nel 10" a 178x, nel quale appariva debole e relativamente compatto) — 450x.
NGC 6408	gx	17h38m34s	+18°52.7'	q 158	Her	16"	buona / discreto	gx diffusa a basso gradiente di luce, approssim. circolare, con Ø poco superiore a 1'; c'è una stellina 1' SE — 270x.
NGC 6409	gx	17h36m35s	+50°46.0'	q 53	Dra	16"	mediocre / ottimo	molto debole, quasi elusiva; alternano gli occhi si può tuttavia individuare con una certa facilità all'interno di un triangolo di stelle che occupa quasi tutto il campo dell'oculare 9.7 mm (16.5'): è un galassietta di dimensioni inferiori a 1' — 188x.
NGC 6411	gx	17h35m33s	+60°48.8'	q 53	Dra	24"	ottima / m. buona	molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 90"×60", con bulge contrastato e a tratti debolmente screziato a 450x; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SW (già osservata nel 10" a 178x e appariva di dimensioni analoghe).
NGC 6412	gx	17h29m37s	+75°42.3'	q 12	Dra	24"	molto buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di un paio di primi; a 450x appare leggermente screziata verso l'interno, ma è poco meglio contrastata a 340x; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SW; allineata ed equidistante con due stelle brillanti a SSW: si tratta rispettivamente della SAO 8821 di 9ª grandezza e della SAO 8824 di 8ª (era già visibile nel 10" a 63x come una chiazza rotondeggiante, diffusa e di dimensioni analoghe).
NGC 6414	gx	17h30m37s	+74°22.5'	q 12	Dra	16"	ottima / discreto	debolissima, appare abbastanza facilmente solo in visione distolta come una piccola chiazza lattescente forse allungata da NW a SE per ~ 1'; in visione diretta è di aspetto quasi stellare; ci dovrebbe essere una debole stellina sovrapposta verso NW — 188x.
NGC 6416	aa	17h44m18s	−32°21.0'	q 376	Sco	6"	buona / buono	piccolo gruppo disperso di 8 o 9 stelle di cui una brillante più o meno nel mezzo.
NGC 6417	gx	17h41m48s	+23°40.3'	q 158	Her	16"	buona / discreto	oggetto molto diffuso e leggermente ovale, di dimensioni 50"×40", con piccolo nucleo puntiforme visibile a tratti in posizione leggermente decentrata verso N — 270x.
NGC 6418	gx	17h38m09s	+58°42.9'	q 53	Dra	16"	discreta / scarso	debole, con basso gradiente di luce, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi, con luminosità interna un poco irregolare; c'è una stellina a poco più 1' SE dal bordo — 188x.
NGC 6419	gx	17h36m06s	+68°09.3'	q 30	Dra	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una coppia di stelline orientate da E a W e distanti ~ 30" subito a N — 450x.
NGC 6420	gx	17h36m16s	+68°03.1'	q 30	Dra	24"	ottima / m. buono	compatta, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
NGC 6422	gx	17h36m30s	+68°03.5'	q 30	Dra	24"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' — 450x.
NGC 6423	gx	17h36m53s	+68°10.3'	q 30	Dra	24"	ottima / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
NGC 6424	gx	17h36m12s	+69°59.4'	q 30	Dra	28"	m. buona / discreto	relativamente brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 45" — 495x.
NGC 6425	aa	17h46m54s	−31°31.0'	q 377	Sco	6"	buona / buono	relativamente compatto, con in primo piano due piccoli filari di stelle che paiono convergere verso W.
NGC 6426	ag	17h44m55s	+03°10.2'	q 248	Cas	24"	m. buona / m. buono	parzialmente risolto a 340x, molto diffuso e con evidente addensamento centrale, con Ø di 2.5'; è praticamente delimitato a W da 3 stelline orientate da N a S: la prima è una coppia sbilanciata, quella centrale una doppia serrata, mentre quella più a S è una tripletta a mala pena risolvibile a 450x (era visibile ma irrisolto nel 10" a 188x).
NGC 6427	gx	17h43m39s	+25°29.6'	q 158	Her	16"	buona / discreto	è molto allungata da NE a SW per una 40-ina di secondi, con nucleo brillante, puntiforme; c'è una stellina proprio al bordo SW e un'altra a ~ 40" a S — 270x.
NGC 6429	gx	17h44m05s	+25°21.0'	q 158	Her	16"	buona / discreto	allungata come NGC 6427, ma con gradiente di luce minore, di dimensioni 45"×30", bulge piccolo e diffuso; c'è una stellina doppia a ~ 30" verso SE — 270x.
NGC 6433	gx	17h43m56s	+36°48.0'	q 116	Her	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 2'×30" e con bulge diffuso, poco contrastato sul disco; meglio evidente e definita scalando a 340x (era visibile, anche se molto debolmente, nel 10" a 178x, ma il nucleo appariva solo in visione distolta).
NGC 6434	gx	17h36m49s	+72°05.4'	q 30	Dra	24"	m. buona / ottimo	diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30" e con nucleo stellare evidente; è un poco disturbata dalla SAO 8860 di magnitudo 7.7 situata un paio di primi più a S (appariva molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6435	gx	17h40m11s	+62°38.5'	q 30	Dra	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con nucleo quasi stellare — 450x.
NGC 6436	gx	17h41m13s	+60°27.0'	q 53	Dra	16"	discreta / scarso	debole lucore molto diffuso, di forma non definita e con gradiente di luce molto basso di luce, situato a ridosso NE di 3 stelline in fila abbastanza brillanti — 188x.
NGC 6439	np	17h48m20s	−16°27.6'	q 293	Sgr	10"	buona / buono	piccolissima e diffusa, molto debole, rotonda con Ø di una decina di secondi; è meglio osservabile a 240x (a bassi ingrandimenti è praticamente di aspetto stellare); c'è una stellina brillante a ~ 1' verso S.
NGC 6440	ag	17h48m53s	−20°21.6'	q 338	Sgr	24"	buona / m. buono	bello, di aspetto molto regolare, con Ø di oltre 1' e finemente screziato a 450x (già osservato nel 10" a 178x: avevo stranamente individuato alcune lievi frammentazioni nella parte più interna che però non ho riscontrato nel 24").
NGC 6441	ag	17h50m13s	−37°03.1'	q 377	Sco	6"	buona / buono	compatto, molto luminoso, con Ø di 1.5'; è situato 4' E di una brillante stella arancione di 3a.
NGC 6442	gx	17h46m51s	+20°45.6'	q 158	Her	16"	buona / discreto	rotonda, con condensazione centrale evidente e Ø ~40"; c'è una stellina molto debole a ridosso del bordo settentrionale — 270x.
NGC 6443	gx	17h44m33s	+48°06.9'	q 81	Her	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 450x.
NGC 6444	aa	17h44m30s	−34°48.0'	q 377	Sco	10"	m. buona / m. buono	gruppo disperso di deboli stelline del Ø di una decina di primi nel quale, a 178x, si possono contare una ventina di componenti; le principali sembrano disposte su una sorta d "barra" orientata da E a W.
NGC 6445	np	17h49m15s	−20°00.6'	q 338	Sgr	24"	buona / m. buono	bella e di aspetto curioso: è cioè di forma rettangolare con due anse evidenti e leggermente arcuate in corrispondenza dei due lati minori (quella a NW è più brillante); scalando a 340x e usando l'O III l'effetto è più marcato, ma non aumentano i particolari visibili; nel complesso la planetaria è dunque orientata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina subito a NW (era osservabile senza problemi anche nel 10" a 178x).
NGC 6446	gx	17h46m08s	+35°34.1'	q 116	Her	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue nucleo stellare; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelline a N e NE (appariva solo elusivamente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6447	gx	17h46m17s	+35°34.4'	q 116	Her	24"	m. buona / m. buono	situata 2' a E di NGC 6446, è una gx diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è un terzetto serrato di stelline brillanti, leggermente arcuato a ~ 3' verso E; la gx è situata a una decina di primi SW di un piccolo asterismo di 4 stelle già visibile nel cercatore 12x50: 3 di queste sono molto brillanti e formano un triangolo rettangolo isoscele perfetto coi cateti lunghi 3' e orientati secondo le direzioni cardinali (la gx era molto debole nel 10" a 178x).
NGC 6449	gx	17h43m46s	+56°48.2'	q 53	Dra	16"	discreta / scarso	debole, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; a tratti appare leggermente più brillante verso S — 188x.
NGC 6451	aa	17h50m42s	−30°12.0'	q 377	Sco	6"	buona / buono	relativamente compatto, granulato e di forma vagamente triangolare.
NGC 6452	gx	17h47m58s	+20°50.3'	q 158	Her	16"	buona / discreto	piccola e debolissima, ma visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 270x come "incastrata" tra 2 stelline distanti poco più di 1' e orientate da E a W; non è più estesa di 20"-25" — 270x.
NGC 6453	ag	17h50m52s	−34°35.9'	q 377	Sco	10"	m. buona / m. buono	piccolo e molto debole, con Ø di un paio di primi; presenta basso gradiente di luce e appare molto stemperato ai bordi; c'è una stellina quasi a ridosso del bordo W — 178x.
NGC 6454	gx	17h44m56s	+55°42.3'	q 53	Dra	28"	ottima / m. buono	brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' scarso verso S; un'altra stellina debolissima si trova a ~ W, ma questa è in realtà la **PGC 2511525** — 495x.
NGC 6456	gx	17h42m32s	+67°35.5'	q 30	Dra	28"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso N — 495x.
NGC 6457	gx	17h42m53s	+66°28.5'	q 30	Dra	28"	m. buona / discreto	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" (era visibile molto debolmente nel 10" a 178x, ma appariva rotonda con Ø di 45" e con nucleo puntiforme) — 495x.
NGC 6458	gx	17h49m11s	+20°48.2'	q 158	Her	16"	buona / discreto	piccola, diffusa, circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e un piccolo nucleo puntiforme — 270x.
NGC 6459	gx	17h45m47s	+55°46.6'	q 53	Dra	28"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 495x.
NGC 6460	gx	17h49m30s	+20°45.8'	q 158	Her	16"	buona / discreto	è di luminosità uniforme, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 6461	gx	17h38m42s	+73°30.9'	q 12	Dra	16"	buona / m. buono	è una gx piccola, elusiva e molto diffusa che si vede a tratti con gran difficoltà; non dovrebbe essere più estesa di 20" o 30" — 270x.
NGC 6462	gx	17h44m49s	+61°54.6'	q 30	Dra	16"	buona / mediocre	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, relativamente compatta con Ø di una 20-ina di secondi; sembra una debole stellina sfuocata — 188x.
NGC 6463	gx	17h43m34s	+67°36.2'	q 30	Dra	28"	m. buona / discreto	fa parte di un gruppo di galassie comprendente alcune NGC e altre componenti molto deboli — questa è visualmente facile, molto diffusa e con evidente condensazione centrale, rotonda con Ø di 45" — 495x.
NGC 6464	gx	17h45m47s	+60°53.8'	q 53	Dra	28"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø < 40"; c'è una debole stellina a 1' SW e una appena percettibile alla stessa distanza dalla parte opposta — 495x.
NGC 6466	gx	17h48m08s	+51°23.9'	q 53	Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con piccolo bulge molto marcato; situata tra due stelline abbastanza brillanti a 1.5' N e 2' a S — 450x.
NGC 6467	gx	17h50m40s	+17°32.3'	q 158	Her	16"	buona / ottimo	debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, con basso gradiente di luce, orientata grosso modo da E a W con dimensioni 80"×40"; il tenue bulge sembra tuttavia orientato un poco in senso antiorario rispetto all'asse della galassia che comunque alquanto disturbata dalla presenza di numerose stelle di campo — 270x.
NGC 6469	aa	17h52m54s	−22°20.0'	q 339	Sgr	10"	ottima / discreto	gruppo disperso di una 30-ina di stelle poste su un'area di 15'×10' e orientata da N a S; a bassi ingrandimenti (63x) si nota una sorta di gap all'interno come se le stelle fosse poste a mo' di corona.
NGC 6470	gx	17h44m13s	+67°35.6'	q 30	Dra	28"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1'; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi in direzione NW-SE (altresì riportata come **NGC 6471**) — 495x.
NGC 6472	gx	17h44m15s	+67°37.2'	q 30	Dra	28"	m. buona / discreto	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina subito a NE — 495x.
NGC 6473	gx	17h47m05s	+57°18.1'	q 53	Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a poco più di 1' verso E (altresì denominata NGC 6474) — 450x.
NGC 6477	gx	17h44m03s	+67°37.8'	q 30	Dra	28"	m. buona / discreto	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a ridosso NW e una appena percettibile subito a E — 495x.
NGC 6478	gx	17h48m38s	+51°09.4'	q 53	Dra	16"	mediocre / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30", con bulge esteso e piccolo nucleo di aspetto stellare; c'è una stellina quasi a ridosso dell'estremità SW — 188x.
NGC 6479	gx	17h48m22s	+54°09.0'	q 53	Dra	16"	mediocre / ottimo	debole, estesa ~ 1', di luminosità pressoché uniforme; è disturbata dalla luce di una brillante stella di 6ª situata 6' o 7' ENE che a causa della fortissima umidità crea un alone molto fastidioso — 188x.
NGC 6481	ss	17h52m48s	+04°10.0'		Oph	24"	m. buona / m. buono	nella posizione indicata dalle coordinate si trova un piccolo allineamento serrato di 4 stelline orientate da E a W, esteso una 40-ina di secondi e leggermente arcuato con concavità rivolta verso N; la 2ª componente da E è la più brillante, mentre la 1ª da W è appena percettibile; rispetto a quest'ultima, una 5ª stellina appena più evidente si trova a una decina di secondi più a N — 450x.
NGC 6482	gx	17h51m49s	+23°04.3'	q 158	Her	24"	buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 1'; il nucleo, poco contrastato sul disco, forma una coppia serrata con una stellina a W (era osservabile senza problemi anche nel 10" a 178x; a 63x pareva un piccolo ammasso globulare) — 450x.
NGC 6484	gx	17h51m47s	+24°29.0'	q 158	Her	16"	buona / discreto	presenta un bulge brillante che si stacca su un alone tenue e molto sfumato; è allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 6485	gx	17h51m53s	+31°27.7'	q 116	Her	16"	buona / ottimo	debole, ma facilmente visibile, approssim. circolare con Ø di circa 1', poco diffusa e appena più brillante all'interno — 380x.
NGC 6486	gx	17h52m35s	+29°49.1'	q 116	Her	16"	buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo evidente di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 6487	gx	17h52m42s	+29°50.3'	q 116	Her	16"	buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di 80" e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 6488	gx	17h49m21s	+62°13.4'	q 30	Dra	16"	m. buona / mediocre	macchiolina di luce compatta, rotonda, dai bordi ben definiti e con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 6489	gx	17h49m24s	+60°04.3'	q 53	Dra	28"	ottima / m. buono	diffusa e con nucleo stellare brillante, rotonda con Ø < 30"; situata tra due stelline brillanti distanti un paio di primi in direzione NW-SE; una coppia sbilanciata di stelline si trova a 1' scarso verso W — 495x.
NGC 6490	gx	17h54m30s	+18°22.5'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	è piccola e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W, con dimensioni 45"×30' — 270x.
NGC 6491	gx	17h50m01s	+61°31.9'	q 30	Dra	16"	discreta / ottimo	presenta una condensazione centrale molto brillante, marcata, di aspetto quasi stellare e un tenue alone allungata da NE a SW e di dimensioni 60"×30" — 380x.
NGC 6493	gx	17h50m23s	+61°33.6'	q 30	Dra	16"	discreta / ottimo	debolissima, molto diffusa, con bassissima luminanza superficiale, estesa una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 6495	gx	17h54m51s	+18°19.6'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	relativamente facile, ma presenta basso gradiente di luce; è rotonda, diffusa con Ø di massimo di 1' — 270x.
NGC 6497	gx	17h51m18s	+59°28.3'	q 53	Dra	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 80"×40" e con piccolo bulge evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N — 450x.
NGC 6500	gx	17h56m00s	+18°20.3'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti ~ 3' in direzione NE-SW e di aspetto simile; la 1ª diffusa, presenta un bulge esteso, ben evidente ed è poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45". La 2ª pure è diffusa ai bordi, ma ha un nucleo più piccolo e brillante; è rotonda con Ø di ~ 1'; la visione è un po' disturbata dalla HD 163640 di 6ª grandezza situata 5' a E della coppia — 270x.
NGC 6501	gx	17h56m04s	+18°22.4'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	v. **NGC 6500**
NGC 6503	gx	17h49m28s	+70°08.6'	q 30	Dra	24"	m. buona / ottimo	molto bella e debolmente screziata a 450x, allungata da NW a SE con dimensioni di 4'×1' e di luminosità pressoché uniforme, salvo un piccolo bulge a mala pena visibile; situata subito a W della SAO 8937 di magnitudo 8.6 (era facilmente visibile nel 10" a 178x).
NGC 6504	gx	17h56m06s	+33°12.5'	q 116	Her	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce orientata da E a W, estesa un paio di primi e con nucleo quasi stellare molto brillante (era comunque debolmente visibile anche nel 10" 178x) — 450x.
NGC 6505	gx	17h51m08s	+65°31.8'	q 30	Dra	16"	buona / discreto	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso; a 188x è visibile, in visione distolta, un piccolo nucleo poco più evidente del disco che a tratti sembra mostrare qualche lieve discrepanza di luminosità.
NGC 6507	aa	17h59m36s	−17°23.0'	q 339	Sgr	10"	ottima / discreto	gruppo molto povero e disperso di una dozzina di stelle deboli.
NGC 6508	gx	17h49m47s	+72°01.3'	q 30	Dra	16"	buona / discreto	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo molto brillante — 188x.
NGC 6509	gx	17h59m25s	+06°17.3'	q 204	Oph	16"	buona / buono	relativamente facile, diffusa e con gradiente di luce molto basso, poco allungata da E a W, di dimensioni 80"×60"; c'è una stellina a ridosso verso E e un'altra situata a 1' di distanza sempre verso E — 380x.
NGC 6510	gx	17h54m39s	+60°49.1'	q 30	Dra	24"	ottima / m. buona	molto debole, poco allungata da N a S, di dimensioni 50"×40" e con una condensazione centrale di aspetto irregolare; sembra a tratti di vedere una piccola barra orientata in senso perpendicolare all'allungamento della gx (altresì riportata come **NGC 6511**) — 450x.
NGC 6512	gx	17h54m50s	+62°38.7'	q 30	Dra	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
NGC 6513	gx	17h59m34s	+24°53.2'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	piccola, abbastanza compatta, e con basso gradiente di luce; è poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 6515	gx	17h57m25s	+50°43.7'	q 53	Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e con piccolo bulge rotondo, contrastato di ~ 10" di Ø — 450x.
NGC 6516	gx	17h55m16s	+62°40.2'	q 30	Dra	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
NGC 6517	ag	18h01m51s	−08°57.5'	q 294	Oph	24"	m. buona / m. buono	presenta un Ø di 1.5' e un elevato gradiente di luce, ma solo a momenti appare debolmente screziato (già precedentemente osservato nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6518	gx	17h59m44s	+28°52.0'	q 116	Her	16"	buona / ottimo	piccola, relativamente brillante, compatta, con marcata condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso del nucleo verso W — 380x.
NGC 6520	aa	18h03m25s	−27°52.9'	q 339	Sgr	10"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto relativamente compatto, allungato da N a S con dimensioni ~ 3'×2', screziato a 63x; all'incirca delle stesse dimensioni è Barnard 86 che si nota subito a W.
NGC 6521	gx	17h55m48s	+62°36.7'	q 30	Dra	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina al bordo W — 450x.
NGC 6522	ag	18h03m35s	−30°02.0'	q 377	Sgr	6"	buona / buono	piccolo e debole, leggermente condensato e con Ø max di 1'.
NGC 6524	gx	17h59m15s	+45°53.3'	q 81	Her	16"	discreta / buono	poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", con bulge esteso e diffuso con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a poche decine di secondi verso E — 188x.
NGC 6526	neb	18h04m27s	−23°32.0'	q 339	Sgr	10"	m. buona / m. buono	complesso nebulare molto esteso, tenue e irregolare, diseguale in brillanza, solo vagamente distinguibile nel campo oculare a 63x; più facilmente visibile nel 20×80.
NGC 6527	gx	18h01m46s	+19°43.7'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	debole, di luminosità uniforme e di aspetto un po' confuso, probabilmente rotonda con Ø di 45" — 270x.
NGC 6528	ag	18h04m50s	−30°03.3'	q 377	Sgr	6"	buona / buono	più piccolo e più debole di NGC 6522, meglio osservabile in visione distolta.
NGC 6532	gx	17h59m14s	+56°13.9'	q 53	Dra	16"	discreta / scarso	molto debole, appena più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 188x.
NGC 6534	gx	17h56m09s	+64°17.1'	q 30	Dra	16"	m. buona / mediocre	piccola, debole, con Ø massimo di 20", situata a meno di 1' a S di una stella brillante — 270x.
NGC 6535	ag	18h03m51s	−00°17.8'	q 249	Ser	24"	m. buona / m. buono	esteso 1.5' e parzialmente risolto a 450x, soprattutto in visione distolta; 4 stelline brillanti, 2 delle quali costituiscono una doppia stretta, ne lambiscono l'estremità occidentale (appariva molto debole e leggermente granulato nel 10" a 178x).
NGC 6536	gx	17h57m16s	+64°56.3'	q 30	Dra	16"	discreta / ottimo	molto debole e diffusa, con bassissima luminanza superficiale, estesa una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 6537	np	18h05m13s	−19°50.6'	q 339	Sgr	10"	buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, con Ø di una decina di secondi e una tinta vagamente verdastra; solo a momenti sembra d'intravvedere a 450x la stellina centrale; forma un triangolo isoscele molto aperto con 2 stelline a W e NW (anche nel 10" a 240x appariva compatta, seppure molto debole) — 450x.
NGC 6538	gx	17h54m17s	+73°25.5'	q 12	Dra	16"	ottima / discreto	debole e poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 188x.
NGC 6539	ag	18h04m50s	−07°35.1'	q 294	Ser	24"	buona / m. buono	ha Ø di un paio di primi, diffuso e piuttosto spampanato, con basso gradiente di luce e meglio contrastato scalando a 340x; è di aspetto più simile a una gx; alcune stelline si staccano dal corpo centrale, tra cui una appena percettibile a ridosso E (già precedentemente osservato nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6540	aa	18h06m09s	−27°45.9'	q 339	Sgr	10"	m. buona / buono	oggetto molto debole e piccolo, di forma approssim. circolare con Ø poco superiore a 1'; presenta una certa granulazione a 178x, ma sembra comunque molto povero; a 63x è una semplice chiazza lattescente visibile più agevolmente in visione laterale.
NGC 6542	gx	17h59m39s	+61°21.6'	q 30	Dra	16"	discreta / scarso	posta praticamente di taglio, orientata da E a W, con bulge estesa ed evidente; c'è una stellina a ridosso del bordo orientale — 188x.
NGC 6543	np	17h58m33s	+66°38.0'	q 30	Dra	24"	m. buona / ottimo	poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45", compatta e di un colore bianco-azzurro che tuttavia si apprezza meglio scalando molto gli ingrandimenti; è talmente brillante che non mostra dettagli superficiali significativi, salvo due anse laterali che però non si separano dal corpo centrale (la planetaria è facilmente visibile nel cercatore 12x50) — 450x.
NGC 6544	ag	18h07m21s	−24°59.8'	q 339	Sgr	24"	buona / buono	a prima vista sembra fatto a semicerchio; in realtà c'è una stringa leggermente arcuata di 5 stelline (quella centrale è la più brillante) che lo delimita a S che dà quest'impressione; l'ammasso non è ricco, presenta un basso gradiente di luce ed è quasi totalmente risolto a 450x (nel Comet-Tracker da 6", a 86x, appariva di forma alquanto irregolare; una stellina situata subito a SW dava al primo colpo d'occhio la strana illusione che l'oggetto fosse attraversato da una banda scura).
NGC 6546	aa	18h07m12s	−23°18.0'	q 339	Sgr	10"	ottima / discreto	gruppo disperso di stelle le più brillanti delle quali ricordano vagamente una farfalla; le 7 più luminose sembrano immerse in un fondo lattescente.
NGC 6547	gx	18h05m10s	+25°14.0'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	piccolo fuso con bulge evidente, orientata da NW a SE ed estesa 40" o 50" — 270x.
NGC 6548	gx	18h05m59s	+18°35.2'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	facile, relativamente brillante, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; presenta un alto gradiente di luce e un nucleo brillante — 270x.
NGC 6549	gx	18h05m49s	+18°32.3'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	situata 4'a SW di NGC 6548, è una debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa per ~ 1' — 270x.
NGC 6552	gx	18h00m07s	+66°36.9'	q 30	Dra	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con tenue bulge diffuso e poco contrastato (era visibile molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6553	ag	18h09m17s	−25°54.5'	q 339	Sgr	24"	discreta / ottimo	bello, esteso 2.5', presenta basso gradiente di luce e appare finemente screziato anche a 340x; c'è una doppia stretta a ridosso E e una stellina a ridosso NW; si nota un piccolo vuoto stellare verso SW: questo dà a prima vista l'impressione che l'ammasso sia poco allungato da NW a SE (relativamente compatto e di luminosità uniforme nel Comet-Tracker da 6" a 86x) — 450x.
NGC 6555	gx	18h07m49s	+17°36.3'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	è una gx molto diffusa, stemperata, grosso modo circolare con Ø di 1.5' e di luminosità pressoché uniforme, salvo lievissime discrepanze di luce all'interno che però si notano a solo a momenti; ci sono delle debolissime stelline a ridosso verso N — 270x.
NGC 6558	ag	18h10m18s	−31°45.8'	q 337	Sgr	10"	buona / buono	molto piccolo e molto debole, con Ø sì e no di 1', visibile agevolmente solo in visione distolta con l'oculare da 118x.
NGC 6560	gx	18h05m14s	+46°52.9'	q 82	Her	16"	discreta / buono	molto debole, rotonda, di una 30-ina di secondi di Ø e di luminosità uniforme; è situato 1.5' a SW di una stella doppia sbilanciata con componenti distanti ~ 30" (ossia all'incirca pari alle dimensioni della gx) in direzione N-S — 188x.
NGC 6562	gx	18h05m01s	+56°15.8'	q 53	Dra	16"	mediocre / ottimo	piccola, circolare, di 30" o 40" di Ø e nucleo puntiforme; in visione diretta è di aspetto quasi stellare; c'è una stellina a neppure 1' verso SW (o WSW) — 188x.
NGC 6565	np	18h11m53s	−28°10.7'	q 377	Sgr	16"	ottima / scarso	è un oggetto brillante, piccolo, del Ø di 7" o 8" di luminosità uniforme e di un colore azzurrino — 188x.
NGC 6566	gx	18h07m01s	+52°15.6'	q 53	Dra	16"	mediocre / ottimo	è una gx dai bordi piuttosto confusi, di dimensioni inferiori a 1', con una condensazione abbastanza marcata e di aspetto stellare — 188x.
NGC 6567	np	18h13m45s	−19°04.5'	q 339	Sgr	24"	buona / buono	molto piccola e brillante, con un'ansa molto tenue a NW che le dà una forma allungata, pari grosso modo a 20"×10"; c'è una stellina a ridosso E (appare poco più di una stellina sfuocata nel 10" a 178x; era altresì visibile, anche se abbastanza al limite, la stellina a E) — 450x.
NGC 6568	aa	18h12m48s	−21°35.0'	q 339	Sgr	10"	m. buona / buono	gruppo disperso di una 40-ina di stelle racchiuse in un'area estesa una decina di primi; a 63x risalta subito una strana configurazione che ricorda un "3" speculare speculare o una "E" arrotondata.
NGC 6569	ag	18h13m39s	−31°49.6'	q 337	Sgr	10"	buona / buono	debole, con Ø di un paio di primi e basso gradiente di luce; non appare granulazione neppure a 178x, ma solo qualche debole stellina sovrapposta.
NGC 6570	gx	18h11m07s	+14°05.6'	q 204	Oph	16"	m. buona / buono	facile da vedere, ma di aspetto un po' irregolare, grosso modo rotonda con Ø superiore a 1'; c'è una stellina subito a NW — 380x.
NGC 6571	gx	18h10m49s	+21°14.3'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	è una galassia debolissima, quasi elusiva, piccola, con Ø max di 20"; è necessaria la visione distolta per distinguerla da un paio di minute stelline di egual luminosità e situate a S — 270x.
NGC 6572	np	18h12m06s	+06°51.2'	q 204	Oph	24"	m. buona / m. buono	molto brillante (facilmente visibile nel cercatore 12×60), rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di un bel colore azzurro chiaro a tratti cangiante al verde pallido; l'aspetto è tuttavia uniforme e rimane tale anche a 450x con l'O III (facilmente visibile, nonché di Ø simile, anche nel 10" a 240x).
NGC 6574	gx	18h11m51s	+14°58.9'	q 204	Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e brillante, ma con basso gradiente di luce, screziata a 450x, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso verso S e una più debole al bordo occidentale (era facilmente visibile anche nel 10" a 178x in condizioni di cielo discrete).
NGC 6575	gx	18h10m57s	+31°07.1'	q 116	Her	16"	ottima / buono	abbastanza brillante, diffusa, alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 1' scarso ed evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 6576	gx	18h11m48s	+21°25.7'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	è un piccola galassietta molto debole, di luminosità pressoché uniforme e con Ø massimo di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 6577	gx	18h11m02s	+21°27.8'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	più estesa di NGC 6576, è debole, rotonda, poco diffusa, con Ø di ~ 40" e con un piccolo nucleo di aspetto stellare — 270x.
NGC 6578	np	18h16m17s	−20°27.0'	q 339	Sgr	24"	buona / buono	piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, anche se non si nota la stellina centrale; è situata a ridosso NE di una stellina brillante (appariva molto debole e condensata nel 10" a 240x) — 450x.
NGC 6579	gx	18h12m32s	+21°25.2'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	assieme alla successiva forma una coppia di gx molto vicine che in visione distolta tendono a fondersi in un'unica chiazza lattescente. La 1aè la più debole, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30"; la 2ª è più estesa, di dimensioni 60"×40", orientata da NW a SE e con tenue condensazione centrale — 270x.
NGC 6580	gx	18h12m34s	+21°25.6'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	v. **NGC 6579**
NGC 6581	gx	18h12m48s	+25°24.7'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	è un piccolo e debole ovale di luminosità uniforme, orientata da E a W e dimensioni 30"×15" — 270x.
NGC 6582	gx	18h10m29s	+49°55.3'	q 82	Her	24"	ottima / ottimo	presenta un nucleo stellare circonfuso da un tenue alone molto diffuso, rotondo con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
NGC 6583	aa	18h15m20s	−22°08.6'	q 339	Sgr	10"	m. buona / buono	molto debole, ovale, orientato da NE a SW con dimensioni di circa 3'×2'; appare granulato in visione distolta a 178x, ma non è possibile contare le singole componenti.
NGC 6585	gx	18h12m22s	+39°38.0'	q 82	Her	24"	m. buona / m. buono	è un bel fuso di luminosità pressoché uniforme, orientato da NE a SW esteso quasi 2' e spesso una 30-ina di secondi; sembra "incuneato" in un asterismo di 5 stelle fatto a "M" o "W" irregolare (a seconda dell'orientamento) situato a ridosso NE; meglio contrastata, comunque, scalando a 340x (era debolissima nel 10" a 178x e solo a momenti in visione distolta appariva molto allungata da NE a SW) — 450x.
NGC 6586	gx	18h13m38s	+21°05.4'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	è una debole chiazza ovale di luminosità uniforme, allungata da E a W e di dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso S e un'altra appena percettibile verso NE; a ~ 4' verso E si trova una stellina abbastanza brillante; quasi a ridosso di quest'ultima, verso NW, si nota, sia pure a momenti in visione distolta, un elusivo baffo di luce che punta a S, appena percettibile a 270x; dal momento che il seeing non aiuta a dirimere la questione, resta il dubbio che non si tratti di un'altra galassia, ma che sia invece un minuscolo raggruppamento serrato di deboli stelline.
NGC 6587	gx	18h13m51s	+18°49.5'	q 159	Her	16"	discreta / ottimo	piccola e rotonda, debole poco più brillante all'interno, situata 1'.5 SE di una stella brillante di 11ª grandezza — 270x.
NGC 6589	neb	18h16m52s	−19°46.7'	q 339	Sgr	10"	ottima / discreto	assieme ad NGC 6590 forma una coppia di 2 aloni distanti ~ 6' in direzione NNW-SSE che circondano rispettivamente una stella e una doppia serrata.
NGC 6590	neb	18h17m02s	−19°51.8'	q 339	Sgr	10"	ottima / discreto	v. **NGC 6589**
NGC 6591	st?	18h13m55s	+21°05.3'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	dovrebbe trattarsi di quella tripletta serrata situata 4' a E di NGC 6586 e che a causa del seeing appare come un tenue oggetto diffuso — 270x.
NGC 6592	gx	18h09m51s	+61°25.3'	q 30	Dra	16"	discreta / scarso	rotonda con Ø di ~ 40", diffusa e con nucleo brillante di aspetto quasi stellare — 188x.
NGC 6593	gx	18h14m03s	+22°17.0'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	debole, di aspetto diffuso e irregolare, con una tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ~ 1' verso N. È immersa in un campo molto ricco — 270x.
NGC 6594	gx	18h10m05s	+61°08.0'	q 30	Dra	16"	discreta / scarso	molto debole, estesa ~ 1' e con gradiente di luce molto basso di luce; è situata ~ 6' SW di una stella brillante — 188x.
NGC 6596	aa	18h17m30s	−16°39.0'	q 294	Sgr	10"	m. buona / m. buono	è un piccolo gruppo piuttosto disperso di una 15-ina di stelle brillanti di cui 8 poste a "C" quadra.
NGC 6597	gx	18h10m13s	+61°10.8'	q 30	Dra	16"	discreta / scarso	è poco più piccola e ancora più debole di NGC 6596; è compatta, con Ø di una 30-ina di secondi e situata a 3' E della stessa stella; c'è anche una stellina debole a 1.5' verso N — 188x.
NGC 6598	gx	18h08m56s	+69°04.1'	q 30	Dra	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a ridosso NE (appariva molto debolmente nel 10") — 450x.
NGC 6599	gx	18h15m43s	+24°54.8'	q 30	Her	16"	discreta / scarso	relativamente facile, rotonda con Ø di 45", con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso SW — 270x.
NGC 6601	gx	18h11m44s	+61°27.2'	q 30	Dra	24"	buona / mediocre	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
NGC 6602	gx	18h16m34s	+25°02.7'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	approssim. circolare, di dimensioni poco inferiori a NGC 6599, di luminosità uniforme e situata in un campo molto ricco; una stellina si trova a ridosso verso E — 270x.
NGC 6603	aa	18h18m28s	−18°24.4'	q 339	Sgr	10"	ottima / buono	trattasi propriamente di M24 — oggetto interessante, compatto, oblungo, diviso quasi perfettamente a metà da una stretta banda scura; sembra un insetto in volo.
NGC 6604	aa	18h18m06s	−12°13.0'	q 294	Ser	10"	ottima / discreto	piccolo gruppo molto povero di 7 od 8 stelle, la più luminosa delle quali è riportata sull'Uranometria.
NGC 6606	gx	18h14m41s	+43°16.1'	q 82	Lyr	16"	discreta / buono	debole, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×50", molto diffusa ai bordi e gradatamente più brillante verso l'interno — 188x.
NGC 6607	gx	18h12m15s	+61°20.0'	q 30	Dra	24"	buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
NGC 6608	gx	18h12m34s	+61°19.9'	q 30	Dra	24"	buona / mediocre	situata un paio di primi a E della precedente, è molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" e un nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso S e una molto debole subito a NE — 450x.

NGC 6609	gx	18h12m30s	+61°18.0'	q 30	Dra	24"	buona / mediocre	è una debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione NE-SW; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
NGC 6612	gx	18h16m11s	+36°04.7'	q 116	Lyr	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE (appariva solo elusivamente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6615	gx	18h18m33s	+13°15.9'	q 204	Oph	16"	m. buona / buono	brillante, abbastanza compatta, con condensazione centrale evidente quasi stellare, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W — 380x.
NGC 6616	gx	18h17m41s	+22°14.3'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	è un debole ovale di luminosità uniforme, dimensioni 60"×45", orientata da NE a SW che sembra dipartirsi da una stellina brillante situata al margine SW — 270x.
NGC 6617	gx	18h14m03s	+61°19.2'	q 30	Dra	24"	m. buona / discreto	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 6619	gx	18h18m56s	+23°39.3'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	è un ovale relativamente brillante, di dimensioni 45"×30", con bulge evidente ma poco contrastato sull'alone; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
NGC 6620	np	18h22m54s	−26°49.3'	q 339	Sgr	24"	buona / buono	è un minuscolo dischetto grigio-verde abbastanza brillante, poco diffuso, di luminosità uniforme e con stellina centrale evidente; rimane ancora di aspetto quasi stellare a 340x; è situata a 1' NW di una stella brillante (nel 10" appariva leggermente sfocata solo in visione distolta spingendo a 240x) — 450x.
NGC 6621	gx	18h12m56s	+68°21.8'	q 30	Dra	16"	buona / discreto	a 188x si vedono chiaramente due nuclei relativamente brillanti separati da meno di 1' in direzione NW-SE, con aloni diffusi che tendono a confondersi tra loro; in visione distolta la 1ª appare orientata da NE a SW per 1', mentre la 2ª rimane un oggetto molto piccolo, forse rotondo e non più esteso di 20".
NGC 6622	gx	18h13m00s	+68°21.2'	q 30	Dra	16"	buona / discreto	v. **NGC 6621**
NGC 6623	gx	18h19m43s	+23°42.7'	q 159	Her	24"	buona / buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce e di aspetto a tratti un po' irregolare; è approssim. rotonda con Ø di 45" — 400x.
NGC 6624	ag	18h23m40s	−30°21.7'	q 238	Sgr	10"	buona / buono	è un oggetto di aspetto cometario, con gradiente di luce molto alto e Ø di un paio di primi, ma senza traccia di granulosità.
NGC 6627	gx	18h22m39s	+15°41.9'	q 204	Her	16"	m. buona / buono	debole, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con condensazione centrale a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso verso W.
NGC 6628	gx	18h22m22s	+23°28.7'	q 159	Her	16"	discreta / scarso	diffusa, stemperata sul fondo cielo, probabilmente ovale, allungata ~ da E a W con dimensioni 60"×45" e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 6629	np	18h25m42s	−23°12.2'	q 340	Sgr	24"	buona / buono	bella, poco diffusa, con Ø di una 20-ina di secondi e di aspetto regolare; è visibile la stellina centrale; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N (facilmente visibile come un piccolo dischetto brillante nel 10" a 240x) — 450x.
NGC 6631	aa	18h27m12s	−12°01.0'	q 295	Sct	10"	m. buona / m. buono	debole, appare fortemente granulato a 118x e allungato da NW a SE, di dimensioni 5'×3' con una stella brillante al bordo nord-occidentale.
NGC 6632	gx	18h25m03s	+27°32.1'	q 160	Her	16"	buona / discreto	relativamente brillante, con alto gradiente di luce, diffusa; appare poco allungata all'incirca da N a S con dimensioni 60"×45; forma un piccolo triangolo con 2stelline distanti 30" e orientate da NE a SW — 380x.
NGC 6633	aa	18h27m13s	+06°30.6'	q 205	Oph	6"	mediocre / ottimo	disperso, presenta una sorta di nucleo arcuato, concavo in direzione W, con 3 filari di stelle che da questo si dipartono a mo' di coda cometaria; c'è un piccolo distaccamento verso SW.
NGC 6635	gx	18h27m37s	+14°49.1'	q 205	Her	16"	m. buona / buono	debole, ma relativamente compatta, rotonda, Ø di 45", con condensazione centrale evidente e diffusa — 380x.
NGC 6636	gx	18h22m03s	+66°37.0'	q 30	Dra	24"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce orientata da N a S ed estesa 1.5' (la dimensioni è grosso modo pari alla distanza delle due stelle brillanti situate a S e SE); meglio contrastata scalando a 340x; un nodulo di aspetto quasi stellare si trova a ridosso NE della gx: da un controllo successivamente effettuato è risultato di fatto essere la MCG+11-22-47.
NGC 6638	ag	18h30m56s	−25°29.8'	q 340	Sgr	24"	buona / buono	bello, molto diffuso ed esteso per quasi 2', con una zona interna di 1' molto granulata e un alone circonfuso finemente screziato; sono molto poche le stelline individuali che si risolvono (era facilmente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6639	aa	18h30m58s	−13°10.1'	q 295	Sct	10"	m. buona / m. buono	piccolo gruppo di una dozzina di stelle di luminosità abbastanza simile sparse su un'area con dimensioni lineari di ~ 4'; un'altra concentrazione stellare poco più estesa si trova a una 20-ina di primi a NE, ma non ho trovato un numero di catalogo corrispondente — 118x.
NGC 6640	gx	18h28m08s	+34°18.2'	q 117	Lyr	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e con basso gradiente di luce; c'è una debole stellina quasi a ridosso NE (appariva elusivamente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6641	gx	18h28m57s	+22°54.2'	q 160	Her	16"	buona / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 40"×30", diffusa e con piccola condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW; una stellina brillante si trova invece 1' scarso a NW — 380x.
NGC 6642	ag	18h31m54s	−23°28.6'	q 340	Sgr	24"	buona / buono	esteso 1' e parzialmente risolto a 450x, soprattutto nella zona esterna; ci sono 2 stelline a ridosso del nucleo: la più brillante a SE e l'altra a W; queste danno a prima vista l'impressione che l'ammasso sia "fratturato" (già osservato nel 10", ma non risolto a 178x).
NGC 6643	gx	18h19m46s	+74°34.2'	q 12	Dra	24"	m. buona / ottimo	bella, ma con gradiente di luce molto basso, allungata da NE a SW con dimensioni 3'×1.5', finemente screziata a 450x; presenta una piccola condensazione centrale poco contrastata sul disco; ci sono 4 stelline brillanti foggiate a "L" a NW (era stata osservata col 10" in condizioni di visibilità abbastanza simili).
NGC 6644	np	18h32m35s	−25°07.7'	q 340	Sgr	24"	buona / buono	molto piccola, brillante e compatta, leggermente azzurrata e di aspetto quasi stellare anche a 450x; forma un piccolo triangolo molto schiacciato con due stelline a NNW e a ESE (era visibile nel 10", ma rimaneva stellare anche a 240x).
NGC 6645	aa	18h32m36s	−16°53.0'	q 296	Sgr	10"	ottima / buono	relativamente brillante e di forma molto irregolare, risolto a 63x; sembra presentare un gap nel mezzo.
NGC 6646	gx	18h29m39s	+39°51.9'	q 82	Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. circolare con Ø di oltre 1' (appariva molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6649	aa	18h33m29s	−10°24.1'	q 295	Sct	6"	discreta / buono	debole, appare finemente screziato in visione distolta a 63x.
NGC 6650	gx	18h25m28s	+68°00.3'	q 30	Dra	16"	m. buona / mediocre	è un piccola galassietta rotonda, relativamente brillante, compatto, con Ø massimo di 45" — 270x.
NGC 6651	gx	18h24m20s	+71°36.1'	q 30	Dra	16"	buona / discreto	piuttosto debole, allungata da NE a SW, con dimensioni 60"×30" e gradatamente più brillante all'interno — 188x.
NGC 6652	ag	18h35m46s	−32°59.4'	q 378	Sgr	10"	buona / buono	debole, con Ø di un paio di primi, ma di forma un po' irregolare e di luminosità non uniforme nelle regioni interne; c'è una stellina a ridosso verso W e altre debolissime che appaiono a tratti a 240x.
NGC 6654	gx	18h24m08s	+73°11.0'	q 12	Dra	16"	ottima / discreto	gx molto facile; presenta un bulge luminoso estesa per 30"-40" e un alone molto tenue, opalescente e uniformemente estesa per un paio di primi; è leggermente ovale, orientata da N a S — 188x.
NGC 6654A	gx	18h39m26s	+73°34.8'	q 12	Dra	16"	m. buona / buono	debole e con bassissima luminanza superficiale, allungata da ENE a WSW con dimensioni 2'×1'; è situata tra 2 stelline distanti ~ 2' e orientate da N a S: quella a N è più brillante — 270x.
NGC 6657	gx	18h33m02s	+34°03.6'	q 117	Lyr	24"	buona / buono	è un bell'ovale regolare di 60"×30", orientato da NW a SE, di dimensioni 60"×30", diffuso e con nucleo stellare; è situato all'interno di un piccolo triangolo isoscele molto allungato di deboli stelline: quella che occupa il vertice più acuto è praticamente a ridosso della gx (era debolissima nel 10", ma a 178x mostrava il nucleo puntiforme) — 450x.
NGC 6658	gx	18h33m55s	+22°53.2'	q 160	Her	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da N a S per oltre 1', presenta un bulge brillante, contrastato, con un nucleo stellare; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso NE — 380x.
NGC 6661	gx	18h34m37s	+22°54.6'	q 160	Her	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40", con bulge evidente e un piccolo nucleo quasi stellare — 380x.
NGC 6662	gx	18h34m11s	+32°03.9'	q 117	Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×20" e con tenue bulge diffuso poco contrastato sul disco (nel 10" a 240x appariva molto piccola e compatta e con dimensioni 30"×15": è evidente che era visibile solo il bulge centrale) — 450x.
NGC 6663	gx	18h33m34s	+40°03.0'	q 82	Lyr	16"	buona / ottimo	è un debole lucore estesa per una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; anche a 380x il campo rimane ricco di stelline.
NGC 6664	aa	18h36m31s	−08°11.0'	q 295	Sct	10"	buona / buono	oggetto molto diradato, approssim. circolare e già parzialmente risolto a 57x; è situato a ridosso E di α Sct.
NGC 6665	gx	18h34m30s	+30°43.2'	q 117	Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×40"; poco meglio contrastata scalando a 340x (appariva debolissima nel 10" a 176).
NGC 6667	gx	18h30m40s	+67°59.2'	q 30	Dra	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con gradiente di luce molto basso; in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 2'×45"; meglio contrastata scalando a 340x (era visibile molto debolmente nel 10" a 188x).
NGC 6669	gx	18h37m55s	+22°04.5'	q 160	Her	16"	m. buona / ottimo	debolissima e insidiosa, perché si "nasconde" dietro una stellina; in visione distolta appare a tratti un baffo che si diparte da questa stellina verso S per 20"-30"; in visione diretta sembra invece una sorta di alone asimmetrico — 380x.
NGC 6670	gx	18h33m37s	+59°53.4'	q 54	Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' verso E (appariva molto debole e di forma irregolare nel 16" a 380x in condizioni di visibilità simili); forma una coppia ravvicinata con **MAC 1833+5953** (v. apposita sezione) — 450x.
NGC 6671	gx	18h37m26s	+26°25.0'	q 160	Lyr	16"	buona / ottimo	è leggermente ovale, orientata da N a S con dimensioni 45"×30"; a tratti sembra di vedere come una sorta di barra centrale più brillante allungata da NW a SW con un nucleo brillante puntiforme; la gx appare come "schiacciata" tra 2 stelline di cui una a ridosso verso E — 380x.
NGC 6672	gx	18h33m44s	+42°48.0'	q 82	Lyr	16"	buona / ottimo	molto piccola, debole e compatta, rotonda con Ø di 10"-15"; è situata quasi nel mezzo di 2 stelle di cui quella a S è brillante — 380x.
NGC 6674	gx	18h38m34s	+25°22.5'	q 160	Her	16"	buona / ottimo	presenta un bulge brillante immerso in una chiazza lattescente, diffusa, orientata da NW a SE con dimensioni 90"×60"; c'è una stellina nell'alone molto vicina al bulge verso N — 380x.
NGC 6675	gx	18h37m26s	+40°03.5'	q 82	Lyr	24"	m. buona / m. buono	è una bella chiazza diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 90"×60" (appariva debole e rotonda nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 6676	gx	18h33m10s	+66°57.6'	q 30	Dra	16"	discreta / ottimo	lama di luce molto debole, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1' scarso — 380x.
NGC 6677	gx	18h33m30s	+67°08.2'	q 30	Dra	16"	discreta / ottimo	relativamente brillante e compatta, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi e una evidente condensazione centrale; sembra di vedere una leggera protuberanza verso S — 380x.
NGC 6679	gx	18h33m31s	+67°08.8'	q 30	Dra	16"	discreta / ottimo	debolissima e di aspetto stellare in visione diretta; in visione distolta appare invece leggermente nebulosa, con condensazione centrale puntiforme che potrebbe però essere anche una debole stellina a ridosso; una stellina appena percepibile e di luminosità simile si trova per confronto a 1' scarso verso NE — 380x.
NGC 6680	gx	18h39m44s	+22°19.0'	q 160	Her	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o meno, relativamente compatta; c'è una debole stellina a ridosso verso N — 380x.
NGC 6683	aa	18h42m12s	−06°16.0'	q 295	Sct	10"	m. buona / m. buono	piccolo gruppo relativamente compatto ma irregolare di stelline molto deboli, meglio evidente a 63x; si trova a pochi primi dal margine orientale di un'ampia zona scura a forma di "bottiglione" o "matraccio" denominata B 103; questa zona scura risulta facilmente visibile solo nel 20×80 essendo estesa per oltre 1°.
NGC 6685	gx	18h39m59s	+39°58.9'	q 82	Lyr	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
NGC 6686	gx	18h40m07s	+40°08.3'	q 82	Lyr	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e basso gradiente di luce — 450x.
NGC 6687	gx	18h37m22s	+59°38.6'	q 54	Dra	16"	buona / m. buono	debolissima, piccola e molto diffusa, osservabile a tratti in visione distolta in un campo ricco di stelline brillanti fra cui spicca un asterismo di 7 stelle situato a N della galassia che ricorda vagamente M29 — 380x.
NGC 6688	gx	18h40m40s	+36°17.4'	q 117	Lyr	16"	m. buona / ottimo	presenta un bulge abbastanza brillante, di una 20-ina di secondi di Ø circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di ~ 80"; osservata a 270x e 380x.
NGC 6690	gx	18h34m50s	+70°31.5'	q 30	Dra	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 3'×1'; c'è una stellina verso il margine N; un'altra un poco più brillante si trova a ridosso W (appariva molto debole e diffusa nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 6691	gx	18h39m12s	+55°38.5'	q 54	Dra	16"	discreta / scarso	debole, approssim. circolare con Ø di 1.5', ma di aspetto un po' confuso e con nucleo ben evidente — 188x.
NGC 6692	gx	18h41m42s	+34°50.6'	q 117	Lyr	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso NE (appariva elusivamente nel 10" a 178x, anche perché il campo molto ricco di stelline ne rendevano problematica l'identificazione).
NGC 6695	gx	18h42m43s	+40°22.0'	q 82	Lyr	16"	discreta / buono	debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con basso gradiente di luce; presenta un piccolo nucleo visibile a momenti — 188x.
NGC 6696	gx	18h40m05s	+59°20.0'	q 54	Dra	16"	buona / m. buono	è un'altra galassia debolissima e molto difficile, estesa non più di 30", di aspetto simile a NGC 6670, ma a differenza di quest'ultima sembra più compatta — 380x.
NGC 6697	gx	18h45m15s	+25°30.8'	q 160	Her	16"	buona / ottimo	brillante, compatta, circolare con Ø max di 30"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 380x.
NGC 6700	gx	18h46m04s	+32°16.8'	q 117	Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, di luminosità piuttosto irregolare, allungata da NW a SE con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina a ridosso W; meglio contrastata scalando a 340x (appariva elusivamente nel 10" a 178x).
NGC 6701	gx	18h43m13s	+60°39.2'	q 54	Dra	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, debolmente screziata a 450x, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; un baffo ricurvo molto tenue all'estremità NW e che piega verso N tradisce l'inizio di un braccio spirale; c'è una stellina a ridosso SE (già precedentemente osservata col 10" a 178x).
NGC 6702	gx	18h46m58s	+45°42.4'	q 82	Lyr	24"	m. buona / discreto	poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45", con piccolo nucleo marcato anche se meno brillante di quello di NGC 6703 situato 10' a SSE; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso NE (era visibile, seppure molto debolmente, anche nel 10" a 178x e in condizioni analoghe di cielo) — 450x.
NGC 6703	gx	18h47m19s	+45°33.1'	q 82	Lyr	24"	m. buona / discreto	presenta un bel nucleo luminoso esteso una 20-ina di secondi, screziato a 450x, circonfuso da un alone circolare con Ø di 1.5' sul quale contrasta nettamente (era facilmente visibile anche nel 10" a 178x e in condizioni di cielo analoghe).
NGC 6704	aa	18h50m48s	−05°12.0'	q 295	Sct	16"	ottima / ottimo	situato 1° a N di M11 – è un gruppo irregolare di una 30-ina di stelle di luminosità molto varia di cui la metà circa si stacca facilmente sul fondo cielo; è esteso ~ 5' e regge bene 270x.
NGC 6709	aa	18h51m30s	+10°20.0'	q 205	Aql	16"	discreta / ottimo	è già osservabile nel cercatore da 50 mm; a 132x appare a prima vista di aspetto romboidale, con il lato più occidentale costituito da un filare di 5 stelline; se ne contano una 40-ina irregolarmente distribuite e fra queste spicca un piccolo triangolo con componenti di 9ª e 10ª grandezza, di cui quella occidentale è arancione; questo piccolo triangolo possiede in realtà anche una 4ª componente molto debole che lo fa assomigliare più a un minuscolo parallelogramma irregolare, ma ciò si nota più facilmente a 270x. Una stella brillante a NW sembra allungare ulteriormente il rombo.
NGC 6710	gx	18h50m34s	+26°50.3'	q 160	Lyr	16"	buona / ottimo	presenta basso gradiente di luce ma è facilmente visibile, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40" — 380x.
NGC 6711	gx	18h49m01s	+47°39.5'	q 83	Dra	10"	m. buona / discreto	appare solo a momenti in visione distolta a 178x come un debolissimo lucore di luminosità uniforme e forma indistinta; non è comunque più estesa di 1'.
NGC 6712	ag	18h53m04s	−08°42.4'	q 295	Sct	16"	ottima / ottimo	parzialmente risolto a 380x, ma poco concentrato, con Ø di 3'; c'è una linea scura nella parte SE abbastanza netta, orientata da NE a SW, che sembra staccarne un pezzo.
NGC 6713	gx	18h50m44s	+33°57.6'	q 117	Lyr	16"	discreta / buono	chiazza nebulosa molto tenue e molto piccola, estesa non più di 15" o 20" e che si riesce a vedere grazie al buon seeing; in visione diretta rimane comunque di aspetto quasi stellare — 188x.
NGC 6716	aa	18h54m36s	−19°52.0'	q 340	Sgr	10"	discreta / mediocre	non molto ricco, allungato da E a W e con dimensioni massime di una decina di primi; si contano facilmente 7 o 8 stelle brillanti e una dozzina di altre più deboli.
NGC 6717	ag	18h55m06s	−22°42.0'	q 340	Sgr	16"	m. buona / m. buono	dà a prima vista l'impressione di essere diviso in 3 piccole parti immerse in una piccola chiazza lattescente estesa 45"; in realtà la parte orientale è costituita da un minuscolo piccolo triangolo le cui componenti più brillanti sono una coppia serrata; quella centrale è un'altra coppia ravvicinata, mentre quella occidentale è una stella singola. È situato un paio di primi scarsi a S di Ny2 Sagittarii, una brillante stella rossa di 5ª grandezza — 270x.
NGC 6723	ag	18h59m33s	−36°37.9'	q 378	Sgr	6"	buona / buono	brillante, ma di luminosità pressoché uniforme, con Ø > 3'.
NGC 6732	gx	18h56m24s	+52°22.7'	q 54	Dra	24"	m. buona / discreto	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con piccolo bulge rotondo poco contrastato e un nucleo stellare abbastanza contrastato; c'è una stellina brillante quasi a ridosso N (era osservabile, seppure molto debolmente, anche nel 10" a 178x e in condizioni di cielo simili) — 450x.
NGC 6738	aa	19h01m24s	+11°36.0'	q 206	Aql	16"	ottima / discreto	molto disperso nel quale si contano una decina di stelle brillanti e molte altre più deboli; a 132x ingrandimenti appare molto allungato da N a S, con un'estensione di una 20-ina di primi (anche se è difficile stabilirne i confini); l'oggetto è comunque visibile anche nel cercatore da 50 mm. dove appare di forma rettangolare.
NGC 6740	gx	19h00m50s	+28°46.3'	q 118	Lyr	10"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso di luce; a 178x, in visione distolta, appare grosso modo rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' verso W e un'altra di luminosità simile più o meno alla stessa distanza verso N.
NGC 6741	np	19h02m37s	−00°27.0'	q 251	Aql	24"	m. buona / ottimo	brillante, molto compatta di colore bianco-azzurro e con Ø di una decina di secondi; a tratti sembra di vedere la stellina centrale, ma la luce della planetaria tende a offuscarla; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
NGC 6742	np	18h59m20s	+48°27.9'	q 83	Dra	24"	m. buona / m. buono	bolla circolare di aspetto uniforme con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N; scalando a 340x e utilizzando il filtro O III appaiono vaghe e indistinte ombreggiature all'interno (era debolmente visibile nel 10" a 178x).
NGC 6745	gx	19h01m41s	+40°44.7'	q 83	Lyr	24"	buona / buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; leggermente arcuata con concavità rivolta verso W; c'è una stellina appena percettibile, o un nodulo galattico, all'estremità N (la gx era debolmente visibile anche nel 10" a 178x) — 340x.
NGC 6747	gx	18h55m21s	+72°46.3'	q 31	Dra	16"	m. buona / m. buono	è molto debole e piccola, con un nucleo pressoché puntiforme e un tenuissimo alone di aspetto un po' confuso; a bassi ingrandimenti o in condizioni di scarso seeing potrebbe essere scambiata per una stellina; ce ne sono alcune nei pressi, immediatamente verso E — 270x.
NGC 6749	ag	19h05m15s	+01°54.0'	q 251	Aql	6"	buona / buono	poco esteso, di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare una stellina poco più a sud del bordo meridionale.
NGC 6750	gx	19h00m36s	+59°10.0'	q 54	Dra	24"	m. buona / discreto	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; ci sono due deboli stelline a 1.5' verso S orientate da E a W (era osservabile, molto debolmente, anche nel 10" a 178x e in condizioni di cielo simili) — 450x.
NGC 6751	np	19h05m55s	−05°59.5'	q 296	Aql	24"	m. buona / ottimo	molto bella, sembra una piccola corolla di un fiore; debolmente screziata a 450x ed estesa una 30-ina di secondi; la stella centrale è evidente; c'è una stellina a ridosso E e un'altra appena percettibile a ridosso della parte opposta (l'avevo già osservata nel 10" a 178x, ma la stella centrale appariva solo a momenti).
NGC 6755	aa	19h07m48s	+04°14.0'	q 251	Aql	16"	ottima / discreto	a 132x si contano una 30-ina di stelle su un diametro di 12'-15' che sembrano staccarsi da un fondo finemente screziato; il gruppo è abbellito da alcuni piccoli raggruppamenti e da catene stellari che l'occhio riesce magistralmente a portare in primo piano. Al centro dell'ammasso c'è un piccolo grappolo di 9 o 10 componenti molto serrate che si risolve facilmente a 270x.
NGC 6756	aa	19h08m43s	+04°42.3'	q 251	Aql	16"	ottima / discreto	situato a mezzo grado a NNE di NGC 6755, è molto piccolo e piuttosto debole; a 132x non si contano neppure una decina di componenti; al centro dell'oggetto, un poco spostato verso N, si trova un vero e proprio "grumo" stellare di dimensioni grosso modo 45"×30" e orientato da E a W che si riesce a malapena a risolvere a 380x; un altro grumo, molto più piccolo, si trova a 1.5' verso W e questo è probabilmente costituito da una coppia di stelline al limite della risoluzione.
NGC 6757	gx	19h05m06s	+55°43.0'	q 54	Dra	16"	discreta / scarso	debole, molto allungata all'incirca da E a W, di dimensioni 1.5'×1' e abbastanza netta ai bordi; c'è una stellina a ridosso del bordo occidentale — 188x.
NGC 6759	gx	19h06m57s	+50°20.9'	q 54	Dra	28"	ottima / m. buono	diffusa e debolmente screziata verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una coppia serrata di deboli stelline al bordo meridionale; un'altra coppia di stelline più evidenti si trova a 1' SE — 495x.
NGC 6760	ag	19h11m12s	+01°01.8'	q 251	Aql	10"	discreta / discreto	molto stemperato ai bordi, con Ø di 4' e marcata condensazione centrale.
NGC 6762	gx	19h05m37s	+63°56.0'	q 31	Dra	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N W a SE, di dimensioni 60"×20". con piccolo bulge diffuso poco contrastato e un nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina a ridosso SE e una più brillante subito a NW (era osservabile molto debolmente nel 10" a 178x, ma era di aspetto confuso) — 450x.
NGC 6764	gx	19h08m17s	+50°56.0'	q 54	Cyg	24"	m. buona / discreto	diffusa, con basso gradiente di luce, orientata da E a W con dimensioni 90"×60" e con nucleo stellare; due stelline sono presenti a ridosso del nucleo verso S: quella più meridionale sembra lambire l'alone della gx, mentre l'altra appare leggermente sfuocata (di fatto è una doppia molto serrata, ma evidentemente, a causa del seeing non perfetto, non sono riuscito a sdoppiarla. La galassia era debolmente visibile anche nel 10" a 178x; le due stelline summenzionate apparivano come "minute frammentazioni del nucleo") — 450x.
NGC 6765	np	19h11m07s	+30°32.6'	q 118	Lyr	10"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; a 118x appare stranamente più evidente senza filtro O III; è immersa in un campo molto ricco.
NGC 6772	np	19h14m36s	−02°42.5'	q 251	Aql	24"	m. buona / ottimo	è una bolla circolare di luminosità uniforme, poco diffusa e con Ø > 1'; c'è una stellina appena percettibile al bordo orientale e un'altra poco più brillante quasi a ridosso sempre verso E — 450x.
NGC 6774	aa	19h16m36s	−16°16.0'	q 296	Sgr	10"	buona / m. buono	gruppo esteso e disperso di oltre 50 stelle di luminosità assai diseguale, sparse su una superficie estesa una 20-ina di primi, le più brillanti delle quali sono già visibili nel cercatore.
NGC 6778	np	19h18m25s	−01°35.8'	q 251	Aql	24"	m. buona / ottimo	brillante e compatta, presenta una zona interna vagamente rettangolare, di dimensioni 30"×20" e 2 deboli anse disposte simmetricamente sui lati maggiori (assomiglia, con un po' di fantasia, a una piccola M76) — 450x.
NGC 6781	np	19h18m28s	+06°32.2'	q 206	Aql	10"	m. buona / buono	estesa un paio di primi, di luminosità uniforme e di aspetto un po' irregolare; molto sfumata verso la parte settentrionale; non ho visto la stellina centrale.
NGC 6783	gx	19h16m47s	+46°01.1'	q 83	Cyg	16"	m. buona / ottimo	piccola chiazza pressoché circolare con Ø di una 30-ina di secondi, molto debole, poco più brillante all'interno; è immersa in un campo molto ricco; c'è una stellina quasi a ridosso verso E e un'altra a NW; quella a E è poco più vicina alla galassia — 380x.
NGC 6786	gx	19h10m54s	+73°24.6'	q 13	Dra	24"	buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, di aspetto a tratti un po' irregolare, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; un tenuissimo baffo aggetta verso E, ma è osservabile solo a momenti — 450x.
NGC 6787	gx	19h16m10s	+60°25.0'	q 54	Dra	16"	m. buona / mediocre	identificabile con relativa facilità; è pressoché circolare, con Ø di ~ 1', gradiente di luce molto basso e poco definita ai bordi; c'è una stellina a ridosso verso WNW — 270x.
NGC 6789	gx	19h16m42s	+63°58.4'	q 31	Dra	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 1' scarso e basso gradiente di luce; presenta un bulge poco contrastato allungata da E a W ed esteso una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a E e una brillante a N (era visibile molto debolmente nel 10" a 178x, ma solo la zona più interna) — 450x.
NGC 6790	np	19h22m57s	+01°30.7'	q 251	Aql	24"	m. buona / ottimo	è molto brillante, ma rimane di aspetto stellare anche a 450x (probabilmente non è più estesa di pochi secondi); solo a 570x sembra perdere la puntiformità, anche se su soggetti così luminosi è difficile stabilirlo; ad ogni modo può essere utile il confronto con la stella di 12-esima situata una 30-ina di secondi a W; a mezzo primo scarso NNE si nota una stellina appena percettibile.
NGC 6791	aa	19h20m54s	+37°46.1'	q 118	Lyr	6"	m. buona / m. buono	è una debole chiazza lattescente grosso modo rotonda con Ø di ~ 8' e di luminosità pressoché uniforme — 30x.
NGC 6792	gx	19h20m57s	+43°08.0'	q 83	Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 90"×45", con bulge esteso e abbastanza contrastato; c'è una stellina quasi a ridosso NNW; più interessante scalando a 340x (appariva molto debolmente nel 10").
NGC 6793	aa	19h23m13s	+22°08.9'	q 161	Vul	10"	discreta / mediocre	gruppo alquanto disperso di una ventina di stelle racchiuse in un'area di ca. 12'×20' orientata da N a S.
NGC 6796	gx	19h21m31s	+61°08.7'	q 31	Dra	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30", poco diffusa alle estremità N e S e di luminosità pressoché uniforme; meglio contrastata scalando a 340x (era debolmente osservabile nel 10" 178x).
NGC 6798	gx	19h24m03s	+53°37.5'	q 54	Cyg	16"	discreta / scarso	è allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×40", con bulge estesa poco più brillante del disco; c'è una stellina appena percettibile all'estremità SE — 188x.
NGC 6800	aa	19h26m59s	+25°05.0'	q 161	Vul	16"	buona / ottimo	si vede già nel cercatore 10x50 — è un gruppo disperso di una 50-ina di stelle con basso range di luminosità; sembra leggermente ovale, con dimensioni 40'×30' e orientato da N a S — 100x.
NGC 6801	gx	19h27m36s	+54°22.4'	q 54	Cyg	16"	discreta / scarso	debole, allungata all'incirca da NE a SW, di dimensioni 60"×30", molto diffusa e con gradiente di luce molto basso; è poco più luminosa verso N — 188x.
NGC 6802	aa	19h30m35s	+20°15.8'	q 162	Vul	10"	buona / buono	molto debole, di forma grosso modo rettangolare e orientato da N a S, solo parzialmente risolto a 126x.
NGC 6803	np	19h31m17s	+10°03.3'	q 207	Aql	16"	m. buona / ottimo	appare come un dischetto brillante, compatto con Ø di ~ 5" — 380x.
NGC 6804	np	19h31m35s	+09°13.5'	q 207	Aql	16"	m. buona / ottimo	bolla circolare, diafana del Ø di 1'; presenta alcune stelline a ridosso; una abbastanza brillante a NE e due appena percettibili a W — 380x.
NGC 6807	np	19h34m34s	+05°41.0'	q 207	Aql	24"	m. buona / ottimo	rimane stellare anche a 570x; senza filtro O III sarebbe impossibile riconoscerla nel campo oculare.
NGC 6811	aa	19h37m13s	+46°21.8'	q 84	Cyg	6"	m. buona / m. buono	relativamente facile, rotondeggiante, si contano oltre 30 stelle a 63x; già osservabile nel cercatore 6x30.
NGC 6813	neb	19h40m22s	+27°18.6'	q 162	Vul	24"	m. buona / buono	piccola nebulosa brillante, approssim. rotonda con Ø di 1' con una stellina al centro; a 210x col filtro O III arriva ad avviluppare le 2 stelline poste rispettivamente a N e NW; a 400x senza filtro appare più debole, ma in compenso salta fuori la compagna molto debole della stella centrale situatale a ridosso verso E.
NGC 6814	gx	19h42m41s	−10°19.4'	q 297	Aql	24"	m. buona / discreto	presenta un brillante nucleo stellare circonfuso da un alone circolare con Ø di un paio di primi; poco meglio contrastata scalando a 340x; alcune lievi discrepanze di luce appaiono all'interno del disco; c'è una stellina molto debole una 30-ina di secondi a W del nucleo; una stellina brillante si trova a ridosso della galassia verso NW, mentre a una distanza poco maggiore verso NE si trova una coppia di deboli stelline della stessa luminosità distanti una 20-ina di secondi (osservabile molto debolmente anche nel 10" a 178x).
NGC 6815	aa	19h41m00s	+26°42.0'	q 162	Vul	6"	discreta / perfetto	è un piccolo gruppo povero e disperso di stelle deboli di forma vagamente triangolare e che si stacca dal fondo cielo solo in visione laterale (non è riportato sul Megastar).
NGC 6817	gx	19h37m23s	+62°23.0'	q 31	Dra	16"	m. buona / mediocre	debole, orientata da ENE a WSW, di dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; ci sono due stelline a ridosso lungo l'asse maggiore della galassia — 270x.
NGC 6818	np	19h43m58s	−14°09.2'	q 297	Sgr	24"	m. buona / ottimo	brillante e compatta, ma di aspetto abbastanza uniforme anche a 450x, solo debolmente screziata e con Ø di 45"; non si riesce a vedere la stella centrale; situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele ottusangolo formato con 3 deboli stelline (era facilmente visibile anche nel Comet-Tracker a 86x).
NGC 6819	aa	19h41m16s	+40°11.5'	q 84	Cyg	10"	buona / mediocre	bello, luminoso, relativamente compatto, poco allungato da N a S con dimensioni 5'×4'; visibile senza difficoltà nel cercatore; la disposizione delle stelle principali ricorda, a prima vista una .. molletta per biancheria; più interessante a 63x.
NGC 6820	neb	19h43m23s	+23°16.0'	q 162	Vul	24"	m. buona / buono	è un elusivo chiarore che si nota a mala pena a S e soprattutto a E dell'ammasso NGC 6823, ma occorre utilizzare il filtro deepsky e non superare i 110x a causa della notevole estensione; una piccola zona di maggior contrasto si avverte subito a SW del triangolo situato all'interno dell'ammasso summenzionato.
NGC 6821	gx	19h44m24s	−06°50.1'	q 297	Aql	10"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 45"; è visibile abbastanza chiaramente in visione distolta a 178x in un campo relativamente ricco.
NGC 6822	gx	19h44m56s	−14°48.2'	q 297	Sgr	24"	m. buona / ottimo	**galassia di Barnard** — molto estesa e alquanto difficile da vedere, se non altro per la grande quantità di stelline sovrapposte; a 200x appare già sin troppo spampanata, mentre a 110x il fondo cielo è troppo chiaro; ho ottenuto il contrasto migliore a 110x con filtro deepsky in modo da ridurre la luminanza del fondo; anche così, tuttavia, si riesce solo a vedere la parte centrale che è molto allungata da N a S con dimensioni di circa 8'×3'; in pratica arriva a lambire le due piccole regioni H II distanti 3' in direzione E-W e situate all'estremità settentrionale della gx: quella a E è denominata IC 1308 (v. sezione delle nebulose).
NGC 6823	aa	19h43m12s	+23°18.0'	q 162	Vul	24"	m. buona / buono	gruppo disperso e molto irregolare di stelle abbastanza brillanti con ampio range di luminosità; al centro si nota una sorta di triangolo quasi rettangolo al cui vertice retto ci sono 4 stelline molto ravvicinate — 210x.
NGC 6824	gx	19h43m41s	+56°06.6'	q 55	Cyg	16"	buona / m. buono	diffusa, con evidente condensazione centrale, di aspetto un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø > di 1' e un nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina facilmente visibile a ridosso verso S — 380x.
NGC 6825	gx	19h41m55s	+64°04.4'	q 31	Dra	16"	m. buona / mediocre	debole, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e basso gradiente di luce; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 270x.
NGC 6826	np	19h44m48s	+50°31.5'	q 55	Cyg	24"	m. buona / ottimo	stupenda! Perfettamente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, finemente screziata e con una stellina centrale brillante; sembra a prima vista la corolla di un fiore. In visione distolta si nota abbastanza chiaramente un tenue alone che porta il Ø totale della planetaria a ~ 1' — 450x (a ingrandimenti inferiori appare di una tonalità più azzurrina).
NGC 6827	aa	19h48m54s	+21°13.0'	q 162	Vul	10"	discreta / buono	nella zona è visibile un gruppo molto disperso praticamente indistinguibile dalle stelle di campo se non fosse per 2 filari leggermente divergenti che si dipartono verso S; è più interessante a 63x.
NGC 6829	gx	19h47m07s	+59°54.4'	q 55	Dra	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme e molto allungata da NE a SW; in visione distolta appare di dimensioni 90"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso del bordo meridionale — 380x.
NGC 6830	aa	19h51m00s	+23°03.8'	q 162	Sge	24"	m. buona / buono	è un bell'ammasso di stelle non particolarmente brillanti e di aspetto curioso a 110x: si notano infatti 3 filari irregolari che paiono disposti secondo una "N" o una "Z" (a seconda dell'orientamento del campo); alcune componenti più luminose si trovano a E di questa.
NGC 6831	gx	19h47m57s	+59°53.5'	q 55	Dra	16"	buona / m. buono	situata 6' a E della 6829 è molto diffusa, ma facilmente visibile in visione distolta, rotonda con Ø di ~ 1' e una piccola condensazione centrale evidente — 380x.
NGC 6833	np	19h49m47s	+48°57.6'	q 84	Cyg	10"	buona / buono	piccola e debole, appare poco più di una stellina sfocata a 178x; una stellina appena percepibile si trova al bordo S e questo può creare un po' di confusione sulle dimensioni se la si osserva a bassi ingrandimenti.
NGC 6834	aa	19h52m12s	+29°25.0'	q 119	Vul	10"	buona / buono	facile, disperso, molto allungato all'incirca da E a W, di dimensioni grosso modo 6'×3' e con una stella relativamente brillante proprio al centro; posti simmetricamente a N e a S si notano altri 2 piccoli raggruppamenti molto serrati di stelline deboli che sarebbe interessante sapere se appartengono o meno all'ammasso.
NGC 6835	gx	19h54m33s	−12°34.1'	q 297	Sgr	10"	m. buona / buono	debole, molto allungata da ENE a WSW per un paio di primi, con bulge poco più luminoso del disco; c'è una stellina quasi a ridosso del margine E — 178x.
NGC 6836	gx	19h54m40s	−12°41.3'	q 297	Sgr	10"	m. buona / buono	debolissima e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di ~ 1' e di luminosità uniforme, osservabile in visione distolta a 178x; è immersa in un campo molto ricco di stelle che disturbano un poco l'osservazione.
NGC 6837	aa	19h53m24s	+11°41.0'		Aql	16"	discreta / buono	è un gruppo disperso di stelle esteso 3' o 4' nel quale, a 132x si contano una dozzina di componenti, ma si stacca un po' a fatica dal background (non riportato sull'Uranometria) — 450x.
NGC 6840	aa	19h55m16s	+12°07.5'		Aql	16"	discreta / buono	gruppo piuttosto disperso nel quale a 132x si contano una 20-ina di stelle di luminosità abbastanza simile (fatta eccezione per una situata all'estremità occidentale che forse non ne fa parte (non riportato sull'Uranometria) — 450x.
NGC 6842	np	19h55m02s	+29°17.3'	q 119	Vul	10"	buona / buono	oggetto elusivo che mi ha fatto fallire i primi tentativi di ricerca nel corso della nottata; l'ho scorto in visione distolta a 178x: è situato a circa metà strada del lato orientale (tra i 2 uguali) di un triangolo isoscele di stelle di dimensioni pari a 8' e col vertice più acuto rivolto verso N.
NGC 6843	aa	19h56h06s	+12°09.0'		Aql	16"	discreta / buono	situato 12' e E di NGC 6840 è più povero e tende a confondersi col background ricco di stelline; si contano si è no una 15-ina di componenti a 132x; spicca una stringa di 6 stelline all'estremità meridionale (non riportato sull'Uranometria).
NGC 6846	aa	19h56m28s	+32°20.9'		Cyg	24"	buona / buono	molto piccolo e relativamente debole, non più esteso di 45", solo parzialmente risolto ad alti ingrandimenti: a 570x di contano 4 stelline poste a "Y" più una quinta appena percettibile a W, ma che forse si trova all'esterno dell'ammasso (non riportato sull'Uranometria) — 450x.
NGC 6852	np	20h00m39s	+01°43.7'	q 253	Aql	24"	m. buona / ottimo	presenta un anello rotondo, evidente, con Ø di una 30-ina di secondi all'interno del quale si notano 2 noduli, o rinforzi luminosi, a NW e SE; c'è una coppi di stelline distanti una 20-ina di secondi a W e un'altra stellina più debole a ridosso verso SE — 450x.
NGC 6856	aa	19h59m16s	+56°08.0'		Cyg	28"	buona / ottimo	piccolo gruppo di una 15-ina di componenti esteso ~ 3'; 3 stelline situate poco a E del centro sono abbastanza brillanti *(non è riportato sull'Uranometria)* — 495x.
NGC 6857	neb	20h01m49s	+33°31.5'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	facile e relativamente brillante, grosso modo rotonda con Ø < 30"; appare come "incastrata" in una piccola losanga di 4 stelline; queste si notano facilmente a 400x senza filtri: la più brillante si trova a ridosso verso SW, mentre dalla parte opposta ce n'è una più debole; le altre 2 si trovano rispettivamente ai bordi NW e SE (quella a NW è più luminosa), ma queste ultime tendono a confondersi con la nebulosa se la si osserva a 200x col filtro O III.
NGC 6865	gx	20h05m56s	−09°02.5'	q 298	Aql	16"	buona / buono	debole, con nucleo puntiforme visibile a tratti; è poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30"; c'è una stellina molto debole a poche decine di secondi verso E — 188x.
NGC 6866	aa	20h03m55s	+44°09.6'	q 84	Cyg	10"	buona / buono	oggetto molto facile, già individuabile nel cercatore da 50 mm: a 63x si notano subito una dozzina di stelle brillanti sparse, su un'area estesa 5' o 6' che ricordano una piastra di ferro da stiro con la punta rivolta verso SE.
NGC 6869	gx	20h00m43s	+66°13.7'	q 32	Dra	24"	m. buona / discreto	molto facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina molto debole a ridosso SW e un'altra appena percettibile solo a momenti dalla parte opposta (era visibile senza problemi nel 10" a 118x e in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
NGC 6871	aa	20h05m54s	+35°46.0'	q 119	Cyg	24"	buona / buono	gruppo molto disperso e poco interessante anche scalando a 110x; sono presenti una decina di stelle molto brillanti: di queste 6 sono poste ad arco con la concavità rivolta verso W; le 4 più centrali dell'ammasso sono disposte in 2 coppie abbastanza strette.
NGC 6879	np	20h10m27s	+16°55.3'	q 208	Sge	24"	m. buona / ottimo	brillante, ma rimane di aspetto stellare anche a 580x; c'è una stellina molto debole a ridosso verso N (era debolmente visibile anche nel 10" a 188x) — 450x.
NGC 6881	np	20h10m52s	+37°24.7'	q 119	Cyg	10"	buona / buono	piuttosto debole e di aspetto stellare anche a 178x; è necessario il filtro O III per evidenziarla dalle stelle di campo circostanti.
NGC 6882	aa	20h12m00s	+26°29.0'		Vul	10"	discreta / buono	a 178x si contano quasi un centinaio di stelle disperse su un'area di 15' di Ø; è dominato, esattamente al centro, dalla 20 Vul di 6ª grandezza. Altresì denominato NGC 6885: quest'ultimo è erroneamente riportato dall'Uranometria (q 163) come una propaggine SE dell'ammasso.
NGC 6883	aa	20h11m18s	+35°51.0'	q 119	Cyg	24"	buona / buono	è un oggetto che non si nota sul fondo cielo, neppure scalando a 110x; ciò che salta all'occhio è un piccolo asterismo di 5 stelline brillanti foggiate a "Y" la cui estremità SW è una doppia stretta; un vago addensamento stellare si trova subito a W, ma questo è probabilmente esterno all'ammasso; qui ci sono 4 stelline allineate da N a S: quella più meridionale è una doppia con la principale bianca; subito a N ce n'è una più brillante gialla, mentre quella più a N è arancione.
NGC 6884	np	20h10m24s	+46°27.6'	q 84	Cyg	10"	buona / buono	poco più grande di NGC 6881, appare come una tipica immagine stellare nelle notti di turbolenza; diviene particolarmente brillante e di un marcato colore verdastro col filtro O III.
NGC 6886	np	20h12m43s	+19°59.3'	q 163	Sge	24"	m. buona / ottimo	brillante, di una tinta azzurrognola; è di aspetto stellare a 340x, diviene più evidente a 450x, ma solo a 580x appare chiaramente un minuscolo dischetto con Ø di 5" o 6" (era facilmente visibile nel 10" a 188x) — 450x.
NGC 6888	neb	20h12m01s	+38°23.0'	q 119	Cyg	24"	buona / buono	**Crescent Nebula** — molto bella e abbastanza ricca di dettagli se osservata a 110x con O III; debole e assai stemperata sul fondo cielo senza filtro, anche perché aumenta sensibilmente il numero delle stelle di campo visibili che interferiscono con l'osservazione (col filtro era comunque osservabile abbastanza facilmente anche nel 10"). Il disegno effettuato riporta solo le stelle principali su un campo poco superiore ai 20'.
NGC 6891	np	20h15m09s	+12°42.2'	q 208	Del	24"	m. buona / ottimo	molto brillante, debolmente screziata nella parte più esterna, perfettamente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la stella centrale è evidente; c'è una stellina a ridosso verso NE 570x.
NGC 6894	np	20h16m24s	+30°33.8'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	appare ben contrastata a 200x con l'O III, con 2 evidenti rinforzi si luce sull'anello a NW e a SE; non si nota la stellina centrale, anche rimuovendo il filtro; a 400x, sempre senza filtro, è più diffusa e di gradiente di luce inferiore, ma l'immagine è poco più dettagliata e mostra, a momenti, deboli screziature lungo l'anello (era debolmente visibile anche nel 10" a 178x).
NGC 6897	gx	20h21m01s	−12°15.3'	q 298	Cap	16"	buona / buono	è una debole galassietta approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale puntiforme molto tenue visibile a momenti; è situata a 1' NE di una stellina brillante — 188x.
NGC 6898	gx	20h21m08s	−12°21.5'	q 298	Cap	16"	buona / buono	più luminosa di NGC 6897, compatta, gradatamente più brillante verso l'interno e di dimensioni un poco maggiori; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso S — 188x.
NGC 6900	gx	20h21m35s	−02°34.2'	q 253	Aql	16"	m. buona / ottimo	debole chiazza approssim. circolare con Ø di 45", bassa luminanza superficiale e di luminosità uniforme; si vede abbastanza facilmente a 270x, ma resta comunque priva di strutture anche a 380x.
NGC 6901	gx	20h22m21s	+06°25.8'	q 208	Aql	16"	ottima / buono	debole, ma facilmente visibile anche in visione diretta; è diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da ENE a WSW con dimensioni 80"×40" — 270x.

NGC 6903	gx	20h23m45s	−19°19.5'	q 343	Cap	16"	discreta / buono	abbastanza luminosa, ma molto disturbata da una stella brillante sovrapposta; una condensazione centrale è visibile a ridosso di questa stella verso S; l'alone si stempera velocemente sul fondo cielo ed è quindi difficile valutarne le dimensioni; probabilmente ha un Ø di oltre 2' — 188x.
NGC 6905	np	20h22m23s	+20°06.3'	q 163	Del	24"	m. buona / ottimo	molto bella, debolmente screziata a 450x, leggermente ovale con dimensioni 50"×40", sfumata alle estremità N e S; qui, a 340x con filtro O III appaiono due tenuissime anse molto diffuse; la stellina centrale è debole, ma ben visibile; la planetaria è praticamente situata sul lato occidentale di un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti (era debolmente visibile anche nel 10" a 188x) — 450x.
NGC 6906	gx	20h23m34s	+06°26.6'	q 208	Aql	16"	ottima / buono	abbastanza brillante, molto diffusa, con bulge evidente, allungata da NW a SW con dimensioni 80"×50"; c'è una stellina a 1' verso NE — 270x.
NGC 6907	gx	20h25m07s	−24°48.5'	q 343	Cap	10"	buona / buono	debole chiazza di forma e luminosità un po' irregolari, grosso modo rotonda con Ø di un paio di primi; c'è una stellina brillante a 2.5' verso E .
NGC 6910	aa	20h23m06s	+40°47.0'	q 84	Cyg	10"	m. buona / m. buono	situato mezzo grado NNE di γ Cyg — oggetto piuttosto disperso e con poche stelle; se ne contano una decina disposte come una stella a 3 punte (o una Y), di cui un paio di 7ª grandezza. Visualmente non appare più esteso di 5'.
NGC 6911	gx	20h19m39s	+66°43.7'	q 32	Dra	16"	scarsa / buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; situata ~ 1.5' NE di una stellina brillante — 270x.
NGC 6912	gx	20h26m52s	−18°37.0'	q 343	Cap	16"	discreta / buono	molto debole, di luminosità uniforme, estesa max 1', facilmente visibile in visione distolta; c'è una stellina doppia a ~ 1' NNE con componenti separate da ~ 30" in direzione N-S — 188x.
NGC 6915	gx	20h27m46s	−03°04.6'	q 253	Aql	16"	discreta / scarso	relativamente brillante, poco diffusa e poco più brillante all'interno, approssim. circolare con Ø di 1'; c'è una stellina a 1.5' verso S — 188x.
NGC 6916	gx	20h23m33s	+58°20.6'	q 55	Cyg	16"	buona / m. buono	è un debole lucore molto diffuso esteso per max 1' che si estende a E di una stellina; in visione diretta la gx virtualmente scompare, perché lo sguardo viene automaticamente catturato dal questa stellina; in visione distolta è invece un oggetto quasi facile — 380x.
NGC 6917	gx	20h27m48s	+08°05.9'	q 208	Del	16"	ottima / buono	diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina evidente a ridosso verso S — 270x.
NGC 6921	gx	20h28m29s	+25°43.4'	q 163	Vul	24"	m. buona / ottimo	facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo meridionale; un piccolo e debolissimo oggetto diffuso si trova invece a ridosso verso E, ma da un controllo successivamente effettuato è risultato essere una doppia irrisolta — 450x.
NGC 6922	gx	20h29m53s	−02°11.5'	q 253	Aql	16"	discreta / scarso	piccola galassietta molto debole estesa non più di 30" e situato 7' S di una stellina brillante — 188x.
NGC 6923	gx	20h31m39s	−30°49.9'	q 381	Mic	10"	buona / buono	molto debole, osservabile in visione distolta a 178x, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni ~ 1.5'×1'; c'è una stellina brillante quasi a ridosso del bordo settentrionale.
NGC 6925	gx	20h34m20s	−31°58.8'	q 381	Mic	10"	buona / buono	molto debole ed estesa, molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 3'×1', ma non è facile valutarne le dimensioni, perché anche a 118x tende a stemperarsi molto sul fondo cielo (è situata a quasi -32° di declinazione); ci dovrebbero essere alcune stelline sovrapposte.
NGC 6926	gx	20h33m06s	−02°01.6'	q 254	Aql	16"	mediocre / ottimo	debole, di luminosità uniforme, molto stemperata sul fondo cielo, allungata da N a S con dimensioni 1.5'×1' — 270x.
NGC 6927	gx	20h32m38s	+09°55.0'	q 209	Del	24"	ottima / buono	fa parte di un terzetto assieme a NGC 6928 ed NGC 6930 — molto debole, piccola e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni max di 30"×20" — 450x.
NGC 6927A	gx	20h32m37s	+09°53.0'	q 209	Del	24"	ottima / buono	debolissima, appare a momenti in visione distolta a ridosso N di una debole stellina, ma rimane di aspetto stellare anche a 450x.
NGC 6928	gx	20h32m50s	+09°55.6'	q 209	Del	24"	ottima / buono	fa parte del terzetto di NGC 6927 — molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30", con bulge diffuso e contrastato sul disco; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
NGC 6929	gx	20h33m22s	−02°02.2'	q 254	Aql	16"	mediocre / ottimo	situata 4' E di NGC 6926 è molto piccola, circolare, con Ø non superiore a 30" e con nucleo quasi stellare; è allineata con 2 stelline molto deboli situate a E; la gx e le stelline sono equidistanti — 270x.
NGC 6930	gx	20h32m59s	+09°52.3'	q 209	Del	24"	ottima / buono	fa parte del terzetto di NGC 6927 — diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è la MAC 2032+0952 a ridosso N con la quale la gx a prima vista sembra unirsi — 450x.
NGC 6931	gx	20h33m41s	−11°22.1'	q 299	Cap	16"	buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni di 60"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di SW — 188x.
NGC 6934	ag	20h34m12s	+07°24.2'	q 209	Del	24"	buona / buono	bello, di aspetto molto regolare, quasi totalmente risolto a 400x e con Ø valutabile tra 2' e 2.5'; le stelline sono a basso range di luminosità: tra queste ne spicca una poco più evidente verso NE; una stellina brillante si trova subito a W dell'ammasso.
NGC 6939	aa	20h31m32s	+60°39.2'	q 56	Cep	24"	m. buona / ottimo	a 340x pare come una "esplosione" stellare, anche se non particolarmente vistosa delimitato a W da due stelle brillanti orientate da N a S e a E da una doppia abbastanza stretta e sbilanciata; 3 allineamenti, come se fossero le dita centrali di una mano, si notano verso la parte occidentale dell'ammasso.
NGC 6940	aa	20h34m36s	+28°19.0'	q 120	Vul	6"	m. buona / buono	molto ricco, vasto e luminoso, con stelline di luminosità abbastanza uniforme.
NGC 6941	gx	20h36m23s	−04°37.1'	q 254	Aql	16"	mediocre / ottimo	è una galassia molto debole e diffusa, con gradiente di luce molto basso di luce, forse rotonda con Ø di 1' o poco più; poco meglio contrastata scalando a 188x; alcune stelline appena percettibili, si stagliano su di essa — 270x.
NGC 6944	gx	20h38m24s	+06°59.8'	q 209	Del	16"	ottima / buono	relativamente facile, con bulge evidente, leggermente allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 6944A	gx	20h38m1s	+06°54.1'	q 209	Del	16"	ottima / buono	molto debole, rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme; fissandola in visione diretta tende a sparire — 270x.
NGC 6945	gx	20h39m01s	−04°58.4'	q 254	Aqr	16"	discreta / scarso	molto diffusa, con gradiente di luce molto basso di luce e di aspetto non definito, di dimensioni superiori a 1'; si trova 3' SW della brillante SAO 144663 arancione di magnitudo 6.5 — 188x.
NGC 6946	gx	20h34m52s	+60°09.3'	q 56	Cyg	24"	m. buona / m. buono	è una chiazza molto diffusa ed estesa, orientata da E a W con dimensioni che in visione distolta arrivano a 8'×5'; nonostante la sua fama presenta tuttavia pochi dettagli superficiali, anche perché è immersa in un campo molto ricco di stelle anche brillanti che ne confondono un po' la struttura; ad ogni modo è ben visibile un piccolo nucleo quasi stellare e un braccio abbastanza vistoso che si estende sino a una stella situata all'estremità orientale della gx; un nodulo molto diffuso ed evidente si trova dalla parte opposta, a circa 3' WSW del nucleo; questi particolari appaiono poco meglio contrastati scalando a 340x e utilizzando un filtro deepsky; con questo la gx mostra la forma di una "S" irregolare, ma con l'ansa occidentale interrotta (la stellina di 16.3 riportata sulla storica cartina del Thompson è appena percettibile a 450x).
NGC 6949	gx	20h35m07s	+64°48.2'	q 32	Cep	16"	buona / ottimo	debole, molto stemperata, sul fondo cielo, leggermente ovale con dimensioni ~ 60"×45", orientata da E a W e con tenue condensazione centrale; c'è un campo ricco di stelline — 380x.
NGC 6950	aa	20h41m10s	+16°39.0'		Vul	24"	m. buona / ottimo	gruppo disperso ed eterogeneo di stelle che, anche scalando a 210x, si fatica un po' a discernere dal ricco background; le componenti più brillanti si trova proprio al centro; visibile come una debole macchia leggermente granulata nel cercatore 12x60 (non riportato sulla Uranometria) — 450x.
NGC 6951	gx	20h37m14s	+66°06.3'	q 32	Cep	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, orientata da E a W con dimensioni di 2'×1'; presenta un bulge brillante di 30"×20" con all'interno un nucleo stellare; c'è una stellina brillante a ridosso verso E e una debole al bordo NW (debolmente visibile anche nel 10") — 450x.
NGC 6954	gx	20h44m03s	+03°12.6'	q 254	Del	16"	mediocre / ottimo	piccola, orientata da ENE a WSW, di dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso NE — 270x.
NGC 6955	gx	20h44m18s	+02°35.7'	q 254	Del	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø max di 40" — 380x.
NGC 6956	gx	20h43m54s	+12°30.7'	q 209	Del	16"	ottima / buono	facile, ma di aspetto un po' irregolare, allungata ~ da N a S, di dimensioni 60"×40", diffusa e con tenue condensazione centrale; è disturbata dalla luce di una stellina brillante situata a ridosso verso E; un'altra stellina più debole si trova un poco più a E; in visione distolta queste stelline appaiono avviluppate nell'alone della galassia — 270x.
NGC 6957	gx	20h44m48s	+02°34.9'	q 254	Del	16"	m. buona / ottimo	di dimensioni e luminosità simili, ma forse ancora più debole (a meno che non vi sia una piccola caduta di contrasto causata da una stellina brillante situata 1.5' SE); presenta una debole condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
NGC 6959	gx	20h47m07s	+00°25.8'	q 254	Aqr	24"	m. buona / m. buono	fa parte del gruppo di NGC 6962 — relativamente compatta, poco più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni di 40"×20"; forma una coppia ravvicinata con MAC 2047+0026 situata 1' a WSW (v. voce corrispondente) — 450x.
NGC 6960	neb	20h45m54s	+30°43.0'	q 120	Cyg	6"	discreta / perfetto	parte della Cirrus Nebula — è molto disturbata dalla 52 Cygni, di 4ª grandezza, situata praticamente a metà strada; in visione distolta si osserva agevolmente solo la parte più appuntita situata a N della stella sunnominata.
NGC 6961	gx	20h47m10s	+00°21.8'	q 254	Aqr	24"	m. buona / m. buono	fa parte del gruppo di NGC 6962 — rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
NGC 6962	gx	20h47m19s	+00°19.3'	q 254	Aqr	24"	m. buona / m. buono	è la più luminosa ed estesa di un piccolo gruppo che comprende NGC 6959, -61, -64, -65 e -67 — presenta un bulge rotondo e brillante, esteso una 30-ina di secondi con all'interno un nucleo stellare, il tutto circonfuso da un alone molto tenue orientato da E a W con dimensioni 3'×2' (lo si può stimare facilmente dalle due stelline situate a E e a W della gx e che sembrano delimitarla; tuttavia è meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 6964	gx	20h47m24s	+00°18.0'	q 254	Aqr	24"	m. buona / m. buono	fa parte del gruppo di NGC 6962 — molto più debole di questa, con piccolo bulge contrastato, allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
NGC 6965	gx	20h47m20s	+00°29.0'	q 254	Aqr	24"	m. buona / m. buono	fa parte del gruppo di NGC 6962 — rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con condensazione centrale evidente — 450x.
NGC 6967	gx	20h47m34s	+00°24.7'	q 254	Aqr	24"	m. buona / m. buono	fa parte del gruppo di NGC 6962 — allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", diffusa alle estremità dell'asse maggiore, con bulge contrastato e nucleo stellare; c'è una stellina brillante di 10ª a ridosso verso E — 450x.
NGC 6968	gx	20h48m32s	−08°21.6'	q 299	Aqr	16"	buona / buono	compatta, con alto gradiente di luce, nucleo puntiforme, poco allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina brillante al margine settentrionale — 188x.
NGC 6969	gx	20h48m28s	+07°44.3'	q 209	Del	16"	ottima / buono	piccola e compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con condensazione centrale evidente di aspetto stellare — 270x.
NGC 6971	gx	20h49m24s	+05°59.7'	q 209	Del	16"	buona / buono	debole bolla circolare con Ø di 45", diffusa e di luminosità pressoché uniforme; si vede abbastanza facilmente a 270x, ma è meglio impiegarne 380x per tenere fuori campo una brillante stella di 7ª situata 7' NW.
NGC 6972	gx	20h49m59s	+09°54.0'	q 209	Del	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×25" e con condensazione centrale molto evidente; è situata all'interno di un asterismo di forma vagamente circolare, con 2 "peduncoli" che si propagano verso W, formato da una decina di stelline abbastanza brillanti — 450x.
NGC 6974	neb	20h51m08s	+31°51.0'	q 120	Cyg	10"	non registrati	è un nodulo di luminosità della **Cirrus Nebula** situato a una 15-ina di primi SSE di NGC 6979, più evidente di quest'ultima pur restando un oggetto molto debole; è meglio visibile con l'O III, se non altro per smorzare la luce delle stelline di campo in cui è immersa la nebulosa.
NGC 6975	gx	20h52m13s	−05°47.9'	q 299	Aqr	16"	m. buona / ottimo	debolissima ed elusiva, appare solo a momenti anche a 380x, come una piccola chiazza di luce estesa sì e no una 40-ina di secondi, ma bisogna alternare frequentemente gli occhi.
NGC 6976	gx	20h52m26s	−05°46.3'	q 299	Aqr	16"	buona / buono	assieme a NGC 6977 e 6978 costituisce un terzetto di galassie allineate da NE a SW — molto debole, di forma indistinta e luminosità uniforme, visibile con una certa facilità solo in visione distolta; è estesa probabilmente 1' — 188x.
NGC 6977	gx	20h52m30s	−05°44.7'	q 299	Aqr	16"	buona / buono	è situata un paio di primi a NE della precedente ed è più brillante, approssim. circolare con Ø di ~ 1' e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 6978	gx	20h52m35s	−05°42.6'	q 299	Aqr	16"	buona / buono	è la più facile del terzetto, allungata da NE a SW, con dimensioni 2'×1'; presenta un nucleo ben visibile e nettamente più brillante dell'alone — 188x.
NGC 6979	neb	20h50m50s	+31°58.0'	q 120	Cyg	16"	m. buona / buono	è una delle componenti più deboli della **Cirrus Nebula**; quella parte adiacente lunga e sfilacciata situata a SW, orientata da N a S ed estesa una 20-ina di primi di cui l'Uranometria non riporta alcun numero è stranamente più brillante, specialmente verso N e risalta più facilmente dal fondo cielo usando il filtro O III; questa parte è nota come **Triangolo di Pickering**. La 6979 vera e propria è molto debole orientata da N a S con dimensioni grosso modo 6'×3' — 100x con filtro O III.
NGC 6985A	gx	20h45m03s	−11°06.2'		Aqr	24"	buona / m. buono	forma una coppia interagente con **MAC 2045-1106** — allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge diffuso abbastanza evidente. La MAC è una sorta di debolissimo baffo esteso una 40-ina di secondi che aggetta a SW dalla principale; si nota facilmente in visione distolta, meglio a 450x (la coppia non è riportata sull'Uranometria).
NGC 6988	gx	20h55m49s	+10°30.5'	q 209	Del	16"	ottima / buono	piccola galassietta rotonda poco diffusa, di luminosità uniforme e con Ø 30"; c'è una stellina a ridosso del bordo SE — 270x.
NGC 6991	aa	20h54m54s	+47°25.0'	q 85	Cyg	16"	ottima / mediocre	fitto e tenue polverio di stelle su fondo lattiginoso sul quale si staglia qualche componente più brillante; il grosso dell'ammasso appare tuttavia irrisolto forse a causa del seeing; allungato all'incirca da N a S con dimensioni 4'×2.5'; può darsi che la lattescenza osservata sia da attribuire alla nebulosità IC 5076. Due evidenti archi di stelle sono situati rispettivamente a 8' W e 12' NW: il 1º ha la concavità rivolta verso SE, mentre il 2º verso N. Il "gruppetto di 6 stelle poste a trapezio" che avevo registrato anni fa, e che coincide con la posizione dell'Uranometria, è probabilmente spurio — 132x.
NGC 6992-5	neb	20h57m00s	+31°30.0'	q 120	Cyg	6"	m. buona / m. buono	la parte più brillante della **Cirrus Nebula** — è un arco nebulare ben evidente e di aspetto irregolare (ai 2100 m. della Capanna Cervino ero riuscito a scorgerla nel 12×50).
NGC 6996	aa	20h56m30s	+44°37.0'	q 85	Cyg	16"	m. buona / m. buono	è un addensamento costituito da una 20-ina di stelle principali grosso modo disposte secondo una "C" col gap che punta verso NW ed esteso 7' od 8'; il campo è molto ricco per cui l'ammasso di apprezza meglio scalando a 100x. È circondato da una formazione scura simile a una "O" allungata da N a S che nella parte orientale è molto pronunciata quando si osserva col filtro O III: questa è riportata come **Barnard 353**; dalla parte opposta (verso W) è invece molto più sottile; a N è delimitata da 2 stelline brillanti distanti 3', mentre 2 stelline più deboli orientate nello stesso modo e distanti un paio di primi si trovano all'estremità opposta. L'anello scuro è perfettamente visibile anche senza filtro, ma in questo modo il campo esplode in una miriade di stelline facendo perdere contrasto.
NGC 6997	aa	20h56m30s	+44°39.0'	q 85	Cyg	16"	m. buona / m. buono	gruppo irregolare di una 30-ina di stelle che s'intravvede già nel cercatore come una debolissima macchia; è di dimensioni simili a NGC 6996; presenta verso N un arco di 6 stelle le cui 2 esterne sono coppie serrate; parallelamente a queste, verso S, ci sono 2 stelline brillanti che costituiscono il lato di un pentagono esterno all'ammasso e che si protende a SE (il vertice più orientale di questo pentagono è in realtà costituito da 2 stelle distanti ~ 1') — 188x.
NGC 6998	gx	21h01m38s	−28°01.9'	q 382	Mic	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
NGC 6999	gx	21h02m00s	−28°03.5'	q 382	Mic	24"	m. buona / discreto	poco più debole di NGC 6998, dalla quale dista 5' a ESE, e di dimensioni grosso modo simili, appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
NGC 7000	neb	20h58m00s	+44°20.0'	q 85	Cyg	6"	m. buona / m. buono	**Nord America** — facile, molto estesa, non si riesce a contenere nel campo dell'oculare da 30x; molto evidente e netta la parte del "Golfo del Messico".
NGC 7001	gx	21h01m08s	−00°11.7'	q 254	Aqr	16"	mediocre / ottimo	molto debole, probabilmente rotonda, appena più brillante verso l'interno, con Ø max 1', situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da NNW a SSE — 270x.
NGC 7003	gx	21h00m42s	+17°48.3'	q 164	Del	16"	ottima / buono	è di luminosità e aspetto un po' irregolare, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45", c'è una stellina brillante al margine orientale; un'altra stellina debole si trova invece quasi a ridosso verso SW — 270x.
NGC 7006	ag	21h01m29s	+16°11.2'	q 209	Del	24"	buona / buono	appare screziato a 400x, con una zona centrale brillante estesa una 40-ina di secondi e leggermente asimmetrica rispetto a quella periferica; l'ammasso ha un Ø totale di 1.5'.
NGC 7008	np	21h00m33s	+54°32.5'	q 56	Cyg	24"	buona / ottimo	allungata da N a S con dimensioni 90"×60"; presenta 2 rinforzi di luce: uno relativamente tenue e diffuso a S, l'altro più piccolo e marcato verso N; la stellina centrale è evidente; c'è una coppia di stelline brillanti a ridosso del margine meridionale (era osservabile anche nel 10") — 450x.
NGC 7009	np	21h04m11s	−11°21.8'	q 300	Aqr	24"	m. buona / discreto	**Saturnina** — molto brillante, di un bel colore azzurro-verdastro e di aspetto uniforme anche a 450x; è poco allungata da ENE a WSW con dimensioni di 40"×30" ed è immersa in una piccola e tenue chiazza lattescente; due deboli anse molto corte situate alle estremità ENE e WSW sono meglio individuabili col filtro O III per smorzare la luminosità del disco; la planetaria è facilmente visibile nel cercatore 12x50 come una stellina di 8ª grandezza.
NGC 7010	gx	21h04m39s	−12°20.3'	q 300	Aqr	16"	buona / buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×45", con piccolo nucleo puntiforme abbastanza brillante — 188x.
NGC 7013	gx	21h03m33s	+29°53.8'	q 121	Cyg	16"	m. buona / scarso	molto allungata all'incirca da N a S, di dimensioni almeno 3'×1', molto diffusa ma con evidente condensazione centrale; è situata a ridosso verso S di una stellina brillante — 188x.
NGC 7015	gx	21h05m37s	+11°24.8'	q 210	Equ	16"	buona / ottimo	facile, rotonda, poco più brillante all'interno, Ø di ~ 1' e poco diffusa; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 270x.
NGC 7023	neb	21h01m36s	+68°10.0'	q 33	Cep	24"	m. buona / ottimo	**Iris Nebula** — è un'estesa nebulosità di aspetto molto irregolare, molto evidente nella parte più interna, centrata sulla SAO 19158 di 7ª grandezza; la visione migliore d'insieme si ha a 210x. 5 o 6 stelline appena percettibili situate a ridosso W e meglio visibili visibili a 450x formano l'ammasso aperto Collinder 427.
NGC 7024	aa	21h06m05s	+41°30.0'		Cyg	24"	m. buona / ottimo	gruppo disperso di una 20-ina di stelle che anche a 135x si fatica a distinguere dal background; è delimitato a E da 3 stelline brillanti di 11ª grandezza poste a triangolo irregolare molto aperto, da un'altra stellina sempre di 11ª a S e da una quinta stellina ancora di 11ª presso il margine NW. Quando si punta salta subito all'occhio un mini asterismo orientato da NE a SW formato da 6 stelline deboli che ricorda, seppur molto vagamente, il Brocchi Cluster (Cr 399). L'oggetto non è riportato sull'Uranometria.
NGC 7025	gx	21h07m47s	+16°20.2'	q 210	Del	16"	ottima / buono	brillante, compatta, più brillante verso l'interno, poco allungata da NE a SE con dimensioni 40"×30"; è situata 1' E di una stellina brillante; questa stellina si trova al limitare E di un gruppo di una 15-ina di stelle brillanti le più luminose delle quali ricordano una aeroplano: assomiglia a un vero e proprio ammasso aperto esteso una dozzina di primi — 270x.
NGC 7026	np	21h06m18s	+47°51.1'	q 85	Cyg	10"	m. buona / discreto	**Cheeseburger Nebula** — è facile a 178x, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e di un colore bianco-verdastro pallido; una stella brillante di 10ª grandezza si trova quasi a ridosso verso NE; la planetaria è evidentemente più debole della stella, ma se si osserva col filtro O III sembra accendersi e appare più luminosa.
NGC 7027	np	21h07m02s	+42°14.1'	q 85	Cyg	10"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, di colore verde-azzurro e molto luminosa all'interno — 178x.
NGC 7030	gx	21h11m13s	−20°29.2'	q 345	Cap	16"	buona / m. buono	presenta un piccolo bulge e un tenuissimo alone esteso per non più di 30"; c'è una stellina appena percettibile immersa nell'alone quasi a ridosso verso S — 188x.
NGC 7031	aa	21h06m52s	+50°51.0'	q 56	Cyg	16"	scarsa / buono	gruppo disperso di una 15-ina di stelle sparse su un'area delle dimensioni di pochi primi — 188x.
NGC 7033	gx	21h09m36s	+15°07.5'	q 210	Peg	24"	ottima / buono	poco diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo quasi stellare molto evidente — 450x.
NGC 7034	gx	21h09m38s	+15°09.0'	q 210	Peg	24"	ottima / buono	poco più brillante della precedente, dalla quale dista1.5' a N; è molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
NGC 7039	aa	21h11m12s	+45°39.0'	q 85	Cyg	6"	discreta / perfetto	gruppo di aspetto molto irregolare, abbastanza ricco di deboli stelle con alcune componenti che sembrano come "scappare" un po' in tutte le direzioni; è difficile capire visualmente entro quali di queste è compreso. Ci sono 3 stelline abbastanza brillanti: una grosso modo al centro, un'altra verso NE e una 3ª al bordo meridionale.
NGC 7040	gx	21h13m16s	+08°51.9'	q 210	Equ	16"	ottima / buono	debole, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso S — 270x.
NGC 7042	gx	21h13m46s	+13°34.5'	q 210	Peg	16"	ottima / buono	bella, rotonda, relativamente brillante, con Ø > di 1', diffusa e con basso gradiente di luce — 270x.
NGC 7043	gx	21h14m04s	+13°37.5'	q 210	Peg	16"	ottima / buono	debole, diffusa e molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 7044	aa	21h13m09s	+42°29.7'	q 85	Cyg	10"	non registrati	a 63x appare come una debole chiazza nebulare irrisolta, salvo qualche componente sparsa, approssim. circolare con Ø di ~ 4'; a 178x è un brulichio di stelline molto fitto che lo fanno somigliare più a un globulare, anche se resta risolto solo in parte.
NGC 7046	gx	21h14m56s	+02°50.1'	q 255	Equ	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, debolmente screziata a 380x, orientata da E a W con dimensioni 60"×45".
NGC 7047	gx	21h16m28s	−00°49.6'	q 255	Aqr	16"	m. buona / ottimo	facile e relativamente brillante, ma assai diffusa e con luminanza superficiale molto bassa; è orientata ~ da E a W con dimensioni 80"×40" e presenta un nodulo luminoso verso la estremità occidentale; è situata a S di 3 stelline allineate ed equidistanti — 380x.
NGC 7048	np	21h14m15s	+46°17.2'	q 86	Cyg	10"	m. buona / discreto	è piuttosto debole e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 1' (a prima vista si potrebbe scambiare per una galassia); c'è una stellina brillante presso il margine SE e una debole a quello N; meglio evidente a 178x.
NGC 7051	gx	21h19m51s	−08°47.0'	q 300	Aqr	16"	buona / buono	compatta, con nucleo piccolo e luminoso di ~ 20" di dimensioni; presenta un debolissimo alone circonfuso approssim. circolare, con Ø di 1' — 188x.
NGC 7052	gx	21h18m33s	+26°26.8'	q 165	Vul	16"	ottima / buono	è orientata da ENE a WSW con dimensioni 90"×45"; presenta un bulge evidente e diffuso che a tratti sembra orientato da E a W; c'è una stellina quasi a ridosso del margine orientale — 270x.
NGC 7053	gx	21h21m08s	+23°05.1'	q 165	Peg	16"	ottima / buono	relativamente compatta, con basso gradiente di luce e con Ø di 45"; c'è una stellina a pochi secondi verso SW — 270x.
NGC 7056	gx	21h22m08s	+18°39.9'	q 165	Peg	16"	ottima / buono	rotonda, molto diffusa, con Ø < a 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; una condensazione centrale è visibile solo a momenti — 270x.
NGC 7062	aa	21h23m29s	+46°23.0'	q 86	Cyg	10"	buona / buono	bello, di dimensioni 5'×4', di forma irregolare e poco disperso; si contano facilmente una 20-ina di componenti; è delimitato da 2 stelline brillanti orientate all'incirca da E a W.
NGC 7063	aa	21h24m30s	+36°30.0'	q 121	Cyg	6"	discreta / perfetto	piccolo gruppo molto povero contenente una dozzina di stelle.
NGC 7065	gx	21h26m42s	−06°59.7'	q 300	Aqr	16"	passaggio di nubi	oggetto piuttosto difficile in quanto presenta un nucleo stellare e un alone circonfuso molto tenue visibile solo in visione distolta ed esteso ~ 1'; c'è una stellina a poco più di 1' verso S — 188x.
NGC 7065A	gx	21h26m58s	−07°01.3'	q 300	Aqr	16"	scarsa / buono	è di dimensioni analoghe a NGC 7065, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso, situata a SW di un trapezio regolare di stelle brillanti — 270x.
NGC 7066	gx	21h26m14s	+14°11.0'	q 210	Peg	16"	ottima / buono	debole, allungata da NNW a SSE, con dimensioni 45"×30" con una stellina brillante quasi a ridosso verso NW (ossia poco più spostata in senso orario rispetto all'asse della galassia); una tenue condensazione centrale appare solo a momenti — 270x.
NGC 7067	aa	21h24m12s	+48°01.0'	q 86	Cyg	10"	buona / buono	2 piccoli gruppi poveri e dispersi distanti ca. 8' in direzione ENE-WSW; in quello ENE si contano facilmente 6 componenti abbastanza brillanti, irregolarmente disposte da N a S; quell'altro, più debole e allungato nella stessa direzione, ha una decina di stelle di luminosità assai diseguale e disposte vagamente a "W" molto schiacciata (quest'ultimo raggruppamento è tuttavia spurio).
NGC 7068	gx	21h26m32s	+12°11.1'	q 210	Peg	16"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, orientata da N a S con dimensioni 40"×20" ed estesa per ~ 1'; presenta un nucleo abbastanza evidente a 380x; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di NE; quasi allineata ed equidistante con 2 stelle brillanti situate a N della gx.
NGC 7069	gx	21h28m06s	−01°38.7'	q 255	Aqr	16"	m. buona / ottimo	galassietta relativamente brillante, ma di aspetto un po' confuso, con alto gradiente di luce e forse poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 7073	gx	21h29m26s	−11°29.3'	q 300	Cap	24"	discreta / buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di 45" e con gradiente di luce molto basso; ci sono due stelline a meno di 1' rispettivamente a SE e SW; poco meglio evidente a 340x.
NGC 7074	gx	21h29m39s	+06°40.9'	q 210	Peg	16"	ottima / buono	debole, di luminosità stranamente più uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; è difficile tenere fuori campo la SAO 126834 di 6ª grandezza situata 6' a S che disturba molto l'osservazione — 270x.
NGC 7076	np	21h26m23s	+62°53.5'	q 33	Cep	10"	buona / buono	appare elusivamente in visione distolta a 63x con filtro O III come una piccola chiazza rotondeggiante estesa una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso N.
NGC 7077	gx	21h30m00s	+02°24.8'	q 255	Aqr	16"	m. buona / ottimo	piccola, debole, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata all'incirca da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ~ 40" verso W — 380x.
NGC 7080	gx	21h30m02s	+26°43.1'	q 165	Vul	16"	buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø > di 1', gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE e un'altra più debole e poco più lontana verso E — 270x.
NGC 7081	gx	21h31m24s	+02°29.5'	q 255	Aqr	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 45", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; è allineata con 2 stelline situate a SSE: quella a ridosso è la più debole delle 2 — 380x.
NGC 7082	aa	21h29m24s	+47°05.0'	q 86	Cyg	6"	buona / ottimo	gruppo molto disperso e irregolare di stelle brillanti, con dimensioni di 20' o 25', più interessante a 30x.
NGC 7085	gx	21h32m25s	+06°34.8'	q 210	Peg	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, assai stemperata sul fondo cielo, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 7086	aa	21h30m30s	+51°35.0'	q 57	Cyg	10"	ottima / buono	facile, rotondeggiante, costituito da 2 lobi ravvicinati di cui quello a S è il più brillante.
NGC 7094	np	21h36m53s	+12°47.3'	q 211	Peg	24"	m. buona / mediocre	debole e diffusa, perfettamente rotonda con Ø di 1.5'; a 340x appare di luminosità pressoché uniforme; la stellina centrale è brillante, mentre una più debole si trova all'interno verso il bordo NE; scalando a 200x e utilizzando l'O III appare più contrastata e mostra chiaramente un rinforzamento dell'anello dalla parte occidentale — 340x (col filtro a 63x era al limite della visibilità per il 10": mi aveva ricordato la IC 1295 nello Scudo).
NGC 7100	gx	21h39m35s	+08°52.6'	q 211	Peg	16"	m. buona / ottimo	facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, abbastanza compatta e con evidente condensazione centrale — 380x.
NGC 7101	gx	21h39m27s	+08°53.8'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	è una gx elusiva e molto piccola visibile solo a momenti in visione distolta un paio di primi a NW di NGC 7100 — 380x.
NGC 7102	gx	21h39m44s	+06°17.2'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso e appena più brillante all'interno; è meglio osservabile scalando a 188x.
NGC 7103	gx	21h39m51s	−22°28.4'	q 346	Cap	16"	buona / m. buono	debole piccola galassia rotondo, con Ø di 1' in cui appare a tratti una tenue condensazione centrale; c'è una debole stellina a ~ 1' verso W — 188x.
NGC 7104	gx	21h40m03s	−22°25.5'	q 346	Cap	16"	scarsa / buono	molto debole, piccola, approssim. circolare, di luminosità pressoché uniforme e un Ø max di 30" — 270x.
NGC 7111	gx	21h41m54s	−06°42.5'	q 301	Aqr	24"	discreta / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 7112	gx	21h42m23s	+12°29.9'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	debolissima lama di luce con bulge appena evidente che in visione distolta appare estesa per ~ 1' in direzione E-W — 270x.
NGC 7113	gx	21h42m27s	+12°34.1'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	rotonda con Ø di 45", poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata al vertice orientale di un piccolo triangolo equilatero formato con 2 stelline di cui quella a ridosso W molto brillante — 270x.
NGC 7115	gx	21h43m39s	−25°21.1'	q 346	PsA	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo occidentale; poco meglio contrastata scalando a 340x (visibile, seppur elusivamente, anche nel 10" a 178x in condizioni di visibilità simili).
NGC 7116	gx	21h42m41s	+28°56.8'	q 122	Cyg	16"	m. buona / discreto	è di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 7120	gx	21h44m33s	−06°31.4'	q 301	Aqr	24"	discreta / buono	debole, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e poco più brillante all'interno; c'è un piccolo asterismo foggiato a "Y" orientato da E a W formato da 4 stelline brillanti — 450x.
NGC 7121	gx	21h44m52s	−03°37.2'	q 256	Aqr	16"	ottima / discreto	tutto sommato abbastanza facile, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso E — 270x.
NGC 7127	aa	21h43m54s	+54°36.2'	q 57	Cyg	6"	m. buona / m. buono	assieme a NGC 7128 costituisce due piccoli addensamenti relativamente facili, distanti meno di un grado in direzione N-S; il 2º è molto più evidente.
NGC 7128	aa	21h44m00s	+53°43.0'	q 57	Cyg	6"	m. buona / m. buono	v. NGC 7127
NGC 7129	aa	21h42m00s	+66°05.0'	q 33	Cep	24"	ottima / m. buono	gruppo di una 15-ina di componenti molto eterogeneo, con range di luminosità estremo: si va da una stella molto brillante situata verso il margine N al alcune appena percettibili, 3 delle quali si trovano al centro, un poco spostate verso N (le 5 o 6 stelle principali erano già visibili nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 7131	gx	21h47m36s	−13°11.0'	q 301	Cap	16"	m. buona / ottimo	rotonda e relativamente compatta, con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 380x.
NGC 7132	gx	21h47m16s	+10°14.5'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	debole ovale di 45"×30" orientato da E a W, con condensazione centrale tenue e diffusa; è un poco disturbata da una stellina brillante a 1' scarsi verso W — 270x.
NGC 7133	neb	21h42m47s	+66°06.4'	q 33	Cep	24"	ottima / m. buono	è presente un piccolo asterismo orientato da N a S formato da 5 stelline brillanti ciascuna delle quali è circondata da una piccola nebulosità abbastanza marcata, soprattutto sulle 3 più a N; un nodulo particolarmente brillante si trova quasi a ridosso NW della stella più settentrionale; l'asterismo è immerso in una estesa chiazza lattescente, molto diffusa che arriva a lambire il vicino ammasso aperto NGC 7129; la parte più brillante della nebulosa, quella appunto verso N, è riportata sul Megastar come **LBN 497**; poco meglio evidente col *deepsky* (questa zona era già osservabile nel 10") — 340x.
NGC 7137	gx	21h48m13s	+22°09.6'	q 166	Peg	16"	buona / m. buono	è una bolla circolare, facile, ma con gradiente di luce molto basso, con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
NGC 7138	gx	21h49m01s	+12°30.9'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	è un ovale di dimensioni 60"×30", di luminosità uniforme e orientata da N a S; c'è una stellina brillante a ridosso di NW — 270x.
NGC 7139	np	21h46m09s	+63°47.5'	q 33	Cep	24"	ottima / m. buono	è una bolla circolare di aspetto regolare e luminosità pressoché uniforme, con Ø poco maggiore di 1' e poco oscurata ai bordi; l'OIII la rende più evidente rispetto al fondo cielo, ma non ne aumenta i dettagli — 340x.
NGC 7142	aa	21h45m12s	+65°46.4'	q 33	Cep	10"	ottima / buono	debole, con forte granulazione; dà l'impressione di un artiglio con 3 dita su ciascuna delle quali c'è una stella brillante.
NGC 7146	gx	21h51m47s	+03°01.0'	q 256	Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" con una stellina brillante quasi a ridosso di NE — 380x.
NGC 7147	gx	21h51m58s	+03°04.3'	q 256	Peg	16"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 380x.
NGC 7148	gx	21h52m23s	+03°25.6'	q 256	Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø max di 25" o 30" — 270x.
NGC 7149	gx	21h52m12s	+03°18.0'	q 256	Peg	16"	buona / m. buono	facile, diffusa, con condensazione centrale evidente, allungata da NNE a SSW con dimensioni 50"×25"; in visione distolta la gx sembra lambire la stellina situata pochi secondi a S — 270x.
NGC 7156	gx	21h54m34s	+02°56.6'	q 256	Peg	16"	scarsa / buono	è una grossa macchia relativamente brillante, diffusa e rotonda, con Ø di almeno 1.5' e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 7158	gx	21h56m57s	−11°39.5'	q 301	Cap	16"	ottima / buono	è un debolissima galassietta di 30"×20" orientata da E a W e osservabile in visione distolta a 380x; situato un paio di primi a N di una stellina.
NGC 7159	gx	21h56m26s	+13°33.8'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	piccola, relativamente compatta, debole e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso verso S — 270x.
NGC 7160	aa	21h53m48s	+62°36.0'	q 33	Cep	6"	discreta / buono	piccolo gruppo di 7 od 8 stelle fra cui 2 brillanti, esteso solo pochi primi.
NGC 7164	gx	21h56m24s	+01°21.8'	q 256	Aqr	24"	buona / buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni di 40"×30" — 450x.
NGC 7165	gx	21h59m26s	−16°30.7'	q 301	Aqr	16"	buona / buono	approssim. circolare con Ø inferiore a 1', molto diffusa e con alto gradiente di luce — 188x.
NGC 7167	gx	22h00m31s	−24°38.0'	q 346	Aqr	16"	discreta / buono	molto debole, con bassa luminanza superficiale, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 1.5'×1'; c'è una stellina brillante a ridosso verso E — 188x.
NGC 7170	gx	22h01m26s	−05°26.0'	q 301	Aqr	16"	ottima / discreto	relativamente facile, ma molto stemperata sul fondo cielo; a prima vista sembra rotonda, ma in visione laterale appare poco allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×50"; c'è una stellina a poco più di 1' verso NNW (ossia prolungando lungo l'asse della gx) — 270x.
NGC 7171	gx	22h01m02s	−13°16.1'	q 301	Aqr	16"	ottima / buono	è un bell'ovale di 2'×1', orientata da NW a SE sfumato ai bordi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina al bordo SE — 188x.
NGC 7177	gx	22h00m41s	+17°44.3'	q 166	Peg	10"	buona / buono	relativamente brillante e compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 1.5'×1'.
NGC 7180	gx	22h02m18s	−20°32.8'	q 346	Aqr	16"	discreta / buono	presenta un nucleo puntiforme e un bulge diffuso; è allungata ~ da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 188x.
NGC 7181	gx	22h01m44s	−01°57.6'	q 256	Aqr	16"	ottima / discreto	è appena più evidente di NGC 7182, ma di dimensioni simili e con condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina una 30-ina di secondi a SE — 270x.
NGC 7182	gx	22h01m52s	−02°11.8'	q 256	Aqr	16"	ottima / discreto	piccola e molto debole, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare visibile però solo a momenti — 270x.
NGC 7183	gx	22h02m22s	−18°54.9'	q 346	Aqr	16"	discreta / buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 4'×1',ma molto debole e diffusa; presenta un bulge esteso poco più brillante del disco — 188x.
NGC 7184	gx	22h02m40s	−20°48.8'	q 346	Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 3'×1', con bulge diffuso e debolmente screziato a 450x; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso NE (era visibile, compreso il nucleo, nel 10" a 126x).
NGC 7185	gx	22h02m57s	−20°28.3'	q 346	Aqr	16"	discreta / buono	debole, con gradiente di luce medio ma di luminosità piuttosto irregolare; appare poco allungata da NNW a SSE con dimensioni 1.5'×1' — 188x.
NGC 7188	gx	22h03m29s	−20°19.0'	q 346	Aqr	16"	discreta / buono	debolissima, osservabile in visione distolta, a momenti appare orientata da NE a SW con dimensioni 80"×40"; si trova all'interno di un piccolo triangolo isoscele formato con deboli stelline: quella più a S è appena percettibile — 188x.
NGC 7189	gx	22h03m16s	+00°34.2'	q 256	Aqr	16"	ottima / discreto	debole, diffusa, di luminosità uniforme, appena orientata da NW a SE con dimensioni di 60"×45" — 270x.
NGC 7190	gx	22h03m07s	+11°12.0'	q 211	Peg	16"	m. buona / ottimo	galassietta con piccola ed evidente condensazione centrale di aspetto quasi stellare; è leggermente ovale, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ~ 40" verso E — 380x.
NGC 7194	gx	22h03m31s	+12°38.2'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	approssim. rotonda, diffusa, con Ø di 45" e con condensazione centrale piccola ed evidente; c'è una stellina a meno di 1' verso SW — 270x.
NGC 7195	gx	22h03m30s	+12°39.6'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	situata a poco più di 1' a N di NGC 7194, è piccola, rotonda, con nucleo stellare e Ø < a 30" — 270x.
NGC 7197	gx	22h02m58s	+41°03.6'	q 87	Lac	16"	m. buona / buono	allungata all'incirca da E a W con dimensioni 80"×40", diffusa; c'è una stellina a ridosso verso SW e un'altra verso W, praticamente sul prolungamento dell'asse maggiore della galassia — 270x.
NGC 7198	gx	22h05m14s	−00°38.9'	q 256	Aqr	16"	ottima / discreto	abbastanza facile, rotonda e relativamente compatta, con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una stellina a SE a ~ 45" dal centro — 270x.
NGC 7206	gx	22h05m41s	+16°47.1'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	rotonda, diffusa poco più brillante all'interno e condensazione centrale ben evidente; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso NE — 270x.
NGC 7207	gx	22h05m46s	+16°46.1'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	debole, piccola, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e nucleo stellare visibile abbastanza facilmente; c'è una debole stellina a 1' verso E; è situata 1.5' a SE di NGC 7206 — 270x.
NGC 7209	aa	22h05m12s	+46°30.0'	q 87	Lac	6"	non registrati	debole e poco contrastato sul fondo cielo; a 30x si contano una 20-ina di componenti di luminosità pressoché uniforme.
NGC 7211	gx	22h06m22s	−08°05.4'	q 301	Aqr	16"	passaggio di nubi	molto debole e molto piccola, visibile a tratti in visione laterale a un paio di primi N di una stella brillante; c'è una stellina molto debole a 1' verso SE — 188x.
NGC 7212	gx	22h07m02s	+10°14.0'	q 211	Peg	24"	m. buona / m. buono	nonostante la presenza residua di chiarore lunare (Luna al primo quarto oramai dietro la montagna) si può notare una piccola zona centrale rotonda e condensata con Ø di una 20-ina di secondi e un debolissimo baffo diffuso e sfilacciato che si diparte verso N; quest'ultimo è effettivamente costituito dalla **MAC 2207+1014**; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE del sistema; una coppia di deboli stelline si trova a 1' NW — 450x.
NGC 7214	gx	22h09m07s	−27°48.6'	q 347	PsA	16"	buona / buono	compatta, circolare, con Ø di ~ 45"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso S e un'altra appena percettibile alla stessa distanza verso N: quest'ultima è in realtà la **Hickson 91D** — 188x.
NGC 7215	gx	22h08m34s	+00°30.7'	q 257	Aqr	16"	ottima / discreto	debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare chiaramente allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 7217	gx	22h07m52s	+31°21.5'	q 122	Peg	24"	m. buona / m. buono	presenta un bulge brillante, debolmente screziato a 450x, rotondo con Ø < 30" al centro del quale appare il nucleo quasi stellare; questa zona centrale è circonfusa da un alone circolare e uniforme con Ø di 2.5'; c'è una debole stellina a ridosso verso N; una stella brillante si trova a 3' SE (facilmente visibile anche nel 10" a 126x).
NGC 7218	gx	22h10m12s	−16°39.6'	q 302	Aqr	16"	ottima / buono	è un bell'ovale di 2'×1', orientata da N a S sfumato ai bordi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina al bordo SE — 380x.
NGC 7220	gx	22h11m31s	−22°57.2'	q 347	Aqr	16"	buona / m. buono	debolissima, appare a tratti al vertice meridionale di un triangolo rettangolo isoscele formato con 2 stelline orientate da NW a SE e distanti un paio di primi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso del margine NW — 188x.
NGC 7222	gx	22h10m52s	+02°06.3'	q 257	Aqr	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo qualche lieve discrepanza di luce all'interno osservabile a tratti; è rotonda con Ø di 1' scarso — 450x.

NGC 7223	gx	22h10m09s	+41°01.0'	q 87	Lac	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina al bordo meridionale, un'altra di luminosità simile quasi a ridosso N e una 3a poco più evidente sempre verso S, ma a 1' di distanza dalla gx (queste 3 stelline sono praticamente allineate in direzione N-S — 450x.
NGC 7224	gx	22h11m35s	+25°51.9'	q 167	Peg	16"	buona / m. buono	piccola, relativamente compatta, appena più brillante all'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; è situata in un campo ricco di stelle brillanti — 270x.
NGC 7225	gx	22h13m08s	−26°08.9'	q 347	PsA	16"	buona / buono	allungata da NW a SE per oltre1' con tenue nucleo puntiforme; c'è una debole stellina a 1.5' NE — 188x.
NGC 7226	aa	22h10m25s	+55°23.8'	q 57	Lac	10"	discreta / discreto	molto debole, rotondo, del Ø di ca. 3'; appare granulato solo in visione laterale a 178x; 2 stelle brillanti l'attraversano dividendolo in 2 parti diseguali.
NGC 7227	gx	22h11m31s	+38°43.3'	q 122	Lac	24"	ottima / molto buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge debolmente contrastato; poco disturbata da una stellina brillante a ridosso SW — 450x.
NGC 7228	gx	22h11m49s	+38°42.0'	q 122	Lac	24"	ottima / molto buono	molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e un tenue nucleo stellare evidente; c'è una doppia a 1' SE — 450x.
NGC 7230	gx	22h14m13s	−17°04.4'	q 347	Aqr	16"	m. buona / ottimo	è una tenue bolla circolare con Ø di ~ 1', diffusa e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 7231	gx	22h12m31s	+45°19.8'	q 87	Lac	16"	m. buona / m. buono	diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 90"×30"; ci sono 2 stelline a ridosso verso N e NW distanti una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 7235	aa	22h12m30s	+57°16.6'	q 57	Cep	6"	buona / buono	relativamente compatto, di forma irregolare; si contano 7 od 8 stelle, compresa una molto brillante, UGC un fondo lattescente.
NGC 7236	gx	22h14m45s	+13°50.8'	q 212	Peg	16"	buona / discreto	assieme alla successiva forma una coppia galassiette rotonde con Ø di una 30-ina di secondi e separate all'incirca della stessa distanza in direzione NW-SE; la 1ª è leggermente più brillante e presenta anche una condensazione centrale più marcata della 2ª — 270x.
NGC 7237	gx	22h14m47s	+13°50.9'	q 212	Peg	16"	buona / discreto	v. **NGC 7236**
NGC 7239	gx	22h15m01s	−05°03.2'	q 302	Peg	16"	buona / m. buono	molto deboli e piccola, compatta, rotonda con Ø max di 20"; ci sono 3 debolissime stelline allineate situate ~ 1' a S — 270x.
NGC 7240	gx	22h15m22s	+37°16.9'	q 122	Lac	16"	m. buona / discreto	debole, rotonda, di luminosità pressoché uniforme con Ø 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SE — 270x.
NGC 7241	gx	22h15m50s	+19°13.9'	q 167	Peg	24"	buona / buono	molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'×40", diffusa e con basso gradiente di luce, a tratti appena più brillante verso N; a prima vista sembra situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo isoscele, ma in visione distolta si nota che in realtà si estende più a S della componente meridionale — 450x.
NGC 7242	gx	22h15m40s	+37°08.1'	q 122	Lac	16"	m. buona / discreto	relativamente brillante, con bulge luminoso e un debole alone estesa da NE a SW di dimensioni 1.5'×1'; c'è una stellina abbastanza brillante a ~ 40" SE e una altra molto debole poco al di là del margine SW — 270x.
NGC 7243	aa	22h15m18s	+49°53.0'	q 87	Lac	6"	non registrati	è un oggetto facile, già visibile nel cercatore 6x30; nel Comet Tracker appare di aspetto irregolare e si riescono a contare 30 o 40 di componenti ad appena 30x.
NGC 7244	gx	22h16m27s	+16°28.3'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	debole, con basso gradiente di luce, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 7245	aa	22h15m18s	+54°20.0'	q 57	Lac	10"	discreta / buono	debole e di forma irregolare, grosso modo rotondo con Ø di 4'; situato all'interno di un triangolo isoscele di stelle abbastanza brillanti col vertice più acuto che punta a NE; a 178x risaltano sì e no una decina di componenti. Subito a NNE appare un altro debole addensamento stellare, più piccolo e che da un controllo effettuato successivamente è risultato poi essere l'ammasso **King 9.**
NGC 7246	gx	22h17m43s	−15°34.2'	q 302	Aqr	16"	buona / buono	relativamente brillante, con basso gradiente di luce, a tratti di aspetto screziato nella parte centrale, allungata da N a S con dimensioni 2'×1'; c'è una stellina brillante a ridosso verso N; questa stellina è la più occidentale di un piccolo triangolo di stelle all'incirca della stessa luminosità — 188x.
NGC 7247	gx	22h17m41s	−23°43.8'	q 347	Aqr	16"	buona / buono	poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una debole stellina a 1' verso E; è situata un paio di primi SE di una stella brillante doppia — 188x.
NGC 7248	gx	22h16m53s	+40°30.3'	q 87	Lac	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con nucleo di aspetto stellare (appariva debolmente anche nel 10" a 178x in condizioni di visibilità ottimali) — 450x.
NGC 7250	gx	22h18m18s	+40°33.8'	q 87	Lac	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20", ma di aspetto piuttosto irregolare; presenta un debole bulge diffuso poco decentrato verso S e leggermente ruotato in senso antiorario rispetto all'asse della gx: a 450x sembra, a momenti, che si tratti di 2 oggetti sovrapposti; c'è una stellina brillante all'estremità meridionale (nel 10" a 118x appariva come un tenue baffo di luce che si dipartiva a N della stellina sopra menzionata).
NGC 7251	gx	22h20m27s	−15°46.4'	q 302	Aqr	16"	buona / buono	approssim. circolare con Ø di 1.5', diffusa e con gradiente di luce molto basso — 188x.
NGC 7252	gx	22h20m45s	−24°40.7'	q 347	Aqr	10"	buona / buono	molto debole, compatta, circolare con Ø inferiore a 1' e con marcata condensazione centrale.
NGC 7253A	gx	22h19m26s	+29°23.9'	q 122	Peg	16"	m. buona / discreto	piccola, debole, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con bulge evidente — 270x.
NGC 7253B	gx	22h19m29s	+29°23.2'	q 122	Peg	16"	m. buona / discreto	situata a ridosso SE della precedente, è, molto allungata da NE a SW, di luminosità uniforme ed estesa per oltre 1'; è posta praticamente di taglio e a perpendicolo con la precedente; le due gx tendono, tuttavia, a confondersi in un unico oggetto di aspetto un po' irregolare — 270x.
NGC 7255	gx	22h23m08s	−15°32.5'		Aqr	24"	buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" (all'incirca estesa come la distanza delle 2 stelline situate a NE; meglio evidente scalando a 280x (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 7256	gx	22h22m36s	−21°44.2'	q 347	Aqr	16"	buona / buono	relativamente brillante, di luminosità non uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' e con alto gradiente di luce — 188x.
NGC 7258	gx	22h22m58s	−28°20.7'	q 384	PsA	16"	buona / buono	molto debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo puntiforme — 188x.
NGC 7259	gx	22h23m05s	−28°57.2'	q 384	PsA	16"	buona / buono	molto debole, rotonda, di luminosità pressoché uniforme, con Ø < 1' e poco diffusa — 188x.
NGC 7260	gx	22h22m36s	−04°07.2'	q 257	Aqr	16"	buona / m. buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con gradiente di luce molto basso, poco allungata da N a S e di dimensioni 80"×60" — 270x.
NGC 7261	aa	22h20m10s	+58°07.3'	q 57	Cep	6"	non registrati	gruppetto povero di stelle deboli esteso solo pochi primi.
NGC 7263	gx	22h21m45s	+36°21.0'	q 123	Lac	16"	m. buona / discreto	è un piccolo e debole ovale, allungata da ~ da NE a SW, di dimensioni 40"×30"; c'è una debole stellina a ridosso verso NE — 270x.
NGC 7264	gx	22h22m14s	+36°23.2'	q 123	Lac	16"	m. buona / discreto	debole lama di luce di luminosità uniforme estesa per oltre 1' e orientata da NE a SW — 270x.
NGC 7265	gx	22h22m28s	+36°12.6'	q 123	Lac	16"	ottima / ottimo	luminosa e diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 1.5'×1', gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo di aspetto stellare — 380x.
NGC 7266	gx	22h23m59s	−04°04.4'	q 257	Aqr	16"	buona / m. buono	poco diffusa e con evidente condensazione centrale, leggermente ovale, orientata da E a W con dimensioni 50"×40" — 270x.
NGC 7267	gx	22h24m22s	−33°41.6'	q 384	PsA	16"	buona / buono	presenta una zona centrale brillante, allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×30" circonfusa da un tenuissimo alone forse rotondo di 1' di Ø; c'è un piccolo triangolo rettangolo isoscele a SW coi cateti allineati lungo le direzioni N-S ed E-W; il vertice rettangolo è occupato da una stella luminosa — 188x.
NGC 7269	gx	22h25m47s	−13°10.0'	q 302	Aqr	16"	passaggio di nubi	molto debole e non definita ai bordi, ma facilmente individuabile in visione distolta; è situata 5'a E di una stellina brillante — 188x.
NGC 7270	gx	22h23m47s	+32°24.2'	q 123	Peg	16"	m. buona / m. buono	rotondeggiante, ma di aspetto irregolare, con condensazione centrale abbastanza marcata, Ø ~ 1'; sembra mostrare un debole "pendaglio" di luce verso N — 270x.
NGC 7271	gx	22h23m58s	+32°22.0'	q 123	Peg	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, situata a ~ 3' a SW di NGC 7270 e con Ø di circa 30" — 270x.
NGC 7272	gx	22h24m32s	+16°35.3'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	gx a luminanza superficiale molto bassa, poco più brillante all'interno, stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø > di 1'; è situata all'interno di un triangolo il cui vertice meridionale è occupato da una stellina doppia serrata; meglio osservabile scalando a 188x.
NGC 7273	gx	22h24m09s	+36°12.0'	q 123	Lac	16"	m. buona / discreto	assieme a NGC 7274 ed NGC 7276 fa parte di un terzetto allineato in direzione N-S — molto debole, di aspetto un po' confuso, con gradiente di luce molto basso ed estesa una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 7274	gx	22h24m11s	+36°07.6'	q 123	Lac	16"	m. buona / discreto	è la più brillante del terzetto, approssim. circolare, con Ø di ~ 1' e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 7275	gx	22h24m17s	+32°26.7'	q 123	Peg	16"	m. buona / m. buono	piccola e debole lama di luce orientata da SW a NE per ~ 45" con nucleo puntiforme visibile a tratti — 270x.
NGC 7276	gx	22h24m14s	+36°05.3'	q 123	Lac	16"	m. buona / discreto	piccola, debole, rotonda, con Ø max di 30", con un'evidente condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina a 20" SE — 270x.
NGC 7280	gx	22h26m28s	+16°08.9'	q 202	Peg	16"	buona / m. buono	presenta una marcata condensazione centrale di aspetto quasi stellare e un tenue alone molto diffuso e poco allungata da ENE a WSW, di dimensioni 80"×60"; c'è una stellina debolissima visibile a tratti verso SW — 270x.
NGC 7281	aa	22h24m48s	+57°51.0'	q 57	Cep	10"	buona / buono	gruppo disperso di un 20-ina di stelle; la parte più condensata è distribuita su un'area estesa 6' o 7'; risaltano 3 stelle abbastanza brillanti allineate da E a W per un paio di primi nella parte NW dell'ammasso.
NGC 7282	gx	22h25m54s	+40°18.9'	q 87	Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 90"×40"; appare come delimitata da 4 deboli stelline: 2 sono a ridosso NE e SW (la 1a è la più brillante); altre due si trovano ai margini NE e SE; una coppia abbastanza stretta si trova a 1' NW della gx (era debolissima e di aspetto confuso nel 10" a 118x) — 450x.
NGC 7283	gx	22h28m33s	+17°28.2'	q 167	Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, ma in visione distolta appare chiaramente allungata ~ da N a S con dimensioni 40"×20"; in visione diretta appare a tratti solo il nucleo di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 7284	gx	22h28m36s	−24°50.6'	q 347	Aqr	16"	buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia di gx interagenti; di fatto appaiono 2 nuclei distanti una 40-ina di secondi in direzione ENE-WSW avvolti in un alone comune; il 1° è di aspetto quasi stellare, mentre il 2° è più diffuso e più somigliante a quello di una gx ordinaria — 188x.
NGC 7285	gx	22h28m38s	−24°50.5'	q 347	Aqr	16"	buona / buono	v. **NGC 7284**
NGC 7286	gx	22h27m51s	+29°05.8'	q 123	Peg	16"	m. buona / m. buono	debole, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 7288	gx	22h28m15s	−02°53.0'	q 257	Aqr	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo evidente di aspetto stellare — 270x.
NGC 7290	gx	22h28m26s	+17°08.9'	q 167	Peg	16"	buona / m. buono	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; appare facilmente, ma è disturbata dalla luce di 2 stelle brillanti distanti una dozzina di primi: quella a NW è una doppia serrata ed è la più luminosa — 270x.
NGC 7291	gx	22h28m29s	+16°47.0'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	appare leggermente ovale, di dimensioni 60"×50", poco più luminosa all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 270x.
NGC 7292	gx	22h28m26s	+30°17.6'	q 123	Peg	24"	ottima / molto buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 80"×60"; c'è un nodulo appena percettibile subito a S del bulge; una coppia stretta di stelline si trova a 1' verso NW; è poco più interessante e meglio contrastata scalando a 340x (era visibile molto debolmente nel 10" a 63x anche se non avevo risolto la coppia a NW).
NGC 7293	np	22h29m38s	−20°50.2'	q 347	Aqr	6"	discreta / ottimo	**Helix Nebula** — è molto debole ed estesa, grosso modo rotonda con Ø di una decina di primi e di luminosità pressoché uniforme; a tratti in visione distolta appare solo qualche vaga ombreggiatura all'interno.
NGC 7294	gx	22h32m08s	−25°23.8'	q 347	PsA	16"	buona / buono	molto debole, di aspetto confuso, ma facilmente visibile in visione distolta, estesa per circa 1' e con condensazione centrale abbastanza evidente — 188x.
NGC 7296	aa	22h27m58s	+52°19.0'	q 57	Lac	6"	non registrati	molto debole, relativamente compatto e di aspetto granulato a 90x.
NGC 7298	gx	22h30m51s	−14°11.2'	q 302	Aqr	16"	buona / buono	molto debole, osservabile in visione laterale come una tenue e piccola chiazza lattescente di ~ 1' di dimensioni, ma di forma indistinta — 188x.
NGC 7300	gx	22h31m00s	−14°00.1'	q 302	Aqr	16"	buona / buono	allungata da NNW a SSE, di dimensioni ~ 90"×45" e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
NGC 7301	gx	22h30m35s	−17°34.4'	q 347	Aqr	16"	buona / buono	piccola, debole e con gradiente di luce molto basso di luce, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" — 188x.
NGC 7302	gx	22h32m24s	−14°07.2'	q 302	Aqr	24"	ottima / ottimo	facile, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 80"×40", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare evidente — 450x.
NGC 7303	gx	22h31m33s	+30°57.3'	q 123	Peg	16"	ottima / ottimo	è un debole ovale orientata da E a W, di dimensioni 80"×40", diffuso e di luminosità uniforme — 380x.
NGC 7305	gx	22h32m14s	+11°42.7'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, approssim. rotonda, con piccola condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso N — 270x.
NGC 7306	gx	22h33m17s	−27°14.8'	q 347	PsA	16"	buona / buono	debole ovale orientata da NE a SW, di dimensioni 60"×30", gradatamente più brillante verso l'interno; è situata un paio di primi a E di una stellina brillante — 188x.
NGC 7308	gx	22h34m32s	−12°56.0'	q 302	Aqr	16"	buona / buono	è una piccola e debole galassia molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e una evidente condensazione centrale puntiforme — 188x.
NGC 7309	gx	22h34m21s	−10°21.4'	q 302	Aqr	16"	passaggio di nubi	debole, rotonda, con Ø di ~ 1', di aspetto vagamente screziato, ma con basso gradiente di luce; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso E; è situata 6' a S di una stella brillante — 188x.
NGC 7310	gx	22h34m37s	−22°29.1'	q 347	Aqr	16"	buona / m. buono	gx elusiva che appare solo in visione distolta e con una certa difficoltà; a tratti sembra addirittura poco allungata da N a S per max 45" — 188x.
NGC 7311	gx	22h34m07s	+05°34.2'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	brillante, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" con alto gradiente di luce e condensazione centrale marcata di aspetto stellare — 270x.
NGC 7312	gx	22h34m35s	+05°49.0'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	debole stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina proseguendo verso WSW a 1' di distanza dal bordo — 270x.
NGC 7314	gx	22h35m46s	−26°03.0'	q 347	PsA	10"	ottima / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S, con dimensioni 3'×1'(*presenza di chiarore lunare*).
NGC 7315	gx	22h35m32s	+34°48.2'	q 123	Peg	16"	m. buona / m. buono	rotondeggiante, con Ø di ~ 1', poco più brillante all'interno forma un arco con 2 stelline distanti un paio di primi in direzione NE-SW — 270x.
NGC 7316	gx	22h35m56s	+20°19.3'	q 167	Peg	16"	m. buona / buono	facile, rotonda con Ø di ~ 1', di luminosità pressoché uniforme, diffusa; c'è una stellina a meno di 1' verso SSW, in direzione di una stella brillante di 6ª grandezza situata a 3' di distanza — 270x.
NGC 7317	gx	22h35m52s	+33°56.7'	q 123	Peg	24"	m. buona / m. buono	fa parte assieme alle 4 sigle successive, del celebre Quintetto Stephan — poco diffusa, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante al margine N (era molto debole e relativamente compatta nel 10" a 126x) — 450x.
NGC 7318A	gx	22h35m57s	+33°57.9'	q 123	Her	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con **NGC 7318B** — appaiono molto chiaramente i due nuclei stellari ravvicinati, distanti una 20-ina di secondi in direzione E-W e che in visione distolta paiono avviluppati in un unico alone orientato nella stessa direzione con dimensioni 60"×45" (nel 10" si vedeva solo una debole chiazza di dimensioni simili a quelle sopra riportate) — 450x.
NGC 7318B	gx	22h35m58s	+33°58.0'	q 123	Peg	24"	m. buona / m. buono	v. **NGC 7318A**
NGC 7319	gx	22h36m03s	+33°58.5'	q 123	Peg	24"	m. buona / m. buono	è la componente più debole del Quintetto — presenta una zona centrale molto tenue orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20" circonfusa da un alone evanescente grosso modo circolare con Ø di 45" (appariva elusivamente nel 10" a 126x) — 450x.
NGC 7320	gx	22h36m03s	+33°56.9'	q 123	Peg	24"	m. buona / m. buono	questa è invece la componente più facile del Quintetto — è allungata da NW a SE di dimensioni 90"×45" e con gradiente di luce molto basso; una stellina sovrapposta si trova all'interno della gx decentrata verso SE (nel 10", a 126x, dava talvolta l'impressione di un tenue nucleo stellare) — 450x.
NGC 7320C	gx	22h36m20s	+33°59.1'	q 123	Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale puntiforme appena percettibile c'è una stellina appena percettibile a 1' WNW; c'è una stellina molto debole a 1' NW e un'altra più evidente alla stessa distanza verso NE; è altresì nota come MCG+6-49-43 e si trova pochi primi a E del Quintetto di Stephan (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 7321	gx	22h36m28s	+21°37.3'	q 167	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, a momenti screziata se osservata a 450x; è orientata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina al bordo NW (la gx era facilmente visibile anche nel 16" a 270x).
NGC 7323	gx	22h36m53s	+19°08.6'	q 167	Peg	16"	buona / m. buono	facile, ma con gradiente di luce molto basso, diffusa, leggermente allungata da N a S con dimensioni 60"×50" — 270x.
NGC 7324	gx	22h37m01s	+19°08.8'	q 167	Peg	16"	buona / m. buono	più piccola di NGC 7323, presenta una tenue condensazione centrale quasi stellare, visibile a tratti, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SE — 270x.
NGC 7328	gx	22h37m29s	+10°31.9'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	debole, molto allungata da E a W per ~ 1.5' , di luminosità uniforme e relativamente compatta — 270x.
NGC 7330	gx	22h36m56s	+38°32.9'	q 123	Lac	24"	ottima / molto buono	molto diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso; presenta una condensazione centrale evidente e contrastata; c'è una stellina appena percettibile a S del bulge; una stellina abbastanza brillante si trova a 1' NW (già precedentemente osservata col 10" a 178x) — 450x.
NGC 7331	gx	22h37m04s	+34°25.0'	q 123	Peg	10"	ottima / buono	molto bella, estesa, orientata da N a S, di dimensioni 8'×3', con alto gradiente di luce, bulge brillante e diffuso; sembra una miniaturizzazione della Nebulosa di Andromeda. CURIOSITA': questa galassia possiede, nei dintorni, alcuni oggetti fantasma.
NGC 7332	gx	22h37m24s	+23°47.9'	q 167	Peg	16"	ottima / ottimo	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2.5'×0.5', con i bordi definiti, bulge brillante, ben contrastato sul disco e nucleo stellare — 270x.
NGC 7335	gx	22h37m19s	+34°26.9'	q 123	Peg	16"	buona / discreto	fa parte, assieme a NGC 7336, 7337 e 7340, di quel piccolo gruppo di 4 gx situate a E di NGC 7331 — debole, allungata all'incirca da N a S con dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; meglio contrastata a 188x.
NGC 7336	gx	22h37m22s	+34°28.9'	q 123	Peg	16"	buona / discreto	elusiva, visibile solo a momenti e con gran difficoltà a 188x, un paio di primi a N di NGC 7335; c'è una stellina a 1' verso S.
NGC 7337	gx	22h37m27s	+34°22.5'	q 123	Peg	16"	buona / discreto	debole e molto diffusa, pressoché circolare, con Ø di 45" e con nucleo puntiforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E; anche questa appare meglio contrastata a 188x.
NGC 7339	gx	22h37m47s	+23°47.2'	q 167	Peg	16"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 2'×0.5', basso gradiente di luce e appena più brillante all'interno; appare leggermente screziata a 270x.
NGC 7340	gx	22h37m44s	+34°24.6'	q 123	Peg	16"	buona / discreto	fa parte del quartetto situato a E di NGC 7331 — più brillante e compatta di NGC 7337, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a NNW — 188x.
NGC 7341	gx	22h39m06s	−22°40.0'	q 347	Aqr	16"	discreta / buono	piccola, compatta, con marcata condensazione centrale, forse allungata da E a W, ma è comunque difficile stabilirlo, perché l'intensa umidità crea un forte alone attorno a una stella molto brillante situata 1.5 a N — 188x.
NGC 7342	gx	22h38m13s	+35°29.9'	q 123	Peg	24"	ottima / molto buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di 1' scarso e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a ridosso W e una molto debole al bordo S (fa parte di un gruppo) — 450x.
NGC 7343	gx	22h38m38s	+34°04.3'	q 123	Peg	16"	ottima / buono	debole, rotonda, con Ø di 1' scarso, molto diffusa e appena più brillante verso l'interno; si trova al vertice rettangolo di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline: una a 1' NE e l'altra, più debole, alla stessa distanza a NW — 270x.
NGC 7344	gx	22h39m36s	−04°09.5'	q 257	Aqr	16"	buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di aspetto confuso, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a più di 1' verso NW — 270x.
NGC 7345	gx	22h38m45s	+35°32.5'	q 123	Peg	24"	ottima / molto buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15", con bulge diffuso ed evidente — 450x.
NGC 7346	gx	22h39m35s	+11°05.0'	q 212	Aqr	16"	buona / m. buono	piccola e debole, approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 270x.
NGC 7347	gx	22h39m56s	+11°01.7'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×30", di luminosità uniforme e facilmente visibile in visione distolta — 270x.
NGC 7348	gx	22h40m36s	+11°54.4'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, stemperata sul fondo cielo, allungata da N a S con dimensioni 50"×30" — 270x.
NGC 7349	gx	22h41m15s	−21°47.8'	q 348	Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, poco allungata da E a W, di dimensioni 1.5×1', con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti; c'è una stellina brillante ~ 3' verso ENE — 188x.
NGC 7351	gx	22h41m27s	−04°26.7'	q 258	Aqr	16"	buona / m. buono	facile, molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", con bulge evidente e diffuso — 270x.
NGC 7353	gx	22h39m37s	+11°46.2'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme che appare subito alla prima occhiata, dopo di che sembra svanire; è comunque estesa 1.5' in direzione NW-SE con una stellina brillante a ridosso verso SE — 270x.
NGC 7354	np	22h40m20s	+61°17.1'	q 34	Cep	10"	discreta / discreto	è di luminosità uniforme a bassi ingrandimenti, ma a 188x e in visione distolta appare a tratti con lievi discrepanze di luminosità; rotonda con Ø di ~ 40".
NGC 7356	gx	22h42m02s	+30°42.5'	q 123	Peg	16"	m. buona / scarso	debolissima, quasi elusiva, forse allungata da E a W per max 1'; c'è una stellina a ridosso verso S — 188x.
NGC 7357	gx	22h42m24s	+30°10.3'	q 123	Peg	16"	m. buona / scarso	debole, forse rotonda, ma di aspetto irregolare, diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso di NW e un'altra più debole e poco più distante a SE. Il campo è molto disturbato dalla luce intensa della η Pegasi di 3ª grandezza — 270x.
NGC 7359	gx	22h44m48s	−23°41.3'	q 348	Aqr	16"	buona / buono	relativamente brillante, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×30", con bulge brillante, diffuso e nucleo puntiforme — 188x.
NGC 7360	gx	22h43m34s	+04°09.1'	q 258	Peg	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, con nucleo stellare visibile solo a momenti, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 7361	gx	22h42m18s	−30°03.5'	q 384	PsA	10"	buona / m. buono	molto debole e molto allungata da N a S per ~ 3', diffusa; situata a 5' o 6' E di una stella brillante di 8ª grandezza.
NGC 7362	gx	22h43m49s	+08°42.3'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa ai bordi e con evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 7363	gx	22h43m18s	+34°00.0'	q 123	Peg	16"	m. buona / scarso	debole chiazza di luminosità uniforme, pressoché circolare e con Ø < 1' — 188x.
NGC 7364	gx	22h44m24s	−00°09.7'	q 258	Aqr	16"	buona / m. buono	facile, diffusa, più brillante verso l'interno, poco allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 7365	gx	22h45m10s	−19°57.1'	q 348	Aqr	16"	buona / buono	rotonda con Ø di 1' scarso, alto gradiente di luce e con condensazione centrale ben evidente — 188x.
NGC 7366	gx	22h44m27s	+10°46.9'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	debolissima! Si vede come una piccola chiazza circolare di 20 o 30 secondi max di Ø; in visione diretta va e viene, ma tende ad apparire di aspetto stellare — 270x.
NGC 7367	gx	22h44m34s	+03°38.8'	q 258	Peg	16"	buona / m. buono	debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 270x.
NGC 7369	gx	22h44m12s	+34°21.1'	q 123	Peg	16"	m. buona / m. buono	è un debole lucore di luminosità uniforme "schiacciato" tra 2 stelline distanti1'.5; la galassia arriva quasi a lambirle — 270x.
NGC 7370	gx	22h45m37s	+11°03.5'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, estesa max 15 o 20 secondi; appare solo a momenti in visione distolta a 270x.
NGC 7371	gx	22h46m04s	−11°00.1'	q 303	Aqr	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di 1.5', gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una doppia a 2' verso SE — 380x.
NGC 7372	gx	22h45m46s	+11°07.9'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	debole, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" (la visione è un po' disturbata dalla SAO 108159 di magnitudo 6.6 situata a 4.5' NNE) — 270x.
NGC 7373	gx	22h46m19s	+03°12.6'	q 258	Peg	16"	buona / m. buono	debole, relativamente compatta, con nucleo stellare visibile a tratti; è allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" — 270x.
NGC 7374	gx	22h46m01s	+10°51.2'	q 213	Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è situata in una piccola zona depleta, per cui è meglio scalare a 340x; c'è una stellina a 1' scarso NNW che da un controllo successivamente effettuato si trova in corrispondenza di CGCG 430-5: probabilmente la stella offusca il piccolo e tenuissimo alone della gx (che il Megastar riporta di magnitudo 15.8!), la quale è visibile a mala pena in visione distolta a 450x.
NGC 7375	gx	22h46m32s	+21°05.0'	q 168	Peg	16"	m. buona / ottimo	facile, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 7376	gx	22h47m17s	+03°38.7'	q 258	Peg	16"	buona / m. buono	debolissima, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, situata pochi secondi a S di una stellina — 270x.
NGC 7377	gx	22h47m47s	−22°18.7'	q 348	Aqr	10"	buona / buono	debole, approssim. rotonda con Ø di un paio di primi, gradatamente più brillante verso l'interno e molto diffusa ai bordi.
NGC 7378	gx	22h47m48s	−11°49.0'	q 303	Aqr	16"	buona / buono	allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; è situata 4' WNW di una stellina brillante — 188x.
NGC 7379	gx	22h47m33s	+40°14.4'	q 87	Lac	16"	m. buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale; è allineata con 2 stelline situate a SE; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso E — 270x.
NGC 7380	aa	22h47m00s	+58°06.0'	q 58	Cep	6"	non registrati	è un curioso oggetto a forma di "V" col vertice che punta a SW.
NGC 7381	gx	22h50m08s	−19°43.5'	q 348	Aqr	16"	buona / buono	debolissima galassietta rotonda, diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 7383	gx	22h49m36s	+11°33.4'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	fa parte di un piccolo gruppo esteso una dozzina di primi — debole, ma facile da vedere, approssim. circolare, con Ø di una 40-ina di secondi e poco più luminosa all'interno — 270x.
NGC 7384	gx	22h49m46s	+11°33.2'	q 213	Peg	24"	buona / m. buono	piccola, debole e condensata, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
NGC 7385	gx	22h49m55s	+11°36.5'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	è la più luminosa di un piccolo gruppo esteso una dozzina di primi, rotonda, con Ø di 1' con bulge brillante e diffusa; c'è una stellina a 1' verso NW — 270x.
NGC 7386	gx	22h50m02s	+11°41.9'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	presenta un bulge luminoso e un tenue alone circonfuso orientata da NW a SE, di dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 7387	gx	22h50m18s	+11°38.2'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e con un nucleo di aspetto quasi stellare — 270x.
NGC 7388	gx	22h50m08s	+11°43.4'	q 213	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debolissima e condensata, forse rotonda con Ø di una decina di secondi; appare in visione distolta a 1' W di una stellina abbastanza brillante — 450x.
NGC 7389	gx	22h50m16s	+11°34.0'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	è di aspetto e dimensioni simili alla 7387, salvo il fatto che il nucleo è più diffuso e poco meno contrastato — 270x.
NGC 7390	gx	22h50m19s	+11°31.9'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	molto debole, approssim. circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 7391	gx	22h50m36s	−01°32.7'	q 258	Aqr	16"	buona / m. buono	brillante, con alto gradiente di luce, rotonda con Ø > 1'; presenta un bulge marcato e un nucleo stellare; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso N — 270x.
NGC 7392	gx	22h51m49s	−20°36.4'	q 348	Aqr	10"	buona / buono	debole, abbastanza compatta, più facilmente visibile a 178x; è poco allungata da NW a SE, con dimensioni 1.5'×1' e piuttosto irregolare in brillanza.
NGC 7393	gx	22h51m38s	−05°33.5'	q 258	Aqr	16"	buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 90"×45" — 188x.
NGC 7394	aa	22h50m24s	+52°09.0'		Lac	28"	buona / ottimo	gruppo disperso di stelle di luminosità molto diseguale; le 7 od 8 più brillanti sono disposte grosso modo a "Y" con un apice sulla destra *(non è riportato sull'Uranometria)* — 179x.
NGC 7395	gx	22h51m03s	+37°05.3'	q 123	Lac	16"	m. buona / discreto	debole ovale di dimensioni 60"×45"; è orientata da E a W e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 7396	gx	22h52m23s	+01°05.6'	q 258	Psc	16"	buona / ottimo	è la più brillante di un gruppo di 5 gx (di cui, però, ne ho viste solo 4). È allungata da E a W, di dimensioni 90"×45", dai bordi un po' confusi e con basso gradiente di luce — 380x.
NGC 7397	gx	22h52m47s	+01°08.0'	q 258	Psc	16"	buona / ottimo	debole, forse poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e nucleo puntiforme visibile a tratti — 380x.
NGC 7398	gx	22h52m49s	+01°12.0'	q 258	Psc	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, di luminosità uniforme ed estesa una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 7399	gx	22h52m39s	−09°16.0'	q 303	Aqr	16"	buona / buono	piccola, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30", con nucleo evidente quasi stellare; è situata ~ 1' S di una stellina brillante — 188x.
NGC 7401	gx	22h52m58s	+01°08.5'	q 258	Psc	16"	buona / ottimo	è un debolissimo lucore vagamente circolare, con Ø di 1', visibile a tratti un paio di primi NE di una stellina di 14-esima grandezza — 380x.
NGC 7402	gx	22h53m04s	+01°08.7'	q 258	Aqr	24"	m. buona / m. buono	è la più debole di un quartetto di galassie osservate in altra data col 16" e che non ero riuscito a vedere con quello strumento — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata 1.5' a E di NGC 7401 — 450x.
NGC 7405	gx	22h52m57s	+12°35.6'	q 213	Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
NGC 7406	gx	22h53m56s	−06°34.7'	q 303	Aqr	16"	buona / buono	piccola, compatta, coi bordi abbastanza incisi, allungata ~ da NE a SW, di dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso SSW — 188x.
NGC 7407	gx	22h53m21s	+32°07.8'	q 123	Peg	24"	ottima / molto buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; c'è una doppia abbastanza stretta a 1' SE; più interessante se si scala a 340x.
NGC 7409	gx	22h53m48s	+20°12.6'	q 168	Peg	24"	m. buona / discreto	più debole e più piccola di NGC 7411, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 450x.
NGC 7411	gx	22h54m35s	+20°14.2'	q 168	Peg	24"	m. buona / discreto	brillante, rotonda e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare — 450x.
NGC 7413	gx	22h55m03s	+13°13.2'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	è una piccola galassia circolare, con Ø di una 30-ina di secondi poco più brillante al centro — 270x.
NGC 7414	gx	22h55m24s	+13°14.9'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	è un altra debolissima galassietta che appare solo a momenti in visione distolta a 380x, di aspetto quasi stellare, con dimensioni di ~ 10"; c'è una stellina doppia dalle componenti serrate a 3' SE — 270x.
NGC 7415	gx	22h54m54s	+20°15.7'	q 168	Peg	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con MCG+3-58-11 situata a ridosso W; le due gx si separano un po' a fatica anche a 450x (e tutto sommato appaiono meglio contrastate scalando a 340x); la NGC è molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; la MCG è poco più evidente e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
NGC 7416	gx	22h55m42s	−05°29.7'	q 258	Aqr	16"	buona / discreto	molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 2'×30"; presenta un piccolo bulge luminoso, abbastanza contrastato sul disco che si nota con facilità anche in visione diretta — 188x.
NGC 7419	aa	22h54m20s	+60°48.8'	q 58	Cep	28"	buona / ottimo	gruppo relativamente compatto di una 40-ina di stelle di luminosità molto eterogenea; la parte più ricca è orientata da NW a SE ed è delimitata a NW da una stellina brillante (da non confondere con la SAO 20306 di magnitudo 8.5 situata appena all'esterno verso NW); questa zona ha dimensioni ~ 4'×2' (già precedentemente osservato dal Comet-Tracker nel quale, a 90x, appariva molto granulato) — 495x.
NGC 7420	gx	22h55m32s	+29°48.3'	q 213	Peg	16"	m. buona / m. buono	piccola galassia rotonda con Ø di ~ 45", con una piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso di WSW — 270x.
NGC 7422	gx	22h56m12s	+03°55.6'	q 258	Psc	16"	buona / m. buono	è una debole galassia circolare abbastanza compatta con Ø di una 40-ina di secondi e con gradiente di luce molto basso; è comunque visibile senza difficoltà — 270x.
NGC 7423	aa	22h55m08s	+57°05.8'		Cep	28"	buona / ottimo	è praticamente delimitato da 3 stelle brillanti orientate da E a W; al centro ce ne sono 5 poste a "U, mentre verso N si nota una piccola struttura finemente screziata; le dimensioni dell'ammasso sono di circa 4' *(non è riportato sull'Uranometria)* — 495x.
NGC 7425	gx	22h57m15s	−10°57.0'	q 303	Aqr	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa, allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×30" e basso gradiente di luce — 340x.
NGC 7426	gx	22h56m03s	+36°21.7'	q 123	Lac	16"	m. buona / discreto	gx facile, poco allungata da E a W, dai bordi molto stemperati e con bulge brillante estesa nella stessa direzione; di dimensioni 80"×50" è fortemente disturbata dalla luce di una stella brillante di 4ª grandezza situata 4' a W — 270x.
NGC 7427	gx	22h57m10s	+08°30.4'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, piccola, rotonda, con Ø massimo di 30", osservabile in visione distolta, mentre con quella diretta appare solo il nucleo di aspetto stellare — 270x.
NGC 7428	gx	22h57m20s	−01°02.9'	q 258	Psc	16"	buona / m. buono	rotonda, diffusa ai bordi, con Ø di ~ 45" e con nucleo stellare ben evidente — 270x.
NGC 7429	aa	22h55m54s	+59°59.0'	q 58	Cas	28"	buona / ottimo	gruppo disperso di un 20-ina di stelle; la parte maggiormente condensata è formata da una dozzina di componenti che sembra quasi a costituire un gruppo a sé (l'ammasso era già stato osservato nel Comet-Tracker a 56x) — 179x.
NGC 7430	gx	22h57m30s	+08°47.7'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	poco più brillante di NGC 7429, ma di luminosità più uniforme, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con una stellina appena percettibile a ridosso di SE — 270x.
NGC 7431	gx	22h57m52s	+26°09.7'	q 168	Peg	24"	m. buona / m. buono	è un baffo di luminosità uniforme, molto debole, orientato da NE a SW ed esteso una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S — 450x.
NGC 7432	gx	22h58m02s	+13°08.1'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	debole, ma facilmente visibile, approssim. circolare, con Ø di ~ 1' con piccola condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 7433	gx	22h57m56s	+26°09.0'	q 168	Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; in visione distolta appare immersa nell'alone di NGC 7436 — 450x.
NGC 7434	gx	22h58m21s	−01°11.0'	q 258	Aqr	16"	buona / m. buono	molto debole e piccola, ma visibile senza difficoltà in visione distolta in quanto compatta; è di luminosità uniforme ed è poco allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 270x.
NGC 7435	gx	22h57m54s	+26°08.3'	q 168	Peg	24"	m. buona / m. buono	è situata a ridosso SW di NGC 7436, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" una stellina appena percettibile appare a momenti; c'è una debole stellina al bordo settentrionale; un'altra stellina appena percettibile, a tratti diffusa, appare a momenti verso E: quest'ultima, da un controllo successivamente effettuato è poi risultata essere la MCG+4-54-7 — 450x.
NGC 7436	gx	22h57m57s	+26°09.0'	q 168	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' — 450x.
NGC 7437	gx	22h58m10s	+14°18.5'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	debole lucore pressoché circolare, di luminosità uniforme, molto stemperato sul fondo cielo e con Ø poco inferiore alla distanza delle 2 stelline brillanti situate a N — 270x.
NGC 7438	aa	22h57m36s	+54°21.0'		Cas	28"	buona / ottimo	è un piccolo gruppo abbastanza insignificante nel quale spiccano 6 stelline brillanti che formano una sorta di "freccia" curvilinea (la punta è costituita da un piccolo triangolo equilatero); un altro triangolo equilatero più grande si trova subito a W, ma soltanto la componente orientale fa parte dell'ammasso *(non è riportato sull'Uranometria)* — 495x.
NGC 7439	gx	22h58m10s	+29°13.7'	q 123	Peg	16"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto diffuso, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; presenta una condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
NGC 7440	gx	22h58m32s	+35°48.2'	q 123	And	16"	m. buona / discreto	molto debole, forse poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45", di luminosità uniforme salvo un piccolissimo nucleo stellare visibile solo a momenti — 270x.
NGC 7441	gx	22h59m29s	−07°03.3'	q 303	Aqr	16"	buona / buono	debole, assai diffusa, con condensazione centrale evidente, approssim. circolare con Ø di 45"; è situata a meno di 2' SW di una stellina brillante — 188x.
NGC 7442	gx	22h59m26s	+15°32.9'	q 213	Peg	16"	buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, ma di aspetto un po' confuso; forse circolare con Ø di 1' — 270x.
NGC 7443	gx	23h00m09s	−12°48.5'	q 303	UMi	24"	buona / buono	assieme a NGC 7444 forma una coppia di gx distanti un paio di primi in direzione N-S; la 1ª ha nucleo puntiforme brillante ed è allungata da NE a SW per 1.5'; la 2a,che è di aspetto simile, presenta pure un nucleo stellare, un po' meno brillante ed è molto allungata da N a S, sempre per 1.5'; entrambe paiono comunque poste di taglio — 188x.
NGC 7444	gx	23h00m09s	−12°50.0'	q 303	Aqr	16"	buona / buono	v. **NGC 7443**
NGC 7445	gx	22h59m22s	+39°06.5'	q 88	And	24"	m. buona / m. buono	fa parte di un terzetto assieme a NGC 7446 ed NGC 7449 — debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15", poco diffusa e con piccola condensazione centrale molto tenue; allineata ed equidistante con due stelline a E distanti 1.5' — 450x.
NGC 7446	gx	22h59m29s	+39°05.0'	q 88	And	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' N — 450x.
NGC 7448	gx	23h00m04s	+15°58.8'	q 213	Peg	10"	ottima / buono	facile, allungata da N a S, di dimensioni 2'×1', ma con basso gradiente di luce.
NGC 7449	gx	22h59m37s	+39°08.8'	q 88	And	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo marcato di aspetto stellare — 450x.
NGC 7450	gx	23h00m48s	−12°55.1'	q 303	Aqr	16"	buona / buono	piuttosto debole e diffusa, ma con condensazione centrale relativamente brillante; è rotonda con Ø di ~ 1' — 188x.
NGC 7451	gx	23h00m41s	+08°28.1'	q 213	Peg	16"	buona / mediocre	è una gx molto debole, ma al momento dell'osservazione era alta solo 15o sull'orizzonte; è molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con gradiente di luce molto basso di luce — 270x.
NGC 7452	gx	23h00m47s	+06°44.7'	q 213	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi *(presenza residua di chiarore lunare)* — 450x.
NGC 7454	gx	23h01m06s	+16°23.3'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	relativamente brillante, molto diffusa, con alto gradiente di luce, poco allungata da NW a SE, con dimensioni 80"×50"; forma un piccolo triangolo isoscele rettangolo con 2 stelline — 270x.
NGC 7455	gx	23h00m41s	+07°18.2'	q 213	Psc	16"	buona / mediocre	debole, leggermente allungata ~ da N a S, di dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso SE — 270x.
NGC 7457	gx	23h01m00s	+30°08.7'	q 124	Peg	24"	m. buona / ottimo	bella, molto diffusa, screziata nell'alone, allungata da NW a SE con dimensioni 3'×1.5; presenta un bulge abbastanza contrastato di 45"×30" e un nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso del bulge verso W; più interessante a 340x.
NGC 7458	gx	23h01m29s	+01°45.2'	q 258	Psc	16"	buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' e poco più brillante all'interno; c'è una stellina a oltre 1' verso E — 270x.
NGC 7460	gx	23h01m43s	+02°15.8'	q 258	Peg	16"	buona / m. buono	è una debole bolla approssim. rotonda con bassissima luminanza superficiale e con Ø di ~ 1' — 270x.
NGC 7461	gx	23h01m48s	+15°34.9'	q 213	Peg	10"	ottima / discreto	debolissima, assai stemperata sul fondo cielo, ma con una evidente condensazione centrale osservabile in visione distolta a 178x; si trova al vertice rettangolo di un triangolo formato con 2 stelline; una a un paio di primi WSW e l'altra, più debole, a una distanza poco maggiore verso NNW.
NGC 7463	gx	23h01m52s	+15°58.9'	q 213	Peg	10"	m. buona / discreto	è un debole ovale diffuso orientata da E a W, di dimensioni 90"×30" e con piccola condensazione centrale visibile a 178x.

NGC 7464	gx	23h01m54s	+15°58.4'	q 213	Peg	16"	buona / ottimo	galassietta di forma un po' irregolare, di luminosità uniforme e di dimensioni max di 20"; è situata praticamente a ridosso di SE di NGC 7463 — 380x.
NGC 7465	gx	23h02m01s	+15°57.9'	q 213	Peg	10"	m. buona / discreto	situata un paio di primi a SE di NGC 7463, è più piccola, forse circolare con Ø < 1' e marcata condensazione centrale visibile anche in visione diretta a 178x.
NGC 7466	gx	23h02m03s	+27°03.1'	q 168	Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale molto diffusa — 270x.
NGC 7467	gx	23h02m27s	+15°33.2'	q 213	Peg	16"	buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, relativamente compatta e con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 30" SE che si vede a momenti a 380x.
NGC 7468	gx	23h02m59s	+16°36.3'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	è una galassietta di dimensioni 30"×20" orientata da NNE a SSW — 270x.
NGC 7469	gx	23h03m16s	+08°52.5'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	non si capisce se presenta un nucleo molto brillante e puntiforme o se trattasi semplicemente di una stellina sovrapposta; bisogna impiegare la visione distolta per scorgerne il debolissimo alone — 270x.
NGC 7473	gx	23h03m57s	+30°09.6'	q 124	Peg	16"	nottata umidissima e ventosa	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20 ; c'è una debole stellina a una 30-ina di secondi verso N e un'altra d luminosità simile a oltre 1' W — 188x.
NGC 7474	gx	23h04m04s	+20°04.0'	q 168	Peg	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare molto evidente — 450x.
NGC 7475	gx	23h04m10s	+20°04.7'	q 168	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso; presenta un tenue nucleo stellare poco meglio evidente scalando a 340x.
NGC 7478	gx	23h04m57s	+02°34.6'	q 258	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 7479	gx	23h04m57s	+12°19.3'	q 213	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto bella e di forma irregolare, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo quasi stellare; presenta una barra interna molto contrastata orientata da N a S ed estesa almeno un paio di primi, che s'incurva verso SW per poi sfilacciarsi e stemperarsi in un debole alone circonfuso; quest'ultimo, in visione distolta, appare più evidente a E della barra; ci sono 3 stelline sovrapposte, di cui una abbastanza brillante al bordo N; a queste se ne aggiunge una quarta appena percettibile al margine opposto; la gx sembra debolmente screziata nella parte interna se osservata a 450x (già precedentemente osservata col 10" a 178x in condizioni di visibilità analoghe).
NGC 7480	gx	23h05m13s	+02°33.0'	q 258	Psc	16"	m. buona / ottimo	situata 5' a SE di NGC 7478 è una gx relativamente facile, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con bulge evidente e diffuso — 270x.
NGC 7482	gx	23h05m38s	+03°03.5'	q 258	Psc	16"	m. buona / ottimo	abbastanza brillante, rotonda, diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi-50", gradiente di luce medio e condensazione centrale evidente — 270x.
NGC 7483	gx	23h05m48s	+03°32.7'	q 258	Psc	16"	buona / m. buono	abbastanza facile, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 80"×30"; presenta bulge evidente e nucleo stellare visibile a tratti — albeggia: è l'ultima gx osservata nella notte — 270x.
NGC 7484	gx	23h03m05s	−36°16.5'	q 385	Scl	16"	buona / buono	rotonda relativamente brillante e poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso verso S — 270x.
NGC 7485	gx	23h06m05s	+34°06.5'	q 124	Peg	24"	m. buona / buono	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con alto condensazione centrale abbastanza marcata; una debole doppia serrata situata 2' scarsi a E dà a prima vista l'impressione di un piccolo oggetto nebuloso — 340x.
NGC 7486	gx	23h06m07s	+34°04.5'	q 124	Peg	24"	m. buona / buono	appare come una debolissima stellina sfuocata quasi a ridosso NW di una stellina evidente — 450x.
NGC 7487	gx	23h06m51s	+28°10.7'	q 124	Peg	16"	nottata molto umida e ventosa	debole e molto diffusa, approssim. circolare con Ø di 1' scarso e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso WNW — 188x.
NGC 7488	gx	23h07m49s	+00°56.5'	q 258	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 7489	gx	23h07m33s	+22°59.8'	q 168	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
NGC 7490	gx	23h07m25s	+32°22.5'	q 124	Peg	16"	nottata molto umida e ventosa	presenta un piccolo nucleo brillante circonfuso da un tenue alone, rotondo, con Ø di ~ 1', ma non uniforme in brillanza (come se fossero presenti alcune stelline irrisolte sul disco); una stellina si trova quasi a ridosso del bordo settentrionale — 188x.
NGC 7492	ag	23h08m27s	−15°36.7'	q 303	Aqr	16"	ottima / buono	molto debole, esteso e molto stemperato sul fondo cielo; a prima vista ricorda NGC 5053 nella Coma — 75x.
NGC 7494	gx	23h08m58s	−24°22.1'	q 348	Aqr	16"	buona / buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e una condensazione centrale molto tenue; si fatica a vedere perché tenendola al centro dell'oculare il campo è depleto — 188x.
NGC 7495	gx	23h08m57s	+12°02.9'	q 213	Peg	16"	buona / m. buono	è una debole bolla circolare con Ø maggiore di 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso del bordo NW — 270x.
NGC 7497	gx	23h09m04s	+18°10.7'	q 168	Peg	24"	m. buona / m. buono	bella, ma poco contrastata sul fondo cielo, screziata a 340x, orientata da NE a SW, estesa oltre 3' e spessa 1' scarsi; c'è una debole stellina al bordo NE (era debolmente osservabile nel 10" a 178x in condizioni di trasparenza simili).
NGC 7498	gx	23h09m56s	−24°25.5'	q 348	Aqr	16"	buona / m. buono	è un debolissima galassietta visibile a tratti in visione distolta, situata 5' SSW di una stellina brillante; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' NE — 188x.
NGC 7499	gx	23h10m22s	+07°34.8'	q 213	Psc	16"	buona / mediocre	fa parte di un terzetto assieme a NGC 7499 ed NGC 7503 situato in una piccola zona depleta — approssim. rotond. con Ø di 1' e un'evidente condensazione centrale — 270x.
NGC 7500	gx	23h10m30s	+11°00.7'	q 213	Peg	10"	ottima / m. buono	è una galassia molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 45" e con tenue condensazione centrale visibile a 178x.
NGC 7501	gx	23h10m30s	+07°35.4'	q 213	Psc	16"	buona / mediocre	fa parte di un terzetto assieme a NGC 7499 ed NGC 7503 — rispetto alla prima elencata è più debole e di Ø un poco inferiore, ossia attorno a 50" — 270x.
NGC 7503	gx	23h10m42s	+07°34.1'	q 213	Psc	16"	buona / mediocre	fa parte di un terzetto assieme a NGC 7499 ed NGC 7503 — è di dimensioni analoghe alla prima elencata ed è quella che presenta la condensazione centrale più marcata — 270x.
NGC 7505	gx	23h11m01s	+13°37.9'	q 213	Peg	16"	buona / ottimo	è una piccola galassia molto debole, ma abbastanza compatta, in visione distolta appare orientata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente — 270x.
NGC 7506	gx	23h11m41s	−02°09.6'	q 258	Psc	16"	m. buona / ottimo	allungata da E a W, molto diffusa, con basso gradiente di luce e dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 7507	gx	23h12m08s	−28°32.3'	q 385	Scl	10"	ottima / discreto	poco diffusa, rotonda, con Ø di un paio di primi e condensazione centrale molto marcata.
NGC 7508	gx	23h11m49s	+12°56.4'	q 213	Peg	16"	ottima / discreto	è un galassietta allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti; il nucleo appare decentrato verso N; c'è una stellina molto debole a ~ 1' NE — 270x.
NGC 7509	gx	23h12m21s	+14°36.6'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	relativamente brillante e diffusa, rotonda, con alto gradiente di luce e un Ø di 1' scarso— 270x.
NGC 7510	aa	23h11m04s	+60°34.1'	q 58	Cas	10"	buona / buono	gruppetto molto serrato di stelle, le cui componenti principali ricordano una Ny greca orientata da E a W; una stella più brillante si trova a ridosso verso E di tale lettera.
NGC 7511	gx	23h12m26s	+13°43.6'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE, dimensioni 40"×30"; una debole stellina che va e viene è ridosso verso N — 270x.
NGC 7512	gx	23h12m21s	+31°07.6'	q 124	Peg	16"	nottata molto umida e ventosa	debole e diffusa, approssim. circolare con Ø inferiore a 1' e condensazione centrale ben evidente a 188x (nonostante le raffiche di vento!).
NGC 7513	gx	23h13m14s	−28°21.4'	q 385	Aqr	16"	buona / buono	estesa, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 90"×70" — 188x.
NGC 7514	gx	23h12m26s	+34°52.9'	q 124	Peg	16"	nottata molto umida e ventosa	è una sorta di bolla pressoché circolare con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e con bassa luminosità superficiale; è situata 3' S della SAO 73084 di 9ª grandezza — 188x.
NGC 7515	gx	23h12m48s	+12°40.8'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, estesa, con alto gradiente di luce, diffusa, approssim. circolare con Ø superiore a 1' e bulge ben evidente — 270x.
NGC 7516	gx	23h12m52s	+20°14.9'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	presenta un bulge abbastanza brillante e un debolissimo alone circonfuso con Ø di 1' che si riesce ad apprezzare nella sua interezza solo in visione distolta — 380x.
NGC 7517	gx	23h13m14s	−02°06.0'	q 259	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, situata 1' scarso a E di una stellina abbastanza brillante; a tratti, osservando a 380x, appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 270x.
NGC 7518	gx	23h13m13s	+06°19.3'	q 214	Psc	16"	buona / mediocre	debole gx abbastanza compatta, ma con gradiente di luce molto basso di luce; è allungata da E a W e di dimensioni 45"×30" — 270x.
NGC 7519	gx	23h13m11s	+10°46.3'	q 214	Peg	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" (appariva elusivamente nel 10" a 178x in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 7521	gx	23h13m35s	−01°43.9'	q 259	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda, poco diffusa, con nucleo stellare evidente e un Ø di una 30-ina di secondi (è sorta la Luna) — 270x.
NGC 7523	gx	23h13m35s	+13°59.2'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	molto debole, ma visibile a tratti come un baffo di luce uniforme che si diparte verso S dalla più brillante di una coppia di stelline dalle componenti molto serrate — 270x.
NGC 7524	gx	23h13m46s	−01°43.9'	q 259	Psc	16"	m. buona / ottimo	situata 3' a E della 7521 è una gx debolissima, diffusa e stemperata sul fondo cielo, allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 270x.
NGC 7525	gx	23h13m40s	+14°01.2'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	debole, piccola, poco diffusa, approssim. circolare con Ø max di 20" o 30" — 270x.
NGC 7527	gx	23h13m42s	+24°54.1'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	è un ovale allungata da NNW a SSE, di dimensioni 45"×30" che presenta una condensazione centrale brillante e puntiforme — 380x.
NGC 7528	gx	23h14m20s	+10°13.9'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	galassietta rotonda molto debole, con Ø di una 30-ina di secondi osservabile meglio a 270x, ma ben visibile anche a 188x.
NGC 7529	gx	23h14m03s	+08°59.5'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, approssim. rotonda, Ø di 30", situata 4' W di una stellina brillante — 270x.
NGC 7530	gx	23h14m12s	−02°46.8'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	fa parte assieme a NGC 7532 ed NGC 7534 di un terzetto orientato in direzione NNE-SSW — molto debole, ma visibile senza difficoltà in visione distolta, rotonda, diffusa con Ø max di 30" — 380x.
NGC 7532	gx	23h14m22s	−02°43.7'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	piccola, compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con bulge abbastanza marcato — 380x.
NGC 7533	gx	23h14m22s	−02°02.0'	q 259	Psc	16"	m. buona / ottimo	ancora più debole della 7517 e poco più piccola; in visione distolta, a 380x, sembra orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (è sorta la Luna) — 270x.
NGC 7534	gx	23h14m26s	−02°41.9'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	fa parte del terzetto di NGC 7530 — debole ovale di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 40"×20" che sembra dipartirsi verso N da una stellina relativamente brillante — 380x.
NGC 7535	gx	23h14m13s	+13°35.0'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso verso SW — 270x.
NGC 7536	gx	23h14m13s	+13°25.6'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	è un debole ovale di luminosità uniforme allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30", visibile abbastanza facilmente pur essendo a bassa luminanza superficiale — 270x.
NGC 7537	gx	23h14m35s	+04°29.9'	q 259	Psc	10"	m. buona / discreto	costituisce una coppia ravvicinata con NGC 7541 situata 3' NE — debole, molto allungata da E a W per un paio di primi scarsi e di luminosità pressoché uniforme; meglio visibile a 178x.
NGC 7538	neb	23h13m42s	+61°31.1'	q 34	Cep	16"	ottima / ottimo	è un alone ellittico orientato grosso modo da NE a SW che circonda 3 stelline di cui un paio abbastanza brillanti separate da 30" e orientate nello stesso senso; l'alone è tuttavia leggermente asimmetrico, ossia spostato verso SW — osservata a 132x con filtro deepsky.
NGC 7539	gx	23h14m29s	+23°41.1'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, con alto gradiente di luce e poco diffusa; è rotonda con Ø di ~ 1' — 380x.
NGC 7540	gx	23h14m36s	+15°57.0'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	galassietta di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 7541	gx	23h14m43s	+04°32.0'	q 259	Psc	10"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1' e con marcata condensazione centrale visibile anche in visione diretta; c'è una stellina al bordo orientale — 178x.
NGC 7542	gx	23h14m42s	+10°38.6'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	debole galassietta abbastanza compatta, di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; solo a momenti appare una tenue condensazione centrale — 270x.
NGC 7543	gx	23h14m34s	+28°19.6'	q 124	Peg	16"	nottata molto umida e ventosa	debole, approssim. circolare, con Ø di ~ 1', assai diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a 1.5' verso NE — 188x.
NGC 7544	gx	23h14m57s	−02°12.0'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	è debolissima, ma in visione distolta appare chiaramente allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; anche a 380x non riesco tuttavia a capire se c'è una stellina a ridosso o se presenta un nucleo stellare.
NGC 7546	gx	23h15m06s	−02°19.5'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	altra gx debolissima visibile in visione distolta, rotonda, diffusa e con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 7547	gx	23h15m03s	+18°58.4'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", poco più brillante all'interno — 380x.
NGC 7548	gx	23h15m11s	+25°17.0'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa; presenta un bulge evidente e un tenue alone approssim. circolare con Ø di 45" — 380x.
NGC 7549	gx	23h15m17s	+19°02.5'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45"; presenta una barra interna più brillante orientata ~ NW-SE — 380x.
NGC 7550	gx	23h15m16s	+18°57.7'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	bella, rotonda con Ø di 1'; presenta un bulge evidente e un nucleo brillante — 380x.
NGC 7554	gx	23h15m41s	−02°22.8'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	appare facilmente in visione distolta a ~ 1' di distanza W di NGC 7556; pur essendo piccolissima, quasi stellare a bassi ingrandimenti, data la bontà del seeing, appariva chiaramente nebulosa a 380x, con dimensioni di 10" o 15" — 380x.
NGC 7556	gx	23h15m44s	−02°22.9'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×50"; c'è una stellina a ridosso verso S visibile solo a momenti a 380x.
NGC 7557	gx	23h15m40s	+06°42.5'	q 214	Psc	16"	buona / m. buono	debole, ma facilmente visibile a 270x, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 7558	gx	23h15m38s	+18°55.2'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
NGC 7559	gx	23h15m47s	+13°17.4'	q 214	Peg	16"	m. buona / ottimo	rotonda, poco diffusa, con Ø ~ 1' e con piccolo nucleo stellare; c'è una stellina a 1' scarso verso NE — 380x.
NGC 7559A	gx	23h15m46s	+13°17.8'	q 214	Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, rotonda con Ø max di 15"-20" e di luminosità uniforme; appare solo a momenti a 380x fissando il nucleo di NGC 7559.
NGC 7562	gx	23h15m57s	+06°41.3'	q 214	Psc	16"	buona / m. buono	è una bella gx abbastanza brillante, con alto gradiente di luce; è allungata da E a W di dimensioni 60"×45" — 270x.
NGC 7562A	gx	23h16m01s	+06°39.1'	q 214	Psc	24"	buona / m. buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, estesa per 1' scarso e orientata da N a S; appare con molta difficoltà forse per il fatto che il campo è disturbato da una coppia di stelle brillante a SE — 450x.
NGC 7563	gx	23h15m56s	+13°11.7'	q 214	Peg	16"	m. buona / ottimo	presenta una marcata condensazione centrale molto brillante dalla quale si dipartono 2 baffi, a E e a W, per una dimensione di ~ 1'; questi baffi sono molto sfumati ma evidenti anche in visione diretta a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso WNW (da un controllo effettuato successivamente ho verificato che in realtà ho osservato solo la barra; forse a causa dell'umidità eccessiva ho perso l'alone).
NGC 7564	gx	23h15m38s	+07°18.7'	q 214	Psc	16"	buona / m. buono	molto debole e di dimensioni massime di 30"; appare solo a momenti in visione distolta — 270x.
NGC 7566	gx	23h16m37s	−02°19.8'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, con basso gradiente di luce, allungata ~ da E a W, situata tra 2 stelline deboli orientate nello stesso modo e distanti 1'; in visione distolta lambisce entrambe le stelline risultando così di dimensioni 60"×40" — 380x.
NGC 7567	gx	23h16m11s	+15°51.1'	q 214	Peg	24"	ottima / ottimo	lama di luce poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa 1' — 450x.
NGC 7568	gx	23h16m25s	+24°29.8'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme e bassissima luminanza superficiale; dovrebbe essere estesa meno di 1', ma non si riesce a capire l'orientamento — 380x.
NGC 7570	gx	23h16m45s	+13°29.0'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	debole, orientata da NE a SW, presenta un bulge diffuso abbastanza luminoso e un tenuissimo alone molto stemperato di 80"×40"; c'è una stellina nell'alone a una 30-ina di secondi verso SW — 270x.
NGC 7572	gx	23h16m50s	+18°29.0'	q 169	Peg	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza luminosa a 1' verso NE (osservabile, seppure molto debolmente, anche nel 16" a 270x) — 450x.
NGC 7573	gx	23h16m26s	−22°09.3'	q 349	Aqr	16"	buona / buono	bolla circolare poco diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di 45" — 270x.
NGC 7576	gx	23h17m23s	−04°43.6'	q 259	Aqr	16"	m. buona / ottimo	facile, poco diffusa, gradatamente più brillante all'interno, leggermente allungata da N a S con dimensioni 60"×50" — 270x.
NGC 7577	gx	23h17m17s	+07°22.0'	q 214	Psc	16"	m. buona / ottimo	galassietta molto debole e rotondo con Ø max di 20", situato a ridosso SW di una stellina; a 380x appare a tratti una condensazione centrale molto tenue.
NGC 7578A	gx	23h17m12s	+18°42.0'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di galassie deboli, di aspetto simile e di luminosità uniforme; occorrono 380x per sdoppiarle con una certa facilità; i 2 nuclei sono distanti una 40-ina di secondi; la 1ª è più rotonda e con Ø di una 30-ina di secondi.
NGC 7578B	gx	23h17m14s	+18°42.5'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	v. **NGC 7578A**
NGC 7579	gx	23h17m39s	+09°26.0'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	debole, circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
NGC 7580	gx	23h17m37s	+14°00.1'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	galassietta abbastanza compatta di luminosità uniforme e di aspetto un po' irregolare, approssim. circolare con Ø di 1' — 270x.
NGC 7583	gx	23h17m53s	+07°22.8'	q 214	Psc	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø poco superiore a 30" — 450x.
NGC 7584	gx	23h17m53s	+09°26.0'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	poco più brillante ed estesa di NGC 7583, con Ø di 50"; appare leggermente più brillante verso l'interno — 270x.
NGC 7585	gx	23h18m01s	−04°39.0'	q 259	Aqr	16"	m. buona / ottimo	molto bella, presenta un nucleo brillante e molto marcato di aspetto quasi stellare con un alone tenue e diffuso con Ø di un paio di primi — 270x.
NGC 7586	gx	23h17m56s	+08°35.0'	q 214	Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
NGC 7587	gx	23h17m59s	+09°40.8'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme salvo un bulge visibile a tratti; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
NGC 7588	gx	23h17m58s	+18°45.1'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, di luminosità uniforme, estesa max 30"; è disturbata dalla luce di 2 stelle brillanti situate un paio di primi a S — 380x.
NGC 7589	gx	23h18m16s	+00°15.7'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	debolissima! Si riesce a vedere solo in visione distolta a ~ 1' E di una stellina brillante; la gx è forse allungata da E a W per una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 7591	gx	23h18m16s	+06°35.1'	q 214	Psc	16"	buona / ottimo	è allungata da NW a SE, con condensazione centrale evidente e un alone molto diffuso e stemperato di dimensioni 80"×30" — 270x.
NGC 7592	gx	23h18m22s	−04°25.0'	q 259	Aqr	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, ma di aspetto un po' irregolare; presenta un nucleo puntiforme visibile a tratti; a 380x sembra quasi costituita da 2 gx interagenti strettamente ravvicinate; non è comunque più estesa di 45"-50" — 270x.
NGC 7593	gx	23h17m57s	+11°21.0'	q 214	Peg	16"	buona / m. buono	debole, ma salta fuori subito e facilmente in visione distolta quando la si cerca nel campo: è ovale, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", poco più brillante all'interno; c'è una stellina appena percettibile a ridosso ENE — 270x.
NGC 7594	gx	23h18m11s	+10°14.8'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, orientata all'incirca da E a W, di dimensioni 30"×20" — 270x.
NGC 7595	gx	23h18m21s	+09°56.2'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e condensata, a 270x appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; si rintraccia abbastanza facilmente, perché il campo ha molte stelline di riferimento; ce n'è giusto una a 1' scarso verso S.
NGC 7596	gx	23h17m12s	−06°54.7'	q 304	Aqr	16"	m. buona / ottimo	galassietta abbastanza facile con evidente condensazione centrale, relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
NGC 7597	gx	23h18m30s	+18°41.4'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, approssim. circolare, Ø di ~ 40" e poco più brillante all'interno — 380x.
NGC 7598	gx	23h18m33s	+18°45.0'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	più debole di NGC 7597 e più piccola, di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso S — 380x.
NGC 7600	gx	23h18m54s	−07°34.8'	q 304	Aqr	16"	m. buona / m. buono	diffusa, orientata da ENE a WSW di dimensioni 2'×1', con bulge luminoso contrastato sul disco e nucleo stellare — 270x.
NGC 7601	gx	23h18m47s	+09°14.1'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	lucore molto diffuso dai bordi indistinti, ma visibile abbastanza facilmente; è approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 7602	gx	23h18m43s	+18°41.9'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	è un'altra galassietta piccola e debole, circolare, con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e con una condensazione centrale di aspetto stellare visibile a tratti; forma un terzetto serrato con la 7597 e 7598 — 380x.
NGC 7603	gx	23h18m56s	+00°14.6'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	presenta un nucleo brillante stellare circonfuso da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo; è orientata da N a S con dimensioni di 80"×40" — 380x.
NGC 7604	gx	23h17m52s	+07°25.8'	q 214	Psc	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
NGC 7606	gx	23h19m05s	−08°28.1'	q 304	Aqr	24"	buona / buono	molto diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 4'×1.5', con piccolo bulge contrastato di 40"×20" all'interno un nucleo stellare; il disco appare invece molto diffuso (già facilmente visibile nel 10" in buone condizioni di visibilità) — 450x.
NGC 7608	gx	23h19m15s	+08°21.0'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	molto debole, di luminosità uniforme; è molto allungata da NNE a SSW (come la stella doppia situata a 6' ESE) con dimensioni 40"×20" (fa parte di un gruppo situato presso il confine con i Pesci) — 270x.
NGC 7609	gx	23h19m30s	+09°30.5'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	gx a bassa luminosità superficiale con un'evidente condensazione centrale che appare a tratti allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 7610	gx	23h19m41s	+10°11.1'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×40" — 270x.
NGC 7611	gx	23h19m37s	+08°03.8'	q 214	Psc	10"	m. buona / discreto	piccola, compatta, abbastanza facile, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30", con marcata condensazione centrale — 178x.
NGC 7612	gx	23h19m44s	+08°34.6'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	relativamente brillante, con bulge luminoso e un debole alone esteso 60"×30" orientata da N a S — 270x.
NGC 7613	gx	23h19m52s	+00°25.4'		Psc	24"	buona / discreto	appare elusivamente a 450x come una stellina appena percettibile a meno di 1' S di una stellina molto debole; a tratti sembra d'intravedere un'altra stellina subito a S della gx (non è riportata sull'Uranometria).
NGC 7615	gx	23h19m54s	+08°24.0'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	debole ovale di dimensioni 30"×20" orientata da NW a SE; c'è una stellina a 1' verso E — 270x.
NGC 7616	gx	23h19m27s	+10°09.2'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	piccola ed elusiva, appare solo a momenti anche in visione diretta, ma è di aspetto quasi stellare (a meno che non abbia in realtà osservato la stellina situata subito a W) — 270x.
NGC 7617	gx	23h20m09s	+08°10.0'	q 214	Psc	10"	m. buona / discreto	piccola, diffusa, molto debole e di luminosità uniforme; nondimeno in visione distolta appare, seppure a momenti, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 178x.
NGC 7618	gx	23h19m47s	+42°51.2'	q 88	And	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, a prima vista rotonda, ma scalando gli ingrandimenti a 340x si nota che di fatto è poco allungata da N a S con dimensioni di 60"×50".
NGC 7619	gx	23h20m14s	+08°12.4'	q 214	Peg	16"	m. buona / ottimo	brillante, diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di un paio di primi scarsi — 270x.
NGC 7620	gx	23h20m06s	+24°13.3'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, con alto gradiente di luce, rotonda, molto poco diffusa, con Ø di ~ 1' — 380x.
NGC 7621	gx	23h20m25s	+08°22.0'	q 214	Peg	16"	buona / mediocre	è una galassietta molto debole di luminosità uniforme, di dimensioni 30"×20" e orientata da N a S — 270x.
NGC 7623	gx	23h20m30s	+08°23.8'	q 214	Peg	24"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 450x.
NGC 7624	gx	23h20m23s	+27°18.9'	q 169	Peg	16"	discreta / scarso	debole, diffusa, vagamente circolare, con basso gradiente di luce e con Ø di ~ 1'; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso W — 188x.
NGC 7625	gx	23h20m30s	+17°13.5'	q 169	Peg	10"	ottima / buono	compatta, rotonda con Ø di 1' e tenue condensazione centrale.
NGC 7626	gx	23h20m42s	+08°13.0'	q 214	Peg	16"	m. buona / ottimo	bella, con alto gradiente di luce e molto diffusa; sembra a prima vista una copia su scala ridotta di NGC 7619, salvo il fatto che è leggermente allungata da N a S, con dimensioni 90"×80" e inoltre la condensazione centrale è poco più marcata; c'è una stellina al margine occidentale — 270x.
NGC 7628	gx	23h20m55s	+25°53.9'	q 169	Peg	16"	discreta / scarso	debole lucore di luminosità pressoché uniforme, estesa ~ 1' e situato a ridosso, verso N, di una coppia di stelline deboli distanti 1' e orientate da E a W — 188x.
NGC 7629	gx	23h21m19s	+01°24.2'	q 259	Psc	24"	m. buona / ottimo	poco allungata da N a S, con dimensioni 40"×30", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso NE (già visibile, molto debolmente, anche nel 16") — 450x.
NGC 7630	gx	23h21m16s	+11°23.8'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20"; appare a tratti una condensazione centrale molto tenue — 270x.
NGC 7631	gx	23h21m27s	+08°13.0'	q 214	Peg	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 90"×30"; presenta un bulge diffuso e poco contrastato sul disco; più interessante a 270x.
NGC 7634	gx	23h21m42s	+08°53.2'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	galassietta compatta abbastanza brillante, di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 20" dal bulge verso S (o SSE) — 270x.
NGC 7635	neb	23h20m40s	+61°12.0'	q 34	Cas	10"	buona / discreto	debole alone che circonda una stella abbastanza brillante; in visione distolta appare una zona più marcata verso E che è l'unica parte di vero contrasto sul fondo cielo.
NGC 7636	gx	23h22m33s	−29°16.8'	q 385	Scl	16"	buona / buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 7638	gx	23h22m33s	+11°19.8'	q 214	Peg	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è situata all'interno di un trapezio allungato formato da 4 stelline abbastanza brillanti — 450x.
NGC 7639	gx	23h22m48s	+11°22.3'	q 214	Peg	24"	ottima / m. buono	diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con bulge poco contrastato — 450x.
NGC 7640	gx	23h22m07s	+40°50.7'	q 88	And	16"	buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 6'×1' con bulge diffuso appena più brillante del disco; c'è una stellina proprio al centro; a prima vista sembra delimitata a N e a S da 2 stelline (anche se in realtà sono entrambe leggermente spostate verso W): quella a N è più luminosa, ma 1' a SE di quest'ultima ce n'è una più debole — 270x.
NGC 7641	gx	23h22m31s	+11°53.5'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	molto debole; in visione distolta appare quasi come una edge-on orientata da NW a SE per circa 1'; in visione diretta appare solo il bulge molto tenue — 270x.
NGC 7642	gx	23h22m53s	+01°26.5'	q 259	Psc	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 30" (già visibile, molto debolmente, anche nel 16") — 450x.
NGC 7643	gx	23h22m50s	+11°59.3'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	è poco più brillante, di luminosità pressoché uniforme, con dimensioni 60"×30" e orientata a perpendicolo di NGC 7642 (ossia NE-SW) — 270x.
NGC 7644	gx	23h24m33s	+13°58.9'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	è un piccolo e debolissimo oggetto di aspetto un confuso, di luminosità uniforme e con dimensioni di una 20-ina di secondi — 270x.
NGC 7645	gx	23h23m47s	−29°23.8'	q 385	Scl	16"	buona / buono	molto debole, ma poco più evidente di NGC 7644; è approssim. rotonda con Ø di ~ 1', diffusa e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 7646	gx	23h24m07s	−11°51.6'	q 304	Aqr	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo e debole lucore di luminosità uniforme, estesa 20"-25" soffocato dalla luce di una stellina brillante situata a ridosso di NW — 380x.
NGC 7647	gx	23h23m57s	+16°46.6'	q 214	Peg	24"	ottima / ottimo	debole chiazza lattiginosa, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; è il membro più brillante dell'ammasso AGC 2589 — 450x.
NGC 7648	gx	23h23m54s	+09°40.1'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	ovale orientata da E a W, di dimensioni 60"×45", diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una debole stellina a ridosso dell'alone verso E un'altra a 45" da quest'ultima verso SE — 270x.
NGC 7649	gx	23h24m20s	+14°38.8'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	diffusa, orientata da E a W con dimensioni 60"×45", gradatamente più brillante verso l'interno, ma senza condensazione vera e propria; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S, ma visibile solo a momenti (fa parte dell'ammasso AGC 2593) — 270x.
NGC 7651	gx	23h24m26s	+13°58.3'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale evidente; presenta una sorta di «nodulo» verso S: quest'ultimo, da un controllo effettuato successivamente è risultato essere la MAC 2324+1357B — 270x.
NGC 7653	gx	23h24m49s	+15°16.5'	q 214	Peg	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di oltre 1'; a 450x appare debolmente screziata nella parte più centrale.
NGC 7656	gx	23h24m31s	−19°03.5'	q 349	Aqr	16"	buona / buono	molto diffusa, di forma vagamente circolare con Ø di una 40-ina di secondi e un piccolo bulge abbastanza marcato — 188x.
NGC 7659	gx	23h25m56s	+14°12.6'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	facile, relativamente brillante, compatta, molto allungata da E a W (quasi una edge-on) per una 50-ina di secondi; presenta un piccolo nucleo stellare — 270x.
NGC 7660	gx	23h25m49s	+27°01.8'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, ma di aspetto un po' confuso, situata a un paio di primi a E di una stellina brillante; approssim. circolare con Ø di 1' e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
NGC 7662	np	23h25m54s	+42°32.1'	q 88	And	16"	buona / m. buono	è un bel dischetto azzurro circolare, brillante e dai bordi non proprio netti; un sottilissimo anello sembra correre all'interno del disco di 20" di Ø, mentre una lieve ombreggiatura si trova all'interno; non riesco tuttavia a vedere la stellina centrale (evidente nelle fotografie) — 270x e 380x senza filtri.
NGC 7663	gx	23h26m45s	−04°58.0'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	sia in visione diretta, sia in quella distolta si vede solo un nucleo molto debole di aspetto quasi stellare situato a ~ 45" NE di una stellina brillante; tuttavia anche a 380x non sono riuscito a vedere altro — 380x.
NGC 7664	gx	23h26m40s	+25°04.8'	q 169	Peg	16"	discreta / scarso	debole, poco allungata da E a W, con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ~ 1' verso S; la gx è situata un paio di primi a E di 2 stelline distanti 1' e orientate da N a S — 188x.
NGC 7665	gx	23h27m15s	−09°23.1'	q 304	Aqr	16"	buona / buono	galassietta relativamente compatto, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 7667	gx	23h24m23s	−00°06.5'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, a tratti irregolare, appare facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; è allungata da E a W con dimensioni grosso modo 45"×30" (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 7671	gx	23h27m19s	+12°28.1'	q 214	Peg	10"	discreta / discreto	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, molto diffusa e con dimensioni di ~ 1'; c'è una stella di 10ª a un paio di primi verso W.
NGC 7672	gx	23h27m31s	+12°23.1'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	debole lucore visibile abbastanza facilmente, approssim. circolare, con Ø di ~ 1'; è situato ~ 6' a SE di NGC 7671 — 380x.
NGC 7673	gx	23h27m41s	+23°35.4'	q 169	Peg	16"	discreta / scarso	relativamente compatta e luminosa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, situata 4' W di una coppia di stelle brillanti distanti 1.5'; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' SE e un'altra brillante a ~ 2' NW — 188x.
NGC 7674	gx	23h27m57s	+08°46.7'	q 214	Peg	24"	m. buona / discreto	rotonda con Ø di 1' scarso, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare evidente — 450x.
NGC 7675	gx	23h28m06s	+08°46.1'	q 214	Peg	24"	m. buona / discreto	diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
NGC 7677	gx	23h28m06s	+23°31.9'	q 169	Peg	16"	discreta / scarso	piccolo oggetto poco diffuso, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline distanti 40" e orientate in direzione NW-SE; una coppia di stelline brillanti (SAO 91280 e -82) si trova a 3' NNW della gx — 188x.
NGC 7678	gx	23h28m28s	+22°25.3'	q 169	Peg	10"	ottima / buono	debole, allungata all'incirca da N a S con dimensioni ~ 2'×1' e con basso gradiente di luce; sembra incastrata in un piccolo triangolo isoscele di stelline abbastanza brillanti col vertice più acuto che punta a S.
NGC 7679	gx	23h28m46s	+03°30.7'	q 259	Psc	16"	discreta / scarso	presenta un piccolo nucleo molto brillante di aspetto stellare e un tenuissimo alone circonfuso con Ø inferiore a 1'; forma una coppia con **NGC 7682** — 188x.
NGC 7680	gx	23h28m35s	+32°25.0'	q 124	Peg	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 1'; presenta un piccolo bulge molto brillante e un nucleo stellare; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele rettangolo le cui componenti si trovano praticamente a ridosso dell'alone; poco più interessante scalando a 340x.
NGC 7681	gx	23h28m55s	+17°18.5'	q 169	Peg	16"	buona / discreto	presenta un nucleo stellare marcato circonfuso da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo, approssim. rotondo con Ø ~ 1'; c'è una stellina a 1' verso E; una coppia di stelline abbastanza stretta e sbilanciata si trova un paio di primi a NE — 380x.
NGC 7682	gx	23h29m04s	+03°32.0'	q 259	Psc	16"	discreta / scarso	molto più debole e più estesa di NGC 7679, dalla quale dista 4.5' ENE, di luminosità uniforme e forma piuttosto irregolare — 188x.
NGC 7683	gx	23h29m04s	+11°23.7'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	facile, presenta un nucleo brillante di aspetto stellare con un tenue alone molto diffuso allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 270x.
NGC 7684	gx	23h30m32s	+00°04.8'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	relativamente brillante, molto allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge evidente, diffuso; è situata una 40-ina di secondi SE di una stellina brillante — 380x.
NGC 7685	gx	23h30m33s	+03°54.1'	q 259	Psc	24"	m. buona / buono	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø > 1' (nel 16" era debole ma facilmente osservabile in visione distolta) — 450x.
NGC 7686	aa	23h30m12s	+49°07.0'	q 88	And	16"	discreta / m. buono	gruppo disperso con stelle di luminosità molto irregolare; se ne contano 30-35 su un Ø di 15', ma anche scalando gli ingrandimenti non si capisce dov'è delimitato; verso il centro c'è una brillante stella arancione, la più luminosa del gruppo, mentre a 5' SW ce n'è un'altra poco più debole bianca; a poco più di 1' E di quest'ultima c'è una doppia stretta — 270x.
NGC 7687	gx	23h30m54s	+03°32.8'	q 259	Psc	16"	discreta / scarso	debole, abbastanza compatta, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; è situata 1.5' S di una stellina brillante — 188x.
NGC 7688	gx	23h31m05s	+21°24.7'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco più brillante all'interno, rotondeggiante con Ø max di 20"; c'è una stellina di 14ª a 1' SW — 380x.
NGC 7691	gx	23h32m25s	+15°50.9'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	chiazza di luce molto debole e stemperata sul fondo cielo, di dimensioni 60"×45", orientata da N a S e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 7692	gx	23h32m47s	−05°35.8'	q 304	Psc	16"	buona / ottimo	piccola galassia debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
NGC 7693	gx	23h33m11s	−01°17.5'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, forse rotonda con Ø di ~ 45" — 380x.
NGC 7694	gx	23h33m06s	−02°42.1'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	molto debole, estesa e con gradiente di luce molto basso di luce, allungata da E a W con dimensioni 80"×40"; in visione diretta appare solo il bulge pressoché circolare e con Ø di 30"-35" — 380x.
NGC 7695	gx	23h33m15s	−02°43.2'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	debolissima, quasi elusiva, molto piccola; anche a 380x è di aspetto quasi stellare ed è situata 1' a S di NGC 7694 — 380x.
NGC 7696	gx	23h33m50s	+04°52.3'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	è un piccolo ovale molto debole, appena più brillante all'interno, orientata da E a W di dimensioni 40"×30" — 380x.
NGC 7698	gx	23h34m01s	+24°56.7'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	piccola, abbastanza compatta, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina a ~ 30" verso E — 380x.
NGC 7699	gx	23h34m27s	−02°54.0'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	fa parte, assieme a NGC 7700 e 7701, di un terzetto posto ad arco — elusiva, piccola e molto diffusa che appare solo in visione distolta a ~ 1' verso W di una stellina brillante; a tratti, alternando gli occhi, sembra un poco allungata da E a W, ma è molto difficile valutarne le dimensioni — 380x.
NGC 7700	gx	23h34m30s	−02°57.2'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme; è posta praticamente di taglio ed è stesa per oltre 1' in direzione NNW-SSE — 380x.
NGC 7701	gx	23h34m31s	−02°51.3'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	fa parte assieme alle due precedenti di un terzetto posto ad arco — relativamente compatta e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
NGC 7703	gx	23h34m47s	+16°04.5'	q 214	Peg	16"	buona / ottimo	presenta una marcata condensazione centrale e un debole alone molto diffuso orientata ~ da NE a SE con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 7704	gx	23h35m01s	+04°53.9'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata ~ da E a W con dimensioni 60"×40" e nucleo stellare visibile solo a momenti; c'è una stellina presso il bordo SE — 380x.
NGC 7705	gx	23h35m02s	+04°48.2'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	è una debolissima galassietta di luminosità uniforme visibile a tratti in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
NGC 7706	gx	23h35m10s	+04°57.9'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	debole lucore molto diffuso con evidente condensazione centrale; è grosso modo rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
NGC 7707	gx	23h34m51s	+44°18.2'	q 88	And	16"	buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso del bordo NE — 380x.
NGC 7708	aa	23h36m30s	+72°51.0'		Cep	24"	buona / buono	gruppo molto disperso di una 40-ina di stelle di cui una decina brillanti (soprattutto le 4 disposte secondo un piccolo asterismo molto allungato da N a S situate presso il bordo occidentale); fra le più brillanti spicca una doppia stretta a E del centro; è comunque mal definito sul background stellare anche scalando a 110x; non è riportato sull'Uranometria.
NGC 7709	gx	23h35m27s	−16°42.3'	q 304	Aqr	16"	buona / buono	posta praticamente di taglio e orientata da NE a SW, estesa per un paio di primi e di luminosità un poco irregolare — 188x.
NGC 7710	gx	23h35m46s	−02°52.9'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; è situata ~ 5' S di un rettangolo di stelline i cui lati maggiori sono lunghi un paio di primi.
NGC 7711	gx	23h35m39s	+15°18.1'	q 214	Peg	16"	buona / m. buono	contrastata con marcata condensazione centrale e un tenue alone diffuso, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 7712	gx	23h35m51s	+23°37.1'	q 169	Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
NGC 7714	gx	23h36m14s	+02°09.3'	q 259	Psc	16"	discreta / scarso	assieme alla successiva forma una coppia di gx distanti un paio di primi in direzione E-W; la 1ª presenta un nucleo brillante di aspetto stellare e un tenuissimo alone circonfuso, forse circolare con Ø inferiore a 1'; la 2ª è molto debole, più piccola ed è particolarmente disturbata dall'intensa luce della 16 Piscium situata 3' a S — 188x.
NGC 7715	gx	23h36m22s	+02°09.4'	q 259	Psc	16"	discreta / scarso	v. **NGC 7714**
NGC 7716	gx	23h36m31s	+00°17.8'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	presenta un bulge abbastanza marcato orientata grosso modo da N a S e un disco diffuso leggermente ovale con dimensioni 100"×80"; a 380x è molto stemperata sul fondo cielo; c'è una brillante stella di 10ª a un paio di primi verso S.

NGC 7717	gx	23h37m43s	−15°07.1'	q 304	Aqr	16"	buona / buono	è poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", con nucleo puntiforme e brillante che tende a offuscare in parte l'alone; c'è una stellina a poco più di 1' verso E — 188x.
NGC 7718	gx	23h38m05s	+25°43.2'	q 169	Peg	24"	buona / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare visibile a momenti — 450x.
NGC 7719	gx	23h38m02s	−22°58.4'	q 349	Aqr	16"	buona / buono	molto debole, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø < 1' — 270x.
NGC 7720	gx	23h38m29s	+27°01.9'	q 169	Peg	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, leggermente screziata a 450x, allungata da N a S con dimensioni 60"×40".
NGC 7721	gx	23h38m49s	−06°31.0'	q 304	Aqr	10"	buona / m. buono	debole, molto allungata da N a W, di dimensioni ~ 3'×1' con tenue condensazione centrale osservabile in visione distolta a 118x.
NGC 7722	gx	23h38m41s	+15°57.2'	q 214	Peg	16"	m. buona / m. buono	chiazza rotonda, diffusa, gradatamente più brillante all'interno, con Ø di 1'; c'è una stellina a ~ 1' NE e un'altra appena percettibile dalla parte opposta a ridosso dell'alone — 270x.
NGC 7723	gx	23h38m57s	−12°57.6'	q 304	Aqr	10"	buona / m. buono	è una gx con basso gradiente di luce, diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 3'×2' e con tenue ma evidente condensazione centrale.
NGC 7724	gx	23h39m07s	−12°13.5'	q 304	Aqr	10"	buona / discreto	debolissima e di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di circa 1'; è situata a 5' o 6' NNW di una stellina brillante; situata 12' a NW della 7727 osservata in altra data — 178x.
NGC 7725	gx	23h39m15s	−04°32.3'	q 259	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e appena più brillante all'interno; a 380x il campo è depleto, ma si capisce meglio com'è fatta la gx.
NGC 7726	gx	23h39m12s	+27°06.9'	q 169	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 450x.
NGC 7727	gx	23h39m53s	−12°17.6'	q 304	Aqr	10"	buona / m. buono	facile, rotonda con Ø di ~ 3', molto diffusa, ma poco contrastata sul fondo cielo; meglio evidente a 118x (a 178 è piuttosto confusa).
NGC 7728	gx	23h40m01s	+27°08.0'	q 169	Peg	16"	ottima / ottimo	facile, abbastanza luminosa, ma con basso gradiente di luce, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 7729	gx	23h40m34s	+29°11.3'	q 125	Peg	16"	buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S (praticamente una edge-on), estesa per almeno 80" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
NGC 7731	gx	23h41m29s	+03°44.4'	q 259	Psc	16"	discreta / scarso	è un galassietta circolare, con Ø di una 30-ina di secondi situato 1' W di una stellina brillante — 188x.
NGC 7732	gx	23h41m34s	+03°43.5'	q 259	Psc	16"	buona / ottimo	molto debole; in visione distolta appare molto allungata da E a W per oltre 1', mentre con quella diretta appare solo il bulge appena più brillante — 380x.
NGC 7735	gx	23h42m17s	+26°13.9'	q 169	Peg	16"	discreta / ottimo	debole, allungata forse da N a S, di dimensioni 45"×30", situata tra 2 stelline distanti 1' in direzione NE-SW; quella è NE è abbastanza brillante, mentre l'altra è molto debole — 270x.
NGC 7736	gx	23h42m26s	−19°27.1'	q 349	Aqr	16"	buona / buono	debole, allungata forse da N a S, di dimensioni 45"×30", situata tra 2 stelline distanti 1' in direzione NE-SW; quella è NE è abbastanza brillante, mentre l'altra è molto debole — 188x.
NGC 7737	gx	23h42m46s	+27°03.2'	q 169	Peg	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×25", con bulge evidente e nucleo stellare (osservabile debolmente anche nel 16") — 450x.
NGC 7738	gx	23h44m02s	+00°31.0'	q 260	Psc	16"	buona / ottimo	debole, posta praticamente di taglio, orientata da N a S e con bulge appena visibile; in visione distolta appare estesa per quasi 2' (da un controllo eseguito in seguito ho constatato che avevo osservato in realtà solo la barra centrale) — 270x.
NGC 7739	gx	23h44m30s	+00°19.3'	q 260	Psc	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un tenue nucleo stellare (non è riportata sulla Uranometria) — 450x.
NGC 7740	gx	23h43m17s	+27°21.5'	q 169	Peg	16"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, estesa una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme; osservabile con un certa facilità solo a 380x.
NGC 7741	gx	23h43m54s	+26°04.5'	q 169	Peg	10"	ottima / buono	debole, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo e di luminosità pressoché uniforme; è estesa 3' ed è situata tra 2 stelle di cui una brillante proprio al margine settentrionale.
NGC 7742	gx	23h44m16s	+10°46.0'	q 215	Peg	16"	ottima / ottimo	brillante, rotonda, con Ø di ~ 1', con alto gradiente di luce, nucleo puntiforme e bordi sfumati; c'è una stellina quasi a ridosso del bordo SE — 380x.
NGC 7743	gx	23h44m21s	+09°56.0'	q 215	Peg	16"	ottima / ottimo	bella, brillante, estesa, allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1.5'; presenta un nucleo luminoso stellare e un alone circonfuso molto stemperato sul fondo cielo — 380x.
NGC 7745	gx	23h44m46s	+25°54.5'	q 170	Peg	16"	m. buona / discreto	debolissima e di aspetto un po' confuso; a tratti appare più brillante all'interno; forse rotonda con Ø di 45" — 270x.
NGC 7746	gx	23h45m20s	−01°41.1'	q 215	Psc	16"	buona / ottimo	piccola galassietta diffusa, approssim. circolare, con Ø di una 40-ina di secondi con condensazione centrale marcata di aspetto quasi stellare — 380x.
NGC 7747	gx	23h45m32s	+27°21.6'	q 125	Peg	16"	m. buona / discreto	pur essendo debole appare come la classica edge-on, con bulge rigonfio e poco più brillante rispetto al disco orientata da NE a SW; è situata a un paio di primi SW di una stellina abbastanza brillante — 270x.
NGC 7749	gx	23h45m48s	−29°31.0'	q 350	Scl	16"	ottima / ottimo	poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60", molto diffusa e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' verso E — 270x.
NGC 7750	gx	23h46m38s	+03°48.0'	q 215	Psc	16"	ottima / discreto	debole chiazza lattescente di luminosità uniforme, diffusa, dimensioni 80"×40" e orientata da N a S — 270x.
NGC 7751	gx	23h46m58s	+06°51.8'	q 170	Psc	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, rotondeggiante con Ø inferiore a 1' poco più brillante all'interno di luce — 380x.
NGC 7752	gx	23h46m59s	+29°27.5'	q 89	Peg	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" (nel 10" appariva solo a momenti con la coda dell'occhio a 178x) — 450x.
NGC 7753	gx	23h47m05s	+29°29.0'	q 89	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1.5'; il disco ha una luminanza un poco irregolare; c'è una stellina al margine S e una poco più debole a quello N; meglio contrastata scalando a 340x (era debolmente visibile nel 10" a 63x in condizioni di cielo analoghe).
NGC 7754	gx	23h49m11s	−16°36.1'	q 260	Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (appariva, seppure elusivamente, anche nel 16" a 270x) — 450x.
NGC 7755	gx	23h47m51s	−30°31.3'	q 350	Scl	10"	m. buona / buono	debole, compatta, pressoché circolare, con Ø di un paio di primi; osservata a 178x presenta una condensazione centrale abbastanza evidente.
NGC 7757	gx	23h48m45s	+04°10.3'	q 215	Psc	16"	buona / ottimo	chiazza circolare con Ø di un paio di primi con luminanza superficiale e gradiente di luce bassi; si notano senza difficoltà increspature all'interno verosimilmente imputabili ai bracci spirale; allineata ed equidistante con 2 stelline a N — 270x.
NGC 7758	gx	23h48m55s	−22°01.4'	q 305	Aqr	16"	ottima / mediocre	molto deboe e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, situata in un piccolo campo depleto; si vede facilmente il visione distolta e a tratti mostra una tenue condensazione centrale; meglio osservabile a 270x.
NGC 7759	gx	23h48m55s	−16°32.4'	q 260	Peg	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con piccolo nucleo stellare; è pressoché rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1.5' SSE — 450x.
NGC 7760	gx	23h49m12s	+30°59.0'	q 89	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un tenue nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo SW (era già visibile nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 7761	gx	23h51m29s	−13°22.8'	q 260	Aqr	16"	buona / buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1.5'; il disco ha una luminanza un poco irregolare; c'è una stellina al margine S e una poco più debole a quello N; meglio contrastata scalando a 340x (era debolmente visibile nel 10" a 63x in condizioni di cielo analoghe) — 188x.
NGC 7762	aa	23h49m54s	+68°01.0'	q 15	Cep	24"	m. buona / m. buono	gruppo di parecchie decine di stelline a basso range di luminosità e di forma vagamente rettangolare, con rapporto dei lati 3:2 e orientato grosso modo da N a S; una piccola catena di 6 componenti serrate si trova nel mezzo — 110x.
NGC 7763	gx	23h50m16s	−16°35.4'	q 260	Aqr	16"	buona / discreto	al momento dell'osservazione era ancora molto bassa sull'orizzonte; appariva molto debole e poco diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; la visione risultava migliore a scalando a 188x.
NGC 7765	gx	23h50m52s	+27°10.0'	q 215	Peg	16"	ottima / m. buono	assieme alle 3 gx successive fa parte di un quartetto — debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e molto diffusa — 270x.
NGC 7766	gx	23h50m56s	+27°07.6'	q 215	Peg	16"	ottima / m. buono	assieme alla precedente e alle due successive fa parte di un quartetto di cui rappresenta la componente più debole: a 380x appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×20"; c'è una stellina < 1' verso W.
NGC 7767	gx	23h50m56s	+27°05.2'	q 215	Peg	16"	ottima / m. buono	assieme alla successiva e alle due precedenti fa parte di un quartetto — debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso di SW — 270x.
NGC 7768	gx	23h50m59s	+27°08.9'	q 215	Peg	16"	ottima / m. buono	assieme alle 3 gx precedenti fa parte di un quartetto di cui rappresenta la componente più brillante: poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con alta luminanza superficiale, ma basso gradiente di luce e diffusa; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
NGC 7769	gx	23h51m04s	+20°09.0'	q 215	Peg	24"	m. buona / ottimo	bella diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, screziata nelle regioni periferiche, rotonda con Ø di 1.5' e un nucleo stellare visibile a momenti; c'è una debole stellina a ridosso SE e un'altra a E che in visione distolta appare immersa nell'alone, ma potrebbe anche trattarsi di un nodulo galattico (questa gx e le due successive erano già state osservate senza problemi nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 7770	gx	23h51m22s	+20°05.8'	q 125	Peg	24"	m. buona / ottimo	situata a ridosso SW della successiva, è una galassietta rotonda con Ø < 40", diffusa e con basso gradiente di luce — 450x.
NGC 7771	gx	23h51m25s	+20°06.7'	q 125	Peg	24"	m. buona / ottimo	di aspetto screziato a 450x, molto allungata da E a W, di dimensioni 2.5'×1' e con bulge evidente, anche se poco contrastato sul disco; il trio, cui appartengono le due gx precedenti, è comunque più interessante scalando a 340x.
NGC 7772	aa	23h51m46s	+16°14.7'	q 170	Peg	10"	ottima / discreto	gruppetto serrato contenente 7 stelline distribuite su una superficie di 2'×1.5', di forma vagamente triangolare; non si nota alcuna traccia di lattescenza all'interno neppure a 178x.
NGC 7773	gx	23h52m10s	+31°16.6'	q 89	Peg	24"	m. buona / m. buono	bolla circolare, diffusa e di aspetto molto regolare, appena più brillante all'interno e con Ø di 1'; c'è una stellina a ridosso NE (appariva molto debolmente nel 10" a 178x; la stellina a NE era comunque visibile) — 450x.
NGC 7774	gx	23h52m10s	+11°28.3'	q 170	Peg	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con lievi increspature di luce all'interno; c'è una probabile stellina o nodulo verso il bordo orientale (da un controllo successivamente effettuato questo è effettivamente risultato essere la **MAC 2352+1128**; non è quindi da escludere che l'allungamento osservato sia da imputare a questa debole galassietta) — 380x.
NGC 7775	gx	23h52m25s	+28°46.4'	q 89	Peg	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso S (appariva molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 7776	gx	23h54m16s	−13°35.1'		Aqr	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" (non è riportata sull'Uranometria) — 450x.
NGC 7777	gx	23h53m12s	+28°17.0'	q 89	Peg	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare evidente (era debolmente visibile nel 10", ma solo a momenti si capiva com'era orientata a 178x) — 450x.
NGC 7778	gx	23h53m20s	+07°52.2'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	fa parte di un quintetto assieme a NGC 7779, 7780, 7781 e 7782 — relativamente facile, rotonda, di gradiente di luce medio, con Ø di ~ 45", con un piccolissimo nucleo stellare visibile a tratti *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 7779	gx	23h53m27s	+07°52.5'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	situata a ~ 2' a E di NGC 7778, è più grande, approssim. circolare con Ø di ~ 1' *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 7780	gx	23h53m32s	+08°07.1'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 80"×40" e con tenue bulge diffuso appena più brillante del disco *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 7781	gx	23h53m46s	+07°51.6'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per una 30-ina di secondi, con una stellina molto debole a ridosso verso W *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 7782	gx	23h53m54s	+07°58.2'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	è la più luminosa del quintetto e anche la più estesa; è ovale, di dimensioni 90"×45" dai bordi poco definiti e gradatamente più brillante all'interno *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 7783	gx	23h54m10s	+00°23.0'	q 215	Psc	16"	buona / ottimo	facile, compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×30". A una 40-ina di secondi SE si nota facilmente un piccolo oggetto rotondo, compatto esteso una 20-ina di secondi con piccolo nucleo stellare visibile a tratti leggermente decentrata verso E: è la Hickson **98B** riportata sull'Uranometria come **NGC 7783B** — 270x.
NGC 7784	gx	23h55m14s	+21°45.7'	q 125	Peg	16"	discreta / ottimo	molto debole, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta un nucleo stellare appena percettibile — 270x.
NGC 7785	gx	23h55m19s	+05°55.0'	q 170	Psc	10"	buona / m. buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×40" e con evidente condensazione centrale.
NGC 7786	gx	23h55m22s	+21°35.3'	q 125	Peg	16"	discreta / ottimo	è debole, ma più facile della 7784, di aspetto un po' confuso, ma probabilmente allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 270x.
NGC 7787	gx	23h56m08s	+00°33.0'	q 215	Psc	24"	m. buona / buono	debole, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" ed è disturbata da una stellina brillante situata a ridosso verso N; appare meglio contrastata scalando a 340x (già precedentemente osservata, seppur molto debolmente, nel 16").
NGC 7788	aa	23h56m44s	+61°23.9'	q 15	Cas	16"	buona / m. buono	è molto disperso e si fatica un poco a distinguerlo dalle stelle di campo, soprattutto nelle zone periferiche; spicca tuttavia un "nucleo" costituito da una decina di stelline molto serrate con dimensioni di un paio di primi; di queste ce n'è una brillante al margine occidentale — 132x.
NGC 7789	aa	23h57m27s	+56°43.2'	q 35	Cas	16"	m. buona / m. buono	nel cercatore da 50 mm appare come una macchia irrisolta di luminosità uniforme con Ø di una 15-ina di primi; a 132x è una stupenda esplosione stellare: (come se si trattasse di un globulare totalmente risolto); il range di luminosità delle stelle è molto basso, il che ne aumenta l'effetto magico; un'evidente banda scura lo attraversa verso la parte S (la fotografia, per quanto possa essere spettacolare, non enfatizza questo fenomeno — 132x.
NGC 7790	aa	23h58m25s	+61°12.4'	q 15	Cas	16"	buona / m. buono	s'intravede già nel cercatore da 50 mm; a 132x appare allungato da E a W con dimensioni 5'×4' e si contano facilmente una 20-ina di componenti; un piccolo gruppo serrato di 8 stelle nella parte orientale; 3 stelle brillanti si trovano invece a W e NW.
NGC 7792	gx	23h58m04s	+16°30.1'	q 170	Peg	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, estesa 1' scarso — 380x.
NGC 7793	gx	23h57m49s	−32°35.5'	q 350	Scl	10"	m. buona / buono	molto estesa, poco allungata da N a S, di dimensioni 6'×4', molto diffusa e di gradiente di luce molto basso; c'è una stellina a ridosso verso N.
NGC 7794	gx	23h58m34s	+10°43.7'	q 170	Peg	16"	ottima / ottimo	è un debole ovale allungata ~ da N a S, di dimensioni 60"×30", poco più brillante all'interno; c'è una stellina al margine meridionale — 380x.
NGC 7797	gx	23h58m59s	+03°38.1'	q 215	Psc	16"	buona / ottimo	molto debole, con gradiente di luce molto basso di luce, molto stemperata sul fondo cielo e poco allungata da N a S con dimensioni 60"×50" — 270x.
NGC 7798	gx	23h59m26s	+20°45.0'	q 125	Peg	10"	buona / buono	relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso; c'è una stella brillante a poco più di 1' verso SSW — 178x.
NGC 7800	gx	23h59m37s	+14°48.5'	q 170	Peg	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NE a SW, diffusa, di dimensioni 2'×45" e con gradiente di luce molto basso di luce; appare leggermente screziata a 450x; ci sono 3 stelline nelle vicinanze: la più vicina è a NNE, una seconda di magnitudo analoga a poco più lontana verso NE e la terza, più brillante, a 1.5' SE.
NGC 7802	gx	00h01m01s	+06°14.5'	q 170	Psc	16"	m. buona / buono	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" con piccola ed evidente condensazione centrale *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 7803	gx	00h01m20s	+13°06.7'	q 170	Peg	24"	ottima / m. buono	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente abbastanza contrastato e nucleo stellare; c'è una doppia stretta a 1' verso NW; è altresì nota come **Hickson 100A** — 450x.
NGC 7805	gx	00h01m27s	+31°26.0'	q 89	Peg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata e interagente con la successiva situata a ridosso NE — poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta un piccolo bulge evidente e molto contrastato; situata tra una stellina abbastanza brillante a 1' W e una molto debole alla stessa distanza verso E — 450x.
NGC 7806	gx	00h01m30s	+31°26.5'	q 89	Peg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata e interagente con la precedente situata a ridosso SW — diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con piccolo bulge evidente di aspetto quasi stellare (entrambe le gx erano visibili molto debolmente nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 7807	gx	00h00m27s	−18°50.5'	q 305	Cet	16"	ottima / mediocre	debolissima e stemperata sul fondo cielo, visibile con difficoltà, forse rotonda con Ø max di 40" e poco più brillante all'interno (è più difficile di NGC 7758) — 270x.
NGC 7808	gx	00h03m32s	−10°44.6'	q 260	Cet	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina e condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
NGC 7809	gx	00h02m09s	+02°56.4'	q 215	Psc	16"	buona / buono	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, di luminosità uniforme e diffusa — 270x.
NGC 7810	gx	00h02m19s	+12°58.3'	q 170	Peg	24"	m. buona / m. buono	diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con evidente condensazione centrale contrastata — 450x.
NGC 7811	gx	00h02m26s	+03°21.1'	q 215	Psc	16"	buona / buono	galassietta di una 40-ina di secondi di Ø, relativamente compatta, ma dai bordi un po' irregolari — 270x.
NGC 7812	gx	00h02m54s	−34°14.1'	q 350	Scl	16"	buona / buono	debolissimo bozzolo rotondo di poco più di 30" di Ø e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 7813	gx	00h04m09s	−11°59.0'	q 260	Cet	16"	buona / discreto	molto debole, piccola e diffusa allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme — 270x.
NGC 7814	gx	00h03m15s	+16°08.7'	q 170	Peg	24"	ottima / m. buono	presenta un evidente bulge, rotondo con Ø di 1' scarso, poco più brillante verso l'interno, debolmente screziato a 450x, circonfuso da un disco che si stempera abbastanza velocemente alle estremità NW e SE; scalando a 340x la galassia appare nel complesso di dimensioni 4'×1.5'.
NGC 7816	gx	00h03m49s	+07°28.7'	q 170	Psc	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con gradiente di luce molto basso, approssim. circolare di almeno 1' di Ø — 380x.
NGC 7817	gx	00h03m59s	+20°45.1'	q 125	Peg	10"	buona / buono	molto allungata da NE a SW con dimensioni 3'×1', relativamente compatta e con basso gradiente di luce; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso S — 178x.
NGC 7818	gx	00h04m09s	+07°22.7'	q 170	Psc	16"	ottima / ottimo	situata 8' SE della 7816, molto debole e diffusa e di luminosità uniforme; forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
NGC 7819	gx	00h04m25s	+31°28.4'	q 89	Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, poco allungata da E a W, dimensioni 70"×50" e con un nucleo stellare visibile però solo a momenti; è situata a ridosso S di una piccola losanga irregolare di 4 stelline; meglio contrastata scalando a 340x.
NGC 7820	gx	00h04m31s	+05°12.0'	q 170	Psc	16"	m. buona / m. buono	bella, brillante; si presenta come una classica spirale o lenticolare ad alto gradiente di luce con bulge luminoso e nucleo di aspetto stellare; tuttavia è piccola, di dimensioni 40"×20" e allungata da N a S — 380x.
NGC 7821	gx	00h05m17s	−16°28.6'	q 260	Cet	16"	buona / buono	debole, compatta, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme — 188x.
NGC 7824	gx	00h05m06s	+06°55.2'	q 170	Psc	16"	buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S, con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi a SE — 380x.
NGC 7825	gx	00h05m07s	+05°12.2'	q 170	Psc	16"	m. buona / m. buono	diffusa, presenta una piccola condensazione centrale; solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da NW a SE — 270x.
NGC 7827	gx	00h05m28s	+05°13.3'	q 170	Psc	16"	m. buona / m. buono	è un ovale diffuso, allungata da NE a SE e di dimensioni 40"×20" — 270x.
NGC 7828	gx	00h06m27s	−13°24.8'	q 260	Cet	16"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con **NGC 7829** — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 380x.
NGC 7829	gx	00h06m29s	−13°25.2'	q 260	Cet	16"	m. buona / ottimo	molto piccola, compatta e brillante, di aspetto quasi stellare se venisse osservata con ingrandimenti minori e in serate di seeing mediocre; a 380x è chiaramente separata dalla 7828, situata a ridosso NW, e presenta un alone molto debole *(sta sorgendo la Luna)* — 380x.
NGC 7831	gx	00h07m19s	+32°36.5'	q 89	And	24"	m. buona / buono	è un bel fuso orientato da NE a SW, di dimensioni 2'×30" e con tenue bulge debolmente contrastato; c'è una stellina al bordo SW (era molto debole nel 10" a 178x) — 450x.
NGC 7832	gx	00h06m28s	−03°43.0'	q 215	Psc	24"	m. buona / buono	facile, molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina appena percettibile al bordo N — 450x.
NGC 7834	gx	00h06m38s	+08°22.0'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	debole lucore approssim. circolare e di luminosità uniforme, facilmente visibile in visione distolta a ridosso SE di una stella brillante *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 7835	gx	00h06m47s	+08°25.5'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S per max 30" *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 7836	gx	00h08m02s	+33°04.3'	q 89	And	24"	m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" (debolmente visibile nel 10" a 178x in condizioni di cielo buone) — 450x.
NGC 7837	gx	00h06m52s	+08°21.0'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	è poco più debole di NGC 7838 e appare a tratti a neppure 1' verso W come un debolissimo oggetto esteso una 20-ina di secondi; in visione distolta tendono a fondersi in un'unica chiazza *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
NGC 7838	gx	00h06m54s	+08°21.0'	q 170	Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
IC 2	gx	00h11m01s	−12°49.4'		Cet	16"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto molto debole e poco allungato da NW a SE, di dimensioni 30"×20", nel quale appare, solo a tratti a 380x, una condensazione centrale molto tenue.
IC 3	gx	00h12m06s	−00°24.9'		Psc	24"	buona / buono	diffusa, con condensazione centrale evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 400x.
IC 4	gx	00h13m27s	+17°29.1'		Peg	16"	m. buona / m. buono	debole bolla circolare, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con Ø di ~ 1' — 270x.
IC 5	gx	00h17m35s	−09°32.6'		Cet	16"	ottima / ottimo	presenta una nucleo stellare molto brillante circonfuso da un tenue alone poco allungato da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
IC 6	gx	00h18m55s	−03°16.6'		Psc	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø 45"; presenta alto gradiente di luce e nucleo di aspetto stellare — 380x.
IC 7	gx	00h18m53s	+10°35.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un debole oggetto rotondo, facilmente visibile, diffuso, con Ø di 30" con una stellina brillante a ridosso del margine SW — 380x.
IC 8	gx	00h19m03s	−03°13.3'		Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20 e di luminosità uniforme — 380x.
IC 10	gx	00h20m18s	+59°18.1'	q 35	Cas	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, immersa in un campo molto ricco, allungata da NW a SE con dimensioni 3'×2'; c'è una stellina abbastanza brillante all'interno, ma un poco decentrata verso SE — 132x.
IC 12	gx	00h20m15s	−02°39.2'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
IC 13	gx	00h20m20s	+07°42.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole e di aspetto confuso; meglio osservabile a 270x, ma non riesco comunque a capire com'è orientata; forma un triangolo equilatero con 2 stelline situate un paio di primi a N e NE.
IC 16	gx	00h28m07s	−13°05.6'		Cet	24"	discreta / mediocre	debolissima e poco diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (il fondo cielo è chiaro, forse perché la gx è molto bassa sull'orizzonte); a 280x il campo è quasi depleto: ci sono solo 2 stelline a 2.5' SE dell'oggetto.
IC 17	gx	00h28m30s	+02°39.0'		Cet	16"	ottima / buono	rotonda, relativamente compatta e ben evidente, di una 30-ina di secondi di Ø e con piccolo nucleo di aspetto quasi stellare — 380x.
IC 18	gx	00h28m35s	−11°35.2'		Cet	24"	buona / mediocre	forma una coppia IC 19 — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; appare meglio contrastata scalando a 200x.
IC 19	gx	00h28m40s	−11°38.4'		Cet	24"	buona / mediocre	relativamente compatta e leggermente condensata, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso S — 400x.
IC 20	gx	00h28m40s	−13°00.6'		Cet	24"	discreta / mediocre	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 280x.
IC 21	gx	00h29m10s	−00°09.8'		Cet	24"	discreta / buono	debole, diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (situata in una piccola zona virtualmente depleta a 450x).
IC 23	gx	00h30m51s	−12°43.2'		Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di ~ 40", poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
IC 25	gx	00h31m12s	−00°24.4'		Cet	24"	buona / buono	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge molto tenue — 450x.
IC 29	gx	00h34m11s	−02°10.6'		Cet	24"	buona / buono	rotonda con Ø < 40", poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
IC 30	gx	00h34m15s	−02°05.1'		Cet	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
IC 31	gx	00h34m25s	+12°16.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; presenta un piccolo bulge visibile a tratti — 380x.
IC 32	gx	00h35m02s	−02°08.5'		Cet	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con IC 33, dalla quale dista 1' scarso verso W — rotonda, poco diffusa, con evidente condensazione centrale quasi stellare e Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 33	gx	00h35m05s	−02°08.2'		Cet	24"	buona / buono	poco più debole di IC 32, situata 1' a WSW, diffusa, rotonda con Ø simile — 450x.
IC 34	gx	00h35m36s	+09°07.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, ma di aspetto e luminosità un po' irregolare; è allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40", più brillante verso l'interno e con nucleo stellare visibile a 380x; è meglio osservabile a 270x.
IC 35	gx	00h38m00s	+10°21.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	è una debolissima chiazza diffusa, di luminosità uniforme, con Ø di 1' scarso e situata 1.5' SW di una stellina brillante; meglio osservabile a 380x per ridurne l'abbagliamento.
IC 37	gx	00h38m34s	−15°21.5'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto di luminosità uniforme, piccolo, esteso sì e no 15" o 20"; appare a tratti in visione distolta a 1.5' SW di una stellina — 380x.
IC 38	gx	00h39m39s	−15°25.2'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35" — 380x.
IC 40	gx	00h39m21s	−02°27.4'		Cet	24"	buona / buono	facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
IC 43	gx	00h42m22s	+28°38.5'		And	24"	ottima / buono	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE — 450x.
IC 45	gx	00h42m22s	+29°41.9'		And	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; meglio non scendere sotto i 450x.
IC 46	gx	00h42m58s	+27°15.2'		And	24"	buona / buono	relativamente compatta con nucleo puntiforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è allineata ed equidistante con 2 stelline orientate da NE a SW — 450x.
IC 48	gx	00h43m34s	−08°11.2'		Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, rotonda e gradatamente più brillante verso l'interno, poco diffusa con Ø > 30" — 380x.
IC 49	gx	00h43m56s	+01°51.0'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a 2.5' verso S; meglio visibile a 270x.
IC 50	gx	00h46m06s	−09°30.2'		Cet	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø quasi stellare e Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
IC 51	gx	00h46m24s	−13°26.6'	q 89	Cet	10"	buona / buono	piccola e relativamente compatta, con Ø di 1' scarso; a 178x appare una tenue condensazione centrale.
IC 52	gx	00h48m24s	+04°05.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; situata all'interno di un asterismo di 6 stelline brillanti fatto a casetta — 450x.
IC 53	gx	00h50m41s	+10°36.0'		Psc	16"	ottima / m. buono	debole, rotonda, diffusa, luminosità uniforme e Ø ~ 30"; c'è una debolissima stellina al bordo orientale visibile a tratti a 380x.
IC 55	gx	00h41m52s	+07°43.1'		Psc	16"	buona / ottimo	relativamente facile, compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ~ 30' verso SE — 380x.
IC 56	gx	00h51m30s	−12°50.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x *(presenza di debole chiarore lunare)*.
IC 56A	gx	00h51m51s	−12°46.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è situata 7' a NE di IC 56 *(presenza di debole chiarore lunare)*.
IC 57	gx	00h54m48s	+11°50.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, diffusa, di 30" di Ø e con piccola condensazione centrale poco evidente; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 380x.
IC 58	gx	00h55m02s	−13°40.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina subito a SE (fa parte di un piccolo triangolo la cui componente più a N è in realtà un doppia sbilanciata — 450x.
IC 59	neb	00h57m00s	+61°08.5'	q 16	Cas	24"	buona / ottimo	molto più debole di IC 60, più estesa e meno definita; occorre scalare a 110x per notarne il debole contrasto sul fondo cielo; si nota sostanzialmente un chiazza orientata da E a W, estesa una 15-ina di primi e spessa non più di 1/3 di tale distanza; questa arriva a lambire, verso E, un piccolo asterismo serrato foggiato a "T" formato da una decina di stelle abbastanza brillanti; il filtro deepsky non è di alcun aiuto.
IC 60	gx	00h56m04s	−13°21.5'		Cet	24"	buona / scarso	debole, molto diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
IC 61	gx	00h57m07s	+07°30.4'		Psc	16"	buona / ottimo	debole, rotonda con Ø di ~ 40", molto diffusa, di luminosità uniforme — 380x.
IC 62	gx	00h58m44s	+11°48.5'		Psc	16"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
IC 63	neb	00h59m23s	+60°54.0'	q 36	Cas	24"	buona / ottimo	a 200x è ben evidente quella caratteristica conformazione fatta a "V" col vertice che punta verso la γ Cas; più evidente il "braccio" meridionale orientato da E a W ed esteso per 7' od 8' ed è altresì quello che meglio viene contrastato utilizzando il filtro deepsky (l'O III non ha invece alcun effetto); il braccio che si protende verso N, appena meno esteso, è più debole e sfumato e viene messo meno in risalto dal filtro.
IC 64	gx	00h59m24s	+27°03.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 65	gx	01h00m56s	+47°40.9'	q 60	And	24"	m. buona / ottimo	estesa, diffusa, con gradiente di luce molto basso, orientata da NNW a SSE con dimensioni 2'×45"; c'è una coppia serrata di stelline subito a S, un'altra più debole a ridosso E e infine una appena percettibile al bordo meridionale; la gx è nel complesso più interessante se si scala a 340x (appariva debolmente e di aspetto un po' confuso nel 10" a 178x).
IC 66	gx	01h00m33s	+30°47.8'		Psc	16"	m. buona / discreto	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; meglio osservabile a 270x.
IC 69	gx	01h01m24s	+31°02.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, a prima vista di luminosità uniforme, mentre a tratti appare all'interno un tenuissimo nucleo quasi stellare; è rotonda con Ø di 45" — 380x.
IC 73	gx	01h04m53s	+04°46.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 74	gx	01h05m56s	+04°05.4'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30"; occorre tuttavia tenere fuori campo la SAO 109664 di magnitudo 7.5 situata a 7' NNW — 450x.
IC 75	gx	01h07m12s	+10°50.2'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debole, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
IC 76	gx	01h08m12s	−04°33.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da E a W, dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge diffuso abbastanza contrastato — 450x.
IC 77	gx	01h08m44s	−15°25.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 151** — piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
IC 78	gx	01h08m48s	−15°40.7'		Cet	16"	ottima / buono	fa parte di un terzetto assieme a IC 79 e IC 82 — molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; meglio però scalare a 270x.
IC 79	gx	01h08m50s	−15°57.0'		Cet	16"	ottima / buono	è la più facile del trio, rotonda, di 45" di Ø e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso NE — 380x.
IC 80	gx	01h08m51s	−15°24.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso AGC 151 — molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; una debolissima protuberanza appare ogni tanto, a 450x, a ridosso verso SW: questa è risultata poi essere la **MCG-3-4-9** *(presenza di debole chiarore lunare)*.
IC 80B	gx	01h08m53s	−15°20.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso AGC 151 — piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è molto difficile da catturare a 450x perché attorno alla gx il campo è depleto *(presenza di debole chiarore lunare)* — situata 4' a N di IC 80.
IC 81	gx	01h09m22s	−01°41.7'		Cet	24"	m. buona / buono	rotonda, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo abbastanza luminoso di aspetto quasi stellare; c'è una stellina brillante a ridosso verso SE — 450x.
IC 82	gx	01h09m06s	−16°00.0'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio visibile a 270x.
IC 83	gx	01h10m30s	+01°41.3'		Cet	24"	buona / discreto	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una doppia a ridosso verso NE — 450x.
IC 84	gx	01h11m26s	+01°38.4'		Cet	24"	buona / discreto	molto diffusa, poco allungata da N a S, dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare molto contrastato (quest'ultimo, anzi, tende un po' a mascherare la periferia della gx) — 450x.
IC 87	gx	01h14m16s	+00°45.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 89	gx	01h16m04s	+04°17.7'		Psc	16"	buona / buono	è relativamente brillante, con una marcata condensazione centrale e un debole alone circonfuso con Ø di ~ 1'.5 (situata 18' ENE di NGC 446 che stavo cercando) — 270x.
IC 90	gx	01h16m30s	−07°58.6'		Cet	16"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di ~ 40" e gradatamente più brillante verso l'interno; il campo è depleto a 380x, ma la gx s'individua facilmente — 380x.
IC 93	gx	01h19m02s	−17°03.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	abbastanza facile e compatta, allungata da N a S con dimensioni 50"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 280x.
IC 98	gx	01h20m55s	−12°36.2'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 100	gx	01h22m54s	−04°38.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	presenta un piccolo bulge marcato di aspetto quasi stellare circonfuso da un alone allungato da E a W e di dimensioni 60"×45"; forma un piccolo triangolo isoscele ottusangolo con 2 stelline a W e SW — 450x.
IC 101	gx	01h24m09s	+09°55.9'		Psc	16"	m. buona / ottimo	assieme a IC 102 forma una coppia di debolissimi oggetti estesi non più di una 30-ina di secondi che saltano all'occhio in visione distolta; il 2o è più evidente pur essendo di dimensioni del tutto simili — 380x.
IC 102	gx	01h24m26s	+09°53.2'		Psc	16"	m. buona / ottimo	v. **IC 101**
IC 103	gx	01h24m36s	+02°02.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
IC 104	ss	01h24m33s	−01°27.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una doppia molto stretta dalla componenti piuttosto deboli, di uguale luminosità e orientate da NW a SE; è situata all'interno dell'ammasso AGC 194 — 450x.
IC 105	gx	01h24m46s	+02°04.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' SSW — 450x.
IC 107	gx	01h25m13s	+14°52.3'		Psc	16"	ottima / scarso	fa parte di un terzetto assieme a IC 1698 e IC 1700 — è la più debole delle 3, molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 40" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
IC 109	gx	01h25m13s	+02°04.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e poco più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso verso W — 450x.
IC 112	gx	01h26m03s	+11°26.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	si vede abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è diffusa, di luminosità pressoché uniforme, salvo un piccolissimo nucleo stellare visibile a tratti, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" (estesa come la distanza delle 2 stelline a NE).
IC 114	gx	01h26m22s	+09°54.7'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×30; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 115	gx	01h26m54s	+19°12.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa fa con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione stellare; si trova al limite dell'alone indotto dalla SAO 92444 di magnitudo 5.5 situata 3.5' a NW — 450x.
IC 116	gx	01h26m51s	−04°58.9'		Cet	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE (come le 2 stelline di eguale luminosità a E e a NNW) con dimensioni 60"×40" — 270x.
IC 118	gx	01h27m36s	−04°59.8'		Cet	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, estesa per una 30-ina di secondi e con condensazione centrale visibile a tratti a 270x.
IC 119	gx	01h28m13s	−01°54.9'		Cet	16"	buona / ottimo	è poco più evidente di IC 120 e di dimensioni simili, ma è molto disturbata dalla luce della SAO 129315 di 7ª magnitudo situata a soli 1.5' a E; a 380x la galassia appare orientata da E a W,
IC 120	gx	02h28m16s	−01°54.9'		Cet	16"	buona / ottimo	molto debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20"; presenta un nucleo stellare visibile a tratti (situata 8.5' a NNE di IC 119 — 380x.
IC 121	gx	01h28m22s	+02°30.8'	q 218	Cet	16"	discreta / buono	è una gx relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 208x.
IC 123	gx	01h28m51s	+02°26.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; è un poco disturbata dalla SAO 109913 di 10ª grandezza situata 2.5' a NW — 450x.
IC 126	gx	01h29m48s	−01°59.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza circolare molto stemperata sul fondo cielo, con Ø di 45" e appena più brillante all'interno; è situata subito a N di una stellina brillante — 450x.
IC 127	gx	01h29m47s	−06°58.8'		Cet	16"	m. buona / mediocre	molto allungata da NW a SE, di luminosità pressoché uniforme e dimensioni 90"×30"; c'è una stellina brillante praticamente sovrapposta al bordo sud-occidentale (situata 24' WSW di NGC 586) — 270x.
IC 128	gx	01h31m28s	−12°38.2'		Cet	16"	ottima / m. buono	assieme a IC 129 forma una coppia di gx deboli distanti 2.5' in direzione NW-SE; la 1ª è più facile, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale diffusa; la 2ª è debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 40"; è abbastanza facile in visione distolta, ma è meglio contrastata a 270x.
IC 129	gx	01h31m31s	−12°39.2'		Cet	16"	ottima / m. buono	v. **IC 128**
IC 132	knot	01h33m16s	+30°56.7'		Tri	24"	ottima / m. buono	regione H II in M33: facile, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 30"; disturbata dalla SAO 54780 di 9a grandezza situata 1.5' a E — 450x.
IC 136	knot	01h33m01s	+30°30.9'		Tri	24"	ottima / m. buono	**regione H II in M33** — relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 138	gx	01h33m02s	−00°41.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.

IC 141	gx	01h32m51s	−14°48.9'		Cet	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso; presenta un bulge diffuso e abbastanza brillante; c'è una stellina a 2' verso E; osservata a 380x, anche se il campo è depleto.
IC 142	knot	01h33m56s	+30°45.4'		Tri	24"	ottima / m. buono	regione H II in M33: diffusa e condensata (come se fosse presente una stellina al centro), approssim. circolare con Ø < 30" — 450x.
IC 142A	knot	01h33m45s	+30°44.7'		Tri	24"	ottima / m. buono	**regione H II in M33**: debole e diffusa, estesa una 30-ina di secondi, se non appare di aspetto ben definito — 450x.
IC 143	knot	01h34m07s	+30°47.5'		Tri	24"	ottima / m. buono	regione H II in M33: debole, molto diffusa e condensata, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo orientale, ma come nel caso di NGC 592 potrebbe anche trattarsi di una piccola estensione condensata del nodulo — 450x.
IC 144	gx	01h37m41s	−13°18.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare — 400x.
IC 145	gx	01h38m38s	+00°44.5'		Cet	24"	ottima / buono	debole, diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
IC 147	gx	01h39m59s	−14°51.8'		Cet	24"	ottima / m. buono	debolissima e diffusa, con tenue condensazione centrale visibile a tratti, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (a 400x il campo è depleto!).
IC 149	gx	01h42m25s	−16°18.0'		Cet	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; una condensazione centrale molto tenue è visibile a tratti a 400x.
IC 150	gx	01h42m58s	+04°12.0'		Psc	16"	m. buona / m. buono	gx elusiva e molto diffusa, visibile a tratti in visione distolta a ~ 2' NE di una stellina abbastanza brillante; grosso modo circolare con Ø di 30" — 270x.
IC 154	gx	01h45m16s	+10°39.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce facile a 380x, di dimensioni ~ 50"×15" e con bulge evidente, quasi stellare; sembra dipartirsi verso ENE da una stellina.
IC 156	gx	01h45m29s	+10°33.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 45"; presenta un nucleo stellare evidente a 380x; c'è una stellina a 1' verso N.
IC 159	gx	01h46m25s	−08°38.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	è una chiazza abbastanza regolare, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
IC 160	gx	01h46m30s	−13°14.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con piccolo bulge diffuso ben evidente — 400x.
IC 162	gx	01h48m53s	+10°31.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, poco diffusa con Ø di 45" e appena più brillante all'interno; a 1' SE c'è la MCG+2-5-39 (cfr voce corrispondente) — 380x.
IC 163	gx	01h49m15s	+20°42.6'	q 128	Ari	16"	buona / buono	è un debole ovale di luminosità uniforme, diffuso e molto allungato da E a W con dimensioni 90"×40"; è situata a N della più occidentale di 3 stelline poste leggermente arcuate; meglio visibile a 270x; è riportata sull'Uranometria come UGC 1276.
IC 164	gx	01h49m08s	−03°54.3'		Cet	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, poco più brillante all'interno di luce e Ø di 45"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SE; allineata ed equidistante con 2 stelline luminose distanti 3' in direzione NNE-SSW — 380x.
IC 166	aa	01h52m22s	+61°51.3'	q 17	Cas	10"	m. buona / buono	molto debole e molto compatto, rimane irrisolto anche a 188x; alcuni primi più a W si vede un gruppetto di 7 od 8 stelline di luminosità pressoché uniforme.
IC 167	gx	21h54m44s	+21°54.7'		Ari	16"	ottima / buono	debole, ma facilmente visibile in visione distolta, diffusa, di luminosità pressoché uniforme e appena allungata da E a W con dimensioni 60"×50"; c'è una stellina a un paio di primi scarsi verso NW — 380x.
IC 168	gx	01h50m27s	−08°31.4'		Cet	24"	m. buona / mediocre	relativamente brillante, con piccolo bulge evidente e un nucleo stellare; molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 340x.
IC 170	gx	01h51m57s	−08°31.0'		Cet	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø poco superiore a 20" — 400x.
IC 171	gx	01h55m10s	+35°16.8'		Tri	28"	m. buona / buono	brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 1' scarso e con piccolo bulge molto contrastato; c'è una stellina brillante a ridosso NW e una più debole a 1' verso S — 495x.
IC 172	gx	01h54m54s	+00°48.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, approssim. circolare con Ø < 30" e una nucleo stellare; è situata nel mezzo tra la SAO 110222 di magnitudo 9.7 e un'altra stella abbastanza brillante — 450x.
IC 173	gx	01h55m57s	+01°17.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
IC 174	gx	01h56m16s	+03°45.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con bulge marcato; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
IC 175	gx	01h56m19s	+01°20.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata 6' a NE di IC 173.
IC 176	gx	01h56m53s	−02°01.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa per oltre 1.5' — 450x.
IC 177	gx	02h59m51s	+02°46.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, ma facilmente visibile nonostante la Luna di età 5 giorni che brillava ad appena una 20-ina di gradi di distanza; rotonda con Ø < 30", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
IC 178	gx	01h58m55s	+36°40.5'		And	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, a prima vista rotonda con Ø, ma osservando attentamente si nota che è leggermente allungata da N a S con dimensioni 60"×50"; c'è una coppia larga e sbilanciata di stelline a 1.5' SE — 495x. Scalando a 179x appare a N un asterismo di una decina di stelle brillanti che ricordano un uccello in volo.
IC 179	gx	02h00m11s	+38°01.3'		And	28"	ottima / ottimo	brillante, molto diffusa e con alto gradiente di luce, a prima vista rotonda, ma in visione distolta si nota che è leggermente allungata da E a W con dimensioni 60"×50"; a tratti appare debolmente screziata nella parte più interna — 495x.
IC 180	gx	02h00m00s	+23°36.3'		Ari	16"	ottima / buono	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x — situata a meno di 3' SSE di NGC 776.
IC 181	gx	02h00m02s	+23°39.5'		Ari	16"	ottima / buono	debolissimo oggetto rotondo di 20" max di Ø, condensato e facilmente visibile in visione distolta a 380x quando si osserva NGC 776 dalla quale dista un paio di primi verso NE.
IC 182	gx	01h59m52s	+07°24.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, pressoché rotonda con Ø di ~ 40" e di luminosità uniforme — 380x.
IC 183	gx	01h59m34s	−05°20.8'		Cet	16"	m. buona / mediocre	è un ovale abbastanza facile orientato da E a W con dimensioni 60"×30", sfumato ai bordi e poco più brillante all'interno — 270x.
IC 184	gx	01h59m51s	−06°50.4'		Cet	24"	ottima / m. buono	allungata da N a S con dimensioni 60"×30", diffusa e di luminosità uniforme — 400x.
IC 185	gx	02h00m06s	−01°31.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
IC 186A	gx	02h00m25s	−01°33.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata assieme alla successiva e che in visione distolta sembrano immersi in una debole chiazza lattescente; la 1a è poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" ed è anche più evidente; la 2a è invece rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 186B	gx	02h00m24s	−01°33.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **IC 186A**
IC 187	gx	02h01m31s	+26°28.8'		Tri	16"	ottima / buono	debole, diffusa, molto allungata ~ da E a W, di dimensioni 90"×30" e con piccola condensazione centrale abbastanza contrastata; a tratti, osservando a 380x, pare di vedere una debolissima stellina a ridosso del bordo orientale.
IC 189	gx	02h01m53s	+23°33.1'		Ari	24"	ottima / molto buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso W la quale fa parte di un piccolo asterismo di 5 componenti che ricorda la testa dell'Aquario — 450x.
IC 190	gx	02h02m07s	+23°33.0'		Ari	24"	ottima / molto buono	facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 192	gx	02h02m32s	+16°00.8'		Ari	16"	ottima / ottimo	abbastanza facile, compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
IC 193	gx	02h02m31s	+11°05.6'		Ari	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, ma molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 1.5' e appena più brillante all'interno — 380x.
IC 194	gx	02h03m05s	+02°36.8'		Psc	24"	ottima / ottimo	è una lama di luce orientata da N a S ed estesa oltre 1', con piccolo bulge evidente, ma poco contrastato — 450x.
IC 195	gx	02h03m45s	+14°42.5'		Ari	16"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40", con piccolo bulge evidente e contrastato sul disco — 380x.
IC 196	gx	02h03m50s	+14°44.2'		Ari	16"	ottima / ottimo	più estesa di IC195, dalla quale dista solo un paio di primi NNE, allungata ~ da N a S con dimensioni 90"×30"; presenta un evidente bulge diffuso e nucleo stellare — 380x.
IC 197	gx	02h04m05s	+02°47.2'		Psc	24"	ottima / ottimo	facile e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
IC 198	gx	02h06m03s	+09°17.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	assieme a IC 199 forma una coppia di gx debolissime di luminosità uniforme che si osservano solo in visione distolta a 270x; la 1a è più evidente, forse perché più piccola, poco allungata da NE a SW e con dimensioni 40"×30; la 2a è più stemperata, allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×40".
IC 199	gx	02h06m19s	+09°13.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	v. **IC 198**
IC 200	gx	02h06m49s	+31°09.5'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' SE — 450x.
IC 202	gx	02h07m29s	+09°10.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso SE — 450x.
IC 205	gx	02h07m27s	−02°05.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	facile, poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; c'è una doppia stretta con componenti brillanti a 4' verso SW — 450x.
IC 206	gx	02h09m31s	−06°58.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	fa parte di un terzetto assieme a IC 207 e 209 — debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×20" — 400x.
IC 207	gx	02h09m39s	−06°55.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	poco più evidente a prima vista, in quanto più contrastata ai bordi, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 400x.
IC 208	gx	02h08m28s	+06°23.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	è una debole bolla circolare con Ø di 70", molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; è meglio visibile a 270x.
IC 209	gx	02h08m59s	−07°03.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	la più facile del terzetto di IC 206-7, poco diffusa, allungata da ENE a WSW (come le 2 stelline a N e NE distanti 3'), con dimensioni 60"×45" e poco più brillante all'interno — 400x.
IC 210	gx	02h09m28s	−09°40.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	è una bella gx posta quasi di taglio, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da ENE a WSW per un paio di primi — 400x.
IC 211	gx	02h11m08s	+03°51.2'		Cet	16"	ottima / ottimo	bolla circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme e di ~ 1' di Ø; meglio contrastata a 270x.
IC 212	gx	02h13m38s	+16°35.6'		Ari	16"	m. buona / scarso	è un debolissimo oggetto esteso non più di 20" situato tra 2 stelline molto deboli distanti 1.5'; quella orientale è una doppia molto stretta che alla prima occhiata potrebbe trarre in inganno — 270x.
IC 213	gx	02h14m04s	+16°27.4'		Ari	16"	m. buona / scarso	debole bolla circolare di luminosità pressoché uniforme, con Ø di 1' e molto diffusa; c'è una stellina molto debole all'interno verso E visibile a 380x.
IC 214	gx	02h14m06s	+05°10.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto alquanto irregolare, poco diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale abbastanza evidente, ma decentrata verso S (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 450x.
IC 215	gx	02h14m09s	−06°48.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; situata a 1' N di una stellina brillante — 400x.
IC 217	gx	02h16m11s	−11°55.5'		Cet	16"	m. buona / mediocre	è una debole lama di luce di luminosità uniforme estesa un paio di primi e orientata da NE a SW; c'è una stellina appena percettibile al bordo meridionale — 270x.
IC 219	gx	02h18m39s	−06°54.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	diffusa e con alto gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; un nodulo diffuso appena percettibile appare a ridosso NW che è poi risultato essere **MCG-1-6-87** — 450x.
IC 220	gx	02h19m12s	−12°46.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; 3 stelline abbastanza brillanti allineate situate a W sembrano puntare verso la gx — 400x.
IC 221	gx	02h22m41s	+28°15.4'		Tri	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di 1', diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW e un'altra appena percettibile a ridosso verso N — 380x.
IC 222	gx	02h22m48s	+11°38.3'		Ari	24"	buona / buono	rotonda con Ø di 45", molto debole e con basso gradiente di luce — 450x.
IC 223	gx	02h22m01s	−20°44.7'		Cet	16"	m. buona / scarso	facile, molto diffusa, poco allungata all'incirca da N a S con dimensioni 50"×40"; presenta un piccolo nucleo di aspetto quasi stellare (situata 5' NNE di NGC 899) — 188x.
IC 224	gx	02h24m45s	−12°33.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 400x (a 570x appare rotonda e leggermente screziata.
IC 225	gx	02h26m28s	+01°09.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 230	gx	02h28m47s	−10°49.9'		Cet	24"	buona / ottimo	debole e diffusa, con condensazione centrale appena percettibile; è rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
IC 231	gx	02h29m56s	+01°10.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	facile, relativamente compatta, rotonda con Ø < 30"; presenta una piccola condensazione centrale poco contrastata; la gx è un po' disturbata da una stella brillante situata 1' a SE — 450x.
IC 232	gx	02h31m12s	+01°15.9'		Cet	16"	ottima / buono	debole, diffusa, orientata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×45" e con piccolo nucleo di aspetto stellare — 380x.
IC 233	gx	02h31m41s	+02°48.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 234	gx	02h31m37s	−00°08.3'		Cet	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti subito a SE — 450x.
IC 235	gx	02h32m51s	+20°38.5'		Ari	16"	m. buona / m. buono	molto piccola e compatta, rotonda con Ø di 20" e leggermente condensata — 380x.
IC 237	gx	02h33m32s	+01°08.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 238	gx	02h35m23s	+12°50.3'		Ari	16"	ottima / scarso	relativamente brillante, diffusa, con bulge evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40" — 270x.
IC 239	gx	02h36m28s	+38°58.2'	q 93	And	16"	ottima / ottimo	è una gx molto diffusa, stemperata su fondo cielo e di luminosità uniforme; ci sono molte stelle brillanti nel campo, fra cui una al bordo meridionale, che non consentono di stimarne bene la forma; questa è approssim. rotonda con Ø di almeno 3'; un trapezio regolare di stelline deboli è sovrapposto alla gx e la base maggiore ne delimita grosso modo il Ø — 270x.
IC 241	gx	02h37m54s	+02°19.7'		Cet	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, grosso modo rotonda, con Ø di 40", con alto gradiente di luce e nucleo stellare evidente a 380x.
IC 242	gx	02h38m32s	−06°54.1'		Cet	16"	buona / ottimo	molto debole e molto diffusa, poco allungata da NE a SW (orientata, cioè, come le 2 stelline a NW con le quale forma un piccolo triangolo equilatero), con dimensioni 40"×30"; presenta una tenue condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
IC 244	gx	02h34m25s	+02°49.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; poco meglio evidente a scalando a 340x.
IC 245	gx	02h38m55s	−14°18.3'		Cet	24"	buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 40"×20" — 280x.
IC 246	gx	02h40m28s	+02°28.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	presenta un nucleo stellare evidente circonfuso da un alone con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW; un'altra stellina appena percettibile appare solo a momenti un poco più distante sempre a SW: ma da un controllo successivamente effettuato questa è risultata essere la PGC 1228078 — 450x.
IC 247	gx	02h40m09s	−11°44.0'		Cet	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta in un campo virtualmente depleto a 380x; c'è una stellina a > 1' W; ε Ceti di magnitudo 4.8 a 12' SW.
IC 248	gx	02h41m26s	+17°48.7'		Ari	16"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
IC 250	gx	02h40m54s	−13°18.8'		Cet	24"	buona / mediocre	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø ~ 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 251	gx	02h41m14s	−14°57.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con tenue nucleo stellare; c'è una stella brillante 1' scarso a SE e una appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso S — 450x.
IC 252	gx	02h41m45s	−14°50.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	rotonda con Ø simile a IC 251, dalla quale dista 10' a NE, con nucleo stellare abbastanza evidente, ma di gradiente di luce inferiore — 450x.
IC 253	gx	02h42m06s	−15°02.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	relativamente brillante, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo quasi stellare molto evidente — 450x.
IC 255	gx	02h47m03s	+16°17.3'		Ari	24"	m. buona / m. buono	relativamente debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 257	gx	02h49m45s	+46°58.6'		Per	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, presenta un bulge di 30"×20" circonfuso da un tenue alone orientato da N a S ed esteso almeno il doppio; c'è una stellina al bordo S — 450x.
IC 260	gx	02h51m01s	+46°57.3'		Per	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale evidente; allineata ed equidistante con due stelline brillanti a SW e con altre due più debole a NW — 450x.
IC 262	gx	02h51m43s	+42°49.7'		Per	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e con alto gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; ci sono 2 deboli stelline a ridosso N e SW — 450x.
IC 265	gx	02h54m44s	+41°39.3'		Per	28"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; due stelline si trovano rispettivamente a 1' SSE e 1' NNE — 495x.
IC 266	gx	02h55m05s	+42°15.8'		Per	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e brillante, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo W — 450x.
IC 267	gx	02h53m50s	+12°50.9'		Ari	16"	ottima / scarso	debole, allungata ~ da N a S, di dimensioni 90"×30", di luminosità uniforme, situata in una piccola zona depleta — 188x.
IC 268	gx	02h55m27s	−14°06.2'		Eri	24"	buona / mediocre	forma una coppia assieme a IC 269 situata un paio di primi più a N; è molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×20"; c'è una stellina brillante a 2' ENE — 280x.
IC 269	gx	02h55m26s	−14°04.0'		Eri	24"	buona / mediocre	molto debole e molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; la stessa stellina brillante di cui alla voce precedente è situata 2.5' a SE — 280x.
IC 270	gx	02h55m44s	−14°12.5'		Eri	24"	buona / mediocre	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 1'; c'è una stellina al bordo SW; situata a ridosso verso E di un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti — 280x.
IC 271	gx	02h55m19s	−12°00.5'		Eri	24"	m. buona / scarso	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, poco allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×30"; forse a causa del seeing il contrasto sembra migliore scalando a 210x.
IC 272	gx	02h56m06s	−14°11.2'		Eri	24"	buona / mediocre	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale quasi stellare — 280x.
IC 273	gx	02h57m11s	+02°46.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
IC 276	gx	02h58m41s	−15°42.2'		Eri	16"	ottima / m. buono	relativamente compatta e brillante, con bulge diffuso abbastanza contrastato e nucleo stellare; è allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
IC 277	gx	02h59m51s	+02°46.3'		Cet	16"	ottima / m. buono	debole, ma facilmente visibile, di luminosità uniforme, allungata da SW a NE con dimensioni 45"×30" (è riportata sull'Uranometria come **UGC 2460**) — 270x.
IC 278	gx	03h01m31s	+37°45.9'		Per	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda, leggermente condensata e di ~ 40" di Ø; c'è una stellina al bordo occidentale — 380x.
IC 279	gx	03h01m12s	+16°12.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
IC 280	aster	03h03m05s	+42°21.6'		Per	16"	m. buona / m. buono	piccolo gruppo molto povero e abbastanza insignificante — 380x.
IC 283	gx	03h03m50s	−00°12.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, con tenue bulge poco contrastato, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 284	gx	03h06m09s	+42°22.3'	q 63	Per	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 2'×1'; meglio contrastata scalando a 340x, ma a 450x appare più facilmente un piccolo triangolo di stelline nella parte orientale del disco (quella più a W, appena percettibile, potrebbe in realtà essere il nucleo stesso della gx); un debole nodulo a SW, simile a una stellina appena sfuocata è risultata essere la gx 5ZW 319 (IC 284 era osservabile, seppur molto debolmente, nel 10" a 118x in buone condizioni di visibilità).
IC 285	gx	03h04m06s	−12°00.9'		Eri	16"	buona / ottimo	fa parte del quartetto di NGC 1200 dalla quale dista 3' SE — relativamente facile, anche se debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con piccolo nucleo appena percettibile — 270x.
IC 288	gx	03h07m33s	+42°23.2'		Per	28"	m. buona / ottimo	facile, allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×25", diffusa e con bulge contrastato; c'è una stellina quasi a ridosso SE e una molto debole subito a SW; una 3ª stellina si trova a 1' verso N — 495x.
IC 289	np	03h10m20s	+61°19.0'	q 18	Cas	24"	m. buona / m. buono	grosso modo rotonda con Ø di 45", ma coi bordi un poco irregolari; è di aspetto praticamente uniforme, salvo alcune tenui discrepanze di luce che appaiono a tratti all'interno (il campo è molto ricco di stelle, alcune delle quali molto brillanti); la planetaria era visibile molto debolmente anche nel 10" a 178x — 450x.
IC 290	gx	03h09m43s	+40°58.5'		Per	28"	m. buona / m. buono	debole lama di luce estesa 1' in direzione NW-SE, ben definita e con piccolo bulge molto tenue — 495x.
IC 291	gx	03h07m26s	−12°35.2'		Eri	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con tenue condensazione centrale — 400x.
IC 292	gx	03h10m13s	+40°45.9'		Per	24"	buona / buono	relativamente facile, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con basso gradiente di luce; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S — 450x.
IC 294	gx	03h11m03s	+40°37.3'		Per	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un piccolo triangolo di stelline a ridosso W — 450x.
IC 298	gx	03h11m18s	+01°19.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	assieme a IC 298A forma una coppia di galassiette situate praticamente a contatto tra loro; la 1ª è debole, diffusa rotonda con Ø poco inferiore a 30"; un tenue "gap" appare a tratti al bordo occidentale (l'effetto è stato poi riconfermato spingendo a 570x); la compagna presenta un nucleo stellare abbastanza evidente; occorre anche qui forzare a 570x per notarne l'allungamento da N a S con dimensioni 20"×10".
IC 298A	gx	03h11m19s	+01°18.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	v. **IC 298**
IC 299	gx	03h11m02s	−13°06.5'		Eri	24"	m. buona / mediocre	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE; la SAO 148811 di magnitudo 10.6 si trova 3' a NW — 450x.
IC 301	gx	03h14m48s	+41°13.3'		Per	24"	buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole verso la periferia N dell'alone e una più evidente a ridosso SW — 450x.
IC 302	gx	03h12m51s	+04°42.5'		Cet	16"	ottima / buono	è un debole ovale di 80"×60" orientato da NNE a SSW; l'asse maggiore punta a una debole stellina situata a ~ 1' SSW dal bordo; meglio visibile a 188x.
IC 304	gx	03h15m03s	+37°52.3'		Per	16"	m. buona / m. buono	assieme a IC 305 forma una coppia di oggetti molto deboli, distanti poco più di 1' in direzione N-S; la 1ª è di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con una stellina a ridosso verso SE; la 2ª è più debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale visibile a tratti; la debole stellina situata 1' a N è la stessa a ridosso della gx precedente; un'altra stellina più brillante si trova a 1' scarso NE — 380x.
IC 305	gx	03h15m04s	+37°51.6'		Per	16"	m. buona / m. buono	v. **IC 304**
IC 307	gx	03h13m45s	−00°14.4'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 80"×30" e con tenue bulge diffuso appena più brillante, ma visibile solo a tratti — 270x.
IC 308	gx	03h16m16s	+41°10.8'		Per	28"	ottima / discreto	fa parte del **Grande Ammasso di Perseo** — diffusa e con condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S e una molto debole al bordo E — 388x.
IC 309	gx	03h16m06s	+40°48.3'		Per	24"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra 2 stelline brillanti orientate da NW a SE — 450x.
IC 310	gx	03h16m43s	+41°19.5'		Per	28"	ottima / discreto	fa parte, assieme alla successiva, del **Grande Ammasso di Perseo** — facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso — 388x.
IC 312	gx	03h18m08s	+41°45.3'		Per	28"	ottima / discreto	relativamente brillante, poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25" — 388x.
IC 313	gx	03h20m58s	+41°53.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una doppia serrata quasi a ridosso SE, mentre 2 stelline appena percettibili si trovano ai bordi E e W — 495x.
IC 315	gx	03h19m09s	+04°02.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
IC 316	gx	03h21m20s	+41°55.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con **MCG+7-7-64** — ciò che si vede sono 2 "anse" molto tenui che aggettano a E e W da una stellina abbastanza brillante sovrapposta alla gx (l'ansa a W è poco più evidente); una debole stellina si trova a una 30-ina di secondi verso W; a ridosso S si sovrappone la compagna che è molto piccola e debole, una sorta di baffo orientato da NW a SE, esteso non più di 20" e con un nucleo stellare (a meno che non si tratti anche in questo caso di una stellina sovrapposta) — 495x.
IC 317	gx	03h18m56s	−12°44.5'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno; a tratti screziata nella zona centrale se osservata a 400x; c'è una stellina appena percettibile subito a SW e un'altra a un paio di primi WNW; una 3ª si trova a 2' verso N.
IC 318	gx	03h20m44s	−14°34.1'		Eri	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 400x.
IC 319	gx	03h23m27s	+41°24.4'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" o poco più; c'è una stellina al bordo S — 495x.
IC 320	gx	03h25m59s	+40°47.3'		Per	24"	buona / buono	debole chiazza molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo W — 450x.
IC 321	gx	03h24m30s	−14°59.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
IC 325	gx	03h30m49s	−07°02.7'		Eri	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
IC 326	gx	03h30m36s	−14°25.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W, di dimensioni 60"×40" e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso SE; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 327	gx	03h31m10s	−14°41.5'		Eri	24"	buona / m. buono	debolissima, molto diffusa,e di forma indistinta; salta fuori in visione distolta a 400x; non è più estesa di 20"-25" (situata 3' a S di IC 328).
IC 328	gx	03h31m11s	−14°38.3'		Eri	24"	buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline situate un paio di primi a N e NE — 400x.
IC 329	gx	03h32m01s	+00°16.8'		Tau	24"	m. buona / m. buono	assieme a IC 330 e IC 331 forma un terzetto posto ai vertici di un triangolo isoscele che punta a N — è la più piccola delle 3, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare evidente; disturbata dalla SAO 111243 di 8ª grandezza situata un paio di primi a ENE — 450x.
IC 330	gx	03h32m08s	+00°21.2'		Tau	24"	m. buona / m. buono	è situata al vertice più acuto del triangolo isoscele formato con IC 329 e IC 331; molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; situata, a sua volta, all'interno di un piccolo triangolo formato con 2 stelline deboli e una brillante a NNE — 450x.
IC 331	gx	03h32m19s	+00°17.0'		Tau	24"	m. buona / m. buono	è la più orientale del terzetto posto ai vertici di un triangolo isoscele che punta a N (le altre due sono IC 329 e IC 330) rotonda, diffusa, con Ø < 30" e nucleo di aspetto stellare; anche questa purtroppo disturbata dalla SAO 111243 situata 2.5' a W — 450x.
IC 332	gx	03h32m37s	+01°23.0'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge molto diffuso; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x.
IC 334	gx	03h45m17s	+76°38.3'	q 5	Cam	24"	buona / m. buono	facile, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 90"×60" e con piccolo bulge brillante abbastanza compatto all'interno del quale si nota un nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso S del bulge (era debolmente visibile anche nel 10" a 178x) — 450x.
IC 338	gx	03h37m38s	+03°07.1'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e con piccolo bulge poco contrastato; c'è una stellina a 1' verso NW — 450x.
IC 342	gx	03h46m49s	+68°05.8'	q 18	Cam	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo brillante circonfuso da un piccolo bulge che si stempera rapidamente sul fondo cielo; una stellina si trova quasi a ridosso verso N; il disco, esteso almeno una 15-ina di primi, è quasi totalmente invisibile, offuscato dalle numerose stelline sovrapposte, fra le quali ne spiccano 6 allineate a SW; osservando in visione distolta a 132x la parte centrale della gx sembra effettivamente "ovattata" come se il cielo fosse leggermente velato.
IC 343	gx	03h40m07s	−18°26.6'		Eri	16"	ottima / mediocre	fa parte del sestetto di NGC 1393 — diffusa, con bassa luminanza superficiale, ma di aspetto un po' irregolare, orientata da NW a SE con dimensioni ~ 60"×40" — situata 8' N di NGC 1407 — 270x.
IC 344	gx	03h41m29s	−04°39.9'		Eri	16"	m. buona / discreto	molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW (situata 7' WNW di NGC 1417) — 270x.
IC 347	gx	03h42m32s	−04°18.0'		Eri	16"	m. buona / discreto	è molto diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45" e con piccola condensazione centrale ben contrastata sul disco — 270x.
IC 348	aa	03h44m34s	+32°10.0'		Per	16"	buona / discreto	molto povero, a 188x si contano a mala pena una decina di componenti; un paio di queste, situate verso parte meridionale dell'ammasso sono abbastanza brillanti e sono immerse in una tenue chiazza lattescente che costituisce la nebulosa IC 1985.
IC 349	neb	03h46m00s	+23°45.0'	q 132	Tau	10"	buona / buono	è un baffo di luce molto tenue che si diparte dalla 23 Tauri (Merope) verso S per una 15-ina di primi; è interessante osservata a 118x cercando di tener fuori campo la stella.
IC 350	gx	03h44m37s	−11°48.0'		Eri	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è disturbata dalla SAO 149142 arancione di 10ª magnitudo situata un paio di primi a ENE — 450x.
IC 351	np	03h47m33s	+35°02.7'	q 95	Per	16"	buona / m. buono	brillante, rotonda, appare come una stella leggermente sfuocata con Ø di ~ 10"; c'è una debole stellina a una 20-ina di secondi verso WNW — 380x.
IC 352	gx	03h47m37s	−08°44.0'		Eri	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una doppia stretta fortemente sbilanciata a un paio di primi verso S — 450x.
IC 356	gx	04h07m47s	+69°48.8'	q 18	Cam	16"	ottima / ottimo	presenta un bulge evidente con nucleo di aspetto quasi stellare circonfuso da un alone molto stemperato; è ovale, orientata da E a W con dimensioni 2'×1.5'; ci sono 2 stelline: una a NE, ancora all'interno dell'alone, e un'altra a ridosso del bordo NW — 380x.
IC 357	gx	04h03m44s	+22°09.5'		Tau	28"	m. buona / ottimo	diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; la condensazione centrale è allungata da E a W; tuttavia se ci si concentra su questa si tende a perdere il debole alone; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso E (fa parte di un triangolo rettangolo di stelline con la stessa luminosità) — 495x.
IC 359	gx	04h12m28s	+27°42.1'		Tau	16"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda, diffusa, con Ø di almeno 1' e con piccolo nucleo di aspetto quasi stellare visibile a tratti a 270x.
IC 361	aa	04h12m51s	+58°15.0'		Cam	16"	m. buona / ottimo	rotondo con Ø di 5', ma di aspetto un po'' irregolare; si riesce a risolvere, a 270x in una gragnola di stelline di luminosità abbastanza uniforme; ci sono 2 stelline brillanti orientate da NW a SE presso il bordo NW, mentre un archetto di 3 stelline ne lambisce il margine orientale.
IC 362	gx	04h06m42s	−12°12.0'		Eri	16"	m. buona / m. buono	allungata da N a S con dimensioni 45"×30" (l'asse maggiore della gx è circa uguale alla distanza delle 2 stelle a S orientate a perpendicolo), con bulge diffuso e poco contrastato — 270x.
IC 363	gx	04h18m55s	+03°02.0'		Tau	24"	ottima / discreto	relativamente facile, piccola, rotonda con Ø < 20" e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
IC 364	gx	04h19m07s	+03°11.3'		Tau	24"	ottima / discreto	è simile a IC 363, ma più diffusa e di aspetto più uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a W — 450x.
IC 365	gx	04h19m14s	+03°20.8'		Tau	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 450x.
IC 366	gx	04h19m41s	+02°21.6'		Tau	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
IC 367	gx	04h20m41s	−14°46.8'		Eri	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge poco contrastato sul disco — 380x.
IC 368	gx	04h22m43s	−12°36.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	a 450x appare debolmente screziata nella parte esterna, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo quasi stellare.
IC 369	gx	04h23m28s	−11°47.4'		Eri	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
IC 370	gx	04h24m02s	−09°23.8'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 373	gx	04h30m43s	−04°52.2'		Eri	16"	m. buona / discreto	diffusa, rotonda, di 45"-50" di Ø e con debole nucleo stellare osservabile a 380x.
IC 374	gx	04h32m33s	+16°38.1'		Tau	24"	ottima / buono	debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con piccolo nucleo quasi stellare; c'è un nodulo o una stellina appena percettibile al bordo E; una stellina evidente si trova a 1.5' NW — 450x.
IC 376	gx	04h31m16s	−12°27.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
IC 378	gx	04h31m28s	−12°58.0'		Eri	24"	m. buona / buono	piccola, relativamente compatta e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso SW — 450x.
IC 379	gx	04h31m51s	−07°14.3'		Eri	24"	m. buona / buono	relativamente facile, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45" — 450x.
IC 380	gx	04h31m45s	−12°55.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20", ma per vedere l'orientamento occorre scalare a 340x (a 450x è di aspetto più confuso); è allineata con 2 stelle brillanti a NE.
IC 381	gx	04h44m29s	+75°38.4'	q 5	Cam	16"	ottima / ottimo	ovale diffuso con gradiente di luce molto basso e un'evidente condensazione centrale quasi; è orientata da N a S con dimensioni 2'×1.5'; c'è una stellina a ridosso del bordo settentrionale; una doppia molto stretta costituita da stelline debolissime si trova invece subito a W — 380x.
IC 382	gx	04h37m56s	−09°31.1'	q 269	Eri	16"	m. buona / scarso	facile, diffusa, rotonda con Ø di 1' e basso gradiente di luce; presenta condensazione centrale abbastanza evidente — 188x.
IC 385	gx	04h39m31s	−07°05.8'		Eri	24"	m. buona / buono	molto diffusa, con piccolo bulge abbastanza contrastato all'interno del quale si nota abbastanza facilmente un nucleo stellare; allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 450x.
IC 387	gx	04h41m44s	−07°05.1'		Eri	16"	ottima / buono	è una debole chiazza circolare di almeno 1' di Ø, molto diffusa e con condensazione centrale molto tenue — 270x.
IC 388	gx	04h42m00s	−07°18.7'		Eri	16"	ottima / buono	rotonda con Ø di 45", poco diffusa e più brillante all'interno; presenta un nucleo quasi stellare visibile a 380x; c'è un piccolo triangolo di stelle subito a W.
IC 390	gx	04h42m04s	−07°12.4'		Eri	16"	ottima / buono	relativamente facile, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge diffuso — 380x.
IC 391	gx	04h57m22s	+78°11.5'	q 5	Cam	16"	ottima / ottimo	è una bolla rotonda, regolare, poco diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di 1' — 380x.
IC 392	gx	04h46m26s	+03°30.3'		Ori	16"	ottima / scarso	molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", con condensazione centrale abbastanza contrastata sul disco; è situata tra 2 stelline brillanti orientate da NW a SE e distanti 5' — 270x.
IC 393	gx	04h47m52s	−15°31.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e leggermente condensata; quasi allineata ed equidistante con 2 stelline a NNE — 450x.
IC 395	gx	04h49m34s	+00°15.2'		Ori	16"	ottima / scarso	rotonda con Ø di ~ 40", relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenue nucleo stellare osservabile a tratti; c'è una stellina a ridosso verso E un'altra appena percettibile a ridosso W; a poco più di 1' verso W ce n'è un'altra — 270x.
IC 396	gx	04h57m58s	+68°19.4'	q 19	Cam	16"	passaggio di nubi	molto diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W, di dimensioni 2'×1', con piccola ed evidente condensazione centrale; è situate come nello schizzo riportato sul web — 188x.
IC 399	gx	05h01m44s	−04°17.3'		Eri	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
IC 401	gx	05h09m20s	−10°04.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×20", molto diffusa alle 2 estremità e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso N — 450x.
IC 402	gx	05h06m15s	−09°06.4'		Eri	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; è di aspetto un po' confuso, ma grosso modo rotonda con Ø > 1' — 270x.
IC 404	gx	05h13m20s	+09°45.3'		Ori	16"	buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di 25" o 30" max di Ø e nucleo stellare; anzi, in visione diretta si vede solo una debole stellina che forma una coppia ravvicinata con un'altra più brillante distante una 20-ina di secondi; quest'ultima lambisce in pratica il bordo SE della galassia — 380x.
IC 405	neb	05h14m32s	+34°10.0'	q 97	Aur	10"	buona / buono	sono chiazze abbastanza estese di luminosità molto vaga; è visibile un buco di forma ellittica in direzione N da AE Aurigae e un altra di forma irregolare verso W.
IC 407	gx	05h17m43s	−15°31.5'		Lep	24"	buona / m. buono	relativamente compatta e con tenue bulge diffuso appena percettibile, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×20"; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
IC 409	gx	05h19m34s	+03°19.0'		Ori	24"	m. buona / buono	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW — 450x.

IC 410	neb	05h22m25s	+33°27.0'	q 97	Aur	10"	buona / buono	debole nebulosità che appare nella parte occidentale dell'ammasso aperto **NGC 1893**.
IC 412	gx	05h21m58s	+03°29.1'		Ori	24"	m. buona / buono	assieme a IC 413 costituisce una coppia di gx relativamente brillanti, poco diffuse ed entrambe con nucleo stellare marcato; formano un piccolo triangolo con una stella situata a ridosso verso N della 2ª che è rotonda con Ø < 30"; la 1ª è invece allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" (il campo è ricco di stelle brillanti) — 450x.
IC 413	gx	05h21m59s	+03°29.9'		Ori	24"	m. buona / buono	v. **IC 412**
IC 414	gx	05h21m55s	+03°20.5'		Ori	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di di una 20-ina di secondi.
IC 416	gx	05h23m56s	−17°15.6'		Lep	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; allineata ed equidistante con due stelline situate a SSE — 450x.
IC 417	neb	05h28m17s	+34°25.0'	q 97	Aur	10"	buona / discreto	debole lucore molto diffuso, disturbato dalla luce di molte stelle di campo e che può essere evidenziato, sia pur a fatica, da un confine abbastanza brusco verso E; pare, cioè, delimitata da una grande zona oscura allungata da N a S ed estesa per una dozzina di primi; la visione non è tuttavia particolarmente interessante neppure a 46x — nonostante il campo apparente di oltre 1° — e anche se l'O III ne aumenta indubbiamente il contrasto rimane sempre un oggetto alquanto deludente. Da segnalare una stella brillante di 7ª grandezza verso la parte occidentale, la quale si trova al centro di un piccolo gruppo disperso di componenti che tendono a confondersi col background e riportato sull'Uranometria come Stock 8.
IC 418	np	05h27m28s	−12°41.8'	q 270	Lep	24"	ottima / ottimo	presenta uno spesso anello luminoso finemente screziato con Ø di una 20-ina di secondi e un debole alone periferico molto diffuso e uniforme, perfettamente simmetrico con Ø di 1'; la stellina centrale è brillante e di un colore bluastro; il filtro O III enfatizza la parte centrale, aumentandone forse troppo il contrasto, ma non l'alone esterno; la visione migliore si ha comunque senza filtro a 450x; la planetaria era facilmente visibile anche nel 10": a 178x mi ricordava vagamente una versione miniaturizzata della Eskimo.
IC 421	gx	05h32m08s	−07°55.1'		Ori	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 2'×1.5'; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 270x.
IC 422	gx	05h32m18s	−17°13.4'		Lep	24"	m. buona / m. buono	brillante, poco diffusa, gradatamente più luminosa verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccolo bulge quasi stellare — 450x.
IC 423	neb	05h33m20s	−00°36.5'	q 225	Ori	10"	ottima / m. buono	chiazza lattescente molto debole, estesa 5 o 6 primi che si riesce a scorgere solo a momenti; salta fuori tuttavia solo a 60x in visione distolta, perché contrasta molto poco con le zone circostanti.
IC 424	neb	05h33m37s	−00°24.5'	q 225	Ori	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza lattiginosa appena più brillante del fondo cielo di forma assolutamente indefinita che circonda una coppia di stelline separate da una 40-ina di secondi in direzione E-W — 270x.
IC 426	neb	05h36m42s	−00°19.0'	q 226	Ori	24"	buona / mediocre	molto diffusa e di forma indistinta; si nota dapprima un debole alone posto asimmetricamente verso E attorno a una coppia di stelline brillanti; una demarcazione abbastanza evidente passa a ridosso della componente più settentrionale di un piccolo triangolo posto a 3.5' ESE della coppia; il debolissimo chiarore arriva a lambire una stella situata 6' W della coppia, ma non si nota la tenue propaggine meridionale della nebulosa: questa appare solo molto sfumata verso S — 200x.
IC 431	neb	05h40m15s	−01°27.5'	q 226	Ori	10"	buona / buono	assieme a IC 432 sono 2 piccoli aloni molto deboli che circondano 2 stelline; la 2ª delle due è quella decisamente più brillante ed estesa, mentre la 1ª è visibile con molta fatica a 178x e in visione distolta; sono situate una 20-ina di primi a S della SAO 132445 di 5ª grandezza.
IC 432	neb	05h41m00s	+01°30.0'	q 226	Ori	10"	buona / buono	v. **IC 431**
IC 433	gx	05h40m31s	−11°39.9'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
IC 434	neb	05h40m40s	−02°27.0'	q 226	Ori	16"	ottima / buono	è visibile con una certa difficoltà nel 40 cm a 75x; è da notare che la Testa di Cavallo mi è apparsa molto più grande dell'aspettativa (di fatto era la prima volta che la vedevo) e di forma vagamente quadrangolare.
IC 435	neb	05h42m59s	−02°19.0'	q 226	Ori	10"	buona / buono	un'altra piccola nebulosa che circonda una stellina; a 118x appare di forma irregolare e con Ø di ~ 3'.
IC 438	gx	05h53m00s	−17°52.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	bella, molto diffusa, ma con gradiente di luce molto basso, a tratti debolmente screziata a 450x, rotonda con Ø di 1.5'; presenta un nodulo stellare appena percettibile al bordo NE; c'è una stellina a ridosso N e altre 2 di luminosità simile rispettivamente a S e poco più distante verso E; una stellina più evidente si trova invece subito a NE; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 440	gx	06h19m13s	+80°04.1'		Cam	16"	ottima / buono	facile, diffusa, si aspetto un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø inferiore a 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso verso SW — 270x.
IC 441	gx	06h02m42s	−12°30.0'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina al bordo W; meglio contrastata a 340x.
IC 442	gx	06h36m10s	+82°58.1'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente brillante e compatta, con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45" — 270x.
IC 443	neb	06h17m52s	+22°46.0'	q 137	Gem	10"	buona / buono	è visibile solo la zona più brillante col filtro O III unito all'oculare da 46x e appare come un getto di luce esteso una 15-ina di primi, leggermente arcuato verso SW; ricorda vagamente la Crescent Nebula osservata senza filtri.
IC 444	neb	06h22m12s	+22°59.0'	q 137	Gem	16"	ottima / ottimo	è visibile come una sorta di appannamento dell'oculare che circonda la 12 Geminorum di 6ª grandezza per un Ø di ca. 1'; questo effetto, pur essendo presente anche attorno alla 11 Gem di luminosità simile, è però molto meno visibile nel 2° caso, il che indica che la nebulosa è effettivamente visibile e anche con una certa facilità. Meglio impiegare la visione diretta a 270x.
IC 445	gx	06h36m21s	+67°51.6'		Cam	16"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di 45", diffusa e con piccolo nucleo evidente — 380x.
IC 449	gx	16h45m42s	+71°20.7'		Cam	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile e brillante, rotonda con Ø inferiore a 1'; è poco diffusa e presenta un piccolo nucleo stellare — 380x.
IC 450	gx	06h52m12s	+74°25.6'		Cam	16"	ottima / buono	presenta un brillante nucleo stellare e un tenuissimo alone che a 380x non pare più esteso di 25" o 30" (a bassi ingrandimenti sembra solo una stella!).
IC 451	gx	06h52m52s	+74°28.8'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente facile ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
IC 454	gx	06h51m06s	+12°55.3'		Gem	16"	m. buona / scarso	relativamente facile, ma di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 70"×40" — 380x.
IC 455	gx	07h34m52s	+85°32.3'		Cep	16"	ottima / buono	relativamente facile e compatta, orientata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con evidente condensazione centrale stellare — 270x.
IC 458	gx	07h10m34s	+50°07.1'		Lyn	24"	ottima / buono	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante al bordo S — 450x.
IC 459	gx	07h10m39s	+50°50.6'		Lyn	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (o poco meno) — 450x.
IC 460	gx	07h10m44s	+50°12.1'		Lyn	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
IC 461	gx	07h10m45s	+50°04.8'		Lyn	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; ci sono 3 stelline abbastanza brillanti e allineate a E — 450x.
IC 464	gx	07h11m05s	+50°08.2'		Lyn	24"	ottima / buono	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale stellare — 450x.
IC 465	gx	07h11m34s	+50°14.9'		Lyn	24"	ottima / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale molto evidente; c'è una stellina a 1' NE e una più debole alla stessa distanza SE; 3 deboli stelline allineate da NE a SW si trovano subito a S della gx — 450x.
IC 466	neb	07h08m39s	−04°19.0'	q 228	Mon	16"	ottima / buono	è un evidente alone di forma approssim. rotonda che circonda una stellina brillante; presenta come un piccolo "gap" nella parte occidentale, ma forse è un'impressione prodotta dalle 2 stelline deboli situate ai margini NW e SW — 270x.
IC 467	gx	07h30m16s	+79°52.3'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di aspetto uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina al bordo SW (appariva molto debolmente nel 10" a 178x) — 360x.
IC 469	gx	07h55m59s	+85°09.5'		Cep	16"	ottima / buono	facile, allungata da E a W con dimensioni 2'×1' e poco più brillante verso l'interno; appare leggermente screziata a 270x; presenta un piccolo nucleo più brillante e diffuso.
IC 471	gx	07h43m36s	+49°40.0'		Lyn	16"	m. buona / buono	più compatta di IC 472, molto evidente, di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 30" o 40" — 270x.
IC 472	gx	07h43m51s	+49°36.8'		Lyn	16"	m. buona / buono	debole, molto diffusa, ma facilmente visibile, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" e con basso gradiente di luce (situata 4' SE di IC 471) — 270x.
IC 474	gx	07h47m07s	+26°30.2'		Gem	24"	ottima / buono	relativamente facile, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge evidente, ma poco contrastato — 450x.
IC 475	gx	07h47m09s	+30°29.3'		Gem	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW e una debole alla stessa distanza verso NW — 450x.
IC 476	gx	07h47m16s	+26°57.0'		Gem	16"	ottima / m. buono	debolissima! È visibile in visione distolta spazzolando con gli occhi nei dintorni; è di aspetto molto diffuso e appare a tratti orientata da E a W per max 20" o 30" (situata 1.5' NW di NGC 2449) — 380x.
IC 477	gx	07h52m07s	+23°29.0'		Gem	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; una stellina appena percettibile a ridosso W, ma da un controllo successivo è risultata essere la **2MASS 07520522+2328513** — 450x.
IC 478	gx	07h53m42s	+26°29.5'		Gem	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; non sembra gran che disturbata dalla SAO 79977 di 8ª grandezza situata 4.5' a N — 450x.
IC 479	gx	07h54m22s	+27°00.5'		Gem	24"	ottima / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 480	gx	07h55m23s	+26°44.5'		Gem	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa ~ 1'; salta fuori in visione distolta a 380x.
IC 481	gx	07h59m03s	+24°09.6'		Gem	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15" e con tenue condensazione centrale appena percettibile — 450x.
IC 482	gx	07h59m47s	+25°21.5'		Gem	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di deboli stelline un paio di primi a W orientate da N a S e distanti come il Ø della gx; un'altra coppia di stelline più brillanti si trova 2.5' a NE; una stellina appena percettibile è situata quasi a ridosso della gx verso NW (al momento dell'osservazione era ancora molto bassa) — 340x.
IC 484	gx	08h00m01s	+26°39.9'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
IC 485	gx	08h00m20s	+26°42.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
IC 486	gx	08h00m21s	+26°36.8'		Gem	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa e con condensazione centrale evidente approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con CGCG 148-85 situata 1' a W — 450x.
IC 490	gx	08h03m20s	+25°48.7'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE — 450x.
IC 491	gx	08h03m55s	+26°31.2'		Cnc	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; una stellina appena percettibile appare a momenti a ridosso W, ma si tratta in realtà di 2MASS 08035300+2631233; un'altra simile e appena più evidente si trova a 1' SW; quest'ultima appare effettivamente nebulosa, ma non dovrebbe essere più estesa di 10": è la PGC 1779069 — 450x.
IC 492	gx	08h05m39s	+26°10.0'		Cnc	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 45", diffusa e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a ridosso verso SE — 380x.
IC 493	gx	08h07m27s	+25°08.0'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, rotonda, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 380x.
IC 494	gx	08h06m24s	+01°02.2'		Eri	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e poco più brillante all'interno — 380x.
IC 495	gx	08h08m19s	+09°00.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo irregolare molto allungato il cui vertice più acuto punta a NW — 450x.
IC 497	gx	08h10m06s	+24°55.3'		Cnc	24"	ottima / buono	debole e molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NW; una doppia stretta con stelle della stessa luminosità si trova a 1' N — 450x.
IC 498	gx	08h09m30s	+05°16.8'		CMi	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø > 1' — 400x.
IC 499	gx	09h45m12s	+85°44.4'		Cam	16"	ottima / buono	facile, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 90"×60" e con evidente condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso NE — 270x.
IC 500	gx	08h12m39s	−16°03.0'		Pup	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo NE — 450x.
IC 501	gx	08h18m48s	+24°32.2'		Cnc	24"	m. buona / buono	piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata tra 2 stelline orientate da NNE a SSW e distanti 3' — 450x.
IC 502	gx	08h22m04s	+08°45.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso W — 450x.
IC 503	gx	08h22m11s	+03°16.1'		Hya	24"	buona / buono	appare orientata da WNW a ESE, di dimensioni 45"×30", con piccola condensazione centrale diffusa poco decentrata verso WNW — 400x.
IC 504	gx	08h22m41s	+04°15.8'		Hya	24"	buona / buono	una delle più facili di un gruppo cui appartengono anche IC 504, IC 505 e IC 506 — rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SE — 400x.
IC 505	gx	08h23m22s	+04°22.3'		Hya	24"	buona / buono	molto debole, allungata da NW a SE con di dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 400x.
IC 506	gx	08h23m31s	+04°18.0'		Hya	24"	buona / buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 400x.
IC 508	gx	08h28m22s	+25°07.5'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30" — 380x.
IC 509	gx	08h32m03s	+24°00.7'		Cnc	16"	ottima / ottimo	bolla circolare di luminosità uniforme e Ø di ~ 1', con una stellina a ridosso verso NE — 380x.
IC 510	gx	08h32m11s	−02°09.7'		Hya	24"	buona / m. buono	debolissima e poco diffusa, salta fuori facilmente in visione distolta a 400x; a tratti appare poco allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 40"×30"; c'è una stellina subito a SE. Curiosità: a 6' scarsi SW c'è una debolissima coppia serrata di stelline che anche a questo ingrandimento appare come un piccolo oggetto nebuloso.
IC 511	gx	08h40m50s	+73°29.2'		Cam	16"	ottima / buono	è allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" con nucleo marcato e un alone poco diffuso — 270x.
IC 512	gx	09h03m51s	+85°30.1'	q 1	Cam	16"	ottima / discreto	debole, approssim. circolare con Ø di un paio di primi, molto diffusa e con tenue condensazione centrale poco più brillante del disco; c'è una debole stellina a ~ 1' SSE *(presenza di chiarore lunare)* — 188x.
IC 513	gx	08h33m05s	−12°21.3'		Hya	24"	m. buona / scarso	relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e don condensazione centrale quasi stellare abbastanza evidente — 340x.
IC 514	gx	08h35m22s	−02°02.8'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a bordo meridionale — 450x.
IC 515	gx	08h35m31s	−01°54.0'		Hya	24"	buona / discreto	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x — situata 3' S di NGC 2616.
IC 516	gx	08h35m51s	−01°52.3'		Hya	24"	buona / discreto	piccolo oggetto rotondo, debole e condensato con Ø non superiore a 15" — 450x — situata 4.5' ESE di NGC 2616.
IC 517	gx	08h36m22s	−02°03.3'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
IC 519	gx	08h40m34s	+02°36.7'		Hya	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione stellare — 450x.
IC 520	gx	08h53m42s	+73°29.5'	q 7	Cam	24"	m. buona / m. buono	bella, molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 80"×60", con piccolo bulge contrastato e nucleo stellare molto evidente; debolmente screziata a 450x; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S (era facilmente visibile anche nel 10" a 178x).
IC 521	gx	08h46m44s	+02°32.2'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue nucleo stellare; è situata all'interno, verso N, di un asterismo di 7 o 8 stelle brillanti ed esteso una decina di primi — 400x.
IC 522	gx	08h54m35s	+57°10.0'		UMa	16"	ottima / buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di 45", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 380x.
IC 523	gx	08h53m11s	+09°08.9'		Cnc	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; è situata tra 2 piccoli asterismi di 4 stelle foggiati a "y", uno a NW e l'altro a SE: quello a NW è più grande e ha una stella brillante distante meno di 4' dalla gx — 400x.
IC 525	gx	09h01m23s	−01°52.2'		Hya	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" e di luminosità pressoché uniforme salvo un nucleo stellare visibile a tratti a 400x.
IC 526	gx	09h02m41s	+10°50.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" — 450x.
IC 527	gx	09h09m42s	+37°36.1'		Lyn	16"	m. buona / buono	debole chiazza rotonda con Ø > 1', molto stemperata sul fondo cielo; a tratti appare una piccola condensazione centrale diffusa — 380x.
IC 528	gx	09h09m23s	+15°47.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, ma molto disturbata dalla SAO 98393 di 9ª grandezza situata 1.5' a NE; è molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25", con bulge evidente e nucleo stellare — 450x.
IC 529	gx	09h18m32s	+73°45.6'	q 8	Cam	24"	m. buona / ottimo	estesa, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo qualche irregolarità di luce molto tenue all'interno e visibile a tratti; allungata da NW a SE con dimensioni 2.5'×1'; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso E (era debolmente visibile anche nel 10" a 116x).
IC 530	gx	09h15m17s	+11°53.1'		Cnc	24"	buona / buono	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×15" (in visione distolta sembra ancora più lunga, come una edge-on) e con nucleo stellare — 400x.
IC 531	gx	09h17m51s	−00°16.7'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi scarsi e orientate a perpendicolo con la gx — 400x.
IC 534	gx	09h21m15s	+03°09.0'		Hya	24"	buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE ed estesa 1.5' — 570x.
IC 536	gx	09h24m40s	+25°06.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×15" e con nucleo puntiforme evidente; c'è una stellina appena percettibile al bordo E — 450x.
IC 537	gx	09h25m23s	−12°23.5'		Hya	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo relativamente compatto, con nucleo stellare e di una 20-ina di secondi di Ø; c'è una stellina subito a S — 380x.
IC 539	gx	09h29m08s	−02°33.0'		Hya	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
IC 540	gx	09h30m10s	+07°54.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15" e con bulge diffuso appena percettibile — 450x.
IC 542	gx	09h31m06s	−13°10.9'		Hya	24"	m. buona / scarso	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15", con tenue bulge diffuso e poco contrastato; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di NE — 450x.
IC 544	gx	09h35m53s	+24°53.6'		Leo	24"	buona / m. buono	è una lama di luce relativamente compatta, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NNE a SSW ed estesa 45" — 450x.
IC 545	gx	09h36m05s	+24°56.9'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
IC 546	gx	09h34m50s	−16°23.1'		Hya	16"	m. buona / scarso	relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso N; a soli 3' verso W c'è la SAO 155310 di 9ª: una doppia dalle componenti molto sbilanciate (situata 5' W di NGC 2924) — 270x.
IC 548	gx	09h38m19s	+09°26.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e con nucleo stellare, allungata da N a S con dimensioni 25"×10"; situata tra 2 stelline molto deboli, una a NE e l'altra quasi a ridosso verso SW (situata 5.5' a SSE di NGC 2939 osservata in altra data) — 450x.
IC 549	gx	09h40m43s	+03°57.6'		Hya	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso NW — 570x.
IC 550	gx	09h40m29s	−06°56.7'		Hya	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, con piccolo bulge evidente, orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; in parte disturbata dalla SAO 137050 di magnitudo 7.7 situata a meno di 5' NE e che anche a 450x si fatica a tenere fuori campo.
IC 551	gx	09h41m00s	+06°56.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 552	gx	09h41m17s	+10°38.8'		Leo	24"	buona / ottimo	è una bella galassietta ad alto gradiente di luce, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25", con bulge relativamente brillante e nucleo stellare — 450x.
IC 553	gx	09h40m45s	−05°26.1'		Hya	24"	buona / buono	debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
IC 555	gx	09h41m57s	+12°17.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa, con bulge evidente e nucleo stellare, allungata da N a S con dimensioni 45"×20"; c'è una coppia serrata di stelline subito a NW — 450x.
IC 557	gx	09h44m02s	+10°59.3'		Leo	16"	m. buona / buono	più debole di NGC 2984 dalla quale dista 7' a SE; è di aspetto confuso, estesa meno 1' e situata in mezzo a due stelline molto deboli distanti ~ 4' in direzione NE-SW — 380x.
IC 558	gx	09h45m00s	+29°27.1'		Leo	16"	m. buona / ottimo	rotonda, Ø di ~ 40", diffusa e con condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina a ridosso verso W; è meglio osservare a 270x, perché a 380x il campo è piuttosto depleto.
IC 559	gx	09h44m44s	+09°37.0'		Leo	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40.30; c'è una stella brillante a meno di 2' verso E — 450x.
IC 560	gx	09h45m53s	−00°16.1'		Hya	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina brillante a ridosso verso S e un'altra debole subito a W — 400x.
IC 561	gx	09h45m59s	+03°08.7'		Sex	16"	ottima / discreto	debole, rotonda, poco diffusa, con Ø di 30"-35" e di luminosità uniforme — 270x.
IC 562	gx	09h46m04s	−03°58.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 400x.
IC 563	gx	09h46m20s	+03°02.7'		Sex	16"	ottima / discreto	debole e di luminosità uniforme, diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 270x.
IC 564	gx	09h46m21s	+03°04.3'		Sex	16"	ottima / discreto	molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 90"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
IC 565	gx	09h47m50s	+15°51.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 450x.
IC 566	gx	09h49m56s	−00°13.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, compatta e con condensazione stellare visibile a momenti, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; meglio visibile a 580x, se non altro per tenere fuori campo la SAO 117933 di 7ª grandezza situata 4' a E.
IC 568	gx	09h51m08s	+15°43.8'		Leo	24"	buona / ottimo	diffusa, orientata da E a W con dimensioni 40"×20" e poco più brillante all'interno — 450x.
IC 569	gx	09h51m28s	+10°55.2'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e una tenue condensazione centrale di aspetto stellare; allineata e quasi equidistante con due stelline a S — 450x.
IC 570	gx	09h51m51s	+15°45.4'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
IC 571	gx	09h52m32s	+15°46.5'		Leo	24"	buona / ottimo	piccola, rotonda con Ø simile a IC 570, diffusa e con nucleo stellare marcata — 450x.
IC 572	gx	09h52m33s	+15°49.6'		Leo	24"	buona / ottimo	diffusa, con evidente condensazione centrale, rotonda con Ø > 20" — 450x.
IC 574	gx	09h54m27s	−06°57.2'		Sex	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, con piccola condensazione centrale evidente quasi stellare e con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 40" verso E — 380x.
IC 575	gx	09h54m33s	−06°51.4'		Sex	16"	ottima / ottimo	situata 6' a N di IC 574, è più debole e di aspetto più uniforme, diffusa, grosso modo rotonda con Ø 45" — 380x.
IC 576	gx	09h55m07s	+11°02.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola, relativamente compatta e solo a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
IC 577	gx	09h56m04s	+10°29.9'		Leo	24"	buona / mediocre	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina al bordo meridionale (vento forte) — 280x.
IC 578	gx	09h56m16s	+10°29.2'		Leo	24"	buona / mediocre	più diffusa di IC 577, dalla quale dista 3' a E, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno (vento forte) — 280x.
IC 579	gx	09h56m39s	−13°46.5'		Hya	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 380x.
IC 581	gx	09h58m12s	+15°56.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con bulge diffuso, abbastanza contrastato; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 450x.
IC 582	gx	09h59m00s	+17°49.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con IC 583 — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 40" — 380x.
IC 583	gx	09h55m05s	+17°49.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma facilmente visibile anche in visione diretta; è allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme (situata 1' a E di IC 582) — 380x.
IC 584	gx	09h59m05s	+10°21.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e un nucleo stellare visibile solo a momenti — 450x.
IC 585	gx	09h59m44s	+12°59.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	di aspetto simile a NGC 3080, dalla quale dista ~ 5' SW, ma di Ø leggermente inferiore — 380x.
IC 587	gx	10h03m05s	−02°24.0'		Sex	16"	ottima / ottimo	molto debole, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio contrastata a 270x, allungata da E a W con dimensioni 40"×20".
IC 588	gx	10h02m07s	+03°03.5'		Sex	16"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; meglio osservabile a 380x.
IC 590	gx	10h05m50s	+00°38.0'		Sex	16"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con MAC 1005+0037B; in visione distolta appaiono 2 nuclei stellari ravvicinati immersi in un alone esteso ~ 40"; le singole galassie sembrano rotonde con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
IC 591	gx	10h07m28s	+12°16.5'	q 189	Leo	16"	m. buona / buono	relativamente facile e compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una debole stellina a un paio di primi NNW (situata 23' scarsi a N di Regolo) — 188x.
IC 592	gx	10h07m59s	−02°29.9'		Sex	16"	ottima / ottimo	debolissima e in parte disturbata dalla SAO 137367 arancione di 8ª grandezza situata ad appena 1.5' verso S; è probabilmente rotonda con Ø di 25" o 30" — 380x.
IC 593	gx	10h08m18s	−02°31.6'		Sex	16"	ottima / ottimo	appena più evidente, di Ø simile e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso E; la SAO 137367, situata 5' a W, si riesce stavolta a tenere fuori campo a 380x.
IC 594	gx	10h10m31s	+10°02.5'		Sex	16"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 380x.
IC 595	gx	10h09m38s	+11°00.0'		Leo	24"	buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 596	gx	09h58m12s	+15°56.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con bulge diffuso, abbastanza contrastato; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 450x.
IC 598	gx	10h12m49s	+43°08.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	facile, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" con bulge evidente e nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
IC 599	gx	10h13m12s	−05°37.7'		Sex	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, ma relativamente facile da vedere in visione distolta a 380x; è molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con tenuissimo bulge appena percettibile.
IC 600	gx	10h17m11s	−03°29.9'		Sex	24"	m. buona / discreto	facile, relativamente estesa, ma con bassissimo gradiente di luce; è allungata da NNE a SSW con dimensioni grosso modo 2'×1'; un piccolo bulge diffuso appare a tratti poco decentrato verso SE — 400x.
IC 601	gx	10h18m15s	+07°02.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a poco più di 1' NE — debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
IC 602	gx	10h18m20s	+07°03.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la precedente situata a poco più di 1' SW — relativamente compatta e brillante, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante subito a S — 450x.
IC 603	gx	10h19m25s	−05°39.4'		Sex	16"	m. buona / m. buono	debole e molto disturbata dalla luce della SAO 137488 di 9.2 situata a poco più di 1' N; è poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30", diffusa e con bulge rotondo abbastanza evidente — 380x.
IC 605	gx	10h22m24s	+01°11.9'		Sex	24"	m. buona / discreto	debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
IC 606	gx	10h23m33s	+10°57.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
IC 607	gx	10h24m09s	+16°44.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole ovale diffuso e di luminosità pressoché uniforme, orientato da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 400x.
IC 608	gx	10h24m21s	−06°02.3'		Sex	24"	mediocre / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
IC 609	gx	10h25m35s	−02°12.9'		Sex	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; appare meglio contrastata scalando a 200x.
IC 610	gx	10h26m28s	+20°13.7'		Leo	16"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da NE a SE, estesa 1.5' e spessa non più di 20", con tenuissimo bulge diffuso appena percettibile — 380x.
IC 612	gx	10h27m06s	+11°03.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a s di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; è situata quasi in mezzo a due stelline abbastanza brillanti (fa parte dell'ammasso AGC 1016).
IC 613	gx	10h27m08s	+11°00.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1' E (fa parte dell'ammasso AGC 1016).
IC 614	gx	10h26m52s	−03°27.8'		Sex	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, poco meglio evidente a 270x, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N.
IC 615	gx	10h27m22s	+11°04.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20" (fa parte dell'ammasso **AGC 1016**).
IC 616	gx	10h32m47s	+15°51.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	diffusa, rotonda con Ø di 45", a tratti screziata a 400x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE.
IC 620	gx	10h33m33s	+11°52.3'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; la MAC 1033+1152 appare solo elusivamente a ridosso N, ma solo come una stellina; per scovarla non bisogna però scendere sotto i 340x.
IC 621	gx	10h33m22s	+02°40.8'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
IC 623	gx	10h35m21s	+03°33.5'		Sex	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
IC 624	gx	10h36m15s	−08°20.1'		Sex	16"	m. buona / scarso	molto allungata da NE a SW, di dimensioni di 80"×20", con piccolo bulge abbastanza brillante e nucleo stellare — 270x.
IC 626	gx	10h36m57s	−07°01.4'		Sex	16"	m. buona / scarso	molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 270x.
IC 627	gx	10h37m20s	−03°21.4'		Sex	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e poco più brillante all'interno — 400x.
IC 628	gx	10h37m36s	+05°36.2'		Sex	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina abbastanza brillante 1.5' a S — 380x.
IC 630	gx	10h38m34s	−07°10.2'		Sex	16"	m. buona / scarso	è un oggetto molto piccola e relativamente compatto, rotondo con Ø di 20" e con nucleo stellare; è situato a ridosso NNE della SAO 137699 di magnitudo 7.8 — 270x.
IC 632	gx	10h39m12s	−00°24.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale molto tenue — 450x.
IC 633	gx	10h39m24s	−00°23.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a 1' NNE — 450x — situata 3.5' a ENE di IC 632.
IC 634	gx	10h40m55s	+05°59.5'		Sex	24"	m. buona / buono	diffusa, con piccolo bulge appena percettibile, allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso ESE (ossia sul prolungamento dell'asse maggiore della gx) — 450x.
IC 635	gx	10h41m45s	+15°38.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
IC 636	gx	10h41m51s	+04°19.8'		Sex	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso SW (in realtà ce n'è una terza molto debole a ridosso di quella più a NW); poco disturbata dalla SAO 118434 di magnitudo 8.5 situata un paio di primi a S — 450x.
IC 637	gx	10h42m22s	+15°21.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso NE e una abbastanza brillante a 1' SW (quest'ultima è la più occidentale di un piccolo asterismo di 5 componenti foggiato a "M" o "W" molto aperta) — 450x.
IC 638	gx	10h43m48s	+15°53.7'		Leo	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 639	gx	10h45m52s	+16°55.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
IC 642	gx	10h48m08s	+18°11.3'		Leo	16"	buona / ottimo	abbastanza facile, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 80"; è meglio visibile a 270x.
IC 643	gx	10h49m27s	+12°12.0'		Leo	24"	buona / m. buono	presenta un bulge abbastanza brillante con all'interno un nucleo stellare; due baffi molto tenui si dipartono a E e W per un'estensione totale di ~ 45" — 450x.
IC 644	gx	10h51m32s	+55°23.5'		UMa	16"	buona / mediocre	debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W (situata 4.5' a N di NGC 3398, la galassia che volevo osservare) — 188x.
IC 648	gx	10h51m00s	+12°17.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40", debolmente screziata a 450x; c'è una stellina al bordo N (può darsi, anzi, che sia proprio questa a dare l'impressione di un leggero allungamento: forse la gx è rotonda); purtroppo il campo è disturbato dalla SAO 99317 di 8ª grandezza situata 4' scarsi a SW.
IC 649	gx	10h50m52s	+01°09.4'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di aspetto a prima vista un po' confuso, grosso modo allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso verso SW — 450x.
IC 651	gx	10h50m58s	−02°09.0'		Sex	24"	buona / m. buono	gx facile, ma dai bordi non ben definiti, rotonda con Ø di 40" e di luminosità uniforme — 400x.
IC 653	gx	10h52m07s	−00°33.6'		Sex	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata a 270x; forma un triangolo con 2 stelline: una 1.5' a S e l'altra 2' a SW.
IC 654	gx	10h53m50s	−11°43.5'		Crt	24"	m. buona / discreto	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×25" e con piccolo bulge contrastato — 450x.
IC 655	gx	10h54m22s	−00°21.9'		Leo	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1' — 450x.
IC 657	gx	10h57m54s	+04°54.3'		Leo	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 1.5' SE di una debole stellina; è allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
IC 658	gx	10h58m16s	+08°14.5'		Leo	16"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare — 380x.
IC 659	gx	10h58m04s	−06°15.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40"; c'è una coppia di deboli stelline a 1' SE — 450x.
IC 662	gx	10h59m20s	+01°35.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e con condensazione centrale evidente — 450x.
IC 663	gx	11h00m37s	+10°26.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	fa parte assieme a IC 664 e 666 del quartetto di NGC 3492 — poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30", diffusa e con piccola condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 400x.
IC 664	gx	11h00m45s	+10°33.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	fa parte assieme a IC 663 e 666 del quartetto di NGC 3492 — presenta condensazione centrale abbastanza marcata circonfusa da un tenue alone approssim. rotondo con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
IC 665	gx	11h00m30s	−13°52.0'		Crt	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e con debole condensazione centrale poco contrastata, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
IC 666	gx	11h01m15s	+10°28.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	fa parte assieme a IC 663 e 664 del quartetto di NGC 3492 — piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e nucleo stellare; situata tra 2 stelline orientate da NW a SE e distanti un paio di primi — 400x.
IC 669	gx	11h07m16s	+06°18.1'		Leo	24"	buona / buono	allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso N — 400x.
IC 670	gx	11h07m29s	+06°42.8'		Leo	24"	buona / buono	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale diffusa — 400x.
IC 671	gx	11h07m31s	+00°47.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1' — 400x.

IC 672	gx	10h57m54s	+04°54.3'		Crt	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 1.5' SE di una debole stellina; è allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
IC 673	gx	11h09m25s	−00°06.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante al centro, allungata da N a S con dimensioni 80"×40" — 400x.
IC 674	gx	11h08m03s	−12°29.0'		UMa	16"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 270x.
IC 676	gx	11h12m40s	+09°03.4'		Leo	24"	m. buona / discreto	bella, diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; all'estremità W si nota come una lieve "frattura": se è reale dovrebbe trattarsi o di un nodulo o di una stellina appena percettibile inglobata nel disco — 400x.
IC 677	gx	11h13m57s	+12°18.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	è un bell'ovale poco diffuso e appena più brillante all'interno, orientato da NE a SW con dimensioni 60"×30"; a tratti appare leggermente screziato a 400x.
IC 678	gx	11h14m06s	+06°34.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 679	gx	11h16m37s	−13°58.3'		Crt	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza brillante e contrastata; in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
IC 680	gx	11h17m55s	−01°56.7'		Leo	24"	buona / m. buono	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi poco diffusa e leggermente condensata — 400x.
IC 681	gx	11h18m32s	−12°18.4'		Crt	16"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; meglio visibile scalando a 270x.
IC 683	gx	11h21m32s	+02°45.1'		Leo	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 683E	gx	11h21m27s	+02°44.8'		Leo	24"	ottima / ottimo	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a poco più di 1' a W di IC 683, non più estesa di 15" — 450x.
IC 685	gx	11h22m06s	+17°45.2'		Leo	24"	m. buona / buono	è debolissima e molto piccola, appare a tratti a una 30-ina di secondi SW di una debole stellina, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
IC 686	gx	11h23m05s	+05°38.7'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
IC 687	gx	11h24m17s	+47°50.8'		UMa	20"	buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo quasi stellare — 360x.
IC 691	gx	11h26m44s	+59°09.3'	q 46	UMa	16"	buona / mediocre	debole e molto piccola, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi poco diffusa e con condensazione centrale di aspetto stellare; si trova al vertice orientale di un piccolo triangolo rettangolo formato con 2 stelline brillanti della stessa luminosità e orientate da N a S — 188x.
IC 692	gx	11h25m53s	+09°59.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti (quella più vicina alla gx è la più luminosa) — 450x.
IC 694	gx	11h28m31s	+58°33.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	forma un sistema doppio con **NGC 3690**; in visione distolta appaiono palesemente avviluppate nello stesso alone; è allungata da N a S con dimensioni 40"×30" (l'altra sembra rotondeggiante e più diffusa); presenta una zona centrale più marcata della compagna; a tratti appare verso N una debolissima galassietta, molto piccola che da un controllo effettuato successivamente è risultata poi essere **MCG+10-17-2A** — 380x.
IC 696	gx	11h28m40s	+09°05.9'		Leo	16"	buona / ottimo	fa parte di un piccolo gruppo di deboli galassie — molto debole, appena più brillante all'interno; probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
IC 697	gx	11h28m34s	−01°37.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e con condensazione centrale appena percettibile, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
IC 698	gx	11h29m04s	+09°06.7'		Leo	16"	buona / ottimo	fa parte di un piccolo gruppo di deboli galassie — compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE (orientata come la coppia di stelline brillanti distanti ~ 2' e situate 5.5' a SE), di dimensioni 40"×20" — 270x.
IC 699	gx	11h29m06s	+08°59.3'		Leo	16"	buona / ottimo	fa parte, assieme alla precedente, di un piccolo gruppo di deboli galassie — quasi una edge-on, orientata da N a S per 1' scarso, stemperata sul fondo cielo e con condensazione centrale abbastanza marcata, stellare (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 270x.
IC 700	gx	11h29m15s	+20°35.0'		Leo	16"	scarso / m. buono	gx molto debole, di luminosità uniforme che solo a tratti appare allungata all'incirca da E a W, con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina di 14-esima a ~ 1' S — 270x.
IC 701	gx	11h31m01s	+20°28.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, approssim. rotonda con Ø di ~ 40" e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
IC 706	gx	11h33m12s	−13°20.3'		Crt	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge appena più contrastato del disco — 450x.
IC 707	gx	11h33m45s	+21°22.8'		Leo	16"	m. buona / ottimo	rotonda, abbastanza compatta, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; a 380x sono presenti nel campo solo stelline al limite della visibilità.
IC 708	gx	11h33m59s	+49°03.7'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e con piccola condensazione centrale ben evidente — 450x.
IC 709	gx	11h34m14s	+49°02.6'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale stellare; c'è una stellina al bordo N — 450x.
IC 711	gx	11h34m47s	+48°57.6'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con tenue condensazione centrale — 450x.
IC 712	gx	11h34m49s	+49°04.7'		UMa	24"	m. buona / buono	è la componente più brillante dell'ammasso **AGC 1314** — diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con condensazione centrale abbastanza brillante quasi stellare, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 450x.
IC 716	gx	11h39m03s	−00°12.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per oltre 1'; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
IC 718	gx	11h39m53s	+08°52.5'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, appare poco più contrastata scalando a 270x, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1.5' (o poco più) verso W.
IC 719	gx	11h40m18s	+09°00.6'	q 192	Vir	16"	ottima / ottimo	facile e relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" e poco più brillante all'interno —380x.
IC 720	gx	11h42m44s	+08°58.5'		Vir	16"	ottima / ottimo	è più evidente di IC 722 osservata per prima, anch'essa di dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme, ma orientata da N a S —380x.
IC 722	gx	11h42m44s	+08°58.5'		Vir	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, solo a tratti in visione distolta appare allungata da E a W con dm 45"×30"; meglio visibile a 270x.
IC 724	gx	11h43m34s	+08°56.5'		Vir	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, orientata da NE a SW, di dimensioni 80"×40", poco diffusa e con condensazione centrale quasi stellare — 380x.
IC 725	gx	11h43m29s	−01°40.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 30" e con nucleo stellare; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 450x.
IC 727	gx	11h44m29s	+10°47.0'		Leo	24"	m. buona / buono	è una lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa circa 1.5' — 450x.
IC 728	gx	11h44m50s	−01°36.1'		Vir	24"	m. buona / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×30" — 570x.
IC 729	gx	11h45m18s	+33°20.2'		UMa	16"	buona / m. buono	fa parte del quintetto di NGC 3855 — molto debole, piccola, con nucleo stellare osservabile a 380x, allungata da N a S con dimensioni 30"×20".
IC 730	gx	11h45m35s	+03°13.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 732	gx	11h46m00s	+20°26.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto molto piccolo, esteso max 20" e nucleo stellare visibile a tratti; appare solo a 380x; subito a N c'è la MAC 1145-2026, ancora più elusiva, ma nei rarissimi momenti in cui appare sembra una stellina.
IC 736	gx	11h48m27s	+12°43.6'		Leo	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' verso E; è la componente più brillante del sistema di Hickson 59 (vedi) — 450x.
IC 737	gx	11h48m31s	+12°43.8'		Leo	24"	buona / m. buono	è un debolissimo lucore di forma indistinta e di luminosità uniforme; appare a momenti in visione distolta tra la precedente e la stellina subito a E; non sembra più estesa di 20" o 25"; fa parte del sistema di Hickson 59 — 450x.
IC 739	gx	11h51m31s	+23°51.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 50"×30" — 400x.
IC 741	gx	11h50m32s	−04°50.1'		Vir	16"	ottima / ottimo	piccola, compatta e relativamente brillante, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare — 380x.
IC 742	gx	11h51m02s	+20°48.0'		Leo	16"	buona / buono	molto debole, di aspetto un po' confuso, approssim. circolare con Ø di ~ 1' e di luminosità uniforme (situata 25' WNW di NGC 3937) — 270x.
IC 743	gx	11h53m22s	−13°15.8'		Crt	24"	m. buona / buono	debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1' SE (ossia sul prolungamento dell'asse galattico — 450x.
IC 745	gx	11h54m12s	+00°08.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola gx brillante, poco diffusa con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare marcato — 570x.
IC 746	gx	11h55m35s	+25°53.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 380x.
IC 749	gx	11h58m34s	+42°44.0'	q 74	UMa	24"	ottima / buono	chiazza estesa, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di 1.5'; meglio contrastata scalando a 340x (era debole, ma osservabile senza difficoltà nel 10" in condizioni di cielo analoghe).
IC 750	gx	11h58m52s	+42°43.3'	q 74	UMa	24"	ottima / buono	brillante, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa debolmente screziata a 450x; è molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30".
IC 751	gx	11h58m52s	+42°34.3'		UMa	24"	ottima / buono	poco diffusa, molto allungata da NE a SW, dimensioni 60"×15" e con nucleo puntiforme poco contrastato — 450x.
IC 752	gx	11h59m15s	+42°34.0'		UMa	24"	ottima / buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NE — 450x.
IC 753	gx	11h59m13s	−00°31.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante e compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 754	gx	11h59m24s	−01°39.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	abbastanza brillante, rotonda, poco diffusa, con Ø di 30" e condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a meno di 1' verso W — 570x.
IC 755	gx	12h01m10s	+14°06.3'		Com	16"	ottima / ottimo	debole lama di luce relativamente compatta, orientata da NW a SE ed estesa almeno 1.5' — 380x.
IC 756	gx	12h02m58s	+04°50.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 90"×30" — 400x.
IC 758	gx	12h04m12s	+62°30.3'		UMa	16"	non registrati	debole chiarore diffuso, con bassissimo gradiente di luce, approssim. circolare e con Ø di un paio di primi — 188x.
IC 762	gx	12h08m12s	+25°45.4'		Com	16"	buona / buono	debole, approssim. rotonda, diffusa, Ø inferiore a 1' e con tenue condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti; c'è una stellina brillante a 2.5' SSE e un'altra più debole ~ 1.5' a N — 380x.
IC 763	gx	12h08m15s	+25°48.7'		Com	16"	buona / buono	più debole di IC 762 e di luminosità pressoché uniforme, diffusa, poco allungata ~ da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' scarso verso NE (situata 3' a N della precedente) — 380x.
IC 764	gx	12h10m14s	−29°44.3'	q 368	Hya	16"	buona / buono	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 3'×1'; la visione è meglio contrastata scalando a 188x.
IC 766	gx	12h10m54s	−12°39.3'		Crv	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante e compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con nucleo stellare; c'è una debole stellina subito a E e un'altra a 1' verso N — 450x.
IC 767	gx	12h11m03s	+12°06.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
IC 768	gx	12h11m48s	+12°08.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole ovale molto diffuso e appena più brillante all'interno, orientato da E a W con dimensioni 60"×30"; la gx è poco disturbata da una stellina brillante situata a poco più di 1' SE — 450x.
IC 769	gx	12h12m31s	+12°07.4'		Vir	16"	ottima / ottimo	debole chiazza ovale con gradiente di luce molto basso, diffusa, orientata da NE a SW e di dimensioni 2'×1.5' — 380x.
IC 771	gx	12h15m13s	+13°11.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, poco allungata da E a W, dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
IC 772	gx	12h15m16s	+23°57.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 380x.
IC 773	gx	12h18m08s	+06°08.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	rotonda con nucleo stellare marcato e un alone diffuso esteso per una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso NE — 400x.
IC 774	gx	12h18m51s	−06°46.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
IC 775	gx	12h18m54s	+12°54.7'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	molto debole e diffusa, rotondeggiante, con Ø < 1'; è gradatamente più brillante verso l'interno e presenta un nucleo quasi stellare; c'è una stellina brillante a un paio di primi verso E — 188x.
IC 776	gx	12h19m03s	+08°51.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, con tenue condensazione centrale, allungata da E a W e di dimensioni grosso modo 60"×40"; la gx è decisamente meglio definita a 280x (a 400x appare molto confusa).
IC 777	gx	12h19m24s	+28°18.6'		Com	16"	buona / buono	è un piccolo oggetto dai bordi molto sfumati, con debole bulge percettibile solo tratti; poco allungata da NW a SE con dimensioni ~ 60"×45" (situata 18' ENE di NGC 4251) — 270x.
IC 779	gx	12h19m39s	+29°53.0'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
IC 780	gx	12h19m58s	+25°46.3'		Com	16"	buona / buono	relativamente facile da vedere, molto diffusa e con evidente condensazione centrale, poco allungata da N a S con dimensioni 70"×50" — 380x.
IC 781	gx	12h20m03s	+14°57.7'		Com	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø 1' scarso e di luminosità pressoché uniforme, salvo qualche lieve screziatura osservabile a 400x; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N.
IC 782	gx	12h21m37s	+05°45.9'		Vir	24"	buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente a 570x; c'è una stella a ridosso SE; a 4' verso E ce n'è un'altra più brillante.
IC 783	gx	12h21m39s	+15°44.8'	q 193	Com	16"	m. buona / buono	debole, con gradiente di luce molto basso e assai stemperata sul fondo cielo rotonda con Ø 1'; forma un piccolo triangolo con 2 stelline a SW e a SE (quest'ultima è più brillante) — 188x.
IC 784	gx	12h22m30s	−04°39.2'		Vir	16"	buona / ottimo	molto debole e molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30" e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenuissimo bulge diffuso visibile a tratti; c'è una stellina subito a NE; meglio definita a 380x.
IC 785	gx	12h23m02s	−13°13.4'		Crv	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
IC 786	gx	12h23m11s	−13°12.3'		Crv	24"	m. buona / m. buono	più evidente di IC 785, dalla quale dista un paio di primi a NE, poco diffusa, rotonda con Ø < 1' e piccolo nucleo poco contrastato; allineata ed equidistante con 2 stelline a WSW — 450x.
IC 789	gx	12h26m21s	+07°27.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e con nucleo quasi stellare evidente; c'è una stellina a poco più di 1' verso S — 450x.
IC 790	gx	12h26m35s	+09°02.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	brillante, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale ben evidente — 450x.
IC 791	gx	12h26m59s	+22°38.4'		Com	16"	buona / buono	a prima vista appare rotonda, diffusa, con Ø di 1' e con condensazione centrale visibile a tratti; in visione distolta tuttavia sembra di vedere una sorta di "barra" orientata da N a S per ~ 45" — 380x.
IC 792	gx	12h27m09s	+16°19.5'		Com	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
IC 794	gx	12h28m09s	+12°05.6'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" — 270x.
IC 796	gx	12h29m26s	+16°24.3'		Com	16"	buona / buono	debole, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 70"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
IC 797	gx	12h31m55s	+15°07.4'		Com	16"	buona / buono	debole, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" e di luminosità uniforme; forma un triangolo isoscele (quasi equilatero) con 2 stelline: una a 5' WNW e l'altra a poco meno verso SSW — 270x.
IC 798	gx	12h32m33s	+15°24.9'		Com	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 800	gx	12h33m57s	+15°21.3'		Com	16"	m. buona / buono	debole e diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo molto debole visibile però solo a momenti; meglio contrastata a 132x.
IC 801	gx	12h33m45s	+52°15.3'		CVn	16"	m. buona / discreto	relativamente brillante e pressoché rotonda, diffusa, con Ø di 1' scarso e con marcata condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso S — 270x.
IC 804	gx	12h41m16s	+05°00.5'		Vir	24"	buona / m. buono	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare relativamente brillante — 450x.
IC 806	gx	12h42m08s	−17°21.0'		Crv	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, un poco disturbata da una stellina brillante situata 1' a SW; in visione distolta appare circolare con Ø < 40" — 450x.
IC 807	gx	12h42m12s	−17°24.2'		Crv	24"	m. buona / buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, di aspetto regolare, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
IC 810	gx	12h42m09s	+12°35.8'		Vir	16"	buona / mediocre	debole, ma abbastanza compatta, di dimensioni 60"×30", basso gradiente di luce e orientata da N a S (situata 21' S di NGC 4620) — 270x.
IC 812	gx	12h44m51s	−04°26.1'		Vir	24"	ottima / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1.5' SE — 450x.
IC 813	gx	12h45m12s	+23°02.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	abbastanza facile, rotonda, poco diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina a ridosso NW, nell'alone della galassia, visibile a tratti in visione distolta a 380x.
IC 815A	gx	12h46m18s	+11°52.4'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata 1' a W di MCG+2-33-18) — 450x.
IC 815B	gx	12h46m30s	+11°54.4'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x quando si osserva MCG+2-33-17, dalla quale dista 1' a SE; è poco più di una stellina sfocata, forse rotonda con Ø di una decina di secondi.
IC 816	gx	12h46m46s	+09°51.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale — 450x.
IC 817	gx	12h46m57s	+09°51.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	situata 2.5' a E della precedente è più piccola, rotonda con Ø < 30", poco diffusa e con nucleo più evidente — 450x.
IC 818	gx	12h46m44s	+29°44.1'		Com	16"	ottima / ottimo	debole, ma poco più evidente di IC 821, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 380x.
IC 821	gx	12h47m26s	+29°47.3'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, di luminosità uniforme e Ø di una 40-ina di secondi; è meglio definita a 270x.
IC 826	gx	12h51m20s	+31°03.4'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di 35"-40", appena più brillante all'interno e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
IC 827	gx	12h51m55s	+16°17.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450x.
IC 829	gx	12h52m27s	−15°31.1'		Crv	16"	buona / ottimo	fa parte di un terzetto di galassiette abbastanza facili, ravvicinate, pressoché allineate e non riportate sull'Uranometria — brillante e compatta, piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 30" (situata all'interno dell'ammasso **AGC 1631**) — 380x.
IC 830	gx	12h51m17s	+53°41.7'		UMa	16"	m. buona / discreto	abbastanza facile, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni ~ 50"×30"; presenta un nucleo stellare evidente — 270x.
IC 831	gx	12h52m44s	+26°28.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
IC 832	gx	12h53m59s	+26°26.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	poco più evidente, rotonda con Ø di 25"-30" (più o meno come la distanza delle 2 stelline a NW) e con nucleo stellare abbastanza evidente — 380x.
IC 834	gx	12h56m19s	+26°21.5'		Com	24"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (o poco più), con nucleo stellare molto brillante che tende a confondere un po' la forma — 450x.
IC 835	gx	12h56m53s	+26°29.2'		Com	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti subito a N — 450x.
IC 836	gx	12h55m54s	+63°36.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce estesa oltre 1' e orientata da E a W, con tenue bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina al bordo N e una abbastanza brillante a ridosso verso E — 450x.
IC 837	gx	12h57m31s	+26°30.8'		Com	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
IC 838	gx	12h58m14s	+26°25.6'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, appare a tratti in visione distolta, a 380x, a un paio di primi N di NGC 4849 (riportata sull'Uranometria come **4849A**).
IC 840	gx	12h58m42s	+10°37.0'		Vir	24"	m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
IC 842	gx	13h00m39s	+29°01.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e appena più brillante all'interno; meglio evidente a 270x.
IC 843	gx	13h01m34s	+29°07.8'		Com	16"	buona / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 40"×20" con una piccola condensazione centrale evidente — 380x.
IC 848	gx	13h07m01s	+16°00.4'		Com	24"	m. buona / ottimo	chiazza circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 849	gx	13h07m39s	−00°56.5'		Vir	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SSE — 450x.
IC 850	gx	13h07m50s	−00°52.1'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 30"×10" — 450x — situata 5' NNE di IC 849.
IC 851	gx	13h08m34s	+21°02.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; è poco più definita scalando a 270x.
IC 852	gx	13h07m37s	+60°09.4'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
IC 853	gx	13h08m42s	+52°46.5'		UMa	16"	m. buona / discreto	debole e diffusa chiazza rotonda con Ø > 1', molto stemperata sul fondo cielo e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
IC 854	gx	13h09m50s	+24°34.6'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di 30", diffusa e appena condensata; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso SE — 380x.
IC 855	gx	13h10m37s	−04°29.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW — 450x.
IC 857	gx	13h13m50s	+17°04.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	rotonda, poco diffusa, con gradiente di luce molto basso e Ø di ~ 40" (ossia poco più della distanza delle 2 stelline situate 3' SW); un nucleo stellare appare a tratti a 380x.
IC 858	gx	13h14m55s	+17°13.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	assieme a IC 859 forma una coppia di gx facili, relativamente compatte e con evidente condensazione centrale; la 1ª è più grande, approssim. rotonda con Ø inferiore a 1', mentre la 2ª non è più estesa di 30"; sono separate da 1.5' in direzione E-W; c'è una stellina visibile a tratti a pochi secondi NE della prima — 380x.
IC 859	gx	13h14m57s	+17°13.5'		Com	16"	m. buona / ottimo	v. **IC 858**
IC 866	gx	13h17m17s	+20°41.5'		Com	16"	m. buona / ottimo	fa parte di un quartetto assieme a IC 867, -68 e -70 — molto debole, poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale quasi stellare a 380x.
IC 867	gx	13h17m20s	+20°38.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" — 380x.
IC 868	gx	13h17m30s	+20°36.4'		Com	16"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di un 30-ina di secondi e una nucleo stellare — 380x.
IC 870	gx	13h17m31s	+20°36.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di aspetto uniforme — 380x.
IC 871	gx	13h17m59s	+04°24.2'		Vir	24"	buona / m. buono	fa parte assieme a IC 873 e IC 876 di un terzetto di galassiette facili — allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×30", diffusa e con evidente condensazione centrale; c'è una stella brillante subito a E e un'altra a 1.5' NW — 450x.
IC 873	gx	13h18m16s	+04°27.8'		Vir	24"	buona / m. buono	piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x — situata 6' a NE di IC 871.
IC 875	gx	13h17m07s	+57°32.4'	q 48	UMa	16"	buona / mediocre	diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' verso W — 188x.
IC 876	gx	13h18m34s	+04°29.2'		Vir	24"	buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare — 450x.
IC 879	gx	13h19m41s	−27°25.7'		Hya	16"	m. buona / m. buono	salta fuori facilmente quando si osserva la 5078, dalla quale dista un paio di primi a SW; è debole, diffusa e orientata nello stesso modo con dimensioni 60"×30"; presenta un piccolo nucleo quasi stellare — 270x.
IC 881	gx	13h19m56s	+15°51.0'		Com	24"	m. buona / buono	poco diffusa e molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge abbastanza contrastato (sta sorgendo la Luna all'ultimo quarto) — 450x.
IC 882	gx	13h20m07s	+15°53.9'		Com	24"	m. buona / buono	situata a 4' NNE della precedente, è poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso NW (sta sorgendo la Luna all'ultimo quarto) — 450x.
IC 883	gx	13h20m36s	+34°08.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debole oggetto che a 380x è di aspetto un po' irregolare; poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; solo a tratti appare poco più luminosa all'interno.
IC 885	gx	13h22m31s	+21°19.0'		Com	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa rotonda, di 1' scarso di Ø e con nucleo stellare evidente — 380x.
IC 891	gx	13h30moos	+00°18.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" e un nucleo stellare poco contrastato; è disturbata dalla SAO 119964 di 9ª grandezza situata 3' a NE — 450x.
IC 892	gx	13h31m46s	−02°42.7'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole e con condensazione centrale brillante di aspetto quasi stellare, orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
IC 893	gx	13h31m47s	−02°36.7'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" e poco più brillante al centro — 450x — situata 6' a N di IC 892.
IC 894	gx	13h32m05s	+17°02.9'		Com	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da E a W, con dimensioni 50"×25" e di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
IC 896	gx	13h34m10s	+04°52.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale evidente — 450x.
IC 899	gx	13h34m59s	−08°05.5'		Vir	24"	buona / ottimo	poco diffusa e con tenue condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
IC 900	gx	13h34m43s	+09°20.2'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina brillante a 1' NW e un'altra appena percettibile quasi a ridosso verso W — 380x.
IC 901	gx	13h35m42s	+13°19.8'		Vir	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
IC 902	gx	13h36m01s	+49°57.6'		Her	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare; il disco è di aspetto molto uniforme — 380x.
IC 903	gx	13h38m26s	−00°13.6'		Vir	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare; il disco è di aspetto molto uniforme — 380x.
IC 904	gx	13h38m32s	+00°32.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW; una stellina appena percettibile si trova un paio di primi a NE (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
IC 905	gx	13h40m03s	+23°08.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, con condensazione centrale evidente a 380x, rotonda con Ø di 40".
IC 909	gx	13h40m51s	+24°28.4'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 25"-30"; c'è una stellina 1' verso S — 380x.
IC 933	gx	13h45m16s	+23°13.1'		Boo	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di 1' scarso e nucleo di aspetto stellare; c'è una stellina a N a ridosso del nucleo — 380x.
IC 939	gx	13h47m43s	+03°24.7'		Vir	24"	buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e poco più brillante all'interno — 450x.
IC 940	gx	13h47m58s	+03°27.0'		Vir	24"	buona / m. buono	situata a poco più di 4' NE della precedente, è molto debole e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N — 450x.
IC 943	gx	13h50m32s	+03°11.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina quasi a ridosso verso NNE (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
IC 944	gx	13h51m31s	+14°05.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 80"×20" e con tenue bulge diffuso evidente — 450x.
IC 945	gx	13h47m48s	+72°03.0'		UMi	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso N — 450x.
IC 946	gx	13h52m08s	+14°05.9'		Boo	24"	m. buona / buono	facile, rotonda con Ø < 40" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
IC 947	gx	13h52m36s	+00°49.1'		Vir	16"	buona / ottimo	relativamente compatta, ma molto disturbata dalla SAO 120146 di 8ª situata a ridosso NE; è allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare evidente 380x.
IC 948	gx	13h52m27s	+14°05.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	brillante e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge ben evidente — 450x.
IC 950	gx	13h52m27s	+14°29.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; 2 stelline brillanti situate a 1' E e 1' S fanno parte di un piccolo asterismo regolare e simmetrico di 4 componenti; un nodulo appena percettibile al margine SW della gx è risultato essere la MAC 1352+1429 — 450x.
IC 951	gx	13h51m47s	+50°58.7'		UMa	16"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
IC 952	gx	13h53m42s	+03°22.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20", molto stemperata alle estremità del fuso; c'è una stellina a ridosso verso S; allineata e quasi equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti a N (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
IC 954	gx	13h49m56s	+71°09.9'		UM1	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile e compatta, appena più brillante all'interno; a 380x appare approssim. rotonda con Ø di 35"40"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso NE.
IC 959	gx	13h56m03s	+13°30.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare evidente — 380x.
IC 960	gx	13h55m59s	+17°30.0'		Boo	16"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MCG+3-36-4** (situata a ridosso verso N); mentre però quest'ultima si vede abbastanza facilmente a 380x, allungata da NE a SW e di dimensioni 60"×20", la 1ª resta un oggetto elusivo, piccolo e diffuso che appare solo a tratti in visione distolta.
IC 962	gx	13h57m13s	+12°01.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, rotonda, di 30" di Ø e con nucleo stellare — 380x.
IC 963	gx	13h57m25s	+17°24.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	è di aspetto regolare, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e con basso gradiente di luce — 450x.
IC 964	gx	13h57m41s	+17°30.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 450x.
IC 965	gx	13h57m47s	+17°30.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e un'evidente condensazione centrale — 450x.
IC 966	gx	13h58m14s	+05°24.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; quasi allineata ed equidistante con 2 stelline: una debole 1' a N e l'altra brillante un paio di primi di distanza.
IC 967	gx	13h58m23s	+14°27.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×15"; osservando a 450x appare a tratti di forma un poco irregolare.
IC 968	gx	14h00m37s	−02°54.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MAC 1400-0254 — allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme; la MAC è poco più debole e diffusa e si separa abbastanza facilmente a 450x; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni simili alla compagna.
IC 970	gx	14h02m34s	+14°33.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	mfacile e relativamente brillante, molto allungata da NE a SW di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge rotondo abbastanza contrastato; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso S — 450x.
IC 971	gx	14h03m53s	−10°08.4'		Vir	24"	buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, poco allungata grosso modo da NE a SW con dimensioni 80"×60"; meglio evidente, comunque, scalando a 340x.
IC 972	np	14h04m26s	−17°13.7'	q 331	Vir	16"	buona / m. buono	debole bolla rotonda di luminosità perfettamente uniforme e del Ø di 1' scarso — 270x.
IC 976	gx	14h08m43s	−01°09.7'		Vir	16"	buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare — 380x.
IC 977	gx	14h08m42s	−03°00.2'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
IC 978	gx	14h08m58s	−02°58.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debole e leggermente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x — situata poco più di 4' a ENE di IC 977.
IC 979	gx	14h09m32s	+14°49.9'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40", diffusa e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 270x.
IC 981	gx	14h10m28s	−04°10.3'		Vir	24"	discreta / m. buono	piccola, debole e poco diffusa, con condensazione centrale evidente, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso SE; un'altra stellina appena percettibile appare a ridosso di NE *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
IC 982	gx	14h09m59s	+17°41.8'		Boo	16"	buona / buono	rotonda con Ø di 40", stemperata sul fondo cielo e con una condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
IC 983	gx	14h10m04s	+17°44.0'		Boo	16"	m. buona / buono	situata 2'.5 a NNE di IC 982, presenta una debole barra centrale orientata ~ da E a W, con un piccolo nucleo stellare visibile a tratti; l'alone è tenuissimo e molto diluito sul fondo cielo; è molto disturbata dalla luce di una stella brillante di 9ª situata 1.5' a SE; sono entrambe situate una decina di primi a N di NGC 5490 — 270x.
IC 984	gx	14h10m08s	+18°21.9'		Boo	16"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce con gradiente di luce molto basso, estesa un paio di primi in direzione NE-SW — 380x.
IC 985	gx	14h11m33s	−03°13.2'		Vir	24"	discreta / m. buono	molto debole e poco diffusa, con condensazione centrale molto tenue, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso verso SW *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
IC 986	gx	14h11m26s	+01°17.2'		Vir	24"	buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; molto disturbata dalla SAO 120334 di 6ª grandezza situata a < 5' NNE; c'è una stellina a un paio di primi verso W: osservando quest'ultima si nota, in visione distolta, una debolissima chiazza molto piccola che aggetta verso W; da un controllo effettuato successivamente è di fatto risultata essere la CGCG 18-71 — 450x.
IC 988	gx	14h14m32s	+03°11.4'		Vir	24"	buona / m. buono	piccola, relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 989	gx	14h14m51s	+03°07.9'		Vir	24"	buona / m. buono	brillante, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" (già precedentemente osservata con 16") — 450x.
IC 990	gx	14h15m49s	+39°47.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo quasi stellare evidente — 450x.
IC 991	gx	14h17m49s	−13°52.4'		Vir	24"	m. buona / mediocre	facile, molto diffusa e di luminosità uniforme, leggermente screziata a 450x, allungata da E a W con dimensioni 60"×40".
IC 992	gx	14h18m15s	+00°53.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante a 1' verso NE — 450x.
IC 993	gx	14h18m19s	+11°13.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
IC 994	gx	14h18m23s	+11°11.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S di dimensioni 60"×30" e con bulge contrastato; c'è una stellina subito a E — 450x.
IC 995	gx	14h16m31s	+57°48.5'		UMa	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina a un paio di primi verso NW — 450x.
IC 996	gx	14h17m22s	+57°37.8'		UMa	24"	buona / m. buono	poco più debole della precedente, dalla quale dista 12' a SSE, anche questa di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 2' scarsi verso N — 450x.
IC 997	gx	14h20m00s	−04°27.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e brillante, ma con basso gradiente di luce, grosso modo orientata da N a S con dimensioni 60"×40", ma la forma non è regolare: c'è infatti una piccola zona centrale di una 20-ina di secondi che sembra aggettare verso E (da un controllo successivamente effettuato questa è poi risultata essere una gx sovrapposta, la MAC 1420-0427); c'è una stellina quasi a ridosso verso NE e un'altra brillante sempre a N, ma più distante — 450x.
IC 999	gx	14h19m36s	+17°51.9'		Boo	16"	ottima / ottimo	assieme a IC 1000 forma una coppia di gx di aspetto simile, distanti un paio di primi e di dimensioni 45"×30"; presentano entrambe un piccolo bulge evidente e contrastato sul disco; la 1ª è orientata da NW a SE, mentre la 2ª lo è da NNE a SSW (non sono, cioè, esattamente a perpendicolo) — 380x.
IC 1000	gx	14h19m40s	+17°51.3'		Com	16"	ottima / ottimo	v. **IC 999**
IC 1006	gx	14h22m59s	+23°47.7'		Boo	16"	discreta / ottimo	molto debole, allungata da E a W con dimensioni 45"×30", diffusa e poco più brillante all'interno; meglio visibile a 270x.
IC 1007	gx	14h24m37s	+04°33.5'		Vir	24"	discreta / m. buono	relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.

IC 1010	gx	14h27m20s	+01°01.5'		Vir	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 1'; una piccola condensazione centrale appare abbastanza facilmente a 380x.
IC 1011	gx	14h28m04s	+01°00.4'		Vir	16"	buona / ottimo	molto debole, ma più compatta e più piccola di IC 1010, rotonda, con Ø di ~ 30" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
IC 1012	gx	14h27m10s	+30°56.4'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, salta fuori in visione distolta quando si osservano le 2 stelline a W e distanti 1.5'; è rotonda, poco diffusa e di luminosità uniforme; meglio osservabile a 270x.
IC 1014	gx	14h28m19s	+13°46.8'	q 197	Boo	16"	buona / m. buono	molto diffusa, appena più brillante all'interno; è di aspetto un po' confuso, ma è allungata ~ da NE a SW con dimensioni 1.5' ×45" — 270x.
IC 1015	gx	14h28m19s	+15°25.1'		Boo	24"	ottima / ottimo	osservando a 450x sembra come spaccata in due: una parte meridionale molto diffusa e un piccolo nodulo compatto a NE; da un controllo effettuato successivamente, la presunta "compagna" è in effetti risultata essere la PGC 2800988; la visione non migliora sensibilmente forzando a 580x; è situata in mezzo a due stelline abbastanza brillanti orientate da NW a SE e distanti 5.5'.
IC 1017	gx	14h28m07s	+25°52.1'		Boo	16"	m. buona / buono	piccola, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" con condensazione centrale evidente (situata 2' NW di NGC 5629) — 270x.
IC 1018	gx	14h28m13s	+25°49.8'		Boo	16"	m. buona / buono	debolissima! È visibile in visione distolta come un piccolo oggetto molto stemperato, grosso modo circolare con Ø di 20" o 30" (situata 1.5' SW di NGC 5629) — 270x.
IC 1019	gx	14h28m13s	+25°56.8'		Boo	16"	discreta / ottimo	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stella a ridosso verso W — 270x.
IC 1020	gx	14h29m49s	+26°02.0'		Boo	16"	discreta / ottimo	molto piccola e abbastanza compatta, molto allungata da N a S, dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare marcato; c'è una stellina brillante a 1' NW — 270x.
IC 1021	gx	14h29m17s	+20°39.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 45" — 380x.
IC 1022	gx	14h30m02s	+03°46.3'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante subito a N — 450x.
IC 1024	gx	14h31m27s	+03°00.5'		Vir	16"	buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina al bordo settentrionale — 380x.
IC 1025	gx	14h31m28s	+07°03.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
IC 1027	gx	14h29m48s	+53°57.9'		Boo	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
IC 1028	gx	14h33m16s	+41°39.0'		Boo	16"	m. buona / m. buono	è molto disturbata da una stellina brillante situata a ridosso verso E (che fa parte di 3 stelline perfettamente allineate ed equidistanti: quella di mezzo è la più debole); in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×20" e di luminosità uniforme; in visione diretta è solo una sorta di fosforescenza a W della stella; meglio osservabile a 380x.
IC 1029	gx	14h32m27s	+49°54.3'		Boo	24"	m. buona / discreto	è un magnifico fuso esteso 3' e orientato da SSE a NNW, che presenta un bulge brillante e piccolo nucleo puntiforme; è più brillante della 5673 (q 77) dalla quale dista 10' verso ESE — 270x.
IC 1031	gx	14h34m24s	+48°02.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	assieme alle 2 successive fa parte di un terzetto orientato in direzione N-S — debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina subito a NE — 450x.
IC 1032	gx	14h34m39s	+47°58.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e con condensazione centrale abbastanza contrastata — 450x.
IC 1033	gx	14h34m42s	+47°57.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	è la più evidente del terzetto, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
IC 1035	gx	14h38m10s	+09°20.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; debole irregolarità di luce appena accennata verso N; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 450x.
IC 1036	gx	14h38m23s	+18°06.7'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva IC 1037 dalla quale dista ~ 4' verso S — 380x.
IC 1037	gx	14h38m25s	+18°11.0'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 1' e condensazione centrale di aspetto quasi stellare; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline deboli distanti tra loro 1.5: una a E e l'altra a SE — 380x.
IC 1039	gx	14h40m29s	+03°26.0'		Vir	16"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a IC 1041 e IC 1042, del piccolo gruppo di NGC 5718 — è un piccolo oggetto con nucleo stellare, esteso max 20"-25" — 270x.
IC 1041	gx	14h40m38s	+03°22.6'		Vir	16"	m. buona / ottimo	fa parte del piccolo gruppo di NGC 5718 — più brillante di IC 1039, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con piccolo bulge evidente — 270x.
IC 1042	gx	14h40m39s	+03°28.2'		Vir	16"	m. buona / ottimo	fa parte del piccolo gruppo di NGC 5718 — più debole di quest'ultima, dalla quale dista 1' a W, e con gradiente di luce minore; è rotonda, diffusa con Ø di 35"-40" — 270x.
IC 1044	gx	14h41m29s	+09°25.9'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" e leggermente condensata; c'è una stellina a 1' NNE — 400x.
IC 1046	gx	14h37m53s	+69°00.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25" — 450x.
IC 1048	gx	14h42m58s	+04°53.4'	q 243	Vir	16"	discreta / scarso	debole, di luminosità pressoché uniforme, posta praticamente di taglio, orientata all'incirca da N a S ed estesa un paio di primi — 188x.
IC 1049	gx	14h39m33s	+62°00.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare poco contrastato; è situata all'interno di un asterismo di forma triangolare costituito da 6 stelline brillanti — 450x.
IC 1050	gx	14h44m07s	+18°00.7'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale diffusa osservabile a 380x.
IC 1053	gx	14h45m43s	+16°56.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, ancorché situata nei bagliori della o Bootis di magnitudo 4.6 situata 7' a W; è poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 1054	gx	14h46m31s	+01°16.5'		Vir	24"	buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; si trova praticamente in mezzo a 2 stelle: una abbastanza brillante a 1.5' W e una più debole alla stessa distanza verso NE — 450x.
IC 1055	gx	14h47m26s	−13°43.0'		Lib	24"	mediocre / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
IC 1056	gx	14h45m39s	+50°23.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	è una chiazza rotonda relativamente brillante, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme e con Ø > 1' — 380x.
IC 1058	gx	14h49m12s	+17°01.2'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole, in visione distolta appare molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge diffuso evidente a 380x.
IC 1060	gx	14h51m47s	−07°14.0'		Lib	24"	mediocre / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450x.
IC 1063	gx	14h52m11s	+04°40.9'		Vir	24"	buona / buono	rotonda, diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e un curioso doppio nucleo (ma uno dei due noduli, quello orientale, è quasi certamente una stellina sovrapposta) — 450x.
IC 1065	gx	14h49m21s	+63°16.2'	q 27	Dra	16"	m. buona / buono	compatta, di forma irregolare, estesa ~ 45" con nucleo luminoso; ci sono 2 deboli stelline situate vicino alla gx verso SW — 270x.
IC 1066	gx	14h53m03s	+03°17.8'		Vir	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W cm dimensioni 60"×40" — 380x.
IC 1067	gx	14h53m05s	+03°19.9'		Vir	16"	m. buona / ottimo	più evidente di IC 1066 (dalla quale dista un paio di primi a N), rotonda, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso verso W — 380x.
IC 1068	gx	14h53m33s	+03°04.6'		Vir	24"	m. buona / mediocre	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
IC 1069	gx	14h50m46s	+54°24.7'		Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" — 450x.
IC 1071	gx	14h54m12s	+04°45.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme a IC 1072 e IC 1073 di un terzetto di gx equidistanti in direzione N-S e poste leggermente ad arco — poco diffusa e relativamente brillante, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare abbastanza marcato — 450x.
IC 1072	gx	14h54m13s	+04°50.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 40"×20", con basso gradiente di luce e piccolo nucleo di aspetto quasi stellare — 450x.
IC 1073	gx	14h54m14s	+04°47.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è la più debole del terzetto di IC 107: piccola, rotonda, diffusa con Ø > 20" e nucleo stellare — 450x.
IC 1074	gx	14h51m57s	+51°15.9'		Boo	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×30" (a prima vista sembra di forma rettangolare); c'è una debole stellina subito a SE, una più evidente a 1' SW e una abbastanza brillante a 1.5' verso W — 495x.
IC 1075	gx	14h54m49s	+18°06.3'		Boo	16"	buona / mediocre	debolissima, ma in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni ~ 60"×30" — 270x.
IC 1076	gx	14h55m00s	+18°02.2'		Boo	16"	buona / mediocre	relativamente compatta, allungata grosso modo da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale abbastanza evidente — 270x.
IC 1078	gx	14h56m29s	+09°21.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
IC 1079	gx	14h56m36s	+09°22.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	poco allungata da E a W, di dimensioni 50"×40", diffusa, con tenue e piccola condensazione centrale; c'è una stellina a 1' S — 270x.
IC 1080	gx	14h58m00s	−06°43.4'		Lib	24"	buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con condensazione centrale di aspetto stellare — 450x.
IC 1081	gx	14h58m55s	−19°14.4'		Lib	16"	m. buona / m. buono	molto debole, ma osservabile anche in visione diretta, allungata da NW a SW con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme (situata < 3' NE di NGC 5791) — 270x.
IC 1082	gx	14h58m52s	+07°00.4'		Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 2.5' verso E — 450x.
IC 1084	gx	15h01m15s	−07°28.5'		Lib	16"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, probabilmente rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme — situata 5' E di NGC 5812 — 270x.
IC 1085	gx	15h02m43s	+17°15.1'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø di 1' scarso e nucleo stellare ben osservabile a 380x; c'è una stellina un paio di primi verso SW.
IC 1087	gx	15h06m44s	+03°46.6'		Vir	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso SE — questa è più evidente, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e appena più brillante all'interno; la compagna è invece un debolissimo baffo orientato nello stesso modo e con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
IC 1088	gx	15h06m46s	+03°46.3'		Vir	24"	ottima / buono	v. **IC 1087**
IC 1089	gx	15h07m26s	+07°07.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, approssim. circolare con Ø < 30" e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
IC 1090	gx	15h03m46s	+42°42.0'		Boo	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o poco più — 495x.
IC 1091	gx	15h08m14s	−11°08.5'		Lib	16"	buona / ottimo	si vede bene in visione distolta, ma resta una gx molto debole e stemperata sul fondo cielo; solo a tratti appare un poco allungata da NW a SE (ossia perpendicolarmente alla congiungente delle 2 stelle di riferimento situate verso NW) — 270x.
IC 1092	gx	15h07m36s	+09°21.5'		Boo	24"	buona / ottimo	allungata da E a W con dimensioni 40"×20", diffusa maggiormente verso N e S e poco più brillante all'interno — 450x.
IC 1093	gx	15h07m36s	+14°32.9'		Boo	24"	buona / ottimo	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
IC 1096	gx	15h08m24s	+19°12.5'		Boo	16"	m. buona / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a IC 1097 e a CGCG 106-10 — debole, rotonda, poco diffusa, con Ø di 25"-30" e un nucleo stellare; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 380x.
IC 1097	gx	15h08m31s	+19°11.1'		Boo	16"	m. buona / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a IC 1096 e a CGCG 106-10 — molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante 1' verso NW e una doppia stretta dalle componenti disuguali a 1' S — 380x.
IC 1099	gx	15h06m55s	+56°30.5'		Dra	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 45"; situata al bordo occidentale di un piccolo asterismo irregolare formato da 7 stelline — 450x.
IC 1100	gx	15h06m21s	+62°59.9'	q 28	Dra	16"	m. buona / buono	brillante, rotonda, del Ø di 1' con alto gradiente; c'è una stellina a 1' verso SW e un'altra più brillante a circa 2' verso NNE (erroneamente riportata sulla Uranometria come NGC 5881) — 270x.
IC 1101	gx	15h10m56s	+05°44.7'		Vir	24"	buona / ottimo	debole ovale molto diffuso, di luminosità uniforme, di dimensioni grosso modo 80"×40" e con nucleo stellare; c'è una stellina al bordo E e un'altra quasi a ridosso verso W (è il membro centrale dell'ammasso AGC 2029) — 400x.
IC 1102	gx	15h11m05s	+04°17.6'		Vir	24"	buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" (ci sono 2 stelle abbastanza brillanti a SE orientate nello stesso modo — 450x.
IC 1105	gx	15h13m14s	+04°17.2'		Ser	24"	discreta / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 49-48 situata a ridosso verso SW — relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; la compagna è decisamente più debole, molto diffusa, con tenue condensazione centrale, orientata nello stesso modo, ma con dimensioni poco inferiori, ossia 30"×15" — 450x.
IC 1106	gx	15h13m56s	+04°42.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' scarso verso E — 450x.
IC 1107	gx	15h14m09s	+04°42.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
IC 1110	gx	15h12m05s	+67°21.8'		UMi	24"	buona / ottimo	relativamente compatta e brillante, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
IC 1111	gx	15h16m01s	+54°28.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×25" e con condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a ridosso verso E — 495x.
IC 1112	gx	15h17m47s	+07°13.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
IC 1113	gx	15h18m15s	+12°29.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' NE — 450x.
IC 1116	gx	15h21m55s	+08°25.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, diffusa, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile a 1' SW — 450x.
IC 1118	gx	15h25m00s	+13°26.7'		Ser	24"	buona / m. buono	rotonda, poco diffusa, con Ø di 45" e condensazione centrale evidente; c'è una stellina subito a W e un'altra appena percettibile al bordo SE — 450x.
IC 1119	gx	15h25m45s	−03°39.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un nodulo appena percettibile a ridosso N che appare a tratti a 450x; da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la PGC 1068507.
IC 1124	gx	15h30m01s	+23°38.3'		Ser	16"	buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e appena più brillante all'interno — 380x.
IC 1125	gx	15h33m06s	−01°37.7'		Ser	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di aspetto un po' irregolare; a tratti sembra poco allungata da N a S, di dimensioni ~ 80"×60" e con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti; c'è una stellina a poco più di 1' verso NE — 380x.
IC 1128	gx	15h37m53s	−01°44.1'		Ser	24"	discreta / m. buono	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e leggermente condensata — 450x.
IC 1129	gx	05h32m01s	+68°14.8'		UMi	16"	ottima / discreto	debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, facilmente visibile anche in visione diretta; è rotonda con Ø < 1'; c'è una stellina doppia a 5' verso NE — 270x.
IC 1131	gx	15h38m52s	+12°04.8'		Ser	16"	ottima / ottimo	piccolo e debole oggetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø e con nucleo stellare; situata a ridosso verso E di un piccolo triangolo rettangolo di stelline di uguale luminosità — 380x.
IC 1132	gx	15h40m07s	+20°40.8'		Ser	16"	buona / mediocre	debole bolla circolare, con Ø > 1', diffusa e di luminosità uniforme — 270x.
IC 1133	gx	15h41m12s	+15°34.4'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20", diffusa e di luminosità pressoché uniforme; solo forzando a 570x appaiono ogni tanto alcune lievissime discrepanze di luminosità sul disco; in parte disturbata da una stella brillante di 10ª situata un paio di primi a W.
IC 1134	gx	15h44m58s	+16°57.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso SE e un'altra debole ma più evidente a 1' verso W — 450x.
IC 1135	gx	15h45m35s	+17°42.0'		Ser	16"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, poco diffusa, orientata grosso modo da E a W con dimensioni 40"×20" — 380x.
IC 1136	gx	15h47m34s	−01°32.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno rotonda con Ø di 30"-35" e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una debole stellina a 1' scarso E; una stella brillante di 11-esima di trova un paio di primi a NNE — 450x.
IC 1138	gx	15h48m16s	+26°12.4'		CrB	16"	ottima / m. buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; una condensazione centrale molto tenue è visibile solo a tratti a 380x.
IC 1141	gx	15h49m48s	+12°24.0'		Ser	24"	ottima / buono	relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare — 340x.
IC 1142	gx	15h50m26s	+18°08.6'		Ser	16"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di aspetto un po' confuso, approssim. Rotonda con Ø 45"; solo tratti appare una tenue condensazione centrale; meglio scalare a 270x.
IC 1143	gx	15h30m55s	+82°27.5'		UMi	16"	ottima / discreto	rotonda, diffusa con evidente condensazione centrale e Ø di 45"; c'è una stellina a ~ 1' SE. Due minuscoli oggetti distanti 1' scarso in direzione E-W si trovano a 3' SW della galassia: quello a W è più evidente, esteso una 20-ina di secondi e con condensazione centrale puntiforme; il 2º appare solo in visione distolta (da un controllo successivo la 1ª è risultata essere MCG+14-7-20, mentre la 2ª è la MCG+14-7-21) — 270x.
IC 1144	gx	15h51m21s	+43°25.0'		UMa	16"	m. buona / m. buono	presenta un marcato nucleo quasi stellare e un alone molto diffuso, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
IC 1145	gx	15h44m08s	+72°25.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
IC 1146	gx	15h48m22s	+69°23.1'		Dra	24"	ottima / m. buona	facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
IC 1147	gx	15h50m12s	+69°33.6'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
IC 1149	gx	15h58m09s	+12°04.2'		Ser	16"	buona / ottimo	debole, ma relativamente facile, rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e con Ø poco inferiore a 1' — 380x.
IC 1151	gx	15h58m32s	+17°26.5'		Ser	16"	m. buona / m. buono	alquanto estesa, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 2'×40"; a tratti, osservando a 380x, appaiono lievi discrepanze di luce all'interno.
IC 1152	gx	15h56m43s	+48°05.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con evidente condensazione centrale contrastata sul disco — 450x.
IC 1153	gx	15h57m03s	+48°10.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	di aspetto e dimensioni simili alla precedente, rotonda con Ø anch'essa di ~ 40", ma con condensazione centrale poco più diffusa — 450x.
IC 1154	gx	15h52m28s	+70°22.5'		UMi	16"	ottima / discreto	debole, molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, facilmente visibile anche in visione diretta; è rotonda con Ø < 1' — 270x.
IC 1155	gx	16h00m36s	+15°41.1'		Ser	24"	ottima / buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø con Ø analogo a IC 1161 ; c'è una stellina a ridosso SE — 340x.
IC 1156	gx	16h00m37s	+19°43.4'		Her	16"	m. buona / m. buono	facile, poco diffusa, rotonda, Ø ~ 40" con piccola ed evidente condensazione centrale; a tratti, a 380x, appare una debolissima stellina a ridosso de nucleo verso S; un'altra stellina più evidente si trova 1.5' SSW.
IC 1157	gx	16h01m02s	+15°29.7'		Ser	24"	ottima / buono	debole, diffusa e condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso W — 340x.
IC 1158	gx	16h01m34s	+01°42.5'	q 245	Ser	16"	discreta / scarso	debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo, a prima vista di forma indistinta, mentre in visione indiretta a 188x appare, seppur a momenti, orientato da NW a SE con dimensioni grosso modo 2'×1.5'.
IC 1159	gx	16h01m05s	+15°25.2'		Ser	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø > 30" — 450x.
IC 1161	gx	16h01m17s	+15°38.7'		Ser	24"	ottima / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e piccolo nucleo quasi stellare — 340x.
IC 1162	gx	16h01m16s	+17°40.7'		Her	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno; c'è una stellina subito a N — 450x.
IC 1163	gx	16h01m31s	+15°30.2'		Ser	24"	ottima / buono	molto debole, rotonda con Ø > 30" e piccola condensazione centrale evidente — 340x.
IC 1165A	gx	16h02m08s	+15°41.8'		Ser	24"	ottima / buono	assieme a IC 1165B forma una coppia di oggetti relativamente compatti, piccoli e rotondi con Ø di una 20-ina di secondi; si separano facilmente a 340x; il 1º è poco più evidente, mentre il 2º sembra più "sfilacciato" e leggermente più piccolo.
IC 1165B	gx	16h02m09s	+15°41.5'		Ser	24"	ottima / buono	v. **IC 1165A**
IC 1167	gx	16h03m53s	+14°56.8'		Ser	16"	ottima / m. buono	molto debole, di Ø simile a IC 1168 (osservata per prima), ma con condensazione centrale meno evidente — 380x.
IC 1168	gx	16h03m56s	+14°54.1'		Ser	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda, diffusa, con tenue nucleo stellare e Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso NW — 380x.
IC 1169	gx	06h04m13s	+13°44.7'		Ser	16"	buona / ottimo	poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", con nucleo stellare marcato circonfuso da un alone molto tenue — 380x.
IC 1170	gx	16h04m32s	+17°43.3'		Her	16"	discreta / m. buono	fa parte dell'ammasso AGC 2151 — molto debole, visibile a tratti in visione distolta a ridosso di NGC 6041; si capisce comunque che è una galassia abbastanza compatta, molto piccola, di dimensioni 20"×10" e orientata da E a W — 270x.
IC 1173	gx	16h05m13s	+17°25.4'		Her	24"	ottima / m. buono	situata verso il bordo meridionale dell'ammasso **AGC 2151** — debole, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×25" e con piccola condensazione poco contrastata; meglio evidente scalando a 340x.
IC 1174	gx	16h05m27s	+15°01.5'		Ser	16"	buona / ottimo	fa parte dell'ammasso AGC 2151 — rotonda con Ø di 45" e relativamente compatta; presenta un nucleo stellare su un disco di luminosità uniforme — 380x.
IC 1178	gx	16h05m33s	+17°36.3'		Her	16"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2151** — forma una coppia serrata assieme a IC 1181 — si sdoppiano senza grandi difficoltà a 380x, ma sono molto sbilanciate in luminosità; la 1ª è abbastanza facile, rotonda con Ø di ~ 30"; la 2ª appare a tratti a ridosso verso S, ma è un oggetto molto debole esteso non più di una 15-ina di secondi — 380x.
IC 1179	gx	16h05m22s	+17°45.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2151** — forma una coppia ravvicinata con NGC 6050 già precedentemente osservata col 16": quest'ultima appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; la IC salta fuori in visione distolta come un debole alone verso SW, esteso sì e no una 30-ina di secondi, ma che tende a "impastarsi" con la galassia precedente anche a 450x.
IC 1181	gx	16h05m34s	+17°35.6'		Her	16"	m. buona / m. buono	v. IC 1178
IC 1182	gx	16h05m37s	+17°48.1'		Her	16"	discreta / m. buono	fa parte dell'ammasso AGC 2151 — poco più brillante di IC 1183, rotonda, con Ø di 20"-30" e di luminosità all'incirca uniforme — 270x.
IC 1183	gx	16h05m38s	+17°46.1'		Her	16"	discreta / m. buono	fa parte dell'ammasso AGC 2151 — debole, allungata ~ da E a W, di luminosità uniforme e dimensioni 30"×20" — 270x.
IC 1185	gx	16h05m45s	+17°43.0'	q 155	Her	16"	discreta / m. buono	fa parte dell'ammasso AGC 2151 di rappresenta una delle componenti più brillanti — abbastanza compatta, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ~ 1' verso SE — 270x.
IC 1186	gx	16h05m44s	+17°21.7'		Her	24"	ottima / m. buono	situata verso il bordo SSE dell'ammasso **AGC 2151** — molto diffusa allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e appena più brillante all'interno — 450x.
IC 1188	gx	16h06m07s	+17°27.6'		Her	24"	ottima / m. buono	situata verso il bordo SE dell'ammasso **AGC 2151** — debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 1189	gx	16h06m15s	+18°11.0'		Her	16"	m. buona / discreto	fa parte dell'ammasso AGC 2151 — piccola e debole galassia rotonda, relativamente compatta e di luminosità uniforme, con Ø di una 20-ina di secondi — 270x.
IC 1192	gx	16h16m33s	+17°46.5'		Her	24"	ottima / m. buono	situata verso il bordo orientale dell'ammasso **AGC 2151** — molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
IC 1193	gx	16h06m32s	+17°42.8'		Her	24"	ottima / m. buono	situata verso il bordo orientale dell'ammasso **AGC 2151** — debole, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e poco più brillante verso l'interno — 450x.
IC 1194	gx	16h06m39s	+17°45.7'		Her	24"	ottima / m. buono	situata verso il bordo orientale dell'ammasso **AGC 2151** — poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
IC 1195	gx	16h06m41s	+17°11.5'		Her	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 1196	gx	16h07m58s	+10°46.8'		Ser	16"	ottima / m. buono	allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge diffuso poco contrastato sul disco; è meglio definita a 270x.
IC 1197	gx	16h08m17s	+07°32.3'		Ser	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×20" — 450x.
IC 1198	gx	16h08m36s	+12°19.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge quasi stellare poco contrastato — 450x.
IC 1199	gx	16h10m34s	+10°02.4'		Ser	16"	buona / ottimo	molto debole e molto allungata da N a S con dimensioni ~ 80"×30" (poco meno della distanza delle 2 stelline a NW); presenta un piccolo bulge quasi stellare visibile a 380x; è molto disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a E.
IC 1201	gx	16h05m41s	+69°35.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1'; c'è una coppia di stelline subito a N della gx — 450x.
IC 1205	gx	16h14m16s	+09°32.3'		Her	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; disturbata dalla SAO 121441 di 8ª grandezza — 400x.
IC 1206	gx	16h15m13s	+11°17.8'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di < 1'; osservando a 380x appare a tratti qualcosa di puntiforme, ma non riesco a capire se trattasi del nucleo o di un stellina a ridosso.
IC 1209	gx	16h18m39s	+15°33.5'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45" e con piccolo bulge di aspetto stellare visibile a 380x.
IC 1210	gx	16h14m30s	+62°32.2'		Dra	16"	ottima / discreto	debole, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×30" e con bulge appena più brillante del disco — 270x.
IC 1211	gx	16h16m52s	+53°00.4'		Dra	16"	m. buona / ottimo	è una gx brillante, rotonda, con Ø di 45", con bulge ben evidente e nucleo stellare; non è stranamente riportata sull'Uranometria — 270x.
IC 1212	gx	16h15m31s	+64°13.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' SE — 450x.
IC 1214	gx	16h16m12s	+65°58.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare; forma un piccolissimo triangolo rettangolo isoscele con con 2 stelline a E, la più brillante, e a N; quest'ultima è in realtà una doppia stretta e sbilanciata — 450x.
IC 1215	gx	16h15m35s	+68°23.9'		Dra	16"	ottima / discreto	debole, ma facilmente visibile anche in visione diretta, molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di 40" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
IC 1216	gx	16h15m55s	+68°21.0'		Dra	16"	ottima / discreto	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, estesa grosso modo come IC 1215, dalla quale dista 3.5 SSE, ma è di forma indistinta e appare solo in visione distolta — 270x.
IC 1218	gx	16h16m37s	+68°12.2'		Dra	16"	ottima / discreto	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e poco più brillante all'interno — 270x.
IC 1219	gx	16h24m27s	+19°29.0'		Her	16"	ottima / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina 1' a E — 380x.
IC 1221	gx	16h34m42s	+46°23.5'		Her	16"	buona / ottimo	bolla circolare molto debole di luminosità uniforme e con Ø di ~ 1' — 380x.
IC 1222	gx	16h35m09s	+46°12.8'		Her	16"	buona / ottimo	poco più evidente di IC 1221, rotonda e di Ø simile, con una zona interna più brillante — 380x.
IC 1223	gx	16h35m42s	+49°13.3'		Her	28"	ottima / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; ci sono 4 stelline quasi allineate a E (quella più vicina alla gx è la più brillante) — 495x.
IC 1225	gx	16h36m52s	+67°37.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso N e una al margine S — 450x.
IC 1228	gx	16h42m07s	+65°35.1'		Dra	16"	ottima / discreto	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni di 60"×30"; c'è una stellina a ~ 1' verso N — 270x.
IC 1231	gx	16h46m59s	+58°25.4'		Dra	16"	buona / mediocre	è un debole ovale a bassissimo gradiente, orientato da NNW a SSE con dimensioni 90"×45" e assai stemperato sul fondo cielo *(ultima gx osservata: albeggia)* — 270x.
IC 1235	gx	16h52m03s	+63°07.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale poco contrastata; disturbata dalla SAO 17252 di 8ª grandezza situata 3' a NE — 450x.
IC 1236	gx	16h58m30s	+20°02.4'		Her	16"	m. buona / m. buono	è una debole bolla circolare di luminosità uniforme e di ~ 1' di Ø; si vede facilmente in visione distolta a 270x; c'è una stellina a poco più di 1' verso NW.
IC 1237	gx	16h56m16s	+55°01.6'		Dra	16"	buona / mediocre	molto debole, di luminosità uniforme e diffusa; in visione distolta appare molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×30" — 270x.
IC 1241	gx	10h01m28s	+63°41.5'		Dra	16"	ottima / discreto	è una debole chiazza rotonda di luminosità pressoché uniforme, relativamente compatta e con Ø di ~ 40" — 270x.
IC 1242	gx	15h33m06s	−01°37.7'		Oph	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di aspetto un po' irregolare; a tratti sembra poco allungata da N a S, di dimensioni ~ 80"×60" e con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti; c'è una stellina a poco più di 1' verso NE — 380x.
IC 1244	gx	17h10m34s	+36°18.3'		Her	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, con Ø di 1' scarso — 380x.
IC 1245	gx	17h12m37s	+38°01.2'		Her	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e leggermente più brillante all'interno; c'è una debole stellina a 1' verso N — 380x.
IC 1248	gx	17h11m40s	+59°59.7'		Dra	16"	buona / ottimo	è una debole chiazza rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø inferiore a 1'; appare facilmente in visione distolta a 270x.
IC 1251	gx	17h10m13s	+72°34.6'		Dra	24"	buona / ottimo	molto debole e con lievi discrepanze di luminosità all'interno visibili a momenti; orientata da E a W con dimensioni 60"×40" (la gx è situata 6.5' a N di NGC 6340 ed era già stata osservata, seppur elusivamente, col 16" a 270x) — 450x.
IC 1252	gx	17h15m50s	+57°22.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E una a ridosso NW — 495x.
IC 1254	gx	17h11m34s	+72°24.2'		Dra	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a SE e un'altra stellina a ~ 1' verso S (la gx è situata 8' a NE di NGC 6340 ed era assai debolmente visibile nel 16" a 270x).
IC 1255	gx	17h23m05s	+12°41.7'		Oph	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina al bordo E — 450x.
IC 1256	gx	17h23m47s	+26°29.2'		Her	16"	buona / ottimo	chiazza diffusa, approssim. rotonda, di luminosità uniforme Ø di ~ 1'; non aumentano i dettagli aumentando a 380x.
IC 1257	ag	17h27m08s	−07°05.6'		Oph	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima macchiolina rotonda, del Ø non superiore ai 45" e con una condensazione centrale percettibile a tratti a 270x; non si "sgrana" neppure a 380x, malgrado la bontà del seeing (se non sapessi che è un globulare, l'avrei scambiato per una gx!).
IC 1258	gx	17h27m17s	+58°29.1'		Dra	16"	m. buona / ottimo	diffusa, con basso gradiente, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina doppia con componenti separate da una 40-ina di secondi da N a S situata subito a W della galassia (situata 2' a SSW di UGC 10869) — 270x.
IC 1259	gx	17h27m25s	+58°31.0'		Dra	16"	m. buona / ottimo	appare come una debolissima stellina a ridosso W di UGC 10869 — 270x.
IC 1261	gx	17h23m26s	+71°15.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MCG+12-16-32B situata a ridosso W; le due gx si separano facilmente a 450x; la IC è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con condensazione centrale quasi stellare; la MCG è pure rotonda, di dimensioni analoghe, ma di aspetto più uniforme; una debole stellina di aspetto diffuso (ho "scoperto" dopo che in realtà si trattava di una doppia stretta irrisolta) si trova subito a S della coppia — 450x.
IC 1262	gx	17h33m02s	+43°45.6'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30", a tratti appena più brillante all'interno; c'è una debole stellina a 1' SE — 450x.
IC 1263	gx	17h33m07s	+43°49.3'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; situata tra due stelline orientate da NNW a SSE (la prima è una coppia sbilanciata) e distanti 3'; meglio definita scalando a 340x.
IC 1264	gx	17h33m17s	+43°37.7'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 450x.
IC 1265	gx	17h36m39s	+42°05.3'		Her	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con bulge poco contrastato sul disco; c'è una doppia dalle componenti molto deboli quasi a ridosso verso E — 380x.
IC 1267	gx	17h38m46s	+59°22.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con basso gradiente di luce; c'è una debole stellina a 1' SE; poco meglio definita scalando a 340x.
IC 1268	gx	17h50m39s	+17°12.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità un po' irregolare, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW — 450x.
IC 1269	gx	17h52m06s	+21°34.2'		Her	16"	buona / ottimo	tenue chiazza di luminosità pressoché uniforme e Ø > 1'; la visione non migliora a 380x; c'è una stellina a meno di 1' dal margine SE.
IC 1276	ag	18h10m44s	−07°12.5'	q 294	Ser	10"	buona / buono	debolissimo, poco esteso e di luminosità pressoché uniforme, osservabile in visione indiretta a 60x a (178x tende a estinguersi sul fondo cielo); grosso modo rotondo con Ø di ~ 3'; c'è una debole stellina sovrapposta verso la parte occidentale; non si nota alcun cenno di granulazione neppure aumentando a 118x.
IC 1277	gx	18h10m27s	+31°00.2'		Her	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, con bassissima luminanza superficiale, approssim. rotonda con Ø di 40"45"; è situata tra una stellina doppia a SW e una di egual magnitudo a NE; c'è pure una stellina appena percettibile a ridosso di SE (situata 9' SW di NGC 6575) — 270x.
IC 1279	gx	18h11m15s	+36°00.4'		Her	16"	m. buona / buono	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 2'×30", con bulge quasi stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' verso SW — 270x.
IC 1280	gx	12h12m18s	+25°39.7'		Her	16"	buona / ottimo	relativamente facile, piccola, rotonda, Ø di 30", con tenue condensazione centrale diffusa; è situata tra 2 stelline orientate da N a S che ne lambiscono i bordi — 380x.
IC 1281	gx	18h11m38s	+35°59.8'		Her	16"	buona / buono	è un debole oggetto diffuso, approssim. rotondo ed esteso max 30"; c'è un piccolo arco di 3 stelline brillanti a W — 270x.
IC 1286	gx	18h16m14s	+55°35.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30" — 450x.
IC 1288	gx	18h29m22s	+39°42.8'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, allungata da N a S, d dimensioni 45"×30" e con bulge diffuso abbastanza contrastato; c'è una stellina al bordo settentrionale — 450x.
IC 1289	gx	18h30m02s	+39°57.9'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
IC 1291	gx	18h33m53s	+49°16.7'		Dra	28"	ottima / ottimo	diffusa e di aspetto a tratti un po' irregolare, allungata da NW a SE, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una coppia serrata di stelline verso il margine meridionale; verso quello N si nota, solo a momenti, una sorta di nodulo, o forse una stellina appena percettibile; una stellina abbastanza brillante si trova a ridosso N della gx — 495x.
IC 1295	np	18h54m37s	−08°49.5'	q 295	Sct	16"	ottima / ottimo	è una bolla circolare molto debole, dai contorni non ben definiti e di poco meno di 2' di Ø; a 270x con l'O III, appaiono a tratti delle debolissime ombreggiature all'interno verso la parte occidentale; una coppia di stelline molto deboli distanti una dozzina di secondi si trovano all'interno decentrate verso SW; al bordo SW c'è invece una stellina relativamente luminosa; una stellina debole si trova invece a ridosso verso S e un'altra appena percettibile ne lambisce il margine SE.
IC 1296	gx	18h53m19s	+33°04.0'		Lyr	24"	buona / ottimo	chiazza diffusa molto debole, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare che tuttavia è meglio visibile in visione diretta; in visione distolta appare a tratti un tenuissimo baffo all'interno orientato da NE a SW ed esteso grosso modo come la gx stessa; c'è una stellina evidente a ridosso E e una percettibile solo a momenti al bordo SE (già osservata, seppure elusivamente, nel 16" a 380x in condizioni di cielo analoghe) — 450x.
IC 1297	np	19h17m23s	−39°36.8'	q 410	CrA	10"	buona / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; a 60x potrebbe essere a prima vista scambiata per una stella di campo, ma si "accende" frapponendovi l'O III; a 178x appare con un certa facilità la stella centrale.
IC 1298	aa	19h18m36s	−01°35.8'		Aql	16"	m. buona / ottimo	è un minuscolo gruppo serrato di 6 componenti; le due stelline più brillanti sono distanti una 15-ina di secondi e sono orientate da NW a SE: di queste quella a SE probabilmente è doppia, perché appare leggermente nebulosa; la stellina più occidentale si intravede appena 380x (non è riportato sull'Uranometria).
IC 1301	gx	19h26m37s	+49°45.4'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelline molto deboli a ridosso N e una percettibile solo a momenti al bordo S; 3 stelline allineate da NE a SW si trovano a E: quella più occidentale si trova a ridosso SE della gx — 450x.
IC 1302	gx	19h30m53s	+35°47.2'	q 118	Cyg	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa di luminosità uniforme e forma indistinta, estesa ~ 1'; delimitata a S da una stellina brillante e a N da una "bisciolina" di 4 stelline deboli: le 2 più esterne sono appena percettibili — 380x.
IC 1303	gx	19h31m30s	+35°52.6'		Cyg	16"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza rotonda con Ø di 40" e di luminosità uniforme; è visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x — situata 9' a NE di IC 1302.
IC 1308	knot	19h45m05s	−14°43.2'		Sgr	24"	m. buona / ottimo	**regione H II in NGC 6822** — debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; enfatizzato a 200x con O III, ma facilmente visibile anche a 450x senza filtro.

IC 1308A	knot	19h44m52s	−14°43.1'		Sgr	24"	m. buona / ottimo	**regione H II in NGC 6822** — situato 3' a W di IC 1308, è più brillante, più piccolo e compatto, con Ø di una 20-ina di secondi; più interessante a 450x senza filtri; sembra di vedere, a momenti, una debolissima stellina all'interno decentrata verso E.
IC 1309	gx	20h03m01s	−17°13.9'		Sgr	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 1311	aa	20h10m47s	+41°10.5'	q 84	Cyg	10"	ottima / buono	gruppo disperso di stelle relativamente brillanti già visibile nel cercatore 8x50; se ne contano più di 20 a 62x; una stella luminosa si trova al bordo N.
IC 1313	gx	20h18m43s	−16°56.9'		Cap	16"	buona / ottimo	a 270x è una chiazza lattescente molto debole e diffusa, estesa ~ 1' con una piccola zona centrale più brillante; c'è una stellina nel mezzo a ridosso del nucleo verso N.
IC 1317	gx	20h23m16s	+00°39.9'		Aql	16"	discreta / scarso	debole, compatta ma di forma irregolare, con dimensioni di una 30-ina di secondi, facilmente visibile in visione distolta a 1.5' SSW di una stellina brillante; c'è poi una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NW — 188x.
IC 1318	neb	20h26m00s	+40°20.0'	q 88	Cyg	6"	buona / buono	appaiono distintamente, nei pressi di γ Cyg, delle chiazze di nebulosità attraversate da canali scuri; il complesso è notevolmente frammentato perché oltre alla presenza di questi canali vi si trovano anche estese macchie scure. Un'ampia zona scura a 1º E di γ è denominata Barnard 889.
IC 1320	gx	20h26m26s	+02°54.6'		Del	16"	ottima / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; osservata a 380x, se non altro per cercar di tenere fuori campo una brillante stella arancione situata a meno di 4' NW.
IC 1324	gx	20h32m12s	−09°03.4'		Cap	16"	ottima / buono	relativamente facile, piccola, rotonda con Ø di 30", poco diffusa e con nucleo stellare; c'è una stellina a ~ SE — 380x.
IC 1327	gx	20h35m42s	−00°00.3'		Aql	16"	m. buona / buono	debole oggetto rotondo di 30"-35" di Ø, poco diffuso e di luminosità uniforme; è molto disturbata dalla SAO 144611 di 7ª situata 1.5' E e il cui alone, a causa dell'umidità elevata, arriva a lambire la gx — 380x.
IC 1330	gx	20h46m15s	−14°01.4'		Aqr	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a N — 450x.
IC 1331	gx	20h47m49s	−09°59.7'		Aqr	24"	buona / discreto	diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con bulge evidente seppure poco contrastato; è situata al centro di un piccolo triangolo rettangolo molto acuminato il cui cateto maggiore è orientato da E a W, ossia come la galassia — 450x.
IC 1332	gx	20h51m51s	−13°42.7'		Aqr	24"	buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×40" — 450x.
IC 1334	gx	20h52m17s	−16°17.1'		Cap	16"	ottima / buono	molto debole, allungata da E a W con dimensioni 45"×30", diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo quasi stellare visibile solo a momenti a 270x.
IC 1337	gx	20h56m52s	−16°35.2'		Cap	16"	ottima / buono	più evidente di IC 1334 e di dimensioni simili, ma di aspetto più compatto, ma di luminosità uniforme — 380x.
IC 1339	gx	20h57m55s	−17°56.6'		Cap	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
IC 1341	gx	21h00m17s	−13°58.6'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
IC 1342	gx	21h00m25s	+14°29.7'		Aqr	16"	ottima / buono	debolissima, approssim. rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di 35"-40"; facilmente visibile in visione distolta a 380x.
IC 1344	gx	21h01m16s	−13°22.8'		Aqr	16"	ottima / buono	ovale molto debole di luminosità uniforme e dimensioni 60"×30", situato ~ 1' SW di una stellina allineate con l'asse della galassia — 380x.
IC 1347	gx	21h01m44s	−13°18.8'		Aqr	16"	ottima / buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø di 30" e di luminosità uniforme, situata a 1' SE di una stellina brillante; debole stellina a una 30-ina di secondi SSE — 380x.
IC 1350	gx	21h01m52s	−13°51.1'		Aqr	24"	buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 1357	gx	21h05m57s	−10°42.9'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
IC 1359	gx	21h08m43s	+12°29.0'		Del	16"	ottima / ottimo	facile, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; presenta bulge brillante, diffuso e nucleo stellare — 380x.
IC 1360	gx	21h10m50s	+05°04.3'		Equ	24"	ottima / buono	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina subito a NW — 340x.
IC 1361	gx	21h11m29s	+05°03.2'		Equ	24"	ottima / buono	diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" e nucleo stellare abbastanza evidente — 340x.
IC 1364	gx	21h13m25s	+02°46.2'		Equ	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, con alto gradiente, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con nucleo di aspetto quasi stellare — 380x.
IC 1365	gx	21h13m56s	+02°33.9'		Equ	16"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, con bassissimo gradiente, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata a 270x.
IC 1366	gx	21h14m08s	+01°46.6'		Aqr	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20" o poco più; c'è una stellina molto debole a ridosso NE; un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti si trova subito a SW — 450x.
IC 1367	gx	21h14m10s	+02°59.6'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
IC 1368	gx	21h14m12s	+02°10.7'		Aqr	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma facilmente visibile a 380x, allungata da NE a SW, con dimensioni 45"×20" e di luminosità pressoché uniforme.
IC 1369	aa	21h12m07s	+47°46.0'	q 86	Cyg	10"	m. buona / discreto	debole chiazza granulata, molto piccola, grosso modo circolare con Ø di 3'4'; spingendo a 178x si può arrivare a contare una 20-ina di componenti, anche se alcune sono un po' al limite.
IC 1371	gx	21h20m16s	−04°52.6'		Aqr	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata ~ da N a S con dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x *(presenza di chiarore lunare)*.
IC 1373	gx	21h20m37s	+01°05.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S — 450x.
IC 1375	gx	21h20m16s	−04°52.6'		Equ	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata ~ da N a S con dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x *(presenza di chiarore lunare)*.
IC 1377	gx	21h25m27s	+04°18.8'		Equ	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, meglio definita scalando a 340x, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme.
IC 1379	gx	21h26m01s	+03°05.8'		Equ	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo S — 450x.
IC 1380	gx	21h27m11s	+02°43.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
IC 1381	gx	21h27m34s	−01°11.3'		Aqr	24"	discreta / buono	debole, molto diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
IC 1383	gx	21h27m40s	−01°06.1'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, ma relativamente compatta, orientata da NW a SE con dimensioni di 30"×10" (o poco meno) — 450x — situata 5' a N di IC 1381.
IC 1384	gx	21h27m53s	−01°22.1'		Aqr	16"	m. buona / buono	debole, rotonda, diffusa, con piccolo bulge di aspetto quasi stellare e Ø di 40" — 380x.
IC 1385	gx	21h28m51s	−01°04.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso W e un'altra di luminosità simile a 1' SE — 450x.
IC 1387	gx	21h29m34s	−01°21.0'		Aqr	16"	ottima / buono	piccola, debole, ma relativamente facile, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
IC 1388	gx	21h29m52s	−00°37.9'		Aqr	24"	buona / buono	piccola e relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente — 450x.
IC 1390	gx	21h32m25s	−01°51.7'		Aqr	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi [comincia ad albeggiare: ultima gx osservata nella notte] — 450x.
IC 1391	gx	21h35m00s	−00°30.7'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con una condensazione stellare abbastanza evidente; c'è una debole stellina a 1' SW — 450x.
IC 1392	gx	21h35m33s	+35°23.9'		Cyg	16"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza rotonda con Ø di 40" e di luminosità uniforme; è visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x (situata 9' a NE di IC 1390).
IC 1393	gx	21h40m14s	−22°24.7'		Cap	16"	scarsa / buono	è di aspetto e dimensione simili a NGC 7104, dalla quale dista 3' NNE, ma è più debole — 270x.
IC 1394	gx	21h40m13s	+14°38.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
IC 1395	gx	21h41m41s	+04°06.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale quasi stellare; c'è una debole stellina a 1.5' NE e un'altra appena percettibile a poco più di 1' NW — 450x.
IC 1396	aa + neb	21h39m00s	+57°30.0'	q 57	Cep	10" 6"	m. buona / ottimo	l'ammasso è relativamente facile ed è visibile anche nel cercatore da 50mm come una debole macchia poco contrastata sul fondo cielo; nel 10" a 178x si possono contare una 40-ina di stelle, fra cui una tripletta abbastanza serrata formata da 3 componenti azzurre (la più brillante è la SAO 33626 di magnitudo 5.6 e spettro O6) situata al centro; la nebulosa associata è invece molto debole e di aspetto confuso, se non altro perché è molto estesa e non si riesce a tenere interamente nel campo del telescopio neppure a 60x; è stata successivamente riosservata col Comet Tracker in condizioni di cielo analoghe ed è risultata facile a 22x con filtro O III e 3º di campo: pareva un continuo susseguirsi di increspature che ricordava la superficie mossa di un liquido all'interno di un recipiente.
IC 1398	gx	21h45m51s	+09°28.5'		Peg	24"	buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante verso l'interno (a prima vista sembra un ovale di luminosità uniforme), allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
IC 1399	gx	21h46m09s	+04°24.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto simile a IC 1380, anche se appare poco più brillante; anche questa è rotonda con Ø di 30" scarsi — 450x.
IC 1401	gx	21h47m00s	+01°42.7'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; prosegue verso W un arco formato con 3 stelline; un'altra stellina è situata a SE della gx — 380x.
IC 1405	gx	21h50m50s	+02°01.2'		Aqr	16"	m. buona / buono	debolissima chiazza rotonda a bassissimo gradiente, di una 40-ina di secondi di Ø e molto stemperata sul fondo cielo; c'è una doppia stretta a ridosso verso NW — 380x.
IC 1406	gx	21h51m05s	+01°59.2'		Aqr	16"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente facile a 380x, molto piccola e abbastanza compatta, con Ø di una 20-ina di secondi — situata 4' a SE di IC 1405.
IC 1408	gx	21h53m09s	−13°20.8'		Cap	24"	m. buona / m. buono	diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con una piccola condensazione centrale abbastanza contrastata; è allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; situata a ridosso di un asterismo di 5 stelle brillanti fatto a "Y" — 450x.
IC 1411	gx	21h56m01s	−01°31.0'		Aqr	16"	ottima / buono	relativamente facile, molto piccola, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; presenta un nucleo stellare evidente a 380x.
IC 1414	gx	21h58m18s	+08°25.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	rotonda e diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S — 400x.
IC 1417	gx	22h00m22s	−13°08.8'		Aqr	16"	ottima / buono	molto debole e molto allungata da E a W, di dimensioni 70"×20", con tenue bulge diffuso appena più contrastato del disco; c'è una stellina appena percettibile al bordo orientale; meglio osservabile a 270x.
IC 1418	gx	22h02m00s	+04°23.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
IC 1420	gx	22h02m31s	+19°45.0'	q 166	Peg	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ridosso verso N — 270x.
IC 1421	gx	22h03m04s	−09°58.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale visibile solo a momenti, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 1422	gx	22h03m00s	+02°35.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 20"×15" e con tenue condensazione centrale; è situata tra 2 stelline, a SE e NW; la 1ª fa parte di un piccolo triangolo equilatero — 450x.
IC 1423	gx	22h03m13s	+04°17.8'		Peg	16"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, diffusa, allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×30" — 380x.
IC 1425	gx	22h03m24s	+02°35.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
IC 1427	gx	22h03m35s	+15°06.4'		Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
IC 1428	gx	22h04m28s	+02°37.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 45" verso S — 450x.
IC 1431	gx	22h07m40s	−13°30.8'		Aqr	24"	buona / mediocre	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 400x.
IC 1433	gx	22h12m10s	−12°45.9'		Aqr	24"	discreta / buono	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 1434	aa	22h10m30s	+52°50.0'	q 57	Lac	10"	ottima / buono	si notano 4 stelle abbastanza brillanti che somigliano a un piccolo aquilone e che a 178x si staglia su un fondo granulato e parzialmente risolto; c'è una stella al bordo SE.
IC 1436	gx	22h13m51s	−10°11.5'		Aqr	16"	buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo, relativamente compatto e di 20" di Ø; c'è una stellina molto debole subito a NW — 380x.
IC 1437	gx	22h15m45s	+02°03.9'		Aqr	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda, con Ø di ~ 1' e di luminosità pressoché uniforme; a tratti, osservando a 380x, appare qualcosa di puntiforme, ma non riesco bene a capire se trattasi del nucleo o di una debolissima stellina a ridosso.
IC 1440	gx	22h16m33s	−16°01.0'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×15", diffusa e con bulge brillante — 450x.
IC 1441	gx	22h15m19s	+37°18.1'		Lac	16"	m. buona / discreto	è un debolissimo oggetto di luminosità uniforme esteso max 30" e che a tratti appare orientato da N a S (situata 4' a W di NGC 7242) — 270x.
IC 1442	aa	22h16m30s	+54°03.0'	q 57	Lac	10"	buona / buono	gruppo abbastanza serrato di una 20-ina di stelle deboli le cui componenti, tuttavia, si contano con molta difficoltà a 178x; è esteso 3' o 4' ed è delimitato da 3 stelle brillanti, la più luminosa delle quali, arancione di 9a grandezza, si trova al bordo SW; a bassi ingrandimenti appare soltanto come una chiazza debolmente granulata.
IC 1444	gx	22h22m24s	+05°08.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 30" scarsi — 450x.
IC 1447	gx	22h30m00s	−05°07.2'		Aqr	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; disturbata dalla SAO 146124 di 10ª grandezza situata 1.5' a N — 270x.
IC 1454	np	22h42m25s	+80°22.5'	q 14	Cep	16"	m. buona / buono	è una bolla pressoché circolare di luminosità uniforme, relativamente compatta, di 35" o 40" di Ø e con una coppia serrata di stelline al margine NE — 270x.
IC 1455	gx	22h23m56s	+01°22.3'		Psc	16"	m. buona / buono	relativamente facile, ma con basso gradiente, poco diffusa, allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×30"; è allineata con 2 stelline situate 1.5' a SW — 270x.
IC 1458	gx	22h56m41s	−07°42.4'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' e appena più brillante all'interno — 270x.
IC 1460	gx	22h57m04s	+04°40.6'		Eri	16"	m. buona / discreto	molto debole, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti 3' — 380x.
IC 1461	gx	22h58m34s	+15°10.4'		Peg	24"	buona / m. buono	poco diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina a 1' verso E e un'altra appena percettibile praticamente a ridosso SE — 450x.
IC 1464A	gx	23h03m12s	−08°59.4'		Aqr	24"	ottima / ottimo	forma con IC 1464B una coppia di galassie molto ravvicinate, ma facilmente separabili a 450x; la 1ª è più affusolata, orientata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale evidente; la 2ª è poco più cicciotta, orientata nello stesso modo, di dimensioni 45"×30" e con un nucleo più marcato.
IC 1464B	gx	23h03m11s	−08°59.4'		Aqr	24"	ottima / ottimo	v. **IC 1464A**
IC 1467	gx	23h04m50s	−03°13.8'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
IC 1468	gx	23h05m08s	−03°12.3'		Psc	24"	m. buona / buono	orientata da NNW a SSE, con condensazione centrale evidente; è di dimensioni simili a IC 1467, ma poco più diffusa.
IC 1470	neb	23h05m12s	+60°14.3'	q 58	Cep	16"	buona / m. buono	ben evidente, estesa ~ 1.5', con una stellina all'interno decentrata verso N; a 270x sembra una piccola cometa con la coda aperta a ventaglio; c'è una doppia molto stretta un paio di primi a W.
IC 1471	gx	23h08m45s	−12°38.3'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa, rotonda con Ø di 40" e di luminosità pressoché uniforme (la visione non cambia spingendo gli ingrandimenti) — 270x.
IC 1472	gx	23h09m07s	+17°15.5'		Peg	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale evidente — 380x.
IC 1473	gx	23h11m06s	+29°38.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; aumentando a 380x la visione non muta.
IC 1474	gx	23h12m51s	+05°48.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, di aspetto molto regolare, allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×30" — 450x.
IC 1476	gx	23h14m16s	+30°33.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	è facilmente visibile, ma a 340x sembra a prima vista di aspetto irregolare a causa di alcune stelline a ridosso; meglio osservare a 450x; la gx è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una doppia stretta a ridosso NW; due stelline appena percettibili si trovano rispettivamente a E e a ridosso S.
IC 1478	gx	23h18m14s	+10°17.9'		Peg	16"	m. buona / m. buono	diffusa, con bassissimo gradiente, allungata ~ da N a S, di dimensioni 60"×45" (situata 3' a N di NGC 7594) — 270x.
IC 1479	gx	23h18m46s	−10°23.9'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo stellare abbastanza luminoso, circonfuso da un alone molto stemperato, rotondo con Ø di ~ 1' — 270x.
IC 1482	gx	23h10m49s	+01°44.3'		Psc	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda, gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo stellare e Ø < 30" — 450x.
IC 1484	gx	23h22m40s	+11°23.1'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
IC 1487	gx	23h24m36s	+14°41.0'		Peg	24"	m. buona / mediocre	piccola, debole e con nucleo stellare, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte dell'ammasso denominato **AGC 2593** di cui fa parte anche NGC 7649) — 450x.
IC 1489	gx	23h26m32s	−12°31.0'		Aqr	16"	m. buona / buono	debolissimo oggetto rotondo, relativamente compatto e di luminosità uniforme; si vede abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è situato 1.5' N di una stellina brillante (che è anche la più settentrionale di un piccolo triangolo rettangolo).
IC 1491	gx	23h29m25s	−16°19.0'		Aqr	24"	buona / mediocre	molto debole, piccola, poco diffusa e a tratti condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; si apprezza meglio scalando a 280x.
IC 1492	gx	23h30m36s	−03°02.4'		Psc	16"	m. buona / ottimo	abbastanza facile e relativamente compatta, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con evidente nucleo stellare — 380x.
IC 1495	gx	23h30m48s	−13°29.1'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, con condensazione centrale evidente a 270x, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1.5' NE.
IC 1496	gx	23h30m53s	−02°56.1'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere; è diffusa, orientata nello stesso modo di IC 1495, di dimensioni 40"×20" e presenta un tenue nucleo stellare visibile a 380x.
IC 1498	gx	23h31m54s	−05°00.4'		Aqr	16"	buona / m. buono	è molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×20", con tenue bulge diffuso, poco contrastato sul disco — 270x.
IC 1500	gx	23h33m09s	+04°33.1'		Psc	24"	m. buona / ottimo	poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30", con bulge diffuso debolmente contrastato — 450x.
IC 1501	gx	23h34m40s	−03°09.1'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 90"×45" (era visibile, seppur quasi al limite, anche nel 16") — 450x.
IC 1502	gx	23h36m20s	+75°38.9'		Cep	16"	ottima / buono	facile, piccola, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×20" e con marcata condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina 30" verso E e un'altra poco più distante a NW — 380x.
IC 1503	gx	23h38m27s	+04°48.1'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme; a 380x appare allungata da NE a SW con dimensioni ~ 45"×30" *(ultima galassia osservata nella notte: albeggia)*.
IC 1504	gx	23h41m19s	+04°01.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e con tenue bulge appena percettibile; molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S (questa gx era già stata osservata, seppur molto debolmente, nel 16") — 450x.
IC 1505	gx	23h41m37s	−03°33.9'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda, Ø di ~ 40" e con condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
IC 1506	gx	23h44m48s	+04°44.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole e relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 1508	gx	23h45m55s	+12°03.7'		Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, a 380x appare molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30" e bassissimo gradiente.
IC 1507	gx	23h45m33s	+01°41.3'		Psc	16"	ottima / scarso	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con bulge diffuso, appena percettibile sul disco — 270x.
IC 1510	gx	23h50m33s	+02°04.3'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
IC 1513	gx	23h53m29s	+11°19.0'		Peg	16"	m. buona / buono	debolissima, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con bulge diffuso, abbastanza evidente a 270x.
IC 1515	gx	23h56m04s	−00°59.3'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole, situata a ridosso verso E di una stellina abbastanza brillante (a prima vista, usando un ingrandimento inferiore, sembra solo un baffo indistinto); è allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
IC 1516	gx	23h56m07s	−00°55.0'		Psc	16"	ottima / buono	è molto diffusa, rotonda, di 45" di Ø e con piccolo nucleo di aspetto quasi stellare — 380x.
IC 1517	gx	23h56m19s	−00°18.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	è molto diffusa, rotonda, di 45" di Ø e con piccolo nucleo di aspetto quasi stellare — 380x.
IC 1520	gx	23h57m54s	−14°02.4'		Cet	16"	m. buona / m. buono	è un piccolo oggetto rotondo molto debole, diffuso, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di ~ 40"; meglio tuttavia osservabile a 270x.
IC 1522	gx	23h59m03s	+01°43.2'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con bulge puntiforme molto debole — 450x.
IC 1524	gx	23h59m11s	−04°07.6'		Psc	16"	m. buona / buono	relativamente facile, molto diffusa e con basso gradiente, allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso verso N; più interessante scalando a 270x.
IC 1525	gx	23h59m16s	+46°53.4'		And	24"	m. buona / buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, molto diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 80"×60"; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 1526	gx	00h01m31s	+11°20.8'		Peg	24"	m. buona / buono	diffusa e poco più brillante all'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è un piccolo triangolo rettangolo subito a S: la stellina più occidentale è una doppia stretta — 450x.
IC 1527	gx	00h02m22s	+04°05.4'		Psc	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso a SE — 450x.
IC 1529	gx	00h05m13s	−11°30.1'		Cet	16"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda, con nucleo abbastanza evidente a 270x e Ø di ~ 1'; è situata all'interno di un triangolo irregolare di stelline.
IC 1534	gx	00h13m46s	+48°09.1'		And	24"	m. buona / buono	debole, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", diffusa e con bulge evidente (fa parte assieme alle due successive del sestetto di NGC 48) — 450x.
IC 1535	gx	00h13m57s	+48°09.5'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" — 450x.
IC 1536	gx	00h14m19s	+48°08.6'		And	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata a ridosso SE di un piccolo asterismo di 4 stelline di luminosità simile foggiato a "T" — 450x.
IC 1540	gx	00h19m49s	+23°46.3'		And	24"	buona / buono	facile, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20", con bulge esteso e poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N — 450x.
IC 1541	gx	00h20m02s	+22°00.0'		And	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×10" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
IC 1542	gx	00h20m41s	+22°35.6'		And	16"	ottima / buono	debolissima e diffusa chiazza lattescente di luminosità uniforme e con Ø di ~ 40" che appare in visione distolta a 380x; c'è una stellina a ridosso S o SW (difficile stabilirlo a causa del vento!).
IC 1543	gx	00h20m56s	+21°52.0'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 450x.
IC 1544	gx	00h20m41s	+22°35.6'		And	16"	ottima / buono	debolissima e diffusa chiazza lattescente di luminosità uniforme e con Ø di ~ 40" che appare in visione distolta a 380x; c'è una stellina a ridosso S o SW (difficile stabilirlo a causa del vento!).
IC 1546	gx	02h21m29s	+22°30.4'		And	16"	ottima / buono	debole allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale puntiforme (situata 1' scarso a SE di NGC 85) — 380x.
IC 1549	gx	00h22m50s	+06°57.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di 1' e poco più brillante all'interno; c'è una stellina a poco più di 1' ESE — 380x.
IC 1550	gx	00h24m28s	+38°11.1'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø < 40" e un marcato nucleo quasi stellare; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
IC 1551	gx	00h27m35s	+08°52.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; meglio a 270x.
IC 1552	gx	00h29m44s	+21°28.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, estesa 45" in direzione NW-SE — 450x.
IC 1553	gx	00h32m40s	−25°36.5'		Scl	24"	m. buona / scarso	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 340x.
IC 1558	gx	00h35m47s	−25°22.5'		Scl	24"	m. buona / scarso	è un'estesa chiazza lattescente, a prima vista approssim. circolare, ma prolungando l'osservazione appare in realtà poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 2'×1.5'; molto diffusa e appena più evidente verso l'interno; la visione è comunque disturbata dalla SAO 166387 di 8a grandezza situata 3' a SW — 340x.
IC 1559	gx	00h36m52s	+23°59.0'		And	24"	buona / buono	compatta, rotonda con Ø < 30" ed evidente condensazione centrale; il campo è comunque disturbato dalla SAO 74148 di 6ª grandezza situata 3.5' a ENE — 450x (situata a ridosso S di NGC 169).
IC 1561	gx	00h38m33s	−24°20.4'		Cet	24"	m. buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×30" — 340x.
IC 1562	gx	00h38m34s	−24°16.4'		Cet	24"	m. buona / scarso	è una chiazza lattescente piuttosto debole, diffusa rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a ridosso N — 340x.
IC 1563	gx	00h39m00s	−09°01.0'		Cet	16"	buona / discreto	a 270x si separa facilmente da NGC 191 situata a ridosso verso N; presenta un nucleo stellare abbastanza pronunciato e un piccolo alone esteso una 20-ina di secondi.
IC 1564	gx	00h39m05s	+06°01.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, meglio osservabile a 270x, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30".
IC 1565	gx	00h39m26s	+06°44.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 45" con nucleo evidente a 380x.
IC 1566	gx	00h39m33s	+06°48.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	più piccola e di aspetto più compatto, rotonda con Ø di 30" — 380x.
IC 1568	gx	00h39m56s	+06°50.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø inferiore a 1' — 380x.
IC 1569	gx	00h40m28s	+06°43.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, salta fuori solo a 380x; è rotonda, con Ø di 30" e con nucleo stellare visibile a tratti.
IC 1571	gx	00h40m38s	−00°19.8'		Cet	16"	ottima / ottimo	è poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40", ma di aspetto un po' irregolare a 380x; ha una piccola condensazione centrale visibile solo a tratti.
IC 1574	gx	00h43m04s	−22°14.8'		Cet	24"	m. buona / scarso	chiazza molto debole e diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 90"×30" e di luminosità uniforme; una stellina percettibile solo a momenti situata subito a SW è in realtà la **MAC 0043-2215** — 340x.
IC 1575	gx	00h43m34s	−04°07.2'		Cet	24"	m. buona / discreto	è in realtà formata da due galassie ravvicinate che tuttavia non sono riuscito a separare; appare un unico oggetto diffuso, orientato da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e poco più brillante verso l'interno; poco più stemperato verso SE; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
IC 1582	gx	00h46m17s	−24°16.7'		Cet	24"	m. buona / scarso	debolissimo baffo di luminosità uniforme, esteso una 40-ina di secondi in direzione NE-SW — 340x.
IC 1583	gx	00h47m10s	+23°04.4'		And	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente — 450x.
IC 1584	gx	00h47m19s	+27°49.7'		And	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina al bordo occidentale — 450x.
IC 1585	gx	00h47m14s	+23°03.2'		And	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale marcata; poco più evidente di IC 1583, dalla quale dista 1.5' verso SE — 450x.
IC 1586	gx	00h47m56s	+22°22.4'		And	24"	buona / buono	relativamente compatta e facile, con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 1590	aa	00h52m49s	+56°37.7'		Cas	16"	ottima / ottimo	piccolo gruppo, povero e irregolare di stelline situato nella zona più brillante della nebulosa NGC 281; le dimensioni del piccolo campo riprodotto non superano i 4' — 380x.
IC 1592	gx	00h53m27s	+05°46.2'		Psc	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø > 30" e di luminosità pressoché uni-forme; c'è una debole stellina a 1' N e un'altra di luminosità simile a 1.5' verso S — 450x.
IC 1596	gx	00h54m43s	+21°31.4'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con piccolo nucleo quasi stellare che appare più contrastato del disco e osservabile abbastanza facilmente a 380x; c'è una stellina brillante a 1' verso W.
IC 1598	gx	00h54m42s	+05°46.4'		Psc	24"	m. buona / buono	più facile di IC 1592 , poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e nucleo stellare — 450x.
IC 1602	gx	00h55m52s	−09°59.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, con piccola condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 280×.
IC 1607	gx	00h58m49s	+00°35.3'		Cet	24"	m. buona / buono	brillante, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, rotonda con Ø di 45" — 450x.
IC 1610	gx	01h01m43s	−15°34.0'		Cet	16"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa, con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; è rotonda con Ø 45"; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
IC 1613	gx	01h04m47s	+02°07.1'	q 217	Cet	16"	ottima / ottimo	estesa chiazza lattescente, molto debole e stemperata sul fondo cielo, grosso modo circolare con Ø di 5' o 6'; è praticamente definita da 3 stelle poste a triangolo equilatero: una brillante a SW, una doppia stretta con le componenti disuguali a N e un'altra a SE; la visione migliore si ha a 132x, ma a 270x appaiono alcune vaghe screziature all'interno.
IC 1618	gx	01h05m56s	+32°24.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
IC 1619	gx	01h07m22s	+33°04.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	è situata in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti orientate da N a S e distanti poco più di 1'; la gx è poco allungata da E a W (ossia a perpendicolo con le suddette stelline), di dimensioni 40"×30", con piccola e tenue condensazione centrale — 380x.
IC 1620	gx	01h07m14s	+13°57.3'		Psc	16"	ottima / m. buono	debolissima, molto stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 380x.
IC 1622	gx	01h07m37s	−17°32.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	situata 3' a SW di IC 1623 — debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi*(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
IC 1623	gx	01h07m47s	−17°30.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	brillante e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante verso l'interno; forma una coppia ravvicinata con IC **1623A** *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
IC 1623A	gx	01h07m47s	−17°30.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta si separa da IC 1623 e si diparte verso E, rotonda con Ø poco inferiore *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
IC 1634	gx	01h11m03s	+17°39.1'		Psc	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 1636	gx	01h11m37s	+33°21.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
IC 1638	gx	01h12m22s	+33°21.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	più evidente e più grande di IC 1638, rotonda con Ø 45"; presenta una tenue condensazione centrale poco contrastata sul disco — 380x.
IC 1639	gx	01h11m46s	−00°39.9'	q 217	Cet	16"	ottima / discreto	facile, rotonda, relativamente compatta, con basso gradiente e Ø di ~ 30" — 270x.
IC 1640	gx	01h11m51s	−00°37.8'		Cet	16"	ottima / discreto	debole e molto piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme (situata un paio di primi a NE di IC 1639) — 270x.
IC 1643	gx	01h12m09s	−00°24.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco più brillante al centro e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
IC 1645	gx	01h12m27s	+15°45.0'		Psc	24"	buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi ed evidente condensazione centrale; a bassi ingrandimenti pare poco più evidente di IC 1646, dalla quale dista ~ 5' verso NW — 400x.
IC 1646	gx	01h12m44s	+15°42.4'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi 400x.
IC 1647	gx	01h13m14s	+38°53.1'		And	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" — 450x.
IC 1648	gx	01h13m42s	+33°13.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di 30" e appena più brillante all'interno — 380x.
IC 1652	gx	01h14m56s	+31°56.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole lama di luce relativamente compatta ed estesa 1' che si diparte verso S da una stellina; ha un nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
IC 1654	gx	01h15m12s	+30°11.7'		Psc	16"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~45" — 270x.
IC 1659	gx	01h16m06s	+30°21.0'		Psc	16"	m. buona / discreto	più evidente di IC 1654, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme — 270x.
IC 1666	gx	01h19m53s	+32°28.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, poco allungata ~ da E a W, di dimensioni 40"×30" con una stellina a ridosso verso NW (situata 16' SSW di NGC 472) — 380x.
IC 1668	gx	01h18m53s	+33°10.4'		Psc	28"	m. buona / mediocre	piccola, debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 291x.
IC 1669	gx	01h20m07s	+33°11.1'		Psc	28"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; c'è una doppia stretta e sbilanciata a un paio di primi NW — 291x.
IC 1670A	gx	01h18m04s	−16°48.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	costituisce assieme a IC 1670B una coppia di gx interagenti — la 1ª appare in visione distolta come una lama di luce molto debole orientata da NW a SE per ~ 1.5'; un nucleo stellare salta fuori ogni tanto a 400x; la 2ª è relativamente facile, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con un piccolo bulge rotondo; appaiono ben separate anche a ingrandimenti inferiori.
IC 1670B	gx	01h18m53s	−16°48.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **IC 1670A**
IC 1672	gx	01h20m38s	+29°42.0'		Psc	16"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a ridosso verso E — 270x.
IC 1673	gx	01h20m46s	+33°02.6'		Psc	28"	m. buona / mediocre	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare brillante: equidistante da 2 stelline situate rispettivamente 2' a NE e 2' a W — 291x.
IC 1675	gx	01h21m00s	+34°15.0'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con un piccolo nucleo appena percettibile — 270x.
IC 1677	gx	01h21m07s	+33°13.0'		Psc	28"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 291x.
IC 1678	gx	01h21m03s	+05°33.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
IC 1679	gx	01h21m44s	+33°29.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x — situata 3' a SW di NGC 483.
IC 1680	gx	01h21m51s	+33°16.9'		Psc	16"	m. buona / m. buono	piccola, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
IC 1681	gx	01h21m21s	+00°05.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 1682	gx	01h20m38s	+29°42.0'		Psc	16"	m. buona / m. buono	rotonda, poco più grande e brillante di IC 1681, compatta, con Ø di ~ 45" — 270x.
IC 1683	gx	01h21m39s	+34°26.3'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debole, orientata da N a S, di dimensioni 1.5'x45", appena più brillante all'interno; c'è una stellina a ridosso di SW — 270x.
IC 1687	gx	01h23m19s	+33°16.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccolo bulge rotondo con dimensioni di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a W; la visione è disturbata dalla SAO 54647 di 7a grandezza situata 1.5' a NW — 450x.
IC 1689	gx	01h23m48s	+33°03.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	a 340x pare a prima vista simile a IC 1690 (osservata per prima), ma in realtà è più diffusa, di dimensioni leggermente superiori e orientata da N a S; c'è una stellina subito a W — 450x.
IC 1690	gx	01h23m50s	+33°09.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
IC 1692	gx	01h24m39s	+33°14.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 1694	gx	01h24m48s	+01°36.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30", diffusa e con nucleo di aspetto quasi stellare — 450x.
IC 1695	gx	01h25m08s	+08°42.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo quasi stellare circonfuso da un alone rotondo, molto diffuso con Ø max di 40"; c'è una stellina a ridosso NE del nucleo; un' altra stellina si trova a meno di 1' NW — 380x.
IC 1696	gx	01h24m52s	−01°37.0'		Cet	16"	buona / ottimo	piccola, rotonda, relativamente compatta, con Ø max 25"-30"; c'è una stellina a ~ 30" verso W; è situata 3' SE di NGC 530 che a sua volta si trova all'estremità SW dell'ammasso AGC 194 — 380x.
IC 1697	gx	01h25m03s	+00°26.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", con bulge abbastanza brillante e nucleo stellare — 450x.
IC 1698	gx	01h25m22s	+14°50.3'		Psc	16"	ottima / scarso	fa parte di un terzetto assieme a IC 1700 e a IC 107 — debole, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×20" con tenue bulge quasi stellare visibile a 270x.

IC 1700	gx	01h25m25s	+14°51.8'		Psc	16"	ottima / scarso	fa parte di un terzetto assieme alla precedente e a IC 107 — è la più brillante del trio; presenta un nucleo stellare marcato circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
IC 1701	gx	01h25m50s	+18°11.1'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, rotonda, diffusa, appena condensata e Ø di ~ 30"; c'è una stellina quasi a ridosso versi NW — 270x.
IC 1702	gx	01h25m56s	+16°36.1'		Psc	16"	ottima / scarso	relativamente facile, ma molto diffusa e solo appena più brillante allungata da N a S con dimensioni 60"×50"; c'è una stellina a ridosso verso N — 270x.
IC 1704	gx	01h27m10s	+14°46.6'		Psc	16"	ottima / scarso	è una bolla circolare relativamente facile, diffusa, con Ø di ~ 1' e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
IC 1705	gx	01h26m45s	−03°30.1'		Cet	24"	buona / buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
IC 1706	gx	01h27m31s	+14°49.2'		Psc	16"	ottima / scarso	piccolo oggetto molto debole e diffuso, con Ø di 20"25"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta (situata 6' a NE di IC 1705) — 270x.
IC 1715	gx	01h33m35s	+12°35.1'		Psc	16"	ottima / scarso	è un debole oggetto poco allungato da E a W di dimensioni 40"×30"; a tratti appare qualcosa di puntiforme, ma non riesco a capire se trattasi del nucleo o di una debolissima stellina sovrapposta — 270x.
IC 1718	gx	01h38m26s	+33°21.9'		Tri	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo SW — 450x.
IC 1721	gx	01h41m25s	+08°31.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un debole fuso relativamente compatto, di luminosità pressoché uniforme, con dimensioni 60"×30" e orientato da E a W — 380x.
IC 1723	gx	01h43m14s	+08°53.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	è una tenue lama di luce orientata da NNE a SSW estesa almeno 2'; un tenue bulge diffuso appare più contrastato del disco; c'è una stellina quasi a ridosso del bordo meridionale, ma un po' spostata verso W; a 380x il campo è quasi depleto.
IC 1725	gx	01h45m12s	+21°46.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è situata in una piccola zona di cielo quasi depleta a 450x.
IC 1726	gx	01h45m20s	+04°37.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo puntiforme; c'è una stellina quasi a ridosso a SE — 450x.
IC 1727	gx	01h47m31s	+27°19.6'	q 128	Tri	24"	m. buona / buono	molto stemperata sul fondo cielo, diviene diafana ad altri ingrandimenti; di aspetto non regolare, allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 4'×2' e di luminosità uniforme; meglio non superare i 340x.
IC 1731	gx	01h50m12s	+27°11.7'		Tri	16"	m. buona / m. buono	debole, poco allungata da NW a SE con dimensioni 80"×60"; presenta un debolissimo nucleo visibile solo a momenti; si trova a NW di una coppia di stelline deboli distanti 1' in direzione ~ N-S; quella a N è a ridosso della galassia verso E (situata 6' a N dell'ammasso aperto Collinder 21) — 270x.
IC 1732	gx	01h50m48s	+35°56.0'		And	16"	m. buona / discreto	compatta, relativamente brillante con nucleo stellare appena percettibile, di dimensioni 45"×15", allungata da NE a SO; c"è una stellina a ridosso del bordo NE — 270x.
IC 1733	gx	01h50m43s	+33°04.9'		Tri	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo stellare evidente circonfuso da un tenue alone molto diffuso, grosso modo rotondo con Ø di 1' scarso — 380x.
IC 1735	gx	01h50m52s	+33°05.5'		Tri	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di 30" o 35" (situata 2' ENE di IC 1733) — 380x.
IC 1738	gx	01h51m08s	−09°47.5'		Eri	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a poco più di 1' verso N (situata 5.5' a S di NGC 701) — 380x **[questa è la mia 10-millesima galassia osservata — 31-12-2007]**.
IC 1741	gx	01h51m57s	−16°47.3'		Cet	16"	m. buona / mediocre	debolissima, ma visibile anche in visione diretta, molto allungata da N a S per 1'; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso del bordo settentrionale — 270x.
IC 1742	gx	01h53m14s	+22°43.3'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 1746	gx	01h54m24s	+04°48.2'		Psc	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e poco più brillante verso l'interno — 450x.
IC 1747	np	01h57m36s	+63°19.3'	q 17	Cas	10"	buona / discreto	molto piccola, con Ø non superiore a 10", compatta e poco sfumata ai bordi; è abbastanza brillante, ma si riconosce facilmente solo a 240x.
IC 1748	gx	01h56m09s	+17°38.5'		Ari	16"	ottima / buono	debolissima, assai stemperata sul fondo cielo, appare in visione distolta a 270x, forse rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stringa di stelline 3' a S.
IC 1749	gx	01h56m11s	+06°44.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, compatta, rotonda con Ø max di 40" e appena più brillante all'interno — 380x.
IC 1750	gx	01h56m18s	+04°04.6'		Psc	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta e con tenue bulge diffuso appena percettibile, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
IC 1751	gx	01h56m19s	+05°39.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso W — 450x.
IC 1753	gx	01h57m19s	+28°35.4'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W e un'altra poco più brillante verso NNW — 450x.
IC 1754	gx	01h56m50s	+04°01.5'		Psc	24"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele molto aperto con 2 stelline a WNW e a W — 450x.
IC 1755	gx	01h57m10s	+14°33.0'		Ari	16"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce estesa ~ 1.5'. orientata da NNW a SSE, con nucleo stellare tenue e piccolo bulge visibile a tratti — 380x.
IC 1756	gx	01h57m05s	−00°28.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce che in visione distolta sembra aggettare per un grado scarso a NNW di una stellina che per quanto debole riesce nondimeno a interferire un po' con la visione; non bisogna scendere sotto i 450x ((presenza della Luna di età 5 giorni a una 20-ina di gradi di distanza).
IC 1761	gx	01h58m52s	+00°34.1'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme (situata 3.5' NE di NGC 768) — 380x.
IC 1764	gx	02h00m23s	+24°34.8'		Ari	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda, diffusa e con Ø di 45" — 380x.
IC 1767	gx	01h59m59s	−11°04.7'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30" e con bulge diffuso e poco contrastato sul disco — 400x.
IC 1770	gx	02h02m14s	+09°58.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	assieme a IC 1171 forma una coppia di gx facili a 380x; la 1ª è poco più estesa, rotonda con Ø di 40" e nucleo stellare; la 2ª ha un Ø di 30"-35", con condensazione centrale diffusa e meno marcata; formano un piccolo triangolo rettangolo con una stellina situata a SW.
IC 1771	gx	02h02m16s	+09°58.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	v. **IC 1770**
IC 1772	gx	02h02m43s	+07°44.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un minuscolo oggetto, molto debole, esteso sì e no 15" o 20" e tuttavia visibile anche in visione diretta a 380x.
IC 1774	gx	02h03m59s	+15°19.1'		Ari	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore circolare con Ø di ~ 1' ed estremamente diffuso; si vede con molta fatica a 270x.
IC 1776	gx	02h05m15s	+06°06.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	è una debolissima bolla circolare che in visione distolta si stacca appena dal fondo cielo; è meglio visibile a 270x.
IC 1779	gx	02h06m26s	+03°42.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' SSW — 450x.
IC 1780	gx	02h06m51s	+14°43.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; situata a ridosso di un asterismo formato da 4 stelle brillanti che interferiscono un po' con l'osservazione — 450x.
IC 1781	gx	02h06m53s	−00°31.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina a 1' NNW — 450x.
IC 1784	gx	02h16m13s	+32°39.0'		Tri	24"	m. buona / discreto	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" (o poco più) — 450x.
IC 1785	gx	02h16m21s	+32°40.0'		Tri	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a SE — 450x.
IC 1786	gx	02h16m06s	+05°08.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di 30" scarsi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
IC 1789	gx	02h17m51s	+32°23.8'		Tri	24"	ottima / mediocre	è un bel fuso orientato da NNE a SSW, ma con basso gradiente di luce; il bulge è molto diffuso e poco contrastato — 450x.
IC 1790	gx	02h17m38s	+12°30.6'		Ari	16"	ottima / ottimo	forma una coppia con IC 1791 — è una debolissima lama di luce osservabile in visione distolta a 380x, estesa per quasi 1' e orientata da E a W.
IC 1791	gx	02h17m41s	+12°28.2'		Ari	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 45" e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
IC 1792	gx	02h19m01s	+34°27.7'		Tri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' — 450x.
IC 1793	gx	02h21m32s	+32°32.7'		Tri	16"	ottima / m. buono	allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25", diffusa e leggermente più brillante all'interno — 380x.
IC 1794	gx	02h21m30s	+15°45.7'		Ari	16"	m. buona / scarso	è un debole oggetto rotondo e diffuso, poco più brillante all'interno e con Ø di 1'; c'è una stellina a poco più di 1' NNW — 380x.
IC 1795	neb	02h26m40s	+62°05.0'	q 17	Cas	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e resa irregolare dalla presenza di alcune stelline situate all'interno di essa; la zona più brillane appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo pari a 6'×4'; una stellina brillante si trova praticamente al margine S, mentre quello N è delimitato da un piccolo arco di 3 stelline (quella più a W è in realtà una doppia stretta); una sorta di tenue ansa più scura si nota a circa metà nebulosa verso W — 110x con filtro O III.
IC 1797	gx	02h25m28s	+20°23.7'		Ari	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N; un'altra stellina molto debole e a tratti leggermente sfuocata si trova a 1' E, ma da un controllo successivamente effettuato è risultata essere la PGC 3089945 — 450x.
IC 1799	gx	02h28m46s	+45°58.3'		Eri	24"	m. buona / buono	facile, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale; ci sono 2 deboli stelline a ridosso della gx, una a S e l'altra NNE — 450x.
IC 1801	gx	02h28m13s	+19°35.0'		Ari	16"	ottima / ottimo	a 380x appare allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme (situata a ridosso SSE di NGC 935).
IC 1803	gx	02h29m14s	+23°05.0'		Ari	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare meglio contrastato a 270x; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso NW; un'altra stellina debole si trova invece a 1' NE.
IC 1805	neb	02h32m48s	+61°30.0'	q 16	Cas	3"	discreta / buono	osservato al 20×80 appare come una debole chiazza lattescente di forma indistinta nella quale è immerso l'ammasso aperto Melotte 15.
IC 1809	gx	02h31m40s	+22°55.0'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debole, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale diffusa abbastanza evidente a 380x.
IC 1815	gx	02h34m20s	+32°25.7'		Tri	28"	m. buona / buono	relativamente brillante e molto diffusa, rotonda con Ø 45" e alto gradiente di luce, debolmente screziata nella parte interna; non sembra affatto disturbata dalla SAO 55664 di 7ª grandezza situata 3' a NW — 495x.
IC 1817	gx	02h33m49s	+11°12.2'		Ari	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **MCG+2-7-15** situata a ridosso E — si separano abbastanza facilmente a 450x: la IC è piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e presenta un nucleo stellare visibile a momenti; la MCG è invece allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme
IC 1818	gx	02h34m07s	−11°02.4'		Eri	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 30" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 270x.
IC 1819	gx	02h35m42s	+04°03.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; presenta un tenue bulge circolare poco contrastato e un nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
IC 1820	gx	02h35m53s	+06°02.4'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' NE; meglio non scendere sotto i 450x.
IC 1821	gx	02h36m26s	+13°46.8'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 3 stelle brillanti di 8ª grandezza (SAO 93015, 93016 e 93020) allineate in direzione NW-SE che disturbano l'osservazione — 450x.
IC 1823	gx	02h38m37s	+32°04.2'		Tri	16"	ottima / ottimo	è debole, ma in visione distolta, a 270x, appare chiaramente allungata da E a W con dimensioni 60"×30".
IC 1825	gx	02h38m55s	+09°05.8'		Cet	16"	ottima / scarso	debole, ma relativamente facile da vedere, con bassissimo gradiente, orientata da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
IC 1827	gx	02h39m46s	+01°33.5'		Cet	16"	m. buona / buono	piccola, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15", con nucleo stellare brillante e una stellina ben evidente al bordo SE (situata a 6' NW di NGC 1038) — 270x.
IC 1830	gx	02h39m04s	−27°26.6'	q 310	For	16"	m. buona / scarso	facile, approssim. rotonda con Ø di 80", poco più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W — 188x.
IC 1832	gx	02h41m58s	+19°01.8'		Ari	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø < 30"; è quasi allineata ed equidistante con 2 stelline a NNW — 450x.
IC 1834	gx	02h42m48s	+03°05.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
IC 1836	gx	02h43m23s	+03°06.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 40"; rischia di essere offuscata dai bagliori della γ Ceti di 3ª grandezza situata 8' a N (anche se a 450x la stella si riesce a tenere fuori campo).
IC 1838	gx	02h44m43s	+19°27.3'		Ari	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
IC 1839	gx	02h44m43s	+15°14.4'		Ari	16"	ottima / scarso	molto debole, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; è assai disturbata dalla luce della brillante ο Ari di 5ª grandezza che a 270x si fatica a tenere fuori campo.
IC 1840	gx	02h43m42s	−15°42.3'		Cet	24"	buona / buono	poco diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
IC 1841	gx	02h45m36s	+18°55.8'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo quasi stellare abbastanza evidente — 450x.
IC 1842	gx	02h45m23s	+11°27.5'		Ari	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con piccolo nucleo visibile solo a momenti — 450x.
IC 1843	gx	02h45m25s	+02°52.8'		Cet	16"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti a 380x.
IC 1844	gx	02h45m49s	+03°13.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
IC 1846	gx	02h47m44s	+13°15.3'		Ari	16"	ottima / scarso	piccola, rotonda, poco diffusa, con Ø di circa 30" e con nucleo stellare — 270x.
IC 1848	aa + neb	02h51m11s	+60°24.1'	q 38	Cas	6"	discreta / buono	gruppo di stelle relativamente deboli sparse su un'area di 12' di Ø e che circonda una coppia di stelle di 7ª grandezza distanti un paio di primi; difficile, tuttavia, stabilirne i confini; tracce di nebulosità appena percettibili a 30x e appartenenti all'omonima nebulosa si notano a W dell'ammasso (altresì definito Collinder 32).
IC 1849	gx	02h47m45s	+09°21.4'		Cet	24"	m. buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
IC 1853	gx	02h48m04s	−13°59.6'		Eri	16"	m. buona / mediocre	situata un paio di primi S di NGC 1103, è molto debole, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge visibile in visione distolta — 270x.
IC 1856	gx	02h48m51s	−00°46.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; debolmente screziata se osservata a 450x.
IC 1857	gx	02h49m39s	+14°37.2'		Ari	16"	m. buona / scarso	molto debole, allungata da NW a SE, con tenue bulge evidente a 270x.
IC 1861	gx	02h53m07s	+25°29.5'		Ari	16"	ottima / buono	rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, e con Ø di 40"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W — 380x.
IC 1865	gx	02h55m20s	+08°49.7'		Cet	16"	m. buona / scarso	debole e di aspetto un po' confuso, poco allungata all'incirca da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1.5' verso SE — 270x.
IC 1866	gx	02h54m53s	−15°39.1'		Eri	24"	buona / mediocre	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 280x.
IC 1867	gx	02h55m52s	+09°18.7'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1' scarso; poco meglio definita e contrastata scalando a 340x; si trova a metà strada tra una stellina situata 2' a SW e una doppia molto serrata dalla parte opposta.
IC 1870	gx	02h57m33s	−02°20.8'		Eri	16"	ottima / buono	gx oblunga, di luminosità pressoché uniforme e molto disturbata dalla luce di una brillante situata < 2' a E; è allungata da NW a SE con dimensioni 90"×40" poco più contrastata a 270x.
IC 1871	neb	03h03m09s	+60°27.7'	q 38	Cas	24"	m. buona / discreto	debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo, con un tenue addensamento verso NE; si nota abbastanza facilmente a 340x; all'incirca estesa da N a S e con dimensioni grosso modo di 3'×2' (la larghezza è più o meno pari alla distanza delle 2 stelline brillanti situate appena a N); la visione non sembra migliorare utilizzando filtri deepsky od O III.
IC 1874	gx	03h06m22s	+36°00.9'		Per	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; allineata ed equidistante con due stelline a W (quella più occidentale è abbastanza brillante) — 450x.
IC 1876	gx	03h04m32s	−27°27.6'	q 311	For	16"	ottima / mediocre	rotonda, diffusa, con bassissimo gradiente e Ø poco superiore a 1'; è situata 1.5 NW di una stellina — 270x.
IC 1880	gx	03h06m28s	−09°43.9'		Eri	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; a tratti appare allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante meno di 2' verso E — 270x.
IC 1882	gx	03h07m49s	+03°08.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina una 40-ina di secondi a SE — 450x.
IC 1883	gx	03h09m42s	+40°53.6'		Per	28"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso W — 495x.
IC 1886	gx	03h08m03s	−04°24.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' S — 450x.
IC 1892	gx	03h08m27s	−23°03.2'		Eri	16"	ottima / mediocre	fa parte del quartetto di NGC 1228 (q 311) — molto debole e stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40" — 270x.
IC 1894	gx	03h10m25s	+19°36.4'		Ari	24"	buona / discreto	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"×20" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
IC 1895	gx	03h09m36s	−25°15.2'		For	24"	discreta / mediocre	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata sul lato meridionale di un triangolo equilatero di stelline di luminosità decrescente a partire da quella più a N girando in senso orario — 340x.
IC 1897	gx	03h10m46s	−10°47.7'		Eri	24"	buona / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 1898	gx	03h10m20s	−22°24.3'		Eri	24"	discreta / mediocre	è una lama di luce molto debole orientata da E a W con un'estensione che in visione distolta arriva a 3'; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso SW — 340x.
IC 1899	gx	03h12m13s	−25°18.3'		For	24"	discreta / mediocre	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge appena più evidente (la gx è situata in una piccola zona depleta); una piccola chiazza molto debole estesa una 15-ina di secondi e situata 1.5' a NE è in realtà la MCG-4-8-46 — 340x.
IC 1900	gx	03h15m55s	+37°09.3'		Per	24"	ottima / ottimo	fa parte di un terzetto assieme alle due successive con le componenti situate ai vertici di un triangolo isoscele rettangolo — questa è diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con bulge evidente — 450x.
IC 1901	gx	03h16m03s	+37°06.7'		Per	24"	ottima / m. buono	poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge abbastanza evidente — 450x.
IC 1902	gx	03h16m12s	+37°10.6'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno e con nucleo stellare visibile a tratti — 450x.
IC 1905	aster	03h18m49s	+41°21.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	è un piccolo ed insignificante asterismo di 4 stelline foggiato a losanga irregolare — 495x.
IC 1907	gx	03h19m34s	+41°34.8'		Per	28"	ottima / discreto	fa parte del **Grande Ammasso di Perseo** — diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un tenue nucleo stellare; c'è un piccolo triangolo equilatero di stelline a ridosso S — 388x.
IC 1928	gx	03h27m29s	−21°33.6'		Eri	24"	discreta / mediocre	debole, poco diffusa, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso E — 340x.
IC 1931	gx	03h28m58s	+01°45.0'		Tau	24"	m. buona / mediocre	chiazza molto debole e spampanata, poco meglio contrastata scalando a 340x; è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e presenta una condensazione centrale appena percettibile.
IC 1953	gx	03h33m42s	−21°28.7'	q 312	Eri	16"	ottima / mediocre	è un'estesa chiazza lattescente di luminosità un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø di un paio di primi; situata in pieno bagliore della τ5 Eri di 4ª grandezza — 270x.
IC 1956	gx	03h35m33s	+05°04.0'		Tau	24"	m. buona / mediocre	è una lama di luce molto debole orientata da NE a SW e che in visione distolta appare estesa per ~ 1'; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 1967	gx	03h37m48s	+03°16.2'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a ~ 45" verso SE — 450x.
IC 1977	gx	03h40m45s	+17°44.4'		Tau	16"	ottima / buono	debolissima e molto diffusa, meglio osservabile a 270x, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW.
IC 1985	neb	03h44m36s	+32°09.0'	q 95	Per	10"	m. buona / mediocre	alone ben evidente, anche se tenue, di forma alquanto irregolare, esteso per 4' o 5' che circonda una coppia di stelle abbastanza brillanti distanti una 20-ina di secondi; queste fanno parte dell'ammasso aperto IC 348 che con ogni probabilità è fisicamente associato alla nebulosa; più interessante, comunque, se osservato a 60x.
IC 2002	gx	03h54m30s	+10°42.4'		Tau	16"	ottima / scarso	debole, diffusa, di luminosità uniforme e aspetto un po' irregolare; grosso modo rotonda con Ø < 1'; c'è una stellina a 1' NNE — 270x.
IC 2003	np	03h56m22s	+33°52.5'	q 95	Per	16"	m. buona / m. buono	brillante, rotonda con Ø di 15"-20", screziata a 380x e di una colorazione bluastra a ingrandimenti inferiori; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso SW — 380x.
IC 2005	gx	03h57m40s	+36°47.2'		Per	24"	m. buona / m. buono	facile, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale puntiforme evidente; la gx è situata all'interno della Nebulosa California *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
IC 2019	gx	04h01m54s	+05°38.3'		Tau	24"	ottima / discreto	diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare molto evidente; un debolissimo nodulo situato a ridosso SW, e che a prima vista dà l'impressione alla gx di essere allungata, è risultato essere la MAC 0401+0538.
IC 2026	gx	04h03m50s	−11°10.8'		Eri	16"	ottima / m. buono	è un oggetto piccolo e debolissimo che appare, a tratti, a ridosso verso S di una stellina appena percettibile; non è più estesa di 15"-20"; si riesce a catturare solamente a 380x; è situato a poco più di 1' W di NGC 1509 osservata in altra data.
IC 2027	gx	04h06m40s	+37°07.0'		Per	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, di luminosità pressoché uniforme salvo una condensazione centrale puntiforme visibile però solo a momenti; c'è un piccolo triangolo isoscele molto schiacciato a ridosso verso NW: la componente più a S è quella più brillante *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
IC 2041	gx	04h12m35s	−32°49.0'		Eri	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare in visione distolta a 270x, più o meno rotonda con Ø di 40"; è situata subito a NE di NGC 1532.
IC 2057	gx	04h21m56s	+04°02.8'		Tau	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo meridionale — 450x.
IC 2087	neb	04h40m00s	+25°44.0'	q 134	Tau	10"	m. buona / mediocre	è un diffuso lucore molto debole, esteso per ~ 4', facilmente individuabile in visione distolta a 60x; forma un triangolo isoscele ottusangolo con una coppia di stelle distanti 10' e orientate da E a W; non ho fatto uso di alcun filtro.
IC 2093	gx	04h46m26s	−02°40.8'		Ori	24"	buona / scarso	rotonda, diffusa con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso E — 340x.
IC 2101	gx	04h51m42s	−06°13.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20" — 450x.
IC 2102	gx	04h51m55s	−04°57.1'		Eri	24"	ottima / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso SW — 450x.
IC 2104	gx	04h56m19s	−15°47.9'		Lep	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 380x.
IC 2112	gx	05h00m30s	+04°23.2'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; situata tra una stella brillante a NW che disturba po' l'osservazione e una debole stellina a SE — 450x.
IC 2132	gx	05h32m28s	−13°55.6'		Eri	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e poco più brillant all'interno; ci sono 2 stelline molto deboli: una a 1' SE e l'altra 1.5' SW; una più brillante si trova invece un paio di primi a NW — 400x.
IC 2149	np	05h56m24s	+46°06.2'	q 66	Aur	10"	buona / buono	molto piccola, diffusa e di una tenue tonalità azzurra; a 240x appare stranamente allungata da E a W, con dimensioni 30"×20", mentre a bassi ingrandimenti è di aspetto decisamente stellare.
IC 2151	gx	05h52m37s	−17°47.3'		Lep	24"	m. buona / m. buono	diffusa e appena più brillante all'interno allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 450x.
IC 2156	aa	06h04m48s	+24°09.0'		Gem	10"	ottima / buono	è una sorta di "appendice" settentrionale di IC 2157 (così almeno è riportato sul Megastar); molto povero in quanto a 178x si contano sì e no 7 o 8 componenti di luminosità diseguale disposte in forma grosso modo rettangolare.
IC 2157	aa	06h04m48s	+24°04.3'	q 136	Gem	10"	ottima / buono	gruppo disperso già visibile nel cercatore; sembra formato da due blocchi in direzione N-S: quello meridionale di forma triangolare, l'altro vagamente rettangolare, ma quest'ultimo è in realtà riportato sul Megastar come **IC 2156**.
IC 2162	neb	06h12m54s	+17°59.0'	q 137	Ori	16"	m. buona / ottimo	si presenta come un doppio alone attorno a 2 stelline abbastanza brillanti distanti ~ 5' in direzione E-W: quello orientale, oltre a essere più evidente, appare più esteso e maggiormente decentrato verso E rispetto alla stellina — 270x.
IC 2163	gx	06h16m29s	−21°22.6'		CMa	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata e interagente con NGC 2207 — è di aspetto uniforme, orientata da E a W con dimensioni 2'×1' e tende ad assottigliarsi, nonché a sfumare verso E; la coppia appare più interessante scalando a 340x.
IC 2165	np	06h21m43s	−12°59.2'	q 272	CMa	24"	ottima / m. buono	molto brillante e netta ai bordi, bluastra, rotonda con Ø di una decina di secondi; appare debolmente screziata a alti ingrandimenti; tuttavia anche a 580x non si riesce a vedere la stellina centrale (era facilmente visibile nel 10", ma restava di aspetto stellare anche a 178x).
IC 2166	gx	06h26m56s	+59°04.8'	q 41	Lyn	16"	ottima / buono	è una gx debole e molto diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1'; meglio evidente a 270x.
IC 2169	neb	06h31m08s	+09°56.0'	q 182	Mon	10"	buona / buono	è un debolissimo lucore di forma indistinta, salta fuori a momenti in visione distolta a 46x in un campo molto ricco; sembra contrastare poco di più verso W, ma non ho notato alcun miglioramento utilizzando l'O III.
IC 2174	gx	07h09m06s	+75°21.3'		Cam	16"	ottima / buono	facile, rotonda con Ø di ~ 45", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — situata poco meno di 6' WNW di NGC 2314 — 270x.
IC 2175	gx	06h59m50s	+35°27.5'		Aur	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto disturbata dalla SAO 59623 di 8.6m situata ad appena 1.5' N; a tratti appare allungata da E a W per almeno 1'; meglio osservabile a 380x a causa della vicinanza alla stella.
IC 2176	gx	07h07m32s	+32°28.2'		Gem	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale abbastanza evidente di aspetto quasi stellare; è situata all'interno di un piccolo triangolo equilatero di stelline: quella più a E è molto debole — 380x.
IC 2177	neb	07h06m00s	−10°55.0'	q 273	Mon	6"	m. buona / buono	molto debole osservata a 22x: appare come una banda lattescente orientata da N a S per un paio di gradi; diviene leggermente più contrastata con l'H Beta (specie nelle sue parti centrali), salvo l'estrema propaggine meridionale — denominata **Cederblad 90** — che risalta invece meglio con l'O III.
IC 2179	gx	07h15m32s	+64°15.6'	q 21	Cam	10"	non registrati	piccola, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è situata 1.5' a E di una stella brillante di 9ª grandezza — 178x.
IC 2180	gx	07h11m20s	+26°22.3'		Gem	16"	ottima / ottimo	oggetto molto debole e diffuso, di luminosità uniforme e con Ø di 30"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi di Ø verso NE; molto disturbata dalla SAO 79142, arancione e di magnitudo 6.7 situata a soli 3' NE — 380x.
IC 2181	gx	07h13m10s	+18°59.7'		Gem	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con piccolo nucleo stellare visibile a 380x; anche a quest'ingrandimento è tuttavia difficile tenere fuori campo la SAO 96635 situata 4.5' verso S.
IC 2182	gx	07h14m11s	+18°56.7'		Gem	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina a ridosso verso W — 380x.
IC 2185	gx	07h23m16s	+32°29.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' SSW e una più debole subito a E — 450x.
IC 2186	gx	07h22m43s	+21°30.8'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 380x.
IC 2187	gx	07h22m43s	+21°28.9'		Gem	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, di luminosità uniforme e di 20" max di Ø, con una stellina brillante al bordo settentrionale (situata 2' scarsi a S di IC 2186) — 380x.
IC 2190	gx	07h29m54s	+37°27.5'		Aur	16"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; è situata all'interno di un piccolo asterismo di 5 stelline abbastanza brillanti foggiate a "M" — 380x.
IC 2191	gx	07h30m17s	+24°19.7'		Gem	24"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa, con basso gradiente di luce e nucleo quasi stellare — 450x.
IC 2192	gx	07h33m24s	+31°29.0'		Gem	16"	m. buona / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 60"×40", diffusa e con bulge appena più contrastato del disco; c'è una stellina a ridosso verso N che fa parte di un piccolo triangolo rettangolo con cateti di 1' — 380x.
IC 2194	gx	07h33m40s	+31°20.0'		Gem	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, piccola, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; presenta un marcato nucleo stellare ben evidente a 380x.
IC 2196	gx	07h34m10s	+31°24.4'		Gem	16"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di 45"-50", poco diffusa; presenta un nucleo di aspetto stellare visibile a 380x.
IC 2198	gx	07h34m11s	+23°58.0'		Gem	24"	ottima / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità abbastanza uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
IC 2199	gx	07h34m56s	+31°16.5'		Gem	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, ma con bassissimo gradiente e poco contrastata sul fondo cielo; è allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×45"; presenta un tenuissimo bulge visibile solo a tratti a 380x.
IC 2201	gx	07h36m16s	+33°07.3'		Gem	16"	m. buona / ottimo	molto allungata da ENE a WSW, con dimensioni 60"×20" e bulge diffuso abbastanza evidente a 380x (le dimensioni della gx sono simili alla distanza delle 2 stelline un paio di primi a E).
IC 2203	gx	07h40m34s	+34°13.8'		Gem	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa; a 380x, in visione distolta, appare orientata da NW a SE con dimensioni ~ 60"×30", ma sembra di aspetto un po' irregolare.
IC 2204	gx	07h41m18s	+34°14.0'		Gem	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 40", poco diffusa, di aspetto molto regolare e poco più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' SW e un'altra brillante a 1.5' SE — 380x.
IC 2205	gx	07h46m55s	+26°52.3'		Gem	16"	ottima / m. buono	compatta, estesa 20"-30", con condensazione centrale piccola ed evidente, ma di aspetto un po' irregolare (situata poco più di 7' a SW di NGC 2449) — 380x.
IC 2207	gx	07h49m51s	+33°57.7'		Gem	16"	m. buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce orientata da NW a SE per oltre 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x; c'è una stellina quasi a ridosso NE.
IC 2209	gx	07h56m14s	+60°18.3'	q 43	Cam	16"	ottima / m. buono	rotonda, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 45" — 380x.
IC 2211	gx	07h57m46s	+32°33.5'		Gem	16"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, con tenue condensazione centrale appena percettibile, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 380x.
IC 2213	gx	07h59m07s	+27°27.8'		Gem	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SSW — 450x.
IC 2214	gx	07h59m54s	+33°17.4'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 35"-40" e poco più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso NE appena percettibile a 380x.
IC 2217	gx	08h00m50s	+27°30.0'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 25"-30"; c'è una stellina molto debole a 1' NE — 380x.
IC 2219	gx	08h02m36s	+27°26.2'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con tenue bulge diffuso appena più contrastato del disco — 380x.
IC 2222	gx	08h05m15s	+37°28.4'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 3 stelline a NE (quella più esterna è la più brillante) — 450x.
IC 2225	gx	08h05m28s	+35°56.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e leggermente più brillante all'interno; meglio osservabile a 270x.
IC 2226	gx	08h06m11s	+12°32.6'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45", ma di aspetto un po' confuso; è molto stemperata sul fondo cielo e presenta un tenue condensazione centrale visibile a tratti; meglio scalare a 270x.
IC 2228	gx	08h07m06s	+08°02.9'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debolissima, quasi elusiva, piccola; appare a tratti in visione distolta come un piccolo oggetto che si diparte dalla più settentrionale delle componenti di una stellina doppia; la gx sembra, in visione distolta, avviluppare la stessa stellina *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
IC 2230	gx	08h10m57s	+25°41.1'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo molto tenue e poco contrastato — 450x.
IC 2231	gx	08h11m02s	+05°05.2'		CMi	24"	buona / buono	poco allungata da E a W, dimensioni 50"×40" e con piccolo bulge diffuso; c'è una stellina brillante al bordo W; un'altra stellina si trova a una 40-ina di secondi verso S —400x.
IC 2233	gx	08h13m59s	+45°44.7'	q 69	Lyn	16"	m. buona / m. buono	è una debole lama di luce orientata da N a S che in visione distolta appare estesa per almeno 3'; c'è una stellina all'interno vicino il bordo settentrionale; subito a E si trova invece una doppia stretta la cui componente più brillante disturba l'osservazione; a 380x appare abbastanza facilmente un tenuissimo bulge esteso per ~ 1.
IC 2239	gx	08h14m07s	+23°52.0'		Gem	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo, diffuso, di 30"-35" di Ø e con condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso di NE — 380x.
IC 2248	gx	08h16m05s	+23°08.0'		Cnc	16"	ottima / ottimo	piccolo e debole oggetto rotondo, di una 20-ina di secondi max di Ø e con condensazione centrale visibile a 380x (situata 4' a SSE di UGC 4299).
IC 2253	gx	08h16m34s	+21°24.6'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debole, rotonda con Ø di 30", poco diffusa e condensata — 380x.
IC 2254	gx	08h16m45s	+24°46.8'		Cnc	24"	ottima / molto buono	piccola, relativamente compatta e condensata, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; c'è una debole stellina a ridosso W e un'altra più evidente a 1' scarso verso NE — 450x.
IC 2256	gx	08h16m54s	+24°10.6'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline subito a NW — 450x.
IC 2267	gx	08h18m01s	+24°44.2'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole lama di luce diffusa e di aspetto uniforme, orientata da NNW a SSE (ossia poco "ruotata" rispetto alle due stelline distanti 2.5' a E) ed estesa ~ 80" — 450x.
IC 2268	gx	08h18m07s	+24°47.8'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; si trova sul lato NE di un rettangolo formato da 4 stelline — 450x.
IC 2271	gx	08h18m20s	+24°31.6'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto piccola e molto debole, a tratti condensata, approssim. rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina subito a NE; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
IC 2283	gx	08h19m15s	+24°47.5'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stella brillante (la SAO 80093 di magnitudo 9.5) ad appena 1' SE che disturba un po' l'osservazione — 450x.
IC 2293	gx	08h19m32s	+21°23.6'		Cnc	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, osservabile solo in visione distolta ed estesa ~ 30" (situata a meno di 6' SE di NGC 2557) — 380x.
IC 2307	gx	08h20m43s	+19°26.5'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
IC 2311	gx	08h18m46s	−25°22.2'		Pup	16"	ottima / discreto	rotonda, abbastanza compatta, con Ø di ~ 40", appena più brillante all'interno e facilmente visibile a 188x (situata 8' a N di NGC 2566).
IC 2327	gx	08h22m28s	+03°10.2'		Hya	24"	buona / buono	relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme salvo un nucleo stellare visibile a tratti a 400x; c'è un gruppo di una dozzina di stelle subito a N che a prima vista, a 200x, sembra un piccolo ammasso aperto di forma irregolare.
IC 2329	gx	08h22m20s	+19°25.0'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce orientata da NW a SE ed estesa forse 1.5' che appare a tratti in visione distolta scalando a 188x.
IC 2338	gx	08h23m34s	+21°20.6'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	forma una coppia, assieme a IC 2339, formata da 2 piccoli oggetti rotondi molto deboli e poco diffusi, con Ø < 30" e distanti meno di 1' in direzione NE-SW; il 1º presenta una nucleo stellare appena percettibile; il 2º ha la condensazione più marcata ed è nel complesso poco più evidente — 380x.
IC 2339	gx	08h23m34s	+21°20.9'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	v. **IC 2338**
IC 2340	gx	08h20m30s	+18°45.0'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo poco diffuso, con Ø < 30" e di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
IC 2341	gx	08h23m41s	+21°26.1'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile e compatta, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare visibile a 380x.
IC 2361	gx	08h25m44s	+27°52.5'		Cnc	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso SW — 380x.
IC 2363	gx	08h25m45s	+19°27.0'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda, di Ø 30"-35" e con nucleo stellare meglio visibile a 270x; c'è una stellina a ridosso NE — 380x.
IC 2365	gx	08h26m18s	+27°50.4'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda, molto diffusa, ma con condensazione centrale piccola ed evidente a 380x; è disturbata dalla luce della SAO 80181 arancione di magnitudo 5.6 e situata a soli 4' NE.
IC 2369	gx	08h26m21s	+20°16.2'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; la visione è disturbata da una stella brillante situata a neppure 1' N della gx — 450x.

IC 2373	gx	08h26m49s	+20°21.9'		Cnc	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; è rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme.
IC 2375	gx	08h26m20s	−13°18.2'		Pup	24"	m. buona / scarso	(fa parte di un terzetto relativamente compatto assieme a IC 2377 e -79) poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 340x.
IC 2376	gx	08h28m24s	+30°22.9'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo oggetto esteso 10"-15" che salta fuori solo in visione distolta a 380x.
IC 2377	gx	08h26m26s	−13°18.4'		Pup	24"	m. buona / scarso	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×30" — 340x.
IC 2378	gx	08h28m22s	+30°26.6'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta a 1' scarso N di una stellina molto debole — 380x.
IC 2379	gx	08h26m28s	−13°17.6'		Pup	24"	m. buona / scarso	poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso di SE — 340x.
IC 2380	gx	08h28m32s	+30°25.9'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	approssim. rotonda, diffusa con Ø di 1' scarso e poco più brillante verso l'interno; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso NE (diverse altre galassiette molto debole sono presenti nei dintorni, ma solo quelle etichettate sulla cartina sono state osservate) — 380x.
IC 2382	gx	08h28m46s	+22°03.2'		Cnc	24"	buona / buono	piccola e relativamente compatta, con nucleo brillante quasi stellare e luminoso come praticamente come la stellina al bordo N; quest'ultima fa parte di una piccola "bisciola" di 4 stelline di luminosità uguale — 450x.
IC 2384	gx	08h34m23s	+32°26.0'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
IC 2385	gx	08h35m11s	+37°16.0'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, con tenuissimo bulge appena più contrastato del disco, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; è situata alla base minore di un piccolo trapezio di stelline abbastanza brillanti — 380x.
IC 2387	gx	08h38m34s	+30°47.9'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debole ovale di luminosità uniforme, orientato da NNE a SSW con dimensioni 60"×30"; appare poco più contrastata a 270x; è situata tra 2 stelle brillanti: quella meno luminosa si trova 2.5' NW.
IC 2388	gx	08h39m56s	+19°38.7'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	è una delle galassiette del **Praesepe** — piccola e debolissima; appare solo a tratti in visione distolta — 380x.
IC 2389	gx	08h47m58s	+73°32.3'	q 7	Cam	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15", con piccolo bulge evidente ma poco contrastato sul disco; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S dell'estremità SE della gx; è situata a W di un piccolo arco formato da 6 stelline abbastanza brillanti (era visibile, seppure elusivamente, nel 10" a 178x).
IC 2392	gx	08h44m31s	+18°17.1'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; osservata a 380x se non altro per tenere fuori campo la δ Cnc.
IC 2393	gx	08h46m49s	+28°10.3'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, diffusa, poco allungata da NNE a SSW con dimensioni 50"×40" e con marcata condensazione centrale di aspetto stellare; osservato a 380x se non altro per cercar tenere fuori campo la brillante SAO 80423 di magnitudo 6.6 situata 4' a E.
IC 2394	gx	08h47m07s	+28°14.1'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	decisamente più debole, ma si vede senza problemi a 380x se si tiene fuori campo la SAO 80423; è allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; a tratti appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è il nucleo o una debolissima stellina a ridosso.
IC 2398	gx	08h46m44s	+17°45.3'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissima e poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante subito a NE e un'altra più debole verso S — 380x.
IC 2399	gx	08h47m50s	+18°54.7'		Cnc	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' N; meglio scalare a 340x.
IC 2400	gx	08h47m59s	+38°04.2'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina brillante 1' a E (che fa parte di una coppia di stelline di luminosità simile orientate da N a S e separate da un paio di primi); meglio contrastata scalando a 270x.
IC 2401	gx	08h48m10s	+37°45.3'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 450x.
IC 2404	gx	08h48m10s	+29°29.5'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a a NE e un'altra appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso S — 450x.
IC 2405	gx	08h48m43s	+37°13.1'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debole e piccolo oggetto rotondo, poco diffuso e appena più brillante all'interno — 380x.
IC 2406	gx	08h48m05s	+17°42.1'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debole ovale di luminosità pressoché uniforme, orientato da N a S con dimensioni 60"×30" — 380x.
IC 2407	gx	08h48m09s	+17°36.7'		Cnc	16"	ottima / ottimo	è una debolissima "righetta" orientata da E a W che a 380x, in visione distolta, appare estesa per una 40-ina di secondi; solo a tratti si vede qualcosa di puntiforme, ma non si capisce se è il nucleo o una stellina a ridosso (situata 5.5' a S di IC 2406).
IC 2409	gx	08h48m25s	+18°19.8'		Cnc	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di < 1' — 380x.
IC 2411	gx	08h48m30s	+19°02.6'		Cnc	24"	m. buona / buono	situata 1.5' a NNE di NGC 2667 — debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10" e di luminosità uniforme; allineata ed equidistante con due deboli stelline a ENE — 450x.
IC 2420	gx	08h51m34s	+03°06.0'		Hya	24"	buona / ottimo	relativamente compatta, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a ridosso SE (un'altra stellina appena percettibile si trova subito a NE) — 570x.
IC 2421	gx	08h54m22s	+32°40.8'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo; a 270x appare grosso modo rotonda con Ø di ~ 1' e di luminosità uniforme.
IC 2422	gx	08h54m24s	+20°13.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso SE — 450x.
IC 2423	gx	08h54m47s	+20°13.3'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno — 450x.
IC 2426	gx	08h58m30s	+02°55.5'		Hya	24"	buona / discreto	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile — 450x.
IC 2428	gx	09h03m14s	+30°35.5'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme e molto allungata da E a W con dimensioni ~ 100"×20"; meglio scendere a 270x, perché a 381 il campo è depleto e non vi sono stelline di riferimento.
IC 2429	gx	09h03m43s	+29°17.7'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e relativamente compatta, piccola, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e condensazione centrale appena percettibile — 380x.
IC 2430	gx	09h04m23s	+27°57.2'		Cnc	16"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, anche se disturbata dalla luce della SAO 80609 di 6.7 situata 4' a SW; la gx è poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S — 380x.
IC 2431	gx	09h04m35s	+14°35.7'		Cnc	24"	buona / ottimo	approssim. rotonda, di Ø < 30" e con alcune discrepanze di luce all'interno messe ben in evidenza a 570x.
IC 2432	gx	09h04m39s	+05°30.7'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale appena percettibile, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 2433	gx	09h05m29s	+22°36.1'		Cnc	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20" — 450x.
IC 2434	gx	09h07m16s	+37°12.9'		Lyn	16"	buona / m. buono	molto debole di luminosità pressoché uniforme (un tenuissimo bulge diffuso appare solo a tratti a 380x), allungata da N a S con dimensioni ~ 50"×30"; c'è una stellina a ~ 1' SSE.
IC 2435	gx	09h06m50s	+26°16.5'		Cnc	24"	ottima / buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 2437	gx	09h05m33s	−19°12.4'		Hya	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, con evidente condensazione centrale, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; situata al vertice nord-orientale di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline orientate come la gx e distanti poco più di 1' (situata ~ 9' a SE della coppia NGC 2754-58) — 270x.
IC 2439	gx	09h08m38s	+32°35.6'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20", con piccolo bulge evidente e nucleo stellare abbastanza marcato — 380x.
IC 2441	gx	09h10m02s	+22°51.3'		Cnc	24"	m. buona / mediocre	sembra doppia e a prima vista anche poco più evidente di IC 2442 (situata 1' a SE); è orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; il "nodulo" a NW è più brillante di quello a SE — 450x.
IC 2442	gx	09h10m05s	+22°50.3'		Cnc	24"	m. buona / mediocre	debole e diffusa, di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare visibile tuttavia solo a tratti, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
IC 2443	gx	09h11m31s	+28°49.6'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda, poco diffusa, con Ø di 40" e poco più brillante all'interno — 380x.
IC 2444	gx	09h12m51s	+30°12.7'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	piccola e debole, diffusa, rotonda, di 30" di Ø e con tenue nucleo stellare visibile a 380x.
IC 2445	gx	09h13m12s	+31°48.5'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio visibile a 270x.
IC 2446	gx	09h13m31s	+28°57.1'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debole, in visione distolta sembra di dimensioni 80"×40", allungata da NW a SW con tenue bulge diffuso appena più contrastato del disco; in visione diretta è meglio tuttavia scalare a 270x.
IC 2453	gx	09h15m54s	+20°55.7'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a ENE e un'altra a perpendicolo a 1' NNW — 450x.
IC 2454	gx	09h16m02s	+17°49.2'		Cnc	16"	buona / m. buono	relativamente brillante, compatta e rotonda, di luminosità uniforme, con un Ø di una 40-ina di secondi (situata poco più di 7' a NW di NGC 2797) — 270x.
IC 2458	gx	09h21m29s	+64°14.2'	q 23	UMa	16"	buona / scarso	piccolo e debolissimo oggetto di luminosità uniforme esteso per poche decine di secondi e che in visione distolta appare chiaramente orientato da N a S; sembra a prima vista un'appendice sud-occidentale di NGC 2820 — 188x.
IC 2461	gx	09h19m58s	+37°11.5'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce estesa un'80-ina di secondi e orientata da NW a SE; presenta un bulge diffuso abbastanza evidente meglio contrastato a 270x; a 380x, tuttavia, si apprezzano meglio le dimensioni.
IC 2463	gx	09h23m00s	+22°37.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola, debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
IC 2464	gx	09h23m22s	+22°37.8'		Leo	24"	m. buona / buono	più evidente di IC 2463, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
IC 2465	gx	09h23m22s	+22°26.2'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, con condensazione centrale di aspetto quasi stellare, orientata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a 1' verso W (la quale fa parte di un piccolo asterismo di 4 stelle fatto a "L"; una stellina appena percettibile si trova invece subito a NW — 450x.
IC 2466	gx	09h23m45s	+24°31.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo S; un'altra stellina più debole si trova a 1' sempre verso S — 450x.
IC 2467	gx	09h24m53s	+38°21.1'		LMi	16"	m. buona / ottimo	rotonda, poco diffusa, di una 30-ina di secondi di Ø e con tenue nucleo stellare visibile a 380x.
IC 2468	gx	09h25m01s	+38°20.6'		LMi	16"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di ~ 15" di Ø; salta fuori abbastanza facilmente a 380x quando si osserva IC 2467 dalla quale dista 1.5' verso ESE.
IC 2471	gx	09h25m12s	−06°49.8'		Hya	16"	buona / m. buono	non è stranamente riportata sull'Uranometria pur essendo poco più brillante di NGC 2876 dalla quale dista 7' verso S; è rotondeggiante, compatta, con Ø di ~ 30", con condensazione centrale molto marcata di aspetto quasi stellare — 270x.
IC 2472	gx	09h26m34s	+21°23.1'		Leo	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
IC 2473	gx	09h27m23s	+30°26.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 45"; meglio osservabile a 270x; a 380x è più evidente il nucleo stellare.
IC 2474	gx	09h27m11s	+23°02.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto piccola e compatta, orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina evidente a ridosso verso SE (situata 2' NW di NGC 2885) — 380x.
IC 2475	gx	09h27m54s	+29°47.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni ~ 45"×15" — 380x.
IC 2476	gx	09h27m53s	+29°59.1'		Leo	16"	m. buona / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a IC 2478 e IC 2479 — debole, diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso; presenta un piccolo bulge poco più evidente del disco visibile a 380x; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE.
IC 2478	gx	09h28m01s	+30°02.2'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e relativamente compatto, con Ø max di 20" e visibile abbastanza facilmente a 380x; è equidistante con 2 stelline situate a E.
IC 2479	gx	09h28m04s	+29°59.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	di aspetto e dimensione simili alla precedente ma più diffusa; salta fuori senza problemi in visione distolta a 380x.
IC 2480	gx	09h28m18s	+29°42.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare evidente a 380x.
IC 2481	gx	09h27m29s	+03°55.8'		Hya	24"	buona / m. buono	debole, con tenue nucleo diffuso poco contrastato sul disco, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline di eguale luminosità situate a N e a NE — 400x.
IC 2486	gx	09h30m17s	+26°38.5'		Cnc	16"	buona / m. buono	debolissima, diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso NE; meglio definita a 380x.
IC 2487	gx	09h27m00s	−12°06.6'		Hya	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, presenta un bulge rotondo abbastanza brillante circonfuso da un disco tenuissimo con Ø di 1' scarso — 380x.
IC 2487	gx	09h30m09s	+20°05.4'		Leo	16"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; meglio tuttavia scalare a 270x.
IC 2490	gx	09h33m03s	+29°55.7'		Leo	16"	buona / m. buono	debole, rotonda, diffusa, con Ø di ~ 45"; a tratti sembra appena più brillante verso l'interno — 380x.
IC 2491	gx	09h35m14s	+34°43.9'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e con tenue nucleo stellare visibile a 380x.
IC 2493	gx	09h36m18s	+37°21.8'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda, diffusa con condensazione centrale quasi stellare osservabile a 380x e Ø di 35"-40".
IC 2495	gx	09h38m07s	+28°03.4'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debole oggetto rotondo, poco diffuso, di luminosità pressoché uniforme con Ø di 30"-35"; a soli 5' SE c'è la SAO 80941 di 7.8 che però si riesce a tenere fuori campo a 380x.
IC 2498	gx	09h41m22s	+28°06.8'		Leo	16"	buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare visibile a tratti; meglio definita a 380x.
IC 2500	gx	09h42m23s	+36°21.0'		LMi	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, orientata da NW a SE e con dimensioni ~ 60"×30" — 270x.
IC 2505	gx	09h45m10s	+27°15.6'		Leo	16"	buona / m. buono	assieme a IC 2506 forma una coppia di gx al limite della visibilità: la 1ª è elusiva e appare solo occasionalmente in visione distolta, estesa sì e no 30"; la 2a, più evidente, ha una condensazione centrale puntiforme visibile a tratti e possiede dimensioni simili; sono entrambe meglio visibili a 270x.
IC 2506	gx	09h45m13s	+27°15.0'		Leo	16"	buona / m. buono	v. **IC 2505**
IC 2508	gx	09h47m07s	+33°30.5'		LMi	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c' una stellina a 1' verso SW — 450x.
IC 2515	gx	09h54m39s	+37°24.5'		LMi	16"	buona / ottimo	molto debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", con bulge tenue e diffuso; c'è la SAO 61753 a poco più di 2' a E — 380x.
IC 2516	gx	09h54m48s	+37°41.2'		LMi	16"	buona / ottimo	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
IC 2520	gx	09h56m20s	+27°13.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	facile, diffusa, rotonda con Ø di 30" e appena più brillante verso l'interno; c'è una stella brillante a 2' scarsi verso SW — 380x.
IC 2524	gx	08h08m10s	+39°09.4'		LMi	16"	m. buona / m. buono	debole, con leggera condensazione centrale, ma si aspetto un po' confuso e irregolare, di dimensioni inferiori a 1'; è situata a ~ 3' N di una stellina brillante — 270x.
IC 2530	gx	10h01m31s	+37°12.2'		LMi	16"	buona / m. buono	rotonda, con condensazione centrale evidente e abbastanza marcata e Ø < 40"; c'è una stellina a 1' verso ENE (situata 3' SW di UGC 5391, la gx che stavo in effetti cercando) — 380x.
IC 2535	gx	10h04m32s	+38°00.4'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø inferiore a 40" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
IC 2537	gx	10h03m52s	−27°34.3'	q 324	Ant	16"	ottima / ottimo	è un debole lucore molto stemperato sul fondo cielo e di aspetto un po' confuso; allungata ~ da N a S con dimensioni 2'×1.5'; la visione migliora un poco scalando a 188x.
IC 2540	gx	10h06m47s	+31°28.5'		LMi	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, poco più brillante all'interno, con Ø di 40"; c'è una stellina a 1' verso N — 380x.
IC 2541	gx	10h05m48s	−17°26.1'		Hya	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e con basso gradiente di luce, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" — 450x.
IC 2542	gx	10h07m50s	+34°18.9'		LMi	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di ~ 45" e con bassissimo gradiente di luce — 380x.
IC 2544	gx	10h08m30s	+33°20.8'		LMi	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 30"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline a SE e a NE — 380x.
IC 2550	gx	10h10m28s	+27°57.2'		LMi	16"	ottima / m. buono	è un debolissimo lucore di luminosità uniforme, approssim. rotondo con Ø di 45" situato tra 2 stelline brillanti distanti 1' e orientate da NW a SW: la gx è un poco spostata verso W — 380x.
IC 2551	gx	10h10m40s	+24°24.8'		Leo	16"	ottima / m. buono	rotonda, poco diffusa, con Ø di 30" e nucleo stellare 380x.
IC 2561	gx	10h19m09s	+34°40.5'		LMi	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con bulge diffuso poco contrastato sul disco; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
IC 2562	gx	10h18m54s	+16°09.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
IC 2565	gx	10h21m18s	+27°55.8'		LMi	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; presenta un nodulo o una stellina appena percettibile al bordo occidentale; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
IC 2566	gx	10h22m25s	+36°35.4'		LMi	16"	ottima / ottimo	assieme a IC 2568 forma una coppia di gx separate da 2.5' in direzione NE-SW — la 1ª è allungata da N a S, di dimensioni 50"×30", diffusa e con condensazione centrale di aspetto quasi stellare; la 2a, poco più grande, è invece allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", diffusa e con Ø più marcata, molto piccola ma non puntiforme (sembra una mini righetta brillante) — 380x.
IC 2567	gx	10h21m58s	+24°39.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45"; presenta una piccola e tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
IC 2568	gx	10h22m30s	+36°36.0'		LMi	16"	ottima / ottimo	v. **IC 2566**
IC 2572	gx	10h25m07s	+28°05.7'		LMi	16"	ottima / m. buono	è una piccola lama di luce molto debole, facilmente osservabile in visione distolta, orientata da NE a SW per una 40-ina di secondi e con un piccolo nucleo evidente (situata 4'.5 a NNE di NGC 3235) — 270x.
IC 2574	gx	10h28m22s	+68°25.0'	q 24	UMa	24"	buona / ottimo	è una chiazza oblunga molto stemperata sul fondo cielo, orientata da NE a SW con dimensioni 5'×2.5'; c'è un nodulo abbastanza brillante, diffuso e di aspetto irregolare a NE (visualmente appare esterno alla gx); un altro nodulo appena percettibile a 450x si trova in mezzo a 2 stelline situate a E; la gx risulta comunque meglio visibile scalando a 200x (già precedentemente intravista nel 10" a 118x e definita comunque "difficile" anche nel 16").
IC 2583	gx	10h31m10s	+26°03.3'		Leo	16"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda di una 40-ina di secondi di Ø e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' SSW — 380x.
IC 2590	gx	10h36m17s	+26°57.7'		Leo	16"	buona / ottimo	debole oggetto rotondo, di ~ 30" di Ø, poco diffuso e appena più brillante all'interno; c'è una stellina brillante a 1' SW — 380x.
IC 2591	gx	10h36m29s	+35°03.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole e di aspetto confuso, estesa una 40-ina di secondi, presenta una condensazione centrale visibile a momenti a 380x *(presenza di chiarore lunare)*.
IC 2598	gx	10h39m42s	+26°43.6'		LMi	16"	m. buona / m. buono	debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme e con Ø di 20" — 380x.
IC 2600	gx	10h46m39s	+72°19.2'		UMa	16"	m. buona / mediocre	assieme a IC 2601 sono due deboli chiazze rotondeggianti, estese non più di 30" e di luminosità uniforme; la 2ª è solo appena più evidente (situate una decina di primi a SW di NGC 3364) — 270x.
IC 2601	gx	10h47m13s	+72°19.4'		UMa	16"	m. buona / mediocre	v. **IC 2600**
IC 2604	gx	10h49m25s	+32°46.4'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a 1' verso SW e un'altra più debole a 1' NW; meglio contrastata a 270x.
IC 2606	gx	10h50m17s	+37°57.4'		LMi	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, con tenue condensazione centrale, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
IC 2607	gx	10h50m19s	+37°59.7'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole, salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva IC 2606 dalla quale dista poco più di 2' verso N; è approssim. rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina brillante alla stessa distanza verso NNW — 380x.
IC 2612	gx	10h53m37s	+32°46.2'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, di luminosità pressoché uniforme, diffusa, con Ø di 40"; c'è una stellina a 1' verso SE — 380x.
IC 2616	gx	11h02m06s	+38°47.3'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è più debole di IC 2617, piccola, rotonda di 20"-25" di Ø e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline molto deboli subito a NE.
IC 2617	gx	11h02m08s	+38°39.8'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' NE — 380x.
IC 2620	gx	11h02m24s	+38°30.3'		UMa	16"	buona / ottimo	molto debole e poco diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 35"-40" — 380x.
IC 2627	gx	11h09m53s	−23°43.6'	q 326	Crt	10"	buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di un paio di primi e di luminosità uniforme; si può osservare con relativa facilità solo a 118x, perché a ingrandimenti tende a stemperarsi totalmente sul fondo cielo.
IC 2628	gx	11h11m38s	+12°07.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø poco superiore a 30" e con condensazione stellare evidente — 450x.
IC 2634	gx	11h13m28s	+10°29.1'		Leo	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi non sembra particolarmente disturbata dalla SAO 99505 di magnitudo 7.5 situata 3.5' a SW — 495x.
IC 2637	gx	11h13m50s	+09°35.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta, con condensazione centrale piccola e marcata, rotonda con Ø forse inferiore a 30"; c'è una stellina a meno di 1' verso W — 400x.
IC 2638	gx	11h13m52s	+10°33.8'		Leo	28"	ottima / buono	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge abbastanza evidente — 495x.
IC 2649	gx	11h14m46s	+11°07.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; equidistante con 2 stelline brillanti a N.
IC 2661	gx	11h15m29s	+13°36.5'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, ma si vede con relativa facilità in visione distolta; occorre però scalare a 340x; a tratti appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" (situata 11' a SSW di IC 2666) — 450x.
IC 2666	gx	11h15m44s	+13°46.9'		Leo	24"	m. buona / buono	diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40", poco più brillante all'interno, ma senza bulge — 450x.
IC 2668	gx	11h15m32s	−14°10.2'		Crt	16"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni ~ 60"×30"; meglio contrastata a 270x; c'è un arco di 4 stelline a 6' verso S come comodo riferimento.
IC 2672	gx	11h16m04s	+10°09.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40"-45"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso E e un'altra brillante a poco più di 1' sempre a E (la gx è praticamente allineata ed equidistante con queste stelle) — 450x.
IC 2674	gx	11h16m08s	+11°02.9'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; appare a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×20" — 450x.
IC 2681	gx	11h16m36s	+11°12.0'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 2686	gx	11h17m03s	+12°56.9'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a ridosso verso S della più occidentale di una coppia di stelline orientate da E a W; probabilmente rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; non bisogna scendere sotto i 450x (di fatto a 340x non l'ho vista).
IC 2694	gx	11h17m38s	+13°22.5'		Leo	28"	ottima / buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina c'è una stella brillante a 1' scarso verso N e una debole subito a NW — 495x.
IC 2695	gx	11h17m49s	+13°43.7'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e molto difficile da vedere, in quanto il capo è virtualmente depleto (presenti solo alcune deboli stelline) anche a 340x sembrerebbe molto piccola, estesa non più di 10" o 15"; non è possibile spingere a 450x per il motivi sopra esposti.
IC 2703	gx	11h08m05s	+17°39.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
IC 2708	gx	11h18m35s	+12°42.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40 e un nucleo di aspetto stellare; c'è una stellina subito a S — 450x.
IC 2725	gx	11h19m57s	+13°25.8'		Leo	24"	m. buona / buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 450x, ma non dovrebbe essere più estesa di una decina di secondi (a bassi ingrandimenti potrebbe essere scambiata per una stellina appena percettibile).
IC 2734	gx	11h20m24s	+12°26.6'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, appare con difficoltà in visione distolta; di fatto è visibile solo a tratti a 450x, orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi.
IC 2745	gx	11h21m32s	+13°25.6'		Leo	24"	buona / buono	debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso S — 340x.
IC 2757	gx	11h22m02s	+08°23.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	è un debole ovale diffuso e di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni 30"×20"; poco meglio contrastato scalando a 340x [è sorta la Luna all'ultimo quarto].
IC 2758	gx	11h22m03s	+07°48.8'		Leo	28"	ottima / buono	poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con piccolo bulge evidente; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 495x.
IC 2759	gx	11h22m14s	+24°18.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo denominato **Hickson 51** — debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; nota altresì come **Hickson 51B** — 450x.
IC 2762	gx	11h22m18s	+12°43.3'		Leo	24"	buona / buono	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"× 20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 340x.
IC 2763	gx	11h22m18s	+13°03.9'		Leo	24"	buona / buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 340x.
IC 2776	gx	11h22m40s	+13°19.8'		Leo	24"	buona / buono	molto debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 340x.
IC 2782	gx	11h22m55s	+13°26.5'		Leo	16"	ottima / ottimo	debolissima, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; il campo è quasi depleto: meglio osservare a 270x.
IC 2784	gx	11h23m12s	+13°07.1'		Leo	24"	buona / buono	piccola, debole, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso NW — 340x.
IC 2785	gx	11h23m15s	+13°23.5'		Leo	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1123+1323 situata a ridosso E — relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare; la MAC è molto piccola e debole, a tratti orientata da NW a SE, ma non più estesa di 15" o 20" — 340x.
IC 2787	gx	11h23m19s	+13°37.8'		Leo	24"	buona / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 340x.
IC 2804	gx	11h24m56s	+13°13.4'		Leo	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 340x.
IC 2810A	gx	11h25m45s	+14°40.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; c'è una debole stellina a ridosso E — 450x.
IC 2810B	gx	11h25m50s	+14°40.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, appare facilmente in visione distolta a 450x quando si osserva IC 2810A, dalla quale dista poco più di 1' a SE; appare a tratti orientata come la principale, ma con dimensioni di 20"×10" — 450x.
IC 2822	gx	11h26m34s	+11°26.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 450x.
IC 2826	gx	11h27m06s	+13°14.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
IC 2828	gx	11h27m11s	+08°43.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 2830	gx	11h27m22s	+07°48.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente a 450x in una piccola zona di cielo depleta; non è più estesa di 20"; la visione non sembra migliorare scalando a 340x.
IC 2843	gx	11h27m58s	+13°11.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo molto debole e in parte offuscato dalla SAO 99617 di 9ª grandezza situata 1.5' a E; meglio visibile a 450x.
IC 2846	gx	11h28m00s	+11°09.5'		Leo	24"	buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale evidente; c'è una stellina a 1.5' verso E — 450x.
IC 2850	gx	11h28m13s	+09°03.7'		Leo	16"	buona / ottimo	elusiva e molto piccola, appare solo a momenti in visione distolta a ridosso NW di una debole stellina — 270x.
IC 2853	gx	11h28m15s	+09°08.8'		Leo	16"	buona / ottimo	è un debole gx di forma indistinta situata quasi a ridosso SSW di una stellina brillante di 10a; è estesa ~ 45" e presenta una condensazione centrale puntiforme visibile a momenti — 270x.
IC 2856	gx	11h28m16s	−12°53.4'		Crt	24"	m. buona / scarso	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 340x.
IC 2857	gx	11h28m31s	+09°06.3'		Leo	24"	buona / discreto	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa per 1' e orientata da N a S; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N (fa parte di un piccolo gruppo osservato molto tempo addietro col 16") — 450x.
IC 2871	gx	11h29m21s	+08°36.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
IC 2873	gx	11h29m28s	+13°13.2'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a N e un'altra più evidente all'incirca alla stessa distanza verso SW — 450x.
IC 2887	gx	11h30m30s	+09°23.3'		Leo	16"	buona / ottimo	gx elusiva disturbata dalla luce di una stellina brillante di 9ª situata 1' a NE; in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE per max 30" (situata a 9' scarsi NE di NGC 3705) — 270x.
IC 2889	gx	11h30m29s	−13°05.5'		Crt	24"	m. buona / buono	debole, ma più che altro molto disturbata dalla SAO 156622 di 7ª grandezza situata 3' a NE che anche a 450x si fatica molto a tenere fuori campo; è allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e di luminosità uniforme.
IC 2910	gx	11h31m55s	−09°43.5'		Crt	24"	m. buona / scarso	presenta un piccolo nucleo brillante di dimensioni 20"×15", orientato da N a S circonfuso da un tenue alone un poco asimmetrico, nel senso che si estende maggiormente verso E; la galassia risulta nel complesso rotondeggiante con Ø di 1' scarso — 340x.
IC 2913	gx	11h31m51s	−30°24.6'		Hya	16"	m. buona / m. buono	rotonda, diffusa, poco più brillante verso l'interno e con Ø di una 30-ina di secondi (situata 7' a SE di NGC 3717) — 380x.
IC 2925	gx	11h33m13s	+34°15.9'		UMa	16"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a IC 2928 e IC 2933, di un terzetto di deboli galassiette — è un piccolo oggetto molto debole allungato da N a S con dimensioni 30"×20" e condensazione centrale puntiforme visibile a 380x.
IC 2928	gx	11h33m30s	+34°19.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa, e stemperata sul fondo cielo, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, appena più brillante al centro; meglio tuttavia scalare a 270x.
IC 2933	gx	11h34m13s	+34°18.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" con tenue bulge puntiforme visibile a 380x; c'è un piccolo arco di 4 stelline quasi equidistanti a S.
IC 2934	gx	11h34m20s	+13°19.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NNW a SSE (ossia come la coppia di stelline situata a S della SAO 99670) con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
IC 2941	gx	11h36m10s	+10°03.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, con bassa luminanza superficiale, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 280x.
IC 2943	gx	11h36m42s	+54°50.7'		UMa	16"	ottima / scarso	debole, piccola, rotonda, con Ø max di 20" o 25" ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina molto debole a 30" verso N — 188x.
IC 2945	gx	11h37m04s	+12°55.6'		Leo	24"	buona / ottimo	diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare evidente — 400x.
IC 2946	gx	11h37m29s	+32°15.1'		UMa	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~ 30"; appare meglio contrastata a 270x.
IC 2947	gx	11h37m31s	+31°21.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è una bolla circolare molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme con Ø di ~ 40" — 380x.
IC 2950	gx	11h41m38s	+37°59.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, piccola e diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 30" — 380x.
IC 2951	gx	11h43m24s	+19°45.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso E — 380x.
IC 2952	gx	11h44m17s	+33°21.1'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta quando di fissa la NGC 3855, situata 1.5' a E; è molto diffusa e con nucleo stellare appena percettibile; non più estesa di 30" — 270x.
IC 2955	gx	11h45m04s	+19°37.2'		Leo	16"	buona / buono	situata quasi a ridosso verso nord di NGC 3862 — è circolare, con Ø di una 30-ina di secondi e presenta un piccolo nucleo quasi stellare — 270x.
IC 2956	gx	11h45m18s	+26°46.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 1', poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5 verso NE — 400x.
IC 2963	gx	11h49m24s	−05°07.1'		Vir	24"	m. buona / buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con piccolo e tenue bulge diffuso; c'è una stellina brillante al bordo NW — 400x.
IC 2967	gx	11h50m55s	+30°51.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare — 380x.
IC 2969	gx	11h52m31s	−03°52.3'		Vir	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; meglio osservabile a 270x.
IC 2973	gx	11h53m51s	+33°21.9'		UMa	16"	mediocre / ottimo	debolissimo ovale di 80"×30" orientato da NW a SE, di luminosità pressoché uniforme, che appare con relativa facilità in visione distolta a 270x; c'è una stellina molto debole a poca distanza dal margine NW.
IC 2974	gx	11h53m49s	−05°10.1'		Vir	24"	m. buona / buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×20" e con bulge diffuso evidente; c'è una stellina a ridosso verso E — 400x.
IC 2978	gx	11h56m23s	+32°02.3'		UMa	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" (situata 4.5' a WNW di NGC 3986) — 450x.
IC 2979	gx	11h56m54s	+32°09.5'		UMa	16"	ottima / discreto	debole, piccola, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale di aspetto stellare (situata 8'.5 a N di NGC 3986) — 270x.
IC 2982	gx	11h57m51s	+27°52.1'		Leo	16"	ottima / discreto	più debole di NGC 3988, dalla quale dista 6' verso E, leggermente ovale, orientata da E a W e di dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a neppure un primo verso W (questa stellina fa parte di un piccolo asterismo di 4 componenti foggiato a "L") — 270x.
IC 2984	gx	11h59m07s	+30°41.8'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare solo in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
IC 2985	gx	11h59m13s	+30°43.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 45"×20", ma è meglio scalare a 270x.
IC 2986	gx	11h59m50s	+30°50.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, diffusa, con Ø di 30"-35", più brillante all'interno e con nucleo di aspetto quasi stellare a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso verso N (che è la più debole di un piccolo asterismo foggiato a "Y".
IC 2995	gx	12h05m47s	−24°56.5'		Hya	16"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, con bulge esteso appena più brillante del disco e molto allungata ~ da NW a SE con dimensioni 3'×1'; c'è una debole stellina a ~ 1' SW del bulge; la visione non migliora sensibilmente scalando a 188x; in questo caso salta fuori fissando la stellina situata sul prolungamento dell'asse verso SE (a metà strada tra la gx e la stellina brillante che si trova al centro di un arco di 3 componenti a E).
IC 3003	gx	12h07m33s	+32°48.8'		Com	16"	ottima / m. buono	piccola, rotonda, relativamente compatta, con Ø di una 30-ina di secondi (situata 12' a SSE di NGC 4122) — 270x.
IC 3007	gx	12h07m31s	+31°20.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	oggetto molto piccolo e debole, forse rotondo con Ø di 20"-25" e condensazione centrale puntiforme evidente a 380x.
IC 3008	gx	12h07m52s	+13°34.6'		Com	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; allineata ed equidistante con due stelline a SE — 450x.
IC 3012	gx	12h08m24s	+11°10.6'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 495x.
IC 3013	gx	12h08m26s	+10°01.0'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (si trova a ridosso SW di un triangolo isoscele aperto formato da 3 stelline abbastanza brillanti — 495x.
IC 3014	gx	12h08m37s	+38°49.9'		CVn	16"	m. buona / ottimo	rotonda, poco diffusa con Ø di 40" e basso gradiente di luce; c'è una stellina a un paio di primi verso W — 380x.
IC 3019	gx	12h09m22s	+13°59.6'		Com	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza rotondeggiante di luminosità uniforme che appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x (in questo caso non ho notato un miglioramento scalando gli ingrandimenti).
IC 3021	gx	12h09m55s	+13°03.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è una stellina a 1.5' NE; è preferibile non scalare a 340x.
IC 3022	gx	12h10m02s	+38°44.6'		CVn	16"	m. buona / ottimo	di dimensioni e aspetto simili, salvo il fatto che a 380x presenta una condensazione centrale abbastanza evidente ed è un poco più diffusa.
IC 3024	gx	12h10m12s	+12°19.5'		Vir	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 495x.
IC 3029	gx	12h10m42s	+13°19.8'		Com	24"	buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
IC 3032	gx	12h11m08s	+14°16.5'		Com	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.

IC 3033	gx	12h11m10s	+13°35.2'		Com	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; meglio scalare a 340x; la visione è però disturbata dalla SAO 99977 di 9ª grandezza situata un paio di primi a SSE e che comunque non si riesce a tenere fuori campo nemmeno a 450x.
IC 3036	gx	12h12m15s	+12°29.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva chiazza molto diffusa e di forma indistinta; appare solo a tratti in visione distolta a 400x.
IC 3044	gx	12h12m48s	+13°58.6'		Com	24"	buona / ottimo	molto debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW con dimensioni 80"×30"; meglio contrastata a 280x.
IC 3049	gx	12h13m33s	+14°29.0'		Com	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni di 30"×20"; c'è una stellina subito a NW e una molto tenue e appena sfuocata a ridosso SE, ma quest'ultima è in realtà la **MAC 1213+1428** — 495x.
IC 3053	gx	12h13m52s	+14°13.4'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso S; una stellina appena percettibile si trova quasi a ridosso E — 450x.
IC 3059	gx	12h14m56s	+13°27.5'		Com	24"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE; meglio evidente a 340x.
IC 3060	gx	12h15m02s	+12°32.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e con tenue condensazione centrale — 450x.
IC 3061	gx	12h15m04s	+14°01.7'	q 193	Com	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce, orientata da NW a SE ed estesa 1.5', con una zona centrale diffusa appena percettibile; c'è una coppia abbastanza serrata di stelline un paio di primi a E; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3062	gx	12h15m05s	+13°35.6'		Com	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
IC 3063	gx	12h15m07s	+12°01.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina quasi a ridosso N — 450x.
IC 3065	gx	12h15m13s	+14°26.0'		Com	24"	m. buona / m. buono	allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con bulge evidente; c'è una stellina a 1.5' SSE — 400x.
IC 3066	gx	12h15m16s	+13°28.5'		Com	24"	buona / ottimo	appare in visione distolta come una debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa ~ 1' — 450x.
IC 3073	gx	12h15m36s	+13°37.2'		Com	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di forma indistinta, in parte anche disturbata da una stellina abbastanza brillante situata a 1' S; estesa forse una 30-ina di secondi; meglio comunque scalare a 340x.
IC 3074	gx	12h15m46s	+10°41.9'		Vir	24"	buona / ottimo	lama di luce molto debole, estesa 1.5', orientata da N a S e di luminosità uniforme — 450x.
IC 3075	gx	12h15m55s	+23°35.7'		Com	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge abbastanza contrastato di aspetto quasi stellare; più interessante a 450x.
IC 3077	gx	12h15m56s	+14°26.1'		Com	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, solo in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo 50"×30", ma occorre scalare a 280x.
IC 3078	gx	12h16m00s	+12°41.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW e un'altra di luminosità simile a 1' scarso N — 450x.
IC 3080	gx	12h16m03s	+14°11.3'		Com	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale osservabile a 400x.
IC 3081	gx	12h16m09s	+12°41.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
IC 3091	gx	12h16m29s	+14°00.7'		Com	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare marcato; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE (è la mediana di 3 stelline quasi allineate da N a S) — 400x.
IC 3093	gx	12h16m42s	+14°16.6'		Com	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 400x.
IC 3094	gx	12h16m56s	+13°37.5'		Com	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso N (la quale fa parte di un piccolo arco di 4 componenti) — 450x.
IC 3096	gx	12h16m53s	+14°30.9'		Com	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x.
IC 3099	gx	12h17m09s	+12°27.2'		Vir	24"	buona / ottimo	fa parte, assieme a IC 3100 e 3105, di un terzetto di galassie molto deboli — lama di luce di aspetto uniforme, orientata da N a S ed estesa oltre 1'; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
IC 3100	gx	12h17m05s	+12°17.4'		Vir	24"	buona / ottimo	fa parte, assieme a IC 3099 e 3105, di un terzetto di galassie molto deboli — debolissima e di luminosità uniforme, stemperata sul fondo cielo, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30"; meglio scalare a 340x.
IC 3105	gx	12h17m34s	+12°23.3'		Vir	24"	buona / ottimo	fa parte, assieme a IC 3099 e 3100, di un terzetto di galassie molto deboli — molto debole e molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3107	gx	12h17m47s	+10°50.7'		Vir	24"	buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno; allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 400x.
IC 3108	gx	12h17m43s	+13°22.7'		Com	24"	buona / ottimo	debolissimo oggetto molto piccolo e diffuso, poco allungato da E a W con dimensioni 20"×15"; ho dovuto scalare a 340x perché il campo è virtualmente depleto.
IC 3109	gx	12h17m44s	+13°10.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina un paio di primi a NE — 450x.
IC 3112	gx	12h17m48s	+26°01.8'		Com	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; ci sono due deboli stelline a 1' N ed E — 450x.
IC 3115	gx	12h18m00s	+06°39.2'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	è un debolissimo lucore di luminosità uniforme, osservabile solo a momenti in visione distolta a 188x, ma è di forma indistinta e solo approssim. circolare con Ø di ~ 1.5'.
IC 3118	gx	12h18m11s	+09°30.0'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso W; meglio contrastata scalando a 340x; forma un piccolo triangolo isoscele allungato con 2 stelline brillanti che punta verso S.
IC 3122	gx	12h18m22s	+25°13.0'		Com	16"	buona / buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno; in visione distolta a 270x appare chiaramente allungata da NW a SW con dimensioni 60"×40".
IC 3131	gx	12h18m51s	+07°51.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W. Alla stessa distanza verso E appare a tratti qualcosa di elusivo e molto piccolo, ma forse trattasi di una stellina — 400x.
IC 3134	gx	12h18m56s	+08°57.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 400x.
IC 3136	gx	12h18m57s	+06°11.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
IC 3142	gx	12h19m05s	+13°58.9'		Com	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi. Forma una coppia ravvicinata con la debolissima **UGC 7355** situata subito a W e che in visione distolta appare di dimensioni simili — 495x.
IC 3149	gx	12h19m24s	+12°18.1'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione stellare molto tenue — 495x.
IC 3151	gx	12h19m33s	+09°24.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	fa parte di un terzetto assieme a IC 3167 e IC 3170 — relativamente facile, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20", con piccolo bulge evidente e poco contrastato; si trova all'interno di un asterismo di 5 stelline foggiato a W; la galassia non sembra disturbata dalla SAO 119327 di 9ª grandezza situata 4' scarsi a NW — 450x.
IC 3153	gx	12h19m37s	+05°23.9'		Vir	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, con condensazione centrale visibile a tratti, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 3155	gx	12h19m55s	+06°00.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; disturbata dalla SAO 119333 di magnitudo 7.5 situata a meno di 2' verso N; si trova 1' a SW di NGC 4269 osservata col 16" in altra data — 400x.
IC 3156	gx	12h19m44s	+09°09.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una debole stellina a 1.5' NW; meglio comunque scalare a 340x, perché la zona è priva di stelline abbastanza brillanti di riferimento.
IC 3157	gx	12h19m48s	+12°25.3'		Vir	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 40"×20" e con debole condensazione centrale; c'è una stellina a 1' scarso SW — 495x.
IC 3165	gx	12h20m05s	+27°58.5'		Com	16"	buona / buono	è una chiazza diffusa, appena più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; meglio scalare a 188x.
IC 3167	gx	12h20m19s	+09°32.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	la meno evidente del terzetto di IC 3151 — diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3168	gx	12h20m18s	+27°55.2'		Com	16"	buona / buono	debolissima, piccola, rotonda con Ø di ~ 30"; appare solo a tratti tra 2 stelline distanti un paio di primi in direzione N-S: rispetto a queste è poco spostata verso E — 380x.
IC 3170	gx	12h20m27s	+09°25.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
IC 3171	gx	12h20m24s	+25°33.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 40" e appena più brillante all'interno — 380x.
IC 3193	gx	12h21m01s	+27°53.9'		Com	16"	buona / buono	è un debolissimo baffo di dimensioni 40"×20" di luminosità pressoché uniforme che sembra dipartirsi verso SE da una debole stellina; tuttavia, osservando attentamente a 270x la stellina non è sull'asse della gx, ma a ridosso verso N.
IC 3199	gx	12h21m46s	+10°35.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
IC 3203	gx	12h21m46s	+25°53.0'		Com	24"	ottima / m. buono	debole lama di luce abbastanza ben definita, orientata da NW a SE ed estesa 1'; presenta un bulge diffuso appena percettibile — 450x.
IC 3211	gx	12h22m07s	+08°59.4'		Vir	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
IC 3215	gx	12h22m10s	+26°03.1'		Com	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20"; meglio evidente e contrastata scalando a 450x.
IC 3225	gx	12h22m39s	+06°40.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30" — 400x.
IC 3229	gx	12h22m53s	+06°40.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	più piccola e più debole di IC 3225, dalla quale dista 3.5' a E, diffusa, di luminosità uniforme, orientata nello stesso modo, ma con dimensioni 45"×15" — 400x.
IC 3238	gx	12h23m06s	+14°27.5'		Com	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
IC 3244	gx	12h23m12s	+14°23.3'		Com	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' E e una più debole a 1.5' NNW — 450x.
IC 3255	gx	12h23m35s	+09°38.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale evidente; c'è una stellina subito a E — 450x.
IC 3258	gx	12h23m44s	+12°28.8'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotondeggiante con Ø di ~ 1', ma di aspetto piuttosto confuso — 188x.
IC 3259	gx	12h23m49s	+07°11.2'		Vir	16"	discreta / scarso	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×30"; c'è una stellina debole a un paio di primi verso SE — 188x.
IC 3262	gx	12h23m48s	+27°23.6'		Com	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
IC 3267	gx	12h24m06s	+07°02.5'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	debolissima, forse rotonda con Ø inferiore a 1', visibile abbastanza facilmente solo in visione distolta a 188x.
IC 3268	gx	12h24m08s	+06°36.3'		Vir	24"	buona / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a ridosso verso SE: questa fa parte di un triangolo isoscele formato da 3 componenti della stessa luminosità e il cui vertice più acuto punta a WNW; c'è altresì una debole stellina subito a S della gx — 570x.
IC 3271	gx	12h24m14s	+07°57.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; situata tra 2 stelle orientate da NNE a SSW: è poco spostata verso quella a SSW che è pure la più brillante — 400x.
IC 3274	gx	12h24m15s	+09°16.0'		Vir	16"	ottima / ottimo	facile, molto piccola, rotonda, di 20" di Ø, poco diffusa e con nucleo stellare (situata a poco più di 2' a SW di NGC 4360) — 380x.
IC 3280	gx	12h24m27s	+13°14.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
IC 3303	gx	12h25m15s	+12°42.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (era elusivamente visibile nel 10" a 178x) — 450x.
IC 3305	gx	12h25m15s	+11°51.0'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso S (che è la più meridionale di una losanga di 4 componenti brillanti: le 2 centrali sono la SAO 100089 di 10ª grandezza e la SAO 100090 di 9ª); in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 495x.
IC 3311	gx	12h25m33s	+12°15.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce appena più brillante all'interno, estesa 1.5' in direzione NW-SE — 450x.
IC 3313	gx	12h25m36s	+15°49.8'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x, anche se così diventa quasi impossibile tenere fuori campo la SAO 100095, arancione di 6ª grandezza; forma una coppia ravvicinata con la debolissima MCG+3-32-32 situata subito a N.
IC 3322	gx	12h25m54s	+07°33.3'	q 193	Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, orientata da NNW a SSE, estesa almeno 1.5' e spessa < 30", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; debolmente screziata a 450x, ma meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3328	gx	12h25m58s	+10°03.2'		Vir	16"	ottima / ottimo	debole e piccolo oggetto rotondo, diffuso e a tratti condensato, con Ø di 25"-30"; meglio osservabile a 270x (situata 9' a ENE di NGC 4380).
IC 3330	gx	12h25m56s	+30°50.6'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina brillante un paio di primi a W e una appena percettibile a poco più di 1' verso E — 380x.
IC 3331	gx	12h26m05s	+11°48.8'		Vir	28"	ottima / m. buono	debole e diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina a poco più di 1' SW — 495x.
IC 3349	gx	12h26m47s	+12°27.3'		Vir	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto, forse rotondo ed esteso max 30" che appare solo a tratti in visione distolta a 380x a ~ 1' SE di una stellina.
IC 3358	gx	12h26m54s	+11°39.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" — 400x.
IC 3365	gx	12h27m12s	+15°53.9'		Com	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30"; c'è una coppia di stelline appena percettibili a ridosso W; 2 stelline abbastanza brillanti si trovano rispettivamente 2' a S e 2' a W — 495x.
IC 3367	gx	12h27m10s	+26°57.5'		Com	16"	buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 30" e di luminosità uniforme (bisogna cercare di tenere fuori campo la 16 Comae di 5ª grandezza) — 380x.
IC 3369	gx	12h27m17s	+16°01.5'		Com	28"	m. buona / ottimo	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 495x.
IC 3376	gx	12h27m50s	+26°59.7'		Com	16"	buona / buono	presenta un piccolo nucleo abbastanza marcato di aspetto quasi stellare circonfuso da un tenue alone molto stemperato sul fondo cielo appena allungato da NW a SE con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina quasi a ridosso SSW — 270x.
IC 3381	gx	12h28m15s	+11°47.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, più che altro molto disturbata da 2 stelle brillanti tra cui la SAO 100114 di 8ª grandezza situata un paio di primi a N; è allungata da E a W con dimensioni grosso modo 50"×30" — 570x, anche se l'allungamento si apprezza meglio scalando a 400x.
IC 3383	gx	12h28m12s	+10°17.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, solo a tratti appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3388	gx	12h28m28s	+12°49.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 3391	gx	12h28m27s	+18°24.9'		Com	16"	buona / buono	relativamente facile da vedere, di luminosità uniforme e di aspetto un po' confuso, comunque approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SW — 270x.
IC 3392	gx	12h28m43s	+15°00.0'		Com	16"	buona / ottimo	è un ovale di 90"×45", orientato da NW a SE, poco diffuso e di luminosità uniforme, salvo un tenue nucleo stellare poco evidente; c'è una coppia di stelline a SW distanti un paio di primi e orientate quasi nello stesso modo — 270x.
IC 3393	gx	12h28m42s	+12°55.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
IC 3407	gx	12h29m04s	+27°46.7'		Com	16"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40"; appare più contrastata a 270x.
IC 3412	gx	12h29m23s	+09°59.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; poco meglio definita scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
IC 3413	gx	12h29m23s	+11°26.0'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×30"; disturbata dalla SAO 100126 di 8.5m situata a soli 4' NE; la gx è comunque meglio definita scalando a 188x.
IC 3414	gx	12h29m29s	+06°46.3'		Vir	16"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×40"; c'è una stellina a un paio di primi SSW (ossia sul prolungamento dell'asse della gx) — 270x.
IC 3416	gx	12h29m35s	+10°47.6'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissima e di aspetto confuso, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 3425	gx	12h29m56s	+10°36.9'		Vir	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge poco più brillante — 450x.
IC 3430	gx	12h30m17s	+09°05.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 50"×25" — 450x.
IC 3443	gx	12h31m16s	+12°19.9'	q 193	Vir	16"	discreta / scarso	elusiva, appare solo ogni tanto e a fatica a 188x alternando gli occhi; è molto piccola, non più estesa di 20" e solo a momenti sembra di scorgerla distintamente. È una delle satelliti di M87 e situata 7' SE di quest'ultima.
IC 3457	gx	12h31m51s	+12°39.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; appare meglio contrastata scalando a 280x.
IC 3459	gx	12h31m56s	+12°10.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE; meglio contrastata scalando a 340x anche se così diventa più difficile tenere fuori campo la SAO 100140 di 8ª grandezza situata 5' a SW).
IC 3461	gx	12h32m03s	+11°53.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 3466	gx	12h32m06s	+11°49.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa situata a 1' SW di una stellina abbastanza brillante; in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di 20" o poco più — 450x.
IC 3467	gx	12h32m24s	+11°47.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi e orientato da E a W; la visione è un po' disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a W — 450x.
IC 3468	gx	12h32m14s	+10°15.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di 45" e tenue condensazione centrale osservabile a 400x; c'è una debole stellina a 1.5' verso E e un'altra brillante poco più distante verso NNW.
IC 3470	gx	12h32m23s	+11°15.8'		Vir	24"	m. buona / buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, rotonda con Ø > 30" — 450x.
IC 3473	gx	12h32m19s	+18°14.7'		Com	16"	m. buona / ottimo	è un indistinto lucore esteso ~ 1' che s'intravede "decentemente" solo a 188x.
IC 3474	gx	12h32m36s	+02°39.6'		Vir	16"	buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa almeno 1.5' e orientata da NE a SW; solo a tratti appare un tenuissimo rigonfiamento centrale; meglio evidente e contrastata a 380x.
IC 3475	gx	12h32m41s	+12°46.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza grosso modo rotonda con Ø > 1'; salta fuori in visione distolta a 200x in mezzo a 2 stelline orientate da NW a SE: quella di NW è appena percettibile.
IC 3476	gx	12h32m42s	+14°03.0'	q 194	Com	16"	m. buona / buono	debole, approssim. circolare, con Ø di ~ 2', molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 188x.
IC 3478	gx	12h32m44s	+14°11.8'		Com	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile a 1.5 ESE — 400x.
IC 3481	gx	12h32m52s	+11°24.2'	q 194	Vir	16"	ottima / ottimo	rotonda, gradatamente più brillante verso l'interno, diffusa, con Ø < 1' e nucleo di aspetto stellare — 380x.
IC 3481A	gx	12h32m57s	+11°23.4'	q 194	Vir	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto diffuso e molto piccolo, con Ø max di 20"; salta fuori con relativa facilità in visione distolta a 380x a poco più di 1' SE di IC 3481.
IC 3483	gx	12h33m10s	+11°20.8'	q 194	Vir	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza di forma indistinta, molto disturbata dalla luce di una stellina brillante situata a ridosso di NNE; appare grosso modo rotonda, con Ø di 30"-35" e con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti a 380x.
IC 3484	gx	12h33m05s	+17°24.2'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NNE — 450x.
IC 3487	gx	12h33m13s	+09°23.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" (grosso modo estesa come la distanza della coppia di stelline a E) — 450x.
IC 3489	gx	12h33m14s	+12°14.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata in una piccola plaga depleta, ma è comunque ben evidente, per cui non occorre scalare gli ingrandimenti — 450x.
IC 3492	gx	12h33m20s	+12°51.2'	q 194	Vir	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MCG+2-32-132 situata a poco più di 1' verso W — debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 450x.
IC 3499	gx	12h33m45s	+10°59.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta con bulge diffuso molto tenue e nucleo stellare, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 400x.
IC 3501	gx	12h33m52s	+13°19.3'		Com	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 3505	gx	12h34m10s	+15°58.1'		Com	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, a tratti leggermente screziata e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" — 450x.
IC 3508	gx	12h34m07s	+26°40.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto piccola, rotonda con Ø di 20", relativamente compatta e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
IC 3509	gx	12h34m12s	+12°02.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è un debole ovale di 45"×30", orientato da E a W, diffuso e appena più brillante all'interno — 450x.
IC 3510	gx	12h34m15s	+11°04.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, situata a ridosso W di una stellina; è grosso modo rotonda con Ø di 30"-35" — 400x.
IC 3517	gx	12h34m31s	+09°09.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×30", ma occorre scalare a 340x; c'è una debole stellina a 1' NE.
IC 3518	gx	12h34m31s	+09°37.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30"; situata sul lato orientale di un triangolo isoscele di stelle brillante il cui vertice più acuto punta a S — 450x.
IC 3521	gx	12h34m40s	+07°09.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; a tratti leggermente screziata a 400x; situata al vertice NE di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline della stessa luminosità.
IC 3522	gx	12h34m46s	+15°13.2'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 60"×30", ma è meglio evidente scalando a 340x.
IC 3528	gx	12h34m56s	+15°33.9'		Com	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 20" o poco più — 450x.
IC 3530	gx	12h34m49s	+17°48.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 1'; è meglio contrastata a 188x.
IC 3540	gx	12h35m27s	+12°45.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
IC 3546	gx	12h35m42s	+26°13.3'		Com	16"	discreta / scarso	molto debole, estesa almeno 45", molto diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ~1.5' SW (situata 17' a NW di NGC 4565) — 270x.
IC 3556	gx	12h36m03s	+26°59.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	è una piccola galassia elusiva che appare solo a momenti in visione distolta a 380x; assieme a IC 3559 fa parte del gruppo di NGC 4556 (q 149, vedi).
IC 3557	gx	12h36m08s	+16°38.5'		Com	24"	ottima / m. buono	debole chiazza diffusa e rotondeggiante con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 450x.
IC 3559	gx	12h35m58s	+26°58.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	è un oggetto rotondo molto debole con Ø di ~ 30", osservabile tuttavia abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; a tratti pare di vedere un elusiva condensazione centrale.
IC 3560	gx	12h36m04s	+27°04.7'		Com	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta; salta fuori quando si osserva un gruppetto serratissimo di 5 stelline situato 3' a SW e che a prima vista, a 270x, sembra un piccolo oggetto nebuloso — 380x.
IC 3561	gx	12h36m05s	+26°54.0'		Com	16"	discreta / scarso	fa parte, assieme a NGC 4558, 4559 e 4563 di un piccolo gruppo — debole, molto diffusa, di luminosità uniforme ed estesa una 30-ina di secondi (situata 4' a E di NGC 4556) — 270x.
IC 3567	gx	12h36m23s	+13°36.1'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, a tratti in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; è situata tra due stelline molto deboli: una a NW e l'altra appena percettibile a SE — 450x.
IC 3568	np	12h33m07s	+82°33.8'	q 9	Cam	24"	m. buona / m. buono	molto brillante, rotonda, compatta con Ø < 30" e di un colore azzurro pallido; c'è una stellina al bordo W; osservando in visione distolta a 450x si nota un tenue alone molto piccolo e lievemente asimmetrico verso SW; ma non dovrebbe trattarsi della fantomatica gx UGC 7731 che è di fatto inesistente (era già facilmente osservabile nel 10" a 240x).
IC 3576	gx	12h36m37s	+06°37.3'	q 194	Vir	16"	buona / mediocre	debolissimo lucore di forma indistinta, molto diffuso ed esteso per oltre 1' — 270x.
IC 3578	gx	12h36m39s	+11°06.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3582	gx	12h36m30s	+26°12.0'		Com	16"	discreta / scarso	piccola, compatta, relativamente brillante con una marcata condensazione centrale di aspetto stellare; è poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — situata 13' a N di NGC 4565 — 270x.
IC 3583	gx	12h36m44s	+13°15.5'	q 194	Vir	16"	buona / discreto	è abbastanza facile a 208x, di luminosità uniforme e di forma alquanto irregolare, grosso modo orientata da N a S con dimensioni di 60"×30"; ci sono 2 stelline a ridosso: una a SE e l'altra più brillante a NE (e probabilmente sono queste stelline che la rendevano alquanto elusiva nel 10" a 118x); si trova nello stesso campo di M90, a 6' verso NNW.
IC 3585	gx	12h36m40s	+26°49.8'		Com	16"	discreta / scarso	chiazza di luce molto debole e diffusa, grosso modo circolare con Ø di 45" e basso gradiente di luce; appare abbastanza facilmente subito a N di una stellina brillante — 270x.
IC 3586	gx	12h36m55s	+12°31.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole chiazza circolare molto diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso — 450x.
IC 3591	gx	12h37m02s	+06°55.5'		Vir	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina debole a ridosso SW; un'altra stellina più brillante si trova a 45" NW — 450x.
IC 3592	gx	12h36m53s	+27°51.7'	q 149	Com	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
IC 3593	gx	12h36m54s	+27°44.9'		Com	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 3598	gx	12h37m21s	+28°12.5'		Com	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", con piccolo nucleo di aspetto quasi stellare visibile a 380x.
IC 3602	gx	12h38m07s	+10°05.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile subito a E; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3608	gx	12h38m37s	+10°28.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
IC 3611	gx	12h39m04s	+13°21.8'		Com	24"	m. buona / ottimo	facile, diffusa, con gradiente di luce molto basso, orientata da NW a SE con dimensioni 80"×30" — 400x.
IC 3612	gx	12h39m05s	+14°43.9'		Com	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3617	gx	12h39m25s	+07°57.9'	q 194	Vir	16"	buona / mediocre	debole, di aspetto un po' irregolare, orientata all'incirca da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 270x.
IC 3618	gx	12h39m17s	+26°40.6'		Com	24"	ottima / ottimo	piccola, piuttosto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 3620	gx	12h39m18s	+27°54.5'		Com	24"	ottima / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
IC 3623	gx	12h39m28s	+27°06.1'		Com	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 30" e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
IC 3629	gx	12h39m47s	+13°32.0'		Com	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
IC 3629A	gx	12h39m49s	+13°32.9'		Com	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente a 1' NE di IC 3629, ma anche a 450x è solo una stellina sfuocata: non dovrebbe quindi essere più estesa di 10" — 450x.
IC 3631	gx	12h39m48s	+12°58.4'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente brillante, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare — 450x.
IC 3633	gx	12h40m11s	+09°53.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; poco meglio definita scalando a 340x.
IC 3635	gx	12h40m13s	+12°52.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (situata 8.5' a SE di IC 3631) — 450x.
IC 3637	gx	12h40m19s	+14°42.9'		Com	24"	ottima / m. buono	estesa chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina subito a W; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3638	gx	12h40m17s	+10°31.1'		Vir	24"	m. buona / buono	diffusa, con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
IC 3644	gx	12h40m36s	+26°30.3'		Com	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10", a tratti appena più brillante all'interno — 450x.
IC 3646	gx	12h40m39s	+26°31.5'		Com	24"	ottima / ottimo	più evidente di IC 3644, dalla quale dista poco più di 1' verso N, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina a 1' N; sono entrambe situate in una piccola zona depleta, per cui è meglio scalare a 340x.
IC 3647	gx	12h40m53s	+10°28.5'		Vir	24"	m. buona / buono	è una debolissima chiazza di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni approssim. 60"×30"; è stranamente meglio osservabile a 450x (forse a causa della SAO 100207 di 6ª grandezza, situata poco più di 10' a ESE e che a ingrandimenti inferiori tenta prepotentemente di entrare nel campo...).
IC 3651	gx	12h40m53s	+26°43.7'		Com	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
IC 3652	gx	12h40m59s	+11°11.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a NE orientate da N a S — 450x.
IC 3653	gx	12h41m16s	+11°23.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta e brillante, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 450x.
IC 3658	gx	12h41m21s	+14°42.1'		Com	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20", ma è meglio scalare a 340x.
IC 3662	gx	12h41m36s	+23°25.5'		Com	24"	ottima / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a 1' scarso verso E — 450x.
IC 3665	gx	12h41m46s	+11°29.3'	q 194	Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissimo ovale di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso di NE; meglio evidente scalando a 340x.
IC 3671	gx	12h41m51s	+23°30.6'		Com	24"	ottima / m. buono	appena più debole di IC 3662, dalla quale dista 6' a NE, di Ø analogo e di aspetto più uniforme — 450x.
IC 3672	gx	12h42m09s	+11°45.2'		Vir	24"	m. buona / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella brillante a poco più di 1' SSW — 450x.
IC 3686	gx	12h42m36s	+10°33.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
IC 3687	gx	12h42m15s	+38°30.2'	q 108	CVn	16"	m. buona / scarso	è un debolissimo lucore molto diffuso e stemperato osservabile solo in visione distolta ed esteso ~ 1.5'; sembra, a tratti, di vedere qualcosa di puntiforme, ma non si riesce a capire bene se a E o SE; meglio visibile scalando a 188x.
IC 3690	gx	12h42m49s	+10°21.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge poco contrastato — 450x.
IC 3692	gx	12h42m54s	+20°59.4'		Com	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di ~ 45" e appena più brillante all'interno — 380x.
IC 3694	gx	12h43m07s	+11°12.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia con IC 3698 situata 2.5' a E — sono di aspetto simile, deboli diffuse e di luminosità uniforme, rotonde con Ø di una 30-ina di secondi; la 1a è poco più evidente, ma questa differenza si nota meglio scalando a 340x.
IC 3697	gx	12h42m59s	+39°50.7'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima e poco diffusa, appare in visione distolta a 270x tra 2 stelline distanti 4' scarsi; la gx salta fuori a ~ 1.5' W da quella più orientale; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
IC 3698	gx	12h43m17s	+11°12.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia con IC 3694 situata 2.5' a W — sono di aspetto simile, deboli diffuse e di luminosità uniforme, rotonde con Ø di una 30-ina di secondi; questa è poco più debole, anche se la differenza si nota meglio scalando a 340x.
IC 3704	gx	12h43m45s	+10°46.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20", poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
IC 3709	gx	12h44m04s	+09°03.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
IC 3710	gx	12h44m10s	+12°07.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto spampanata, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
IC 3713	gx	12h44m03s	+41°10.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con condensazione centrale evidente, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
IC 3714	gx	12h44m23s	+10°11.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con due stelline a SSE.
IC 3718	gx	12h44m46s	+12°21.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole ed estesa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da ENE a WSW 2'×45" — 400x.
IC 3720	gx	12h44m48s	+12°03.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza di forma indistinta che appare in visione distolta a ridosso N di una stellina; solo scalando a 210x si riesce a tratti capire che è orientata da NW a SE ed estesa per ~ 1'.
IC 3721	gx	12h44m53s	+18°45.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 270x.
IC 3723	gx	12h44m31s	+40°44.2'		CVn	28"	mediocre / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e condensata, estesa non più di 10"-12"; è situata a ridosso E di una debole stellina — 388x.
IC 3724	gx	12h44m54s	+10°17.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N — 450x.
IC 3726	gx	12h44m43s	+40°40.7'		CVn	28"	mediocre / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×15" — 388x.
IC 3727	gx	12h45m06s	+10°54.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso di NW — 450x.
IC 3730	gx	12h45m07s	+21°10.2'		Com	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 3735	gx	12h45m21s	+13°41.5'		Com	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
IC 3742	gx	12h45m32s	+13°20.0'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE e un'altra più evidente a un paio di primi verso W — 400x.
IC 3745	gx	12h45m45s	+19°10.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme, di 35"-40" di Ø; è visibile in visione distolta a 380x, anche se appare meglio contrastata a 270x.
IC 3754	gx	12h46m16s	+08°20.9'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente brillante, ma con gradiente di luce molto basso, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una doppia molto stretta a 1' verso E che anche a 450x dà l'impressione di un piccolo oggetto nebuloso.
IC 3758	gx	12h46m00s	+40°46.5'		CVn	28"	mediocre / ottimo	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di 20"-25" e con tenue condensazione centrale — 388x.
IC 3773	gx	12h47m15s	+10°12.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da N a S con dimensioni 70"×30", diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 400x.
IC 3778	gx	12h47m02s	+40°35.8'		CVn	28"	m. buona / scarso	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
IC 3783	gx	12h47m28s	+40°34.0'		CVn	28"	m. buona / scarso	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 495x.
IC 3806	gx	12h48m55s	+14°54.5'		Com	24"	m. buona / buono	è un bel fuso di luminosità pressoché uniforme e di aspetto regolare, orientato da N a S con dimensioni 70"×20" — 450x.
IC 3826	gx	12h50m40s	−09°01.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è un bel fuso abbastanza brillante, ma con basso gradiente di luce, orientato da N a S con dimensioni 90"×30" — 450x.

IC 3827	gx	12h50m52s	−14°29.5'		Crv	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo di luminosità uniforme e con Ø di ~ 40"; c'è una stellina a ridosso verso S — 270x.
IC 3831	gx	12h51m18s	−14°34.4'		Crv	16"	ottima / ottimo	presenta bulge evidente, nucleo stellare circonfuso da un disco di dimensioni 60"×45" e orientato da NW a SE — 270x.
IC 3850	gx	12h52m39s	+40°06.2'		CVn	16"	m. buona / buono	oggetto rotondo con Ø di ~ 40" con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina brillante a 1' verso W; altre 6 o 7 stelline brillanti sono presenti nel campo — 270x.
IC 3881	gx	12h54m49s	+19°10.7'	q 149	Com	16"	discreta / scarso	debole, molto allungata da NE a SW per oltre un paio di primi, vagamente screziata al centro, ma un po' confusa verso i bordi; è situata ~ 3' a SE di una stellina abbastanza brillante — 188x.
IC 3883	gx	12h55m13s	−08°07.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina subito a N-450x.
IC 3892	gx	12h55m06s	+39°13.3'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
IC 3895	gx	12h55m09s	+39°12.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	situata 1' a SSE della precedente, è debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di un 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta e sbilanciata a 1' SE — 450x.
IC 3900	gx	12h55m41s	+27°15.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 50"×30" e con piccolo bulge di aspetto quasi stellare — 380x.
IC 3908	gx	12h56m40s	−07°33.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	è una bella gx di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' SW; è comunque più interessante scalando a 340x.
IC 3946	gx	12h58m49s	+27°48.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 50"×25" con condensazione centrale evidente — 380x.
IC 3947	gx	12h58m52s	+27°47.1'		Com	16"	m. buona / ottimo	piccola, diffusa, con Ø di 20" e con condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
IC 3949	gx	12h58m56s	+27°50.0'		Com	16"	ottima / ottimo	fa parte, assieme a molte delle numerazioni seguenti, del **Grande Ammasso della Coma** — nonostante sia molto debole si capisce abbastanza facilmente che è allungata ~ da E a W per una 30-ina di secondi — 380x.
IC 3955	gx	12h59m06s	+27°59.8'		Com	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, forse poco allungata da N a di dimensioni 30"×20" — 380x.
IC 3957	gx	12h59m07s	+27°43.0'		Com	16"	ottima / ottimo	costituisce un terzetto di galassiette, assieme a IC 3959 e IC 3963, abbastanza al limite della visibilità: la 1ª e la 3ª sono più diffuse; IC 3963 appare addirittura allungata da E a W; la 2ª è invece compatta, rotonda con Ø di 15-20 secondi — 380x.
IC 3959	gx	12h59m08s	+27°47.0'		Com	16"	ottima / ottimo	v. **IC 3957**
IC 3960	gx	12h59m10s	+27°51.3'		Com	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
IC 3963	gx	12h59m13s	+27°46.5'		Com	16"	ottima / ottimo	v. **IC 3957**
IC 3973	gx	12h59m31s	+27°53.0'		Com	16"	ottima / ottimo	forma con IC 3976 una coppia di gx molto deboli — soprattutto la 2ª — e molto piccole, con dimensioni non superiori a 15" o 20"; sono separate da un paio di primi in direzione N-S — 380x.
IC 3975	gx	12h59m16s	+38°53.0'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debole, piccola, con condensazione centrale di aspetto quasi stellare, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" (situata 6.5' a NW della coppia IC 4003-4) — 380x.
IC 3976	gx	12h59m29s	+27°51.0'		Com	16"	ottima / ottimo	v. **IC 3973**
IC 3990	gx	12h59m39s	+28°53.7'		Com	16"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata assieme a IC 3991 — allungata da NNE a SSW, di dimensioni 40"×20" e con piccolo nucleo evidente di aspetto quasi stellare — 380x.
IC 3991	gx	12h59m40s	+28°55.6'		Com	16"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata assieme alla precedente dalla quale dista un paio di primi a N — molto debole e diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con tenue nucleo stellare visibile a tratti a 380x; è situata a ridosso S di una stellina abbastanza brillante.
IC 4003	gx	12h59m41s	+38°48.7'		CVn	16"	m. buona / ottimo	assieme a IC 4004 forma una coppia di deboli galassiette diffuse distanti 45" in direzione NE-SW; la 1ª è poco più estesa, rotonda con Ø di 30" e nucleo stellare; la 2ª è pure rotonda, con nucleo stellare meno evidente e Ø di 20"-25" — 380x.
IC 4004	gx	12h59m43s	+38°48.7'		CVn	16"	m. buona / ottimo	v. **IC 4003**
IC 4021	gx	13h00m15s	+28°02.5'		Com	16"	ottima / ottimo	assieme a IC 4026 forma una coppia di deboli oggetti molto piccoli distanti ~ 1.5' in direzione E-W e con una stellina appena percettibile nel mezzo; si vedono facilmente in visione distolta; la 2ª è poco più brillante — 380x.
IC 4026	gx	13h00m22s	+28°02.8'		Com	16"	ottima / ottimo	v. **IC 4021**
IC 4028	gx	13h00m16s	+36°15.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare in visione distolta 3' SW di una stellina doppia; è estesa una 40-ina di secondi, ma è meglio scalare a 270x.
IC 4030	gx	13h00m28s	+27°57.3'		Com	16"	ottima / ottimo	con IC 4033 forma una debolissima coppia di oggetti molto piccoli visibili solo in visione distolta e distanti 1' in direzione N-S; sono più piccoli della vicina NGC 4894, situata 2.5' W (riportate sul Megastar come **PGC 44763** e **PGC 44771**) — 380x.
IC 4033	gx	13h00m28s	+27°58.3'		Com	16"	ottima / ottimo	v. **IC 4030**
IC 4040	gx	13h00m40s	+28°03.4'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma a tratti appare allungata da NW a SE come una sorta di minuscola lama di luce di dimensioni 30"×10" — 380x.
IC 4041	gx	13h00m41s	+27°59.8'		Com	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
IC 4042	gx	13h00m43s	+27°58.3'		Com	24"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con nucleo brillante — 450x.
IC 4045	gx	13h00m49s	+28°05.4'		Com	16"	ottima / ottimo	poco più debole e compatta di NGC 4908 situata 3' a S — rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
IC 4049	gx	13h00m43s	+36°20.7'		CVn	16"	m. buona / ottimo	piccolo e debole oggetto rotondo, relativamente compatto, con Ø di una 30-ina di secondi e una nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso NW — 380x.
IC 4051	gx	13h00m54s	+28°00.5'	q 109	Com	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
IC 4062	gx	13h00m59s	+39°51.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	è un elusiva macchiolina molto piccola, forse rotonda che salta fuori solo a tratti in visione distolta a 380x (situata a 2' NW di IC 4064).
IC 4064	gx	13h01m07s	+39°50.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	è la più brillante di un piccolo gruppo di galassie molto difficili — rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare; si trova al vertice rettangolo di un piccolo triangolo formato con 2 stelline brillanti un paio di primi in direzione NE-SW: quella a NE è la più luminosa — 380x.
IC 4065	gx	13h01m11s	+39°44.7'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta e molto piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme (situata 6' a S di IC 4064) — 380x.
IC 4067	gx	13h01m20s	+39°53.9'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e condensata, estesa non più di 15" o 20" (situata 4.5' a NE di IC 4064) — 380x.
IC 4071	gx	13h02m04s	−07°36.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N — 450x.
IC 4073	gx	13h01m26s	+39°54.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a ~ 1' a NE di IC 4067 quando si fissa quest'ultima — 380x.
IC 4088	gx	13h01m43s	+29°02.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	è più evidente di IC 482, molto allungata da E a W, con dimensioni 60"×20 e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
IC 4100	gx	13h02m05s	+40°24.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una debole stellina a un paio di primi SSE — 270x.
IC 4106	gx	13h02m38s	+28°06.8'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con bassissimo contrasto, di luminosità pressoché uniforme, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (situata 4.5' a NNW di NGC 4929) — 380x.
IC 4111	gx	13h02m57s	+28°04.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, estesa 20"-25"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 3' NE di NGC 4929 — 380x.
IC 4133	gx	13h03m51s	+27°59.3'	q 149	Com	16"	m. buona / ottimo	è di aspetto e dimensioni simili a NGC 4943, dalla quale dista 6' a S, solo appena più diffusa — 380x.
IC 4134	gx	13h04m14s	−11°30.8'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di NE (situata 4' a E della coppia NGC 4933A-B) — 450x.
IC 4165	gx	13h04m57s	+39°55.5'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
IC 4166	gx	13h05m19s	+31°26.6'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", con tenue e piccola condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina praticamente a ridosso verso SW — 380x.
IC 4171	gx	13h05m18s	+36°06.1'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x, anche perché è situata in una piccola zona di cielo depleta.
IC 4178	gx	13h05m42s	+36°01.0'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; meglio definita scalando a 340x.
IC 4180	gx	13h06m56s	−23°55.0'		Hya	16"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da NNW a SSE con dimensioni 45"×30"; presenta un piccolo nucleo stellare visibile a tratti (non è riportata sull'Uranometria: situata 10' a NW di NGC 4970) — 270x.
IC 4182	gx	03h05m49s	+37°36.3'	q 109	CVn	16"	m. buona / scarso	è un debole lucore molto stemperato sul fondo cielo, grosso modo circolare con Ø di ~ 4' e di luminosità pressoché uniforme, delimitata a S da una stella brillante e da una più debole a E; la gx nell'insieme s'individua meglio a 100x, ma a 188x appaiono, anche se a momenti e compatibilmente col seeing scarso, alcune discrepanze di luce all'interno.
IC 4187	gx	13h06m00s	+36°17.9'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo oggetto rotondo, poco diffuso, piccolo, con Ø max di 30", situato 1' scarso a N di una coppia serrata di stelline — 380x.
IC 4189	gx	13h06m04s	+35°58.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	bolla circolare ben definita, con Ø di 45" e di luminosità pressoché uniforme; è più interessante scalando a 340x.
IC 4201	gx	13h07m51s	+35°50.1'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è più evidente di MCG+6-29-39, dalla quale dista 7' a NE, di 30" di Ø, diffusa e con condensazione centrale appena accennata — 380x.
IC 4209	gx	13h10m22s	−07°10.3'		Vir	24"	m. buona / discreto	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; ci sono 3 stelline luminose quasi equidistanti a E, NE e NW; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 4210	gx	13h10m48s	+29°42.6'		Com	16"	buona / ottimo	è la più debole di un terzetto di cui fanno parte NGC 5004 ed NGC 5004A; in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole a una 40-ina di secondi verso S — 380x.
IC 4212	gx	13h12m03s	−06°59.5'		Vir	24"	m. buona / discreto	debolissimo lucore circolare, esteso ~ 1' e assai stemperato; si "stacca" a fatica dal fondo cielo a 340x; c'è una stellina subito a E.
IC 4213	gx	13h12m11s	+35°40.3'	q 109	CVn	16"	buona / ottimo	è una debole lama di luce orientata da N a S di luminosità pressoché uniforme (solo a tratti appare poco più brillante all'interno); c'è una stellina a ~ 3' SE — 380x.
IC 4216	gx	13h17m02s	−10°46.2'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 2'×45"; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW; è comunque meglio contrastata scalando a 340x.
IC 4218	gx	13h17m03s	−02°15.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", con tenue bulge diffuso e debolmente contrastato — 450x.
IC 4220	gx	13h17m54s	−13°36.3'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
IC 4221	gx	13h18m30s	−14°36.5'		Vir	16"	ottima / ottimo	è un bell'ovale molto diffuso, di luminosità pressoché uniforme, allungato da N a S con dimensioni 80"×40" (situata 19' a NW di NGC 5073) — 270x.
IC 4223	gx	13h18m55s	+07°47.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N; un'altra stellina visibile a tratti appare a 1' scarso verso SW, ma si tratta in realtà di PGC 1330809 — 450x.
IC 4224	gx	13h19m05s	−02°30.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25"; c'è una debole stellina a 1' verso E; forma un triangolo isoscele molto schiacciato con 2 stelle brillanti che disturbano un po' l'osservazione anche a 450x.
IC 4229	gx	13h22m26s	−02°25.1'		Vir	24"	buona / m. buono	facile, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale evidente — 450x.
IC 4234	gx	13h23m00s	+27°07.0'		Com	16"	ottima / ottimo	piccola, rotonda, di una 30-ina di secondi di Ø e con tenue condensazione centrale stella osservabile senza difficoltà a 380x.
IC 4239	gx	13h24m25s	+30°57.5'		CVn	16"	buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di ~ 30" (situata 6' a ESE di NGC 5131) — 380x.
IC 4248	gx	13h26m47s	−29°52.8'		Hya	16"	buona / buono	è un debolissimo oggetto di luminosità uniforme esteso una 30-ina di secondi; appare a tratti a ~ 1' NW di una coppia di stelline — 270x.
IC 4263	gx	13h28m34s	+46°55.6'		CVn	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce molto debole, estesa per ~2' in direzione E-W e di luminosità pressoché uniforme (situata 16' a N di NGC 5173) — 270x.
IC 4278	gx	13h30m27s	+47°14.8'		CVn	28"	ottima / ottimo	piccola chiazza diffusa, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata pochi primi a E del sistema di M51) — 495x.
IC 4304	gx	13h55m58s	+33°25.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a IC 4305 e IC 4306 — relativamente facile, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30', con piccolo bulge abbastanza contrastato sul disco; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
IC 4305	gx	13h35m58s	+33°28.4'		CVn	16"	ottima / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a IC 4304 e 4306 — rotonda, diffusa, di 40" di Ø e con nucleo di aspetto stellare visibile a 380x.
IC 4306	gx	13h36m20s	+33°25.4'		CVn	16"	ottima / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a IC 4304 e 4305 — molto debole, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con tenuissimo bulge appena contrastato visibile a tratti a 380x.
IC 4329	gx	13h49m05s	−30°17.7'		Cen	16"	buona / buono	molto diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 80"×60"; presenta un piccolo bulge appena più contrastato del disco — 270x.
IC 4329A	gx	13h49m19s	−30°18.5'		Cen	16"	buona / buono	è molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con nucleo stellare marcato (situata 3' a SW di IC 4329) — 270x.
IC 4336	gx	13h50m43s	+39°42.4'		CVn	16"	buona / buono	è estesa poco meno della 5326, dalla quale dista 8' a N, ma è molto più debole e di luminosità pressoché uniforme, salvo una debolissima condensazione centrale visibile a tratti; è orientata all'incirca da N a S e di dimensioni 60"×20" — 270x.
IC 4337	gx	13h52m19s	+14°16.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
IC 4340	gx	13h53m34s	+37°23.2'		CVn	16"	buona / buono	relativamente compatta, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"-35" — 270x.
IC 4341	gx	13h53m34s	+37°31.3'		CVn	16"	buona / buono	diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso NW — 270x.
IC 4351	gx	13h57m54s	−29°18.9'	q 371	Hya	16"	ottima / m. buono	è un fuso orientato da NNE a SSW, esteso 5' o 6', poco più brillante all'interno di luce e situato tra 2 stelline orientate da E a W: quella orientale è più brillante — 270x.
IC 4356	gx	13h58m45s	+37°29.4'		CVn	24"	ottima / m. buono	facile, compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 4' a NNE della coppia NGC 5394-5) — 450x.
IC 4357	gx	14h00m44s	+31°53.7'		CVn	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di aspetto un po' irregolare a 380x, grosso modo rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5 NNW.
IC 4358	gx	14h03m34s	+10°09.0'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" (situata 4.5' a W di IC 971) — 450x.
IC 4361	gx	14h04m07s	−09°46.1'		Vir	16"	buona / buono	debolissima, appare in visione distolta a neppure 3' ESE di una stella brillante di 7ª che pertanto non si riesce a tenere fuori campo; a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 380x.
IC 4364	gx	14h04m20s	−09°59.6'		Vir	24"	buona / buono	più debole e diffusa di IC 971, osservata precedentemente e dalla quale dista 11' a NE; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
IC 4381	gx	14h10m57s	+25°29.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	è una chiazza diffusa, rotondeggiante con Ø di 45" situata a NE di un piccolo arco di 3 stelline brillanti — 380x.
IC 4382	gx	14h11m03s	+25°31.1'		Boo	16"	ottima / ottimo	salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva IC 4381, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20", con tenue e piccola condensazione centrale — 380x.
IC 4383	gx	14h12m16s	+15°52.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; appare in visione distolta quando si osserva MCG+3-36-79, situata 1' a SW, e in particolar modo la debole stellina a ridosso S — 450x.
IC 4384	gx	14h11m56s	+27°06.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	rotonda, poco diffusa, di una 30-ina di secondi di Ø e con piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
IC 4395	gx	14h14m21s	+26°51.4'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, compatta, rotonda con Ø di 30" e appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina luminosa un paio di primi verso S — 380x.
IC 4397	gx	14h17m59s	+26°24.8'		Boo	16"	m. buona / buono	molto diffusa e stemperata, di luminosità uniforme; a tratti sembra appena ovale, con dimensioni 60"×50" (situata 10' a NW di NGC 5553) — 270x.
IC 4398	gx	14h18m03s	+28°52.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, rotonda, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, con Ø di 30" — 380x.
IC 4399	gx	14h18m24s	+26°23.1'		Boo	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme ed estesa non più di una 30-ina di secondi (situata 6' a ESE di NGC 5553) — 270x.
IC 4401	gx	14h19m25s	−04°29.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge esteso, poco contrastato — 450x.
IC 4403	gx	14h18m17s	+31°39.2'		CVn	16"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
IC 4405	gx	14h19m16s	+26°17.9'		Boo	16"	buona / ottimo	debole, poco allungata da WNW a ESE, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge diffuso abbastanza contrastato sul disco; c'è una stellina a 1.5' WNW sul prolungamento dell'asse della gx — 380x.
IC 4408	gx	14h21m13s	+29°59.6'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
IC 4418	gx	14h25m27s	+25°31.6'		Boo	16"	ottima / ottimo	presenta una condensazione centrale di aspetto stellare abbastanza marcata circonfusa da una alone diffuso, rotondo con Ø di 35"-40" — 380x.
IC 4422	gx	14h25m59s	+30°28.4'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi 380x.
IC 4423	gx	14h26m18s	+26°14.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	è un debole ovale di luminosità uniforme, orientato da NE a SW con dimensioni 40"×20"; è molto disturbato dalla luce di 2 stelle brillanti: la SAO 83349 di 7.4 a 5' WNW e la SAO 83354 di 8.2 a soli 4' SE — 380x.
IC 4424	gx	14h27m32s	+04°49.3'		Vir	24"	buona / buono	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso S (situata 4' scarsi a ENE di NGC 5619) — 450x.
IC 4425	gx	14h26m44s	+27°11.4'		Boo	16"	discreta / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, rotonda, diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
IC 4426	gx	14h27m17s	+16°49.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	poco più piccola di IC 4429, osservata per prima e dalla quale dista 6.5' a SW, rotonda con Ø di < 30" e con condensazione centrale più evidente — 450x.
IC 4429	gx	14h27m37s	+16°54.0'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 4433	gx	14h27m55s	+16°12.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e con tenue condensazione stellare; forma una coppia ravvicinata con la piccola MAC 1427+1611A situata 1' scarso a SSW (v. voce corrispondente) — 450x.
IC 4436	gx	14h27m58s	+26°30.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda, diffusa, con basso gradiente di luce e Ø di 40" — 380x.
IC 4442	gx	14h28m45s	+28°57.9'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare — 380x.
IC 4447	gx	14h29m18s	+30°49.9'		Boo	16"	buona / ottimo	piccolo ovale di 40"×30" orientato da N a S con nucleo stellare; c'è una stellina a meno di 1' verso NW — 380x.
IC 4450	gx	14h32m12s	+28°33.4'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni analoghe a quelle di IC 4442 ; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N — 380x.
IC 4460	gx	14h34m36s	+30°16.7'		Boo	16"	buona / ottimo	è un debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo, di Ø 15"-20" osservabile a 380x a una 40-ina di secondi E di una debole stellina.
IC 4461	gx	14h35m02s	+26°32.6'		Boo	16"	discreta / ottimo	è una debolissima chiazza molto diffusa, estesa ~ 1' e approssim. circolare; a ridosso verso E appare un debolissimo oggetto stellare visibile a 380x: da un controllo effettuato successivamente è risultato essere la IC 4462; una stellina vera e propria si trova a una 40-ina di secondi E da quest'ultima.
IC 4462	gx	14h35m04s	+26°32.5'		Boo	16"	discreta / ottimo	v. **IC 4461**
IC 4470	gx	14h28m23s	+78°53.1'		UMi	16"	ottima / discreto	debole, compatta, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", con nucleo puntiforme; c'è una stellina a ridosso verso NE (situata 4' a NW di NGC 5712) — 188x.
IC 4473	gx	14h37m54s	+15°51.7'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, di aspetto un po' confuso, grosso modo orientata da N a S di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale appena percettibile (in realtà si tratta di una gx doppia che non sono riuscito a risolvere) — 450x.
IC 4475	gx	14h38m23s	+23°20.0'		Boo	16"	ottima / ottimo	presenta una tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare e abbastanza luminosa circonfusa da un alone diffuso, rotondo con Ø di 35"-40" — 380x.
IC 4477	gx	14h38m35s	+28°27.5'		Boo	16"	buona / ottimo	debolissima ed estesa non più di 30", forse rotonda; è situata a ~ 30" SE di una stellina — 380x.
IC 4478	gx	14h39m13s	+15°52.6'		Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
IC 4479	gx	14h38m46s	+28°30.3'		Boo	16"	buona / ottimo	debolissima e visibile con gran difficoltà; è rotonda con Ø di 45" e molto diffusa; meglio scalare a 270x, perché a 380x si stempera troppo.
IC 4483	gx	14h40m19s	+16°41.1'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×30" 400x.
IC 4494	gx	14h44m25s	+15°31.5'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima, molto piccola, ma relativamente compatta, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni di 20"-10" — 450x.
IC 4496	gx	14h43m54s	+33°24.4'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto diffusa, rotonda, con Ø di 45" e piccola condensazione centrale abbastanza evidente a 380x.
IC 4497	gx	14h44m21s	+28°33.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di 20"-25" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a < 1' verso E — 380x.
IC 4503	gx	14h46m40s	+16°08.8'		Vir	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"-35" — 570x.
IC 4505	gx	14h46m33s	+33°24.5'		Boo	16"	ottima / m. buono	relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con Ø 40" e condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
IC 4506	gx	14h46m40s	+33°24.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto piccola e rotonda, con Ø 15"-20' e di luminosità uniforme (situata 1.5' a ESE di IC 4505) — 380x.
IC 4507	gx	14h47m42s	+18°27.3'		Boo	16"	buona / discreto	debolissimo oggetto appena condensato, diffuso, poco allungato da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 270x.
IC 4508	gx	14h47m51s	+31°46.1'		Boo	16"	buona / ottimo	fa parte di un quartetto, assieme a IC 4509 e a un paio di altre galassiette — molto debole, diffusa, con nucleo stellare osservabile a 380x; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
IC 4509	gx	14h48m27s	+31°47.5'		Boo	16"	buona / ottimo	fa parte di un quartetto, assieme a IC 4508 e a un paio di altre galassiette — molto debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; meglio a 270x, perché a 380x il campo è depleto e di fatica a orientarvisi.
IC 4514	gx	14h50m55s	+27°34.7'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di 40"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; appare poco più contrastata a 270x.
IC 4516	gx	14h54m23s	+16°21.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, rotonda, di 45"-50" di Ø e con tenue condensazione centrale — 380x.
IC 4526	gx	15h02m38s	+23°21.0'		Boo	16"	buona / mediocre	debolissimo oggetto visibile a tratti a ~ 1.5' NW di NGC 5829 (q 153); è rotonda con Ø di 20" o 30"; si fatica un poco a vederla a 188x; meglio a 270x.
IC 4528	gx	15h00m33s	+49°10.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	elusiva lama di luce estesa una 40-ina di secondi e orientata grosso modo da N a S; appare in visione distolta, tutto sommato meglio a 340x; c'è una stellina molto debole a 1' verso N.
IC 4533	gx	15h04m30s	+27°47.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio visibile a 270x.
IC 4542	gx	15h22m06s	+33°08.9'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e con nucleo stellare, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso W (che è la più luminosa di un piccolo triangolo equilatero coi lati di un paio di primi) — 380x.
IC 4546	gx	15h26m58s	+28°51.1'	q 112	CrB	28"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso NE — 495x.
IC 4547	gx	15h27m15s	+28°47.3'		CrB	28"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø < 30", poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente — 495x.
IC 4553	gx	15h34m57s	+23°30.2'		Ser	16"	discreta / ottimo	rotonda, diffusa e stemperata sul fondo cielo con gradiente di luce molto basso e con Ø di 1' scarso — 270x.
IC 4556	gx	15h35m22s	+25°17.8'		Ser	16"	buona / discreto	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di 45", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo di aspetto stellare a 380x.
IC 4559	gx	15h35m53s	+25°20.5'		Ser	16"	buona / discreto	macchiolina molto debole, rotonda con Ø di 25" o 30" e appena condensata (non sono riuscito a vedere la IC 4558) — 380x.
IC 4561	gx	15h36m47s	+25°25.0'		Ser	16"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
IC 4562	gx	15h35m57s	+43°29.6'		Boo	16"	m. buona / m. buono	fa parte di un quintetto — presenta un marcato nucleo stellare circonfuso da un alone rotondo, diffuso, con Ø di 45" — 380x.
IC 4562A	gx	15h36m02s	+43°30.2'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto piccola, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di ~ 20" — 380x.
IC 4563	gx	15h35m03s	+39°49.9'		Boo	16"	m. buona / m. buono	piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; osservata a 380x anche per ridurre l'effetto di riverberazione di 2 stelle brillanti situate rispettivamente a W e a S.
IC 4564	gx	15h36m27s	+43°31.1'		Boo	16"	m. buona / m. buono	è di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 380x.
IC 4565	gx	15h36m35s	+43°25.5'		Boo	16"	m. buona / m. buono	è la più debole del quintetto, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
IC 4566	gx	15h36m42s	+43°32.4'		Boo	16"	m. buona / m. buono	diffusa, orientata da NW a SE, con dimensioni 60"×45"; presenta un piccolo nucleo stellare visibile a tratti — 380x.
IC 4567	gx	15h37m13s	+43°17.9'		Boo	16"	m. buona / m. buono	è di aspetto e dimensioni simili alla IC 4566, dalla quale dista 16' a SSE, orientata nello stesso modo, ma di gradiente di luce più uniforme — 380x.
IC 4568	gx	15h40m08s	+28°09.1'		CrB	16"	buona / ottimo	molto debole e molto piccola, poco diffusa; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non riesco a capire com'è orientata; non è comunque più estesa di 20"-25" — 380x.
IC 4569	gx	15h40m48s	+28°17.5'		CrB	16"	m. buona / ottimo	assieme a IC 4570, 4572 e a CGCG 166-30 fa parte di un terzetto di gx poste in diagonale — relativamente facile, diffusa, rotonda, di 30" di Ø e con nucleo stellare — 380x.
IC 4570	gx	15h41m22s	+28°13.8'		CrB	16"	m. buona / ottimo	assieme a IC 4569, 4572 e a CGCG 166-30 fa parte di un terzetto di gx poste in diagonale — molto debole, rotonda, poco diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di 30"; c'è una stellina a 1.5' verso S; è meglio evidente a 270x.
IC 4572	gx	15h41m54s	+28°08.0'		CrB	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, debolmente screziata e meglio definita scalando a 340x; è allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" (precedentemente osservata col 16" a 270x assieme ad alcune altre del gruppo).
IC 4573	gx	15h42m12s	+23°48.0'		Ser	16"	buona / discreto	è la più elusiva del quintetto di IC 4576 — appare solo a tratti in visione distolta a 270x quando si osserva IC 4575.
IC 4575	gx	15h42m20s	+23°48.5'		Ser	16"	buona / discreto	fa parte del quintetto di IC 4576 — molto debole, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo orientale — 270x.
IC 4576	gx	15h42m35s	+23°40.2'		Ser	16"	buona / discreto	fa parte di un quintetto assieme a IC 4573, 4575, 4577 e 4579 — rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
IC 4577	gx	15h42m46s	+23°47.5'		Ser	16"	buona / discreto	fa parte del quintetto di IC 4576 — debole, rotonda con Ø di 30", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
IC 4579	gx	15h42m51s	+23°46.4'		Ser	16"	buona / discreto	fa parte del quintetto di IC 4576 — ancora più debole e più piccola di quest'ultima, con dimensioni di 20"-25"; c'è una stellina a 1' verso N (situata al vertice rettangolo di un piccolo triangolo formato con IC 4577) — 270x.
IC 4580	gx	15h43m14s	+28°21.4'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta e molto piccola; a 380x appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni 30"×15".
IC 4581	gx	15h44m01s	+28°16.6'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto debole, situata quasi a ridosso verso N di una stellina; è poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti a 380x.
IC 4582	gx	15h45m39s	+28°05.3'		CrB	16"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" con bulge diffuso abbastanza evidente a 380x; c'è una stellina a poco più di 1' verso E.
IC 4583	gx	15h46m22s	+23°48.5'		Ser	16"	m. buona / buono	debole, diffusa, con nucleo quasi stellare, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina a 1' SE — 380x.
IC 4593	np	16h11m44s	+12°04.3'	q 200	Her	24"	mediocre / ottimo	brillante, presenta un nucleo centrale luminoso circonfuso da un piccolo alone rotondo con Ø di una 20-ina di secondi e di aspetto leggermente screziato a 570x. Era già stata precedentemente osservata nel 10": con buone condizioni di trasparenza e seeing appariva di aspetto stellare anche a 178x; solo a 240x si riusciva a capire che non era perfettamente puntiforme.
IC 4610	gx	16h33m50s	+39°15.8'		Her	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; ci sono 2 stelline a 1' verso N e NE — 495x.
IC 4614	gx	16h37m47s	+36°06.4'		Her	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile al margine N (situata 3' a NNW di NGC 6196) — 450x.
IC 4617	gx	16h42m08s	+36°41.0'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, in visione distolta appare molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso E e una a 1' scarso verso NE; queste stelline fanno parte di un piccolo parallelogramma allungato di 4 componenti di luminosità abbastanza simile e orientato da NE a SW (e usualmente situata nello stesso campo di M13 dal quale dista una 15-ina di primi NNE) — 495x.
IC 4619	gx	16h44m11s	+17°45.6'		Her	16"	ottima / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare meglio contrastata a 270x, ma a 380x sembra di aspetto più regolare.
IC 4621	gx	16h50m51s	+08°47.0'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' NW e un'altra più debole alla stessa distanza verso E.
IC 4624	gx	16h51m33s	+17°27.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
IC 4630	gx	16h55m10s	+26°39.8'		Her	16"	m. buona / m. buono	abbastanza brillante, approssim. rotonda, Ø di ~ 45" e con marcata condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
IC 4634	np	17h01m34s	−21°49.6'	q 337	Oph	10"	buona / buono	brillante, di colore biancastro, ma di dimensioni estremamente ridotte: occorrono 240x per distinguerne l'aspetto non stellare; a tratti appare all'interno un piccola zona puntiforme che con ogni probabilità è la stellina centrale.
IC 4660	gx	17h21m45s	+75°50.8'		UMi	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante a 1' verso S e una molto debole in posizione diametralmente opposta; meglio osservabile a 380x.
IC 4665	aa	17h46m12s	+05°43.0'	q 203	Oph	6"	mediocre / ottimo	ammasso molto disperso di una 30-ina di stelle brillanti e altre più deboli in maggior numero; già visibile nel cercatore 6x30.
IC 4669	gx	17h47m13s	+61°26.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
IC 4670	np	17h55m07s	−21°44.7'	q 339	Sgr	10"	m. buona / m. buono	debolissima e di aspetto stellare (rimane come tale anche a 240x); si riesce a individuare a 118x col filtro O III a un paio di primi SE di una stellina di 11-esima grandezza — riportata sul Megastar come **ESO 589-20**.
IC 4673	np	18h03m18s	−27°06.4'	q 339	Sgr	16"	ottima / scarso	è molto piccola, di un colore grigio-azzurro smorto, poco sfumata e molto brillante al centro; ha un Ø di una 15-ina di secondi e c'è una stellina debole a pochi secondi verso NE — 188x.
IC 4677	np	17h58m15s	+66°38.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è una chiazza oblunga molto debole, di luminosità uniforme, ma a tratti un poco irregolare, orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; meglio contrastata ed evidente scalando a 340x e utilizzando l'O III; c'è una stellina quasi a ridosso NE; l'oggetto è disturbato sia da una stella brillante di 10ª grandezza situata 1' a NW, sia dalla splendida NGC 6543 (di cui fa parte) che si trova 1.5' a E; quest'ultima è talmente luminosa che non mostra dettagli significativi, salvo due anse laterali che tuttavia non si separano dal corpo centrale.
IC 4688	gx	18h08m12s	+11°42.7'		Oph	16"	m. buona / buono	è un diffuso lucore, molto debole che appare in visione distolta a 270x, approssim. rotondo con Ø di 1' e immersa in un campo molto ricco di stelline; la più vicina alla galassia è abbastanza brillante e si trova ~ 1' SE.
IC 4691	gx	18h08m46s	+11°49.7'		Oph	24"	buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo NE; allineata con due stelline a NW; una terza stellina, sempre allineata con le altre, si trova dalla parte opposta ed è più vicina alla galassia — 450x.
IC 4697	gx	18h12m27s	+25°25.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con condensazione stellare appena percettibile — 450x.
IC 4706	neb	18h19m36s	−16°01.0'	q 294	Sgr	10"	m. buona / buono	appare un tenuissimo alone che circonda irregolarmente una coppia di stelline brillanti distanti poco più di 1' e orientate da NW a SE; non viene affatto enfatizzata dall'O III a 60x; potrebbe trattarsi di un semplice fenomeno di diffusione, se non altro perché nella posizione indicata dalle coordinate il Megastar non riporta alcunché.
IC 4708	gx	18h13m46s	+61°09.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso W — 450x.
IC 4732	np	18h33m55s	−22°38.7'	q 340	Sgr	10"	buona / buono	oggetto debole che rimane di aspetto quasi stellare anche a 240x; è individuabile facendo scorrere davanti all'occhio l'O III.
IC 4756	aa	18h38m54s	+05°26.0'	q 205	Ser	6"	mediocre / ottimo	molto esteso e disperso su una superficie approssim. circolare con Ø di 1°; come nel caso di IC 4665 è già ben visibile nel cercatore 8x30 e già molto interessante a 30x.
IC 4763	gx	18h33m36s	+67°06.6'		Dra	16"	discreta / ottimo	facile, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso del bordo sud-orientale situata un paio di primi a S di NGC 6677) — 380x.
IC 4772	gx	18h39m56s	+40°01.6'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 450x.
IC 4846	np	19h16m28s	−09°02.6'	q 296	Aql	10"	buona / buono	ancora un oggetto di aspetto stellare; risulta evidente, come in altri casi analoghi, solo col filtro O III in quanto ne aumenta la luminosità facendola apparire di colore verdastro.
IC 4867	gx	19h26m32s	+50°07.5'		Cyg	24"	m. buona / discreto	forma una coppia abbastanza ravvicinata con MCG+8-35-11 situata 1' a NE — relativamente brillante e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni almeno 60"×30", con bulge evidente e nucleo stellare — 450x.
IC 4954	neb	20h04m54s	+29°11.0'	q 119	Vul	24"	buona / buono	è la più evidente di 3 piccole chiazze di aspetto alquanto irregolare poste grosso modo da N a S; circonda una stellina brillante ed è estesa 1' scarso; a poco meno di 3' NNW si nota un altro debole lucore, meno appariscente, che aggetta a NE da una coppia di stelline luminose: si nota abbastanza bene il contrasto rispetto alla parte opposta della coppia; questa zona è usualmente riportata come IC 4955; infine, a poco più di 1' a N di quest'ultima c'è un'altra piccola nebulosità, di aspetto meno diffuso che avviluppa una coppia stretta molto sbilanciata; in fotografia risulta solo un'appendice della precedente. Tutte le stelle sopra menzionate, più alcune altre via via più deboli, fra le quali un piccolo terzetto di componenti di 12-esima allineato da NW a SE, costituiscono l'ammasso aperto **Roslund 4** — 210x.
IC 4955	neb	20h04m47s	+29°13.8'		Vul	24"	buona / buono	v. **IC 4954**
IC 4996	aa	20h16m32s	+37°38.7'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	presenta un polverio di stelle deboli che tuttavia si risolvono facilmente a 110x; al centro ve ne sono 3 brillanti (più una 4ª più debole a formare un piccolo trapezio); intorno si contano una decina di stelle abbastanza brillanti sparse su un'area estesa 4' o 5', ma gli effettivi confini restano mal definiti.
IC 4997	np	20h20m09s	+16°43.9'	q 208	Sge	24"	discreta / buono	è molto luminosa, ma rimane di aspetto stellare anche a 570x; presenta una colorazione più bluastra della stella brillante situata 1' a SW.
IC 5050	gx	20h45m15s	−05°37.3'		Cap	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SW e un'altra poco più evidente subito a S; una stellina brillante si trova a 1' verso E — 450x.
IC 5067	neb	20h51m00s	+44°00.0'	q 85	Cyg	6"	m. buona / m. buono	**Nebulosa Pellicano** — debole; s'intravede la zona scura tra le stelle 56 e 57 Cyg (si può trovare anche sotto la sigla **IC 5070**) — 30x.
IC 5076	neb	20h55m38s	+47°24.3'	q 85	Cyg	16"	ottima / mediocre	è una diffusa lattescenza, molto tenue che fa da sfondo all'ammasso NGC 6991; è grosso modo orientata da N a S con dimensioni 4'×2.5' — 132x.
IC 5078	gx	21h02m31s	−16°49.1'		Cap	16"	ottima / buono	debolissimo lucore esteso e indistinto, di dimensioni grosso modo 90"×30" che sembra dipartirsi a E e a W da quella centrale di 3 stelline allineate da NW a SE (quella a NW è la più brillante); meglio utilizzare 270x.
IC 5083	gx	21h03m51s	+11°45.8'		Equ	24"	discreta / m. buono	presenta un nucleo stellare abbastanza marcato circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E — 570x.
IC 5090	gx	21h11m30s	−02°01.9'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale piccola e poco contrastata sul disco; a NE c'è una coppia di deboli stelline distanti ~ 30" e orientata da N a S — 380x.
IC 5104	gx	21h21m29s	+21°14.5'		Peg	16"	m. buona / buono	molto debole, appena più brillante all'interno, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 270x.
IC 5111	gx	21h28m11s	+02°28.5'		Aqr	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.

IC 5115	gx	21h30m57s	+11°45.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	elusiva, appare solo a tratti a ridosso SE di una stellina; non è più estesa di 20" (situata 11' a WSW di CGCG 427-1) — 450x.
IC 5117	np	21h32m31s	+44°35.8'	q 86	Cyg	10"	buona / buono	rimane di aspetto quasi stellare anche a 240x, situata una 20-ina di secondi a W una stellina; con un'altra stellina più debole situata subito a N forma un minuscolo triangolo isoscele.
IC 5119	gx	21h33m65s	+21°50.3'		Peg	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con tenue condensazione centrale appena percettibile; c'è una debole stellina a ridosso verso W e un'altra più brillante subito a NW — 450x.
IC 5144	gx	21h54m20s	+15°02.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 5145	gx	21h54m23s	+15°09.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	facile, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina subito a S — 450x.a
IC 5146	neb	21h53m29s	+47°15.7'	q 86	Cyg	24"	buona / buono	Cocoon Nebula — diffuso chiarore molto debole e assai poco contrastato sul fondo cielo; anche col filtro deepsky la visione non migliora in maniera eclatante; appare grosso modo circolare con Ø di ~ 8'; una stellina relativamente brillante si trova proprio al centro, mentre un'altra di magnitudo simile è al bordo meridionale — 110x.
IC 5151	gx	21h58m53s	+03°45.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso NE — 450x.
IC 5160	gx	22h03m05s	+10°55.5'		Peg	24"	buona / m. buono	è un ovale molto diffuso e gradatamente più brillante verso l'interno, orientato da N a S con dimensioni 60"×40". Subito a S della gx c'è un gruppo di una 20-ina di stelle abbastanza brillanti che a ingrandimenti più bassi pare un vero e proprio ammasso aperto; è costituito da 2 archi con le convessità affiancate: quello a W ha appena 5 stelle, mentre quello a E è più irregolare, ricco e frastagliato; gx e ammasso appaiono ben evidenti a 200x. — 450x.
IC 5161	gx	22h05m39s	+09°38.4'		Peg	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e con tenue bulge diffuso — 450x.
IC 5177	gx	22h11m34s	+11°47.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole oggetto diffuso e di forma indistinta, forse rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ~ 45" verso N — 380x.
IC 5180	gx	22h11m12s	+38°55.6'		Lac	16"	m. buona / buono	presenta un evidente condensazione centrale brillante e diffusa, e un tenue alone di ~ 1' di Ø — 380x.
IC 5191	gx	22h15m02s	+37°18.0'		Lac	16"	buona / discreto	fa parte di un quintetto assieme a NGC 7242, dalla quale dista 7' a W; è debole, relativamente compatta, di luminosità uniforme, posta pressoché di taglio e orientata da ENE a WSW per ~ 40" — 270x.
IC 5192	gx	22h15m14s	+37°16.2'		Lac	16"	buona / discreto	molto piccola e debole, ma visibile senza difficoltà; è piccola, rotonda e di luminosità uniforme; una stellina molto debole è visibile a tratti a ridosso del centro verso N (situata 5' a W di NGC 7442) — 270x.
IC 5193	gx	22h15m43s	+37°14.6'		Lac	16"	buona / discreto	debole, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW, dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a ridosso del bordo NE e una più brillante a quello opposto (situata 3' a S di NGC 7242) — 270x.
IC 5217	np	22h23m56s	+50°58.0'	q 57	Lac	10"	buona / buono	relativamente brillante, di un colore grigio-verde, ben contrastata sul fondo cielo e molto piccola (diviene non stellare soltanto a 240x); il Ø non dovrebbe superare i 10"-15".
IC 5223	gx	22h29m45s	+07°59.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme salvo una condensazione centrale molto tenue visibile però solo a tratti, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ~ 45" NW — 380x.
IC 5231	gx	22h34m00s	+23°20.3'		Peg	24"	ottima / mediocre	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
IC 5233	gx	22h36m33s	+25°45.8'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole oggetto rotondo con Ø di una 40-ina di secondi, diffuso e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso NE — 380x.
IC 5241	gx	22h41m39s	+02°38.4'		Aqr	16"	m. buona / buono	debolissima, ma visibile abbastanza facilmente in visione distolta, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di ~ 40" — 270x.
IC 5242	gx	22h41m15s	+23°24.4'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di 30"; presenta una tenue e piccola condensazione centrale osservabile a 380x.
IC 5243	gx	22h41m25s	+23°22.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	poco più debole di IC 5242, di dimensioni simili, ma di aspetto più uniforme; una condensazione centrale appare solo a tratti a 380x; c'è una debole stellina a 1' SW e un'altra appena percettibile quasi a ridosso verso SE.
IC 5253	gx	22h45m29s	+21°48.5'		Peg	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina al bordo S e un'altra percettibile solo a momenti a quello opposto — 450x.
IC 5254	gx	22h46m01s	+21°07.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo lucore che in visione distolta appare poco allungato da E a W per più di 30"; è situata a ridosso verso N di una stellina; forse è poco più evidente a 380x (situata 8' a WNW di NGC 7375) — 270x.
IC 5258	gx	22h51m32s	+23°04.9'		Peg	16"	m. buona / buono	abbastanza facile, poco diffusa, allungata da E a W poco più brillante all'interno, piccola condensazione centrale evidente e di dimensioni 60"×40" — 270x.
IC 5269	gx	22h57m43s	−36°01.5'	q 384	PsA	16"	buona / buono	è un debolissimo ovale molto diffuso, orientato da NE a SW con dimensioni 60"×30"; si fatica a vedere perché anche a 188x il campo è praticamente depleto (salvo un'unica stella situata al bordo SW) — 188x.
IC 5270	gx	22h57m55s	−35°51.5'		PsA	16"	buona / buono	è una lama di luce molto debole, osservabile facilmente in visione distolta, estesa un paio di primi e orientata da E a W; meglio visibile a 380x (non è riportata sull'Uranometria: situata 10' a N di IC 5269).
IC 5271	gx	22h58m02s	−33°44.6'	q 384	PsA	10"	m. buona / buono	debole, visibile in visione distolta come una macchia allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×1' e di luminosità uniforme — 178x.
IC 5274	gx	22h58m28s	+18°55.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda, di 40" di Ø, diffusa e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x; c'è una stellina a ~ 1' verso N.
IC 5276	gx	22h58m40s	+18°49.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; è situata tra 2 stelline distanti poco più di 1' e orientate da NW a SE (ossia a perpendicolo con l'asse della gx): quella a NW è più brillante — 380x.
IC 5278	gx	23h00m16s	−08°10.7'		Aqr	24"	ottima / ottimo	debolissima e situata a ridosso S di una stellina brillante; in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
IC 5282	gx	23h02m48s	+21°52.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; praticamente allineata ed equidistante con 2 stelline distanti 1'; meglio definita a 270x.
IC 5283	gx	23h03m18s	+08°53.6'		Peg	16"	buona / m. buono	situata a poco più di 1' NE di NGC 7469 è molto debole e di luminosità uniforme; è allungata da NW a SE con dimensioni 45"×20" — 270x.
IC 5284	gx	23h06m46s	+19°07.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×20" e con bulge appena più brillante del disco; c'è una stellina a 1' NE; appare meglio contrastata a 270x.
IC 5285	gx	23h06m59s	+22°56.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	piccola, rotonda, relativamente compatta, con nucleo stellare visibile a tratti e Ø inferiore a 30"; c'è una stellina a una 15-ina di secondi dal bordo occidentale (situata 8' a WSW di NGC 7489) — 270x.
IC 5287	gx	23h09m20s	+00°45.3'		Psc	16"	m. buona / buono	debolissima, di forma indistinta, forse rotonda con Ø di ~ 1'; solo a tratti appare appena più brillante all'interno — 270x.
IC 5292	gx	23h13m47s	+13°41.2'		Peg	16"	buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, di aspetto un po' confuso, approssim. circolare e di una 30-ina di secondi o poco più di Ø (situata 9' a NW di NGC 7535) — 270x.
IC 5293	gx	23h14m45s	+25°08.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme alle tre successive di un quartetto arcuato ed esteso 7' da NW a SE — relativamente compatta e con condensazione stellare appena percettibile a 450x; orientata da N a S con dimensioni 30"×20".
IC 5295	gx	23h15m29s	+25°07.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
IC 5296	gx	23h15m44s	+25°05.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 450x.
IC 5297	gx	23h15m58s	+25°01.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
IC 5298	gx	23h16m01s	+25°33.4'		Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, piccola, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30" — 380x.
IC 5304	gx	23h18m53s	−10°15.5'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale visibile a tratti a 270x; a 380x è di aspetto più uniforme; c'è una stellina a 1.5' SW.
IC 5305	gx	23h18m06s	+10°18.0'		Peg	16"	m. buona / m. buono	è un piccolo oggetto diffuso con tenue condensazione centrale, approssim. circolare, di ~ 30" di Ø; è allineata con 2 stelline distanti poco più di 30"e orientate grosso modo da N a S (situata 3.5' a NNW di NGC 7594) — 270x.
IC 5312	gx	23h20m58s	+19°19.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	assieme a IC 5314 forma una coppia di oggetti molto deboli, di luminosità uniforme e relativamente compatti, rotondi con Ø di una 20-ina di secondi; il primo dei due è poco più evidente — 380x.
IC 5314	gx	23h21m08s	+19°18.7'		Peg	16"	m. buona / ottimo	v. **IC 5312**
IC 5315	gx	20h21m18s	+25°23.1'		Peg	16"	m. buona / buono	abbastanza compatta, rotonda con Ø di 30", di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile però solo a tratti — 270x.
IC 5317	gx	23h23m29s	+21°09.8'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole e molto diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 40"; c'è una stellina a 1' verso NW — 380x.
IC 5329	gx	23h33m09s	+21°14.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare come una lama estesa ~ 1' e orientata da E a W — 380x.
IC 5331	gx	23h33m25s	+21°07.8'		Peg	16"	m. buona / ottimo	ancora una debolissima e piccola lama di luce orientata da N a S (a perpendicolo, cioè, rispetto a IC 5329) ed estesa per una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 380x.
IC 5332	gx	23h34m27s	−36°06.1'	q 385	Scl	16"	buona / buono	è un diffuso lucore che a 188x appare molto stemperato sul fondo cielo; probabilmente rotonda con Ø che in visione distolta arriva a 5'; è grosso modo delimitata da una coppia di stelline brillanti a W e SW e un'altra più debole subito a NE.
IC 5334	gx	23h34m36s	−04°32.1'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	debole; a 270x appare molto allungata da NW a SE, dimensioni 80"×20" (praticamente una edge-on), con bulge piccolo e ben contrastato sul disco; a 380x il campo è depleto.
IC 5337	gx	23h36m25s	+21°09.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a 1' verso E — poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare molto tenue; è situata al centro dell'ammasso AGC 2626 — 450x.
IC 5338	gx	23h36m31s	+21°08.8'	q 169	Peg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la precedente situata a 1' verso W — debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40"; è situata al centro dell'ammasso AGC 2626 — 450x.
IC 5341	gx	23h38m27s	+26°59.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia con CGCG 476-90 situata 40" a NW; le due galassie sono di aspetto simile, rotonde con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale — 450x.
IC 5342	gx	23h38m39s	+27°00.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con condensazione centrale evidente — 450x.
IC 5350	gx	23h47m15s	−27°57.4'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 340x.
IC 5351	gx	23h47m19s	−02°18.8'		Psc	16"	ottima / buono	fa parte di un quartetto assieme a IC 5356, IC 5357 e IC 5359 — molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; sembra aggettare verso N da una stellina brillante che disturba; presenta un nucleo stellare a ridosso di tale stellina — 380x.
IC 5353	gx	23h47m29s	−28°06.5'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — molto diffusa e con basso gradiente di luce, approssim. rotonda con Ø di 1'; un debolissimo oggetto molto piccolo che appare in visione distolta a ridosso E: è la **PGC 72423** — 340x.
IC 5354	gx	23h47m29s	−28°08.1'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 340x.
IC 5355	gx	23h47m15s	+32°47.0'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
IC 5356	gx	23h47m24s	−02°21.1'		Psc	16"	ottima / buono	fa parte del quartetto di IC 5351 — molto debole, rotonda con Ø di 35"-40", diffusa e con nucleo stellare; è situata tra 2 stelline orientate da NE a SW e distanti 1.5' — 380x.
IC 5357	gx	23h47m23s	−02°18.0'		Psc	16"	ottima / buono	fa parte del quartetto di IC 5351 di cui rappresenta il membro più evidente — è allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×30", diffusa e con condensazione centrale evidente; l'asse maggiore della gx punta a una stellina situata a poco più di 1' NNW (che da un controllo effettuato successivamente è risultata poi essere la Hickson 97E (la quale, a quanto pare, ha un nucleo decisamente stellare!) — 380x.
IC 5358	gx	23h47m45s	−28°08.4'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso AGC 4038 — molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 90"×45"; c'è una stellina visibile solo a momenti al bordo NE; un'altra appena percettibile si trova a ridosso N, ma quest'ultima è in realtà la PGC 3098105; anche il piccolo e debolissimo nodulo diffuso che appare ogni tanto al bordo SW è di fatto una galassietta, la PGC 72437 — 340x.
IC 5359	gx	23h47m38s	−02°19.0'		Psc	16"	ottima / buono	fa parte del quartetto di IC 5351 — debolissima, osservabile in visione distolta a 380x; solo a tratti appare allungata da NW a SE (ossia come le 2 stelline situate 3' a E) ed estesa come la distanza di tali stelline (45"-50").
IC 5369	gx	23h59m50s	+32°42.1'		And	16"	ottima / ottimo	fa parte, assieme a IC 5370, IC 5371 e IC 5373 di un quartetto alquanto difficile — molto debole, diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 30" e nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è un piccolo triangolo equilatero perfetto a 3' SSE.
IC 5370	gx	00h00m01s	+32°44.3'		And	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo brillante, quasi stellare, circonfuso da un alone rotondo con Ø di 35"-40"; è la più luminosa del quartetto — 380x.
IC 5371	gx	00h00m16s	+32°47.5'		And	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 20"; appare facilmente in visione distolta a 380x a neppure 1' NW di una stellina.
IC 5373	gx	00h00m29s	+32°46.9'		And	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno — 380x.
IC 5374	gx	00h01m04s	+04°30.0'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
IC 5375	gx	00h01m05s	+04°32.4'		Psc	24"	m. buona / buono	più evidente di IC 5374, situata 2.5' a S; è allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", diffusa e con tenue condensazione centrale — 450x.
IC 5376	gx	00h01m20s	+34°31.6'		And	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×20" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
IC 5377	gx	00h02m05s	+16°35.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza molto spampanata e di forma indistinta, estesa forse una 40-ina di secondi; appare tuttavia senza difficoltà in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
IC 5379	gx	00h02m41s	+16°36.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	anche questa è debolissima, solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×15"; poco meglio evidente scalando a 340x (situata 8.5' a E di IC 5377).
IC 5381	gx	00h03m11s	+15°58.0'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce estesa almeno 1' con bulge evidente; è situata a ridosso verso N di un piccolo triangolo: la stellina più a W è doppia — 380x.
IC 226	gx	02h27m46s	+28°12.6'		Tri	28"	m. buona / buono	gx facile, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale molto contrastata; c'è una doppia a ridosso N — 495x.
IC 227	gx	02h28m04s	+28°10.5'		Tri	28"	m. buona / buono	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" (ossia poco maggiore della precedente); c'è una stellina situata a ridosso SW — 495x.
UGC 3	gx	00h02m46s	+18°53.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale evidente — 450x.
UGC 4	gx	00h02m57s	+04°12.5'		Psc	24"	m. buona / buono	debole e relativamente compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
UGC 5	gx	00h03m06s	−01°54.9'		Psc	16"	ottima / buono	relativamente facile, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40", diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 6	gx	00h03m10s	+21°57.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
UGC 10	gx	00h00m21s	+08°37.9'		Psc	16"	m. buona / ottimo	a 270x appare come una debolissima chiazza diffusa, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 1'; a 380x non mostra più dettagli, ma tende a stemperarsi eccessivamente.
UGC 11	gx	00h03m21s	+22°06.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta subito a E di una stellina — 450x.
UGC 12	gx	00h03m20s	+29°47.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (o poco più); è situata tra 2 stelline orientate da NNE a SSW — 450x.
UGC 13	gx	00h03m29s	+27°21.1'		Peg	16"	m. buona / buono	relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con condensazione centrale quasi stellare osservabile a 380x.
UGC 18	gx	00h03m56s	+10°52.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, estesa una 30-ina di secondi; a 270x appare a tratti, in visione distolta, una condensazione centrale molto tenue.
UGC 22	gx	00h04m05s	+10°17.7'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima, piccola, diffusa e di luminosità uniforme; appare in visione distolta tra 2 stelline abbastanza brillanti e distanti un paio di primi e orientate NW a SE; la gx non è allineata con queste, ma situata ~ 1' a S di quella più a W — 380x.
UGC 23	gx	00h04m13s	+10°47.4'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, approssim. rotonda con Ø di ~ 40", diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 24	gx	00h04m15s	+22°35.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, purtroppo immersa nei bagliori della SAO 73724 di 8ª grandezza situata ad appena 1.5' SE; approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo E — 450x.
UGC 25	gx	00h24m25s	+06°10.6'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; a 450x il campo è praticamente depleto salvo 2 stelline situate 4' a SW e orientate quasi a perpendicolo con l'asse maggiore della gx.
UGC 27	gx	00h04m29s	+05°50.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 29	gx	00h04m34s	+28°18.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 1', diffusa e poco più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 31	gx	00h04m52s	+17°11.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40"; meglio osservabile a 270x; c'è una stellina a 1' verso NE.
UGC 32	gx	00h04m59s	+11°42.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	elusiva, molto diffusa, visibile solo a tratti in visione distolta a 270x (a 380x il campo è quasi depleto), estesa non più di 20"-25" e con condensazione centrale molto tenue.
UGC 33	gx	00h04m58s	+05°07.4'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debole, ma visibile abbastanza facilmente anche in visione diretta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 35	gx	00h05m10s	+06°15.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore di forma indistinta, forse rotondo ed esteso una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso W; appare solo in visione distolta, stranamente meglio a 450x.
UGC 36	gx	00h05m14s	+06°46.3'		Psc	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", con piccolo nucleo più evidente del disco visibile abbastanza facilmente; c'è una stellina a 1' SE; a 380x il campo oculare è depleto.
UGC 40	gx	00h05m48s	+27°26.9'		Peg	16"	m. buona / buono	debole chiazza rotonda, di ~ 40" di Ø, molto diffusa e con tenue condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
UGC 41	gx	00h05m56s	+22°29.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, estesa 1' scarso e orientata da NE a SW; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 46	gx	00h06m22s	+17°25.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con MCG+3-1-24 situata a ridosso N — poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 48	gx	00h06m37s	+47°52.7'		And	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina appena percettibile subito a E e una più evidente a 1' verso N — 450x.
UGC 50	gx	00h06m40s	+26°09.3'		Peg	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W — 450x.
UGC 51	gx	00h06m40s	+05°06.8'		Psc	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 52	gx	00h06m49s	+08°37.7'		Psc	16"	m. buona / ottimo	è una bolla rotonda con Ø di 1', diffusa e di aspetto molto regolare a 380x, appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina luminosa a un paio di primi NW.
UGC 53	gx	00h06m50s	+19°19.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a 1' verso NE.
UGC 55	gx	00h06m59s	+46°38.3'		And	24"	buona / discreto	è una chiazza elusiva estesa forse una 30-ina di secondi, situata a ridosso SE di una stellina; appare solo a momenti in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
UGC 56	gx	00h07m02s	+14°06.4'		Peg	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; non è purtroppo possibile tenere fuori campo la SAO 91715 di 9ª grandezza situata 4.5' a SW — 450x.
UGC 61	gx	00h07m24s	+47°02.5'		And	24"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una doppia stretta e bilanciata quasi a ridosso S; forma una coppia ravvicinata con CGCG 549-19 situata subito a E — 450x.
UGC 63	gx	00h07m51s	+35°58.0'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x; a tratti appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30"; solo a momenti appare una stellina a ridosso, ma non riesco a capire se si trova a E o a S della gx.
UGC 64	gx	00h07m44s	+40°52.6'		And	24"	m. buona / ottimo	è un elusivo e indistinto lucore situato a ridosso N di una stellina; un'altra stellina molto debole è invece a ridosso SW; una doppia stretta e irrisolta si trova subito a E e dà l'impressione a prima vista di un piccolo oggetto diffuso — 450x.
UGC 66	gx	00h08m07s	+09°43.1'		Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e relativamente compatta; a 380x appare come un piccolo ovale di 45"×30", orientato da E a W al centro del quale si nota, a tratti, un nucleo puntiforme.
UGC 67	gx	00h08m15s	+07°46.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 70"×30" — 450x.
UGC 68	gx	00h08m10s	+27°00.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una zona centrale abbastanza evidente, orientata da E a W ed estesa praticamente come la gx — 450x.
UGC 69	gx	00h08m11s	+27°31.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 71	gx	00h08m36s	+44°05.8'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto spampanata, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20"; meglio comunque non scalare; c'è una doppia stretta e sbilanciata a 1' verso W — 450x.
UGC 72	gx	00h08m38s	−00°44.1'		Psc	24"	m. buona / buono	poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
UGC 79	gx	00h09m04s	+25°37.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, orientata da E a W con dimensioni 60"×40"; è decisamente meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 81	gx	00h09m04s	+10°55.1'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina subito a NW — 450x.
UGC 85	gx	00h09m28s	+47°21.6'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina al bordo meridionale e una a ridosso N; altre due deboli stelline si trovano rispettivamente a a SE e SW — 450x.
UGC 87	gx	00h09m47s	+28°20.5'		Peg	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con una stellina brillante praticamente al centro che ne confonde un po' la forma; una componente più debole si trova al margine SW — 495x.
UGC 88	gx	00h09m52s	+04°40.5'		Psc	24"	buona / buono	molto diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 91	gx	00h10m03s	+28°09.0'		Peg	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge appena percettibile — 495x.
UGC 92	gx	00h10m02s	+28°12.6'		Peg	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con bulge rotondo evidente; c'è una debole stellina a 1.5' verso W — 495x.
UGC 93	gx	00h10m17s	+30°51.0'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 1' scarso e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante di 10a grandezza a un paio di primi S che disturba un po' la visione — 450x.
UGC 95	gx	00h10m26s	+28°59.3'		And	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con NGC 27 situata a poco più di 1' verso E — è una lama di luce molto debole e di aspetto pressoché uniforme, orientata da N a S ed estesa circa 1'; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
UGC 97	gx	00h10m36s	+28°40.9'		And	24"	ottima / ottimo	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; molto disturbata dalla SAO 73785 di 7ª grandezza situata 2.5' a SW al confine col Pegaso — 450x.
UGC 99	gx	00h10m41s	+13°42.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di ~ 45"; scalando a 200x appare a tratti un tenuissimo nucleo stellare.
UGC 101	gx	00h10m57s	+25°33.6'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge abbastanza evidente; c'è una stellina appena percettibile a 3' verso S — 450x.
UGC 102	gx	00h11m01s	+30°03.8'		And	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 1', molto diffusa e con condensazione centrale evidente; c'è un asterismo di 4 stelline brillanti foggiato a "L" stretta subito a N; la componente più luminosa si trova 1.5' a N della gx — 450x.
UGC 104	gx	00h11m10s	+08°00.1'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×30", appena più brillante all'interno; usati 380x per cercar di tenere fuori campo una stella di 7a.
UGC 105	gx	00h11m14s	+28°54.4'		And	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda, Ø di 45" e con nucleo stellare osservabile a 380x; situata tra 2 stelline distanti ~ 2' e orientate da NW a SE.
UGC 107	gx	00h11m38s	+27°56.8'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una debole stellina subito a W — 450x.
UGC 108	gx	00h11m45s	+28°30.0'		And	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a ridosso NW — 450x.
UGC 110	gx	00h12m01s	+26°23.6'		And	24"	buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, molto diffusa, salta fuori in visione distolta, ma occorrono 450x per guadagnare un po' di contrasto, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
UGC 111	gx	00h12m09s	+12°02.7'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina a 45" verso NW — 450x.
UGC 113	gx	00h12m16s	+22°19.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, abbastanza compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20", è situata 1' a S di una coppia di stelline brillanti — 380x.
UGC 115	gx	00h10m38s	+88°20.1'		Cep	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo con Ø di ~ 30"; appare solo a tratti in visione distolta a 380x; c'è una stellina appena percettibile a una 30-ina di secondi SE.
UGC 116	gx	00h12m38s	+05°30.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo WSW — 450x.
UGC 117	gx	00h12m55s	+33°21.6'		And	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; è situata all'interno di un asterismo di 7 stelline brillanti foggiato a "X"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 119	gx	00h13m03s	+14°24.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è un debole oggetto relativamente compatto, poco allungato da E a W e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina visibile a tratti a SW — 380x.
UGC 121	gx	00h13m01s	+39°14.7'		And	24"	buona / discreto	molto debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 122	gx	00h13m17s	+17°01.8'	q 125	Peg	16"	m. buona / discreto	debolissima, quasi elusiva; appare a tratti come un "baffo" che si diparte verso E da una stellina; bisogna cercar di tenere fuori campo la SAO 91779 di magnitudo 6.5 che disturba molto, specie se c'è, come stanotte, molta umidità — 380x.
UGC 124	gx	00h13m24s	+28°22.1'		And	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina al bordo NE (una doppia dalle componenti brillanti si trova 3' a S) — 450x.
UGC 126	gx	00h13m45s	+14°36.4'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, rotonda con Ø max di 20"; appare in visione distolta a 380x a ridosso verso NW di una debole stellina; una stellina brillante si trova invece un paio di primi NNE.
UGC 128	gx	00h13m51s	+35°59.6'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e assai stemperato sul fondo cielo; meglio contrastato scalando a 340x.
UGC 129	gx	00h13m56s	+03°42.8'		Psc	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare; è allineata ed equidistante con 2 stelline a N e una terza più debole a S — 450x.
UGC 130	gx	00h13m57s	+30°53.0'		And	16"	m. buona / mediocre	facile, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata verso il margine orientale di un piccolo asterismo di 5 stelline abbastanza brillanti — 270x.
UGC 132	gx	00h14m01s	+12°57.8'		Psc	16"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, visibile a tratti in visione distolta a 188x, allungata da N a S con dimensioni 60"×30".
UGC 139	gx	00h14m32s	−00°44.2'		Psc	16"	ottima / scarso	è un debole ovale di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni 60"×40" — 270x.
UGC 141	gx	00h14m34s	+28°27.0'		And	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' SSE — 450x.
UGC 142	gx	00h14m34s	+05°14.0'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e con bulge appena percettibile, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" 340x.
UGC 143	gx	00h15m15s	+05°53.2'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; occorre tuttavia tenere fuori campo la SAO 109091 situata 6' a SE — 450x.
UGC 146	gx	00h15m44s	+27°26.6'		And	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 50"×25" e con piccolo bulge abbastanza marcato; c'è una stellina al bordo orientale — 450x.
UGC 147	gx	00h15m44s	+29°40.0'		And	16"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 148	gx	00h15m51s	+16°05.4'		Psc	16"	m. buona / ottimo	gx tutto sommato facile a 380x, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme.
UGC 149	gx	00h15m57s	+14°04.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
UGC 151	gx	00h16m15s	+10°19.9'		Psc	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, di aspetto regolare e Ø di 1'; presenta un nucleo puntiforme ben evidente a 380x.
UGC 152	gx	00h16m29s	+29°55.5'		And	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa 45"; meglio definita scalando a 340x.
UGC 155	gx	00h16m44s	+07°04.5'		Psc	16"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce orientata da N a S ed estesa ~ 1.5' (poco più della distanza delle 2 stelline situate rispettivamente a E e SE), con tenue bulge diffuso ed evidente a 380x.
UGC 156	gx	00h16m48s	+12°20.8'	q 171	Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce quasi elusiva orientata da N a S situata a NW di un asterismo di 7 stelline brillanti — 380x.
UGC 157	gx	00h16m54s	+27°50.8'		And	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a meno di 1' W e un'altra più debole più o meno alla stessa distanza verso N — 450x.
UGC 158	gx	00h17m05s	+42°09.6'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una coppia serrata di stelline molto deboli al bordo N — 450x.
UGC 160	gx	00h17m04s	+34°30.0'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore approssim. circolare con Ø di 30"-35; appare a tratti all'interno di un piccolo triangolo isoscele molto acuminato e orientato grosso modo da E a W; una delle stelline si trova a ridosso E della gx — 450x.
UGC 162	gx	00h17m19s	+17°25.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1' verso NE — 450x.
UGC 164	gx	00h17m24s	+18°05.1'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appare solo in visione distolta a 380x, molto allungata da ENE a WSE (stimato in base ai lati del piccolo triangolo situato a NW) per ~ 1'.
UGC 165	gx	00h17m42s	+24°40.0'		And	24"	buona / buono	debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 166	gx	00h17m36s	+30°12.3'		And	16"	buona / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo 60"×30"; appare meglio contrastata scalando a 270x.
UGC 168	gx	00h18m11s	+18°17.5'		Psc	16"	m. buona / m. buono	altra gx debolissima, osservabile solo a tratti in visione distolta a 380x; ogni tanto appare allungata da N a S per 1', ma non riesco a capirne le proporzioni.
UGC 169	gx	00h18m19s	+19°23.6'		Psc	16"	m. buona / m. buono	macchiolina rotonda molto debole e diffusa, di luminosità uniforme e di 35"-40" di Ø situata a ridosso di una stellina brillante dalla quale, in visione distolta, sembra aggettare verso S; c'è una stellina a poco più di 1' verso W — 380x.
UGC 171	gx	00h18m24s	+48°43.9'		Cas	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 175	gx	00h18m27s	+49°59.9'		Cas	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole estesa una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta ma è meglio non scalare gli ingrandimenti; c'è una stellina a ridosso N e una appena percettibile al bordo SE — 450x.
UGC 177	gx	00h19m00s	+79°41.8'		Cep	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NW e una più debole a 1' di distanza dalla parte opposta — 450x.
UGC 178	gx	00h18m53s	+48°01.0'		Cas	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso S che possiede una debole compagna (più a S) e una abbastanza brillante subito a W — 450x.
UGC 179	gx	00h19m00s	+23°28.6'		And	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 180	gx	00h19m08s	+15°45.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 181	gx	00h19m00s	+19°23.8'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce di luminosità pressoché uniforme, abbastanza facile da vedere a 380x, estesa ~ 1' in direzione N-S; c'è una stellina a 1' verso NE.
UGC 183	gx	00h19m35s	+47°14.3'		Cas	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30"; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline: la componente più a NE è la più brillante — 450x.
UGC 191	gx	00h20m05s	+10°52.9'	q 171	Psc	16"	ottima / m. buono	gx elusiva che appare solo a tratti a ridosso verso N di una stellina (che è la più occidentale di 4 stelline allineate: quella a E è la più brillante); a prima vista sembra di vedere solo un tenuissimo alone asimmetrico, esteso una 40-ina di secondi di secondi, attorno a questa stellina — 380x.
UGC 196	gx	00h20m34s	+47°26.2'		Cas	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di 45"; c'è una debole stellina a ridosso NE e una brillante a 1' N; la gx è situata subito a W di un piccolo rettangolo regolare formato da 4 stelline brillanti (la componente più a N è la più luminosa) — 450x.
UGC 197	gx	00h20m49s	+20°01.9'		Psc	24"	buona / buono	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; è situata all'interno di un piccolo triangolo irregolare di stelle la cui componente più a W è una doppia stretta e sbilanciata — 450x.
UGC 202	gx	00h21m08s	+27°12.8'		And	16"	ottima / buono	relativamente facile, molto piccola, rotonda con Ø di 20"-25" e condensazione centrale ben osservabile a 380x.
UGC 205	gx	00h21m20s	+17°20.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso; poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 207	gx	00h21m31s	+29°39.7'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NW e una appena percettibile dalla parte opposta — 450x.
UGC 210	gx	00h22m05s	+23°44.2'		And	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 450x.
UGC 212	gx	00h22m23s	−01°18.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; in visione distolta appare a tratti immersa in una piccola e tenue chiazza lattescente che tende a farla aumentare leggermente di dimensioni, circa 40"×30" — 450x.
UGC 213	gx	00h22m25s	+06°26.0'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø inferiore a 30" e nucleo stellare osservabile a 380x.
UGC 215	gx	00h22m26s	+29°30.3'		And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40" e con bulge abbastanza evidente anche se poco contrastato sul disco; un piccolo triangolo molto aperto di stelline le fa da contorno da E a NW — 450x.
UGC 219	gx	00h22m57s	+16°15.2'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 220	gx	00h23m16s	+02°25.3'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina al bordo W — 450x.
UGC 221	gx	00h23m11s	+27°25.9'		And	24"	buona / buono	molto diffusa e appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 224	gx	00h23m38s	−00°30.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MCG+0-2-19 situata a ridosso N, ma il sistema è molto disturbato dalla SAO 128735 situata un paio di primi a SSE — la UGC è più evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare; la MCG sembra a prima vista un'estensione della UGC e presenta anch'essa un nucleo stellare appena percettibile; la coppia è comunque meglio evidente spingendo a 580x.
UGC 225	gx	00h23m36s	+20°51.2'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, di 30"-35" di Ø e con condensazione centrale osservabile a 380x.
UGC 226	gx	00h23m48s	+14°41.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.

UGC 227	gx	00h23m50s	+26°55.3'		And	24"	buona / buono	relativamente brillante, diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40", con piccolo bulge di aspetto quasi stellare; è situata tra 2 stelle brillanti orientate da NE a SW (il campo qui è particolarmente ricco di stelle luminose) — 450x.
UGC 228	gx	00h23m57s	+24°18.3'		And	24"	buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' verso SE — 450x.
UGC 229	gx	00h23m53s	+28°20.0'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 232	gx	00h24m39s	+33°15.4'		And	16"	buona / m. buono	molto debole, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina al bordo meridionale — 270x.
UGC 233	gx	00h24m43s	+14°49.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole e di aspetto un po' irregolare; approssim. rotonda con Ø di ~ 40" e gradiente molto basso — 380x.
UGC 234	gx	00h24m47s	+29°33.6'		And	24"	m. buona / ottimo	chiazza oblunga molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W e di dimensioni grosso modo 40"×20" — 450x.
UGC 235	gx	00h24m56s	+45°09.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una coppia di stelline a 1' N — 450x.
UGC 236	gx	00h24m59s	+43°39.7'		And	24"	buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" e condensazione centrale evidente; c'è una debole stellina a 1' ENE — 450x.
UGC 237	gx	00h25m00s	+06°39.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	poco più evidente di UGC 240, ma molto più piccola e di aspetto più confuso; a 380x appare in visione distolta orientata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo puntiforme.
UGC 238	gx	00h25m04s	+31°20.7'		And	16"	ottima / ottimo	debolissima, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×30" e con tenue bulge diffuso appena più contrastato, ma visibile a tratti; c'è una stellina al margine meridionale — 380x.
UGC 240	gx	00h25m10s	+06°29.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole chiazza lattescente, diffusa, appena più brillante all'interno, orientata ~ da NW a SW con dimensioni 90"×60"; meglio scalare a 270x.
UGC 242	gx	00h25m29s	+20°14.2'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debole chiazza lattiginosa, appena più brillante all'interno, rotonda, di aspetto regolare e Ø di 70"; meglio scalare a 270x.
UGC 243	gx	00h25m30s	+45°55.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso S — 450x.
UGC 244	gx	00h25m30s	+24°48.7'		And	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"× 30"; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' a S — 450x.
UGC 245	gx	00h25m50s	+05°24.9'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 248	gx	00h26m07s	+25°43.5'		And	24"	buona / buono	diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; presenta un piccolo nodulo poco più brillante esteso una 15-ina di secondi verso SW: da un controllo effettuato successivamente questo è risultato essere la **Hickson 1B**; il sistema si trova a ridosso verso E di un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti che formano una losanga molto allungata in direzione N-S — 450x.
UGC 249	gx	00h26m10s	+13°39.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un diffuso lucore molto stemperato sul fondo cielo, approssim. rotondo, con Ø di ~ 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
UGC 250	gx	00h26m07s	+16°26.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, diffuso, di neppure 30" di Ø, osservabile in visione distolta a 270x (a 380x si stempera troppo).
UGC 252	gx	00h26m25s	+01°01.2'		Cet	24"	discreta / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare ed estesa 1' scarso (ossia un po' meno della distanza delle 2 stelline a NE e NNW); poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 253	gx	00h26m26s	+06°16.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; è molto disturbata dalla luce di una stellina brillante situata ~ 1' NE; meglio usare 380x.
UGC 260	gx	00h27m03s	+11°35.0'	q 171	Psc	24"	m. buona / discreto	bella, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 2'×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo occidentale situata a "metà galassia" — 450x.
UGC 261	gx	00h27m17s	+24°10.2'		And	16"	ottima / buono	debole, ma relativamente facile essendo ad alto gradiente; è diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" — 380x.
UGC 262	gx	00h27m16s	+39°47.5'		And	24"	buona / discreto	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con piccolo nucleo evidente; c'è una debole stellina a ridosso E; meglio evidente a 340x.
UGC 265	gx	00h27m14s	+20°04.3'		Psc	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 266	gx	00h27m23s	+10°50.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo di 40" di Ø e con condensazione centrale appena percettibile a 380x; c'è una stellina brillante a ridosso verso E che disturba.
UGC 269	gx	00h27m38s	+04°14.9'		Psc	24"	discreta / buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 272	gx	00h27m50s	−01°12.0'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stella doppia a un paio di secondi verso SE — 450x.
UGC 274	gx	00h27m52s	+30°36.1'		And	24"	m. buona / ottimo	grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e con basso gradiente di luce — 450x.
UGC 275	gx	00h27m59s	+02°30.5'		Cet	16"	ottima / buono	debole, ma relativamente facile in visione distolta, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e appena più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 276	gx	00h28m00s	+30°45.9'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso N — 450x.
UGC 277	gx	00h28m14s	+03°14.0'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" (molto simile alle gx della coppia UGC 282-3) — 450x.
UGC 278	gx	00h28m21s	+27°22.1'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa almeno 1'; appare senza problemi in visione distolta a 1.5' E di una stellina brillante — 450x.
UGC 279	gx	00h28m15s	+30°48.1'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×20", con un bulge diffuso e poco contrastato — 450x.
UGC 280	gx	00h28m21s	−00°13.1'		Cet	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo molto diffuso con Ø di una 30-ina di secondi; meglio visibile a 270x.
UGC 281	gx	00h28m22s	+02°31.6'		Cet	16"	ottima / buono	elusiva, solo a tratti in visione distolta appare poco allungata da N a S per una 30-ina di secondi, ma è meglio scendere a 270x.
UGC 282	gx	00h28m20s	+03°23.1'		Psc	24"	m. buona / buono	assieme a **UGC 283** forma una coppia di galassie deboli di aspetto assai simile, distanti tra loro ~ 1' in direzione ENE-WSW, molto diffuse e di luminosità uniforme; la 1ª è orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; la 2ª è invece allungata da N a S e di dimensioni uguali — 450x.
UGC 283	gx	00h28m22s	+03°23.4'		Psc	24"	m. buona / buono	v. **UGC 282**
UGC 284	gx	00h28m34s	+33°16.3'		And	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 495x.
UGC 285	gx	00h28m51s	+28°56.4'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso E o NE — 450x.
UGC 287	gx	00h28m54s	+10°10.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; meglio osservabile a 270x.
UGC 288	gx	00h29m04s	+43°25.8'		And	28"	m. buona / buono	elusivo lucore di forma indistinta che circonda in modo asimmetrico una stellina abbastanza evidente dalla quale tende ad aggettare maggiormente verso SE; una stellina più brillante si trova quasi a ridosso NE e una più debole a 1' NW; c'è infine una doppia stretta e sbilanciata a 1' scarso verso S — 495x.
UGC 299	gx	00h29m53s	+31°23.6'		And	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 270x.
UGC 303	gx	00h30m31s	+42°06.4'		And	24"	buona / discreto	debolissima chiazza oblunga estesa circa 1' e orientata da N a S; appare a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 304	gx	00h30m39s	+12°40.9'		Psc	24"	buona / buono	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 305	gx	00h30m34s	+13°22.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un debole lucore rotondo con Ø di 1' scarso, appena più brillante all'interno, abbastanza facile in visione distolta, ma meglio visibile a 270x (a 380x si stempera troppo sul fondo cielo).
UGC 306	gx	00h30m56s	+42°11.5'		And	24"	buona / discreto	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo do 40"×20", meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina brillante a 1' W.
UGC 307	gx	00h30m52s	+10°40.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale poco contrastata sul disco; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 312	gx	00h31m24s	+08°28.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	si vede facilmente a 380x come una debole chiazza di luminosità pressoché uniforme orientata da N a S con dimensioni 80"×40".
UGC 313	gx	00h31m26s	+06°12.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un debole ovale diffuso, di luminosità pressoché uniforme, esteso 60"×40" e orientato da N a S — 380x.
UGC 314	gx	00h31m29s	+08°24.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta anche a 380x; è poco allungata da N a S con dimensioni ~ 50"×40"; c'è una stellina a 1' verso S.
UGC 316	gx	00h31m36s	+14°36.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	è un debolissimo ed elusivo baffo di luce che si diparte verso SW da una stellina brillante per una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 317	gx	00h31m43s	+00°54.0'		Cet	24"	discreta / buono	è una debolissima chiazza forse circolare estesa una 30-ina di secondi e molto stemperata sul fondo cielo; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 318	gx	00h31m53s	+37°40.7'		And	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a SW e una più evidente a 1' SE; una coppia di stelline brillanti si trova un paio di primi a N — 495x.
UGC 319	gx	00h32m12s	+31°40.9'		And	16"	buona / m. buono	debolissimo lucore di forma indistinta, che appare in visione distolta a 1.5' NE di una stellina brillante; un'altra stellina più debole si trova alla stessa distanza verso SE; meglio visibile scalando a 188x.
UGC 320	gx	00h32m31s	+02°34.5'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo W; appare tuttavia meglio contrastata e visibile scalando a 340x.
UGC 321	gx	00h32m32s	+23°23.7'		And	24"	m. buona / m. buono	è un baffo di luce molto tenue, esteso una 40-ina di secondi che in visione distolta appare aggettare verso NW da una stellina — 450x.
UGC 325	gx	00h35m47s	+24°14.2'		And	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, oltre tutto immersa nei bagliori di una stella brillante situata a ridosso verso NE; non pare comunque più estesa di 30" — 450x.
UGC 327	gx	00h33m15s	+07°54.3'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 329	gx	00h33m36s	+02°40.9'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme, molto stemperata sul fondo cielo che in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 60"×45"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S; un'altra stellina più brillante si trova a 1.5' NE; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 330	gx	00h33m42s	+39°32.7'		And	24"	buona / discreto	molto diffusa, con piccolo bulge abbastanza contrastato, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 331	gx	00h33m47s	+07°14.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, debole, diffusa, rotonda con Ø di ~ 45" — 380x.
UGC 333	gx	00h33m58s	+48°57.0'		Cas	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a ridosso NE — 450x.
UGC 334	gx	00h33m54s	+31°27.1'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza approssim. circolare, molto stemperata sul fondo cielo e che in visione distolta arriva a ~ 1' di Ø; meglio contrastata ed evidente scalando a 340x; c'è una coppia di stelline a 1' verso E.
UGC 335	gx	00h33m55s	+07°16.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	abbastanza facile a 380x, rotonda con Ø di 30"; forma una coppia ravvicinata con MCG+1-2-29 situata 1' SE, ma è poco più debole e di aspetto più uniforme, salvo un nucleo stellare visibile solo a tratti.
UGC 336	gx	00h34m08s	+44°08.7'		And	24"	m. buona / ottimo	chiazza circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme e con Ø di 1' scarso; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NW; 3 stelline serrate, di luminosità simile e allineate da N a S si trovano 3' a S — 450x.
UGC 338	gx	00h34m22s	+39°36.1'		And	24"	buona / discreto	molto debole, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 339	gx	00h34m22s	+10°12.3'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente brillante, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 342	gx	00h34m33s	+03°36.1'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 344	gx	00h34m51s	+39°32.6'		And	24"	buona / discreto	debolissima chiazza molto diffusa e vagamente circolare, estesa forse una 40-ina di secondi e poco meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina molto debole a ridosso W.
UGC 345	gx	00h34m49s	+28°24.6'		And	28"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina a ridosso SW — 495x.
UGC 346	gx	00h34m57s	+31°56.8'		And	16"	buona / m. buono	debolissima, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a poco più di 1' verso SE e un'altra più debole a eguale distanza verso N — 270x.
UGC 348	gx	00h35m27s	+02°56.1'		Psc	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45"; appare poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 349	gx	00h35m24s	+03°23.8'		Psc	24"	buona / buono	debole e molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo W — 450x.
UGC 350	gx	00h35m26s	+04°52.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole chiazza diffusa di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; a prima vista sembra aggettare a SW da una stellina; meglio visibile a 450x.
UGC 353	gx	00h35m39s	+08°59.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, a 270x appare a tratti poco allungata da NW a SE (ossia a perpendicolo con le 2 stelline situate a E e SW e distanti ~ 1') e di luminosità uniforme.
UGC 355	gx	00h35m56s	+31°52.3'		And	16"	buona / m. buono	debole, ma relativamente facile, allungata nella stessa direzione di UGC 346 , ma poco più cicciotta, di dimensioni 60"×45" e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 357	gx	00h36m10s	+21°27.9'		Psc	16"	ottima / mediocre	debolissima macchiolina forse rotonda con Ø di ~ 30" che appare in visione distolta a 270x.
UGC 358	gx	00h36m13s	+01°42.7'		Cet	24"	buona / buono	debole, diffusa, leggermente condensata, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso SW e un'altra di egual magnitudo a 1.5' verso W; un paio di primi a E c'è n'è un'altra poco più evidente — 400x.
UGC 359	gx	00h36m10s	+04°38.1'		Cet	24"	discreta / buono	debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" e appena più brillante all'interno — 450x.
UGC 361	gx	00h36m25s	+49°00.8'		Cas	24"	m. buona / ottimo	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stella a ridosso S — 450x.
UGC 362	gx	00h36m34s	+32°44.8'		And	28"	m. buona / discreto	è un'elusiva chiazza di forma indistinta che solo a momenti in visione distolta pare estesa una 30-ina di secondi; situata tra una coppia di stelline a 1.5' NW e una molto debole subito a SE — 495x.
UGC 364	gx	00h36m45s	+21°34.0'		Psc	16"	ottima / mediocre	è un tenuissimo e diffuso alone ovale di dimensioni 45"×30" e orientato da NE a SW che circonda una stellina brillante — 270x.
UGC 366	gx	00h36m56s	+28°53.6'		And	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 1'; ci sono 2 stelline quasi a ridosso: una a N e l'altra a NE — 270x.
UGC 367	gx	00h37m08s	+25°41.6'		And	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta a ridosso SE di MCG+4-2-37, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
UGC 371	gx	00h37m21s	+29°09.0'		And	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto tenue orientata da NE a SW e che in visione distolta appare più estesa di 1' — 450x.
UGC 372	gx	00h37m28s	+42°54.3'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina brillante a 1' SE e una debole alla stessa distanza verso NW — 450x.
UGC 373	gx	00h37m34s	+09°33.4'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile però solo a tratti; la gx è molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30" — 450x.
UGC 375	gx	00h37m44s	+25°38.4'		And	16"	ottima / buono	debole di luminosità uniforme, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 378	gx	00h37m59s	+48°11.8'		Cas	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa ~ 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; situata tra 2 stelline orientate nello stesso modo (quella a NE è più brillante).
UGC 381	gx	00h38m12s	+30°53.5'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 384	gx	00h38m22s	+32°38.2'		And	16"	ottima / ottimo	è una debolissima chiazza lattescente di luminosità uniforme, molto diffusa, grosso modo rotonda con Ø > 1'; meglio scalare a 270x.
UGC 385	gx	00h38m25s	+13°29.1'		Psc	16"	buona / buono	debolissima macchiolina rotonda con Ø di ~ 30" visibile solo a momenti a 380x; ogni tanto sembra d'intravedere un elusivo nucleo stellare.
UGC 386	gx	00h38m24s	+15°02.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, ma osservabile senza problemi a 380x; è rotonda, con Ø di ~ 40", con piccola ed evidente condensazione centrale.
UGC 388	gx	00h38m32s	+30°17.3'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso NE — 450x.
UGC 389	gx	00h38m27s	+01°58.6'		Cet	24"	discreta / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 392	gx	00h40m35s	+83°13.3'		Cep	16"	ottima / m. buono	è una debolissima lama di luce visibile abbastanza facilmente in visione distolta, orientata ~ da N a S, estesa per oltre 1' e poco più brillante all'interno — 380x.
UGC 393	gx	00h38m40s	+17°24.3'		Psc	16"	ottima / buono	è una gx difficilissima, appare solo a tratti in visione distolta, poco più evidente a 270x, ma bisogna alternare gli occhi; è molto diffusa e non più estesa di una 30-ina di secondi.
UGC 394	gx	00h38m43s	+41°59.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni di 40"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 395	gx	00h38m51s	+31°32.6'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 450x.
UGC 398	gx	00h38m57s	+25°38.3'		And	16"	ottima / buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; forse poco più evidente scalando a 270x.
UGC 400	gx	00h39m18s	+29°39.5'		And	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
UGC 402	gx	00h39m19s	+03°57.2'		Psc	24"	discreta / buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, con piccolo bulge poco contrastato; in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" — 450x.
UGC 403	gx	00h39m20s	+13°06.4'		Psc	24"	buona / buono	assieme a UGC 404 forma una coppia di galassiette elusive che appaiono con una certa difficoltà; la 2ª è poco più evidente e si trova quasi a ridosso di una debole stellina situata a SW; la 1ª salta fuori in visione distolta quando si cerca di fissare lo sguardo sulla 2a; non sono comunque più estese di 20" — 450x.
UGC 404	gx	00h39m18s	+13°06.0'		Psc	24"	buona / buono	v. **UGC 403**
UGC 409	gx	00h39m24s	+04°34.1'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×30" e nucleo stellare visibile a tratti — 450x.
UGC 411	gx	00h39m30s	+25°38.6'		And	16"	ottima / buono	debole, ma relativamente facile a 380x, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×30", con bulge poco contrastato e nucleo stellare.
UGC 412	gx	00h39m29s	+29°45.7'		And	28"	m. buona / discreto	molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge molto diffuso ma poco contrastato — 495x.
UGC 416	gx	00h39m33s	+03°56.0'		Psc	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, pressoché circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
UGC 418	gx	00h39m38s	+08°57.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo fuso di 60"×20", orientato da E a W che appare in visione distolta; presenta un nucleo quasi stellare abbastanza evidente a 380x.
UGC 422	gx	00h39m43s	+09°00.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole; a 380x appare a tratti poco allungata ~ da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo puntiforme visibile ogni tanto.
UGC 425	gx	00h40m11s	+22°43.0'		And	24"	m. buona / buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente abbastanza più brillante verso l'interno di luce, poco diffusa, rotonda con Ø < 40" — 450x.
UGC 428	gx	00h40m28s	+29°33.3'		And	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; a 1' verso S c'è la **MAC 0040+2932** — 495x.
UGC 429	gx	00h40m51s	+06°55.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina a 1' verso S e una doppia stretta a 1' NW — 380x.
UGC 431	gx	00h40m41s	+30°09.7'		And	16"	buona / m. buono	molto debole, rotonda, diffusa, con condensazione centrale abbastanza evidente e Ø di ~ 30"; c'è una stellina a 1' scarso verso SE — 270x.
UGC 433	gx	00h41m04s	+31°44.0'		And	16"	buona / m. buono	debolissima lama di luce appena più evidente al centro, ma osservabile solo in visione distolta; è orientata da E a W ed estesa almeno 1.5' — 270x.
UGC 435	gx	00h41m00s	−01°37.9'		Cet	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto allungata ~ da NE a SW, con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme, salvo una condensazione centrale molto tenue visibile a tratti in a 380x; si vede facilmente la stellina situata a 1' SW.
UGC 439	gx	00h41m21s	−01°42.9'	q 216	Cet	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, con Ø di 45", poco diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 380x.
UGC 444	gx	00h42m05s	+36°48.2'		And	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 451	gx	00h42m24s	+18°49.3'		Psc	16"	ottima / mediocre	debolissimo oggetto rotondo, molto diffuso, con tenue condensazione centrale, Ø di 30"-35", situato a ridosso NE di una stellina abbastanza brillante — 270x.
UGC 455	gx	00h42m36s	−01°59.7'		Cet	24"	buona / buono	presenta un nucleo diffuso evidente e un tenuissimo alone grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi che si stempera nella luce di una stella brillante al bordo meridionale — 400x.
UGC 465	gx	00h43m51s	+32°51.2'		And	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" con bulge abbastanza brillante ed evidente a 380x; è allineata con 2 debolissime stelline ravvicinate e orientate in direzione E-W.
UGC 466	gx	00h43m52s	+00°48.1'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; c'è una debole stellina subito a W — 450x.
UGC 469	gx	00h44m04s	+26°12.4'		And	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole, a momenti poco più brillante all'interno, orientata da NW a SE ed estesa 1' — 450x.
UGC 470	gx	00h44m13s	+26°50.7'		And	24"	buona / buono	relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", con tenue bulge diffuso e poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso S — 450x.
UGC 471	gx	00h44m42s	+45°25.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa ed estesa sì e no una 30-ina di secondi, e oltretutto disturbata da una stellina a ridosso W e da un'altra più brillante subito a S — 450x.
UGC 472	gx	00h44m54s	+16°56.3'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima, a tratti in visione distolta appare abbastanza chiaramente allungata da NW a SE per una distanza pari a quella delle 2 stelline situate 3' a SE, ossia 1'; meglio osservabile a 340x.
UGC 477	gx	00h46m13s	+19°29.4'	q 126	Psc	16"	m. buona / discreto	appare a tratti come una debolissima lama di luce di luminosità uniforme e orientata all'incirca N a S ed estesa ~ 1.5' — 270x.
UGC 478	gx	00h46m25s	+30°14.3'		And	16"	buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15" e con bulge diffuso appena più evidente — 380x.
UGC 479	gx	00h46m29s	+31°48.6'		And	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, con condensazione centrale evidente, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 480	gx	00h46m31s	+36°19.6'		And	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 519-12** situata 1.5' a E — molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di 1' e con condensazione centrale poco contrastata; a tratti sembra di aspetto un po' irregolare quando si scala a 340x, mentre è più uniforme a 450x.
UGC 483	gx	00h46m50s	+26°28.5'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×20"; la visione non migliora scalando a 340x.
UGC 484	gx	00h46m56s	+32°40.5'		And	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30" e con tenue bulge diffuso appena accennato; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 380x.
UGC 488	gx	00h47m19s	+14°42.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma si riesce a trovare facilmente a 380x; è rotonda, di luminosità pressoché uniforme, con Ø di 35"-40"; situata tra 2 stelline distanti 6' in direzione NE-SW.
UGC 492	gx	00h48m05s	−01°33.9'		Cet	24"	buona / buono	presenta un nucleo stellare molto marcato all'interno di un piccolo bulge rotondo; in visione distolta si "allunga" abbastanza chiaramente da NW a SE con dimensioni di ~ 45"×30" (la gx è stranamente più disturbata dal suo stesso nucleo che dalla SAO 128960 di 9ª grandezza situata 3.5' a SW — 450x.
UGC 495	gx	00h47m08s	+30°20.5'		And	16"	buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce estesa un paio di primi in direzione N-S e appena percettibile in visione distolta — 380x.
UGC 496	gx	00h48m30s	+01°21.2'		Cet	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con PGC 93078 situata a ridosso verso E — a 340x sembra di vedere, a prima vista, un unico oggetto orientato da E a W; a 450x si notano abbastanza distintamente 2 deboli oggetti diffusi, leggermente condensati e di aspetto simile, rotondi con Ø < 30"; il nucleo della PGC è poco più evidente.
UGC 500	gx	00h48m48s	+11°22.2'		Psc	16"	buona / ottimo	elusiva macchiolina visibile solo a tratti in visione distolta a 270x (a 380x sparisce del tutto!).
UGC 501	gx	00h49m02s	+28°13.1'		And	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da WNW a ESE (come le 2 stelline brillanti a NE) ed estesa ~ 1'; ci sono 2 stelline appena percettibili: una a ridosso E e l'altra poco discosta a ESE (ossia sul prolungamento dell'asse della gx) meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 505	gx	00h49m26s	−01°46.3'		Cet	24"	m. buona / buono	appare come "soffocata" da una stellina brillante situata nel mezzo (non può trattarsi del nucleo!); osservando a 450x in visione distolta e facendo il confronto con una stellina di luminosità simile situata 3' a W si nota che il presunto "appannamento" non è tale ma appartiene effettivamente alla gx, grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a meno di 1' verso NE.
UGC 506	gx	00h49m39s	+22°56.0'		And	16"	ottima / mediocre	è un ovale relativamente facile, orientato da N a S, di dimensioni 60"×45" e con bulge diffuso ed evidente — 270x.
UGC 507	gx	00h49m36s	+01°07.0'		Cet	24"	buona / discreto	è una debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NW a SE e che in visione distolta appare estesa almeno 1.5'; c'è una stellina a 1' N — 450x.
UGC 510	gx	00h49m58s	+21°43.2'		And	24"	buona / m. buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S; in visione distolta pare estesa per 1'; c'è una stellina a ridosso NE e una brillante subito a N — 450x.
UGC 511	gx	00h38m51s	+31°32.6'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 450x.
UGC 512	gx	00h50m03s	+07°55.1'		Psc	16"	buona / ottimo	è una debolissima macchia lattescente di luminosità uniforme ed estesa una 40-ina di secondi situata a ridosso SW di una debole stellina — 380x.
UGC 513	gx	00h50m23s	+11°42.6'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' verso N — 400x.
UGC 514	gx	00h50m43s	+00°26.0'		Cet	24"	buona / discreto	molto debole e piuttosto spampanata, di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelle brillanti e sbilanciate a 4' NNW: la più luminosa è la SAO 109496 di 8ª grandezza che disturba un po' l'osservazione.
UGC 517	gx	00h50m41s	+11°21.1'		Psc	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e piccola condensazione centrale evidente — 400x.
UGC 518	gx	00h50m50s	+30°09.8'		Psc	16"	buona / m. buono	debolissima, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è situata sul lato meridionale di un triangolo equilatero formato da 3 stelline di luminosità uniforme crescente (cominciando da quella a W); meglio visibile a 270x.
UGC 520	gx	00h51m10s	+17°44.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di forma indistinta, estesa una 40-ina di secondi e con condensazione centrale visibile solo a momenti; poco meglio evidente scalando a 340x.
UGC 521	gx	00h51m12s	+12°01.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma sembra di aspetto un po' confuso, piccola, estesa non più di 30"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
UGC 522	gx	00h51m27s	+40°43.5'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti 1.5' a NE — 450x.
UGC 524	gx	00h51m35s	+29°24.0'		Psc	28"	m. buona / discreto	molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare marcato; situata tra una stellina abbastanza brillante al bordo SE e una più debole a quello opposto — 495x.
UGC 525	gx	00h51m35s	+29°42.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di ~ 1; c'è una debole stellina a 1' S e un'altra percettibile solo a momenti più o meno alla stessa distanza verso N; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 526	gx	00h51m44s	+03°10.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma; non sembra comunque più estesa di 20" — 450x.
UGC 527	gx	00h51m50s	+03°06.4'		Psc	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza di aspetto confuso, appare a tratti orientata da N a S ed estesa ~ 1', ma occorre scalare a 340x.
UGC 529	gx	00h52m12s	+29°40.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge evidente — 450x.
UGC 530	gx	00h52m14s	+44°19.9'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", con bulge evidente e diffusa alle estremità N e S; c'è una stellina brillante a 1' E — 450x.
UGC 531	gx	00h52m05s	+02°25.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 535	gx	00h52m31s	+26°07.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	è una tenuissima chiazza di forma indistinta che sembra aggettare a N da una stellina brillante (la quale fa parte di una losanga a 4 componenti); non sembra più estesa di 30" — 450x.
UGC 537	gx	00h52m34s	+06°00.1'		Psc	24"	buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, rotonda con Ø non superiore a 20".
UGC 538	gx	00h52m40s	+06°03.0'		Psc	24"	buona / buono	più facile di UGC 537, dalla quale dista 3' a NNE, ma comunque molto debole, è diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante subito a NE; anche in questo caso la visione è migliore a 340x.
UGC 539	gx	00h52m54s	+41°58.2'		And	24"	buona / discreto	molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W e una più debole poco più distante verso NW — 450x.
UGC 540	gx	00h52m58s	+29°01.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
UGC 542	gx	00h53m26s	+29°16.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole, orientata grosso modo da N a S per un paio di primi scarsi e con bulge appena accennato; c'è una stellina a 45" verso E — 380x.
UGC 544	gx	00h53m33s	+02°55.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa oltre 1'; c'è una stellina a NE, in pratica sul prolungamento dell'asse della gx — 450x.
UGC 545	st?	00h53m35s	+12°41.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	nella posizione riportata si vede solo una stella senza alcuna traccia di nebulosità — 380x.
UGC 546	gx	00h53m42s	+18°05.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso S — 450x.
UGC 547	gx	00h53m55s	+24°46.3'		Psc	24"	buona / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso SE e un'altra della stessa luminosità a 1' verso E — 450x.
UGC 548	gx	00h24m23s	+31°39.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	chiazza rotonda di ~ 1' di Ø, molto debole e diffusa e di luminosità uniforme; meglio osservabile a 270x.
UGC 554	gx	00h54m47s	+28°43.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, ma facilmente visibile in visione distolta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 555	gx	00h54m49s	+28°52.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	più facile di UGC 554 e di dimensioni analoghe, orientata da NE a SW, con piccolo bulge ben evidente di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 556	gx	00h54m50s	+29°14.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina a 1' S; è tuttavia meglio definita scalando a 340x.
UGC 557	gx	00h54m47s	+31°21.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 558	gx	00h54m49s	+10°32.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta si vede abbastanza chiaramente che è allungata da NE a SW con dimensioni ~ 40"×20", ma bisogna spingere a 380x.
UGC 563	gx	00h55m00s	+01°22.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 564	gx	00h55m14s	+36°26.1'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
UGC 566	gx	00h55m18s	+31°43.8'		Psc	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 567	gx	00h55m19s	+31°45.0'		Psc	24"	m. buona / buono	poco diffusa, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"× 20" e con nucleo stellare ben contrastata; c'è una stellina una 30-ina di secondi verso N.
UGC 568	gx	00h55m09s	−01°02.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø 45"; meglio definita scalando a 340x.
UGC 570	gx	00h55m54s	−00°55.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 571	gx	00h55m59s	+12°07.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto molto piccolo, orientato da N a S con dimensioni 30"×15"; salta fuori in visione distolta a 270x a meno di 1' E di una stellina; c'è un asterismo irregolare di 8 stelline a 8' SE.
UGC 575	gx	00h56m09s	+31°04.4'		Psc	28"	m. buona / discreto	molto debole e relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10" — 495x.
UGC 578	gx	00h56m21s	+39°49.6'		And	24"	buona / discreto	relativamente brillante, poco diffusa e gradatamente più brillante al centro, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; è situata all'interno di un piccolo trapezio di stelline — 450x.
UGC 579	gx	00h56m16s	−01°15.3'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, leggermente più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×40" — 380x.
UGC 580	gx	00h56m23s	+13°52.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	assieme a UGC 582 forma una coppia di gx molto difficili, distanti 1' in direzione NE-SW; la 1ª è poco più evidente (di fatto è la prima che appare), rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la 2a, pure circolare, sembra leggermente più estesa; sono meglio evidenti scalando a 340x, ma in questo modo diventa più problematico tenere fuori dal campo la SAO 92159 di 6ª grandezza situata a meno di 6' NNW della coppia.
UGC 581	gx	00h56m28s	+11°51.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un oggetto elusivo, molto piccolo che appare solo a tratti a 380x a poco più di 1' N di una stellina; in visione laterale salta fuori prima quella debolissima stellina situata 40" SE.
UGC 582	gx	00h56m21s	+13°51.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	v. **UGC 580**
UGC 583	gx	00h56m26s	−01°15.8'		Cet	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 40" — 380x.
UGC 585	gx	00h56m45s	+27°00.6'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme; a prima vista sembra rotonda, mentre in visione distolta si capisce che è orientata da E a W con dimensioni 45"×30"; forma una coppia abbastanza ravvicinata con MCG+4-31-21 situata 1' a NE — 450x.
UGC 587	gx	00h56m57s	−01°12.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (fa parte dell'ammasso **AGC 119**) — 450x.
UGC 588	gx	00h57m02s	−00°52.5'		Cet	24"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso NW — 450x.
UGC 590	gx	00h57m05s	+14°54.5'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30". A 8.5' verso S c'è la quasar **0054+144** visibile come una stellina molto debole — 400x.
UGC 591	gx	00h57m20s	+23°53.4'		And	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; è situata in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti distanti 2.5' e orientate da NW a SE; meglio osservabile a 270x.
UGC 595	gx	00h57m35s	−01°23.5'		Cet	24"	m. buona / buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' verso ENE — 450x.
UGC 596	gx	00h57m40s	+08°05.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare — 450x.
UGC 598	gx	00h57m50s	+31°29.1'		Psc	16"	buona / m. buono	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 70"×35" con bulge diffuso poco contrastato sul disco; c'è una stellina a 1.5' SW (sul prolungamento dell'asse della gx) — 270x.
UGC 599	gx	00h57m45s	−00°25.1'		Cet	24"	buona / discreto	forma in realtà una coppia serrata con MAC 0057-0024; si separano facilmente a 450x; UGC è relativamente facile, rotonda con Ø di, poco diffusa, con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza contrastato; la MAC è debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15".
UGC 600	gx	00h58m24s	+48°39.7'		Cas	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso N; altre due stelline più brillanti si trovano a ridosso rispettivamente a SE e a SW — 450x.
UGC 602	gx	00h58m23s	+36°43.8'		And	16"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×50"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo occidentale — 270x.
UGC 603	gx	00h58m25s	+11°33.5'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 30"; appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 435-28 un paio di primi a NNE, ma bisogna scalare a 340x, perché il campo circostante è totalmente depleto; un elusivo nodulo diffuso appena percettibile a ridosso NE è risultato essere **PGC 1395486**.

UGC 605	gx	00h58m34s	+22°19.2'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta in mezzo a 2 stelline: una a S e una doppia serrata a N; solo a momenti appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
UGC 607	gx	00h58m45s	+12°44.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme, con Ø di ~ 30", situata 1.5' N si una stellina — 380x.
UGC 608	gx	00h59m03s	+48°01.1'		Cas	24"	m. buona / ottimo	è un tenuissimo baffo di luce che in visione distolta appare orientato da NW a SE ed esteso una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E; meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 610	gx	00h58m51s	+12°58.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con condensazione centrale abbastanza evidente a 380x; c'è una stellina a 1' SE.
UGC 612	gx	00h59m01s	+23°51.2'		Psc	16"	ottima / buono	relativamente facile, allungata da E a W con dimensioni 40"×20", poco diffusa e appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 614	gx	00h59m36s	+35°36.6'		And	16"	ottima / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 60"×45"; c'è una stellina a 1' verso E; meglio scalare a 270x.
UGC 615	gx	00h59m40s	+15°19.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale visibile a 270x; c'è una stellina a 45" NE.
UGC 616	gx	00h59m39s	+18°50.6'		Psc	16"	ottima / buono	è una debolissima macchiolina molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 30"; appare in visione distolta a ridosso N di una stellina brillante; forse meglio visibile a 270x.
UGC 617	gx	00h59m49s	+18°00.5'		Psc	16"	ottima / buono	debole, stemperata ai bordi e di aspetto un po' confuso a 380x; anche questa è probabilmente rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e piccola condensazione centrale.
UGC 618	gx	00h59m42s	+00°55.0'		Cet	24"	buona / discreto	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante a 1' W; meglio definita scalando a 340x, anche se così diventa più difficile tenere fuori campo una doppia stretta sbilanciata, ma dalle componenti brillanti situata a meno di 6' W.
UGC 620	gx	01h00m05s	+17°59.3'		Psc	16"	ottima / buono	debolissima, molto piccola e relativamente compatta; appare a tratti a 380x orientata da N a S e dimensioni ~ 30"×15".
UGC 621	gx	01h00m11s	+18°17.0'		Psc	24"	buona / m. buono	sarebbe una gx tutto sommato facile da vedere se non fosse molto disturbata dalla SAO 92194 di 7ª grandezza situata 5' a S; poco diffusa e appena più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 50"×25" — 450x.
UGC 622	gx	01h00m28s	+47°59.7'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S (è un po' difficile tenere fuori campo la SAO 36829 di 7ª grandezza situata 5' a ENE) — 450x.
UGC 626	gx	01h00m38s	−01°41.9'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, purtroppo molto disturbata dalla SAO 129076 di 7ª grandezza situata ad appena 2.5' NNE; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 627	gx	01h01m00s	+13°28.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di 30"-35" — 380x.
UGC 629	gx	01h01m02s	+29°36.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso — 270x.
UGC 632	gx	01h01m11s	+30°07.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", poco diffusa e con tenue condensazione centrale poco contrastata sul disco; c'è una stellina brillante a 1' NW — 270x.
UGC 633	gx	01h01m22s	+31°30.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce molto tenue e di luminosità uniforme, orientata da N a S e che in visione distolta appare estesa di 1' — 380x.
UGC 634	gx	01h01m25s	+07°37.5'	q 172	Psc	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore di luminosità uniforme, molto stemperato sul fondo cielo; a tratti in visione distolta appare orientato da NNE a SSW (ossia come le 2 stelline in mezzo alle quali si trova la gx) con dimensioni 60"×45"; meglio osservabile a 188x.
UGC 635	gx	01h01m44s	+46°39.9'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
UGC 636	gx	01h01m42s	+24°03.5'		Psc	24"	buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e con condensazione centrale abbastanza marcata, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è situata al vertice rettangolo di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline brillanti distanti un paio di primi in direzione NW-SE — 450x.
UGC 638	gx	01h02m05s	+26°57.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' e un tenue nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 450x.
UGC 640	gx	01h02m16s	+09°05.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
UGC 642	gx	01h03m57s	+80°39.5'		Cep	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 643	gx	01h03m06s	+24°58.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a poco più di 1' SE di una stellina — 450x.
UGC 644	gx	01h03m19s	+14°02.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MCG+2-3-27 situata 45" SE; entrambe sono debolissime, ma si riescono a sdoppiare abbastanza facilmente anche a 270x; la 1ª è orientata da NE a SW con dimensioni ~ 45"×30"; la 2ª è molto più piccola, ma ha una luminosità specifica più alta, orientata da N a S con dimensioni 30"×15".
UGC 646	gx	01h03m26s	+32°14.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con piccola condensazione centrale evidente di aspetto quasi stellare; c'è una stellina al margine W e un'altra molto debole poco più a N — 380x.
UGC 647	gx	01h03m22s	−01°30.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; è meglio definita scalando a 340x nonostante la vicinanza della SAO 129095 di 9ª grandezza, situata ad appena 1' NE, che disturba palesemente l'osservazione.
UGC 648	gx	01h03m24s	+01°52.6'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme e di forma indistinta, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
UGC 649	gx	01h03m35s	+06°25.0'		Psc	24"	m. buona / buono	allungata da N a S, di dimensioni 70"×30" e con tenue bulge diffuso; c'è una stellina abbastanza brillante subito a E — 400x.
UGC 650	gx	01h03m34s	+08°34.5'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; la visione è disturbata dalla SAO 109634 di 8ª situata a neppure 3' NW (e che quindi non si può tenere fuori campo neppure a 450x).
UGC 651	gx	01h03m39s	−00°29.5'		Psc	24"	ottima / ottimo	debolissima, solo in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×20", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 654	gx	01h03m59s	+21°13.5'		Psc	24"	buona / m. buono	presenta un piccolo bulge molto luminoso circonfuso da un alone estremamente tenue e stemperato sul fondo cielo esteso una 40-ina di secondi; il nucleo della gx forma un piccolo arco con 2 stelline brillanti, a NNW e a N — 450x.
UGC 655	gx	01h04m01s	+41°50.5'		And	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di ~ 45"; poco meglio evidente scalando a 340x; c'è un parallelogramma regolare di 4 stelline della stessa luminosità subito a W.
UGC 656	gx	01h03m45s	+02°17.0'		Cet	16"	ottima / ottimo	è ancora più debole di UGC 654, ma a tratti in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni ~ 30"×15" e di luminosità uniforme; meglio tuttavia scendere a 270x.
UGC 657	gx	01h03m59s	+32°57.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza estesa sì e no 30", appare elusivamente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; c'è una stellina molto debole subito a SW.
UGC 658	gx	01h04m05s	+35°56.9'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima chiazza forse rotonda di 30" o 40" di Ø, molto disturbata da una stella brillante quasi a ridosso verso W; quest'ultima fa parte di un triangolo di stelle brillante che aggravano la visione; c'è piccolo asterismo di 5 stelline 4' a N — 270x.
UGC 659	gx	01h04m19s	+18°41.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa ~ 1'; purtroppo è disturbata da una stellina brillante situata 1' a SW — 450x.
UGC 661	gx	01h04m17s	−01°04.5'		Cet	24"	buona / discreto	facile, molto diffusa allungata da E a W, di dimensioni 50"×25" e con nucleo stellare molto brillante — 450x.
UGC 664	gx	01h04m44s	+09°52.9'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø max di 30" — 380x.
UGC 665	gx	01h04m52s	+42°12.7'		And	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N e una debole dalla parte opposta; una stellina luminosa poi si trova a 1' NE (le 2 brillanti fanno parte di un triangolo rettangolo molto allungato da N a S); poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 669	gx	01h05m19s	+31°40.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1.5'; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 670	gx	01h06m50s	+75°36.0'		Cas	16"	ottima / m. buono	e un piccolo oggetto molto debole e di luminosità uniforme, di aspetto un po' irregolare, ma approssim. rotondo con Ø di 30"-35" — 380x.
UGC 672	gx	01h06m18s	+44°57.2'		And	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a tratti in visione distolta, ma tutto sommato non conviene scalare gli ingrandimenti; la forma è indistinta, ma non sembra più estesa di una 30-ina di secondi; c'è una doppia serrata a 1.5' SE e una coppia di stelline alla stessa distanza verso NW; una stellina abbastanza brillante si trova a 1' NE, mentre un'altra percettibile soltanto a momenti è a ridosso S della gx (ma solo quando appare) — 450x.
UGC 674	gx	01h06m21s	+21°22.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi, molto stemperata sul fondo cielo; la visione non migliora scalando a 340x.
UGC 676	gx	01h06m10s	+01°14.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto diffuso e con nucleo stellare evidente (di fatto è la prima cosa che salta fuori in visione diretta); in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 677	gx	01h06m26s	+14°34.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma visibile senza problemi a 380x anche in visione diretta, rotonda con Ø di 30"-40" e di luminosità uniforme.
UGC 678	gx	01h06m14s	+03°34.5'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×45", non appare più contrastata scalando a 340x.
UGC 685	gx	01h07m22s	+16°41.1'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, ma visibile facilmente in visione distolta; è allungata da NW a SE con dimensioni 2'×1' e di luminosità uniforme; meglio tuttavia scalare a 188x, in quanto la visione è meno confusa.
UGC 690	gx	01h07m33s	+39°24.0'		And	24"	buona / discreto	debole chiazza lattiginosa molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 1' situata tra una stellina brillante a NE e una coppia di stelline più deboli a SW; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 692	gx	01h07m37s	+32°56.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore rotondo con Ø di 45" e di luminosità uniforme; è relativamente facile in visione distolta a 270x.
UGC 694	gx	01h07m32s	+02°11.0'		Cet	24"	m. buona / buono	fa parte del gruppo denominato AGC 147 — molto debole, diffusa e a tratti legger-mente condensata, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
UGC 695	gx	01h07m46s	+01°03.8'		Cet	24"	buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una doppia stretta a 2.5' SE; meglio contrastata a 340x.
UGC 696	gx	01h08m04s	+21°07.2'		Psc	16"	ottima / buono	debole oggetto rotondo con Ø di 30", poco diffuso e poco più brillante all'interno; c'è una stellina abbastanza brillante a ~ 40" verso SW — 380x.
UGC 697	gx	01h08m05s	+33°27.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 380x.
UGC 698	gx	01h07m56s	+02°32.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa almeno 1'; c'è una debole stellina subito a N — 450x.
UGC 701	gx	01h08m12s	+02°11.6'		Cet	24"	m. buona / buono	fa parte del gruppo AGC 147 — molto debole e disturbata da una stellina brillante situata al bordo NE; è rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 705	gx	01h08m25s	+06°29.0'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; relativamente facile in visione distolta, ma è meglio visibile scalando a 340x (era elusiva nel 16" a 270x).
UGC 706	gx	01h88m24s	+08°20.9'		Psc	16"	ottima / buono	piccola, debolissima e diffusa, estesa sì e no una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta a un paio di primi verso W — 380x.
UGC 708	gx	01h08m34s	+16°54.0'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole, rotonda e di luminosità uniforme e con Ø di ~ 40"; a S c'è una coppia di stelline brillanti distanti 1' — 380x.
UGC 709	gx	01h08m40s	+01°21.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, a tratti molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 45"×15".
UGC 710	gx	01h08m44s	+33°27.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 60"×20"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina brillante a 1.5' SE.
UGC 711	gx	01h08m37s	+01°38.5'	q 217	Cet	16"	buona / buono	è una lama di luce molto debole orientata da NW a SE, di luminosità uniforme e che in visione distolta appare estesa per un paio di primi; è situata quasi a ridosso W di una stella brillante di 9ª grandezza riportata sull'Uranometria — 270x.
UGC 714	gx	01h09m14s	+32°09.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	chiazza pressoché circolare, molto debole e diffusa con Ø di 45" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 717	gx	01h09m22s	+14°20.5'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 60"×45" e con condensazione centrale quasi stellare visibile a 380x; a poco più di 1' SE appare a tratti un'altra debolissima galassietta diffusa ed estesa per non più di una 20-ina di secondi; questa è risultata poi essere la MAC 0109+1419B.
UGC 719	gx	01h09m29s	+14°21.8'		Psc	16"	m. buona / m. buono	salta fuori facilmente in visione distolta, debole, rotonda con Ø di ~ 30" e condensazione centrale visibile a tratti 380x.
UGC 720	gx	01h09m18s	+02°12.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e con condensazione centrale appena evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o poco più — 450x.
UGC 722	gx	01h09m46s	+13°18.5'		Psc	24"	m. buona / buono	debole macchia molto stemperata sul fondo cielo, di forma indistinta e grosso modo estesa per 1' scarso; c'è una stellina appena percettibile al bordo orientale — 400x.
UGC 724	gx	01h09m59s	+32°22.1'		Psc	16"	m. buona / discreto	relativamente facile, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
UGC 725	gx	01h10m11s	+43°06.6'		And	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina subito a S; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 726	gx	01h09m57s	−01°45.0'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; occorre tuttavia scalare a 340x in quanto a 450x è di aspetto alquanto confuso.
UGC 728	gx	01h10m29s	+43°17.3'		And	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare poco allungata da E a W, di dimensioni grosso modo 60"×45" e con bulge esteso appena percettibile; meglio definita scalando a 340x.
UGC 731	gx	01h10m42s	+49°36.0'		Cas	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza, orientata da E a W e compresa grosso modo tra una doppia serrata a E e una stellina appena percettibile a W; appare solo a momenti, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 732	gx	01h10m44s	+33°33.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata a 270x; c'è una stellina brillante a 1' verso N e un'altra più debole 1' a W.
UGC 733	gx	01h10m39s	+16°35.8'		Psc	24"	buona / buono	piccola, molto debole e poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø poco superiore a 20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N (il campo è insolitamente ricco di stelle brillanti) — 450x.
UGC 734	gx	01h10m38s	−00°16.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' verso N — 450x.
UGC 736	gx	01h10m49s	−01°45.4'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 738	gx	01h11m05s	+33°50.2'		And	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore molto diffuso, forse rotondo con Ø di una 40-ina di secondi; appare stranamente con meno difficoltà a 380x.
UGC 741	gx	01h11m09s	+08°46.5'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debole, rotonda, appena più brillante all'interno, poco diffusa e con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 742	gx	01h11m17s	+31°44.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva macchiolina rotonda di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi, appare solo a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x.
UGC 743	gx	01h11m18s	+31°53.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e poco più luminosa all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; poco disturbata da una stellina abbastanza brillante al bordo W — 450x.
UGC 746	gx	01h11m36s	+49°07.3'		Cas	16"	ottima / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con piccolo bulge abbastanza marcato ed evidente; c'è una coppia di stelline a SW distanti ~ 0.5' e orientate da N a S — 380x.
UGC 747	gx	01h11m23s	+01°16.7'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; è disturbata dalla luce di una stellina abbastanza brillante che si trova a meno di 1' SE — 450x.
UGC 748	gx	01h11m44s	+35°16.5'		And	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma a tratti appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
UGC 749	gx	01h11m31s	+01°19.3'		Cet	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge molto diffuso — 450x.
UGC 751	gx	01h12m00s	+17°18.6'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E. Ci sono alcune galassiette molto deboli nello stesso campo oculare (vedi) — 450x.
UGC 753	gx	01h12m05s	−00°14.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso NW.
UGC 755	gx	01h12m39s	+38°30.3'		Psc	16"	m. buona / discreto	appare in visione distolta come una sorta di alone circolare di luminosità uniforme che aggetta verso W da una stellina brillante; un'altra stella di eguale magnitudo si trova a 1.5 WSW — 270x.
UGC 756	gx	01h12m43s	+32°58.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SE; meglio osservabile a 270x.
UGC 757	gx	01h12m34s	+00°17.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso; è stranamente meglio evidente restando a 450x.
UGC 768	gx	01h13m10s	+02°17.3'		Cet	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale visibile solo a tratti; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SE — 450x.
UGC 769	gx	01h13m17s	+12°46.3'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
UGC 771	gx	01h13m42s	−00°06.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; situata in mezzo a 2 stelline: una abbastanza brillante a 1' WNW e l'altra appena percettibile alla stessa distanza verso ESE — 450x.
UGC 773	gx	01h13m43s	+02°22.3'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, con tenue condensazione centrale visibile a tratti, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 774	gx	01h13m51s	+13°16.3'		Psc	16"	ottima / buono	è un debole oggetto grosso modo rotondo, poco diffuso, con Ø max di 30" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 777	gx	01h14m11s	+42°14.4'		And	28"	m. buona / m. buono	debole chiazza rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso N; situata tra 2 stelline abbastanza brillanti orientate da NNE a SSW — 495x.
UGC 780	gx	01h14m15s	+37°57.4'		And	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10"; situata a S di un gruppo eterogeneo di forma triangolare formato da 8 stelline brillanti — 495x.
UGC 781	gx	01h14m07s	+38°07.3'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa ~ 1'; è situata tra due stelline distanti un paio di primi e orientate grosso modo a perpendicolo con l'asse della gx — 450x.
UGC 783	gx	01h14m26s	+42°33.4'		And	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×40"; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 784	gx	01h14m04s	−01°44.5'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; qualche lieve screziatura appare a tratti a 450x.
UGC 785	gx	01h14m15s	+15°53.9'		Psc	16"	ottima / buono	piccola e molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 30" — 380x.
UGC 790	gx	01h14m37s	+01°10.8'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e con bassa luminanza superficiale, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 791	gx	01h14m38s	+01°49.8'		Cet	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 793	gx	01h14m49s	−00°29.7'		Cet	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; a 450x si nota, seppur a tratti, una tenuissima protrusione verso E; la stessa impressione è stata confermata anche a 570x: da un controllo successivamente effettuato questo è risultato essere la MAC 0114-0029A.
UGC 795	gx	01h14m59s	+12°22.8'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' SE e una più debole a 1.5' SW; una brillante stella di 10ª si trova a 3.5' verso N — 400x.
UGC 797	gx	01h14m58s	+00°25.9'		Cet	24"	buona / discreto	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 800	gx	01h15m19s	+28°29.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; appare solo in visione distolta a 270x.
UGC 803	gx	01h15m23s	+08°06.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta a 340x a ~ 1' SE di una stellina molto debole (c'è però da dire che il campo è anche disturbato dalla SAO 109759 situata a 5' SW).
UGC 807	gx	01h15m35s	−00°50.9'		Cet	24"	m. buona / buono	è una sorta di debole "protuberanza" che si estende a NE di NGC 450, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 808	gx	01h15m38s	+09°18.4'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, forse rotonda con Ø > di 1'; a 380x si nota una stellina appena percettibile a ridosso verso E; la gx è tuttavia meglio visibile a 270x.
UGC 809	gx	01h15m52s	+33°48.7'		And	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 811	gx	01h16m04s	+37°38.9'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
UGC 813	gx	01h16m16s	+46°44.5'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo ESE; forma una coppia ravvicinata con UGC 816 situata 1' a ENE — 450x.
UGC 814	gx	01h16m08s	+41°08.5'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza forse circolare ed estesa sì e no una 30-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta subito a N di una stellina brillante (quest'ultima è la componente centrale di un asterismo formato da 5 stelline abbastanza luminose — 450x.
UGC 816	gx	01h16m21s	+46°44.8'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, presenta una zona centrale tenue orientata da N a S, estesa una 40-ina di secondi e due baffi appena percettibili che aggettano verso E e W; forma una coppia ravvicinata con UGC 813 situata 1' a WSW — 450x.
UGC 817	gx	01h16m06s	+01°34.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 822	gx	01h16m26s	+39°03.2'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" (a 340x sembra di fatto poco più evidente all'interno); c'è una coppia di stelline; quasi allineata ed equidistante con una coppia di stelline brillanti di 9ª grandezza a N — 450x.
UGC 824	gx	01h16m59s	+13°01.4'		Psc	16"	ottima / buono	in visione distolta appare posta praticamente di taglio ed estesa quasi 2' in direzione E-W; presenta un nucleo stellare ben evidente sia a 270x, sia a 380x.
UGC 826	gx	01h17m39s	+43°38.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina molto debole subito a N; una coppia di stelline brillanti si trova a 1.5' NW — 450x.
UGC 827	gx	01h17m28s	+14°42.2'		Psc	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 0117+1442 situata a ridosso ESE; quest'ultima sembra addirittura più evidente, con condensazione centrale visibile a tratti; sono comunque di aspetto simile, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
UGC 828	gx	01h17m45s	+21°25.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
UGC 830	gx	01h17m52s	−01°57.4'		Cet	24"	m. buona / buono	è una chiazza circolare molto debole, stemperata sul fondo cielo di luminosità uniforme e con Ø di almeno 1'; forma piccolo triangolo equilatero con 2 deboli stelline, una a 1.5' E e l'altra a 1.5' SSE; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 831	gx	01h18m10s	+38°26.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare un po' più contrastata scalando a 188x.
UGC 833	gx	01h18m09s	+11°22.9'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, allungata da NE a SW con dimensioni di 2'×1'; a 270x pare appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina a poco più di 1' verso NW.
UGC 834	gx	01h18m24s	+04°45.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 835	gx	01h18m40s	+31°02.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	altra debolissima gx molto diffusa, grosso modo rotonda e di aspetto simile a UGC 800 — 270x.
UGC 836	gx	01h19m59s	+44°17.2'		And	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' SE; 3 debolissime stelline poste ad arco si trovano invece subito a N: quella centrale è la più evidente, mentre le altre due sono percettibile solo a momenti — 450x.
UGC 837	gx	01h18m32s	−01°11.8'		Cet	24"	buona / discreto	è un debolissimo ovale diffuso e di luminosità uniforme che in visione distolta appare a tratti orientato da N a S con dimensioni 30"×20"; si trova al vertice occidentale di un triangolo rettangolo formato con 2 stelline brillanti — 450x.
UGC 838	gx	01h18m46s	+14°59.6'		Psc	16"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda, di 1' scarso di Ø e gradatamente più brillante verso l'interno; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelline (a SSE e WSW) — 380x.
UGC 841	gx	01h19m10s	+33°01.8'		Psc	28"	m. buona / mediocre	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1'; ci sono due stelline appena percettibili a SE e SW — 291x.
UGC 842	gx	01h18m54s	−01°00.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
UGC 843	gx	01h18m57s	+05°33.4'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' verso SW — 400x.
UGC 844	gx	01h19m05s	+10°03.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	appare elusivamente in visione distolta a 450x, ma è di forma indistinta e comunque non più estesa di 20"-25".
UGC 845	gx	01h19m17s	+21°45.7'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, ma relativamente facile da vedere in visione distolta a 380x; è rotonda con Ø di 40" e presenta una piccola condensazione centrale appena percettibile.
UGC 847	gx	01h19m04s	−00°08.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da ENE a WSW ed estesa almeno 1'; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 849	gx	01h19m24s	+12°26.8'		Psc	16"	ottima / buono	debole, diffusa, poco allungata da E a W, dimensioni 60"×45" e con tenue condensazione centrale; forma una coppia ravvicinata con CGCG 436-23, situata 1' a N, che è più evidente, piccola, rotonda, con Ø di 30" e con condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 850	gx	01h19m30s	+21°09.0'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, meglio contrastata scalando a 340x, orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' SW.
UGC 851	gx	01h19m33s	+19°42.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a SSW — 450x.
UGC 853	gx	01h19m38s	+31°39.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" — 450x-
UGC 854	gx	01h19m31s	+03°54.5'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15"; poco meglio evidente scalando a 340x; allineata ed equidistante con 2 stelline a SE (quella più esterna è in coppia con un'altra di luminosità simile).
UGC 855	gx	01h19m37s	+08°10.3'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole, rotonda con Ø di ~ 40", diffusa e appena più brillante all'interno; c'è una doppia a 4' o 5' verso NNE con componenti separate più o meno dallo stesso valore con Ø — 380x.
UGC 860	gx	01h19m59s	+12°55.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme con Ø di < 30"; a 380x salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 1.5 NE di una stellina.
UGC 862	gx	01h20m13s	+33°30.4'		Psc	16"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto rotondo dai bordi sfumati con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale puntiforme — 270x.
UGC 863	gx	01h21m43s	+78°37.7'		Cep	16"	ottima / ottimo	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo; ciò che sono riuscito a vedere a 380x è probabilmente solo la zona centrale estesa non più di una 30-ina di secondi.
UGC 865	gx	01h20m12s	+14°33.7'		Psc	16"	ottima / scarso	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di 45"; presenta una condensazione centrale visibile abbastanza facilmente; c'è una stellina a ~ 1' NE — 270x.
UGC 866	gx	01h20m07s	−00°12.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 450x.
UGC 867	gx	01h20m15s	−00°20.2'		Cet	24"	m. buona / discreto	poco più evidente di UGC 866 — situata 8' più a N — diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina appena percettibile a 1' E — 450x.
UGC 873	gx	01h20m40s	+30°23.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a ridosso NW di una stellina abbastanza brillante che ne confonde un po' la forma; c'è un asterismo di 8 stelline brillanti a SW — 450x.
UGC 874	gx	01h20m46s	+01°18.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta, con bulge brillante e nucleo stellare appena percettibile, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×13"; la gx è più o meno estesa come UGC 875 e ha un rapporto degli assi di 3 a 1.
UGC 875	gx	01h20m46s	+01°26.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, solo a momenti appare leggermente condensata; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 878	gx	01h21m03s	+33°53.7'		And	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
UGC 880	gx	01h21m09s	+42°51.1'		And	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20", con tenue e piccola condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso N e una debole al bordo W — 450x.
UGC 881	gx	01h20m53s	+04°48.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole e gradatamente più brillante verso l'interno, a tratti leggermente screziata a 450x, rotonda con Ø 45".
UGC 882	gx	01h20m56s	+06°34.5'		Psc	24"	buona / buono	è una gx elusiva che in visione distolta sembra estesa per almeno 1'; salta fuori a 1.5' NE di una debole stellina, ma occorre scalare a 200x.
UGC 887	gx	01h21m09s	+05°08.5'		Psc	24"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; molto disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso NW; una debole stellina si trova invece dalla parte opposta — 450x.
UGC 889	gx	01h21m10s	+17°52.1'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente orientata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20"; non sembra meglio evidente scalando a 340x.
UGC 890	gx	01h21m08s	+01°22.4'		Psc	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30" — 450x.
UGC 891	gx	01h21m18s	+12°24.6'		Psc	16"	ottima / buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×30", ma è meglio scalare a 188x.
UGC 892	gx	01h21m17s	−00°32.7'		Cet	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale brillante — 380x.
UGC 897	gx	01h21m29s	+15°56.8'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' SE — 450x.
UGC 899	gx	01h21m37s	+20°55.2'		Psc	16"	ottima / buono	debolissima, diffusa, luminosità uniforme e con Ø max di 30"; c'è una stellina molto debole a ~ 1' verso N (si fa molta fatica a osservare a 380x, perché a quest'ingrandimento il campo è privo di riferimenti stellari validi).
UGC 901	gx	01h21m37s	+32°36.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con una stellina al bordo occidentale; situata ad appena 2.5' SW della SAO 54627 di 8.6m — 380x.
UGC 902	gx	01h21m56s	+50°02.8'		And	28"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo luminoso quasi stellare circonfuso da un alone via via più tenue, rotondo con Ø di 1' scarso — 495x.
UGC 904	gx	01h21m50s	+18°16.1'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 909	gx	01h22m01s	+37°24.1'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme che nondimeno in visione distolta appare chiaramente orientata da NE a SW con dimensioni 60"×45" — 270x.
UGC 910	gx	01h21m58s	+15°47.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	è purtroppo "annegata" nella luce della SAO 92396 di 7ª grandezza situatale quasi a ridosso verso E; in visione distolta appare comunque abbastanza facilmente, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 911	gx	01h22m10s	+32°12.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
UGC 913	gx	01h22m15s	+34°40.2'		And	16"	m. buona / m. buono	debole, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ~ 1' verso SE — 270x.
UGC 921	gx	01h22m47s	−01°23.6'		Cet	24"	buona / buono	facile, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 90"×30" e con tenue bulge diffuso, poco contrastato sul disco — 450x.
UGC 928	gx	01h23m12s	−00°38.5'		Cet	24"	buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 929	gx	01h23m14s	−00°23.1'		Cet	24"	buona / buono	molto diffusa e con bassissimo gradiente di luce, rotonda con Ø 1' (ultima gx osservata: è sorta la Luna all'ultimo quarto) — 450x.
UGC 931	gx	01h23m15s	−00°42.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, a 450x appare orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi.
UGC 933	gx	01h23m23s	+15°12.9'		Psc	24"	buona / buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 934	gx	01h23m28s	+30°47.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso verso NW — 270x.
UGC 937	gx	01h23m37s	+32°37.8'		Psc	28"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NNE — 495x.
UGC 940	gx	01h23m38s	+34°34.2'		And	16"	ottima / ottimo	è una debolissima chiazza molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi che appare in visione distolta — 380x.
UGC 941	gx	01h23m32s	+06°57.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E e una appena percettibile subito a SE — 450x.
UGC 943	gx	01h23m47s	+11°30.5'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e spampanata, in visione distolta appare chiaramente rotonda con Ø di 45" e una condensazione centrale appena percettibile; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 945	gx	01h24m00s	+43°13.6'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare appena percettibile, ma visibile solo a momenti, rotonda con Ø di 30" o poco più; ci sono 3 deboli stelline allineate ed equidistanti a SE; occorre cercar di tenere fuori campo la SAO 37177 di 6ª grandezza situata 6' a SSE — 450x.
UGC 950	gx	01h24m22s	+32°13.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	fa parte di un quartetto assieme al UGC 955, a UGC 987 e a CGCG 502-80 — debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 951	gx	01h24m15s	+01°03.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e disturbata da una stella brillante quasi a ridosso verso N; in visione distolta appare molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 955	gx	01h24m30s	+15°46.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce che appare come tale solo in visione distolta a 450x; in visione diretta si vede a momenti, ma è di aspetto un po' confuso.
UGC 958	gx	01h24m34s	+16°32.2'		Psc	24"	ottima / ottimo	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme orientata da NNE a SSW ed estesa per 1'; c'è una stellina visibile solo a momenti a ridosso verso S — 450x.
UGC 959	gx	01h24m45s	+32°09.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", con bulge rotondo abbastanza contrastato e nucleo stellare — 380x.
UGC 964	gx	01h24m35s	+07°43.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole e con basso gradiente di luce, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 967	gx	01h24m44s	+08°46.6'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio visibile scalando a 340x.
UGC 969	gx	01h24m46s	+09°45.7'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima, visibile solo a tratti in visione distolta a circa 1' di distanza NW da una stellina di 14-esima grandezza — 380x.
UGC 974	gx	01h24m54s	−01°30.0'		Cet	16"	buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 194** — è molto debole, di luminosità uniforme, orientata ~ da N a S e dimensioni 30"×20" — 380x.
UGC 975	gx	01h25m15s	+34°21.4'		And	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni ~ 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo NE e un'altra più debole quasi a ridosso verso SE; meglio tuttavia scalare a 270x.
UGC 981	gx	01h25m09s	+02°18.2'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma più che altro disturbata da una stellina brillante al bordo SW; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 450x.
UGC 984	gx	01h25m18s	−01°31.0'		Cet	16"	buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 194** — debole, orientata da NW a SE, di dimensioni simili alla 538 dalla quale dista 3' NW; è di dimensioni 40"×20" e presenta un nucleo stellare visibile senza fatica — 380x.
UGC 985	gx	01h25m23s	+14°31.2'		Psc	16"	ottima / scarso	è molto debole, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×30" e con tenue condensazione centrale visibile a tratti a 270x; si trova a S di un piccolo asterismo foggiato a "T".
UGC 987	gx	01h25m31s	+32°08.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×30", con tenue bulge diffuso e nucleo stellare — 380x.
UGC 996	gx	01h25m32s	−01°30.1'		Cet	16"	buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 194** — oggetto molto debole, che a tratti appare allungato da E a W ed esteso al massimo per una 30-ina di secondi — 380x.

UGC 998	gx	01h25m40s	+00°07.8'		Cet	24"	ottima / buono	appare piuttosto elusivamente in visione distolta a 450x; solo a momenti in visione distolta e alternando gli occhi si vede come una lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi.
UGC 1001	gx	01h25m39s	+00°26.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, meglio contrastata scalando a 340x, forse rotonda con Ø > 40".
UGC 1003	gx	01h25m44s	−01°27.4'		Cet	16"	buona / ottimo	è una piccola gx compatta, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
UGC 1006	gx	01h25m53s	+01°30.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso — 450x.
UGC 1014	gx	01h26m23s	+06°16.6'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso NW — 450x.
UGC 1020	gx	01h26m44s	+17°15.8'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; appare stranamente più confusa a 380x.
UGC 1022	gx	01h26m57s	+39°01.1'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 1023	gx	01h26m49s	+12°01.5'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, con condensazione centrale appena percettibile, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 1024	gx	01h26m55s	+13°02.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 1025	gx	01h27m06s	+18°35.9'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda, diffusa, con Ø di 40" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a poco più di 1' verso SE — 380x.
UGC 1028	gx	01h27m08s	+02°16.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccola condensazione centrale poco contrastata sul disco — 450x.
UGC 1029	gx	01h27m21s	+11°58.5'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 1030	gx	01h27m16s	−01°16.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 1031	gx	01h27m37s	+40°17.7'		And	28"	m. buona / m. buono	debole chiazza circolare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante subito a W e una doppia sbilanciata poco più distante verso NE; poco disturbata dalla SAO 37234 di magnitudo 6.6 situata 3' a NE — 495x.
UGC 1032	gx	01h27m32s	+19°10.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale abbastanza contrastata; ci sono 2 stelline quasi a ridosso della gx, a W e NW — 450x.
UGC 1033	gx	01h27m35s	+31°33.3'		Psc	16"	m. buona / discreto	in visione diretta appare solo in nucleo stellare e il bulge diffuso; in visione distolta si "allunga" molto in direzione NW-SE per un paio di primi — 270x.
UGC 1035	gx	01h27m49s	+48°49.2'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" (o poco più); c'è una stellina brillante a ridosso NE e una coppia di stelline più debole a 1' verso S *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 1037	gx	01h27m47s	+43°09.3'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×20"; 3 stelline leggermente arcuate e orientate da N a S si trovano a E della gx (quella centrale è la più debole) — 495x.
UGC 1039	gx	01h32m45s	+85º00.8'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso N e una più brillante a 1' verso S — 450x.
UGC 1040	gx	01h27m36s	−01°06.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante e compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", con bulge diffuso e contrastato — 450x.
UGC 1042	gx	01h28m06s	+49°14.5'		And	24"	m. buona / ottimo	allungata da E a W, molto diffusa alle due estremità, di dimensioni 60"×30", con piccolo nucleo abbastanza brillante e contrastato sul disco; situata tra due stelline orientate da N a S e distanti 2.5' — 450x.
UGC 1043	gx	01h27m43s	−01°08.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	più debole e diffusa di UGC 1040, orientata nello stesso modo, con dimensioni 50"×30" e con piccolo bulge abbastanza evidente.
UGC 1045	gx	01h28m00s	+32°02.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma bisogna tener fuori campo la SAO 54711 di 6ª grandezza situata 5.5' a SW; è comunque debolissima e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 380x.
UGC 1046	gx	01h28m05s	+38°12.9'		And	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto rotondo esteso max 30"; appare solo a tratti in visione distolta scalando a 188x.
UGC 1055	gx	01h28m37s	−01°43.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina a 1' scarso; una coppia di stelline brillanti con componenti orientate da NW a SE (quella a SE è una doppia molto stretta e sbilanciata) si trova un paio di primi a SW — 450x.
UGC 1056	gx	01h28m47s	+16°41.4'		Psc	16"	ottima / buono	debolissima chiazza rotonda molto diffusa ed estesa ~ 45"; è situata tra 2 stelline distanti 3' e orientate da N a S — 270x.
UGC 1057	gx	01h28m53s	+13°47.5'		Psc	16"	ottima / scarso	molto debole e disturbata dalla luce di una stella brillante situata 2.5' a N, ma è abbastanza compatta, allungata grosso modo da N a S con dimensioni 40"×20"e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 1059	gx	01h29m12s	+39°25.6'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 2 stelline a ridosso, una a N e l'altra più debole a SE; un'altra stellina si trova sempre a N, a 1.5' di distanza dalla gx — 450x.
UGC 1060	gx	01h28m56s	−01°49.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è un baffo di luce molto debole e diffuso, esteso una 40-ina di secondi e orientato da E a W; appare facilmente in visione distolta a 450x; due stelline appena percettibili a NE e a SE.
UGC 1062	gx	01h29m00s	−00°33.7'		Cet	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×25" e con nucleo quasi stellare — 380x.
UGC 1065	gx	01h29m11s	+11°08.5'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole e spampanata, di luminosità uniforme, stranamente meglio visibile a 450x; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva NGC 569 (q 173), dalla quale dista 1' verso NE; è orientata grosso modo da N a S con dimensioni 60"×30".
UGC 1068	gx	01h29m47s	+45°35.9'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×50"; c'è una stellina a ridosso E; 3 stelline allineate da NNW a SSE si trovano subito a N della gx — 450x.
UGC 1070	gx	01h30m00s	+40°58.5'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45", meglio contrastata scalando a 340x; situata a ridosso N di un piccolo triangolo equilatero di stelline.
UGC 1072	gx	01h29m44s	−01°14.5'	q 218	Cet	16"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto circolare, abbastanza compatto, di luminosità uniforme e con Ø di 20" o 30" — 270x.
UGC 1074	gx	01h30m05s	+33°18.7'		Psc	28"	m. buona / buono	debolissima chiazza molto diffusa, in visione distolta pare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline orientate da N a S a 1' SE; un'altra stellina poco più brillante si trova a poco più di 1' verso E — 495x.
UGC 1076	gx	01h30m20s	+17°01.3'		Psc	16"	ottima / scarso	debolissima, visibile in visione distolta a 270x; solo a tratti appare allungata da NW a SE per una 40-ina di secondi.
UGC 1077	gx	01h30m35s	+19°36.5'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di 30"; c'è una stellina a ridosso verso SE; meglio visibile a 380x.
UGC 1079	gx	01h31m03s	+49°03.5'		And	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia serrata di stelline sbilanciata in luminosità quasi a ridosso S; 3 stelline arcuate e abbastanza brillanti si trovano un paio di primi a N — 495x.
UGC 1083	gx	01h30m58s	+14°06.5'		Psc	16"	ottima / scarso	molto debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con piccolo bulge quasi stellare visibile a tratti a 270x.
UGC 1086	gx	01h31m35s	+34°47.0'		And	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto disturbata da una stella di 9ª situata neppure 2' SW; in visione distolta appare di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 1087	gx	01h31m27s	+14°16.6'		Psc	16"	ottima / scarso	è un'evanescente bolla circolare, molto diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 1'; salta fuori senza problemi in visione distolta a 270x.
UGC 1088	gx	01h31m38s	+36°50.0'		And	24"	m. buona / discreto	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N; meglio contrastata ed evidente scalando a 340x.
UGC 1090	gx	01h31m47s	+38°43.0'		And	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di u, appare facilmente in visione distolta a 380x, rotonda con Ø di 40"-45"; c'è una stellina a 1' verso NE.
UGC 1095	gx	01h32m13s	+32°06.1'		Tri	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con MCG+5-4-66 situata 1' a W — presenta un nucleo stellare appena percettibile circonfuso da un tenuissimo alone ovale orientato da E a W con dimensioni 30"×10"; disturbata da una stellina situatale a ridosso verso S (che fa parte di una losanga irregolare di 4 componenti). La MCG+5-4-66 è decisamente più facile, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
UGC 1097	gx	01h32m13s	+18°00.4'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa, con tenue condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 380x.
UGC 1098	gx	01h32m16s	+21°24.6'		Psc	16"	ottima / mediocre	debole oggetto rotondo, diffuso, appena più brillante all'interno e con Ø di 30"-35"; c'è una stellina abbastanza brillante a ~ 1' NE — 380x.
UGC 1099	gx	01h32m29s	+19°38.1'		Psc	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
UGC 1101	gx	01h32m36s	+41°59.3'		And	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW e una appena percettibile a ridosso di NE; una coppia di stelline brillanti si trova a 1' verso S — 450x.
UGC 1102	gx	01h32m30s	+04°36.0'	q 218	Psc	16"	m. buona / m. buono	è una chiazza lattescente, estesa almeno 1.5', molto stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme; c'è una stellina a un paio di primi verso NW; meglio osservabile a 270x.
UGC 1110	gx	01h33m18s	+13°19.9'		Psc	16"	ottima / scarso	è una gx elusiva, appare solo a tratti in visione distolta, ma non riesco a capire com'è fatta (a causa del seeing non posso spingere a 380x) — 270x.
UGC 1112	gx	01h33m19s	+03°04.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 1113	gx	01h33m28s	+17°24.5'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme; c'è una coppia di deboli stelline a un paio di primi SSE; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1114	gx	01h33m31s	+19°01.8'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina molto debole a 1.5' verso E — 450x.
UGC 1116	gx	01h33m34s	−01°05.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' verso E.
UGC 1118	gx	01h33m42s	+03°32.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, in visione distolta appare molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 90"×30" e con piccolo bulge appena percettibile di aspetto stellare — 450x.
UGC 1119	gx	01h33m50s	+17°14.0'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza estremamente diffusa, appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
UGC 1120	gx	01h34m02s	−01°04.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni che in visione distolta arrivano a 90"×30" e con piccolo bulge abbastanza contrastato sul disco — 450x.
UGC 1121	gx	01h34m07s	+13°29.5'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x; un oggetto diffuso, elusivo e molto piccolo salta fuori solo a momenti verso SE: si tratta di MCG+2-5-4, non più estesa di 15".
UGC 1123	gx	01h34m08s	−01°01.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	brillante, poco diffusa e molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×20", con bulge ben contrastato e nucleo stellare.
UGC 1125	gx	01h34m49s	+34°01.1'		Tri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e di aspetto abbastanza uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 1129	gx	01h34m53s	+12°04.6'		Psc	16"	ottima / scarso	debole, ma relativamente facile, piccola, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" e poco più brillante all'interno — 270x.
UGC 1130	gx	01h34m58s	+01°20.1'		Cet	24"	ottima / buono	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa oltre 1'; c'è un piccolo triangolo isoscele aperto di stelline abbastanza brillanti a ~ 3' verso E — 450x.
UGC 1131	gx	01h35m16s	+34°28.4'		Tri	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina al bordo NW; meglio contrastata a 380x.
UGC 1132	gx	01h35m32s	+47°33.0'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" o poco più — 450x.
UGC 1133	gx	01h35m03s	+04°22.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di aspetto confuso, forse rotonda con Ø di ~ 1', situata tra 2 stelline: una a W e l'altra appena percettibile a E; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1139	gx	01h35m31s	+11°57.2'		Psc	16"	ottima / scarso	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, solo a tratti poco più brillante all'interno; salta fuori facilmente in visione distolta — 270x.
UGC 1142	gx	01h36m21s	+47°23.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SW — 450x.
UGC 1145	gx	01h36m32s	+39°55.4'		And	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" (ossia poco meno di UGC 822 osservata subito prima); c'è una stellina a 1' SE; 3 stelline allineate da E a W si trovano a N della gx — 450x.
UGC 1148	gx	01h40m38s	+83°56.4'		Cep	24"	buona / buono	è un debole lucore molto diffuso che aggetta a mo' di ventaglio a S di una stellina abbastanza brillante; non riesco a capirne la forma, ma potrebbe essere grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 1151	gx	01h36m40s	−01°23.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa, orientata da NNE a SSW (come le 3 stelline allineate ed equidistanti a S), di dimensioni 45"×30" e con evidente condensazione centrale — 450x.
UGC 1152	gx	01h36m56s	+31°59.1'		Tri	16"	ottima / ottimo	molto debole, appare facilmente in visione distolta a 270x, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; si trova presso un piccolo asterismo di 5 stelline deboli di cui 4 poste a parallelogramma regolare (una di queste è quasi a ridosso S della gx).
UGC 1154	gx	01h37m17s	+28°53.4'		Tri	16"	ottima / ottimo	rotonda, poco diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi; è allineata ed equidistante con 2 stelline situate a NNE — 380x.
UGC 1155	gx	01h37m08s	+04°53.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e leggermente più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 1156	gx	01h37m21s	+14°27.8'		Psc	24"	ottima / ottimo	debolissima, poco diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø < 30" e a tratti leggermente condensata.
UGC 1159	gx	01h37m37s	+00°02.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; molto difficile da individuare, in quanto situata in una zona di cielo depleta; occorre scalare a 340x.
UGC 1160	gx	01h38m03s	+32°29.6'		Tri	28"	m. buona / buono	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, estesa 1' in direzione E-W; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' verso N — 495x.
UGC 1161	gx	01h38m14s	+36°36.6'		And	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
UGC 1162	gx	01h38m16s	+41°39.2'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, in visione distolta grosso modo rotonda con Ø di 45"; situata all'interno di un triangolo rettangolo di stelline; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1163	gx	01h37m56s	+01°00.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1' verso NE — 450x.
UGC 1165	gx	01h38m31s	+28°43.4'		Tri	28"	m. buona / buono	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione NE-SW; c'è una coppia di stelline orientate da N a S a 1' SE — 495x.
UGC 1166	gx	01h38m35s	+34°59.5'		Tri	16"	ottima / ottimo	è allungata da ENE a WSW, di dimensioni 40"×20", facilmente visibile, ma con gradiente molto basso; è allineata con 3 stelline orientate da N a S — 380x.
UGC 1167	gx	01h38m21s	+07°32.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	è una debole bolla circolare con Ø di ~ 45" e di luminosità pressoché uniforme; non sembra particolarmente diffusa, ma è meglio scalare a 270x.
UGC 1168	gx	01h39m18s	+48°45.9'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e appena più evidente all'interno, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" (l'orientamento si nota meglio scalando a 340x); c'è una stellina una paio di primi a E e una alla stessa distanza verso NW *(presenza di chiarore lunare).*
UGC 1169	gx	01h38m47s	+01°04.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	relativamente brillante, molto diffusa, con piccolo bulge marcato e nucleo stellare, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 1172	gx	01h39m39s	+05°47.0'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE.
UGC 1174	gx	01h39m47s	−02°02.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 1176	gx	01h40m10s	+15°54.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza a bassissima luminanza superficiale, grosso modo rotonda con Ø di 1.5'; è situata tra una doppia stretta sbilanciata a S e una stellina a N; nonostante il contrasto così basso sul fondo cielo si nota meglio a 340x che a 210x.
UGC 1178	gx	01h40m28s	+34°37.5'		Tri	24"	m. buona / m. buono	gx molto difficile, in quanto è attraversata da 4 stelline foggiate a "Y", 2 delle quali, quelle del "gambo", abbastanza brillanti; in visione distolta appare posta di taglio, orientata da NE a SW — ossia come il piccolo asterismo sovrapposto — estesa 1.5' e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 1179	gx	01h40m35s	+43°51.7'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a 1' S — 495x.
UGC 1180	gx	01h40m17s	−00°17.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø max di 40"; a meno di non spostarla al bordo, a 450x non si riesce a tener fuori campo la SAO 129435 di 7ª situata ad appena 4' NW e che interferisce con l'osservazione.
UGC 1182	gx	01h40m56s	+49°15.1'		And	24"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 30"; situata all'interno di un quadrilatero formato da una stella molto luminosa a N (SAO 37424 di 8ª grandezza), 2 stelline relativamente brillanti a 1' E e 1' W e una probabile coppia serrata irrisolta di componenti molto deboli a S *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 1183	gx	01h40m27s	+02°40.9'		Psc	16"	m. buona / ottimo	è debolissima, solo a tratti in visione distolta si capisce che è orientata da E a W con dimensioni grosso modo 40"×20", ma bisogna scalare a 270x.
UGC 1185	gx	01h41m13s	+45°00.1'		And	24"	m. buona / buono	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente; 2 stelle brillanti di 8ª grandezza si trovano quasi ai bordi del campo, ma non sembrano interferire con l'osservazione — 450x.
UGC 1186	gx	01h41m48s	+49°02.5'		And	28"	m. buona / buono	presenta un piccolo nucleo abbastanza brillante di 15" di Ø circonfuso da un tenue alone molto stemperato, rotondo con Ø di 1' scarso; c'è una doppia serrata e appena risolvibile a 1' W — 495x.
UGC 1189	gx	01h41m55s	+07°07.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1191	gx	01h42m06s	+07°39.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e Ø 30", situato quasi a ridosso NW di una stellina; è osservabile solo a 380x.
UGC 1195	gx	01h42m27s	+13°58.6'	q 173	Psc	16"	buona / buono	debole, con bassissimo gradiente di luce e molto stemperata ai bordi; è molto allungata da SW a NE, con dimensioni 2'.5×1' — 270x.
UGC 1197	gx	01h42m33s	+18°18.4'	q 128	Psc	16"	buona / buono	è una gx elusiva che appare solo a tratti in visione distolta a 270x poco più di 1.5' a N di una coppia di deboli stelline distanti una 40-ina di secondi; forse orientata come queste ultime.
UGC 1199	gx	01h42m42s	+08°10.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1200	gx	01h42m48s	+13°09.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×45" e appena più brillante all'interno; meglio scalare a 270x.
UGC 1204	gx	01h34m12s	+04°16.7'		Psc	16"	m. buona / m. buono	altro oggetto elusivo visibile solo a tratti; tuttavia alternando gli occhi per riposarli appare ogni tanto allungata da NE a SW per una 40-ina di secondi — 270x.
UGC 1206	gx	01h43m21s	+11°54.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, Ø 30" con piccolo nucleo quasi stellare; meglio osservabile a 270x.
UGC 1208	gx	01h44m17s	+12°15.2'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole e diffusa, solo a momenti appare poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1209	gx	01h43m45s	+12°09.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata ~ da E a W con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 1212	gx	01h44m08s	+34°23.2'		Tri	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 1213	gx	01h44m09s	+31°19.2'		Tri	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale ben contrastata; situata sul lato orientale di un piccolo asterismo rettangolare: due vertici opposti sono occupati da coppie strette — 450x.
UGC 1214	gx	01h43m58s	+02°21.0'		Cet	16"	m. buona / ottimo	presenta un bulge evidente con nucleo stellare, circonfuso da un alone rotondo, diffuso con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 1217	gx	01h44m23s	+43°01.9'		And	28"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi, orientato da E a W e situato a ridosso N di una stellina abbastanza brillante; una stellina più debole si trova subito a NW della gx — 495x.
UGC 1218	gx	01h44m17s	+12°15.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
UGC 1221	gx	01h44m38s	+38°12.0'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1224	gx	01h45m10s	+32°07.4'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi e orientata da NW a SE; è allineata, ma non equidistante, con due stelline abbastanza brillanti a NW — 495x.
UGC 1225	gx	01h47m37s	+11°20.7'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo; a prima vista sembra grosso modo rotonda, ma prolungando l'osservazione si capisce che è in realtà orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; tuttavia, l'allungamento si apprezza meglio scalando a 340x; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NE.
UGC 1226	gx	01h45m02s	+10°22.0'		Psc	24"	ottima / ottimo	debolissimo lucore di forma indistinta ed esteso una 40-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a E di una debole stellina, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 1227	gx	01h45m15s	+32°03.7'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 495x.
UGC 1228	gx	01h45m22s	+28°43.2'		Tri	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e spampanata, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni grosso modo 60"×40"; c'è una stellina appena percettibile al bordo orientale e un'altra appena più brillante subito a NE — 450x.
UGC 1233	gx	01h45m41s	+28°48.3'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30".
UGC 1235	gx	01h45m36s	+03°21.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme (anche a 450x si fatica un poco a tenere fuori campo la SAO 110114 di magnitudo 6.7 situata 6' a NE).
UGC 1237	gx	01h45m55s	+09°49.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un debole fuso molto allungato da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e appena più brillante all'interno; a 380x sembra di vedere una debolissima stellina quasi a ridosso del nucleo verso N.
UGC 1239	gx	01h56m10s	+06°25.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare a tratti in visione distolta, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è appena più evidente scalando a 270x.
UGC 1240	gx	01h46m21s	+04°15.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 1242	gx	01h46m37s	+14°41.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 25"×15"; c'è una stellina appena percettibile a una 30-ina di secondi W — 450x.
UGC 1243	gx	01h46m46s	+18°34.5'		Psc	16"	ottima / mediocre	è un debole ovale orientato da NW a SE, di dimensioni 60"×30", stemperato ai bordi e con tenue bulge diffuso — 380x.
UGC 1244	gx	01h46m49s	+24°27.9'		Ari	24"	m. buona / ottimo	è debolissima, ma in visione distolta appare abbastanza facilmente orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; poco meglio contrastata a 450x, anche perché a quest'ingrandimento è più facile tenere fuori campo una coppia di stelle brillanti — le SAO 74928 e 74929 rispettivamente di 9ª e 8ª grandezza — situate 6.5' a SE.
UGC 1245	gx	01h46m51s	+11°24.1'		Ari	16"	ottima / ottimo	presenta un piccolo nucleo molto evidente circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di 40" o 45" — 380x.
UGC 1246	gx	01h46m01s	+12°24.3'		Ari	16"	ottima / buono	è un debolissimo lucore molto diffuso, e di luminosità uniforme, approssim. rotondo con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 1251	gx	01h47m30s	+36°02.1'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con piccolo bulge evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S — 450x.
UGC 1253	gx	01h47m30s	+12°06.3'		Ari	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata scalando a 340x: a questo ingrandimento presenta anche un bulge appena percettibile.
UGC 1254	gx	01h48m03s	+48°37.8'		Per	28"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø < 40" (non si capisce bene perché c'è una piccola stringa di 4 stelline molto deboli a ridosso W che ne confondono un po' la forma); presenta un nucleo stellare appena percettibile; un'altra debole stellina si trova subito a E — 495x.
UGC 1257	gx	01h48m07s	+36°27.1'		And	16"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile a tratti a 380x; è allungata da E a W con dimensioni 30"×20".
UGC 1260	gx	01h48m33s	+12°36.8'		Ari	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa e con bassissimo gradiente; è poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 380x.
UGC 1261	gx	01h48m34s	+13°25.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 1263	gx	01h48m33s	+10°34.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	è la più difficile di un quartetto di 4 gx poste a trapezio regolare a cavallo tra Ariete e Pesci: le altre 3 (UGC 1266, -68 e IC 162) erano state già osservate in altra data col 16" — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina a 1' verso NE — 450x.
UGC 1266	gx	01h48m44s	+10°30.4'		Ari	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo stellare molto marcato (ma non sarà una stellina sovrapposta?), poco allungata da NE a SE con dimensioni 40"×30" — 380x.
UGC 1268	gx	01h48m52s	+10°35.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	situata 5' scarsi a E di UGC 1263, è una lama di luce relativamente compatta, orientata da NW a SE, di luminosità pressoché uniforme e con una stellina brillante quasi a ridosso verso NW — 450x.
UGC 1269	gx	01h49m06s	+34°59.0'		Tri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1271	gx	01h49m00s	+13°12.6'		Ari	16"	ottima / ottimo	gx facile, si trova subito a 380x, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; presenta un piccolo nucleo poco contrastato sul disco.
UGC 1272	gx	01h49m16s	+35°04.4'		Tri	24"	m. buona / discreto	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
UGC 1274	gx	01h49m11s	+12°51.2'		Ari	16"	m. buona / scarso	relativamente facile, molto ~ da E a W con dimensioni 60"×30"; a 270x appare a tratti con nucleo stellare.
UGC 1277	gx	01h49m26s	+35°27.1'		Tri	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e poco più brillante all'interno; c'è una doppia larga subito a S con le componenti orientate nello stesso modo; disturbata dalla SAO 55002 di 8ª situata un paio di primi a W — 380x.
UGC 1278	gx	01h49m21s	+12°42.9'		Ari	16"	m. buona / scarso	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta a 270x; si trova al vertice occidentale di un piccolo triangolo equilatero formato con 2 deboli stelline e coi lati di ~ 3'.
UGC 1279	gx	01h49m25s	+13°22.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1281	gx	01h49m32s	+32°35.5'		Tri	24"	ottima / mediocre	è una lama di luce di luminosità uniforme, poco contrastata sul fondo cielo, orientata da NE a SW ed estesa 3'; si apprezza meglio scalando a 340x.
UGC 1282	gx	01h49m30s	+12°30.6'		Ari	16"	ottima / ottimo	è un fuso di ~ 60"×30" abbastanza facile, con alto gradiente, ma che a 380x sembra di luminosità piuttosto irregolare; c'è una stellina a 1' SE.
UGC 1285	gx	01h59m02s	+86°40.5'		Cep	16"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso verso S visibile a 380x.
UGC 1289	gx	01h50m04s	+16°26.3'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo SW — 450x.
UGC 1290	gx	01h50m03s	+11°48.7'		Ari	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 1293	gx	01h50m00s	+02°05.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta a 450x sono di 45"×30" (a 340x in visione diretta appare invece rotonda).
UGC 1295	gx	01h50m15s	+33°29.7'		Tri	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N — 450x.
UGC 1296	gx	01h50m07s	−00°44.4'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
UGC 1297	gx	01h50m11s	+02°18.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; meglio definita scalando a 340x.
UGC 1303	gx	01h50m53s	+48°21.1'		And	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, disturbata da una stella brillante a ridosso E (una più debole si trova dalla parte opposta); in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×30" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 1306	gx	01h50m47s	+32°38.8'		Tri	24"	ottima / mediocre	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e una piccola condensazione centrale appena percettibile; meglio contrastata scalando a 340x; 9 galassiette MAC molto deboli o debolissime si trovano nei dintorni (nell'apposita sezione riportate le singole voci).
UGC 1308	gx	01h50m51s	+36°16.5'		And	16"	m. buona / m. buono	è una bolla diafana di 45" di Ø con all'interno una stellina brillante, ma decentrata verso W; c'è una stellina molto debole a ridosso verso W — 270x.
UGC 1311	gx	01h51m02s	+29°48.0'		Tri	24"	m. buona / discreto	è una piccola e debolissima chiazza estesa 25"-30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 1312	gx	01h51m02s	+13°17.8'		Ari	16"	m. buona / scarso	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso SW — 270x.
UGC 1314	gx	01h51m03s	+12°35.0'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore di forma indistinta, esteso una 30-ina di secondi e molto stemperato sul fondo cielo; appare in visione distolta quasi a ridosso S di una stellina appena percettibile — 450x.
UGC 1316	gx	01h51m17s	+34°51.0'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma solo a momenti appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo 20"×10"; c'è una doppia irrisolta appena percettibile a SE (sembra di fatto un minuscolo oggetto nebuloso); una stellina abbastanza brillante si trova alla stessa distanza verso NE.
UGC 1318	gx	01h51m24s	+33°01.9'		Tri	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare osservabile a 380x.
UGC 1319	gx	01h51m29s	+36°03.9'		And	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da N a S con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N (fa parte dell'ammasso **AGC 262**) — 495x.
UGC 1321	gx	01h51m11s	−01°01.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N; una coppia di stelline brillante si trova subito a W — 450x.
UGC 1322	gx	01h51m30s	+13°07.9'		Ari	16"	m. buona / scarso	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø max di 25"-30"; appare solo a tratti in visione distolta a 270x.
UGC 1325	gx	01h51m37s	+08°15.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo stellare abbastanza marcato circonfuso da un alone rotondo di 45"50" di Ø — 380x.
UGC 1326	gx	01h51m40s	+08°18.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	situata 2.5' a NNE di UGC 1325, è più piccola, relativamente compatta, rotonda, con Ø di 30" e con nucleo stellare visibile a 380x; le 2 gx sono poste quasi simmetricamente rispetto a un gruppetto di 3 stelline ravvicinate: le 2 più brillanti sono distanti ~ 20" in direzione NW-SE.
UGC 1327	gx	01h51m48s	+30°32.6'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con bulge appena percettibile, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina a ridosso W — 450x.
UGC 1331	gx	01h52m11s	+42°55.1'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso S; poco meglio contrastata scalando a 340x; al momento dell'osservazione la gx si trovava allo zenit!
UGC 1332	gx	01h52m18s	+48°05.2'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e poco più brillante all'interno rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W; 2 deboli stelline si trovano ai bordi NE e NW — 450x.
UGC 1333	gx	01h51m48s	+00°15.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi (è sorta la Luna poco superiore all'ultimo quarto) — 450x.
UGC 1338	gx	01h52m22s	+35°47.8'		And	16"	m. buona / discreto	molto debole, ma facilmente. visibile in visione distolta, piccola, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 1339	gx	01h52m25s	+35°51.4'		And	16"	m. buona / discreto	più brillante di UGC 1338 e più estesa, con Ø di almeno 1'; ci sono 2 stelline sovrapposte orientate NE-SO — 270x.
UGC 1340	gx	01h52m40s	+48°05.5'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
UGC 1341	gx	01h52m30s	+31°59.1'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e con tenue condensazione centrale; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso W.
UGC 1344	gx	01h52m35s	+36°30.0'		And	24"	m. buona / buono	molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo meridionale che ne confonde un po' la forma; un'altra stellina della stessa luminosità si trova a 1' N del nucleo — 450x.
UGC 1347	gx	01h52m46s	+36°37.1'		And	24"	m. buona / buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; un nodulo, oppure una stellina appena percettibile, è visibile a momenti verso il bordo meridionale; una stellina abbastanza brillante si trova a ridosso SE — 450x.
UGC 1350	gx	01h52m57s	+36°36.8'		And	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare che è però visibile solo a momenti; in visione distolta appare rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
UGC 1353	gx	01h53m22s	+36°57.2'		And	24"	m. buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e un nucleo stellare evidente; situata a ridosso di un piccolo asterismo formato da 4 stelline abbastanza brillanti — 450x.
UGC 1354	gx	01h53m05s	−01°04.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, situata tra due deboli stelline orientate da N a S; in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 1355	gx	01h53m36s	+43°57.9'		And	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta una zona centrale allungata da N a S appena più contrastata del disco, ma la si nota meglio a 450x.
UGC 1357	gx	01h53m22s	+19°57.2'		Ari	24"	ottima / molto buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
UGC 1359	gx	01h53m42s	+29°56.0'		Tri	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e con Ø di 1' scarso — 380x.
UGC 1361	gx	01h53m50s	+36°33.8'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, più che altro disturbata da una stellina brillante situata a ridosso S (se non addirittura sovrapposta alla gx); non riesco a capirne la forma, ma in visione distolta non sembra più estesa di 30"; c'è una debole stellina al margine N — 450x.
UGC 1365	gx	01h53m59s	−00°45.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con lievi discrepanze di luce all'interno; in visione distolta la gx sembra, a prima vista, aggettare verso SE da una stellina brillante; in realtà, a 450x si nota chiaramente che la stellina in questione si trova solo quasi a ridosso verso NW.
UGC 1366	gx	01h54m20s	+36°37.8'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 1368	gx	01h54m13s	+07°53.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce di luminosità uniforme, estesa quasi 1.5' e orientata da NE a SW; a 380x la visione non migliora.
UGC 1369	gx	01h54m13s	+18°06.1'		Ari	16"	ottima / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x e alternare gli occhi; probabilmente rotonda con Ø di ~ 1'.
UGC 1370	gx	01h54m24s	+13°32.5'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, situata in una piccola zona depleta; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
UGC 1372	gx	01h54m31s	+17°40.4'		Ari	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, ma molto piccola e relativamente compatta, per cui salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S (la più debole di un piccolo triangolo irregolare).
UGC 1373	gx	01h54m24s	+05°25.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1374	gx	01h54m34s	+16°52.0'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, stranamente meglio definita a 450x, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" (a 340x è di aspetto più confuso); c'è una stellina appena percettibile al bordo meridionale; una doppia stretta brillante si trova un paio di primi a E.
UGC 1375	gx	01h54m33s	+20°03.9'		Ari	16"	ottima / buono	debolissimo oggetto rotondo, di ~ 1' di Ø, diffuso e di luminosità uniforme (osservato a 270x, perché a 380x il campo è virtualmente depleto).
UGC 1378	gx	01h56m19s	+73°17.0'		Cas	16"	ottima / m. buono	è estesa almeno un paio di primi, di aspetto un po' confuso, con una zona centrale poco più brillante, diffusa e visibile abbastanza facilmente a 270x.

UGC 1380	gx	01h54m58s	+37°20.5'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
UGC 1382	gx	01h54m41s	−00°08.6'		Cet	16"	ottima / ottimo	più brillante, diffusa e visibile abbastanza facilmente a 270x
UGC 1383	gx	01h54m41s	+06°02.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa 1'; appare con difficoltà in visione distolta a 340x in una piccola zona depleta.
UGC 1385	gx	01h54m54s	+36°55.1'	q 92	And	24"	m. buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con una condensazione stellare evidente — 450x.
UGC 1386	gx	01h55m00s	+13°29.0'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissima, appare in visione distolta quasi a ridosso W di una stellina (la quale fa parte di un piccolo asterismo a 4 componenti foggiato a "Y"); in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 1387	gx	01h55m11s	+36°15.7'		And	24"	m. buona / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta subito a SW di una stellina molto debole; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 30" — 450x.
UGC 1389	gx	01h55m31s	+47°57.3'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una coppia di stelline al margine NW (quella più interna è appena percettibile) — 450x.
UGC 1390	gx	01h55m21s	+36°18.4'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 1391	gx	01h55m16s	+10°00.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' — 450x.
UGC 1393	gx	01h55m24s	+21°17.2'		Ari	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
UGC 1394	gx	01h55m42s	+46°48.2'		And	24"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza molto diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 80"×40" e con piccola condensazione centrale evidente; situata in un campo ricco di stelle; una brillante è a ridosso NE, altre più deboli a NW e SE; un piccolo triangolo di stelline brillanti si trova un paio di primi a S; la gx è comunque meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1395	gx	01h55m22s	+06°36.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1.5' SE e un'altra appena percettibile a 1.5' verso W — 270x.
UGC 1396	gx	01h55m36s	+21°19.0'		Ari	16"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", con piccola ed evidente condensazione centrale — 380x.
UGC 1397	gx	01h55m54s	+32°59.4'		Tri	16"	m. buona / discreto	debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni di 60"×30" — 270x.
UGC 1398	gx	01h55m58s	+37°07.7'		And	24"	m. buona / m. buono	chiazza circolare molto debole con Ø di 45", assai stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme; ci sono due stelline a ridosso E e N (le quali fanno parte di un piccolo arco a 4 componenti orientato da NW a SE: l'ultima a SE è la più debole); poco meglio evidente scalando a 340x.
UGC 1399	gx	01h55m03s	+18°02.7'		Ari	16"	ottima / buono	piccola, rotonda di una 30-ina di secondi di Ø, diffusa, con evidente condensazione centrale e nucleo stellare osservabile a tratti a 380x.
UGC 1400	gx	01h56m04s	+36°07.9'		And	24"	m. buona / discreto	è una gx piuttosto evanescente; in visione distolta appare molto allungata da N a S per un paio di primi e non più spessa di 20"; c'è una stellina brillante esattamente al centro (a meno che non si tratti di un nucleo particolarmente marcato); scalando gli ingrandimenti sembra di vedere a prima vista due baffi che si dipartono in direzioni opposte da questo nucleo — 450x.
UGC 1408	gx	01h56m15s	+03°09.9'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1410	gx	01h56m17s	+04°38.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa ~ 1'; è un po' disturbata da una coppia di stelline brillanti situate 1.5' SSW e orientate come la gx — 450x.
UGC 1415	gx	01h56m44s	+36°23.1'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×20"; presenta un bulge diffuso con all'interno un nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile al bordo SE — 450x.
UGC 1416	gx	01h56m46s	+36°53.2'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a 1' ESE.
UGC 1418	gx	01h56m57s	+40°20.5'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40", con bulge evidente e contrastato; c'è un asterismo di 5 stelline (2 delle quali brillanti) foggiato vagamente a "Y" a W della gx — 450x.
UGC 1419	gx	01h56m39s	+10°18.6'		Psc	24"	buona / buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; è di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20".
UGC 1420	gx	01h56m44s	+15°00.9'		Ari	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 1422	gx	01h57m07s	+32°47.3'		Tri	16"	m. buona / discreto	è debole, ma facilmente individuabile; piccola, orientata da E a W, estesa per 40" o 45"; c'è una stellina proprio nel nucleo (a meno che non sia il nucleo puntiforme) e un'altra a ridosso verso SE — 270x.
UGC 1425	gx	01h56m22s	+05°46.5'		Psc	16"	m. buona / ottimo	è abbastanza facile da vedere, ma situata in una zona depleta; è poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", diffusa e con evidente nucleo stellare — 380x.
UGC 1427	gx	01h56m59s	+06°02.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di ~ 1', diffusa; presenta un piccolo nucleo quasi stellare evidente a 380x.
UGC 1432	gx	01h57m27s	+17°13.2'		Ari	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, appare a tratti in visione distolta, forse rotondeggiante con Ø > 30" — 270x.
UGC 1433	gx	01h57m29s	+19°55.1'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S (fa parte di un piccolo triangolo isoscele) e una più debole alla stessa distanza verso NE — 450x.
UGC 1434	gx	01h57m39s	+36°15.3'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina visibile solo a momenti a ridosso S — 450x.
UGC 1435	gx	01h57m22s	+05°36.6'		Psc	16"	m. buona / ottimo	è un debole ovale di luminosità uniforme orientato da NE a SW con dimensioni 50"×30" — 270x.
UGC 1436	gx	01h57m36s	+19°52.6'		Ari	24"	ottima / molto buono	debolissima e di forma indistinta, ma non più estesa di 20"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 1441	gx	01h57m50s	+37°21.7'		And	24"	buona / buono	debole, ma relativamente facile e compatta, posta praticamente di taglio e orientata da NW a SE; una lieve screziatura appare a tratti a 450x.
UGC 1442	gx	01h57m34s	−02°06.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto disturbata dalla 58 Ceti di magnitudo 6.6 situata a 7' ENE; poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 1444	gx	01h58m00s	+04°23.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole, di aspetto uniforme ed estesa per oltre 1'; in visione distolta sembra come racchiusa tra una stellina a N e una doppia serrata a S — 450x.
UGC 1445	gx	01h58m14s	+19°06.0'		Ari	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e poco più brillante all'interno — 380x.
UGC 1446	gx	01h58m03s	+03°22.1'		Psc	24"	buona / m. buono	debole lama di luce orientata da NE a SW, estesa ~ 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 1.5' ESE — 450x.
UGC 1447	gx	01h58m34s	+44°34.5'		And	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a ridosso W di una stellina; un'altra stellina molto più debole si trova subito a W; meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 1448	gx	01h58m09s	+02°03.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare molto tenue e meglio evidente a 450x.
UGC 1449	gx	01h58m07s	+03°05.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un minuscolo e debolissimo oggetto che tutto sommato salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è situata a ridosso NE della relativamente facile MCG+0-6-10.
UGC 1450	gx	01h58m16s	+14°17.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
UGC 1451	gx	01h58m30s	+25°21.6'		Ari	16"	ottima / buono	è allungata da NW a SE, diffusa, di dimensioni 70"×30", appena più brillante all'interno e con nucleo stellare visibile a tratti a 270x (a 380x sembra di aspetto più uniforme).
UGC 1454	gx	01h58m35s	+03°15.5'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza grosso modo circolare, estesa 40"-45", meglio evidente a 340x.
UGC 1455	gx	01h56m21s	+37°27.1'		And	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione NW-SE con una stellina a ridosso di NE — 495x.
UGC 1459	gx	01h59m07s	+36°03.8'		And	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da WNW a ESE ed estesa oltre 1'; s'incunea tra una debole stellina subito a N e una percettibile solo a momenti a ridosso S — 450x.
UGC 1460	gx	01h59m05s	+36°15.5'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con gradiente di luce molto basso, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; situata all'interno di un triangolo isoscele di stelline il cui vertice più acuto punta a N — 450x.
UGC 1462	gx	01h59m09s	+25°23.1'		Ari	16"	ottima / buono	debolissima macchiolina rotonda, di 30"-35" di Ø, osservabile solo in visione distolta a 380x e con una stellina a ridosso verso S.
UGC 1464	gx	01h59m08s	+01°53.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, meglio contrastata scalando a 340x; solo a momenti appare oblunga, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi.
UGC 1468	gx	01h59m31s	+13°56.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1470	gx	01h59m43s	+32°04.9'		Tri	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole, estesa 1' scarso e orientata da NW a SE; allineata ed equidistante con due stelline a NW; un'altra stellina si trova alla stessa distanza verso SE — 495x.
UGC 1474	gx	02h00m11s	+37°36.2'		And	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza circolare di luminosità uniforme con Ø di 45"; è parzialmente immersa nei bagliori della SAO 55175 di 8ª grandezza situata ad appena un paio di primi NNE; nonostante questo sembra meglio contrastata ed evidente scalando a 340x.
UGC 1477	gx	01h59m59s	+06°58.0'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x, anche se a 450x è ovviamente più facile tenere fuori campo la brillante SAO 110268 di 7ª grandezza situata ad appena 4.5' SE.
UGC 1478	gx	02h00m15s	+24°15.2'		Ari	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 1' e poco più brillante verso il centro; è situata all'interno di un rombo di stelline di luminosità simile — 380x.
UGC 1479	gx	02h00m19s	+24°28.4'		Ari	16"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso NE; un'altra stellina, ma brillante, si trova invece a 1.5' verso W — 380x.
UGC 1481	gx	02h00m05s	−00°16.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta nonostante la Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza; è orientata da NW a SE ed estesa 45"; meglio non scendere sotto i 450x; c'è una stellina subito a W.
UGC 1485	gx	02h00m24s	+21°06.5'		Ari	16"	ottima / buono	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a 1.5' verso SW — 380x.
UGC 1487	gx	02h00m27s	+25°05.0'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole e poco più brillante verso l'interno, in visione distolta appare rotonda con Ø < 40", ma è molto disturbata dalla SAO 75080 di 8ª grandezza situata ad appena 2' verso S — 450x.
UGC 1489	gx	02h00m30s	+42°26.6'		And	24"	m. buona / ottimo	è molto difficile, in quanto c'è una stellina brillante situata praticamente al centro della gx; si può fare il confronto con la stellina di luminosità simile un paio di primi a SSW attorno alla quale il debole alone luminoso è meno evidente; c'è una debole stellina a ridosso SE — 450x.
UGC 1492	gx	02h00m58s	+46°08.3'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge diffuso abbastanza contrastato; c'è un piccolo asterismo di 5 stelline brillanti a 2.5' verso SW — 450x.
UGC 1493	gx	12h00m55s	+38°12.7'		And	16"	m. buona / m. buono	debole, appena più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 270x.
UGC 1494	gx	02h00m47s	+17°18.3'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio definita scalando a 340x.
UGC 1495	gx	02h00m47s	+17°42.9'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare a momenti orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 1496	gx	02h01m00s	+15°11.3'		Ari	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale abbastanza marcata — 380x.
UGC 1498	gx	02h00m59s	+08°18.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×30" — 380x.
UGC 1503	gx	02h01m20s	+33°19.8'		Tri	16"	ottima / ottimo	rotonda, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 35"-40"; c'è una stellina brillante a > 1' ENE e la SAO 55197 a 2' ESE — 380x.
UGC 1504	gx	02h01m33s	+45°00.2'		And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a 1' S e una molto debole più o meno alla stessa distanza verso E; una percettibile solo a momenti si trova al bordo meridionale — 450x.
UGC 1505	gx	02h01m06s	+06°31.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da E a W con dimensioni 45"×20"; presenta un piccolo bulge quasi stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 1508	gx	02h01m51s	+44°53.5'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×20"; c'è una doppia sbilanciata quasi a ridosso SSE — 450x.
UGC 1510	gx	02h01m46s	+26°32.8'		Tri	16"	ottima / buono	debole e piccola, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
UGC 1512	gx	02h01m51s	+16°15.5'		Ari	16"	ottima / ottimo	allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×20", con nucleo stellare ben evidente a 380x; c'è una stellina a 1' NW.
UGC 1513	gx	02h01m47s	+08°28.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	piccola e relativamente facile, con Ø di 30" e con nucleo stellare — 380x.
UGC 1514	gx	02h02m00s	+21°05.8'		Ari	16"	ottima / buono	piccolo e debole oggetto rotondo, di 30" di Ø e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x; c'è un simpatico piccolo arco di 4 stelline, la cui distanza reciproca decresce leggermente da W a E, esteso ~ 3' — 380x.
UGC 1516	gx	02h02m33s	+44°57.9'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi e orientato da NE a SW; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 1518	gx	02h02m19s	+19°04.0'		Ari	16"	ottima / buono	è una debolissima chiazza di ~ 45"×30", orientata da E a W con piccolo nucleo appena più evidente (e che è il primo ad apparire a 270x); la gx è comunque visibile solo in visione distolta.
UGC 1523	gx	02h02m19s	+19°39.5'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e con condensazione centrale visibile solo a momenti, rotonda con Ø < 40" — 450x.
UGC 1524	gx	02h02m34s	+23°38.4'		Ari	24"	ottima / molto buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E (la più meridionale di tre stelline allineate) — 450x.
UGC 1525	gx	02h02m17s	−01°07.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una doppia stretta a poco più di 1' NW e una stella brillante (la SAO 129642 di magnitudo 10.6) a 1.5' verso ENE — 450x.
UGC 1531	gx	02h02m34s	+17°10.1'		Ari	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola; in visione distolta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW; meglio osservabile a 270x.
UGC 1532	gx	02h02m59s	+45°01.4'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 1533	gx	02h02m48s	+26°34.9'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio definita scalando a 340x.
UGC 1536	gx	02h02m55s	+07°31.4'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina a ridosso N — 450x.
UGC 1537	gx	02h03m35s	+48°27.3'		Per	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa ~ 1' (grosso modo la distanza della coppia di stelline a N) e orientata da E a W; appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 1543	gx	02h03m15s	+19°43.5'		Ari	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore esteso oltre 30", in parte disturbato da una stellina brillante situata a poco più di 1' NE — 380x.
UGC 1544	gx	02h03m50s	+48°06.3'		Per	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, appare a tratti in visione distolta a ridosso W di una stellina; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20"-25"; c'è una doppia stretta a 1' verso N — 450x.
UGC 1545	gx	02h03m10s	+05°39.4'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 1546	gx	02h03m20s	+18°37.7'	q 129	Ari	16"	buona / buono	è debolissima e molto stemperata, ma in visione distolta appare con relativa facilità; è rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina poco più di 1' verso W e un'altra appena percettibile a 270x situata a ridosso verso E.
UGC 1548	gx	02h03m49s	+43°00.1'		And	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina appena percettibile presso il bordo SE; situata tra due stelline distanti 1.5' in direzione NW-SE — 495x.
UGC 1549	gx	02h03m33s	+26°18.4'		Ari	16"	buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare — 380x.
UGC 1551	gx	02h03m37s	+24°04.5'	q 129	Ari	16"	ottima / buono	debole chiazza lattiginosa di luminosità uniforme, rotonda con Ø di un paio di primi; appare poco più contrastata scalando a 188x; c'è una stellina appena percettibile al bordo settentrionale.
UGC 1552	gx	02h04m11s	+47°58.5'		Per	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E; una stella brillante si trova a 1' verso NE — 450x.
UGC 1553	gx	02h03m36s	+04°47.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1560	gx	02h03m56s	+19°40.1'		Ari	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 270x.
UGC 1561	gx	02h04m05s	+24°12.5'	q 129	Ari	16"	ottima / ottimo	debolissima, rotonda, di luminosità uniforme e Ø di ~ 1'; appare con relativa facilità in visione distolta a 270x fissando la stellina situata 1' SE.
UGC 1562	gx	02h04m22s	+45°46.6'		And	24"	discreta / buono	debolissima, appare in visione distolta a ridosso W di MCG+8-4-19, ma occorre non scendere sotto i 450x; è situata tra 2 stelline distanti un 1' scarso e orientate da N a S: rispetto alla congiungente la gx è poco spostata verso W.
UGC 1563	gx	02h04m37s	+47°56.4'		Per	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è un piccolo triangolo molto aperto di stelline a SE (quella più esterna è una doppia serrata) — 450x.
UGC 1565	gx	02h04m32s	+27°55.5'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una coppia di stelline a SSW e SW; una stellina appena percettibile si trova a 1' verso NE; poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 1569	gx	02h04m53s	+35°08.9'		Tri	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 1570	gx	02h04m45s	+21°26.1'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x
UGC 1572	gx	02h04m44s	+08°32.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; presenta un tenuissimo nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stellina a ridosso del margine SW.
UGC 1574	gx	02h05m15s	+37°38.1'		And	28"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, ma più che altro disturbata da una stellina brillante a ridosso W; a tratti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" o poco più; ci sono 2 stelline appena percettibili a E e SE — 495x.
UGC 1577	gx	02h05m27s	+31°10.5'		Tri	16"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata ~ da E a W con dimensioni 60"×40" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso W; meglio scalare a 188x.
UGC 1580	gx	02h05m14s	+09°55.6'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole lama di luce orientata da NW a SE ed estesa almeno 1'; alcune screziature appaiono all'interno, ma solo a momenti a 450x; c'è una stella abbastanza brillante a 1.5' verso N.
UGC 1581	gx	02h05m34s	+34°52.8'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 1582	gx	02h05m39s	+39°50.4'		And	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20"; situata all'interno di una losanga regolare di 4 stelline di luminosità molto diversa: la più brillante, la SAO 55254 di 8ª grandezza che tra l'altro disturba l'osservazione, si trova a 1' verso S; una molto debole è quasi a ridosso N; le altre 2 si trovano subito a W e SE — 450x.
UGC 1584	gx	02h05m27s	+13°19.7'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è la brillante SAO 92789 di 8ª grandezza situata 5.5' verso E che si fatica a tenere fuori campo — 450x.
UGC 1585	gx	02h06m02s	+45°11.6'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a poco più di 1' verso ESE — 450x.
UGC 1586	gx	02h06m08s	+48°54.6'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina brillante a più di 1' verso S e una tripletta serrata a 1.5' ENE — 450x.
UGC 1587	gx	02h05m37s	+06°46.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un debole ovale di 60"×30", di luminosità uniforme, orientato da NE a SW e facilmente osservabile in visione distolta a 380x.
UGC 1588	gx	02h05m40s	−00°41.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per oltre 1' — 450x.
UGC 1589	gx	02h05m58s	+14°55.2'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline distanti come la dimensione della gx a 1' scarso verso N; un piccolo e curioso asterismo di 7 stelline orientate da NE a SW si trova 7' a NW — 450x.
UGC 1590	gx	02h06m04s	+29°47.6'		Tri	16"	m. buona / m. buono	stranamente facile per essere una UGC, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45" e con nucleo stellare ben evidente; c'è una stellina a 1.5' verso NW — 380x.
UGC 1591	gx	02h06m12s	+29°58.0'		Tri	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce relativamente compatta, orientata da N a S ed estesa per 1'; presenta un bulge diffuso abbastanza evidente a 380x; c'è una stellina a ridosso verso S.
UGC 1593	gx	02h06m06s	+13°17.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 40"; meglio contrastata scalando a 340x, anche se così diventa praticamente impossibile mantenere fuori campo la SAO 92789 di 8ª grandezza situata 6' a NW — 450x.
UGC 1595	gx	02h06m27s	+27°02.0'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
UGC 1596	gx	02h06m30s	+29°59.6'		Tri	16"	ottima / ottimo	poco allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30", molto diffusa e con piccola condensazione centrale evidente a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
UGC 1597	gx	02h06m16s	−00°17.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo marcato di aspetto quasi stellare; c'è una coppia di stelline brillanti a W — 450x.
UGC 1601	gx	02h07m08s	+42°58.0'		And	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1'; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo meridionale — 495x.
UGC 1603	gx	02h06m42s	−00°51.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio definita scalando a 340x.
UGC 1604	gx	02h07m18s	+37°05.8'		And	24"	m. buona / m. buono	presenta un piccolo nucleo brillante con una stellina a ridosso NE circonfuso da un alone molto stemperato sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di 40"-45" — 450x.
UGC 1605	gx	02h07m01s	+08°07.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con bulge di 30"×15" abbastanza contrastato; la gx è comunque meglio definita scalando a 340x.
UGC 1607	gx	02h07m43s	+45°37.4'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
UGC 1609	gx	02h07m51s	+44°50.6'		And	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una debole stellina subito a N — 495x.
UGC 1612	gx	02h07m56s	+43°35.3'		And	28"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30"; situata tra due stelline orientate da E a W e distanti 2.5': a E una brillante e a W una più debole; altre due stelline si trovano rispettivamente a 1' NNW e 1' SSW — 495x.
UGC 1614	gx	02h07m43s	+15°22.0'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge diffuso apprezzabile — 450x.
UGC 1617	gx	02h07m34s	+02°06.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a CGCG 387-40, di un quintetto di galassiette relativamente facili — di aspetto simile a UGC 1620, osservata per prima, rotonda, poco diffusa e con nucleo di aspetto stellare — 450x.
UGC 1618	gx	02h07m37s	+02°10.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	poco più debole di UGC 1620, osservata per prima, con nucleo meno marcato e Ø simile; c'è una stellina a ridosso NW; in visione distolta appare a tratti un tenuissimo baffo subito a N della gx esteso una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme: da un controllo successivo è risultato essere la Hickson 15F — 450x.
UGC 1620	gx	02h07m40s	+02°09.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	fa parte del quintetto di UGC 1617 — è la più evidente, poco diffusa, rotonda con Ø poco superiore a 30" e nucleo stellare — 450x.
UGC 1621	gx	02h07m52s	+02°40.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; una debole stellina di 15-esima situata un paio di primi a N è in realtà la quasar 0205+024 — 450x.
UGC 1622	gx	02h07m57s	+16°13.2'		Ari	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20"; riesco a vederla solo a 380x forse perché disturbata dalla luce di una stella brillante situata 1.5' SE.
UGC 1623	gx	02h07m56s	+19°10.3'		Ari	24"	ottima / molto buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; ci sono due stelline appena percettibili a ridosso W e SW — 450x.
UGC 1624	gx	02h07m53s	+02°10.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	fa parte del quintetto di UGC 1617 — allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30", poco diffusa e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 1625	gx	02h08m04s	+28°19.9'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10" — 495x.
UGC 1626	gx	02h08m21s	+41°28.8'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' verso E; un debolissimo nodulo di aspetto quasi stellare si "stacca" solo a momenti a S della gx: è la **MAC 0208+4128**.
UGC 1627	gx	02h08m05s	+01°53.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
UGC 1628	gx	02h08m39s	+43°00.4'		And	28"	m. buona / m. buono	debole chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; ci sono 3 stelline brillanti quasi allineate in direzione N-S a 1' N — 495x.
UGC 1630	gx	02h08m25s	+14°58.3'		Ari	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; è situata tra 2 stelline brillanti, poste grosso modo a perpendicolo, ma praticamente a ridosso di quella più a N — 380x.
UGC 1634	gx	02h08m57s	+47°13.2'		And	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza circolare con Ø di 1', molto diffusa e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare visibile però solo a momenti; è situata tra 2 stelline orientate da NE a SW e distanti un paio di primi; una coppia di stelline molto deboli si trovano all'interno dell'alone verso NE; la gx è meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1637	gx	02h09m07s	+44°17.7'		And	28"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza oblunga orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×30" (occorre osservarla più volte, prima di capirne la forma); c'è una stellina appena percettibile a N; una brillante si trova 2.5' a E — 495x.
UGC 1638	gx	02h08m57s	+26°02.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; disturbata da una coppia di stelle brillanti (fra cui la 14 Ari di 5ª grandezza) che a 450x si riesce a fatica a tenere fuori dal campo.
UGC 1641	gx	02h09m10s	+31°59.7'		Tri	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore circolare di Ø probabilmente > 1' e assai stemperato sul fondo cielo; appare in visione distolta, ma è meglio visibile scalando a 188x.
UGC 1643	gx	02h08m51s	+02°43.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 1646	gx	02h09m05s	+05°06.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole, disturbata dalla SAO 110370 di 9ª grandezza situata ad appena un 1' W, orientata da N a S ed estesa oltre 1'; c'è una stellina subito a NE — 450x.
UGC 1648	gx	02h09m14s	+25°34.2'		Ari	24"	ottima / molto buono	relativamente facile, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a 1' verso W e una debole subito a S — 450x.
UGC 1649	gx	02h09m12s	+06°36.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo e di aspetto confuso; solo a tratti appare grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; è stranamente meglio osservabile a 450x.
UGC 1651	gx	02h09m38s	+35°47.8'		Tri	28"	ottima / ottimo	molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 40"-45"; è equidistante ma non allineata con 2 stelline a S. Forma una coppia ravvicinata con **MCG+6-5-88A** situata a ridosso E; questa è molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
UGC 1652	gx	02h09m33s	+21°14.8'		Ari	16"	ottima / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme e poco diffusa; a tratti in visione distolta appare chiaramente allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 270x.
UGC 1654	gx	02h10m09s	+36°42.3'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; è meglio contrastata scalando a 340x, ma la visione è comunque un po' disturbata da alcune stelle brillanti presenti nel campo oculare.
UGC 1657	gx	02h10m16s	+45°35.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole baffo di luce molto diffuso che pare aggettare a N di una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso E — 450x.
UGC 1658	gx	02h09m54s	+10°57.7'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 1659	gx	02h09m57s	+16°02.0'		Ari	16"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di dimensioni 90"×45" (poco meno della distanza delle 2 stelle brillanti situate a NE che è di un paio di primi) e di luminosità uniforme; è meglio scalare a 270x.
UGC 1660	gx	02h10m18s	+38°35.7'		And	24"	m. buona / buono	appare elusivamente subito a N di una stellina abbastanza brillante, ma non ne capisco la forma; non sembra comunque più estesa di 30"; c'è un asterismo di 5 stelle brillanti foggiato a semicerchio subito a N — 450x.
UGC 1661	gx	02h10m15s	+41°31.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
UGC 1662	gx	02h09m55s	+10°45.7'		Ari	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 1663	gx	02h10m09s	+07°38.8'		Cet	16"	ottima / ottimo	è una gx elusiva che appare solo a tratti in visione distolta a 270x, ma non riesco a capire com'è fatta.
UGC 1666	gx	02h10m49s	+34°59.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso NW — 495x.
UGC 1668	gx	02h10m41s	+35°12.0'		Tri	28"	m. buona / ottimo	diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø < 40"; c'è una debole stellina subito a S — 495x.
UGC 1669	gx	02h10m38s	+05°52.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 1674	gx	02h11m11s	+38°45.5'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×20" (ossia estesa come la coppia di stelline a 1.5' NW) — 450x.
UGC 1673	gx	02h11m00s	+37°49.4'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; meglio tuttavia non scendere sotto i 450x.
UGC 1675	gx	02h11m14s	+25°48.6'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 1671	gx	02h10m58s	+32°42.0'		Tri	24"	ottima / mediocre	forma una coppia ravvicinata con CGCG 504-25 situata 2' scarsi a N — sono 2 gx visualmente di aspetto molto simile, entrambe molto allungate da E a W con dimensioni 60"×20" e a tratti appena più brillanti all'interno; solo a momenti questa appare leggermente più cicciotta — 450x.
UGC 1682	gx	02h11m35s	+31°30.6'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole e assai disturbata dalla SAO 55338 di 6ª grandezza situata un paio di primi a NW, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo SE — 450x.
UGC 1684	gx	02h11m24s	+15°57.3'		Ari	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto abbastanza compatto, facile, rotondo con Ø di 30"; forma un triangolo rettangolo perfetto con 2 stelle distanti ~ 2' in direzione NE-SW — 380x.
UGC 1685	gx	02h11m38s	+34°02.7'		Tri	24"	ottima / mediocre	è una lama di luce molto debole, ma abbastanza netta, orientata da ENE a WSW ed estesa almeno 1'; c'è una stellina molto debole a 1.5' N — 450x.
UGC 1687	gx	02h11m39s	+14°17.9'		Ari	16"	ottima / ottimo	facilmente visibile a 380x, rotonda con Ø di 45", poco più luminosa all'interno; c'è una stellina brillante a neppure 1' verso SE.
UGC 1691	gx	02h12m13s	+39°14.1'		And	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccolo nucleo quasi stellare evidente — 450x.
UGC 1692	gx	02h12m16s	+42°22.8'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola chiazza rotondeggiante con Ø < 30", molto diffusa e a tratti condensata; c'è una stellina a ridosso S e una più brillante e poco più distante a W — 450x.
UGC 1696	gx	02h12m28s	+29°51.5'		Tri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N — 450x.
UGC 1697	gx	02h12m20s	−02°08.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×25" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 1698	gx	02h12m20s	−00°48.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare evidente; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline molto deboli situate rispettivamente a 1' NNW e poco più di 1' NNE — 450x.
UGC 1701	gx	02h12m46s	+36°18.2'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e con piccola condensazione centrale evidente, ma poco contrastata, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 1702	gx	02h12m42s	+13°58.2'		Ari	16"	m. buona / scarso	debolissimo oggetto rotondo esteso non più di 30", molto disturbata dalla luce di una stella brillante situata 3' S; usato 380x per "limitare il danno"; c'è una stellina 1' verso N.
UGC 1704	gx	02h13m16s	+41°14.6'		And	28"	m. buona / buono	debolissima, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20" e di luminosità uniforme; la gx è un po' disturbata da un piccolo triangolo molto allungato di stelline brillanti a ridosso NW — 495x.
UGC 1705	gx	02h13m11s	+09°30.6'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
UGC 1706	gx	02h13m34s	+25°51.3'		Ari	16"	buona / m. buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 380x.
UGC 1707	gx	02h13m28s	+04°44.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 110411 di 9ª grandezza situata 3' a W; poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1708	gx	02h13m27s	+09°36.7'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, piccola e di aspetto un po' confuso; a 450x appare a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 25"×20".
UGC 1710	gx	02h13m38s	+13°43.7'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso NW — 450x.
UGC 1716	gx	02h13m45s	+04°06.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente brillante e compatta, con nucleo stellare, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina brillante una 40-ina di secondi verso N — 450x.
UGC 1717	gx	02h13m49s	+16°47.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, situata 1' a S di una stellina abbastanza brillante; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; stranamente meglio osservabile a 450x.
UGC 1721	gx	02h14m34s	+37°24.5'		And	16"	m. buona / m. buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, probabilmente rotonda con Ø > 1'; c'è una stellina a ridosso verso S e un'altra al bordo NW — 270x.
UGC 1723	gx	02h14m17s	+07°35.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e di forma indistinta ed estesa almeno una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE; allineata ed equidistante con 2 stelline a E; meglio comunque scalare a 340x.
UGC 1724	gx	02h14m24s	+07°51.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole chiazza circolare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme e di aspetto molto regolare — 450x.
UGC 1726	gx	02h14m51s	+31°28.3'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole e diffusa, situata a ridosso E di una stellina abbastanza brillante; in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
UGC 1729	gx	02h15m04s	+32°43.5'		Tri	24"	m. buona / discreto	debolissimo lucore diffuso, orientato da N a S ed esteso ~ 1'; c'è una coppia serrata e molto sbilanciata di stelline subito a N; un'altra stellina si trova all'interno alla stessa distanza verso NE; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 1730	gx	02h15m19s	+32°41.8'		Tri	24"	m. buona / discreto	debolissima, a 450x si vede un piccolo nucleo a prima vista quasi stellare, ma che a tratti appare invece orientato da E a W ed esteso 10"-15"; solo a momenti sembra circonfuso da un piccolo alone estremamente tenue di forma indistinta ed estesa una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso SW e una brillante a poco più di 1' verso E — 450x.
UGC 1731	gx	02h15m17s	+18°19.0'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con una condensazione centrale ben evidente; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
UGC 1733	gx	02h15m21s	+22°00.4'		Ari	24"	ottima / molto buono	debolissima lama di luce estesa almeno 1' in direzione NW-SE; appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N.
UGC 1734	gx	02h15m26s	+31°53.1'		Tri	24"	ottima / mediocre	lama di luce molto debole orientata da NE a SW e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E — 450x.
UGC 1735	gx	02h15m38s	+35°31.4'		Tri	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, rotonda, poco diffusa, di 45" di Ø e con condensazione centrale di aspetto quasi stellari; c'è una stellina a < 1' verso SE — 380x.
UGC 1738	gx	02h15m54s	+42°49.4'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso N; una brillante si trova a 1' verso E (situata 3' a W di UGC 1743) — 495x.
UGC 1739	gx	02h15m44s	+25°12.4'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.

UGC 1741	gx	02h15m38s	+01°39.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
UGC 1742	gx	02h15m46s	+15°23.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1.5' verso N — 450x.
UGC 1743	gx	02h16m12s	+42°49.3'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 495x.
UGC 1746	gx	02h15m54s	+01°46.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina appena percettibile a 1' NNE — 450x.
UGC 1749	gx	02h16m14s	+18°18.6'		Ari	24"	ottima / molto buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
UGC 1750	gx	02h16m23s	+32°00.0'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 1753	gx	02h16m32s	+28°12.4'		Tri	24"	m. buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW — 450x.
UGC 1754	gx	02h16m56s	+30°56.0'		Tri	28"	m. buona / buono	molto piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso W — 495x.
UGC 1755	gx	02h16m52s	+11°47.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
UGC 1756	gx	02h16m54s	+02°12.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e con deboli discrepanze di luce all'interno visibili a tratti a 450x, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a 1' NE.
UGC 1757	gx	02h17m23s	+38°24.9'		And	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" con bulge diffuso appena percettibile a 380x (la lunghezza della gx è uguale alla distanza delle 2 stelline brillanti a W).
UGC 1758	gx	02h17m26s	+47°02.0'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa di forma indistinta, molto disturbata da una stella brillante subito a E; una stellina debole si trova a ridosso NW; la gx appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 1765	gx	02h18m00s	+35°45.7'		Tri	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N; la gx salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 523-9 situata 3' a NW — 450x.
UGC 1767	gx	02h18m05s	+38°04.6'		And	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a W, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso e di luminosità uniforme; meglio osservabile a 270x.
UGC 1769	gx	02h18m11s	+37°05.7'		Tri	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
UGC 1772	gx	02h18m27s	+38°01.4'		And	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E e una più brillante diametralmente opposta e poco più lontana — 380x.
UGC 1773	gx	02h18m15s	+13°12.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole lama di luce di luminosità uniforme estesa oltre 1' e orientata da NE a SW — 450x.
UGC 1776	gx	02h18m43s	+35°27.7'		Tri	16"	buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di 35"-40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso W — 380x.
UGC 1777	gx	02h18m44s	+30°30.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme che solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso N — 495x.
UGC 1778	gx	02h18m51s	+33°43.5'		Tri	28"	m. buona / buono	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE (il Megastar la mostra sovrapposta a una fantomatica gx denominata CGCG 523-17 e avente le stesse coordinate) — 495x.
UGC 1780	gx	02h18m57s	+40°33.8'		And	28"	m. buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce visibile a tratti in visione distolta, orientata da N a S ed estesa 1' scarso; c'è una stellina a ridosso NE e una molto debole subito a N — 495x.
UGC 1783	gx	02h19m20s	+44°06.8'		And	28"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare a tratti grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a NW e una coppia di stelline deboli un paio di primi a E — 495x.
UGC 1785	gx	02h18m87s	+04°48.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta con gran difficoltà, ma devo scalare a 340x; e comunque non riesco a capire com'è fatta, anche se non dovrebbe essere più estesa di 30".
UGC 1786	gx	02h19m31s	+37°06.7'		Tri	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1787	gx	02h19m38s	+37°56.2'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile subito a S o SSW — 450x.
UGC 1788	gx	02h19m41s	+36°37.6'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 1790	gx	02h20m03s	+41°42.2'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso NE — 450x.
UGC 1792	gx	02h19m53s	+29°02.2'		Tri	16"	m. buona / m. buono	molto stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 90"×45"; meglio definita a 188x.
UGC 1793	gx	02h20m05s	+37°54.7'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; appare in visione distolta subito a SW della più meridionale di una coppia di stelline abbastanza brillanti, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 1794	gx	02h19m41s	−00°15.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo marcato di aspetto stellare; c'è una coppia di stelline deboli a SW distanti una 30-ina di secondi in direzione N-S (orientate più o meno come la gx) — 450x.
UGC 1796	gx	02h20m23s	+40°47.5'		And	28"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un piccolo triangolo di deboli stelline subito a E: quella a ridosso della gx è appena percettibile — 495x.
UGC 1797	gx	02h20m59s	+01°55.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1798	gx	02h20m32s	+38°31.5'		And	24"	ottima / buono	poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15" e con piccolo bulge abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso W e una più debole a 1' scarso verso SE — 450x.
UGC 1799	gx	02h20m38s	+48°26.5'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina molto debole a 1' SE — 450x.
UGC 1800	gx	02h20m29s	+35°12.3'		Tri	16"	buona / m. buono	è un debolissimo ovale di 45"×30", orientato da N a S e con condensazione centrale quasi stellare visibile però solo a tratti; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso NW — 380x.
UGC 1801	gx	02h20m20s	+08°02.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina appena percettibile al bordo SE — 450x.
UGC 1802	gx	02h21m07s	+48°57.6'		And	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" e con piccolo nucleo evidente; ci sono 2 stelline a ridosso NE e NW — 450x.
UGC 1803	gx	02h20m29s	+06°48.6'		Cet	24"	buona / buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa almeno un paio di primi; appare in visione distolta alternando gli occhi; è praticamente orientata a perpendicolo rispetto alla congiungente delle 2 stelline situate a NE (brillante) e a E (più debole) — 450x.
UGC 1804	gx	02h20m58s	+38°39.4'		And	24"	ottima / buono	è un debolissimo lucore molto diffuso che appare a tratti allineato ed equidistante con 2 stelline brillanti a N; non mi sembra più estesa di 20" — 450x.
UGC 1805	gx	02h20m59s	+32°50.4'		Tri	16"	buona / m. buono	allungata da NNW a SSE (ossia come la direzione cui punta quel piccolo asterismo foggiato a punta di freccia situato a E), di dimensioni 40"×20", con bulge diffuso, evidente e nucleo stellare — 380x.
UGC 1807	gx	02h21m13s	+42°45.8'		And	28"	m. buona / buono	lucore molto tenue, grosso modo circolare con Ø di 45"-50"; la gx è molto disturbata dalla SAO 37964 di 8ª grandezza situata un paio di primi a WNW — 495x.
UGC 1808	gx	02h21m06s	+23°36.0'		Ari	16"	ottima / buono	debolissima chiazza rotonda di 35"-40" di Ø, di luminosità uniforme e con una stellina a ridosso NW; un'altra stellina si trova a 1' verso W (in pratica la gx un piccolo triangolo rettangolo con queste 2 stelline) — 380x.
UGC 1809	gx	02h20m53s	+00°33.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile al bordo orientale; una stellina brillante si trova invece quasi a ridosso sempre verso E — 450x.
UGC 1810	gx	02h21m29s	+39°22.5'		And	16"	ottima / ottimo	è un debole lucore di aspetto irregolare e di luminosità uniforme, disturbato dalla luce di alcune stelline che si sovrappongono a essa — 380x.
UGC 1811	gx	02h21m19s	+13°43.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	chiazza lattescente molto debole, di forma a prima vista indistinta, ma prolungando l'osservazione in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; si trova tra due stelline distanti poco più di 1' in direzione N-S che tendono a confonderne un po' l'aspetto — 450x.
UGC 1812	gx	02h21m25s	+25°25.4'		Ari	16"	buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; sembra a prima vista aggettare da una stellina situata quasi a ridosso NE — 380x.
UGC 1813	gx	02h21m33s	+39°21.4'		And	16"	ottima / ottimo	situata 1.5' a SE di UGC 1810, è una debolissima ed elusiva lama di luce orientata da E a W, ma visibile come tale solo ogni tanto a 380x.
UGC 1814	gx	02h21m24s	+16°34.0'		Ari	16"	m. buona / scarso	debole, molto stemperata sul fondo cielo e di aspetto un po' confuso; grosso modo rotonda con Ø > 1' — 270x.
UGC 1816	gx	02h21m32s	+31°02.6'		Tri	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza diffusa e molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso NE — 450x.
UGC 1817	gx	02h21m33s	+14°11.9'		Ari	16"	m. buona / scarso	debolissima, visibile solo a tratti in visione distolta, appare allungata da N a S per oltre 1' — 270x.
UGC 1820	gx	02h21m46s	+33°01.3'		Tri	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da NW a SE e che in visione distolta appare1.5'; c'è una stellina percettibile solo a momenti subito a N — 450x.
UGC 1824	gx	02h21m40s	+00°15.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 1825	gx	02h22m04s	+32°14.1'		Tri	16"	buona / m. buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 2 stelline quasi a ridosso: una molto debole a S e l'altra a SE — 380x.
UGC 1827	gx	02h22m16s	+43°32.8'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso N e una più distante verso SE; disturbata dalla SAO 37977 di 8ª grandezza a 2.5' NW — 495x.
UGC 1828	gx	02h22m12s	+28°44.0'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a SE e una appena percettibile dalla parte opposta — 495x.
UGC 1830	gx	02h22m31s	+47°51.0'		And	24"	m. buona / m. buono	presenta un piccolo nucleo rotondo evidente circonfuso da un alone molto tenue poco allungato da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una debole stellina a ridosso SE; una coppia di stelline abbastanza brillanti ed equidistanti con la gx si trova a S — 450x.
UGC 1832	gx	02h22m31s	+43°03.9'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; in parte disturbata dalla SAO 37990 di 8ª grandezza situata 2.5' a E — 450x.
UGC 1833	gx	02h22m23s	+28°42.9'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" (situata 2.5' a SE di UGC 1828) — 495x.
UGC 1834	gx	02h22m13s	+12°01.8'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1837	gx	02h22m58s	+43°00.7'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 1839	gx	02h22m30s	−00°37.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per oltre 1; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina subito a E *(presenza di chiarore lunare)*.
UGC 1840	gx	02h23m08s	+41°22.3'		And	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva chiazza estesa 30"-35", molto stemperata sul fondo cielo e di aspetto uniforme; si trova a ridosso S di una doppia di abbastanza stretta; forma una coppia ravvicinata con PGC 9060 situata subito a E; il sistema è altresì noto come **Arp 145** — 450x.
UGC 1841	gx	02h23m12s	+42°59.5'		And	24"	m. buona / ottimo	presenta un piccolo bulge evidente, rotondo con Ø di una 20-ina di secondi circonfuso da un alone molto tenue, ma meglio evidente in visione distolta scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso NW del bulge; a ridosso della parte opposta c'è invece la **MAC 0223+4259**, piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la coppia è comunque molto disturbata dalla SAO 37990 di 8ª grandezza situata ad appena 1.5' verso N.
UGC 1844	gx	02h23m39s	+27°09.6'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo, di aspetto confuso, forse rotondo con Ø di 45"; è situata all'interno di un piccolo parallelogramma formato con 4 stelline; meglio definita scalando a 340x.
UGC 1845	gx	02h24m08s	+47°58.2'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (o poco più); c'è una debole stellina a ridosso e una più evidente a 1' SW — 450x.
UGC 1846	gx	02h23m47s	+28°51.8'		Tri	24"	ottima / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale quasi stellare — 450x.
UGC 1847	gx	02h23m36s	+02°31.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole, di luminosità uniforme ed estesa circa 1' in direzione NW-SE; un nodulo appena percettibile appare a momenti all'estremità SE e di fatto si tratta di **PGC 9081**; una stellina si trova a 1' ENE; purtroppo la visione è un po' disturbata dalla SAO 110509 di 9ª grandezza situata poco più di 3' a N e che non si riesce a tenere fuori campo nemmeno a 450x.
UGC 1848	gx	02h23m56s	+27°29.6'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" (è sorta la Luna all'ultimo quarto: che luce!) — 450x.
UGC 1849	gx	02h24m10s	+43°17.6'		And	28"	ottima / buono	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×20", molto sfumata alle 2 estremità del fuso, e con bulge diffuso poco contrastato; situata in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti orientate a perpendicolo con l'asse maggiore della gx; c'è una debole stellina a 1' verso W — 495x.
UGC 1851	gx	02h24m28s	+49°29.4'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza diffusa di forma indistinta; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; è situata a ridosso SE di un piccolo asterismo di 5 stelline abbastanza brillanti (ne contiene anche altre di più deboli).
UGC 1854	gx	02h24m20s	+43°15.7'		And	28"	ottima / buono	debole lama di luce orientata da NE a SW ed estesa 1'; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE; una coppia di deboli stelline si trova a ridosso verso E — 495x.
UGC 1855	gx	02h24m30s	+40°52.2'		And	24"	m. buona / ottimo	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelle brillanti a 2.5' verso W — 450x.
UGC 1857	gx	02h24m34s	+33°10.1'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1858	gx	02h24m47s	+41°40.9'		And	28"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta una tenue condensazione centrale poco contrastata che appare orientata da NW a SE, come se si trattasse di una barra centrale; situata tra due stelline abbastanza brillanti orientate da N a S e distanti un paio di primi — 495x.
UGC 1859	gx	02h24m44s	+42°37.4'		And	24"	m. buona / m. buono	presenta un bulge brillante, circonfuso da un tenue disco molto diffuso, orientato da NE a SW che in visione appare di dimensioni 60"×30"; poco meglio contrastato scalando a 340x.
UGC 1860	gx	02h24m42s	+25°33.7'		Ari	16"	ottima / buono	molto debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 60" 40" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
UGC 1862	gx	02h24m25s	−02°09.7'		Cet	16"	ottima / buono	è una debole bolla circolare con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 270x.
UGC 1863	gx	02h24m29s	+01°50.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 1864	gx	02h24m59s	+37°28.9'		And	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso W e una più brillante a 1' SSW — 495x.
UGC 1866	gx	02h25m07s	+41°51.0'		And	24"	m. buona / ottimo	piuttosto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina molto più debole al bordo NE; una coppia di stelline abbastanza brillanti si trova subito a N — 450x.
UGC 1867	gx	02h25m15s	+45°27.1'		And	28"	ottima / buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1.5'; praticamente delimitata da due deboli stelline a ridosso NE e SW; due stelline più brillanti si trovano a S con le quali la gx è allineata ed equidistante — 495x.
UGC 1871	gx	02h25m05s	+22°13.0'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debole, piccola e poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 1873	gx	02h25m03s	+17°05.0'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø > 30" e piccola condensazione centrale evidente — 450x.
UGC 1874	gx	02h25m28s	+40°42.4'		And	24"	m. buona / ottimo	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta, ma non ne capisco la forma; non dovrebbe essere più estesa di 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
UGC 1877	gx	02h25m38s	+36°57.8'		Tri	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; è disturbata dalla SAO 55544 di 7ª grandezza situata meno di 4' a NE — 380x.
UGC 1879	gx	02h25m23s	+11°05.4'		Ari	16"	ottima / scarso	molto debole, osservabile in visione distolta, estesa ~ 40"; c'è una stellina a ~ 1.5' SW — 270x.
UGC 1881	gx	02h25m35s	+26°44.6'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa appare in visione distolta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW.
UGC 1882	gx	02h25m45s	+37°13.9'		Tri	16"	buona / m. buono	debole, molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; meglio contrastata a 270x; la SAO 55548 di magnitudo 8.6 situata 2.5' SE non disturba particolarmente.
UGC 1883	gx	02h25m30s	+11°28.3'		Ari	24"	buona / buono	debolissima, solo a tratti appare molto allungata da N a S ed estesa ~ 1.5'; meglio visibile scalando a 340x.
UGC 1884	gx	02h25m53s	+37°53.4'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra 2 stelline distanti un paio di primi in direzione NNW-SSE — 495x.
UGC 1885	gx	02h25m51s	+27°24.7'		Ari	24"	m. buona / buono	relativamente facile, molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
UGC 1886	gx	01h26m01s	+39°28.3'		And	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", con tenue bulge evidente, ma poco contrastato; situata tra due stelline brillanti (quella a W è una doppia molto sbilanciata) — 450x.
UGC 1889	gx	02h26m03s	+30°10.3'		Tri	16"	buona / m. buono	rotonda, diffusa, con tenue condensazione centrale e Ø di una 40-ina di secondi; è situata tra 2 stelline orientate da NE a SW e distanti 4' — 380x.
UGC 1890	gx	02h26m08s	+31°54.7'		Tri	16"	buona / m. buono	facile da osservare a 380x — malgrado la SAO 55553 di 8ª ad appena un paio di primi S — allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40" e poco più brillante all'interno.
UGC 1891	gx	02h26m11s	+26°03.3'		Ari	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" (già osservabile, seppur debolmente, nel 16" a 270x) — 450x.
UGC 1892	gx	02h26m12s	+27°36.2'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare facilmente in visione distolta a poco più di 1' E di una stellina, rotonda con Ø di 45" (poco più grande di UGC 1896 dalla quale dista 4.3' a SW) — 380x.
UGC 1895	gx	02h26m23s	+28°30.4'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
UGC 1896	gx	02h26m21s	+30°26.7'		Tri	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×30" — 380x.
UGC 1898	gx	02h26m26s	+22°59.8'		Ari	24"	m. buona / buono	è una lama di luce molto debole che in visione distolta appare estesa 1' e orientata da NE a SW; allineata ed equidistante con due stelline a W — 450x.
UGC 1899	gx	02h26m26s	+27°39.3'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile, rotonda con Ø di 35"-40", diffusa e poco più brillante all'interno e con nucleo stellare osservabile a 380x; stellina abbastanza brillante a 1' NNE — 380x.
UGC 1905	gx	02h26m19s	−01°33.1'		Cet	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina subito a SE — 450x.
UGC 1909	gx	02h26m54s	+32°05.7'		Tri	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo e di aspetto confuso, estesa forse una 40-ina di secondi; molto disturbata da 3 stelle brillanti, una delle quali si trova a ridosso NE; a ridosso SW c'è invece una stellina molto debole — 450x.
UGC 1910	gx	02h26m57s	+35°10.9'		Tri	16"	buona / m. buono	è molto difficile in quanto si nasconde dietro una stellina brillante dalla quale sembra protendersi con 2 tenuissimi baffi: quello a N è più esteso (la stella si trova, cioè, a 2/3 della lunghezza della gx che di circa 1') — 380x.
UGC 1911	gx	02h26m36s	+00°38.9'		Cet	24"	ottima / buono	debolissimo baffo esteso una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE; appare elusivamente e solo a tratti, ma la visione è un po' disturbata dalla SAO 110533 di 9ª grandezza situata 3' a SW — 450x.
UGC 1914	gx	02h27m26s	+41°03.6'		And	24"	m. buona / ottimo	appare facilmente con un piccolo bulge rotondo con Ø di una 20-ina di secondi, ma l'alone rimane praticamente "soffocato" dalla SAO 38039 di 8ª grandezza situata 1' scarso a SE; c'è una debole stellina a ridosso del bulge verso S — 450x.
UGC 1917	gx	02h27m27s	+24°15.5'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è un piccolo e comodo asterismo di riferimento formato da 4 stelline, e foggiato a pausa musicale di un ottavo, subito a SE — 450x.
UGC 1918	gx	02h27m33s	+25°40.1'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debole, allungata da NW a SE, 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole al bordo orientale e un'altra appena percettibile quasi a ridosso NW; stella brillante a 1.5'; meglio definita a 270x.
UGC 1919	gx	02h27m38s	+36°09.1'		Tri	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; situata tra 2 stelline distanti ~ 1': quella a W fa parte di un piccolo arco di 3 componenti — 380x.
UGC 1924	gx	02h27m50s	+31°43.5'		Tri	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da N a S ed estesa ~ 80"; c'è una stellina al bordo N e una appena percettibile verso quello meridionale — 450x.
UGC 1933	gx	02h28m17s	+38°25.4'		And	28"	m. buona / ottimo	è un lucore molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, che aggetta a S di una stellina brillante, esteso una 30-ina di secondi, ma di forma indistinta — 495x.
UGC 1934	gx	02h27m51s	+00°30.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da WNW a ESE ed estesa ~ 1'; appare abbastanza facilmente anche in visione diretta a 450x.
UGC 1938	gx	02h28m22s	+23°12.9'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma bisogna spingere a 380x; a tratti appare allungata da N a S e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole a 1' verso E.
UGC 1939	gx	02h28m18s	+26°18.7'		Ari	16"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di 30" e condensazione centrale di aspetto stellare osservabile a 380x; c'è una stellina brillante a 1' SSE.
UGC 1940	gx	02h28m22s	+28°08.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina brillante subito a S — 495x.
UGC 1945	gx	02h28m13s	−01°20.8'		Cet	16"	buona / buono	relativamente facile, con gradiente medio di luce, allungata ~ da N a S e di dimensioni 2' ×30"; c'è una stellina presso l'estremità settentrionale — 270x.
UGC 1948	gx	02h28m49s	+38°10.0'		And	24"	ottima / buono	debole e diffusa, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×20" e con piccola condensazione centrale evidente, ma poco contrastata; c'è una stellina brillante a 1' scarso SW e una debole più o meno alla stessa distanza verso NE; una stellina appena percettibile si trova al bordo ESE della gx — 450x.
UGC 1950	gx	02h28m40s	+23°47.8'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1955	gx	02h28m54s	+25°20.6'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×30", ma è meglio scalare a 340x.
UGC 1957	gx	02h29m23s	+47°29.4'		And	28"	ottima / buono	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa almeno 1'; un nucleo stellare molto tenue appare solo a momenti; c'è una doppia serrata e sbilanciata subito a W. A ~ 8' verso W c'è un asterismo arcuato esteso una 12-ina di primi, con la concavità rivolta verso la gx e formato da 6 stelle brillanti di luminosità crescente da N a S (la 2ª da S è una doppia) — 495x.
UGC 1958	gx	02h28m59s	+28°08.7'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso S — 495x.
UGC 1960	gx	02h29m12s	+38°23.7'		And	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 495x.
UGC 1962	gx	02h28m55s	+00°22.3'		Cet	24"	m. buona / buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, orientata da E a W con dimensioni 60"×40"; è situata a ridosso verso W di un piccolo triangolo rettangolo di stelline brillanti — 450x.
UGC 1963	gx	02h29m26s	+31°28.2'		Tri	16"	buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; si vede abbastanza facilmente anche ad alti ingrandimenti, ma è meglio contrastata a 270x.
UGC 1965	gx	02h29m26s	+20°13.0'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole e di aspetto uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 450x.
UGC 1966	gx	02h29m24s	+10°10.6'		Cet	24"	buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S, di dimensioni 50"×40" e con piccolo nucleo poco contrastato; c'è una stellina brillante a 1' ENE e una più debole subito a NE — 450x.
UGC 1968	gx	02h29m50s	+29°44.5'		Tri	28"	m. buona / buono	debolissima chiazza che, in visione distolta, solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; una coppia di deboli stelline si trova a 1' verso E — 495x.
UGC 1970	gx	02h29m54s	+25°15.4'		Ari	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole, poco diffusa e con bulge appena evidente, orientata da NNE a SSW ed estesa per almeno 1.5' — 450x.
UGC 1971	gx	02h30m00s	+28°38.0'		Tri	16"	buona / m. buono	debole, di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 380x.
UGC 1972	gx	02h30m07s	+38°06.1'		And	16"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 380x.
UGC 1973	gx	02h29m41s	+06°52.8'		Cet	16"	ottima / scarso	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 35"40"; forma un triangolo equilatero con 2 stelline brillanti — 270x.
UGC 1974	gx	02h29m50s	+09°50.9'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 1975	gx	02h30m15s	+33°07.9'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una doppia stretta a 1.5' ESE — 495x.
UGC 1976	gx	02h30m22s	+35°19.5'		Tri	16"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE (ossia poco più "inclinata" rispetto alle 2 stelline a W, una delle quali si trova quasi a ridosso della gx) con dimensioni 60"×30"; meglio osservabile a 270x.
UGC 1980	gx	02h30m34s	+32°10.6'		Tri	16"	buona / m. buono	allungata da NW a SE, con dimensioni 50"×30", poco diffusa e leggermente più brillante all'interno — 380x.
UGC 1981	gx	02h30m17s	+00°56.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di aspetto confuso, appare solo a momenti all'interno di un piccolo triangolo rettangolo; è però spostata verso la stellina più a N dalla quale, in visione distolta, sembra aggettare; è appena più evidente scalando a 340x.
UGC 1984	gx	02h30m53s	+43°21.0'		And	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 45"; c'è una stellina brillante subito a N (fa parte di una coppia di stelle di uguale luminosità orientata da E a W) — 450x.
UGC 1987	gx	02h31m13s	+43°20.3'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina brillante a ridosso S — 450x.
UGC 1988	gx	02h31m15s	+40°23.4'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE e una appena percettibile a ridosso W — 450x.
UGC 1989	gx	02h31m19s	+42°52.5'		And	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30" o poco più; c'è una stellina a bordo W; è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti orientate da NE a SW e distanti 3' — 450x.
UGC 1993	gx	02h31m40s	+39°22.7'		And	24"	ottima / m. buono	debole, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 80"×20" e con piccolo bulge diffuso poco contrastato; situata tra una stellina a S e una coppia a N — 450x.
UGC 1995	gx	02h31m26s	+01°20.8'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 1997	gx	02h32m15s	+43°27.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce poco diffusa, orientata da E a W, estesa un'80-ina di secondi e con piccolo bulge appena evidente — 450x.
UGC 1998	gx	02h31m43s	+00°17.6'		Cet	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa di ~ 45"×30", orientata da NW a SE e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta ma è meglio scalare a 340x.
UGC 1999	gx	02h31m52s	+19°09.2'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce che appare in visione distolta subito a W di una stellina (che fa parte di un piccolo triangolo equilatero); è estesa oltre 1' in direzione E-W — 270x.
UGC 2000	gx	02h31m53s	+05°35.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 450x, ma solo a momenti si riesce a capire che è orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15".
UGC 2001	gx	02h32m23s	+42°11.9'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina evidente al bordo S; una debole si trova a ridosso NE — 450x.
UGC 2003	gx	02h32m26s	+39°24.4'		And	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N e una debole subito a S; disturbata dalla SAO 55639 di 8ª grandezza situata 2.5' a SSW — 450x.
UGC 2004	gx	02h32m00s	+00°54.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina evidente al bordo meridionale — 450x.
UGC 2005	gx	02h31m58s	+01°14.8'		Cet	16"	ottima / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina evidente a 1' E e un'altra più debole a uguale distanza verso NW — 380x.
UGC 2006	gx	02h32m40s	+42°25.7'		And	28"	ottima / buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina brillante a ridosso N — 495x.
UGC 2007	gx	02h32m14s	+09°43.2'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; situata tra una stellina a NW e una coppia di stelline abbastanza brillanti a SE — 450x.
UGC 2008	gx	02h32m32s	+31°36.5'		Tri	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima chiazza di aspetto confuso, non più estesa di 20" e che in visione distolta sembra aggettare a E da una stellina; allineata ed equidistante con due stelline brillanti a E e una poco più debole a W — 450x.
UGC 2009	gx	02h32m08s	−01°22.5'		Cet	16"	ottima / ottimo	assieme a UGC 2010 forma una coppia di gx separate da 1.5' in direzione NNW-SSE; la 1ª è debolissima, diffusa con Ø < 30"; la 2ª è relativamente facile, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 2010	gx	02h32m07s	−01°21.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	v. **UGC 2009**
UGC 2011	gx	02h32m38s	+31°33.8'		Tri	24"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, con una stellina brillante al margine N che ne disturba la forma; in visione distolta appare allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
UGC 2012	gx	02h32m42s	+21°01.9'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa, a tratti si vede allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 45"×30"; una condensazione centrale molto tenue appare ogni tanto, ma bisogna scalare a 188x.
UGC 2015	gx	02h32m55s	+34°51.6'		Tri	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda, molto diffusa, di 45" di Ø, con tenue e piccola condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 380x.
UGC 2018	gx	02h32m40s	+00°15.6'		Cet	16"	ottima / ottimo	facile, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare — 380x.
UGC 2019	gx	02h32m39s	+00°37.1'		Cet	24"	m. buona / buono	piccola, poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø < 30" — 450x.
UGC 2020	gx	02h32m54s	+23°19.6'		Ari	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da WNW a ESE (più o meno come le 3 stelline allineate situate 3' a E) ed estesa 1'; appare facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una debole stellina a poco più di 1' NE — 450x.
UGC 2021	gx	02h32m52s	+05°42.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale evidente — 450x.
UGC 2022	gx	02h33m17s	+32°44.8'		Tri	24"	ottima / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' WNW — 450x.
UGC 2023	gx	02h33m18s	+33°29.4'	q 93	Tri	16"	scarsa / buono	debolissimo lucore diffuso e di forma indistinta; in visione distolta appare a tratti poco più brillante all'interno A ridosso verso W c'è una stringa di 5 stelline allineate da N a S — 270x.
UGC 2024	gx	02h33m01s	+00°25.2'		Cet	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da NNW a SSE e con un nucleo molto brillante che rende alquanto difficoltoso capirne le dimensioni; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
UGC 2027	gx	02h33m10s	+08°54.6'		Cet	24"	buona / buono	presenta un nucleo piccolo e abbastanza brillante, quasi stellare, circonfuso da un tenuissimo alone appena percettibile in visione distolta ed esteso una 30-ina di secondi; ci sono due stelline a ridosso verso S osservabile a tratti a 450x.
UGC 2028	gx	02h33m18s	+22°23.6'		Ari	16"	ottima / buono	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni ~ 60"×30" e molto diffusa — 270x.
UGC 2029	gx	02h33m20s	+22°45.1'		Ari	24"	m. buona / ottimo	è una gx elusiva che appare solo a momenti in visione distolta, ma non riesco a capire com'è fatta; non dovrebbe comunque essere più estesa di 30"-35" — 450x.
UGC 2031	gx	02h33m24s	+20°16.4'		Ari	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata a 270x.
UGC 2033	gx	02h33m43s	+37°39.9'		And	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, ma non riesco a capirne la forma perché c'è proprio una stellina brillante sovrapposta anche se poco spostata verso W; grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 2034	gx	02h33m42s	+40°31.7'	q 62	And	28"	m. buona / m. buono	debole, molto spampanata, approssim. rotonda con Ø di 1', praticamente compresa tra una stellina abbastanza brillante a E e una debole a W; un'altra stellina si trova verso il margine N; c'è una doppia stretta e sbilanciata subito a NE; poco meglio evidente scalando a 291x.
UGC 2035	gx	02h33m58s	+44°20.7'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 2037	gx	02h33m39s	+06°28.4'		Cet	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole orientata da E a W e che in visione distolta appare estesa almeno 45"; c'è una debole stellina subito a W — 450x.
UGC 2038	gx	02h34m08s	+40°30.8'		And	28"	m. buona / m. buono	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; è purtroppo anche disturbata da una stellina brillante di 9ª grandezza situata 1.5' a W — 495x.
UGC 2041	gx	02h33m54s	+09°37.9'		Cet	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni di 30"×20" — 450x.
UGC 2043	gx	02h34m24s	+45°00.2'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2044	gx	02h33m56s	+00°55.4'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 2046	gx	02h34m15s	+30°00.4'		Ari	28"	m. buona / buono	è una piccola chiazza elusiva, estesa una 30-ina di secondi, ma di forma indistinta che appare a tratti in visione distolta subito a NE di una stellina brillante — 495x.
UGC 2050	gx	02h34m39s	+44°54.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
UGC 2051	gx	02h34m05s	+01°21.1'		Cet	16"	ottima / buono	presenta un nucleo stellare abbastanza brillante circonfuso da un alone molto tenue e molto piccolo, con Ø pari alla distanza delle 2 stelline situate a SW (una 20-ina di secondi) — 380x.
UGC 2054	gx	02h34m33s	+33°56.5'		Tri	16"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme e molto disturbata da una stella brillante di 8.5m situata 1.5' S; la gx è allungata da E a W con dimensioni ~ 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE e un'altra più brillante subito a SE — 270x.
UGC 2055	gx	02h34m38s	+37°07.9'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore di aspetto a prima vista confuso, ma a tratti in visione distolta appare grosso modo rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; allineata, ma non equidistante con 2 stelline a N — 495x.
UGC 2056	gx	02h34m16s	+02°36.8'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a 1' verso N — 450x.
UGC 2058	gx	02h34m53s	+41°07.1'		And	28"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; ci sono 2 stelline brillanti un paio di primi a E e a S — 495x.
UGC 2060	gx	02h35m03s	+41°21.4'		And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso E e una appena percettibile al bordo N — 450x.
UGC 2061	gx	02h34m38s	−00°58.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×15" — 450x.
UGC 2062	gx	02h34m36s	+01°20.8'		Cet	16"	ottima / buono	debolissimo ovale di luminosità uniforme orientato da E a W con dimensioni 30"×20"; si trova quasi a ridosso NW della più settentrionale di due stelline distanti 1' e orientate da NE a SW — 380x.
UGC 2064	gx	02h35m10s	+20°51.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina a ridosso N; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2065	gx	02h35m23s	+37°29.2'		And	16"	ottima / ottimo	è la più meridionale di un terzetto di deboli galassie di cui fanno parte UGC 2067 e UGC 2069 — molto debole, rotonda, di luminosità uniforme e Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
UGC 2067	gx	02h35m29s	+37°31.1'		And	16"	ottima / ottimo	fa parte di un terzetto di deboli galassie assieme a UGC 2065 e UGC 2069 — debole lama di luce estesa 1.5' in direzione NNW-SSE e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 2069	gx	02h35m38s	+37°38.5'		And	16"	ottima / ottimo	è la più settentrionale di un terzetto di deboli galassie di cui fanno parte UGC 2065 e UGC 2067 — appare come un debole alone molto diffuso e di luminosità uniforme, leggermente ovale situato asimmetricamente verso SW da una stellina brillante; la galassia è grosso modo orientata da E a W con dimensioni 60"×45" — 380x.
UGC 2071	gx	02h35m24s	+19°56.5'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.

UGC 2073	gx	02h36m04s	+42°25.2'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, presenta un bulge brillante di 30"×20" allungato da N a S circonfuso da un disco molto tenue di dimensioni 45"×30" e orientato da E a W *(ultima gx osservata nella notte poiché è sorta la Luna)* — 450x.
UGC 2074	gx	02h36m02s	+42°36.8'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo quasi stellare marcato; c'è una doppia serrata e irrisolta a 1.5' NW — 450x.
UGC 2075	gx	02h35m39s	+06°16.3'		Cet	16"	ottima / scarso	relativamente facile, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, con piccola condensazione centrale evidente e diffusa; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 270x.
UGC 2077	gx	02h36m11s	+34°35.7'		Tri	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
UGC 2078	gx	02h36m00s	+10°26.4'		Cet	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E — 450x.
UGC 2081	gx	02h36m01s	+00°25.3'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, appare facilmente in visione distolta, ma è meglio contrastata scalando a 340x; orientata da E a W con dimensioni 80"×40".
UGC 2082	gx	02h36m16s	+25°25.4'	q 130	Ari	16"	m. buona / scarso	è una debole lama di luce di luminosità uniforme, estesa per circa 3' e orientata da NW a SE. C'è una stellina appena percettibile a ridosso di SW — 132x.
UGC 2083	gx	02h36m30s	+32°42.9'		Tri	16"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 380x.
UGC 2084	gx	02h36m33s	+36°08.0'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" (nel campo sono presenti alcune stelle brillanti tra cui la SAO 55700 di 9ª grandezza un paio di primi a S) — 495x.
UGC 2085	gx	02h36m07s	+01°33.3'		Cet	24"	ottima / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S ed estesa 1' scarso; una stellina percettibile solo a momenti si trova a ridosso N; c'è un asterismo di 4 stelline brillanti a SW — 450x.
UGC 2086	gx	02h36m13s	+14°04.9'		Ari	16"	m. buona / scarso	debolissima ,ma alta fuori con relativa facilità in visione distolta a 380x; è rotonda con Ø di 40"; c'è una stellina a 1.5' NW; situata all'interno di un trapezio sghembo di stelle brillanti.
UGC 2087	gx	02h36m02s	+31°35.8'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto disturbata dalla SAO 55703 di 6ª grandezza situata 2.5' a W; ho dovuto spingere a 580x per poterla individuare; in visione distolta appare molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S.
UGC 2090	gx	02h36m38s	+34°36.5'		Tri	24"	ottima / buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 35" (ossia poco superiore a quello di UGC 2077 osservata subito prima e situata 5' a W) — 450x.
UGC 2091	gx	02h36m24s	+00°42.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2092	gx	02h36m32s	+07°18.5'		Cet	24"	buona / buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW e che in visione distolta supera i 2'; meglio contrastata scalando a 340x (a 450x sembra poco più evidente, ma meno estesa).
UGC 2094	gx	02h36m51s	+36°06.7'		Tri	28"	m. buona / ottimo	diffusa e di luminosità uniforme, di aspetto molto regolare, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NE e una più distante a 1.5' SW — 495x.
UGC 2096	gx	02h36m56s	+11°05.2'		Ari	24"	buona / buono	debole lama di luce orientata da N a S ed estesa per ~ 45" (poco meno della distanza della coppia sbilanciata di stelle brillanti situata a SE — 450x.
UGC 2098	gx	02h37m14s	+19°56.9'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina a 1.5' NW — 450x.
UGC 2099	gx	02h37m13s	+21°34.0'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina al bordo SE — 450x.
UGC 2100	gx	02h37m30s	+33°37.9'		Tri	24"	ottima / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; è situata tra due stelline brillanti distanti 3' in direzione E-W; meglio evidente a 340x.
UGC 2101	gx	02h37m37s	+42°38.1'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina a ridosso N, una dalla parte opposta e una 3ª più debole subito a W — 450x.
UGC 2104	gx	02h37m27s	+23°18.0'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 2105	gx	02h37m40s	+34°25.7'		Tri	16"	scarsa / buono	debole, ma relativamente compatta e facile, approssim. circolare con Ø max 40" e luminosità pressoché uniforme — 270x.
UGC 2106	gx	02h37m24s	−01°49.3'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 50"×20" (ossia di poco inferiori a quelle di NGC 1037 dalla quale dista 9' verso W — 380x.
UGC 2109	gx	02h37m58s	+34°14.5'		Tri	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, leggermente ovale, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×50"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N (forse all'interno dell'alone); un'altra stellina si trova a 1' più a N — 270x.
UGC 2111	gx	02h38m05s	+41°47.4'		And	16"	ottima / m. buono	molto debole e molto allungata da NW a SW con dimensioni 90"×30"; presenta un bulge diffuso appena più contrastato sul disco — 380x.
UGC 2116	gx	02h38m12s	+30°50.8'		Ari	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore che appare a tratti in visione distolta a 1.5' SE di una stellina molto debole; dovrebbe essere estesa almeno 1' — 270x (a 380x si riesce a tenere fuori campo la SAO 55739 di 7ª situata 4' SE, ma la galassia scompare).
UGC 2120	gx	02h38m07s	+01°23.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 2121	gx	02h38m04s	+01°41.2'		Cet	24"	m. buona / buono	debole chiazza rotonda, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con Ø di almeno 1'; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2122	gx	02h38m27s	+29°45.5'		Ari	16"	buona / m. buono	molto debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; meglio contrastata a 380x.
UGC 2126	gx	02h38m47s	+40°41.9'		And	24"	m. buona / ottimo	debole chiarore circolare con Ø di 45", molto diffuso e appena più brillante all'interno; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso W; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2130	gx	02h38m24s	+07°59.6'		Cet	24"	m. buona / buono	debole lama di luce estesa 1' scarso e orientata da NW a SE, con un nucleo stellare visibile solo a momenti; c'è una stellina subito a SW e un'altra poco più distante a SW — 450x.
UGC 2131	gx	02h38m40s	+33°26.7'		Tri	24"	ottima / buono	debolissima chiazza oblunga estesa ~ 1' e orientata da E a W; appare in visione distolta tra la brillante SAO 55748 di magnitudo 6.5 situata un paio di primi scarsi a SE, e che disturba parecchio l'osservazione, e una stellina alla stessa distanza verso NW; una stellina molto debole salta fuori dal bagliore della stella subito a E della gx; la visione non cambia passando da 340x a 450x.
UGC 2134	gx	02h38m52s	+27°50.8'		Ari	16"	ottima / buono	molto debole, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con bulge diffuso appena più contrastato del disco; meglio osservabile a 270x (a 380x si "spampana" troppo).
UGC 2135	gx	02h39m11s	+41°14.7'		Per	28"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; c'è una debole stellina quasi a ridosso NE e una appena percettibile al bordo S — 495x.
UGC 2140	gx	02h39m06s	+18°23.0'		Ari	24"	m. buona / buono	**Hickson 18B** — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso E; una sorta di piccolo nodulo rotondo esteso meno di 20" si "stacca" ogni tanto verso N, e di fatto si tratta di Hickson 18D — 450x.
UGC 2140A	gx	02h39m09s	+18°22.0'		Ari	24"	m. buona / buono	**Hickson 18A** — debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 2143	gx	02h39m37s	+36°04.9'		Tri	16"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 380x.
UGC 2144	gx	02h39m30s	+29°15.5'		Ari	28"	m. buona / ottimo	debolissima, appare elusivamente in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma; sembra comunque estesa una 40-ina di secondi ed è situata all'interno di un rettangolo un po' irregolare allungato da N a S e formato da 4 stelline — 495x.
UGC 2146	gx	02h39m52s	+43°05.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola chiazza elusiva estesa sì e no una 20-ina di secondi; appare solo a momenti in visione distolta quasi a ridosso W di una coppia di stelline — 495x.
UGC 2150	gx	02h39m41s	+09°54.7'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, ma è meglio scalare a 340x, anche perché nel campo non sono presenti stelline di riferimento utili — 450x.
UGC 2151	gx	02h39m58s	+28°19.5'		Tri	16"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente allungata da WNW a ESE, ma bisogna restare a 270x.
UGC 2155	gx	02h40m06s	+14°22.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare visibile però solo a momenti — 450x.
UGC 2156	gx	02h40m19s	+32°15.6'		Tri	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 1' e di luminosità uniforme; è molto disturbata dalla SAO 55773 di 7ª situata 4' NNE; c'è una stellina a ridosso verso N — 270x.
UGC 2157	gx	02h40m25s	+38°33.8'		Per	16"	buona / m. buono	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1'; c'è una stellina a ridosso del bordo NW; meglio contrastata a 270x.
UGC 2161	gx	02h40m47s	+43°49.1'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina al bordo NW — 450x.
UGC 2163	gx	02h40m39s	+15°42.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima chiazza di forma indistinta estesa una 20-ina di secondi con nucleo stellare visibile a tratti, "annegata" nella luce della SAO 93044 di 8ª grandezza che brilla ad appena 1' verso S — 450x.
UGC 2164	gx	02h41m09s	+43°40.9'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 2165	gx	02h41m15s	+38°44.7'		Per	16"	buona / m. buono	elusiva macchiolina forse rotonda ed estesa una 30-ina di secondi; è situata a ridosso SE di una stellina brillante — 270x.
UGC 2166	gx	02h41m10s	+35°51.5'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante subito a E — 495x.
UGC 2167	gx	02h40m55s	+08°35.7'		Cet	16"	ottima / scarso	piccola e debolissima, appare solo a tratti in visione distolta, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 270x.
UGC 2169	gx	02h41m36s	+37°13.6'		Tri	24"	ottima / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione stellare meglio evidente a 340x; c'è una stringa di 5 stelline allineate da NE a SW a W della gx — 450x.
UGC 2172	gx	02h42m11s	+43°21.4'		Per	24"	ottima / m. buono	chiazza molto debole e diffusa, poco più brillante al centro, molto disturbata da una stellina brillante al bordo N; in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è un asterismo di 5 stelline che ricorda la pausa musicale di 1/8 subito a S — 450x.
UGC 2174	gx	02h42m06s	+32°22.5'		Tri	16"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø di 1' scarso; appare più facilmente scalando a 188x.
UGC 2175	gx	02h42m16s	+42°23.6'		Per	28"	ottima / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo E; una coppia di deboli stelline si trova a ridosso SW — 495x.
UGC 2176	gx	02h41m54s	+05°56.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso W — 450x.
UGC 2179	gx	02h42m33s	+35°12.2'		Per	16"	buona / m. buono	debolissima, diffusa e non più estesa di 30"; appare solo in visione distolta a ridosso S di una stellina; quest'ultima fa parte di un piccolo asterismo di 5 stelline: quella a NW è una doppia stretta dalle componenti sbilanciate — 270x.
UGC 2180	gx	02h42m39s	+39°32.0'		Per	24"	m. buona / ottimo	è un debole baffo di luce diffuso esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
UGC 2181	gx	02h42m13s	+02°25.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 2185	gx	02h43m11s	+40°25.6'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N (la più settentrionale di un triangolo isoscele molto aperto formato da 3 stelline di luminosità simile); meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2186	gx	02h43m08s	+41°03.7'		Per	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina molto debole a ridosso NW — 450x.
UGC 2192	gx	02h43m35s	+47°49.5'		Per	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, molto allungata da E a W, dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare poco più contrastato del disco; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
UGC 2194	gx	02h43m27s	+41°24.4'		Per	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; poco meglio contrastata a 450x per ridurre il fastidio delle numerose stelle di campo.
UGC 2195	gx	02h43m31s	+41°56.3'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una debole stellina al bordo N e una appena percettibile a quello E; due stelline più evidenti situate a SSE e SSW completano un piccolo trapezio un po' irregolare — 495x.
UGC 2196	gx	02h43m32s	+44°21.5'		Per	28"	m. buona / m. buono	debole chiazza circolare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e appena più evidente all'interno — 495x.
UGC 2197	gx	02h43m26s	+31°28.3'		Tri	24"	ottima / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×45"; ci sono 2 stelline molto debole a ridosso NE e SW; una terza stellina si trova 1' a SE — 450x.
UGC 2199	gx	02h43m24s	+01°45.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente; allineata ed equidistante con 2 stelle a SW (la più lontana è la SAO 110708 di 8ª grandezza che disturba un poco l'osservazione) — 450x.
UGC 2202	gx	02h43m49s	+32°23.3'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso W; è disturbata dalla SAO 55822 di 7ª grandezza situata a 3' SE che non si riesce a tenere fuori campo — 495x.
UGC 2205	gx	02h43m55s	+33°10.1'		Tri	16"	buona / m. buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta, estesa forse una 30-ina di secondi — 270x.
UGC 2206	gx	02h43m52s	+33°20.9'		Tri	16"	buona / m. buono	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di 30" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 2212	gx	02h44m25s	+33°44.1'		Tri	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
UGC 2213	gx	02h44m34s	+37°58.7'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata all'interno di un minuscolo triangolo rettangolo formato da deboli stelline a ridosso della gx (quella a SE è la più evidente); la visione è comunque disturbata dalla SAO 55827 di magnitudo 8.6 a 1' NNW — 495x.
UGC 2215	gx	02h44m53s	+41°59.4'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW; un'altra più evidente e poco più distante sempre a NW — 450x.
UGC 2216	gx	02h44m21s	+00°40.5'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 2217	gx	02h44m43s	+16°43.7'		Ari	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE ed estesa 1'; c'è una stellina subito a NNW (sul prolungamento dell'asse) — 450x.
UGC 2218	gx	02h44m58s	+32°42.4'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccolo nucleo evidente; situata all'interno di un piccolo triangolo di stelline brillanti e di luminosità decrescente partendo da quella più a E e girando in senso orario — 495x.
UGC 2222	gx	02h45m10s	+32°59.4'		Tri	16"	buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con nucleo stellare e una stellina al bordo meridionale (forma una coppia ravvicinata con UGC 2225 situata 1' a SE) — 380x.
UGC 2223	gx	02h45m14s	+35°11.4'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
UGC 2225	gx	02h45m14s	+32°58.7'		Tri	16"	buona / m. buono	debolissima, poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 380x .
UGC 2226	gx	02h45m36s	+42°09.5'		Per	24"	m. buona / ottimo	diffusa, poco allungata da N a S, dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale molto evidente; forma una coppia ravvicinata con **CGCG 539-92** situata a ridosso W: quest'ultima è molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale poco contrastata — 450x.
UGC 2227	gx	02h45m54s	+42°48.7'		Per	28"	ottima / buono	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di 1' e piccolo bulge poco contrastato — 495x.
UGC 2229	gx	02h45m28s	+00°54.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; un debole nodulo diffuso con nucleo stellare si nota a ridosso SW: di fatto si tratta di MAC 0245+0054A — 450x.
UGC 2232	gx	02h46m04s	+36°54.3'		Per	16"	buona / m. buono	molto debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 40" e di luminosità uniforme; ci sono 2 stelline quasi a ridosso della gx: una a NE e l'altra a NW — 270x.
UGC 2233	gx	02h46m20s	+44°57.1'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20"; è situata tra una stellina abbastanza brillante a N e una più debole a S — 450x.
UGC 2234	gx	02h46m22s	+45°08.6'		Per	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi e orientato da NW a SE; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; ci sono 3 stelline molto deboli e allineate a ridosso S — 450x.
UGC 2235	gx	02h46m30s	+45°12.2'		Per	24"	m. buona / ottimo	è un'elusiva chiazza di forma indistinta, estesa sì e no 30" e molto disturbata da una stellina brillante situata subito a N; una stellina appena percettibile si trova a ridosso W; la visione non migliora scalando a 340x.
UGC 2236	gx	02h46m11s	+27°02.6'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, orientata grosso modo da N a S con dimensioni 40"×20"; la visione è purtroppo disturbata dalla SAO 75560 di magnitudo 8.8 situata a 2.5' E della gx e da un'altra stellina brillante a 1' SW — 450x.
UGC 2237	gx	02h46m24s	+35°13.7'		Per	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale evidente; allineata ma non equidistante con 2 stelline brillanti a S — 495x.
UGC 2238	gx	02h46m17s	+13°05.8'		Ari	16"	ottima / scarso	molto debole e diffusa, osservabile in visione distolta, di luminosità uniforme, con Ø di almeno 1' — 270x.
UGC 2239	gx	02h46m36s	+32°27.0'		Tri	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni che in visione distolta sono di 60"×15"; c'è una stellina molto debole a 1' E; una più brillante si trova un paio di primi verso W (è la più meridionale di 3 stelline allineate in direzione NW-SE — 495x.
UGC 2240	gx	02h46m57s	+48°11.6'		Per	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' verso N e una molto debole a ridosso W — 450x.
UGC 2244	gx	02h46m54s	+39°36.2'		Per	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **MCG+6-7-7** situata a ridosso N — molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 495x.
UGC 2248	gx	02h46m55s	+23°35.7'		Ari	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una debole stellina a 1' verso N e una abbastanza brillante a poco più di 1' SSE (ossia sul prolungamento dell'asse) — 450x.
UGC 2249	gx	02h47m24s	+45°31.9'		Per	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso W (fa parte di un asterismo irregolare di 8 componenti) — 450x.
UGC 2252	gx	02h47m02s	+15°25.3'		Ari	16"	m. buona / scarso	relativamente facile, ma probabilmente ho visto solo la parte centrale, poco diffusa e con alto gradiente, rotonda e con Ø max di 45" (le dimensioni sono inferiori alla distanza delle 2 stelline situate 4' SW) — 380x.
UGC 2255	gx	02h47m02s	+08°09.1'		Cet	16"	m. buona / scarso	è una piccola gx relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline i cui cateti misurano 1' — 380x.
UGC 2256	gx	02h47m41s	+40°29.7'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E — 450x.
UGC 2257	gx	02h48m04s	+48°45.6'		Per	24"	m. buona / m. buono	chiazza rotonda con Ø di una 40-ina di secondi molto debole, diffusa e di luminosità uniforme situata a ridosso S di un asterismo foggiato a "y" curvilinea formato da 4 stelline brillanti — 450x.
UGC 2259	gx	02h47m56s	+37°32.3'	q 93	Per	16"	buona / scarso	debole lucore di forma indistinta e di luminosità uniforme, situata un paio di primi SW di una stellina brillante; a ~ 1' SW da quest'ultima c'è una debole stellina sovrapposta — 188x.
UGC 2263	gx	02h47m38s	+16°50.1'		Ari	16"	m. buona / scarso	molto debole, rotonda con Ø di 30", poco più brillante all'interno; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline situate a S e distanti un paio di primi scarsi in direzione E-W — 380x.
UGC 2267	gx	02h47m52s	+23°24.9'		Ari	24"	m. buona / ottimo	più debole e diffusa di UGC 2248 di luminosità uniforme, orientata in modo simile e con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 2271	gx	02h47m45s	−00°24.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 2272	gx	02h48m04s	+27°06.2'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme, facilmente visibile in visione distolta quando si fissa la stella brillante situata un paio di primi SSE; è orientata da ENE a WSW ed estesa per 1.5' — 380x.
UGC 2273	gx	02h48m29s	+47°59.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×15"; ci sono 2 deboli stelline a NE e SE — 495x.
UGC 2275	gx	02h47m57s	+03°53.3'		Cet	16"	ottima / buono	è un'elusiva chiazza di luce grosso modo rotonda con Ø di un paio di primi che appare solo a tratti al centro di un asterismo irregolare di una dozzina di stelline brillanti (e altre più deboli); bisogna però scalare a 132x; sono riuscito a coglierla esattamente in meridiano.
UGC 2280	gx	02h48m54s	+41°46.7'		Per	28"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S del tenue bulge centrale la cui luce limita le dimensioni della gx (che è in realtà più estesa) — 495x.
UGC 2281	gx	02h49m07s	+47°07.9'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE, mentre un minuscolo triangolo isoscele di stelline si trova a ridosso NW — 450x.
UGC 2282	gx	02h48m42s	+14°18.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole chiazza, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"-50"; c'è una coppia di deboli stelline a 1.5 verso S — 450x.
UGC 2283	gx	02h48m40s	+17°13.4'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' NW e un'altra molto debole alla stessa distanza verso N — 450x.
UGC 2285	gx	02h48m35s	+06°31.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline: a 1' W e 1' N — 450x.
UGC 2286	gx	02h48m52s	+20°51.7'		Ari	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
UGC 2288	gx	02h49m13s	+35°20.1'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" o poco meno; c'è una stellina subito a SE; una coppia di stelline orientate come la gx si trova 1' a W — 495x.
UGC 2289	gx	02h49m01s	+15°44.0'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 2292	gx	02h45m28s	+00°54.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta nucleo stellare percettibile solo a momenti — 450x.
UGC 2294	gx	02h49m02s	+47°07.5'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, disturbata dalla SAO 38369 di 8ª grandezza situata 1.5' a NW; in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20" (o poco più) — 450x.
UGC 2295	gx	02h48m59s	+03°10.1'		Cet	16"	ottima / ottimo	facile, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30" e poco più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 2296	gx	02h49m10s	+18°20.1'		Ari	24"	m. buona / buono	è un alone circolare molto tenue con Ø di 30"-35" che circonda una stellina abbastanza brillante (e secondo me non può trattarsi del nucleo della gx) — 450x.
UGC 2297	gx	02h49m25s	+30°41.0'		Ari	16"	buona / m. buono	assieme a UGC 2300 forma una coppia di debolissime gx tra loro distanti 2.5 in direzione NE-SW; entrambe sono molto diffuse e di luminosità uniforme; la 1ª è orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; la 2ª sembra più estesa e orientata da E a W; ha una stellina quasi a ridosso verso W; appaiono poco meglio contrastate a 188x.
UGC 2300	gx	02h49m30s	+30°41.8'		Ari	16"	buona / m. buono	v. **UGC 2297**
UGC 2302	gx	02h49m09s	+02°07.6'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore molto diffuso, forse rotondo ed esteso oltre 1'; appare solo in visione distolta, ma bisogna scalare a 188x.
UGC 2303	gx	02h49m23s	+17°40.0'		Ari	16"	ottima / buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso N — 380x.
UGC 2304	gx	02h49m31s	+22°08.6'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×15"; meglio non scendere sotto i 450x; c'è una stellina appena percettibile subito a SE — 450x.
UGC 2305	gx	02h49m46s	+38°04.1'		Per	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e con nucleo stellare visibile a tratti a 270x; poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30".
UGC 2308	gx	02h50m12s	+47°03.3'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza approssim. circolare, estesa una 40-ina di secondi, situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline deboli allungato da E a W; la componente a E è doppia, mentre le 2 che formano il cateto minore si trovano a ridosso NW e SW della gx; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2309	gx	02h49m39s	+21°12.5'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso di NW e un'altra a 1' verso E — 450x.
UGC 2311	gx	02h49m28s	−00°52.4'		Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; presenta nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 2317	gx	02h50m24s	+46°11.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina al bordo E; la gx è allineata ed equidistante con due stelline brillanti a W — 495x.
UGC 2319	gx	02h49m54s	−01°00.2'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 2320	gx	02h50m11s	+12°52.9'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; forma una coppia ravvicinata con MAC 0250+1253 situata a ridosso N, ma la compagna, estesa non più di 15" appare elusivamente e solo a tratti — 450x.
UGC 2321	gx	02h50m13s	+18°21.1'		Ari	24"	m. buona / buono	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S — 450x.
UGC 2323	gx	02h50m13s	+08°10.0'		Cet	24"	m. buona / buono	è una chiazza circolare estremamente debole con Ø di una 30-ina di secondi e molto stemperata sul fondo cielo; solo a momenti si separa dall'alone di una stella brillante situata a ridosso N; meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 2324	gx	02h50m17s	+00°05.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MCG+0-8-28 situata a ridosso verso W — si sdoppiano abbastanza facilmente in visione distolta a 450x: UGC è più facile, diffusa, orientata da N a S con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno; la MCG è molto debole, di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"×10"; a 340x sembrano a prima vista un unico oggetto di aspetto un po' confuso.
UGC 2327	gx	02h50m39s	+20°41.0'		Ari	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, solo a tratti poco più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio definita a 270x.
UGC 2328	gx	02h51m00s	+37°28.0'		Per	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø di 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata nel "punto di minimo" di una sorta di catenaria orientata da N a S costituita da 9 stelle brillanti ed estesa per quasi 20' — 380x.
UGC 2329	gx	02h50m49s	+16°00.4'		Ari	16"	m. buona / scarso	relativamente facile, diffusa, piccola, rotonda con Ø di 30"; forma un piccolo triangolo rettangolo con una coppia di stelline situate a E coi cateti di 1.5' — 380x.
UGC 2330	gx	02h51m19s	+41°33.9'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SW; allineata ed equidistante con una coppia di stelle brillanti a S — 450x.
UGC 2333	gx	02h51m12s	+25°24.4'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15"; è disturbata da una coppia di stelline brillanti, la più luminosa delle quali si trova subito a N della gx — 450x.
UGC 2334	gx	02h51m35s	+40°43.9'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina, o forse un nodulo, visibile solo a momenti verso il margine NW; forma un trio con MCG+7-6-69 a ridosso NE e PGC 197725 a 1' NW — 450x.
UGC 2336	gx	02h51m12s	+08°04.6'		Cet	24"	buona / buono	debolissima chiazza di aspetto confuso, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso; occorre tuttavia scalare a 340x.
UGC 2338	gx	02h51m09s	+02°35.6'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, ma molto facile da vedere, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×30" (a 450x il campo oculare è virtualmente depleto).
UGC 2339	gx	02h51m24s	+16°02.5'		Ari	16"	m. buona / scarso	elusiva, estesa non più di 20", appare solo a tratti in visione distolta a 380x.
UGC 2340	gx	02h51m31s	+13°34.5'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta pare allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 2341	gx	02h51m41s	+17°39.7'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, di forma indistinta, estesa 15"-20"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE.
UGC 2343	gx	02h51m35s	−00°44.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a NW; disturbata dalla SAO 130148 di 7ª grandezza situata 3.5' a NW — 450x.
UGC 2346	gx	02h51m55s	+00°39.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 2347	gx	02h52m03s	+12°08.2'		Ari	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 2348	gx	02h52m13s	+13°59.5'		Ari	16"	m. buona / scarso	presenta un bulge evidente, piccolo circonfuso da un alone molto tenue del di 40"-45" — 380x.
UGC 2349	gx	02h52m42s	+41°19.5'		Per	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina a ridosso S e una brillante subito a NE — 495x.
UGC 2350	gx	02h52m41s	+41°23.8'		Per	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 495x.
UGC 2351	gx	02h82m45s	+46°56.3'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; situata a ridosso W di un rombo di 4 stelline orientato da N a S — 450x.
UGC 2358	gx	02h55m43s	+75°09.2'		Cas	16"	ottima / m. buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme; a tratti in visione distolta, a 380x, appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30".
UGC 2360	gx	02h53m23s	+31°41.3'		Per	24"	ottima / buono	debolissima chiazza approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, molto disturbata dalla SAO 55972 di 7ª grandezza situata 2.5' a S; una stellina appena percettibile appare a momenti a ridosso NW; una più evidente si trova a 1' verso SW — 580x.
UGC 2361	gx	02h53m35s	+41°53.1'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra due stelline orientate da NNE a SSW; una 3ª molto debole si trova a ridosso SE — 450x.
UGC 2363	gx	02h53m49s	+39°34.7'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' N e una coppia di deboli stelline a S — 495x.
UGC 2364	gx	02h53m22s	+06°32.4'		Cet	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" (è la gx che avevo cercato di osservare senza successo col 16" dopo aver puntato MCG+1-8-11A situata 4.5' a SSE).
UGC 2366	gx	02h54m00s	+36°25.9'		Per	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso N — 450x.
UGC 2367	gx	02h53m41s	+06°15.9'		Cet	16"	m. buona / scarso	molto debole e diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
UGC 2369	gx	02h54m02s	+14°58.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MCG+2-28-30** situata a ridosso N — questa è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione centrale abbastanza evidente e diffusa; la compagna è invece allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", diffusa e con condensazione centrale meno evidente, una stellina appena percettibile appare a tratti subito a E della coppia — 450x.
UGC 2370	gx	02h54m26s	+42°39.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa 1.5' in direzione NW-SE; appare abbastanza facilmente in visione distolta nonostante sia disturbata da 2 stelle brillanti che delimitano il campo oculare da NE a SW e che quindi non si possono tenere fuori entrambe — 495x.
UGC 2371	gx	02h53m52s	+02°17.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissimo baffo di luce orientato da N a S, esteso una 30-ina di secondi e con tenue nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina quasi a ridosso W; meglio visibile restando a 450x.
UGC 2372	gx	02h53m59s	+05°59.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole e spampanata, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio definita scalando a 340x.
UGC 2376	gx	02h54m22s	+31°17.6'		Per	16"	buona / m. buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø < 1' — 270x.
UGC 2379	gx	02h54m29s	+14°09.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, salvo una sorta di "nodulo" che appare solo a momenti a ridosso E in corrispondenza di **MAC 0254+1409;** la gx è orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; situata tra una stellina abbastanza brillante subito a N e una debole a S — 450x.
UGC 2381	gx	02h54m36s	+12°01.3'		Ari	24"	buona / buono	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa 1' scarso; situata a E di un piccolo asterismo di 4 stelline abbastanza brillanti foggiato a "L" — 450x.
UGC 2382	gx	02h54m39s	+09°21.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa 1'; poco meglio evidente scalando a 450x.
UGC 2384	gx	02h55m01s	+16°00.7'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 50"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE e un'altra poco più evidente a 1' verso N — 450x.
UGC 2385	gx	02h55m03s	−01°11.3'		Cet	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; è difficile da localizzare, perché il campo è depleto: meglio scalare a 340x.
UGC 2386	gx	02h55m11s	+09°20.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; una stellina percettibile solo a momenti si trova a ridosso E, mentre ci sono due stelline rispettivamente a 1' SE e 1' SW — 450x.
UGC 2387	gx	02h55m17s	+12°13.5'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina un paio di primi scarsi a S — 450x.
UGC 2390	gx	02h55m48s	+36°40.8'		Per	16"	buona / m. buono	è un'elusiva macchiolina rotonda di ~ 30" di Ø situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da NW a SE: quella a NW è appena percettibile; la gx appare solo a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x.
UGC 2392	gx	02h55m46s	+33°46.0'		Per	16"	buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa 1'; a prima vista sembra aggettare verso N da una debole stellina — 270x.
UGC 2393	gx	02h55m54s	+32°20.1'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, salvo un piccolo nucleo appena percettibile, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' NNW; allineata ed equidistante con 2 stelline a SW — 495x.
UGC 2395	gx	02h56m07s	+41°37.8'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, assai sfumata alle due estremità del fuso, di dimensioni 60"×15" e con piccolo bulge evidente; c'è una stellina al bordo E e una debole subito a N; allineata con 3 stelline abbastanza brillanti a S — 495x.
UGC 2399	gx	02h55m47s	+06°13.0'		Cet	16"	m. buona / scarso	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e Ø di 30", situato 2' SE di una stellina brillante (il seeing in questo momento è molto scarso): non posso spingere a 380x per limitare l'abbagliamento di una stella brillante di 7ª ubicata 5' SE) — 270x.
UGC 2401	gx	02h56m23s	+37°00.5'		Per	16"	buona / m. buono	molto debole, rotonda, di 40"-45" di Ø e con tenue condensazione centrale diffusa osservabile a 380x; salta fuori facilmente in visione distolta osservando la stellina brillante situata poco più di 1' a S.
UGC 2403	gx	02h55m57s	+00°41.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 2405	gx	02h55m58s	+06°29.7'		Cet	16"	m. buona / scarso	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; ho dovuto scalare a 132x per via del seeing.
UGC 2406	gx	02h56m09s	+15°47.5'		Ari	16"	m. buona / scarso	debolissima e piccola, estesa una 30-ina di secondi; appare a tratti a poco più di 1' W di una debole stellina che va e viene — 270x.
UGC 2413	gx	02h56m29s	+15°55.0'		Ari	16"	m. buona / scarso	forma una coppia ravvicinata con MCG+3-8-22 — si riescono a sdoppiare anche a 132x, ma è meglio osservarle a 270x, malgrado il seeing piuttosto scarso; la 1ª è rotonda con Ø 35"-40" e con condensazione centrale visibile a momenti; la 2ª è pure rotonda ma di Ø non superiore a 20"-25" e presenta una condensazione centrale sempre visibile a tratti.
UGC 2414	gx	02h56m18s	+04°31.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2415	gx	02h56m23s	+06°09.2'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" (fa parte dell'ammasso **AGC 400**) — 450x.
UGC 2416	gx	02h56m33s	+18°41.8'		Ari	16"	ottima / buono	elusiva e non più estesa di 30", appare a tratti in visione distolta fissando intensamente la stellina situata 1.5' SSW; l'esperimento riesce meglio a 380x.
UGC 2418	gx	02h56m27s	+00°52.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, di aspetto un po' irregolare e confuso; a prima vista sembra rotonda, ma in visione distolta è chiaramente orientata da E a W, con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; meglio definita scalando a 340x; c'è una stellina quasi a ridosso verso W.
UGC 2419	gx	02h56m33s	+07°20.0'		Cet	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, rotonda con Ø di 45" e poco più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 2421	gx	02h57m19s	+44°44.5'		Per	24"	m. buona / m. buono	è una piccola e debolissima chiazza diffusa approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi situata a ridosso N di una stella brillante che ne disturba l'osservazione — 450x.

UGC 2423	gx	02h56m47s	+04°58.6'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
UGC 2424	gx	02h57m07s	+17°30.9'		Ari	16"	ottima / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata ~ da N a S per un paio di primi; salta fuori solo in visione distolta; a tratti sembra di vedere un piccolo e tenuissimo bulge — 270x.
UGC 2428	gx	02h57m12s	−00°13.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
UGC 2429	gx	02h57m09s	+01°19.6'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da NE a SW ed estesa per quasi 1'; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E — 450x.
UGC 2430	gx	02h57m26s	+10°28.7'		Ari	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da E a W con dimensioni poco superiori a 30"×20" (ossia appena più estesa della successiva) e con condensazione centrale evidente; purtroppo disturbata dalla SAO 93204 di 8ª grandezza situata 1' a W — 450x.
UGC 2433	gx	02h57m30s	+10°27.5'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE e una appena percettibile a ridosso S — 450x.
UGC 2435	gx	02h58m03s	+35°15.5'		Per	16"	buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma occorre scalare sino a 188x; è probabilmente rotonda con Ø di almeno 1'.
UGC 2436	gx	02h58m16s	+36°30.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10"; c'è una stellina brillante a 1.5' SW — 495x.
UGC 2437	gx	02h57m54s	+11°11.0'		Ari	16"	m. buona / ottimo	è una chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di almeno 1'; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline: una a SSE e l'altra a SW; meglio tuttavia scalare a 270x.
UGC 2438	gx	02h57m53s	+13°01.8'		Ari	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare a tratti in visione distolta a 380x con estensione di 40"-45".
UGC 2441	gx	02h58m22s	+03°51.7'		Cet	24"	buona / buono	debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S ed estesa per un paio di primi — 450x.
UGC 2442	gx	02h58m36s	+25°06.8'		Ari	28"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa ed estesa una 30-ina di secondi, con nucleo stellare osservabile tuttavia solo a momenti; è situata a ridosso S della più orientale di 3 stelline abbastanza brillanti allineate da ENE a WSW — 495x.
UGC 2443	gx	02h58m21s	−02°02.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 60"×30" (c'è un curioso asterismo regolare di 7 stelline foggiato a croce: il braccio più lungo è in direzione WNW-ESE) — 450x.
UGC 2444	gx	02h58m30s	+06°18.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' scarso SE — 450x.
UGC 2446	gx	02h58m41s	+03°26.1'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, facilmente visibile a 380x, rotonda, di 20"-25" di Ø e di luminosità uniforme.
UGC 2448	gx	02h59m07s	+33°54.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	è un debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a 1' W di una debole stellina. Fa coppia ravvicinata con **MCG+6-7-24** situata subito a W — 495x.
UGC 2449	gx	02h59m23s	+47°04.7'		Per	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
UGC 2453	gx	02h59m15s	+16°02.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 2456	gx	03h00m00s	+36°49.2'		Per	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40" e con nucleo stellare evidente — 380x.
UGC 2457	gx	02h59m55s	+24°13.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza circolare di ~ 45" di Ø e di luminosità uniforme; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 2458	gx	03h00m26s	+44°38.2'		Per	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di forma indistinta estesa sì e no 30"; c'è una debole stellina a ridosso E; situata a E di un piccolo asterismo allungato da N a S formato da 5 stelline — 450x.
UGC 2459	gx	03h00m36s	+49°02.9'		Per	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce orientata da NE a SW, estesa 1' o poco più, con nucleo stellare evidente (il nucleo è allineato con due stelline abbastanza brillanti a E); la gx appare più chiaramente scalando a 340x.
UGC 2461	gx	03h00m23s	+34°04.3'		Per	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante subito a E — 450x.
UGC 2462	gx	03h00m30s	+34°02.4'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissima, si vede abbastanza facilmente in visione distolta, ma solo a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante verso N (la stessa della gx precedente situata 2.5' a NW — 450x.
UGC 2463	gx	03h00m37s	+40°15.1'	q 63	Per	16"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme; tuttavia, in visione distolta, appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni 2'×45"; una stellina appena percettibile è situata verso il bordo E; da segnalare una doppia stretta a un paio di primi verso S — 270x.
UGC 2465	gx	03h00m38s	+35°10.2'		Per	16"	ottima / ottimo	piccola lama di luce estesa una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme che si diparte verso SE da una stellina abbastanza brillante; facilmente visibile a 380x.
UGC 2469	gx	03h00m20s	+05°42.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 450x.
UGC 2470	gx	00h03m59s	+43°01.0'		Per	24"	m. buona / ottimo	facile, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge molto contrastato. La MAC 0300+4300 è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x come una stellina leggermente sfuocata a ridosso SW.
UGC 2477	gx	03h01m13s	+41°43.1'		Per	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso N — 450x.
UGC 2478	gx	03h03m30s	+74°39.9'		Cas	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso SW — 450x.
UGC 2482	gx	03h01m03s	−00°44.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto spampanata, in visione distolta appare a momenti orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi, ma occorre scalare a 340x.
UGC 2483	gx	03h01m37s	+31°49.2'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 45"×15" — 450x.
UGC 2485	gx	03h04m04s	+74°26.6'		Cas	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; a tratti in visione distolta sembra di vedere, a 380x, una condensazione centrale molto tenue.
UGC 2486	gx	03h01m30s	+17°51.2'		Ari	16"	ottima / buono	debolissimo e piccolo oggetto rotondo, diffuso, di max 30" di Ø e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso N; meglio visibile a 270x.
UGC 2489	gx	03h01m52s	+35°50.5'		Per	16"	ottima / ottimo	debolissima, stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; meglio contrastata a 270x.
UGC 2491	gx	03h01m54s	+35°44.0'		Per	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare visibile solo a tratti; è rotonda con Ø di ~ 45"; forma un triangolo equilatero con 2 deboli stelline situate rispettivamente 2.5' E e 2.5' SSE — 380x.
UGC 2493	gx	03h02m01s	+35°45.6'		Per	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 407** — debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso verso NW — 380x.
UGC 2494	gx	03h02m04s	+36°06.0'		Per	16"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"× 15"; c'è una stellina a ridosso SW (sul prolungamento dell'asse della gx) — 380x.
UGC 2495	gx	03h02m07s	+41°35.6'		Per	24"	buona / buono	relativamente facile, molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; presenta un piccolo bulge evidente e un nucleo stellare; non pare disturbata dalla SAO 38522 di 9ª grandezza situata un paio di primi a N — 450x.
UGC 2497	gx	03h02m08s	+29°06.4'		Per	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo fuso di 60"×20", orientato da E a W e situato a ridosso verso N di una stellina che fa parte di un piccolo triangolo equilatero — 270x.
UGC 2498	gx	03h02m12s	+17°20.7'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da ENE a WSW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE; meglio definita scalando a 340x.
UGC 2500	gx	03h02m44s	+41°37.6'		Per	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 2501	gx	03h02m34s	+02°11.7'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, allungata da NW a SE (ossia a perpendicolo con le 2 stelline situate un paio d primi a W) con dimensioni 60"×30"; presenta un nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 2506	gx	03h03m31s	+27°41.2'		Ari	16"	ottima / buono	debole e molto diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a 1.5' verso E — 380x.
UGC 2508	gx	03h03m11s	−01°57.7'		Eri	24"	buona / ottimo	è una debolissima lama di luce che appare come tale solo a momenti, in quanto disturbata da una stellina brillante situata a ridosso W (la componente più brillante di una tripletta); è orientata da N a S ed estesa ~ 40" — 450x.
UGC 2509	gx	03h03m24s	+04°29.5'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 2511	gx	03h04m20s	+48°16.2'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' NE e una coppia serrata a 1.5' sempre a NE — 495x.
UGC 2513	gx	03h03m39s	+01°56.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con piccolo nucleo brillante quasi stellare, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 2517	gx	03h04m12s	−01°11.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 2518	gx	03h04m18s	+01°45.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, meglio evidente a 450x (a 340x perde un po' di contrasto), orientata da E a W ed estesa almeno 1'.
UGC 2519	gx	03h09m20s	+80°07.8'		Cas	16"	ottima / m. buono	è un debole lucore molto diffuso e stemperato sul fondo cielo, di luminosità uniforme, poco allungato da N a S con dimensioni 80"×60" (l'asse maggiore è uguale alla distanza delle 2 stelline a qualche primo verso W); si riesce a vedere abbastanza facilmente a 380x *(è sorta la Luna).*
UGC 2522	gx	03h04m57s	+00°13.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge stellare; c'è una stellina al bordo SE — 450x.
UGC 2523	gx	03h05m09s	+01°05.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da N a S, estesa per 1' e con piccolo nucleo poco evidente; c'è una stellina a ~ 1' verso NE; meglio visibile a 450x (a 340x appare più "tozza").
UGC 2526	gx	03h05m43s	+36°47.1'		Per	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce leggermente più brillante all'interno, estesa oltre 2', spessa una 20-ina di secondi e orientata da NW a SE; in visione distolta sembra dipartirsi dalla SAO 56144 di 7ª grandezza — 380x.
UGC 2527	gx	03h05m20s	+02°22.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, orientata da ENE a WSW (come la coppia di stelline brillanti situate a S e a SE e con le quali forma un triangolo rettangolo), con dimensioni 45"×30"; c'è una stella abbastanza luminosa a 1' verso E 450x.
UGC 2528	gx	03h05m55s	+41°35.6'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", con tenue bulge diffuso e poco contrastato; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 2529	gx	03h05m29s	−00°22.9'		Cet	24"	buona / buono	debolissima chiazza di forma indistinta, estesa una 30-ina di secondi; appare in visione distolta a 450x quando si osserva la CGCG 389-78 situata poco più di 1' a S — 450x.
UGC 2534	gx	03h06m33s	+41°29.1'		Per	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un tenue nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 450x.
UGC 2536	gx	03h06m55s	+41°30.5'		Per	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare ab evidente — 450x.
UGC 2537	gx	03h07m05s	+46°37.2'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina evidente all'interno della gx verso il margine SE — 450x.
UGC 2538	gx	03h07m09s	+41°45.0'		Per	24"	m. buona / ottimo	è un debole baffo di luminosità uniforme che a 450x sembra aggettare per una 30-ina di secondi a NW dalla più settentrionale di una coppia di stelline brillanti.
UGC 2540	gx	03h07m01s	+36°10.1'		Per	24"	ottima / m. buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con piccolo bulge diffuso e poco contrastato; c'è una stellina molto debole al bordo N — 450x.
UGC 2547	gx	03h07m28s	+02°31.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2550	gx	03h08m16s	+36°27.0'		Per	16"	ottima / buono	elusiva, va e viene; situata al centro di una stringa di 4 stelline molto deboli, di luminosità simili e orientata all'incirca da N a S; a tratti la gx appare orientata da E a W per almeno 45" e sembra spostata un po' verso W rispetto alla stringa — 270x.
UGC 2552	gx	03h08m40s	+42°52.3'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (o poco più); c'è una coppia di stelline subito a S — 450x.
UGC 2553	gx	03h08m31s	+20°46.3'		Ari	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 270x.
UGC 2554	gx	03h08m55s	+41°28.0'		Per	24"	m. buona / ottimo	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
UGC 2559	gx	03h09m18s	+42°58.3'		Per	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 2562	gx	03h09m57s	+42°07.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 495x.
UGC 2564	gx	03h10m05s	+42°10.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale abbastanza evidente; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo formato da 2 stelline abbastanza brillanti e una più debole (quella a E) — 495x.
UGC 2565	gx	03h10m10s	+31°55.3'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 2568	gx	03h10m14s	+42°13.3'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; situata tra 2 deboli stelline orientate da NNW a SSE; 2 stelline abbastanza brillanti si trovano a 1' S e 1' SW — 495x.
UGC 2573	gx	03h10m56s	+45°01.1'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; situata all'interno di un quadrato formato da 4 stelline di luminosità simile; la gx è comunque disturbata dalla SAO 38624 di 8ª grandezza a 3' verso E — 495x.
UGC 2579	gx	03h11m27s	+35°27.5'		Per	16"	ottima / ottimo	molto debole, grosso modo rotonda con Ø di 30"-35" e appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 2585	gx	03h11m47s	−00°24.1'		Cet	16"	ottima / buono	è una chiazza di luminosità uniforme, molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; è molto disturbata dalla SAO 130333 di 7ª situata 6' SSW — 270x.
UGC 2587	gx	03h12m00s	−01°09.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce, estesa forse 1' in direzione NE-SW e con una piccola zona centrale più evidente — 450x.
UGC 2589	gx	03h12m33s	+12°23.1'		Ari	16"	m. buona / scarso	debole, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi; è situata all'interno di un asterismo foggiato a "Y" — 270x.
UGC 2592	gx	03h12m51s	+18°47.7'		Ari	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina al bordo W; un minuscolo triangolo di deboli stelline si trova subito a E — 495x.
UGC 2593	gx	03h13m07s	+28°38.0'		Ari	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso NE e una poco più debole a 1' verso E; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2594	gx	03h12m46s	−00°20.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø > 30", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; non sembra per nulla disturbata dal triangolo isoscele di stelle brillanti situato subito a S — 450x.
UGC 2596	gx	03h13m29s	+44°07.8'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una coppia di stelline a ridosso N; una 3ª stellina si trova all'interno del disco verso il margine N, ma è percettibile solo a momenti — 450x.
UGC 2597	gx	03h13m19s	+17°59.4'		Ari	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una coppia di deboli stelline a un paio di primi SSW — 495x.
UGC 2598	gx	03h14m08s	+41°17.5'		Per	24"	buona / buono	debole, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25", molto diffusa alle estremità e con piccolo nucleo stellare evidente; c'è una stellina subito a SE — 450x.
UGC 2599	gx	03h13m38s	+02°45.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15" (ossia poco più della distanza delle 2 stelline situate a E); presenta un tenue bulge diffuso appena percettibile; una stellina abbastanza brillante si trova a 1.5' verso N: tra quest'ultima e la gx appare, seppure a momenti, una debolissima stellina debolmente sfuocata che da un controllo successivamente effettuato è risultata essere la MAC 0313+0246 — 450x.
UGC 2602	gx	03h14m10s	+16°29.1'		Ari	16"	m. buona / scarso	è una debolissima chiazza rotonda, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con Ø di almeno 1'; c'è una stellina a 1' SW — 270x.
UGC 2604	gx	03h14m40s	+39°37.1'		Per	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; c'è una debole stellina a ridosso S — 450x.
UGC 2607	gx	03h14m09s	−01°38.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×30", con piccolo bulge appena percettibile; è situata sulla ipotenusa di un piccolo triangolo rettangolo di stelline brillanti; altre 2 stelline danno a questo triangolo una forma curiosa — 450x.
UGC 2608	gx	03h15m01s	+42°02.1'		Per	24"	ottima / m. buono	relativam. facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 2611	gx	03h14m25s	−01°54.9'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline luminose a NW — 450x.
UGC 2612	gx	03h15m14s	+41°58.8'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo E — 450x.
UGC 2614	gx	03h15m18s	+42°41.7'		Per	24"	buona / buono	relativamente facile, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con bulge molto tenue e poco contrastato; c'è una stellina brillante al bordo W — 450x.
UGC 2617	gx	03h16m01s	+40°53.1'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso S orientate da E a W (quella a E è più brillante); un'altra molto debole si trova subito a SW; ce n'è poi una appena percettibile a E, tra la gx e una coppia distante 1.5' in quella direzione; la gx meglio contrastata scalando a 340x — 450x.
UGC 2618	gx	03h16m01s	+42°04.5'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
UGC 2620	gx	03h20m18s	+80°14.8'	q 5	Cep	16"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo, forse circolare con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a ridosso SE — 270x.
UGC 2626	gx	03h16m59s	+41°21.5'		Per	28"	ottima / discreto	molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con piccola condensazione centrale molto evidente; c'è una coppia serrata di stelline quasi a ridosso SW — 388x.
UGC 2627	gx	03h16m59s	+31°34.0'		Per	24"	ottima / m. buono	chiazza molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a ridosso SW; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2628	gx	03h16m32s	−00°28.6'		Cet	24"	buona / buono	lama di luce molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per 1.5' (ossia come le 2 stelline brillanti situate a NW e a ESE) — 450x.
UGC 2629	gx	03h17m07s	+31°35.0'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
UGC 2630	gx	03h17m11s	+37°08.2'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N e una più evidente subito a NE — 450x.
UGC 2638	gx	03h17m02s	+01°15.3'		Cet	24"	ottima / buono	lama di luce molto debole debole, solo a tratti appena più brillante all'interno, orientata da N a S ed estesa 1' scarso; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NNE — 450x.
UGC 2639	gx	03h17m50s	+41°58.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	lama di luce relativamente facile, orientata da E a W, estesa 1' e appena più brillante all'interno; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE; una stellina brillante si trova invece a 1' verso N — 495x.
UGC 2640	gx	03h17m52s	+43°18.3'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina subito a W; una percettibile solo a momenti si trova a ridosso NW; 1.5' NW c'è una doppia serrata — 450x.
UGC 2641	gx	03h17m16s	+03°35.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"×15"; c'è una doppia stretta orientata da NW a SE (utile come riferimento) quasi a ridosso verso E — 450x.
UGC 2645	gx	03h17m26s	−00°05.7'		Cet	16"	ottima / buono	debolissima e molto piccola; solo a tratti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme, ma bisogna scalare a 270x.
UGC 2649	gx	03h17m36s	−01°49.1'		Eri	16"	ottima / buono	facile, rotonda, poco diffusa e con piccola condensazione centrale evidente — 380x.
UGC 2650	gx	03h17m35s	−01°41.7'		Eri	16"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina al bordo NE — 380x.
UGC 2653	gx	03h18m38s	+37°36.5'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; meglio contrastata scalando a 340x, anche se la stellina brillante situata 1' a W disturba l'osservazione; una stellina più debole è subito a S, mentre una coppia sbilanciata si trova a 1' NE — 450x.
UGC 2654	gx	03h18m43s	+42°18.0'		Per	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; sembra "incunearsi" in un piccolo triangolo rettangolo di deboli stelline situato verso S; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline abbastanza brillanti foggiato a "y" subito a N del gx — 450x.
UGC 2655	gx	03h18m45s	+43°14.4'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
UGC 2656	gx	03h18m43s	+41°04.3'		Per	28"	ottima / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso N e una debole subito a NE — 388x.
UGC 2659	gx	03h18m53s	+40°35.8'		Per	28"	ottima / discreto	debole e diffusa, appena più evidente all'interno, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×15" — 388x.
UGC 2661	gx	03h19m12s	+39°26.6'		Per	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×20", molto sfumata alle estremità del fuso e con piccolo bulge molto contrastato — 495x.
UGC 2665	gx	03h19m27s	+41°38.1'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 495x.
UGC 2667	gx	03h19m36s	+38°25.8'		Per	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare con molta fatica in visione distolta, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 280x.
UGC 2668	gx	03h19m45s	+40°28.6'		Per	28"	ottima / discreto	è un indistinto lucore, molto stemperato sul fondo cielo che appare a tratti elusivamente a SW della SAO 38728 di 9ª grandezza (che tende a offuscarla); non è comunque più estesa di 25"-30" — 388x.
UGC 2673	gx	03h20m02s	+41°15.1'		Per	28"	ottima / discreto	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; c'è una coppia di stelline brillanti a NE — 388x.
UGC 2674	gx	03h19m43s	+09°45.1'		Cet	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da trovare, rotonda, molto diffusa, con condensazione centrale evidente e Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1' NE — 380x.
UGC 2677	gx	03h19m57s	+03°35.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con tenue bulge esteso abbastanza evidente; in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 450x.
UGC 2678	gx	03h20m34s	+37°29.7'		Per	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza circolare di luminosità uniforme e Ø di una 30-ina di secondi, con una stellina a ridosso verso NE — 380x.
UGC 2679	gx	03h20m04s	+01°21.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W e una più debole a S — 450x.
UGC 2680	gx	03h20m07s	−01°52.9'		Eri	24"	buona / buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40".
UGC 2685	gx	03h20m52s	+38°15.2'		Per	16"	ottima / ottimo	poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40", diffusa e leggermente più brillante all'interno; c'è una stellina a ~ 1' verso W — 380x.
UGC 2686	gx	03h21m01s	+40°47.9'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 2687	gx	03h19m43s	+09°45.1'		Eri	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da trovare, rotonda, molto diffusa, con condensazione centrale evidente e Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1' NE — 380x.
UGC 2689	gx	03h21m27s	+40°48.1'		Per	24"	ottima / m. buono	allungata da NW a SE con piccolo bulge rotondo evidente, ma poco contrastato, molto diffusa alle estremità e con dimensioni di 60"×30" — 450x.
UGC 2690	gx	03h20m63s	−01°06.5'		Cet	24"	buona / buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante subito a W — 450x.
UGC 2691	gx	03h20m46s	−01°02.7'		Cet	24"	buona / buono	poco più debole di UGC 2690, dalla quale dista 4' a N; è di aspetto ancora più uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" — 450x.
UGC 2692	gx	03h20m59s	−00°22.1'		Cet	16"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 380x.
UGC 2698	gx	03h22m03s	+40°51.8'		Per	24"	ottima / m. buono	allungata da E a W con dimensioni 45"×30", molto diffusa alle due estremità E e W con bulge evidente e contrastato; c'è una stellina brillante a ridosso E e una più debole più o meno alla stessa distanza verso S — 450x.
UGC 2700	gx	03h22m54s	42°33.2'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole e poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15" — 495x.
UGC 2702	gx	03h22m55s	+37°02.0'		Per	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 1.5' e piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare osservabile a 270x; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E.
UGC 2704	gx	03h22m47s	−01°55.4'		Eri	16"	ottima / buono	rotonda, relativamente compatta, con basso gradiente e di 30" di Ø — 380x.
UGC 2705	gx	03h22m47s	+00°09.0'		Cet	24"	buona / buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 450x.
UGC 2706	gx	03h23m43s	+36°55.2'		Per	16"	ottima / ottimo	debolissima, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 2708	gx	03h23m49s	+40°33.5'		Per	24"	buona / buono	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
UGC 2709	gx	03h23m54s	+38°40.6'		Per	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina al bordo NW — 270x.
UGC 2710	gx	03h23m58s	+37°45.3'		Per	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti a 380x; in visione distolta sembra aggettare verso NW da una stellina brillante (la quale fa parte di un piccolo arco di 3 stelline equidistanti e di uguale luminosità); un'altra stellina appena percettibile si trova al bordo meridionale.
UGC 2713	gx	03h23m43s	−00°07.1'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; forma una coppia ravvicinata con MCG+0-9-78 a W (v. voce corrispondente) — 450x.
UGC 2716	gx	03h24m08s	+17°45.2'		Tau	16"	ottima / buono	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' NE e un'altra più lontana verso N — 270x.
UGC 2717	gx	03h24m36s	+40°41.5'		Per	24"	buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un piccolo nucleo brillante quasi stellare — 450x.
UGC 2722	gx	03h25m09s	+42°24.1'		Per	28"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa, grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N; una decisamente più luminosa si trova un paio di primi a SSW — 495x.
UGC 2725	gx	07h25m30s	+41°14.5'		Lyn	20"	m. buona / buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo puntiforme abbastanza evidente; c'è una stellina subito a NE; 3 stelline allineate si trovano a SE; disturbata dalla SAO 38809 di magnitudo 6.5 situata 4' W che non è possibile tenere fuori campo — 360x.
UGC 2729	gx	03h27m02s	+68°35.3'		Cas	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente solo una zona interna rotondeggiante con Ø sì no di 30" (ma la gx è almeno 3 volte più estesa); una coppia di stelline abbastanza brillanti si trovano a ridosso SW — 340x.
UGC 2730	gx	03h25m52s	+40°44.9'		Per	24"	buona / buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa almeno 1'; c'è una stellina molto debole al bordo SE — 450x.
UGC 2733	gx	07h26m03s	+41°15.1'		Lyn	20"	m. buona / buono	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ridosso W — 360x.
UGC 2735	gx	03h25m38s	−01°01.8'		Tau	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 60"×30" (o poco meno); c'è una stellina brillante a 1' verso N — 450x.
UGC 2736	gx	03h26m28s	+40°30.5'		Per	24"	buona / buono	relativamente facile e compatta, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×15" (quasi una edge-on) — 450x.
UGC 2740	gx	03h26m45s	+07°42.9'		Tau	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, appena più brillante all'interno, orientata da NW a SW (ossia a perpendicolo rispetto alla congiungente delle 2 stelline situate a NE e distanti ~ 1') con dimensioni 60"×40"; meglio scalare a 270x.
UGC 2742	gx	03h27m40s	+40°53.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 495x.
UGC 2744	gx	03h27m17s	+02°36.6'		Tau	16"	ottima / buono	elusiva, appare solo a tratti; ogni tanto salta fuori qualcosa di puntiforme, ma non riesco a capire se è il nucleo o una debolissima stellina sovrapposta — 270x.
UGC 2745	gx	03h27m51s	+36°23.4'		Per	24"	ottima / m. buono	diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale — 450x.
UGC 2746	gx	03h28m31s	+36°46.6'		Per	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di ~ 40" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
UGC 2747	gx	03h28m31s	+38°01.3'		Per	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" — 380x.
UGC 2748	gx	03h27m54s	+02°33.7'		Tau	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø > 1'; una piccola zona più brillante all'interno è visibile solo a momenti — 270x.
UGC 2751	gx	03h28m54s	+40°02.2'		Per	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare visibile solo a momenti; situata tra due stelline a NW e SE — 450x.
UGC 2752	gx	03h29m04s	+40°49.5'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×15", con bulge diffuso, evidente ma poco contrastato; situata tra una stellina abbastanza brillante a S e una coppia di stelline sbilanciate in luminosità uniforme a N; una 3ª stellina debole si trova più o meno alla stessa distanza verso NE — 495x.
UGC 2753	gx	03h35m47s	+82°25.5'		Cep	16"	ottima / ottimo	è una debolissima lama di luce osservabile a tratti a 380x, orientata da E a W ed estesa ~ 1'.
UGC 2756	gx	03h29m36s	+40°52.6'		Per	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **MCG+7-8-16** situata a ridosso verso S — debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
UGC 2758	gx	03h30m00s	+39°03.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW e una debole quasi a ridosso NW — 495x.
UGC 2761	gx	03h30m10s	+38°27.2'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con piccolo nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una debole stellina subito a SE; una tripletta serrata di stelline brillanti si trova un paio di primi a SW — 450x.
UGC 2763	gx	03h30m30s	+36°56.9'		Per	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce estesa 45" e orientata da N a S, con piccolo bulge abbastanza marcato; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W — 380x.
UGC 2765	gx	03h32m04s	+68°22.1'		Cam	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 90"×45"; c'è una coppia di stelline a ridosso E (una è appena percettibile); un piccolo asterismo irregolare di 6 stelle brillanti situato a cavallo tra Cassiopea e Giraffa disturbano l'osservazione — 340x.
UGC 2766	gx	03h30m57s	+40°48.5'		Per	24"	buona / buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
UGC 2770	gx	03h31m18s	+35°28.0'		Per	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore leggermente ovale, orientato da E a W con dimensioni 40"×30", diffuso e di luminosità uniforme; ci sono 2 stelline quasi a ridosso: una a NW e l'altra a S — 380x.
UGC 2771	gx	03h31m24s	+39°44.5'		Per	24"	buona / buono	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", molto diffusa alle estremità N e S e con piccolo bulge molto contrastato — 450x.
UGC 2773	gx	03h32m07s	+47°47.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	è una chiazza molto diffusa e con basso gradiente di luce, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; una quaterna di stelline equidistanti e quasi allineate da E a W si trova subito a S della gx — 495x.
UGC 2775	gx	03h32m05s	+41°35.5'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, estesa sì e no 35"-40", ma di forma indistinta; c'è una stellina a ridosso N; altre due stelline si trovano a W e SW (quest'ultima è molto debole) — 450x.
UGC 2776	gx	03h32m43s	+10°31.4'		Tau	24"	ottima / ottimo	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, stranamente meglio a 450x; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 30".
UGC 2778	gx	03h32m50s	+36°13.1'		Per	16"	ottima / ottimo	appare del tutto simile a MCG+6-8-30, sia come dimensioni sia, soprattutto, come difficoltà; meglio non superare i 270x.
UGC 2780	gx	03h33m13s	+36°11.0'		Per	16"	ottima / ottimo	è difficilissima, appare solo a tratti in visione distolta a 270x, di forma indistinta ed estesa una 40-ina di secondi.
UGC 2783	gx	03h34m18s	+39°21.4'		Per	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare; situata tra due stelline molto deboli orientate da E a W — 450x.
UGC 2784	gx	03h34m19s	+39°32.8'		Per	24"	ottima / m. buono	anche questa è facile da vedere, diffusa con Ø analogo alla precedente, ma con gradiente di luce inferiore; c'è una stellina brillante quasi a ridosso N — 450x.
UGC 2788	gx	03h34m47s	+36°12.6'		Per	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×40" e con una sorta di "barra" centrale poco più contrastata del disco; a momenti appare debolmente screziata all'interno — 450x.
UGC 2789	gx	03h36m14s	+67°33.9'		Cam	16"	ottima / buono	è una debolissima chiazza a bassissima luminanza superficiale, di luminosità uniforme ed e-stesa ~ 1'; una stellina molto debole sembra lambirla verso W — 380x.
UGC 2798	gx	03h38m10s	+40°59.0'		Per	24"	ottima / m. buono	diffusa e debolmente screziata a 450x, con gradiente di luce molto basso; è molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 90"×30"; ci sono 2 deboli stelline a ENE (sul prolungamento dell'asse maggiore della gx).
UGC 2800	gx	03h40m03s	+71°24.4'		Cam	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 90"×45"; è situata a ridosso W di un asterismo formato da 4 stelline brillanti (fra cui una doppia stretta) — 340x.
UGC 2802	gx	03h37m51s	+04°56.9'		Tau	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è un asterismo formato da 4 stelle brillanti fatto a "Y" rovesciata a SW — 450x.
UGC 2803	gx	03h38m00s	+12°12.4'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 50"×25"; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 450x.
UGC 2805	gx	03h38m52s	+40°59.5'		Per	24"	ottima / m. buono	si presenta solo come un alone molto tenue grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi posto asimmetricamente a SW di una stellina brillante che tende a offuscarla — 450x.
UGC 2808	gx	03h39m37s	+38°41.4'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appena visibile in visione distolta, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' scarso NW — 270x.
UGC 2812	gx	03h39m53s	−02°06.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	assieme a UGC 2814 forma una coppia di bolle circolari con Ø di una 40-ina di secondi, di luminosità uniforme e di aspetto simile; la 1ª è poco più confusa; la 2ª ha una stellina a ridosso verso NE (la quale fa parte di un piccolo triangolo isoscele di stelle deboli) — 450x.
UGC 2814	gx	03h40m05s	−02°04.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	v. **UGC 2812**
UGC 2816	gx	03h41m12s	+24°00.4'		Tau	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2817	gx	03h41m32s	+37°13.6'		Per	16"	m. buona / m. buono	è una chiazza elusiva osservabile in visione distolta e che solo a tratti appare orientata da NW a SE, ma è molto difficile stimarne le dimensioni (grosso modo 60"×30"); meglio comunque scalare a 188x.
UGC 2823	gx	03h41m36s	+16°01.2'		Tau	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa ~ 1' e orientata da N a S; meglio evidente a 340x.
UGC 2825	gx	03h41m23s	−01°37.0'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debole, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 80"×20", diffusa e di luminosità uniforme; meglio evidente e contrastata scalando a 340x.
UGC 2826	gx	04h43m45s	+68°18.1'		Cam	16"	m. buona / m. buono	debole ovale di dimensioni 60"×45", orientato da NW a SE, diffuso e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso NNW — 270x
UGC 2829	gx	03h41m51s	+08°09.6'		Tau	16"	ottima / scarso	poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" con nucleo stellare abbastanza evidente — 270x.
UGC 2830	gx	03h42m04s	+15°59.3'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con evidente condensazione centrale anche se poco contrastata; c'è una stellina subito a NW — 450x.
UGC 2838	gx	03h43m45s	+24°03.6'		Tau	28"	ottima / ottimo	è un'elusiva lama di luce estesa 40"-45" e orientata da NW a SE; appare a tratti in visione distolta a 1.5' NNW di una stellina brillante di 11-esima grandezza (questa stellina, che possiede una compagna molto debole a ridosso N, è la più occidentale di un asterismo di 6 componenti tutte brillanti foggiato a "M"). È probabile che la difficoltà nell'osservarla sia anche dovuta al fatto che la gx appare immersa in un fondo chiaro, che è la propaggine occidentale della nebulosità delle Pleiadi — 495x.
UGC 2842	gx	03h43m52s	+00°36.9'		Tau	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 2854	gx	03h46m28s	+36°44.3'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso 30"-35" e orientato da N a S; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina a ridosso E (fa parte di un piccolo quadrato di deboli stelline.
UGC 2855	gx	03h48m20s	+70°08.0'	q 18	Cam	16"	buona / discreto	debolissimo lucore che si estende per ~ 3' in direzione grosso modo E-W, di luminosità pressoché uniforme e con una stella brillante a ridosso del margine settentrionale — 270x.
UGC 2857	gx	03h46m58s	+38°38.1'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme situata in un campo molto ricco; poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.

UGC 2860	gx	03h51m16s	+78°17.9'		Cam	24"	buona / m. buono	debolissima, ma più che altro disturbata dalla SAO 4999 di 8ª grandezza situata 2.5' a NW; a tratti appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 2862	gx	03h47m39s	+13°15.3'		Tau	16"	ottima / scarso	debole, diffusa, rotonda, del Ø di 45" e con condensazione centrale visibile a tratti — 270x.
UGC 2864	gx	03h50m46s	+74°07.6'		Cam	24"	buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena percettibile; è equidistante con 2 stelline molto deboli: una a W e l'altra a SE; una doppia stretta sbilanciata si trova a 1.5' NW — 450x.
UGC 2865	gx	03h50m36s	+73°01.9'		Cam	16"	ottima / ottimo	debolissimo ovale di luminosità uniforme, orientato da N S con dimensioni 60"×30" (più meno la distanza delle 2 stelline situate rispettivamente a W e NW); c'è una stellina appena percettibile a poche decine di secondi verso E — 380x.
UGC 2866	gx	03h50m15s	+70°05.7'		Cam	16"	ottima / ottimo	debole, ma più facile di UGC 2865, osservata subito prima e situata una decina di primi a WNW; approssim. rotonda con Ø di ~ 1' e appena più brillante verso l'interno; s'individua facilmente in visione distolta a 380x.
UGC 2871	gx	03h48m46s	+13°08.3'		Tau	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda, appena più brillante all'interno e con Ø di ~ 1'; meglio scalare a 270x.
UGC 2872	gx	03h49m00s	+01°10.3'		Tau	24"	buona / buono	è una sorta di debolissimo aggetto che si protende a S di una stellina brillante per una 30-ina di secondi; a 570x appare a tratti separata dalla stella.
UGC 2876	gx	03h50m53s	+37°36.6'		Per	24"	buona / m. buono	è un'elusiva chiazza di luce non più estesa di 30" che appare solo a tratti in visione distolta a 340x (a 200x il fondo cielo è troppo chiaro, mentre a 450x la visione diviene confusa).
UGC 2879	gx	03h51m46s	+32°58.5'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa che in visione distolta appare a tratti grosso modo rotonda con dimensioni max di 30"; c'è una stellina brillante a 1' NNW e una molto debole alla stessa distanza WNW: quest'ultima è una doppia serrata, ma non sono riuscito a separarne le componenti — 450x.
UGC 2881	gx	03h52m17s	+36°14.0'		Per	16"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa, approssim. rotonda, di Ø poco superiore a 20" e con nucleo stellare molto tenue osservabile in visione distolta a 380x.
UGC 2883	gx	03h52m14s	−01°30.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' verso NW — 450x.
UGC 2885	gx	03h53m02s	+35°35.4'		Per	16"	m. buona / m. buono	debole baffo di luce, molto diffuso, di luminosità uniforme e di dimensioni 60"×30" che si diparte verso SW da una stellina brillante; meglio definita a 380x.
UGC 2888	gx	03h53m19s	+32°19.7'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 270x.
UGC 2889	gx	03h53m38s	+37°15.8'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso SE.
UGC 2890	gx	03h56m05s	+72°55.4'		Cam	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce molto debole ed estesa, orientata da NE a SW per quasi 3'; c'è una stellina brillante sovrapposta all'incirca a metà galassia i cui effetti si riescono UGC po' a smorzare osservando a 380x.
UGC 2894	gx	03h54m07s	+15°59.4'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" — 450x.
UGC 2895	gx	03h54m19s	+17°35.1'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti condensata, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20" o poco più; c'è una stellina a 1.5' NE — 495x.
UGC 2896	gx	03h59m00s	+79°33.3'		Cam	24"	buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1'; disturbata dalla SAO 5043 di 9ª grandezza situata 2.5' a SE; una stellina molto debole si trova a 1' SE — 450x.
UGC 2901	gx	03h56m38s	+34°50.9'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima, rotonda, diffusa e con Ø di ~ 30"; c'è una stellina quasi a ridosso SW e un'altra appena percettibile a ridosso verso N — 380x.
UGC 2902	gx	03h57m09s	+34°09.7'		Per	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina a ridosso verso SE — 380x.
UGC 2903	gx	03h56m45s	+08°05.2'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1.5' NW e una appena percettibile a 1' SW — 450x.
UGC 2904	gx	03h56m58s	+16°29.1'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N — 450x.
UGC 2905	gx	03h57m00s	+16°31.4'		Tau	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SW — 450x.
UGC 2906	gx	04h01m01s	+74°05.1'		Cam	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ~ 1' verso E; una doppia stretta si trova a un paio di primi SE — 380x.
UGC 2907	gx	04h02m45s	+78°16.9'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma osservabile abbastanza bene in visione distolta, di aspetto un po' irregolare, estesa ~ 40"; a 380x si nota una sorta di nodulo di aspetto stellare verso SW visibile a tratti.
UGC 2913	gx	03h59m04s	+01°21.5'		Tau	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale visibile a tratti; stranamente meglio osservabile a 450x; c'è una debole stellina a 1' verso S.
UGC 2914	gx	03h59m17s	+06°41.2'		Tau	16"	ottima / scarso	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 40" e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
UGC 2916	gx	04h02m34s	+71°42.4'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda, diffusa, con Ø max di 35"-40"; c'è una stellina relativamente brillante a SW e una più debole a ridosso verso W — 270x.
UGC 2921	gx	04h00m11s	+00°44.7'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di forma a prima vista indistinta; solo a momenti, scalando a 340x, appare approssim. circolare con Ø di una 30; c'è una debole stellina a 1.5' ESE.
UGC 2923	gx	04h05m44s	+78°39.6'		Cam	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
UGC 2924	gx	04h01m21s	+26°49.4'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni di 30"×20"; c'è la SAO 76394 a poco più di 1' verso S — 495x.
UGC 2926	gx	04h01m11s	+05°33.1'		Tau	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina; meglio definita scalando a 340x
UGC 2927	gx	04h01m41s	+23°06.7'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e poco più evidente all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo E che tende a confonderne un po' la forma; questa stellina si trova al vertice più acuto di un piccolo triangolo isoscele orientato come la gx — 495x.
UGC 2928	gx	04h01m41s	+23°12.4'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e condensata, orientata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una debole stellina poco più di 1' SSE — 495x.
UGC 2936	gx	04h02m48s	+01°58.0'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo W; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2938	gx	04h03m03s	+04°32.7'		Tau	24"	ottima / discreto	debole e molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" e appena più brillante verso l'interno; è situata un paio di primi a NE di una stellina brillante — 450x.
UGC 2942	gx	04h04m10s	+22°07.9'		Tau	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia forse interagente con la successiva — sono 2 debolissime lame di luce estese una 40-ina di secondi orientate quasi a perpendicolo e con una stellina a ridosso verso E; la 1ª è poco più evidente, mentre la compagna è quasi elusiva — 495x.
UGC 2943	gx	04h04m11s	+22°07.5'		Tau	28"	m. buona / ottimo	v. **UGC 2942**
UGC 2944	gx	04h04m37s	+33°17.5'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore estremamente diffuso e di forma indistinta, forse rotondo con Ø di una 40-ina di secondi; salta fuori solo a tratti in visione distolta, ma bisogna scalare a 188x; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N.
UGC 2945	gx	04h04m39s	+33°48.6'		Per	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso N — 380x.
UGC 2948	gx	04h04m55s	+20°49.8'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; situata tra 2 stelline distanti poco più di 1' in direzione NE-SW; la gx è molto disturbata dalla SAO 76434 di 9a grandezza situata 1.5' a N — 495x.
UGC 2949	gx	04h05m02s	+25°15.9'		Tau	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×20"; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' SSE — 380x.
UGC 2950	gx	04h05m06s	+31°01.6'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce che in visione distolta aggetta a S di una stellina per una 40-ina di secondi; un'altra stellina poco più brillante si trova subito a S — 450x.
UGC 2952	gx	04h05m55s	+37°03.8'		Per	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 2954	gx	04h05m30s	+04°26.7'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20".
UGC 2955	gx	04h08m29s	+69°40.4'		Cam	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto osservabile con gran difficoltà a 380x; solo a tratti appare allungata da E a W per una 30-ina di secondi (ossia orientata come le 2 stelline situate 2.5' a N.
UGC 2956	gx	04h06m29s	+31°17.1'		Tau	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 2958	gx	04h06m53s	+22°51.7'		Tau	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme estesa oltre 1' e orientata ~ da N a S; poco meglio contrastata scalando a 270x.
UGC 2959	gx	04h07m07s	+34°26.0'		Per	24"	ottima / m. buono	chiazza molto debole, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile; in visione distolta appare rotonda con Ø < 40" — 450x.
UGC 2960	gx	04h07m20s	+24°36.5'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti poco allungata da N a S con dimensioni di 40"×30"; c'è una debole stellina a 1' verso N — 495x.
UGC 2963	gx	04h07m39s	+03°58.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina al bordo SE; si trova in mezzo a 2 stelline orientate come la gx e distanti un paio di primi — 450x.
UGC 2967	gx	04h09m27s	+36°59.8'		Per	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x per contrastare il debole chiarore lunare; come UGC 2952, anche questa appare grosso modo circolare con Ø simile.
UGC 2969	gx	04h09m02s	−01°09.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è un piccolo arco di 3 stelline da NW a SW della gx — 450x.
UGC 2971	gx	04h09m43s	+37°00.6'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima, molto diffusa, di luminosità uniforme e di forma indistinta, estesa una 40-ina di secondi; è situata tra 2 stelline; è situata tra 2 stelline distanti 3' in direzione NE-SW (non sono riuscito a vedere UGC 2967 a 3' W) — 270x.
UGC 2972	gx	04h09m54s	+36°31.1'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare solo in visione distolta a 270x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
UGC 2973	gx	04h09m55s	−01°22.5'		Eri	24"	ottima / discreto	molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×15", diffusa e poco più brillante all'interno; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' ENE (ossia sul prolungamento dell'asse maggiore della gx) — 450x.
UGC 2976	gx	04h11m24s	+26°52.7'		Tau	16"	ottima / ottimo	appare come una sorta di alone molto tenue, esteso una 40-ina di secondi che avviluppa un paio di stelline ravvicinate; una 3ª stellina appena percettibile si trova al bordo orientale — 380x.
UGC 2977	gx	04h12m09s	+27°55.8'		Tau	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina molto debole a ridosso N e un'altra debole stellina subito a E — 495x.
UGC 2978	gx	04h12m16s	+34°55.0'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 60"×20"; poco meglio evidente scalando a 340x.
UGC 2979	gx	04h11m49s	+06°27.1'		Tau	24"	ottima / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' verso W; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 2981	gx	04h12m46s	+36°53.8'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione stellare poco evidente; c'è una stellina subito a SE — 450x.
UGC 2982	gx	04h12m23s	+05°32.8'		Tau	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso W e un'altra più brillante, nonché più distante, a SW — 450x.
UGC 2983	gx	04h12m52s	+02°22.2'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, di luminosità uniforme e di aspetto regolare, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE — 450x.
UGC 2984	gx	04h13m13s	+13°25.2'		Tau	24"	ottima / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo; a 340x appare poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; a 450x perde contrasto ed è di aspetto confuso.
UGC 2985	gx	04h13m33s	+27°32.5'		Tau	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con bulge diffuso appena più evidente del disco; allineata ed equidistante con 2 stelline a E — 495x.
UGC 2986	gx	04h13m37s	+27°35.0'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W, anche questa con dimensioni 45"×15"; ci sono 2 stelline appena percettibili subito a W — 495x.
UGC 2988	gx	04h03m39s	+25°29.0'		Tau	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa un paio di primi e orientata da N a S; c'è una stellina quasi a ridosso verso N; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
UGC 2991	gx	04h14m00s	+36°51.0'		Per	24"	ottima / m. buono	chiazza molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di 30"-40"; c'è una stellina abbastanza brillante sovrapposta verso il bordo W; la gx presenta una condensazione stellare visibile però solo a momenti — 450x.
UGC 2992	gx	04h13m44s	+01°46.8'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15", con tenue e piccola condensazione centrale; una sorta di "frammento" di aspetto stellare sembra a tratti staccarsi verso SW: data la bontà del seeing l'effetto è più evidenziato a 570x; da un controllo successivamente effettuato, questo è risultato essere il nucleo di PGC 14696.
UGC 2993	gx	04h14m49s	+35°10.9'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo molto piccolo e condensato con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
UGC 2994	gx	04h14m23s	+02°43.9'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, meglio contrastata scalando a 340x, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30".
UGC 2996	gx	04h15m35s	+01°10.8'		Tau	24"	ottima / discreto	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" e un nucleo stellare molto tenue — 450x.
UGC 2997	gx	04h16m05s	+08°10.7'		Tau	16"	ottima / scarso	relativamente facile, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" con bulge diffuso appena percettibile sul disco — 270x.
UGC 2998	gx	04h16m34s	+02°45.5'		Tau	24"	m. buona / mediocre	debole, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; è disturbata dalla SAO 111713 di 8ª grandezza situata a meno di 2' verso N — 450x.
UGC 3004	gx	04h17m19s	+02°26.0'		Tau	24"	m. buona / mediocre	diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e tenue condensazione centrale — 450x.
UGC 3006	gx	04h17m25s	+02°22.2'		Tau	24"	m. buona / mediocre	molto allungata ~ da N a S, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge rotondo abbastanza evidente; è situata 4' a SSE di UGC 3004: sono poste simmetricamente a una coppia di stelle brillanti distanti 1' e orientate da N a S — 450x.
UGC 3007	gx	04h18m30s	+33°46.5'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza rotonda, molto diffusa e con Ø di ~ 45"; il campo è molto ricco e una stellina si trova proprio al bordo N della gx; meglio visibile a 270x.
UGC 3008	gx	04h18m40s	+02°33.6'		Tau	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×30" — 450x.
UGC 3011	gx	04h19m21s	+02°35.8'		Tau	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, meglio contrastata scalando a 340x, orientata da NW a SE con dimensioni 50"×25".
UGC 3014	gx	04h19m54s	+02°05.7'		Tau	24"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x; è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti orientate da E a W: quella a W è una doppia stretta e molto sbilanciata.
UGC 3016	gx	04h21m20s	+36°45.6'		Per	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole, estesa ~ 1' e orientata da E a W — 450x.
UGC 3018	gx	04h21m00s	−00°10.1'		Eri	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 45" — 450x.
UGC 3019	gx	04h21m40s	+36°43.9'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno; in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso NE — 450x.
UGC 3020	gx	04h20m58s	−02°16.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo S — 450x.
UGC 3021	gx	04h21m52s	+36°07.6'		Per	16"	m. buona / m. buono	molto debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1'; meglio osservabile a 270x.
UGC 3022	gx	04h22m00s	−00°48.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 3023	gx	04h21m58s	+01°50.3'		Tau	24"	m. buona / mediocre	a 450x è un oggetto relativamente facile, ma disturbato da una stellina brillante situata al bordo NW; la gx è diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con piccolo nucleo quasi stellare abbastanza contrastato.
UGC 3025	gx	04h23m12s	+05°34.5'		Tau	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da E a W e che nonostante appaia estesa solo una 40-ina di secondi appare poco meglio evidente a scalando a 340x.
UGC 3026	gx	04h26m00s	+70°09.8'		Cam	16"	ottima / buono	è di aspetto simile a UGC 3048, ma più debole e poco più picco-la, di luminosità uniforme e orientata da N a S con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
UGC 3029	gx	04h23m59s	−00°49.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso N e una debole quasi a ridosso verso NW.
UGC 3031	gx	04h24m21s	−00°44.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; salta fuori abbastanza facilmente quasi a ridosso S di una stellina — 450x.
UGC 3035	gx	04h24m40s	+07°13.0'		Tau	24"	ottima / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 70"×50"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
UGC 3037	gx	04h24m50s	−01°01.6'		Eri	24"	ottima / discreto	molto debole, situata tra 2 stelline abbastanza brillanti (specialmente quella a W) che disturbano un po' l'osservazione; è molto allungata da E a W, con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 3038	gx	04h25m01s	+07°10.2'		Tau	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 3039	gx	04h25m04s	+03°01.8'		Tau	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 3040	gx	04h26m05s	+35°12.5'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa, forse circolare con Ø grosso modo di una 30-ina di secondi; è situata 1.5' a N di una stellina brillante; una coppia di deboli stelline si trova alla stessa distanza verso NNE; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 3042	gx	04h28m40s	+70°20.9'		Cam	16"	ottima / buono	è un debole lucore di forma indistinta "incastrato" tra 2 stelline brillanti distanti un paio di primi e orientate da NE a SW; queste fanno parte di un piccolo asterismo di 5 stelline luminose con quella più settentrionale doppia — 380x.
UGC 3046	gx	04h29m20s	+69°31.9'		Cam	16"	ottima / buono	è una piccola e debole macchia rotonda di 30"-35" di Ø e luminosità pressoché uniforme con una stellina a ridosso verso NW; un'altra stellina più brillante si trova a poco più di 1' SE — 380x.
UGC 3047	gx	04h27m16s	+32°37.5'		Per	16"	ottima / buono	è un'elusiva macchiolina rotonda di una 30-ina di secondi di Ø che appare solo a tratti in visione distolta a 270x; c'è una stellina molto debole a ridosso SW e un'altra appena percettibile a E.
UGC 3048	gx	04h29m24s	+70°25.5'		Cam	16"	ottima / buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ~ 1' verso N — 380x.
UGC 3049	gx	04h26m52s	+01°42.3'		Tau	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
UGC 3050	gx	04h27m30s	+30°56.9'		Tau	24"	buona / m. buono	piccola e debolissima, solo a tratti leggermente condensata, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
UGC 3051	gx	04h27m18s	+02°22.6'		Tau	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso W e una appena percettibile a 1' scarso verso S; meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 3053	gx	04h28m10s	+21°39.3'		Tau	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, ma molto disturbata dalla SAO 76618 situata ad appena 3' SW; appare poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35" — 380x.
UGC 3055	gx	04h28m34s	+11°03.0'		Tau	16"	ottima / scarso	piccola e molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20", situata ~ 1.5' NE di una stellina brillante — 270x.
UGC 3057	gx	04h33m15s	+76°34.0'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, diffusa; si vede senza difficoltà in visione distolta a 380x, orientata da E a W con dimensioni 60"×30"; ci sono 2 stelline appena percettibili a SE e SW; una 3ª poco più brillante allineata con le precedenti verso E.
UGC 3058	gx	04h29m35s	+00°46.1'		Tau	24"	m. buona / mediocre	debolissima chiazza orientata da E a W e con dimensioni grosso modo di 40"×20"; è situata a ridosso S di una stellina brillante che tende a offuscare i dintorni; meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 3059	gx	04h29m42s	+03°40.8'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non sembra più contrastata scalando a 340x; molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina evidente al bordo S, una debole quasi a ridosso verso NE (sul prolungamento dell'asse maggiore della gx) e una terza appena percettibile subito a E.
UGC 3067	gx	04h31m01s	+08°05.2'		Tau	16"	ottima / scarso	relativamente facile, piccola, rotonda, con Ø di 30"-35" e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso NW — 270x.
UGC 3069	gx	04h34m29s	+73°12.3'		Cam	16"	ottima / ottimo	è un ovale abbastanza facile, orientato da NW a SW, di dimensioni 45"×30", diffuso con nucleo stellare visibile a 380x.
UGC 3070	gx	04h31m00s	−02°00.2'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso verso SE; a 340x il campo è insolitamente ricco di stelline luminose.
UGC 3074	gx	04h31m27s	+06°38.3'		Tau	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra due stelline brillanti orientate da NW a SE e distanti 3' — 450x.
UGC 3078	gx	04h32m22s	+33°13.2'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole e a tratti appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' scarso SW — 450x.
UGC 3079	gx	04h31m49s	+01°46.0'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 3080	gx	04h31m55s	+01°12.0'		Tau	16"	ottima / scarso	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di almeno 1'; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso W; un'altra più debole si trova invece a ridosso di NE — 270x.
UGC 3081	gx	04h32m01s	+02°23.5'		Tau	24"	ottima / discreto	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; è situata quasi in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti orientate da N a S — 450x.
UGC 3083	gx	04h24m31s	+10°53.3'		Tau	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SE e una poco più debole alla stessa distanza SW — 450x.
UGC 3084	gx	04h32m48s	+10°23.5'		Tau	24"	ottima / buono	è una debolissima lama di luce di aspetto uniforme, orientata da N a S ed estesa forse 1.5' — 450x.
UGC 3087	gx	04h33m11s	+05°21.3'		Tau	24"	ottima / buono	lucore molto tenue e diffuso, esteso una 30-ina di secondi e situato attorno a una stellina relativamente brillante; quest'ultima è in realtà la quasar **3C 120** — 450x.
UGC 3089	gx	04h33m54s	+16°54.7'		Tau	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45" e con condensazione centrale molto tenue e meglio contrastata scalando a 340x; situata a SE di un piccolo asterismo di 5 stelline: la componente più a N è una doppia stretta.
UGC 3091	gx	04h33m56s	+01°06.8'		Tau	16"	ottima / scarso	è un elusivo oggetto rotondo di una 40-ina di secondi di Ø che appare in visione distolta a 1' SW di una stellina molto debole, ma è meglio scalare a 188x; è situata in un campo molto ricco nel quale spicca un triangolo di stelle brillanti che disturba alquanto — 270x.
UGC 3093	gx	04h35m05s	+07°59.3'		Tau	24"	ottima / buono	debole lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 3097	gx	04h35m48s	+02°15.5'		Tau	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 3 stelline a NNE — 450x.
UGC 3102	gx	04h36m25s	+14°20.1'		Tau	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 3104	gx	04h36m40s	−02°17.4'		Eri	16"	ottima / ottimo	debole, poco allungata da NW a SE, con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina ben evidente a ridosso verso NW; un'altra stellina è situata a una 30-ina di secondi verso W *(presenza di debole chiarore lunare)* — 380x.
UGC 3105	gx	04h37m08s	−02°18.2'		Eri	16"	ottima / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con bulge diffuso e poco contrastato sul disco *(presenza di debole chiarore lunare)* — 380x.
UGC 3106	gx	04h37m11s	−01°51.1'		Eri	24"	ottima / discreto	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa per 1'; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SW e un'altra più debole alla stessa distanza verso E — 450x.
UGC 3110	gx	04h41m10s	+73°40.3'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, orientata da NW a SE (ossia come le 2 stelline a NE); c'è una stellina sovrapposta, o a ridosso della gx, all'incirca a metà strada dell'asse maggiore — non si capisce bene neanche a 380x.
UGC 3114	gx	04h40m30s	+66°38.1'		Cam	16"	ottima / buono	è una debolissima chiazza oblunga di 80"×40" orientata ~ da E a W con una stellina relativamente brillante a ridosso verso N; appare solo in visione distolta — 380x.
UGC 3117	gx	04h38m50s	+02°50.7'		Tau	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline situate rispettivamente a 1' W e 1' NW — 450x.
UGC 3121	gx	04h39m45s	+03°02.0'		Tau	24"	ottima / discreto	diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; una stellina appena percettibile si trova al bordo N (a meno che non si tratti di un nucleo stellare in posizione eccentrica); un'altra stellina più evidente si trova 1' scarso a W — 450x.
UGC 3122	gx	04h39m51s	+07°03.3'		Tau	16"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×45" e appena più brillante all'interno; meglio scalare a 270x.
UGC 3123	gx	01h40m03s	+12°30.8'		Tau	24"	ottima / buono	debolissima chiazza diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra 2 stelline (una 3ª appena percettibile si trova a ridosso E); queste stelline fanno parte di un piccolo triangolo irregolare — 450x.
UGC 3124	gx	04h42m36s	+69°12.9'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni ~ 40"×20" e con condensazione centrale visibile solo a tratti a 380x; c'è una stellina a ridosso verso W.
UGC 3127	gx	04h40m25s	−02°01.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" (a tratti in visione distolta pare una edge-on) — 450x.
UGC 3128	gx	04h40m33s	+04°11.8'		Tau	16"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda con Ø di 35"-40", diffusa e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso del margine WNW; la gx è allineata con un'altra stellina situata 1' a ESE e di egual magnitudo — 270x.
UGC 3131	gx	04h45m08s	+72°47.2'		Cam	16"	ottima / ottimo	tenuissimo alone orientato all'incirca da E a W ed esteso 1' situato attorno a una stellina brillante; a tratti, a 380x, la stellina sembra trovarsi verso il bordo settentrionale.
UGC 3132	gx	04h49m58s	+82°39.0'		Cep	24"	buona / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione stellare appena percettibile; c'è una doppia stretta a 1' NW — 450x.
UGC 3134	gx	04h41m48s	−01°18.1'		Eri	16"	ottima / scarso	è una bolla circolare con Ø di 1', poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
UGC 3135	gx	04h42m08s	+20°03.0'		Tau	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 1'; meglio visibile a 270x.
UGC 3136	gx	04h41m54s	+01°04.9'		Tau	24"	buona / scarso	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale; c'è una bisciola di 5 stelline brillanti orientate da E a W subito a S della gx — 340x.
UGC 3137	gx	04h46m16s	+76°25.2'	q 5	Cam	16"	m. buona / m. buono	è una lama di luce estremamente debole, orientata da WSW a ENE, estesa per ~ 3' e situata in un campo abbastanza ricco di stelline brillanti — 270x.
UGC 3141	gx	04h43m09s	+00°44.6'		Tau	16"	ottima / scarso	chiazza rotonda molto debole, di luminosità uniforme e con Ø < 1'; c'è una stellina appena percettibile a 1' NNE —270x.
UGC 3144	gx	04h47m55s	+74°55.1'	q 5	Cam	16"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W ed estesa per ~ 1'; a 285x appaiono, solo a momenti, 3 debolissime stelline a ridosso della galassia verso E — 270x.
UGC 3145	gx	04h44m13s	+00°20.9'		Ori	24"	m. buona / discreto	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta pare poco allungata da E a W con dimensioni 60"×50"; la visione non sembra migliorare scalando a 340x; è situata tra 2 stelline: una brillante a 1' NW e l'altra più debole alla stessa distanza verso SE.
UGC 3147	gx	04h47m50s	+72°51.6'		Cam	16"	ottima / ottimo	è un piccolo oggetto rotondo, abbastanza facile, poco diffuso, con Ø di 30" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina ridosso verso N — 380x.
UGC 3149	gx	04h47m11s	+63°03.2'		Cam	16"	ottima / buono	debole, molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' e poco più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 3150	gx	04h48m27s	+73°28.2'	q 5	Cam	16"	ottima / ottimo	è un debole lucore molto diffuso e di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotondo con Ø di 1.5'; è situata a S di un asterismo costituito da un arco (in verità quasi rettilineo) di 4 stelline brillanti equidistanti (riportata sull'Uranometria come **1573A**) — 380x.
UGC 3155	gx	04h49m01s	+71°32.3'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una coppia di stelline subito a SE — 380x.
UGC 3157	gx	04h46m30s	+18°27.6'		Tau	16"	ottima / ottimo	chiazza rotonda con Ø di ~ 1', diffusa, molto debole e di luminosità uniforme; meglio osservabile a 270x; c'è una coppia di stelline di eguale luminosità e distanti una 40-ina di secondi a S della gx.
UGC 3159	gx	04h49m49s	+72°58.6'		Cam	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso N; meglio definita scalando a 340x.
UGC 3162	gx	04h46m52s	+08°16.3'		Ori	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 60"×30"; tutto sommato è meglio restare a 450x per tenere fuori campo la SAO 112066 di magnitudo 7.6 situata 5' a NW.
UGC 3163	gx	04h49m33s	+69°28.5'		Cam	16"	ottima / buono	facilmente visibile in visione distolta, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con bulge diffuso abbastanza evidente; c'è una stellina a poco più di 1' verso SW — 380x.
UGC 3164	gx	04h47m02s	+00°04.0'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, probabilmente rotonda con Ø di ~ 1'.
UGC 3165	gx	04h47m27s	+23°59.0'		Tau	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 270x, stesa ~ 45"; a 380x appare a tratti qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è il nucleo o una stellina a ridosso.
UGC 3168	gx	04h47m32s	−02°18.7'		Ori	24"	buona / scarso	molto debole e stemperata sul fondo cielo, a tratti leggermente condensata, rotonda con Ø < 40" — 340x.
UGC 3170	gx	04h47m36s	−01°09.7'		Ori	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 450x.
UGC 3171	gx	04h47m45s	+01°49.2'		Ori	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a N e un'altra poco più brillante a poco più di 1' verso SE — 450x.
UGC 3174	gx	04h48m34s	+00°14.5'		Ori	24"	m. buona / m. buono	elusiva e tra l'altro disturbata da una coppia di stelline brillanti di cui una subito a W; appare a tratti in visione distolta, ma rimane di aspetto indistinto, anche scalando a 340x (di fatto la visione non migliora); dovrebbe comunque essere estesa almeno 1'.
UGC 3175	gx	04h52m30s	+74°29.8'		Cam	24"	buona / m. buono	debole lama di luce poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S ed estesa 1'; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
UGC 3176	gx	04h51m37s	+67°13.0'		Cam	16"	ottima / buono	facilmente visibile, diffusa, rotonda, gradatamente più brillante verso l'interno e con piccolo nucleo puntiforme; c'è una stellina doppia stretta dalle componenti sbilanciate a ~ 1' NE — 380x.
UGC 3179	gx	04h49m44s	+03°20.0'		Ori	24"	buona / buono	debole, poco diffusa, piccola e condensata, orientata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; è situata tra una stellina brillante a SW e un'altra più debole a NE — 450x.
UGC 3180	gx	04h50m24s	+08°42.8'		Ori	24"	ottima / buono	relativamente facile, ma molto diffusa e con basso gradiente di luce, approssim. circolare con Ø di 45"; c'è una stellina percettibile a momenti a ridosso N — 450x.
UGC 3181	gx	04h50m37s	+06°00.5'		Ori	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
UGC 3182	gx	04h54m07s	+72°19.5'		Cam	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di ~ 1, diffusa e con gradiente medio di luce — 380x.
UGC 3183	gx	04h51m20s	+23°12.5'		Tau	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare a solo a tratti; mi sembra poco più evidente a 380x, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
UGC 3184	gx	04h51m42s	+05°30.3'		Ori	24"	ottima / buono	molto debole, ma più che altro disturbata da alcune stelline brillanti presenti nel campo e vicine alla gx; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina evidente al bordo orientale che ne confonde un po' la forma — 450x.
UGC 3187	gx	04h51m45s	+06°50.0'		Ori	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' SW; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 3188	gx	04h51m49s	+08°50.6'		Ori	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina evidente al bordo E; poco disturbata da una stellina brillante subito a SW; meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 3189	gx	04h54m38s	+69°42.9'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima, appare in visione distolta molto allungata da NE a SW (orientata come la stringa di 4 stelline situate subito a NW), con dimensioni di ~ 60"×20" — 380x.
UGC 3191	gx	04h52m46s	+04°23.5'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole e alquanto offuscata dall'alone della SAO 112170 di 9ª grandezza situata 1' a N; meglio mantenere i 450x; a tratti appare allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 340x.
UGC 3192	gx	04h52m49s	+01°15.5'		Ori	24"	buona / buono	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 3193	gx	04h52m52s	+03°03.4'		Ori	24"	buona / buono	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; situata all'interno di un triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta verso W — 450x.
UGC 3194	gx	04h52m59s	+01°19.9'		Ori	24"	buona / buono	molto debole e disturbata da un piccolo terzetto di stelline brillanti situate a W della gx; è molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 3195	gx	04h53m11s	+04°22.5'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 3197	gx	04h59m58s	+80°10.8'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di 40"45" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S; meglio a 380x per smorzare l'effetto della Luna.
UGC 3198	gx	04h54m19s	+01°38.4'		Ori	24"	m. buona / discreto	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW (fa parte di un piccolo arco di 3 stelline equidistanti con le quali la gx forma una losanga molto schiacciata — 450x.
UGC 3200	gx	04h54m21s	+02°08.0'		Ori	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale visibile a tratti, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 450x.
UGC 3202	gx	04h55m11s	−01°11.3'		Ori	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso W W (il campo è ricco di stelle brillanti: una si trova ad appena 2.5' SW dalla gx) — 450x.
UGC 3205	gx	04h56m15s	+30°03.1'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, molto stemperata sul fondo cielo, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 270x.
UGC 3206	gx	04h55m58s	+02°56.2'		Ori	24"	buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi S; una stellina brillante si trova a poco più di 1' NW; disturbata dalla SAO 112229 di 8ª grandezza situata 3' a E — 340x.
UGC 3207	gx	04h56m10s	+02°09.4'		Ori	16"	ottima / scarso	facile, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30", con ampio bulge diffuso; c'è una coppia ravvicinata di stelline (che si separano a fatica a causa del seeing non buono) a ridosso di NW — 270x.
UGC 3208	gx	04h56m20s	+01°36.5'		Ori	24"	buona / scarso	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E; disturbata dalla SAO 112223 di 6ª grandezza situata a 5' scarsi W — 340x.
UGC 3209	gx	04h56m26s	+03°01.9'		Ori	24"	buona / scarso	molto debole e diffusa, di dimensioni pressoché uguali a quelle di UGC 3206 , ma orientata da NE a SW; c'è una stellina evidente al bordo E — 340x.
UGC 3211	gx	04h57m23s	+01°53.6'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa per ~ 1' e orientata da N a S; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x (di fatto a 340x non l'ho praticamente vista).
UGC 3213	gx	04h57m59s	+02°56.1'		Ori	24"	ottima / ottimo	relativamente facile e meglio contrastata scalando a 340x, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a 1' SE; situata tra due stelle brillanti: quella a W si trova ad appena 1.5' dalla galassia.
UGC 3214	gx	04h57m57s	−00°07.5'		Ori	16"	ottima / scarso	è una debole lama di luce estesa un paio di primi e orientata da NE a SW con bulge esteso e poco contrastato; c'è una stellina a 1.5' verso W — 270x.
UGC 3215	gx	04h58m19s	+00°44.5'		Ori	24"	buona / buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso SE (è sorta La luna all'ultimo quarto) — 450x.
UGC 3217	gx	05h00m00s	+53°49.9'		Cam	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è una coppia di stelline subito a E; meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 3218	gx	05h00m44s	+62°14.6'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; presenta una tenue e piccola condensazione centrale visibile però solo a tratti; c'è una debole stellina doppia stretta situata a ridosso verso S facilmente visibile a 380x.
UGC 3219	gx	04h58m50s	+06°58.7'		Ori	24"	ottima / buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso NW; meglio visibile restando a 450x.
UGC 3221	gx	04h58m47s	−00°53.0'		Ori	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità a tratti un po' irregolare, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina al bordo meridionale; un triangolo molto acuminato di stelle brillanti si trova 4' a S della gx — 450x.
UGC 3223	gx	04h59m09s	+04°58.5'		Ori	16"	ottima / scarso	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 50"×30" e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso SE; è situata all'interno di un ampio asterismo di 7 stelle: quella più orientale è una doppia stretta — 270x.

UGC 3224	gx	04h59m21s	+05°37.1'		Ori	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; situata a ridosso W di un piccolo triangolo equilatero di stelline; più interessante a 340x.
UGC 3227	gx	05h04m50s	+76°51.9'		Cam	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 3229	gx	05h02m18s	+07°38.2'		Ori	24"	ottima / buono	molto debole, appena più evidente di MAC 0501+0737 (osservata subito prima e situata una 10-ina di primi a W), diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 3230	gx	05h06m36s	+75°35.7'		Cam	16"	ottima / ottimo	facile, diffusa, rotonda con Ø di ~ 1', gradatamente più brillante verso l'interno; presenta un tenue nucleo di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 3231	gx	05h32m05s	+00°14.7'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 3233	gx	05h03m04s	+00°15.3'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; stranamente meglio osservabile a 450x; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W e un'altra di luminosità simile a SE.
UGC 3234	gx	05h03m25s	+16°24.3'		Tau	24"	ottima / buono	elusivo e indistinto lucore esteso 40" o 50" che salta fuori solo in visione distolta a NW di una debole stellina; la visione non sembra migliorare scalando a 340x.
UGC 3236	gx	05h03m33s	+06°39.4'		Ori	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; disturbata dalla SAO 112370 di 7ª grandezza situata 3' a E — 450x.
UGC 3237	gx	05h03m28s	+00°39.5'		Ori	24"	buona / scarso	debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme; in visione distolta appare molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina all'estremità occidentale del fuso — 340x.
UGC 3239	gx	05h04m19s	−00°24.7'		Ori	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso verso W e un'altra appena percettibile subito a SW — 450x.
UGC 3240	gx	05h04m18s	+04°39.1'		Ori	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 3241	gx	05h08m55s	+75°25.7'		Cam	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; presenta una piccola zona centrale rotonda abbastanza marcata con Ø di 15" o 20" e un nucleo stellare visibile a 380x.
UGC 3242	gx	05h04m47s	+04°28.7'		Ori	24"	ottima / ottimo	ancora più debole e sottile di UGC 3240 — osservata subito prima e dalla quale dista una dozzina di primi a SE — appare senza problemi in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 60"×15"; c'è una debole stellina a 1' scarso verso S.
UGC 3245	gx	05h08m40s	+70°28.8'		Cam	16"	ottima / buono	è una debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1'; si vede senza problemi in visione distolta a 270x; c'è una stellina doppia stretta a un paio di primi verso NE.
UGC 3246	gx	05h06m03s	+00°33.4'		Ori	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso E che pare leggermente sfocata (da un controllo successivamente effettuato risulta in effetti una doppia stretta che non sono riuscito a separare) — 450x.
UGC 3247	gx	05h06m38s	+08°40.5'		Ori	16"	ottima / ottimo	è una debolissima bolla rotonda di 30" di Ø che appare con relativa facilità solo a 380x — c'è una stellina molto debole subito a E.
UGC 3248	gx	05h07m06s	+03°58.7'		Ori	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e con tenue bulge poco contrastato, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW e 3 deboli stelline allineate ed equidistanti a SE e orientate da NE a SW: quella più a S è appena percettibile — 450x.
UGC 3249	gx	05h12m15s	+75°55.0'		Cam	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x; c'è un piccolo triangolo equilatero di stelline di luminosità quasi uguale 4' a SE.
UGC 3252	gx	05h11m45s	+67°29.3'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda con Ø almeno 1' diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, ma con gradiente di luce molto basso; è situata tra 2 stelline di egual magnitudo distanti un paio di primi: una a SW e l'altra a NNE — 380x.
UGC 3253	gx	05h19m40s	+84°03.2'		Cep	16"	ottima / ottimo	è un debole ovale di 60"×40", orientato da E a W con tenue condensazione centrale diffusa; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N — 380x.
UGC 3254	gx	05h12m00s	+66°44.5'		Cam	16"	ottima / m. buono	debolissima, piccola ed elusiva, appare solo in visione distolta a 380x, ma bisogna stare attenti a non farsi ingannare dalle deboli stelline presenti nei dintorni, di cui una abbastanza evidente proprio a ridosso verso N: distogliendo appena lo sguardo questa tende a "ingrossarsi", cosa che non capita con le altre.
UGC 3256	gx	05h10m14s	+00°54.3'		Ori	24"	m. buona / buono	bolla circolare di aspetto regolare, poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 3257	gx	05h21m45s	+84°28.9'		Cep	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina subito a W — 380x.
UGC 3258	gx	05h10m43s	+00°24.5'		Ori	24"	buona / scarso	relativamente brillante, poco diffusa e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina brillante al bordo NE 340x.
UGC 3259	gx	05h14m16s	+74°20.0'		Cam	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore approssim. rotondo, con Ø di ~ 1' che si riesce a individuare senza problemi in visione distolta a 380x; non è difficile da localizzare in quanto situata all'interno di un asterismo di 7 stelline brillanti che costituiscono un ottimo riferimento.
UGC 3260	gx	05h12m30s	+51°17.2'		Aur	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo baffo di luce che in visione distolta appare esteso almeno 1' e orientato da WNW a ESE; c'è una stellina a ridosso S e una doppia serrata subito a NE; meglio definita scalando a 340x.
UGC 3261	gx	05h11m32s	+17°03.3'		Tau	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 45"×30" (anche a 570x è disturbata dalle numerose stelline presenti).
UGC 3262	gx	05h11m26s	−00°34.5'		Ori	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina a 30" verso E — 450x.
UGC 3263	gx	05h11m34s	−00°41.4'		Ori	24"	m. buona / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta a ridosso N di una stellina abbastanza brillante; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio osservabile a 340x.
UGC 3264	gx	05h11m31s	−00°35.1'		Ori	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
UGC 3267	gx	05h15m47s	+71°27.6'		Cam	16"	ottima / buono	è una piccola galassietta abbastanza facile, rotonda, con Ø di 30" e con evidente condensazione centrale — 380x.
UGC 3268	gx	05h16m10s	+68°14.6'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø di 20" e condensazione centrale visibile a tratti; forma un piccolo triangolo equilatero con due stelline: una a S e l'altra a SE — 380x.
UGC 3269	gx	05h14m07s	+06°31.2'		Ori	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 3271	gx	05h16m11s	−00°09.0'		Ori	24"	m. buona / buono	è una sorta di tenue alone circolare esteso sì e no una 30-ina di secondi attorno a una stellina abbastanza brillante; un'altra stellina luminosa si trova quasi a ridosso verso E, mentre a 1' W ce n'è una poco più debole — 450x.
UGC 3273	gx	05h17m45s	+53°33.0'	q 40	Aur	16"	m. buona / scarso	è un debolissimo lucore visibile con notevole difficoltà; la visione è disturbata da una minutaglia di debolissime stelline poste nelle immediate vicinanze; oltre a questo sembra anche piuttosto estesa e soltanto a tratti appare molto allungata da NE a SW per oltre 2' — 132x.
UGC 3276	gx	05h21m16s	+76°21.3'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, situata all'interno di un asterismo di 7 stelline brillanti ed esteso da N a S; la gx sembra quasi unire le due stelle più a N che sono orientate da E a W e distanti 1' — 450x.
UGC 3277	gx	05h19m10s	+65°28.2'		Cam	16"	ottima / buono	è un debolissimo baffo di luminosità uniforme di dimensioni ~ 60"×20" che sembra dipartirsi verso S da una stellina — 380x.
UGC 3281	gx	05h20m42s	+72°32.1'		Cam	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 60"×40" e con nucleo abbastanza evidente a 380x.
UGC 3284	gx	05h21m23s	+72°42.1'		Cam	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo; appare solo a tratti in visione distolta a 380x; forse poco allungata da E a W per max 1'.
UGC 3287	gx	05h19m19s	+01°20.1'		Ori	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con PGC 17090 situata quasi a ridosso SW — poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 3294	gx	05h21m04s	+04°00.4'		Ori	24"	buona / scarso	molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40"; disturbata dalla SAO 112660 di 7ª grandezza situata 4' scarsi a E — 340x.
UGC 3296	gx	05h21m22s	+04°53.2'		Ori	24"	buona / scarso	relativamente facile, poco diffusa e con basso gradiente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso W — 340x.
UGC 3302	gx	05h28m23s	+76°39.8'		Cam	16"	ottima / ottimo	è un diffuso lucore circolare con Ø > di 1', situato 1' E di una stellina brillante; c'è una stellina molto debole a ridosso verso S — 380x.
UGC 3303	gx	05h25m00s	+04°30.3'		Ori	24"	buona / scarso	debolissimo baffo di luce, estremamente diffuso che aggetta per meno di 30" a E di una stella abbastanza brillante; una stellina appena percettibile si trova a ridosso verso SE — 340x.
UGC 3306	gx	05h25m17s	+00°25.2'		Ori	24"	m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S e un'altra più debole alla stessa distanza verso N — 450x.
UGC 3307	gx	05h27m57s	+63°51.5'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente facile, poco allungata da E a W, dimensioni 40"×30" e con marcata condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una doppia stretta un paio di primi a SE — 380x.
UGC 3309	gx	05h29m14s	+67°22.4'		Cam	16"	ottima / buono	debole, diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" con condensazione centrale ben evidente a 380x; c'è una stellina a 1' verso NE; forma un triangolo equilatero con 2 stelline situate ~ 5' a NNW e WNW.
UGC 3320	gx	05h38m24s	+79°35.2'		Cam	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N — 450x.
UGC 3325	gx	05h35m19s	+40°53.2'		Aur	16"	m. buona / ottimo	debolissima, quasi elusiva! A 380x appare solo a tratti, diffusa con Ø di 25"-30"; bisogna stare attenti a non farsi ingannare da un falso nucleo puntiforme che in realtà è una stellina appena percettibile situata a ridosso verso E; anche ad alti ingrandimenti il campo rimane abbastanza ricco.
UGC 3326	gx	05h39m32s	+77°18.6'		Cam	24"	buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da NE a SW ed estesa un paio di primi; c'è una stellina a ridosso N e un'altra di luminosità simile subito a SE; la gx è meglio visibile scalando a 340x.
UGC 3328	gx	05h36m17s	+07°19.6'		Ori	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25" con nucleo stellare facilmente visibile a 380x.
UGC 3329	gx	05h36m32s	+16°38.5'		Tau	16"	ottima / ottimo	è un'indistinta chiazza luminosa molto disturbata dalla luce delle numerose stelline presenti nel campo; si nota all'interno un debole puntino luminoso, ma non riesco a capire se è il nucleo della gx o una stellina sovrapposta — 270x.
UGC 3335	gx	05h45m07s	+79°14.2'		Cam	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 450x.
UGC 3336	gx	05h55m44s	+85º54.9'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 3340	gx	05h47m27s	+79°38.1'		Cam	24"	buona / ottimo	relativamente facile, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e leggermente screziata verso la periferia — 450x.
UGC 3341	gx	05h41m55s	+18°29.5'		Tau	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza circolare, molto diffusa e di 40"-45" di Ø, situata a ridosso S di una coppia abbastanza serrata di stelline; malgrado tutto sembra poco più evidente a 380x.
UGC 3342	gx	05h44m30s	+69°18.0'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme orientata da NE a SW ed estesa oltre 1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
UGC 3343	gx	05h45m25s	+72°21.4'		Cam	16"	ottima / ottimo	è molto allungata da E a W con dimensioni 2'x30", di luminosità pressoché uniforme, osservabile abbastanza facilmente anche in visione diretta; è situata a ridosso della più occidentale di 3 stelline brillanti allineate — 380x.
UGC 3344	gx	05h44m57s	+69°09.6'		Cam	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso E.
UGC 3346	gx	05h44m10s	+51°12.0'		Aur	16"	ottima / buono	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme; in visione distolta appare a tratti allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 60"×20"; c'è una doppia abbastanza stretta a 1.5' verso E e una stellina quasi a ridosso W — 270x.
UGC 3347	gx	05h48m41s	+79°31.4'		Cam	24"	buona / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una coppia di stelline subito a NW e una debole stellina quasi a ridosso NE.
UGC 3349	gx	05h46m32s	+69°03.1'		Cam	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa allungata da E a W, dimensioni 50"×30" e con nucleo di aspetto stellare abbastanza marcato — 380x.
UGC 3353	gx	05h51m17s	+79°41.8'		Cam	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, approssim. rotonda con Ø poco inferiore a 1' e condensazione centrale evidente; c'è una stellina doppia 1' verso SE — 380x.
UGC 3354	gx	05h47m18s	+56°06.7'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una doppia stretta a un paio di primi NE (occorre tenere fuori campo la SAO 25362 di 6ª grandezza e situata meno di 7' a E) — 380x.
UGC 3355	gx	05h47m15s	+50°52.2'		Aur	16"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina brillante a 1' NW e un'altra debole a uguale distanza verso E — 270x.
UGC 3357	gx	05h51m25s	+74°17.0'		Cam	16"	ottima / ottimo	debole, ma facilmente osservabile a 380x, allungata da NE a SW con dimensioni 70"×30", poco diffusa e appena più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 3358	gx	05h49m47s	+50°23.5'		Aur	16"	ottima / buono	debolissima, malgrado il vento forte sono riuscita a catturarla a 380x; è estesa una 40-ina di secondi; si riesce a vedere anche a 270x ma solo in visione distolta.
UGC 3362	gx	05h49m31s	+17°39.0'		Tau	16"	ottima / ottimo	forma una coppia assieme a UGC 3363 situata un paio di primi più a N — è una gx debolissima, quasi elusiva, ma quando salta fuori appare a tratti allungata da NW a SE per 30" o 40"; c'è una stellina una 40-ina di secondi a SW; meglio visibile a 270x.
UGC 3363	gx	05h49m32s	+17°41.1'		Tau	16"	ottima / ottimo	forma una coppia assieme alla precedente situata un paio di primi più a S — molto debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con bulge abbastanza evidente — 380x.
UGC 3364	gx	05h54m06s	+76°39.9'		Cam	16"	ottima / buono	è una galassietta piccola ed elusiva; si riesce a catturare solo in visione distolta a 380x; non dovrebbe essere comunque più estesa di una 30-ina di secondi.
UGC 3365	gx	05h52m36s	+66°48.9'		Cam	16"	ottima / buono	è una debole lama di luce che in visione distolta appare estesa per un paio di primi in direzione NW-SE; presenta bulge diffuso ed evidente; 2 stelline situate immediatamente a E e a N sembrano delimitarne le dimensioni; un'altra debole stellina si trova alla stessa distanza, ma dalla parte opposta — 380x.
UGC 3373	gx	05h59m08s	+78°30.5'		Cam	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, ma in visione distolta, a 270x, si riesce a capire che è allungata da E a W con dimensioni di ~ 60"×40"; a 380x è di aspetto più confuso; c'è una stellina quasi a ridosso verso E; un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti foggiate a piccolo trapezio irregolare è situato a 5' NE.
UGC 3375	gx	05h55m25s	+51°54.6'		Aur	16"	ottima / buono	relativamente facile, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30", con tenue bulge diffuso appena più contrastato del disco; c'è una stellina a ridosso del nucleo verso NE — 380x.
UGC 3378	gx	06h06m21s	+83°50.3'		Cam	16"	ottima / buono	poco diffusa rotonda con Ø di 45" e una condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso SE [in questa gx, distante 240 milioni di anni luce, la bimba Kathryn Gray di appena 10 anni aveva scoperto una supernova nel gennaio 2011] — 380x.
UGC 3379	gx	05h58m25s	+68°27.7'		Cam	16"	m. buona / ottimo	è di aspetto un poco irregolare, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×30", con una tenuissima zona interna diffusa appena più evidente; c'è una stellina brillante al margine SE — 380x.
UGC 3381	gx	06h07m23s	+83°43.2'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, estesa non più di 30" o 35"; appare a tratti in visione distolta; è come "circondata" da stelline molto deboli (salvo verso S) — 380x.
UGC 3382	gx	05h59m48s	+62°09.5'		Cam	16"	ottima / buono	rotonda, poco diffusa, Ø 45", con condensazione centrale piccola e abbastanza evidente a 380x.
UGC 3385	gx	06h04m51s	+80°08.6'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente brillante e compatta, allungata da N a S con dimensioni 50"×20"; presenta una condensazione centrale visibile a tratti a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso verso S, praticamente sull'asse della gx.
UGC 3386	gx	06h02m38s	+65°22.3'		Cam	16"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30", gradiente medio e nucleo stellare; è situata tra 2 stelline: quella quasi a ridosso verso N è molto debole — 380x.
UGC 3388	gx	06h05m04s	+75°22.1'		Cam	16"	ottima / buono	è un piccolo e tenue oggetto rotondo con Ø max di 30", diffuso e poco più brillante al centro; è situata ~ 1' E di una stellina brillante che infastidisce un po'' — 380x.
UGC 3394	gx	06h04m50s	+56°09.9'		Cam	16"	ottima / buono	è un'elusiva chiazza di luce osservabile solo a tratti in visione distolta a 270x; dovrebbe essere estesa una 40-ina di secondi; purtroppo c'è una stella brillante proprio a 1' verso E.
UGC 3396	gx	06h09m57s	+79°55.6'		Cam	16"	ottima / buono	presenta una condensazione centrale marcata circonfusa da un tenue alone con Ø di 45" — 380x.
UGC 3397	gx	06h10m34s	+79°52.1'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a NW — 380x.
UGC 3401	gx	06h13m48s	+81°04.5'		Cam	16"	ottima / buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S per ~ 1'; c'è una stellina appena percettibile sull'asse della gx verso N — 380x.
UGC 3403	gx	06h10m36s	+71°23.1'		Cam	16"	m. buona / ottimo	molto debole e a bassissima luminanza superficiale, diffusa, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 100"×40"; meglio a 270x.
UGC 3404	gx	06h14m02s	+80°00.2'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente compatta poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", con gradiente medio di luce e condensazione centrale abbastanza evidente — 380x.
UGC 3405	gx	06h14m13s	+80°27.8'		Cam	16"	ottima / buono	assieme a UGC 3410 forma una coppia di lame di luce molto deboli e di luminosità uniforme e che tuttavia appaiono senza problemi in visione distolta a 380x; sono distanti tra loro un paio di primi ed entrambe orientate da NW a SE; la 1ª è estesa poco più di 1', mentre la 2ª è più "cicciotta" e leggermente più grande (80" contro i 70" della prima).
UGC 3407	gx	06h09m08s	+42°05.1'		Aur	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 30"; è meglio a 380x perché si separa più facilmente dalle stelline di un piccolo asterismo vagamente foggiato a "Y".
UGC 3408	gx	06h14m14s	+79°41.5'		Cam	24"	buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da N a S ed estesa 1'; malgrado l'apparenza che si nota in fotografia; in visuale non è più difficile della vicina UGC 3412 situata 4' a E; la visione risulta comunque poco più contrastata scalando a 340x.
UGC 3410	gx	06h14m27s	+80°27.0'		Cam	16"	ottima / buono	v. **UGC 3405**
UGC 3412	gx	06h15m39s	+79°42.6'		Cam	24"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20" (la lunghezza della gx è grosso modo pari alla distanza delle due stelline situate 2.5' a NE) — 450x.
UGC 3413	gx	06h17m00s	+81°08.3'		Cam	16"	ottima / buono	debole, ma facilmente visibile, diffusa e con bassissimo gradiente, poco allungata da E a W con dimensioni 80"×60" — 380x.
UGC 3416	gx	06h13m40s	+69°43.8'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole, stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme; appare con relativa facilità in visione distolta a 270x; è allungata da E a W con dimensioni 2'×1'.
UGC 3418	gx	06h12m26s	+44°26.3'		Aur	16"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, probabilmente rotonda con Ø di ~ 40"; il campo è abbastanza ricco di stelline; meglio tuttavia scalare a 270x.
UGC 3420	gx	06h16m01s	+75°56.2'		Cam	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e con piccolo bulge abbastanza evidente; in visione distolta appare molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 90"×30" — 450x.
UGC 3422	gx	06h15m08s	+71°08.2'		Cam	16"	m. buona / ottimo	molto debole, appena più brillante, diffusa con Ø di 45"50"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 380x.
UGC 3425	gx	06h14m48s	+66°34.1'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, estesa un paio di primi e orientata da E a W; tutto sommato è abbastanza semplice da vedere in visione distolta a 270x; c'è una stellina al bordo orientale.
UGC 3426	gx	06h15m36s	+71°02.3'		Cam	16"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo stellare molto marcato e brillante e un tenuissimo alone circonfuso, rotondo con di ~ 1'; c'è una stellina brillante a N e una debole a NW — 380x.
UGC 3431	gx	06h19m22s	+76°48.7'		Cam	16"	ottima / buono	facile, presenta una evidente nucleo stellare circonfusa da un alone diffuso esteso per meno di 1'; c'è una stellina molto debole a ridosso verso S; la gx è situata tra 2 stelle brillanti distanti 3' e orientate da NNE a SSE — 380x.
UGC 3435	gx	06h24m54s	+82°19.1'		Cam	16"	ottima / buono	abbastanza facile e relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; a 380x appare appena più brillante all'interno.
UGC 3438	gx	16h20m12s	+66°35.1'		Cam	16"	ottima / buono	debole, allungata da WNW a ESE con dimensioni 70"×30"; è situata tra 2 stelline orientate all'incirca nello stesso modo e distanti oltre 2' — 270x.
UGC 3441	gx	06h27m50s	+83°18.6'		Cam	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e con piccola condensazione centrale, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x.
UGC 3442	gx	06h31m06s	+84°55.5'		Cam	16"	ottima / ottimo	allungata da ESE a WNW, ci dimensioni 45"×15" e con bulge evidente allungato nella stessa direzione; c'è una stellina brillante all'estremità WNW (questa stellina è la più orientale di un piccolo triangolo di stelline brillanti — 380x.
UGC 3447	gx	06h20m34s	+27°58.7'		Aur	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo di aspetto quasi stellare visibile a tratti a 380x; ci sono 2 stelline a ridosso: una a N e l'altra a W — 380x.
UGC 3448	gx	06h22m28s	+66°34.7'		Cam	16"	ottima / buono	è una lama di luce relativamente facile, compatta, con bulge marcato e nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 3451	gx	06h26m04s	+77°52.5'		Cam	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina subito a E — 450x.
UGC 3453	gx	06h24m54s	+73°07.8'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole, poco allungata da NE a SW con dimensioni 50"×40"; a 380x si vede distinta-mente una stellina verso il bordo orientale.
UGC 3456	gx	06h26m27s	+77°23.5'		Cam	24"	buona / m. buono	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso S — 450x.
UGC 3458	gx	06h25m56s	+64°44.5'		Cam	16"	ottima / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo bulge diffuso che si nota a 270x; è molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'×45"; c'è una stellina a ridosso verso S.
UGC 3460	gx	06h28m00s	+74°18.1'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole, allungata da N a S (ossia come le 2 stelle brillanti situate a N e con le quali la gx è equidistante); a tratti, a 380x, appare qualcosa di puntiforme, ma non riesco a capire se trattasi del nucleo o di una stellina sovrapposta.
UGC 3464	gx	06h29m21s	+74°29.5'		Cam	16"	ottima / buono	debole, poco diffusa di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 3467	gx	06h27m18s	+49°36.8'		Aur	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 40"-45"; presenta un piccolo bulge abbastanza evidente a 380x; .
UGC 3471	gx	06h31m35s	+74°26.2'		Cam	16"	ottima / buono	debole, diffusa con basso gradiente e Ø poco superiore a 1'; presenta lievi irregolarità di luce verso il brodo settentrionale; c'è una stellina a ridosso verso NE — 380x.
UGC 3472	gx	06h33m02s	+75°52.0'		Cam	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge poco contrastato — 450x.
UGC 3474	gx	06h32m38s	+71°33.6'		Cam	16"	ottima / ottimo	è un elusivo baffo di luce che a 270x sembra aggettare simmetricamente a N e a S di una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi; a 380x appare invece a fianco della stella verso E.
UGC 3475	gx	06h30m29s	+39°30.2'		Aur	28"	buona / mediocre	è una chiazza molto debole, di aspetto uniforme e assai stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×30"; c'è una stella abbastanza brillante a ridosso N che tuttavia ne confonde un po' la forma — 495x.
UGC 3478	gx	06h32m48s	+63°40.5'		Cam	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco più brillante verso l'interno, allungata da NE a SE con dimensioni di almeno 60"×30" — 380x.
UGC 3480	gx	06h33m07s	+53°31.1'		Aur	16"	ottima / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina percettibile solo a tratti a ridosso verso S; un'altra debole stellina si trova a 1' NW — 380x.
UGC 3486	gx	06h36m18s	+74°20.6'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso S; la gx è situata tra due stelline abbastanza brillanti distanti un paio di primi in direzione E-W — 450x.
UGC 3487	gx	06h33m40s	+40°41.3'		Aur	28"	buona / mediocre	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni che in visione distolta arrivano a 45"×30"; c'è una stellina al bordo W — 495x.
UGC 3488	gx	06h34m10s	+52°07.6'		Aur	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×45", più brillante all'interno e con nucleo stellare; c'è un piccolo asterismo di 5 stelline foggiato a "M" sghemba subito a NE — 380x.
UGC 3493	gx	06h35m27s	+48°50.6'		Aur	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile; a 380x appare allungata da E a W con dimensioni 60"×40", di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina a ridosso verso S.
UGC 3494	gx	06h35m57s	+56°21.2'		Lyn	24"	ottima / buono	è un elusivo baffo di luce esteso forse una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE, "soffocato" dal bagliore della 9 Lyncis di 6ª grandezza situata un paio di primi a N; la visione non migliora dopo aver spinto a 580x.
UGC 3499	gx	06h36m51s	+37°34.2'		Per	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta un tenue nucleo stellare visibile a tratti; ci sono 2 deboli stelline a ridosso N e S; una terza di luminosità simile a 1' SE; una stella brillante si trova invece a poco più di 1' NW — 270x.
UGC 3500	gx	06h47m55s	+84°09.9'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma si riesce a vedere facilmente in visione distolta nonostante la presenza di un falcetto di Luna; è molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", appena più brillante all'interno; c'è una stellina a poche decine di secondi verso W e un'altra più debole verso SE — 380x.
UGC 3502	gx	06h39m48s	+65°27.2'		Cam	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, appare facilmente in visione distolta a 380x; è molto allungata ~ da E a W con dimensioni 60"×20".
UGC 3504	gx	06h40m07s	+60°04.8'		Lyn	16"	buona / mediocre	debole chiazza lattescente approssim. circolare, dai bordi indistinti, di luminosità uniforme e con Ø di un paio di primi; 2 deboli stelline a ridosso del bordo NE appaiono a tratti a 270x; un'altra stellina appena più brillante, e allineata con le 2 precedenti, lambisce invece il margine NW.
UGC 3506	gx	06h40m32s	+50°06.3'		Lyn	16"	ottima / buono	facile, rotonda, diffusa, di Ø < 1' e con piccolo bulge abbastanza marcato; c'è una stellina a ridosso NW appena percettibile a 380x.
UGC 3509	gx	06h54m54s	+85°38.3'		Cep	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per 1'; è disturbata da una stellina brillante a ridosso verso E — 450x.
UGC 3510	gx	06h41m32s	+40°10.2'		Aur	28"	buona / mediocre	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina a ridosso W — 495x.
UGC 3511	gx	06h43m42s	+65°12.4'		Cam	16"	m. buona / ottimo	è un ovale diffuso, facile da vedere, orientato da NW a SE, di dimensioni 60"×45", con piccola ed evidente condensazione centrale (a prima vista è una macchia rotonda, ma si allunga in visione distolta) — 380x.
UGC 3517	gx	06h46m01s	+71°08.5'		Cam	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo lucore, diffuso, che appare in visione distolta a 270x in una piccola zona depleta; stelline appena percettibili appaiono a tratti, ma è difficile dire esattamente dove; una di queste, comunque, si trova verso E (o SE).
UGC 3518	gx	06h43m42s	+28°27.3'		Gem	16"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SW e un'altra una 40-ina di secondi a NE — 380x.
UGC 3521	gx	06h55m01s	+84°02.6'		Cam	16"	ottima / buono	è più debole di UGC 3522, dalla quale dista 3' a SE, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 3522	gx	06h56m05s	+84°55.1'		Cam	16"	ottima / buono	riesco a vedere solo un piccolo nucleo, debole e poco diffuso situato a ~ 1' NW di una stellina; non c'è traccia di alone — 380x.
UGC 3524	gx	06h44m00s	+12°24.1'		Gem	16"	m. buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina al margine N — 270x.
UGC 3525	gx	06h45m03s	+40°24.9'		Aur	16"	m. buona / ottimo	è un debole ovale molto diffuso, di dimensioni 50"×30" e orientato da E a W; a 380x appare a tratti un tenuissimo nucleo di aspetto stellare.
UGC 3527	gx	05h48m05s	+72°45.3'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio evidente scalando a 340x, ma così diventano più fastidiose le SAO 5968 e 5974 di 9ª grandezza situate rispettivamente 4' a SW e 4' a N.
UGC 3528	gx	06h56m11s	+84°04.8'		Cam	16"	ottima / buono	rotonda, diffusa, con basso gradiente e con Ø di ~ 1'; presenta una tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 3528A	gx	07h02m21s	+86°34.8'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 3529	gx	06h45m26s	+34°29.1'		Gem	16"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso SE — 380x.
UGC 3532	gx	06h46m12s	+43°47.5'		Aur	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; meglio osservabile scalando a 270x.
UGC 3535	gx	06h46m24s	+43°49.5'		Aur	16"	m. buona / ottimo	più facile di UGC 3532, piccola, rotonda con Ø di 30"-35", con bulge evidente di aspetto quasi stellare; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso NE; è meglio evidente a 380x.
UGC 3536	gx	06h46m04s	+29°20.9'		Gem	24"	m. buona / mediocre	relativamente brillante e compatta, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo quasi stellare; è allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25" — 450x.
UGC 3536A	gx	07h03m22s	+86°33.5'		Cep	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
UGC 3537	gx	06h46m55s	+33°37.1'		Gem	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa assai stemperata sul fondo cielo, probabilmente rotonda con Ø poco inferiore a 1' — 380x.
UGC 3538	gx	06h47m33s	+47°39.2'		Aur	28"	buona / mediocre	debole, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW — 495x.
UGC 3540	gx	06h54m33s	+82°28.9'		Cam	24"	buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa 1' e orientata da NE a SW; appare in visione distolta ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E; una stellina più debole si trova al bordo SE.
UGC 3548	gx	06h53m27s	+77°24.6'		Cam	16"	ottima / buono	debole, rotonda con Ø 45", poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 3549	gx	06h54m59s	+80°57.9'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente compatta, rotonda, di luminosità uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
UGC 3552	gx	06h49m51s	+28°22.3'		Gem	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, appare a tratti poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30", ma è meglio definita a 270x.
UGC 3553	gx	06h49m43s	+20°04.8'		Gem	24"	ottima / discreto	è una debolissima chiazza diffusa "incastonata" tra 2 stelline brillanti che ne offuscano un po' la visione; solo a momenti appare orientata grosso modo da N a S per una 40-ina di secondi, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 3554	gx	06h50m26s	+43°03.2'		Aur	20"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W — 360x.
UGC 3555	gx	06h49m58s	+25°38.1'		Gem	24"	ottima / discreto	diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 45"; la piccola e debole MCG+4-16-3 è situata a ridosso NW (v. voce corrispondente) — 450x.
UGC 3558	gx	06h50m15s	+20°08.4'		Gem	24"	ottima / discreto	diffusa e con nucleo quasi stellare contrastato, rotonda con Ø < 40"; situata all'interno di un gruppetto di 4 stelline di forma triangolare ed esteso 1' — 450x.
UGC 3561	gx	06h51m20s	+49°53.2'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e poco più brillante all'interno; situata nel mezzo tra una doppia stretta e sbilanciata a SW e una stellina a NE — 450x.
UGC 3567	gx	06h51m47s	+48°29.8'		Aur	16"	buona / m. buono	grosso modo rotonda con Ø di 40" e poco più luminosa all'interno; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso NE — 380x.
UGC 3571	gx	06h51m40s	+29°04.4'		Gem	16"	m. buona / ottimo	è un debole lucore molto stemperato sul fondo cielo, poco più evidente a 270x; a tratti, in visione distolta, appare poco allungata da E a W (o NW-SE, non capisco bene) con dimensioni 70"×50"; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da NW a SE: quella a SE è praticamente a ridosso della gx.
UGC 3573	gx	06h51m48s	+27°28.9'		Gem	16"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole ma relativamente compatta, estesa una 40-ina di secondi e orientata da NW a SE; presenta un nucleo stellare abbastanza marcato — 380x.
UGC 3574	gx	06h53m10s	+57°10.7'	q 42	Lyn	16"	buona / mediocre	è più debole ed estesa di UGC 3504; appare come un indistinto lucore che, in visione distolta, mostra chiaramente un nucleo più brillante; è grosso modo circolare con Ø di 2.5'; la si individua facilmente grazie a un piccolo asterismo foggiato a "W" situato a ridosso verso NW — 270x.
UGC 3576	gx	06h53m07s	+50°02.0'		Lyn	16"	ottima / buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" con nucleo stellare facilmente visibile a 380x; è situata all'interno di un piccolo parallelogramma di stelline deboli di luminosità diseguale: una di queste è proprio a ridosso della gx a NW.
UGC 3577	gx	06h54m43s	+65°12.2'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40"; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con cateti di 1' assieme a 2 stelline: una a S e l'altra a SW; quest'ultima fa parte di un piccolo asterismo foggiato a trapezio. La stella brillante situata 6' WSW non è riportata sull'Uranometria, ma si vede nel cercatore — 270x.
UGC 3578	gx	06h52m20s	+15°14.9'		Gem	16"	m. buona / scarso	relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 380x.
UGC 3580	gx	06h55m31s	+69°33.8'	q 21	Cam	16"	buona / mediocre	debole, ma molto facile da vedere; è allungata da N a S, di dimensioni 2'×1', molto diffusa e con bulge poco più brillante del disco; c'è una stellina a ridosso verso E e un'altra più debole al bordo N — 270x.
UGC 3581	gx	06h59m03s	+80°00.2'		Cam	16"	ottima / buono	debole chiazza di luminosità uniforme, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 70"×50" — 380x.
UGC 3584	gx	06h53m12s	+27°04.8'		Gem	24"	buona / m. buono	è un elusivo baffo di luce che aggetta verso S da una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi; un'altra stellina più debole si trova a ridosso verso W; è stato necessario forzare a 570x.
UGC 3587	gx	06h53m55s	+19°18.0'	q 138	Gem	16"	m. buona / scarso	è un altro debole chiarore immerso in un campo molto ricco di stelline; in visione distolta appare di forma irregolare, con dimensioni attorno a 1.5' — 132x.
UGC 3588	gx	06h54m32s	+45°42.2'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge rotondo e contrastato; c'è una stellina molto debole al bordo E, una di luminosità simile quasi a ridosso N e una più evidente subito a W — 450x.
UGC 3592	gx	06h55m14s	+41°20.3'		Aur	20"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a ridosso W — 360x.
UGC 3593	gx	06h55m14s	+40°57.6'		Aur	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio osservabile a 270x.
UGC 3594	gx	06h54m49s	+23°30.1'		Gem	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza diffusa, di una 40-ina di secondi di Ø 40 e di luminosità uniforme; salta fuori senza problemi in visione distolta a 380x.
UGC 3595	gx	06h56m00s	+55°24.0'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 45" — 380x.
UGC 3596	gx	06h55m36s	+39°45.8'		Aur	16"	buona / m. buono	relativamente facile, presenta un bulge brillante circondato da un alone diffuso, rotondo con Ø di ~ 45" — 380x.
UGC 3597	gx	06h55m46s	+47°55.8'		Aur	28"	m. buona / discreto	debole lama di luce di aspetto uniforme, orientata da E a W ed estesa 1.5' — 495x.
UGC 3598	gx	06h56m30s	+60°39.1'	q 42	Lyn	16"	m. buona / mediocre	debole macchiolina oblunga che in visione distolta sembra dipartirsi verso SE da una stellina brillante; è orientata grosso modo come quel piccolo arco di tre stelline situato ~ 3' a SW; a tratti pare di vedere un piccolo bulge che si stacca dal chiarore — 270x.
UGC 3599	gx	06h55m11s	+24°13.8'		Gem	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, molto piccola e con nucleo quasi stellare; è rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a ridosso verso NW e un piccolo arco di 3 stelline subito a SE — 380x.
UGC 3601	gx	06h55m50s	+40°00.0'		Aur	20"	m. buona / buono	piccola e relativamente facile, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 360x.
UGC 3604	gx	07h02m23s	+80°57.1'		Cam	16"	ottima / buono	è una debole bolla circolare stemperata sul fondo cielo, facilmente visibile in visione distolta e con Ø di ~ 1' — 380x.
UGC 3606	gx	06h57m50s	+63°41.5'		Cam	16"	ottima / m. buono	debolissimo lucore molto diffuso ed esteso una 40-ina di secondi; è osservabile senza problemi in visione distolta a 270x; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline situate a E e a N.
UGC 3608	gx	06h57m34s	+46°24.2'		Lyn	16"	buona / m. buono	relativamente facile, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina a ~ 1' verso W — 380x.
UGC 3609	gx	06h59m23s	+69°16.2'		Cam	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondeggiante, molto diffuso e con Ø ~ 30" — 270x.
UGC 3612	gx	06h57m40s	+39°05.2'		Aur	16"	buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una coppia serrata di debolissime stelline a NW di cui quella più meridionale a ridosso della gx — 380x.
UGC 3614	gx	06h58m17s	+45°03.4'		Aur	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni ~ 60"×40" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una coppia serrata di stelline appena percettibili a SSW (occorre tenere fuori campo la brillante 16 Lyn di magnitudo 4.9) — 380x.
UGC 3615	gx	06h57m59s	+35°44.0'		Gem	16"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 380x.
UGC 3619	gx	05h58m28s	+34°12.7'		Gem	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, appare in visione distolta a 380x, non più estesa di 30"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S — 380x.
UGC 3622	gx	06h59m34s	+33°01.5'		Gem	24"	m. buona / mediocre	lama di luce molto debole "soffocata" dal bagliore della SAO 59668 di 7ª grandezza situata 2' scarsi a N; è orientata da E a W ed estesa ~ 45" — 450x.

UGC 3626	gx	07h02m41s	+70°58.2'		Cam	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo oggetto molto debole e diffuso, esteso non più di 30" che appare in visione distolta a 380x; ogni tanto salta fuori qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è una stellina a ridosso o il nucleo stellare; c'è una doppia stretta a ~ 1' verso W.
UGC 3627	gx	07h01m05s	+51°16.2'		Lyn	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×40" — 380x.
UGC 3630	gx	07h01m03s	+01°54.7'		Mon	16"	m. buona / scarso	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; il campo è molto ricco; meglio scalare a 188x.
UGC 3631	gx	07h01m42s	+29°53.0'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina brillante a 1' N — 450x.
UGC 3632	gx	07h06m29s	+77°52.2'		Cam	24"	buona / ottimo	debolissima, appare a momenti subito a S di una coppia di stelline (quella più orientale è appena percettibile); forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la visione non sembra migliorare scalando a 340x.
UGC 3634	gx	07h01m37s	+14°08.1'		Gem	16"	ottima / buono	facile, piuttosto compatta, con basso gradiente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ~ 1' NE; 3 stelline allineate da NE a SW vicine alla gx saltano facilmente all'occhio — 380x.
UGC 3636	gx	07h06m02s	+75°26.6'		Cam	16"	ottima / buono	abbastanza facile, compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 60"×20"; presenta un leggero rigonfiamento centrale che non è tuttavia più brillante del disco; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 380x.
UGC 3638	gx	07h03m03s	+49°25.4'		Lyn	16"	buona / m. buono	molto debole, poco di diffusa, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni ~ 45"×30"; c'è una stellina 40" verso NW appena percettibile a 380x.
UGC 3640	gx	07h02m48s	+37°07.2'		Aur	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, con condensazione centrale appena percettibile, orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
UGC 3641	gx	07h02m21s	+11°24.3'		Mon	16"	m. buona / scarso	molto debole, assai stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di almeno 1'; a W ci sono 3 stelline allineate da NE a SE e ravvicinate — 270x.
UGC 3642	gx	07h04m23s	+64°01.2'		Cam	16"	m. buona / ottimo	brillante, rotonda, diffusa, con alto gradiente e Ø di 1'; a 380x appare un piccolo nucleo di aspetto quasi stellare.
UGC 3644	gx	07h05m38s	+71°04.3'		Cam	16"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di forma indistinta, appare a tratti in visione distolta a 380x a ~ 1' verso SE da una stellina brillante.
UGC 3645	gx	07h04m01s	+50°40.8'		Lyn	24"	ottima / buono	debole lama di luce di aspetto uniforme, orientata da NE a SW ed estesa almeno 1'; c'è una stellina a ridosso NE e una coppia di luminosità simile a 1' scarso NW — 450x.
UGC 3646	gx	07h04m16s	+54°13.4'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; è situata in mezzo a 2 stelline orientate da NE a SW e distanti un paio di primi scarsi; c'è una stellina molto debole a ridosso verso E e un'altra appena percettibile a ridosso N — 380x.
UGC 3647	gx	07h04m50s	+56°31.1'		Lyn	24"	ottima / buono	debolissimo lucore molto stemperato sul fondo cielo, di forma indistinta ed esteso una 40-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 3648	gx	07h05m24s	+64°05.5'		Cam	16"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole orientata da E a W ed estesa per ~ 1'; meglio a 270x, perché a 380x si diluisce troppo sul fondo cielo.
UGC 3649	gx	07h04m01s	+29°14.6'		Gem	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, poco allude da ENE a WSW (ossia a perpendicolo con le 3 stelline a NNW con le quali è allineata), con dimensioni 40"×30" e appena più brillante all'interno. A 1.5' verso E appare un debolissimo oggetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø visibile abbastanza facilmente in visione distolta: da un controllo effettuato successivamente è risultato essere la **CGCG 146-22** — 380x.
UGC 3650	gx	07h04m10s	+37°41.5'		Aur	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso E e una debole a 1' SSW meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 3652	gx	07h03m51s	+22°22.2'		Gem	16"	ottima / ottimo	chiazza molto debole, allungata ~ da E a W, di dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; è meglio osservabile a 270x.
UGC 3654	gx	07h17m47s	+85°42.8'		Cep	24"	buona / ottimo	relativamente compatta, con piccola condensazione centrale evidente, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo N — 450x.
UGC 3655	gx	07h04m58s	+46°08.5'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
UGC 3656	gx	07h04m24s	+18°32.6'		Gem	24"	ottima / discreto	baffo di luce molto debole e uniforme, orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 3660	gx	07h06m34s	+63°51.0'		Cam	16"	m. buona / ottimo	facile, diffusa, con basso gradiente, allungata ~ da E a W con dimensioni 70"×35"; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 380x.
UGC 3661	gx	07h19m46s	+85°46.0'		Cep	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina subito a SW.
UGC 3665	gx	07h07m59s	+71°33.3'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto allungata da E a W, di dimensioni 50"×20" e con tenuissimo bulge appena percettibile a 380x; c'è una stellina a 1' verso N.
UGC 3667	gx	07h06m21s	+39°10.3'		Aur	28"	m. buona / discreto	è una sorta di debolissimo alone oblungo esteso una 40-ina di secondi che si diparte da una stellina brillante in direzione grosso modo E-W — 495x.
UGC 3668	gx	07h10m45s	+80°58.3'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima, quasi elusiva, appare a tratti in visione distolta a poco più di 1' W di una coppia di stelline brillanti distanti una 30-ina di secondi (altre 2 coppie si trovano a N e a SE); la gx dovrebbe essere rotonda con Ø di ~ 30"; meglio visibile a 380x.
UGC 3670	gx	07h20m00s	+85°35.3'		Cep	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
UGC 3673	gx	07h07m01s	+44°51.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 3675	gx	07h10m24s	+74°53.5'		Cam	24"	buona / ottimo	è un debolissimo filo di luce esteso per oltre 1' in direzione N-S; appare senza difficoltà a 450x, ma è meglio non scalare a ingrandimenti inferiori.
UGC 3676	gx	07h06m40s	+23°53.6'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
UGC 3678	gx	07h06m48s	+19°23.0'		Gem	24"	ottima / discreto	debole chiazza rotondeggiante molto diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di 45"; c'è una stellina quasi a ridosso NE; poco meglio evidente scalando a 340x.
UGC 3679	gx	07h07m28s	+44°47.4'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; situata tra due stelline distanti 1.5' in direzione NE-SW — 450x.
UGC 3683	gx	07h08m14s	+46°07.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	presenta un piccolo bulge brillante, esteso 15"-20" circonfuso da un disco molto diffuso che in visione distolta appare di dimensioni 60"×45" e orientato da N a S; c'è una stellina a ridosso W; più interessante scalando a 340x.
UGC 3684	gx	07h08m24s	+51°14.1'		Lyn	16"	ottima / m. buono	è una debole lama di luce facilmente visibile in visione distolta a 380x, estesa almeno 1' e orientata da NW a SE; è di luminosità uniforme salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile solo a tratti.
UGC 3685	gx	07h09m05s	+61°35.7'	q 21	Lyn	16"	m. buona / m. buono	è una chiazza circolare estesa per ~ 1'.5, con i bordi molto sfumati; presenta un nucleo piccolo, poco più brillante dell'alone, ben evidente anche in visione diretta; c'è una stellina doppia stretta a ridosso verso WSW — 270x.
UGC 3691	gx	07h08m02s	+15°10.8'		Gem	16"	m. buona / scarso	è un debolissimo lucore di dimensioni 80"×40", orientato da NE a SW e situato a ridosso verso S di una coppia di stelline brillanti; un'altra debole stellina si trova al margine meridionale della gx; l'allungamento tuttavia si nota bene solo scalando a 132x; a 270x è di aspetto quasi circolare.
UGC 3692	gx	07h08m30s	+29°52.7'		Gem	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, a tratti poco più brillante all'interno — 380x.
UGC 3694	gx	07h08m36s	+32°40.9'		Gem	16"	ottima / buono	è un'elusiva galassietta diffusa, estesa una 30-ina di secondi e visibile solo a momenti in visione distolta — 270x.
UGC 3696	gx	07h09m23s	+48°38.1'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto diffusa, allungata da E a W di dimensioni 50"×25" e con piccolo bulge brillante e rotondo; c'è una stellina a ridosso SE (fa parte dell'ammasso **AGC 569**) — 495x.
UGC 3697	gx	07h11m21s	+71°50.2'	q 21	Cam	24"	m. buona / m. buono	è una galassia filiforme orientata da E a W, estesa per 2.5' e di luminosità uniforme; nella parte occidentale si nota, in visione distolta, un piccolo e debolissimo segmento esteso una 30-ina di secondi che pare innestarsi sul corpo principale a circa 120°, ossia in direzione NW-SE; c'è una stellina subito all'esterno della galassia verso ENE e un'altra molto debole a ridosso verso SW — 450x.
UGC 3701	gx	07h11m43s	+72°10.2'		Cam	16"	ottima / buono	è una debolissima chiazza lattiginosa, di forma indistinta ed estremamente diffusa, situata all'interno di un triangolo equilatero coi lati di ~ 3'; c'è l'impressione che appaia meglio scalando a 188x.
UGC 3702	gx	07h09m10s	+28°41.7'		Gem	24"	m. buona / buono	debolissimo lucore rotondeggiante, esteso una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso S di una stellina (che fa parte di un minuscolo triangolo rettangolo) — 450x.
UGC 3703	gx	07h09m21s	+36°17.1'		Aur	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 1'; appare poco più contrastata scalando a 188x.
UGC 3704	gx	07h10m31s	+61°47.2'		Lyn	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×30", con bulge evidente e nucleo stellare — 380x.
UGC 3705	gx	07h12m11s	+73°28.3'		Cam	24"	buona / buono	è una debole chiazza molto diffusa e poco contrastata sul fondo cielo e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina brillante a ridosso N — 450x.
UGC 3706	gx	07h09m55s	+47°54.5'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **MCG+8-13-84** situata a ridosso NW — si separano a fatica anche a 450x, molto deboli e di luminosità uniforme; la UGC è grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la MCG appare come un baffo di luce molto tenue, orientato da N a S ed esteso una 40-ina di secondi.
UGC 3707	gx	07h09m03s	+06°55.7'		CMi	24"	ottima / m. buono	debole chiazza molto diffusa immersa in un campo molto ricco, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; un piccolo asterismo di 7 stelline si trova subito a N.
UGC 3710	gx	07h09m32s	+29°39.6'		Gem	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina subito a W — 450x.
UGC 3714	gx	07h12m33s	+71°45.1'		Cam	24"	m. buona / m. buono	facile, rotonda con Ø di almeno 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; appare debolmente screziata a 450x (situata 7.5' a SE di UGC 3697).
UGC 3715	gx	07h25m18s	+86°12.7'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 3716	gx	07h10m36s	+39°44.8'		Aur	20"	m. buona / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta a ~ 1' N di UGC 3718; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 360x.
UGC 3717	gx	07h13m14s	+73°50.6'		Cam	16"	ottima / buono	è una gx a luminanza superficiale molto bassa, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 90"×40" — 380x.
UGC 3718	gx	07h10m39s	+39°43.5'		Aur	20"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione stellare — 360x.
UGC 3719	gx	07h11m01s	+48°30.7'		Lyn	28"	m. buona / discreto	diffusa e poco più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina a 1' scarso NW — 495x.
UGC 3723	gx	07h10m42s	+34°25.2'		Cam	16"	m. buona / ottimo	è allungata da N a S con dimensioni 50"×30"; presenta un bulge contrastato sul disco e un nucleo stellare — 380x.
UGC 3724	gx	07h11m28s	+48°14.4'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N — 450x.
UGC 3725	gx	07h11m41s	+49°51.7'		Lyn	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo W — 495x.
UGC 3726	gx	07h11m07s	+25°54.9'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso NE e una più debole a NW — 380x.
UGC 3729	gx	07h11m44s	+39°34.2'		Aur	20"	m. buona / buono	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; più che altro molto disturbata dalla SAO 59870 di 9ª grandezza situata quasi a ridosso S — 360x.
UGC 3730	gx	07h14m21s	+73°28.7'	q 7	Cam	24"	buona / ottimo	è di aspetto vagamente cometario, meglio contrastata scalando a 340x; presenta una piccola zona relativamente brillante verso N, di circa 30"×20", con all'interno un nucleo stellare evidente, mentre verso S si stempera a ventaglio per ~ 1'; c'è una stellina quasi a ridosso NW.
UGC 3731	gx	07h11m38s	+29°10.1'		Gem	16"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N e un'altra più debole 1' a E — 380x.
UGC 3738	gx	07h12m15s	+07°14.5'		CMi	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, disturbata, da una stellina brillante situata a 1' verso E; è orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; più che altro sembra incastonata tra una doppia stretta a NE e una stellina più debole a SW (altre due stelline molto deboli si trovano a ridosso W e NW) — 450x .
UGC 3741	gx	07h13m47s	+50°15.4'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debolissima, osservabile solo in visione distolta; a tratti pare orientata da NE a SW (ossia a perpendicolo con le 3 stelline allineate di luminosità diseguale situate a SE) con dimensioni grosso modo 45"×30" — 380x.
UGC 3742	gx	07h13m28s	+35°05.8'		Cam	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto allungata da E a W, con dimensioni 90"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso verso E — 380x.
UGC 3745	gx	07h13m27s	+27°30.9'		Gem	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di max 30" di Ø e di luminosità uniforme; salta fuori in visione distolta a 380x quando si osserva la doppia situata subito a SE (con componenti disuguali); c'è una stellina appena percettibile a ridosso di NW.
UGC 3752	gx	07h14m04s	+35°16.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con piccolo bulge molto marcato; c'è una stellina brillante subito a S e un'altra a 1' verso ENE; una stellina molto debole si trova a ridosso W — 450x.
UGC 3753	gx	07h13m56s	+23°14.4'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 3755	gx	07h13m52s	+10°31.3'		CMi	16"	m. buona / scarso	debolissimo lucore di 60"×40", orientato da N a S, ma l'allungamento si nota solo scalando a 132x; c'è una stellina a ridosso verso W.
UGC 3756	gx	07h14m22s	+35°24.0'		Aur	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a S e una coppia a 1' SE — 450x.
UGC 3758	gx	07h15m04s	+50°32.1'		Lyn	16"	ottima / buono	relativamente brillante, presenta un piccolo bulge con nucleo stellare visibile a tratti circonfuso da un alone rotondo con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile, a 380x, quasi a ridosso verso SW.
UGC 3760	gx	07h14m22s	+05°04.9'		CMi	24"	buona / m. buono	oggetto forse rotondo, poco diffuso e di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 2 stelline ai margini N ed E che ne confondono un po' la forma — 400x.
UGC 3762	gx	07h17m58s	+73°52.0'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 3765	gx	07h16m02s	+56°49.1'		Lyn	24"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE — 450x.
UGC 3766	gx	07h14m50s	+16°58.9'		Gem	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE, dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina appena percettibile a ridosso quasi SW — 450x.
UGC 3768	gx	07h14m54s	+06°35.8'		CMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; un poco disturbata dalla SAO 115136 di 9ª grandezza situata a 1' scarso E; a 3' verso N c'è un piccolo gruppo di stelle che si evidenzia dal fondo cielo, costituito da una dozzina di componenti fra cui una doppia abbastanza stretta; è di forma triangolare e visualmente ricorda la Sicilia — 450x.
UGC 3771	gx	07h17m53s	+70°31.2'		Cam	16"	ottima / m. buono	debolissima, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante al margine NE — 270x.
UGC 3772	gx	07h15m35s	+15°08.6'		Gem	16"	m. buona / scarso	è una sorta di piccolo alone asimmetrico che sembra aggettare verso W da una stellina; bisogna effettuare un confronto con la stellina situata 45" a N, di luminosità simile, che ne è priva; a tratti la stellina a S pare doppia, come se la gx avesse un nucleo stellare — 270x.
UGC 3774	gx	07h16m14s	+32°56.3'		Gem	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge visibile a tratti a 380x.
UGC 3776	gx	07h16m39s	+33°59.3'		Gem	16"	m. buona / ottimo	debole, ma facilmente visibile in visione distolta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 45" SE — 380x.
UGC 3777	gx	07h16m43s	+29°51.3'		Gem	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa almeno 1'; c'è una stellina brillante a ridosso verso W che disturba; meglio visibile a 380x.
UGC 3779	gx	07h17m32s	+33°58.5'		Gem	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da E a W e che in visione distolta appare estesa per ~ 1'; c'è una stellina evidente al bordo S situata grosso modo nel mezzo della lunghezza — 450x.
UGC 3780	gx	07h17m28s	+34°04.7'		Gem	16"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce, tuttavia relativamente facile da vedere in visione distolta a 380x; è orientata come UGC 3779, ma estesa max 60" (non sono riuscito a vedere UGC 3779).
UGC 3781	gx	07h17m59s	+40°59.2'		Aur	20"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (c'è una stellina a 1' scarso NNW non riportata sul Megastar); una stellina percettibile solo a momenti si trova al bordo S; la visione è comunque disturbata dalla SAO 41670 di 7ª grandezza situata 4' a SW — 360x.
UGC 3785	gx	07h17m46s	+07°57.2'		CMi	16"	m. buona / scarso	debole, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 270x.
UGC 3787	gx	07h17m57s	+09°41.3'		CMi	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina subito a S e un'altra appena percettibile quasi a ridosso verso NE — 450x.
UGC 3788	gx	07h18m26s	+31°33.6'		Gem	16"	m. buona / m. buono	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" (a prima vista sembrava una lama di luce); c'è una stellina al bordo N; meglio visibile a 380x.
UGC 3789	gx	07h19m31s	+59°21.4'		Lyn	16"	ottima / mediocre	gx facile, ad alto gradiente e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; presenta un nucleo puntiforme visibile a 270x (purtroppo il seeing non permette di spingere di più).
UGC 3791	gx	07h18m32s	+27°09.4'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15" e con un tenue bulge appena accennato; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo W — 450x.
UGC 3792	gx	07h19m18s	+51°17.6'		Lyn	16"	ottima / buono	è una gx stranamente facile (per essere una UGC!), poco allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×45", molto diffusa e con piccolo bulge abbastanza contrastato sul disco; meglio evidente scalando a 270x.
UGC 3799	gx	07h20m06s	+53°00.6'		Lyn	16"	m. buona / buono	è un diffuso lucore molto debole e di luminosità uniforme, rotondo con Ø di ~ 1' — 380x.
UGC 3800	gx	07h20m27s	+56°23.4'		Lyn	16"	ottima / buono	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di 20"-25" di Ø e di luminosità uniforme; ci sono 2 stelline, una a ridosso N e l'altra a E; un'altra stellina percettibile solo a tratti si trova a SW — 380x.
UGC 3802	gx	07h19m47s	+30°54.9'		Gem	24"	m. buona / buono	debole lama di luce estesa 1' in direzione N-S con piccolo bulge evidente; una stellina percettibile a momenti appare a ridosso E; c'è una stellina brillante subito a SW (che in realtà è una doppia stretta estremamente sbilanciata) — 450x.
UGC 3803	gx	07h19m58s	+22°05.5'		Gem	16"	ottima / ottimo	debolissima, rotonda e di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi; è disturbata dalla luce intensa di δ Geminorum anche se a 380x si riesce a tenere la stella fuori campo.
UGC 3804	gx	07h22m35s	+71°36.0'		Cam	16"	m. buona / ottimo	è una chiazza facile da vedere, ma con bassissimo gradiente, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 80"×50" — 380x.
UGC 3805	gx	07h20m00s	+17°56.8'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 30" verso N — 380x.
UGC 3806	gx	07h20m23s	+22°54.4'		Gem	16"	ottima / ottimo	è una gx elusiva che appare a tratti in visione distolta a ~ 1' N di una stellina, ma occorre scalare a 270x; non sembra comunque più estesa di 30".
UGC 3810	gx	07h21m52s	+46°50.6'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW; situata sul lato occidentale di un triangolo di stelline molto allungato da N a S — 450x.
UGC 3811	gx	07h21m43s	+35°44.3'		Aur	16"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, sembra aggettare verso SE da una stellina; a 270x non sembra più estesa di 30".
UGC 3812	gx	07h22m19s	+49°17.5'		Lyn	16"	buona / m. buono	debole, molto diffusa, con una piccola zona interna poco più brillante; è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 3813	gx	07h21m27s	+13°15.8'		Gem	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa e di forma indistinta; solo a momenti appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 3816	gx	07h23m12s	+58°03.9'		Lyn	16"	ottima / buono	relativamente facile e brillante, presenta un piccolo bulge ben contrastato circonfuso da un alone di 45"×30" e orientato ~ da E a W; c'è una stellina a ridosso verso N; più interessante a 380x.
UGC 3818	gx	07h22m47s	+41°39.5'		Aur	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a ridosso N e una abbastanza brillante a 1.5' NE — 495x.
UGC 3820	gx	07h22m20s	+17°17.3'		Gem	24"	m. buona / buono	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da E a W estesa per almeno 1', poco più stemperata alle estremità E e W — 450x.
UGC 3822	gx	07h23m13s	+37°27.6'		Aur	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, (una condensazione centrale appena percettibile appare di fatto solo a momenti), allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina molto debole a ridosso S — 450x.
UGC 3823	gx	07h22m48s	+18°55.6'		Gem	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x quasi a ridosso verso E di una stellina abbastanza brillante; è allungata da E a W con dimensioni 40"×20".
UGC 3824	gx	07h22m51s	+22°35.3'		Gem	16"	ottima / ottimo	facile, relativamente brillante, rotonda, Ø 30", poco più brillante all'interno e con nucleo quasi stellare — 380x.
UGC 3825	gx	07h23m33s	+41°26.1'		Aur	20"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W e una debole alla stessa distanza verso SW — 360x.
UGC 3826	gx	07h24m28s	+61°41.7'	q 21	Cam	16"	m. buona / mediocre	lucore molto debole, ovaleggiante, di dimensioni 60"×45", orientato grosso modo da E a W, con una stellina molto debole quasi a ridosso verso NW — 270x.
UGC 3827	gx	07h23m07s	+22°12.5'		Gem	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo abbastanza compatto con Ø di 20"; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
UGC 3828	gx	07h24m36s	+57°58.1'		Lyn	16"	ottima / buono	anche questa è incredibilmente facile, rotonda con Ø > 1', diffusa e con alto gradiente; è più interessante a 270x.
UGC 3829	gx	07h23m44s	+33°26.5'		Gem	16"	m. buona / ottimo	presenta un brillante nucleo stellare circonfuso da un tenue alone molto stemperato; approssim. rotonda con Ø di ~ 45" — 380x.
UGC 3830	gx	07h23m31s	+02°36.9'		CMi	24"	buona / m. buono	lama di luce orientata da WNW a ESE ed estesa almeno 1'; presenta un tenue bulge poco contrastato visibile ad alti ingrandimenti; c'è una stellina al bordo NNW — 570x.
UGC 3831	gx	07h25m00s	+49°29.5'		Lyn	16"	buona / m. buono	debole chiazza circolare di luminosità uniforme e a bassissimo gradiente, facilmente visibile in visione distolta a 380x; c'è una coppia di stelline a N.
UGC 3832	gx	07h25m14s	+53°26.7'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, orientata ~ da E a W (ossia come le 2 stelline situate 3' a N) e di dimensioni 60"×30"; meglio definita a 270x.
UGC 3837	gx	07h25m34s	+36°41.2'		Aur	16"	m. buona / m. buono	debolissima, solo a tratti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 45"×30" — 270x.
UGC 3838	gx	07h28m12s	+72°34.5'		Cam	16"	ottima / buono	allungata da N a S, di dimensioni 50"×30" con condensazione centrale percettibile solo a tratti; è situata tra 2 stelline brillanti orientate da N a S e distanti un paio di primi — 380x.
UGC 3839	gx	07h25m10s	+09°31.0'		CMi	16"	m. buona / scarso	debole, rotonda, diffusa, con Ø di 45" e con condensazione centrale quasi stellare visibile a 270x.
UGC 3840	gx	07h25m21s	+19°10.7'		Gem	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, con Ø di 40" e con nucleo stellare abbastanza brillante; c'è una stellina a ridosso verso NW — 380x.
UGC 3842	gx	07h25m37s	+19°07.6'		Gem	16"	ottima / ottimo	più debole di UGC 3840 — osservata subito prima e dalla quale dista 5' verso SE — poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare facilmente visibile a 380x.
UGC 3844	gx	07h26m35s	+43°17.8'		Aur	16"	buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e con evidente condensazione centrale, rotonda con Ø di ~ 45"; 380x per tenere fuori campo la SAO 41772 di magnitudo 6.7.
UGC 3845	gx	07h26m43s	+47°05.6'		Lyn	16"	buona / m. buono	debolissima, appena più contrastata del fondo cielo; a 270x, in visione distolta, appare orientata da N a S con dimensioni ~ 60"×30" (o 60"×40", difficile stabilirlo).
UGC 3849	gx	07h26m41s	+37°23.5'		Aur	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con **MAC 0726+3723** situata a ridosso S — 450x.
UGC 3850	gx	07h28m15s	+63°15.5'		Cam	16"	m. buona / ottimo	appare un bulge relativamente brillante, rotondo con Ø di 25"30", un nucleo stellare visibile a 380x; l'alone, tuttavia, si riesce soltanto a intuire a 270x.
UGC 3855	gx	07h28m13s	+58°30.5'		Lyn	16"	ottima / buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", con bulge tenue e diffuso, ma visibile abbastanza chiaramente a 380x; la gx, in sé, è relativamente facile, ma è purtroppo disturbata dalla luce di una stella brillante situata a ridosso di NW.
UGC 3858	gx	07h30m46s	+73°37.8'		Cam	16"	ottima / buono	più debole di UGC 3859, situata 4.5' più a N; presenta un piccolo nucleo quasi stellare circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di ~ 1' — 380x.
UGC 3859	gx	07h30m49s	+73°42.4'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente facile e con alto gradiente di luce, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40", con piccola e marcata condensazione centrale — 380x.
UGC 3860	gx	07h28m17s	+40°46.2'		Aur	20"	m. buona / buono	è un elusivo e indistinto lucore allineato con 2 deboli stelline a S e una più brillante a N; non dovrebbe essere più estesa di 30" — 360x.
UGC 3862	gx	07h27m48s	+20°23.9'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 3863	gx	07h28m54s	+49°08.3'		Lyn	16"	buona / m. buono	rotonda, molto diffusa, con Ø < 1' e con tenue condensazione centrale puntiforme osservabile a tratti in visione distolta a 380x; c'è una stellina a 1' verso NE.
UGC 3864	gx	07h30m57s	+72°31.0'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima, diffusa, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta; è allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; ci sono 2 stelline debolissime al bordo NE distanti 15"20" e orientate da N a S — 380x.
UGC 3866	gx	07h28m37s	+30°55.8'		Gem	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' scarso; poco disturbata da una stellina brillante a ridosso E — 450x.
UGC 3869	gx	07h28m39s	+24°28.8'		Gem	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una doppia stretta quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 3871	gx	07h29m17s	+42°16.8'		Aur	20"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso E — 360x.
UGC 3873	gx	07h28m54s	+20°35.5'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30"; presenta un tenue bulge diffuso, ma bisogna scalare a 270x (a 380x sembra di aspetto più uniforme).
UGC 3874	gx	07h29m05s	+26°55.0'		Gem	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, ma molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e con nucleo quasi stellare — 380x.
UGC 3875	gx	07h29m50s	+52°48.5'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole e con bassissima luminanza superficiale, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 1'; meglio visibile a 270x.
UGC 3876	gx	07h29m18s	+27°54.0'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; meglio scalare a 270x, anche se è più difficile tener fuori campo la SAO 79434 di 5ª di color arancione).
UGC 3877	gx	07h29m17s	+14°25.2'		Gem	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile anche se molto disturbata dalla luce di una coppia di stelle brillanti a S; è poco allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare — 380x.
UGC 3878	gx	07h32m23s	+72°54.5'		Cam	16"	ottima / m. buono	debolissima, appare solo a tratti a 380x a metà strada tra un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato ad aquilone e una coppia di stelline brillanti distanti 1'; non è comunque estesa più di 30".
UGC 3879	gx	07h29m44s	+33°41.4'		Gem	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce che solo a tratti in visione distolta appare allungata da E a W per oltre 1'; non riesco a capire se a ridosso c'è una debolissima stellina o una lieve discrepanza di luce — 270x.
UGC 3885	gx	07h31m07s	+59°28.9'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme e aspetto lattiginoso, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è un piccolo arco di 3 stelline a poco più di 1' verso N; una stellina molto debole si trova invece quasi a ridosso dalla parte opposta — 380x.
UGC 3888	gx	07h30m54s	+39°01.2'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina a ridosso S e una più debole al margine NE — 495x.
UGC 3889	gx	07h33m56s	+73°38.6'		Cam	16"	ottima / buono	debole ovale di luminosità pressoché uniforme, allungato da E a W con dimensioni 40"×20"; è situata a E di una coppia di stelline brillanti — 380x.
UGC 3892	gx	07h31m10s	+13°03.6'		Gem	24"	m. buona / buono	molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina subito a W — 450x.
UGC 3893	gx	07h32m56s	+64°59.5'		Cam	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
UGC 3894	gx	07h32m56s	+64°59.5'		Cam	16"	m. buona / ottimo	rotonda, con basso gradiente, nucleo stellare, poco diffusa, Ø 40"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 380x.
UGC 3897	gx	07h33m20s	+59°37.5'		Lyn	16"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, di luminosità pressoché uniforme (qualche lieve discrepanza di luce all'interno si nota solo a tratti a 380x), allungata da ENE a WSW (ossia a perpendicolo con le 2 stelline brillanti situate a E e distanti 1') e di dimensioni 60"×30".
UGC 3898	gx	07h33m47s	+65°26.7'		Cam	16"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta, rotonda, con condensazione centrale osservabile a tratti e con Ø di 25"-30" — 380x.
UGC 3899	gx	07h32m38s	+35°36.9'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una coppia di stelline subito a W; una stellina debole si trova a 1' NE; meglio visibile a 450x, se non altro per tenere fuori campo la SAO 60152 di 7a grandezza situata 7.5' a W.
UGC 3900	gx	07h32m28s	+10°54.3'		CMi	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma osservabile senza problemi a 380x anche in visione diretta; è rotonda con Ø di ~ 1' e appena più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso W.
UGC 3901	gx	07h33m53s	+49°17.5'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso SW — 495x.
UGC 3903	gx	07h33m09s	+19°12.0'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma a 380x appare chiaramente allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", con piccolo bulge appena allungato nella stessa direzione; c'è una stellina quasi a ridosso verso N.
UGC 3904	gx	07h33m31s	+30°33.8'		Gem	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di 25"-30"; presenta un brillante nucleo quasi stellare; c'è una stellina a ~ 1' verso S — 380x.
UGC 3905	gx	07h34m49s	+62°32.8'		Cam	16"	m. buona / ottimo	debole oggetto rotondo con Ø di 40", poco diffuso e di luminosità uniforme; salta fuori facilmente in visione distolta a 380x a 1' SE di una stellina brillante — 380x.
UGC 3906	gx	07h36m37s	+74°26.7'		Cam	16"	ottima / m. buono	piccola galassietta al limite della visibilità, estesa non più di 30" e con tenuissimo nucleo stellare; salta fuori a tratti a 380x; tuttavia appare per prima la **KUG 730+745B** situata a ridosso verso NE: è debolissima, ma in visione distolta è chiaramente allungata da N a S per una 40-ina di secondi.
UGC 3907	gx	07h33m53s	+37°01.6'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 3909	gx	07h36m59s	+73°42.8'		Cam	16"	ottima / m. buono	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme che in visione distolta appare estesa per oltre 1' e che sembra dipartirsi verso W da una stellina brillante — 380x.
UGC 3911	gx	07h34m07s	+23°05.7'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole, approssim. rotonda con Ø di 30"-35", diffusa e nucleo stellare appena percettibile a 270x (a 380x si nota meno).
UGC 3912	gx	07h34m13s	+04°32.8'	q 229	CMi	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina verso il margine NW — 270x.
UGC 3913	gx	07h34m51s	+33°32.2'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma più che altro disturbata da una coppia di stelle brillanti situate 3' a N e NW; in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×15"; c'è una stellina subito a W — 450x.
UGC 3920	gx	07h35m19s	+19°02.7'		Gem	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo molto debole con Ø max di 30" e appena condensato, situato a ridosso SE di una stellina brillante — 380x.
UGC 3923	gx	07h36m48s	+55°19.3'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo con condensazione centrale visibile a tratti a 380x e con Ø di ~ 30"; c'è una stellina a 1' SE.
UGC 3924	gx	07h35m38s	+11°31.3'		CMi	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente quasi a ridosso S di una stellina molto debole; è di aspetto confuso, estesa forse 30"; poco meglio evidente scalando a 340x.
UGC 3928	gx	07h37m42s	+59°18.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, con bulge appena più contrastato del disco, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 3929	gx	07h39m55s	+75°25.5'		Cam	16"	ottima / m. buono	piccola, rotonda, poco diffusa, con Ø di ~ 30" e condensazione centrale puntiforme; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
UGC 3932	gx	07h37m03s	+22°21.1'		Gem	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme; in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 380x.
UGC 3933	gx	07h37m37s	+41°56.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, estesa ~ 1'; è situata tra una stellina brillante a SE e un piccolo triangolo serrato a NW; c'è altresì una stellina al bordo meridionale appena percettibile a 380x.
UGC 3936	gx	07h37m03s	+13°36.1'		Gem	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 1' — 380x.
UGC 3937	gx	07h37m35s	+35°36.3'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, debolmente screziata a 450x, allungata da N a S con dimensioni 70"×35"; c'è una stellina a poco più di 1' N e una debole alla stessa distanza verso SSE — 450x.
UGC 3938	gx	07h37m09s	+09°54.6'		CMi	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza di luminosità uniforme e molto stemperata sul fondo cielo, estesa per ~ 1'; si riesce a intravedere in visione distolta a 380x.
UGC 3939	gx	07h37m20s	+19°58.5'		Gem	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 3941	gx	07h37m27s	+14°04.7'		Gem	24"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce che in visione distolta appare orientata da E a W ed estesa per 1'; meglio comunque non scendere sotto i 450x; allineata ed equidistante con 2 stelline a S; c'è una stellina molto debole a ridosso verso N.
UGC 3942	gx	07h37m47s	+27°02.2'		Gem	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso SE — 450x.
UGC 3943	gx	07h39m11s	+59°09.7'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	è debolissima, ma appare senza problemi in visione distolta a 380x, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30".
UGC 3944	gx	07h26m35s	+43°17.8'		Aur	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 270x.
UGC 3945	gx	07h40m26s	+69°03.5'		Cam	16"	ottima / ottimo	debolissimo ovale di ~ 30"×20", orientata da N a S e di luminosità uniforme; c'è una stellina a < 1' verso NW — 380x.
UGC 3946	gx	07h38m00s	+03°19.0'	q 229	CMi	16"	ottima / buono	molto debole e pochissimo contrastata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina debolissima visibile a tratti al margine orientale; un'altra più brillante si trova al bordo S — 270x.
UGC 3948	gx	07h39m50s	+54°19.5'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra 2 stelline: una abbastanza brillante a 1' S e una più debole alla stessa distanza verso N — 495x.
UGC 3949	gx	07h39m46s	+48°44.5'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza rotondeggiante di 1' scarso di Ø e di luminosità uniforme; appare in visione distolta a 270x a 1' SW di una stellina.
UGC 3950	gx	07h38m44s	+02°13.0'		CMi	16"	ottima / buono	compatta e molto piccola, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; è situata in un campo molto ricco di stelle — 270x.
UGC 3953	gx	07h40m23s	+57°53.2'		Lyn	16"	ottima / buono	approssim. rotonda, del Ø di ~ 45" e con nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina doppia stretta a poco più di 1' verso E — 380x.
UGC 3955	gx	07h39m25s	+08°53.9'		CMi	24"	ottima / discreto	è una debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa per circa 1'; salta fuori abbastanza facilmente quando si fissa la debole stellina situata subito a N; meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 3957	gx	07h40m58s	+55°25.7'		Lyn	28"	buona / buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo S e una a ridosso NE; una brillante, in realtà una doppia fortemente sbilanciata, si trova 1.5' a S — 495x.
UGC 3960	gx	07h40m23s	+23°16.5'		Gem	16"	ottima / ottimo	debole, ma abbastanza facile da vedere a 380x, rotonda diffusa, con Ø di 30"-35" e poco più brillante all'interno.
UGC 3961	gx	07h41m13s	+47°40.3'		Lyn	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
UGC 3962	gx	07h40m30s	+13°52.3'		CMi	16"	ottima / buono	in visione distolta a 380x appare allungata da NW a SE, di dimensioni ~ 2'×1', con tenue bulge diffuso e poco contrastato sul disco; c'è una stellina a ridosso NW e un'altra più debole a ridosso verso E.
UGC 3964	gx	07h40m18s	−01°34.4'	q 229	Mon	16"	ottima / discreto	è un debolissimo lucore molto diffuso, osservabile in visione distolta ed esteso quasi 1.5'; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
UGC 3968	gx	07h42m45s	+66°15.5'		Cam	16"	ottima / m. buono	è debolissima e molto stemperata sul fondo cielo; dovrebbe essere estesa ~ 1.5'; a 380x diviene quasi invisibile, ma in compenso appare chiaramente una stellina all'estremità occidentale — 270x.
UGC 3972	gx	07h44m43s	+73°49.0'		Cam	20"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' SW e una debole a ridosso verso NE. Forma una coppia ravvicinata con MCG+12-8-8B che si però si separa solo a momenti a ridosso N — 360x.
UGC 3973	gx	07h42m33s	+49°48.6'	q 69	Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa, rotonda, con Ø 45"; non si capisce se ha un nucleo brillante puntiforme o una stellina sovrapposta esattamente nel centro — 270x.
UGC 3974	gx	07h41m54s	+16°48.0'		Gem	24"	ottima / m. buono	è una debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo osservabile scalando a 210x (a 340x s'intravvede, ma è ancora più confusa); a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 2'×1'

UGC 3975	gx	07h45m00s	+72°48.7'	q 7	Cam	16"	m. buona / mediocre	debolissima, visibile con molta difficoltà in visione distolta come una piccola macchia di forma e dimensioni un poco irregolari — 270x.
UGC 3976	gx	07h42m41s	+40°55.8'		Lyn	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo: la componente di NW è la più brillante — 495x.
UGC 3978	gx	07h43m55s	+62°04.3'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 40"; presenta un piccolo nucleo di aspetto stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 3979	gx	07h44m31s	+67°16.4'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'×30" — 270x.
UGC 3980	gx	07h42m44s	+18°19.7'		Gem	24"	ottima / discreto	lama di luce molto debole orientata da N a S ed estesa 1' scarso, con nucleo stellare appena percettibile; è situata subito a E di una coppia di stelline abbastanza brillanti — 450x.
UGC 3981	gx	07h43m53s	+56°59.3'		Lyn	16"	ottima / m. buono	presenta un nucleo marcato di aspetto quasi stellare circonfuso da un tenue alone di ~ 60"×30" e orientato da E a W — 380x.
UGC 3984	gx	07h45m14s	+70°02.0'		Cam	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina a ridosso del margine occidentale; questa fa parte di un piccolo asterismo di 7 stelle che delineano una sorta di "pentola" o "pignatta" — 380x.
UGC 3990	gx	07h44m24s	+40°20.6'		Lyn	20"	buona / buono	è un elusivo baffo di luce orientato da N a S che salta fuori solo a momenti; non dovrebbe essere più esteso di 30" — 360x.
UGC 3991	gx	07h45m35s	+65°45.6'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' SW — 380x.
UGC 3993	gx	07h55m45s	+84°55.6'		Cep	24"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una doppia stretta dalle componenti sbilanciate a 1' verso E — 450x.
UGC 3995	gx	07h44m08s	+29°14.9'		Gem	16"	m. buona / ottimo	presenta un bulge abbastanza brillante e diffuso e un tenue alone assai stemperato sul fondo cielo; la gx è orientata da E a W con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
UGC 3997	gx	07h44m39s	+40°22.0'		Lyn	20"	buona / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare a tratti grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N — 360x.
UGC 4000	gx	07h45m07s	+46°04.3'		Lyn	20"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 360x.
UGC 4001	gx	07h52m37s	+73°30.2'		Cam	16"	m. buona / ottimo	piccola, debole, rotonda, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme e con Ø max di 30" — 380x.
UGC 4003	gx	07h46m29s	+58°57.7'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte assieme a UGC 4012 e a UGC 4020 di un terzetto di gx molto deboli — questa è allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" con piccolo bulge diffuso visibile a 270x.
UGC 4005	gx	07h45m11s	+07°56.0'		CMi	24"	buona / buono	molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" e piccolo bulge diffuso appena percettibile; è disturbata dalla luce di una stella brillante situata a ridosso verso W (subito a S di questa stella ce n'è una debolissima) — 450x.
UGC 4006	gx	07h45m14s	+11°03.8'		CMi	24"	buona / buono	diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è un asterismo vagamente foggiato a "V" a circa 8' NE col vertice che punta a N (occupato da una stella brillante) — 450x.
UGC 4007	gx	07h45m25s	+48°20.0'		Lyn	20"	buona / buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; situata tra una coppia di stelline abbastanza brillanti e una debole a S — 360x.
UGC 4008	gx	07h46m38s	+44°47.5'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debole oggetto diffuso; con nucleo stellare; a 380x appare allungato da N a S con dimensioni 30"×20"; stellina quasi a ridosso verso N; situata in mezzo a 2 stelline brillanti distanti 6' e orientate da ENE a WSW — 380x.
UGC 4010	gx	07h45m45s	+04°58.9'		CMi	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 400x.
UGC 4012	gx	07h47m21s	+59°01.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	altra gx molto debole, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 4013	gx	07h47m29s	+60°56.0'		Cam	16"	m. buona / buono	debole, ma facilmente visibile, allungata da NW a SE, di luminosità leggermente irregolare, diffusa e con dimensioni 60"×30" — 270x.
UGC 4014	gx	07h49m25s	+74°20.0'		Cam	16"	ottima / buono	piccola galassietta relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" con nucleo molto marcato stellare — 380x.
UGC 4015	gx	07h47m48s	+62°19.4'		Cam	16"	ottima / ottimo	è una debolissima chiazza circolare molto diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un asterismo di 5 stelline foggiato ad aquilone 4' più a N — 380x.
UGC 4018	gx	07h47m02s	+41°32.2'		Lyn	20"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 360x.
UGC 4019	gx	07h48m21s	+66°56.0'		Cam	16"	ottima / ottimo	appare come un alone molto debole di dimensioni 30"×20" e orientato da NW a SE che aggetta lievemente a SW di una stellina brillante — 380x.
UGC 4020	gx	07h47m59s	+59°00.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; la gx è meglio osservabile a 380x.
UGC 4021	gx	07h48m31s	+65°20.2'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme e di aspetto un po" confuso, estesa neanche 1' — 380x.
UGC 4022	gx	07h47m44s	+48°13.4'		Lyn	20"	m. buona / buono	debolissima, in visione distolta appare orientata come UGC 4022 (osservata subito prima) e anch'essa di dimensioni grosso modo 45"×15"; è situata in mezzo a 2 deboli stelline distanti un paio di primi in direzione NE-SW — 360x.
UGC 4023	gx	07h48m44s	+66°11.9'		Cam	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, allungata da NW a SE con dimensioni 70"×30", con tenue bulge diffuso osservabile anche a 270x; a 380x si stempera molto sul fondo cielo.
UGC 4024	gx	07h48m33s	+62°12.4'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×20" e con una stellina a ridosso verso W — 380x.
UGC 4025	gx	07h46m56s	+07°17.7'		CMi	24"	buona / buono	poco diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso NW — 450x.
UGC 4028	gx	07h50m50s	+74°21.5'		Cam	16"	ottima / buono	facile da vedere, ma con gradiente di luce molto basso, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 380x.
UGC 4029	gx	07h48m19s	+34°19.9'		Gem	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce estesa almeno 1.5', orientata da NE a SW con bulge diffuso appena percettibile a 270x; c'è una stellina molto debole a ridosso verso SW.
UGC 4033	gx	07h49m47s	+61°21.3'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 1'; meglio scalare a 270x (a 380x si "spampana" troppo!).
UGC 4035	gx	07h50m08s	+55°23.1'		Lyn	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, rotonda, diffusa, con Ø < 1'; presenta un nucleo evidente di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 4038	gx	07h49m36s	+26°54.3'		Gem	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità a tratti un po' irregolare, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso SE e una più debole e più distante dalla parte opposta — 450x.
UGC 4039	gx	07h49m41s	+29°56.6'		Gem	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole orientata da NW a SE ed estesa 1'; un nucleo stellare appare solo a momenti, come a tratti salta fuori una stellina al bordo N — 450x.
UGC 4041	gx	07h52m37s	+73°30.2'		Cam	16"	ottima / buono	facile, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno c'è una stellina brillante subito a NW — 380x.
UGC 4042	gx	07h50m00s	+30°01.5'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 4043	gx	07h50m46s	+54°21.7'		Lyn	16"	ottima / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme estesa un paio di primi in direzione N-S, più facilmente visibile forzando a 380x.
UGC 4047	gx	07h50m09s	+30°43.9'		Gem	16"	m. buona / ottimo	è una bolla leggermente ovale, di dimensioni 50"×40" orientata da NE a SW e di luminosità pressoché uniforme; situata a ridosso verso W di una stellina relativamente brillante — 380x.
UGC 4048	gx	07h50m01s	+19°34.8'		Gem	24"	m. buona / discreto	è un lucore diffuso molto tenue che solo a momenti appare orientato da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una doppia stretta e sbilanciata a ridosso W; una stellina appena percettibile si trova a ridosso S — 450x.
UGC 4049	gx	07h51m18s	+56°54.6'		Lyn	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni ~ 60"×40" e con nucleo stellare; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N — 380x.
UGC 4050	gx	07h53m00s	+72°02.5'		Cam	16"	ottima / m. buono	debole, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 50"×30" — 380x.
UGC 4051	gx	07h51m18s	+50°10.8'		Lyn	16"	ottima / buono	fa parte assieme a UGC 4052 di un piccolo gruppo abbastanza serrato di 4 gx — queste 2 sono di aspetto simile, piccole, rotonde, di una 30-ina di secondi di Ø e con nucleo stellare abbastanza marcata; a ridosso verso W della 2ª c'è la MCG+8-15-8 che è leggermente più piccola, ma anch'essa con nucleo stellare evidente: si separa facilmente da UGC 4052 a 380x.
UGC 4052	gx	07h51m19s	+50°14.1'		Lyn	16"	ottima / buono	v. **UGC 4051**
UGC 4054	gx	07h50m56s	+23°53.7'		Gem	16"	ottima / ottimo	è una debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa un paio di primi; a 270x appare senza difficoltà un tenue nucleo diffuso abbastanza contrastato.
UGC 4056	gx	07h51m36s	+42°52.8'		Lyn	20"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 360x.
UGC 4057	gx	07h54m05s	+74°23.2'		Cam	16"	ottima / buono	bella, si presenta come la classica spirale vista di ¾ è molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2.5'×1', con bulge contrastato e nucleo stellare; il disco è molto tenue e si apprezza nella sua interezza solo in visione distolta — 380x.
UGC 4059	gx	07h52m36s	+62°32.8'		Cam	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE — 450x.
UGC 4060	gx	07h51m26s	+14°01.2'		Gem	24"	m. buona / ottimo	facile, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante al bordo W; una doppia sbilanciata si trova subito a S — 450x.
UGC 4066	gx	07h56m15s	+78°00.8'	q 7	Cam	16"	m. buona / mediocre	debole lucore di luminosità uniforme approssim. circolare con Ø di 1' scarso; con una stellina evidente a ridosso di SE è riportata sull'Uranometria come **NGC 2366A** — 270x.
UGC 4067	gx	07h54m54s	+72°36.7'		Cam	16"	m. buona / mediocre	molto debole, ma più evidente di UGC 3975; è diffusa, di luminosità uniforme, con un Ø max di 40"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SE — 270x.
UGC 4070	gx	07h53m26s	+50°13.7'		Lyn	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, diffusa, rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina brillante a 1.5' NE — 380x.
UGC 4071	gx	07h53m34s	+51°46.8'		Lyn	16"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di ~ 40" e nucleo stellare visibile a 380x; c'è una stellina brillante un paio di primi a W.
UGC 4074	gx	07h54m19s	+54°15.3'		Lyn	16"	ottima / m. buono	rotonda, a bassa luminanza superficiale, appena più brillante all'interno e con Ø > 1'; meglio visibile a 270x.
UGC 4077	gx	07h53m29s	+14°36.8'		Gem	24"	buona / buono	molto debole e diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 45", meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4078	gx	08h04m29s	+84°38.6'		Cam	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare estesa per almeno 1.5' e orientata da E a W — 450x.
UGC 4079	gx	07h55m06s	+55°42.3'		Lyn	16"	m. buona / buono	piccola, compatta, brillante, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 270x.
UGC 4080	gx	07h56m51s	+73°47.2'		Cam	16"	ottima / buono	presenta una zona centrale abbastanza brillante, un nucleo stellare e un alone diffuso, visibile solo in visione distolta, rotondo con Ø di ~ 1' — 380x.
UGC 4082	gx	07h54m50s	+50°02.3'		Lyn	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa rotonda con Ø < 1' e nucleo di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 4084	gx	07h54m33s	+29°42.6'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa per ~ 1' in direzione NW-SE; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 4085	gx	07h55m19s	+53°19.8'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debole ovale abbastanza compatto e definito, di luminosità uniforme, orientato da NE a SW con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a 1' verso SE — 380x.
UGC 4087	gx	07h55m06s	+43°29.2'		Lyn	28"	ottima / ottimo	è un piccolo lucore molto diffuso che aggetta a W di una stellina brillante per 20"-25"; la stellina in questione fa parte di un asterismo formato da 7 componenti luminose — 495x.
UGC 4089	gx	07h54m21s	+13°44.3'		Gem	24"	ottima / discreto	molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×15" e con piccolo bulge contrastato; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 4090	gx	07h54m32s	+16°48.6'		Gem	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina molto debole a ridosso S; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline brillanti orientata da NNW a SSE (in pratica l'orientamento della gx è forma un angolo di 45° con la congiungente delle 2 stelline) — 450x.
UGC 4092	gx	07h56m01s	+58°25.8'		Lyn	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 70"×30"; bisogna cercar di tenere fuori campo la SAO 26571 di 8ª grandezza situata a 6' NW — 380x.
UGC 4094	gx	07h56m35s	+63°36.5'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 1' e appena più brillante all'interno; c'è una stellina appena percettibile a 380x al bordo meridionale.
UGC 4095	gx	07h56m53s	+66°36.7'		Cam	16"	ottima / m. buono	debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni ~ 60"×30"; c'è una stellina a 1' NE (sul prolungamento dell'asse); questa stellina è facilmente visibile a 380x.
UGC 4098	gx	07h57m21s	+66°26.2'		Cam	16"	ottima / m. buono	appare più cicciotta di UGC 4095 e di aspetto più diffuso, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 380x.
UGC 4099	gx	07h55m49s	+24°42.3'		Gem	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, appena condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" — 380x.
UGC 4102	gx	08h03m50s	+61°20.8'		Cam	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni che in visione distolta sono di 50"×25"; appare tuttavia meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4104	gx	07h57m19s	+58°31.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce estesa per ~ 1' in direzione NE-SW osservabile in visione distolta a 380x; presenta una condensazione centrale visibile a tratti.
UGC 4105	gx	07h56m25s	+27°00.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge poco contrastato — 450x.
UGC 4107	gx	07h57m02s	+49°34.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	è una debole chiazza rotonda di Ø > 1', di luminosità uniforme e a bassa luminanza superficiale; forma un piccolo triangolo con 2 stelle brillanti situate a W — 380x.
UGC 4108	gx	07h57m32s	+59°05.0'		Lyn	28"	m. buona / scarso	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; è allineata ed equidistante con 2 stelline a S; una più debole si trova 1.5' a NE — 388x.
UGC 4109	gx	07h56m17s	+11°39.7'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è una coppia abbastanza serrata di deboli stelline a SW; triangolo irregolare di stelle brillanti subito a N — 450x.
UGC 4115	gx	07h57m02s	−14°23.2'		Cnc	24"	m. buona / mediocre	debolissimo lucore che avviluppa una coppia di stelline stretta e sbilanciata; la chiazza aggetta maggiormente verso W; è grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 4122	gx	07h59m01s	+59°07.0'		Lyn	28"	m. buona / scarso	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S, con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×45"; ha un piccolo bulge quasi stellare; c'è una stellina a ridosso NE — 388x.
UGC 4124	gx	07h59m04s	+59°08.2'		Lyn	28"	m. buona / scarso	situata a poco più di 1' N della precedente, è piccola, debole diffusa e solo a tratti condensata; c'è una stellina subito a S (la stessa della gx precedente) e una debole a 1.5' verso E — 388x
UGC 4128	gx	08h00m13s	+60°17.3'		Cam	16"	discreta / buono	relativamente facile, allungata da NE a SW, con bassissimo gradiente di luce; presenta una zona centrale rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e 2 baffi estesi ~ 1.5' da una parte all'altra (non è riportata sull'Uranometria: situata 25' E di NGC 2460) — 270x.
UGC 4132	gx	07h59m13s	+32°54.9'		Gem	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30"; ha un piccolo bulge molto tenue e diffuso, appena più evidente del disco — 380x.
UGC 4135	gx	07h59m17s	+24°27.1'		Gem	24"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce estesa 1' scarso e orientata da E a W; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 4136	gx	07h59m55s	+47°24.8'		Lyn	20"	m. buona / buono	poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15" e con tenue condensazione centrale; c'è una doppia serrata a 1.5' NW e una stellina debole a 1' scarso NE — 360x.
UGC 4139	gx	07h59m24s	+16°26.3'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	è un debole lucore rotondo di 40"-45" di Ø e luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo con 2 stelline che ne lambiscono i bordi: una abbastanza brillante a W e una più debole a NNW — 380x.
UGC 4144	gx	07h59m27s	+07°26.5'		CMi	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da N a S, estesa una 40-ina di secondi e con condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
UGC 4145	gx	07h59m40s	+15°23.2'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	è una galassietta relativamente brillante e compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×25" e con nucleo puntiforme visibile a tratti — 380x.
UGC 4146	gx	08h01m02s	+59°08.4'		Lyn	28"	m. buona / scarso	è una debolissima lama di luce estesa sì e no una 40-ina di secondi e orientata da NE a SW; c'è una stellina quasi a ridosso N; nonostante il seeing è meglio spingere a 495x.
UGC 4147	gx	07h59m47s	+18°24.1'		Cnc	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×15"; equidistante con due stelline a E e distanti all'incirca come la dimensione della gx — 450x.
UGC 4148	gx	08h00m24s	+42°11.6'		Lyn	28"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S e che in visione distolta appare a tratti estesa per 1.5'; c'è una stellina a ridosso NNE — 495x.
UGC 4151	gx	08h04m19s	+77°49.0'		Cam	16"	m. buona / mediocre	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, diffusa, circolare con Ø > 1'; c'è una stellina al bordo occidentale — 270x.
UGC 4154	gx	08h00m06s	+13°09.1'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 70"×20"; ha un bulge diffuso e appena percettibile; c'è una coppia di stelline sbilanciate a ridosso W; meglio visibile scalando a 340x.
UGC 4159	gx	08h01m51s	+61°24.8'		Cam	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30", poco diffusa; meglio osservabile a 270x.
UGC 4162	gx	08h00m46s	+16°32.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ancorché disturbata dalla SAO 97470 di 7ª grandezza situata 2.5' a N; diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente quasi a ridosso SW — 450x.
UGC 4164	gx	08h02m02s	+56°38.6'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge evidente — 495x.
UGC 4167	gx	08h01m19s	+25°17.4'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta, ma non riesco a capire com'è fatta; forse rotonda con Ø di 30" o 40"; forma una coppia ravvicinata con l'altrettanto debolissima MAC 0801+2518 situata subito a N — 450x.
UGC 4169	gx	08h02m33s	+61°23.3'		Cam	16"	m. buona / ottimo	più diffusa di UGC 4159, dalla quale dista 5' a ESE, è una debole chiazza di dimensioni 80"×40" e di luminosità uniforme orientata da NW a SE; è situata a W di una coppia di stelline brillanti; anche questa è meglio osservabile a 270x.
UGC 4170	gx	08h01m23s	+15°22.2'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, rotonda con Ø di 45" e con nucleo di aspetto quasi stellare; a tratti sembra di vedere, a 380x, un piccolo e tenuissimo baffo che ne si diparte verso E; forma un piccolo triangolo con 2 stelline brillanti situate a quasi a ridosso E e S.
UGC 4171	gx	08h01m31s	+09°42.4'		Cnc	24"	ottima / discreto	è una lama di luce orientata da WNW a ESE ed estesa 1.5', di aspetto regolare e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante al bordo S e che a prima vista sembra proprio al centro della gx — 450x.
UGC 4175	gx	08h01m58s	+15°03.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
UGC 4176	gx	08h02m43s	+40°40.7'		Lyn	20"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×20" — 360x.
UGC 4177	gx	08h02m08s	+07°40.4'		CMi	24"	m. buona / mediocre	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 4183	gx	08h02m21s	+06°52.7'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" con piccolo nucleo visibile a tratti a 380x; c'è una stellina a ridosso verso S e un'altra più brillante a 1' NE.
UGC 4188	gx	08h03m24s	+41°54.9'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; a 380x appare facilmente un piccolo bulge poco più brillante del disco; c'è una stellina a 1' ESE e un'altra debole a 1' scarso verso W.
UGC 4190	gx	08h02m57s	+16°18.0'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge quasi stellare visibile senza difficoltà a 380x.
UGC 4195	gx	08h05m07s	+66°47.0'		Cam	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; c'è un piccolo asterismo di stelline brillanti situato a N e a W — 380x.
UGC 4196	gx	08h04m45s	+61°32.1'		Cam	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e Ø ~ 40"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma bisogna scalare a 270x.
UGC 4197	gx	08h03m25s	+10°03.0'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	è una lama di luce facilmente visibile a 380x, estesa un paio di primi in direzione NW-SE con bulge piccolo ed evidente poco contrastato sul disco; c'è una stellina a ridosso verso NW.
UGC 4198	gx	08h03m43s	+09°57.6'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, diffusa, Ø 1' e con condensazione centrale evidente a 380x.
UGC 4199	gx	08h06m40s	+73°20.6'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme e aspetto regolare; è molto allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 4200	gx	08h04m31s	+40°12.4'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte assieme a CGCG 207-25, -27 e -29 di un quartetto di oggetti molto deboli — chiazza approssim. rotonda, con Ø di ~ 1', molto debole e stemperata sul fondo cielo; è situata tra 2 stelline distanti 4' in direzione WNW-ESE — 380x.
UGC 4203	gx	08h04m06s	+05°06.8'		CMi	24"	buona / buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' verso S — 400x.
UGC 4205	gx	08h05m10s	+47°03.1'		Lyn	28"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×10" e con tenue bulge appena percettibile — 495x.
UGC 4207	gx	08h04m48s	+20°41.6'		Cnc	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto esteso max 20" che aggetta verso SE da una stellina brillante — 380x.
UGC 4209	gx	08h05m26s	+46°42.5'		Lyn	20"	buona / buono	relativamente facile, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale evidente — 360x.
UGC 4211	gx	08h04m46s	+10°46.6'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso del nucleo verso W visibile a tratti a 380x.
UGC 4215	gx	08h05m34s	+10°23.6'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti a 450x; c'è una stellina al bordo E; situata in mezzo a 2 stelline deboli di luminosità simile orientate da NE a SW.
UGC 4216	gx	08h05m51s	+12°28.8'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo relativamente compatto visibile senza grandi difficoltà in visione distolta a 270x a ~ 1' S di una stellina.
UGC 4219	gx	08h06m43s	+39°05.5'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di aspetto un po' confuso a 450x; grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità uniforme; il contrasto non sembra migliorare scalando a 340x.
UGC 4222	gx	08h06m19s	+05°37.4'		CMi	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso W — 450x.
UGC 4225	gx	08h06m54s	+22°54.6'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso verso W; molto disturbata dalla SAO 79951 di magnitudo 7.6 situata 4' a S — 450x.
UGC 4226	gx	08h07m21s	+40°23.9'		Lyn	20"	buona / buono	è un lucore molto debole, diffuso e stemperato sul fondo cielo; a tratti, in visione distolta, appare orientato da NNE a SSW (ossia a perpendicolo con le due stelline brillanti a N) e di dimensioni grosso modo 60"×45"; c'è un triangolino molto serrato a ridosso E — 360x.
UGC 4228	gx	08h06m48s	+05°18.6'		CMi	24"	buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di 1', gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ridosso del bulge verso NNE — 400x.
UGC 4229	gx	08h07m41s	+39°00.3'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto quasi stellare a bassi ingrandimenti; a 450x appare un brillante nucleo puntiforme circonfuso da un tenue alone circolare molto piccolo ed esteso una 20-ina di secondi.
UGC 4232	gx	08h07m22s	+17°45.1'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta a 450x; molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; è situata 9' a WSW di NGC 2529 — 450x.
UGC 4233	gx	08h07m17s	+08°52.1'		Cnc	24"	ottima / discreto	debole lama di luce orientata da WNW a ESE, ossia come le 3 stelline allineate situate sul prolungamento dell'asse: la più orientale di queste, più brillante, è a ridosso della gx *(presenza di chiarore lunare)*.
UGC 4236	gx	08h07m57s	+26°01.8'		Cnc	24"	ottima / buono	debolissima, situata a ridosso SE di una stellina; in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20", ma è meglio scalare a 340x.
UGC 4238	gx	08h11m38s	+76°25.3'	q 7	Cam	16"	buona / discreto	debole, molto stemperata sul fondo cielo, appena più brillante all'interno, estesa per almeno 2.5' in direzione E-W; è situata a E di una coppia di stelle luminose distanti tra loro ~ 1' la più brillante delle quali, di 9ª magnitudo, è riportata sull'Uranometria — 270x.
UGC 4239	gx	08h07m58s	+05°12.4'		CMi	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele schiacciato le cui stelline, partendo da quella a S e girando in senso orario, sono di luminosità crescente — 450x.
UGC 4240	gx	08h08m06s	+14°50.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	è una piccola lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa per ~ 1'; meglio non scendere sotto i 450x per ridurre l'effetto di riverberazione di alcune stelle brillante a E della gx.
UGC 4241	gx	08h09m24s	+57°45.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte del sestetto di NGC 2521 (q 43) — molto debole e molto allungata da NW a SE con dimensioni 50"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 4242	gx	08h10m59s	+72°47.7'		Cam	16"	ottima / m. buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø non superiore ai 30"-35" e tenue condensazione centrale visibile a 380x.
UGC 4243	gx	08h10m25s	+67°14.6'		UMa	16"	buona / discreto	abbastanza facile, a 270x appare di luminosità leggermente irregolare, poco diffusa, allungata da NNW da SSE con dimensioni 60"×40"; è situata 3' NE di una brillante stella di 8a grandezza.
UGC 4244	gx	08h08m29s	+11°10.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 4245	gx	08h08m46s	+18°11.7'		Cnc	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto allungata da WNW a ESE, con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; subito a E c'è un piccolo asterismo di 4 stelline — 380x.
UGC 4248	gx	08h08m55s	+00°18.1'		CMi	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda, diffusa con Ø max di 30"; è situata tra 2 coppie di stelline distanti un paio di primi e orientate da N a S — 380x.
UGC 4249	gx	08h09m14s	+16°59.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina stellina appena percettibile subito a NW — 450x.
UGC 4250	gx	08h10m05s	+46°11.6'		Lyn	20"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' NW — 360x.
UGC 4251	gx	08h09m15s	+00°17.0'		CMi	16"	ottima / m. buono	più brillante di UGC 4248, orientata da N a S con dimensioni 30"×15" e appena più brillante all'interno; ci sono 3 stelline che formano un piccolo arco: a NE, E e SE. Si trova al vertice orientale di un triangolo equilatero formato con 2 stelline brillanti — 380x.
UGC 4252	gx	08h10m00s	+40°06.2'		Lyn	20"	buona / buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×15"; ci sono 3 stelline abbastanza brillanti quasi allineate tra loro a N della gx — 360x.
UGC 4253	gx	08h09m16s	−00°22.0'		Mon	16"	ottima / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso S; è disturbata dalla SAO 135561 di magnitudo 7.5 situata 5' a S — 380x.
UGC 4254	gx	08h09m24s	+00°36.5'		CMi	16"	ottima / m. buono	debolissimo ovale diffuso, orientato da E a W, di dimensioni 60"×45" e con condensazione centrale molto tenue osservabile a tratti; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W — 380x.
UGC 4257	gx	08h10m11s	+24°53.3'		Cnc	24"	ottima / buono	debolissima lama di luce di aspetto uniforme, estesa per 1' in direzione NE-SW; c'è una stellina appena percettibile al bordo; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 4260	gx	08h11m08s	+46°27.7'	q 69	Lyn	16"	m. buona / buono	piccola bolla circolare con Ø di una 20-ina di secondi, molto diffusa e relativamente facile da vedere a 270x; c'è una stellina a ridosso di NE e un'altra più debole dalla parte opposta ma ben separata dalla galassia.
UGC 4262	gx	08h19m03s	+83°15.9'		Cam	16"	ottima / buono	è una chiazza luminosa diffusa e con gradiente di luce molto basso, poco allungata ~ da NW a SE con dimensioni 1.5'×1' — 380x.
UGC 4263	gx	08h15m29s	+78°51.8'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente compatta, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con nucleo di aspetto stellare — 380x.
UGC 4267	gx	08h12m56s	+54°58.1'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole, appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni ~ 60"×30" — 380x.
UGC 4269	gx	08h12m01s	+19°21.8'		Cnc	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"× 30"; c'è una doppia stretta dalle componenti sbilanciate subito a S — 380x.
UGC 4270	gx	08h13m21s	+57°51.1'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 380x.
UGC 4272	gx	08h12m47s	+44°21.5'		Lyn	20"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 360x.
UGC 4276	gx	08h12m47s	+09°23.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' SE — 450x.
UGC 4277	gx	08h13m57s	+52°38.9'		Lyn	16"	ottima / buono	è una debole lama di luce che a 270x, in visione distolta, sembra estesa ~ 3' in direzione WNW-ESE; una zona centrale appena più brillante si estende per poco più di 1' ed è quella che salta fuori subito in visione diretta.
UGC 4280	gx	08h14m33s	+54°48.0'		Lyn	16"	ottima / m. buono	si riesce a vedere facilmente in visione distolta a 380x, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" e appena più brillante all'interno.
UGC 4281	gx	08h14m42s	+58°13.5'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con piccolo nucleo quasi stellare visibile a 380x. C'è una galassietta molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi situata a poco più di 1' SE, che è risultata poi essere la **MAC 0814+5812**.
UGC 4282	gx	08h17m39s	+77°30.1'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 380x.
UGC 4283	gx	08h14m22s	+39°15.1'		Lyn	20"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 360x.
UGC 4285	gx	08h13m51s	+00°39.7'		Hya	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto rotondo, molto diffuso e di max 30" di Ø situato a ridosso NW di una stellina abbastanza brillante; molto disturbata dalla SAO116507 situata ad appena un paio di primi SSE — 380x.
UGC 4286	gx	08h14m16s	+18°26.4'		Cnc	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 380x.
UGC 4289	gx	08h15m45s	+58°19.2'		Lyn	16"	ottima / m. buono	rotonda, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con Ø di ~ 1' — 380x.
UGC 4292	gx	08h19m44s	+79°14.1'		Cam	16"	ottima / m. buono	relativamente brillante, compatta, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ridosso verso W — 380x.
UGC 4295	gx	08h17m09s	+64°31.5'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 4297	gx	08h28m28s	+85°36.5'		Cam	16"	ottima / buono	molto allungata da E a W, poco diffusa e di dimensioni 60"×20"; presenta una tenue condensazione centrale facilmente visibile in visione distolta a 270x.
UGC 4299	gx	08h15m59s	+23°12.0'		Cnc	16"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce orientata da NW a SE ed estesa oltre 1'; c'è una stellina a ridosso verso W — 380x.
UGC 4301	gx	08h16m02s	+28°37.4'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a poco più di 1' verso W — 380x.
UGC 4302	gx	08h17m26s	+64°32.7'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso E e una più debole alla stessa distanza verso S — 450x.
UGC 4303	gx	08h16m25s	+25°59.5'		Cnc	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina molto brillante un paio di primi a W — 450x.
UGC 4304	gx	08h16m28s	+23°48.6'		Cnc	24"	buona / buono	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15", con bulge molto tenue e diffuso; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x (il cielo sta rischiarando per l'imminente sorgere della Luna quasi all'Ultimo Quarto).
UGC 4305	gx	08h19m12s	+70°43.2'	q 22	UMa	16"	buona / mediocre	molto debole ed estesa, con gradiente di luce molto basso, assai diffusa e di forma indistinta; si può notare una zona leggermente più brillante a ridosso di un gruppetto molto serrato di 3 stelline — 188x.
UGC 4306	gx	08h17m37s	+35°26.7'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 380x.
UGC 4308	gx	08h17m26s	+21°41.2'		Cnc	16"	ottima / ottimo	chiazza molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di almeno 1'; presenta una piccola zona interna appena più brillante; 2 stelline ne lambiscono i bordi NW e SW — 270x.
UGC 4309	gx	08h18m13s	+49°15.0'		Lyn	28"	ottima / ottimo	debole chiazza molto diffusa rotonda con Ø di 45" e un nucleo stellare molto tenue; c'è la SAO 42276 di 9a grandezza a 3.5' verso S — 495x.
UGC 4310	gx	08h17m16s	+01°12.3'		Hya	24"	buona / buono	debolissimo lucore di luminosità uniforme, molto stemperato sul fondo cielo, grosso modo circolare con Ø di ~ 1'; c'è una stellina quasi a ridosso SE e un'altra poco più distante a NW; appare meglio contrastata a 280x.
UGC 4316	gx	08h17m42s	+04°36.6'		Hya	24"	m. buona / buono	debolissimo lucore osservabile solo in visione distolta, esteso una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE e una stella brillante a 1.5' verso E; meglio tuttavia scalare a 280x.
UGC 4317	gx	08h17m53s	+12°53.9'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
UGC 4318	gx	08h17m54s	+03°22.6'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole, di luminosità uniforme e di aspetto confuso, grosso modo allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SW — 450x.
UGC 4320	gx	08h19m38s	+59°42.6'		UMa	28"	buona / buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge poco contrastato — 495x.
UGC 4322	gx	08h20m02s	+62°49.8'		UMa	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta un bulge brillante e contrastato — 450x.
UGC 4323	gx	08h20m20s	+66°58.9'		UMa	24"	ottima / ottimo	brillante, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con piccola condensazione centrale ben contrastata; 3 stelline abbastanza brillanti quasi allineate si trovano a NW della gx — 450x.
UGC 4326	gx	08h20m35s	+68°36.0'		UMa	16"	buona / discreto	è un debole fuso orientato da NNW a SSE, di dimensioni 80"×30", con tenue bulge diffuso poco contrastato sul disco; c'è una debole stellina a meno di 1' NNE — 380x.
UGC 4328	gx	08h23m35s	+79°11.6'		Cam	16"	ottima / m. buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 380x, allungata da N a S per ~ 45" (dimensioni e orientamento sono stati stimati in riferimento alla coppia di stelline situate 2.5' a W).
UGC 4329	gx	08h19m02s	+21°11.1'		Cnc	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda e diffusa, con Ø di ~ 30"; salta fuori con relativa facilità in visione distolta a 380x.
UGC 4332	gx	08h19m38s	+21°06.8'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni 30"×20"; è situato all'interno di un rombo, ottimo come riferimento — 380x.
UGC 4335	gx	08h20m42s	+54°07.6'		Lyn	16"	ottima / buono	debole e diffusa, leggermente allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40"; presenta una condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
UGC 4338	gx	08h21m00s	+55°16.5'		Lyn	28"	buona / buono	debole e molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 495x.
UGC 4339	gx	08h21m22s	+62°39.2'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole ovale molto diffuso e con gradiente di luce molto basso, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 4341	gx	08h20m10s	+27°05.6'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", con piccola e tenue condensazione centrale osservabile a 380x; è disturbata dalla Chi Cnc di 5ª grandezza che a fatica si riesce a tenere fuori campo.
UGC 4342	gx	08h20m37s	+40°16.7'		Lyn	28"	ottima / ottimo	poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina al bordo W — 495x.
UGC 4344	gx	08h20m17s	+20°52.5'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø > 30"; meglio visibile scalando a 188x.
UGC 4346	gx	08h20m41s	+25°54.3'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, solo a tratti appare più brillante all'interno, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio visibile a 270x.
UGC 4348	gx	08h33m51s	+85°56.6'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30"; c'è una stellina brillante a 1' scarso W che interferisce un po' con l'osservazione; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4349	gx	08h20m35s	−01°22.5'		Hya	24"	buona / ottimo	baffo molto debole, ma facilmente osservabile in visione distolta a 570x che si diparte verso W da una stellina brillante; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW.
UGC 4350	gx	08h20m47s	+16°38.8'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ~ 40" verso W — 450x.
UGC 4351	gx	08h21m10s	+35°47.3'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; in visione distolta appare leggermente condensata; è molto disturbata dalla SAO 60744 di 7ª situata 4.5' a W; altre 2 stelline brillanti si trovano 1.5' a S e a NE; tutto sommato si vede meglio a 380x mantenendola a centro campo (seppur con la SAO presente).
UGC 4352	gx	08h20m43s	−01°24.7'		Hya	24"	buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme; in visione distolta appare a tratti un debolissimo "getto" filiforme che si diparte dalla gx e punta verso SW per ~ 1'; purtroppo il sistema è disturbato da una stella brillante di 10ª e situata a meno di 2' SW: questo baffo è la gx MCG+0-22-3 — 570x.
UGC 4353	gx	08h22m50s	+66°58.2'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×30" — 380x.

UGC 4357	gx	08h22m40s	+56°19.8'		Lyn	16"	ottima / buono	salta fuori solo in visione distolta a 380x, in quanto letteralmente "soffocata" dalla luce di una stellina brillante; in pratica si tratta di un debolissimo aggetto di una 30-ina max di secondi.
UGC 4363	gx	08h25m02s	+74°26.0'		Cam	16"	ottima / m. buono	è un elusivo baffetto di luce che a 380x sembra, a tratti, dipartirsi da una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi.
UGC 4364	gx	08h22m25s	+25°30.5'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio restare a 270x.
UGC 4370	gx	08h22m28s	−01°02.8'		Hya	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ridosso verso N; meglio contrastata scalando a 200x.
UGC 4373	gx	08h22m59s	+27°42.5'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore appena percettibile in visione distolta situata all'interno di un trapezio irregolare di stelle: forma un triangolo equilatero con le 2 più a E che sono orientate da N a S — 270x.
UGC 4374	gx	08h22m53s	+03°34.2'		Hya	24"	buona / buono	relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×50"; meglio contrastata a 200x; c'è una stellina a ridosso verso S.
UGC 4375	gx	08h23m11s	+22°39.9'		Cnc	16"	ottima / m. buono	facilmente osservabile; appare dapprima come una specie di appannamento dello oculare, ma si vede subito che questo è fortemente asimmetrico e in realtà situato a W di una stellina brillante; la galassia, di luminosità uniforme, è estesa ~ 45" — 380x.
UGC 4376	gx	08h24m54s	+66°52.1'		UMa	24"	ottima / ottimo	è una tenue chiazza diffusa approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi sulla quale si sovrappongono due stelline abbastanza brillanti: quella più a S è a ridosso del piccolo nucleo molto debole — 450x.
UGC 4379	gx	08h24m45s	+61°32.6'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 80"×30"; meglio definita scalando a 340x.
UGC 4380	gx	08h24m32s	+54°52.2'		Lyn	16"	ottima / buono	debolissima, molto diffusa, rotonda con Ø > 30"; appare in visione distolta a 380x; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelline situate a NE.
UGC 4381	gx	08h23m13s	−00°51.8'		Hya	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 400x.
UGC 4385	gx	08h23m52s	+14°45.2'		Cnc	24"	buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ~ 45" SW e un'altra appena percettibile a 1' verso E — 450x.
UGC 4386	gx	08h24m02s	+21°01.6'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso, appena più contrastato del disco; c'è una debolissima appena percettibile subito a S — 380x.
UGC 4390	gx	08h27m52s	+73°31.0'	q 7	Cam	20"	m. buona / ottimo	chiazza circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, estesa 45" e di aspetto uniforme; c'è una stellina appena percettibile subito a N e una più evidente e più distante verso SW; poco disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a W — 360x.
UGC 4393	gx	08h26m04s	+45°58.0'	q 70	Lyn	16"	m. buona / buono	galassia facile, ma con basso gradiente di luce, diffusa, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E — 270x.
UGC 4395	gx	08h25m48s	+28°07.2'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NNW a SSE ed estesa almeno 1'; c'è una stellina molto debole a ridosso NNW — 450x.
UGC 4396	gx	08h34m40s	+84°19.0'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4398	gx	08h27m36s	+64°13.7'		UMa	16"	ottima / m. buono	è una debolissima bolla circolare di ~ 1' di Ø, con condensazione centrale molto tenue diffusa visibile a tratti a 270x; c'è una stellina a ridosso verso E.
UGC 4399	gx	08h26m07s	+21°27.4'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 4401	gx	08h26m44s	+48°48.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	elusiva! Appare solo a momenti in visione distolta, ma non ne capisco la forma; non sembra comunque più estesa di 30" — 495x.
UGC 4403	gx	08h26m18s	+11°30.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso SE — 450x.
UGC 4405	gx	08h26m33s	+23°11.6'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare visibile a tratti 380x.
UGC 4406	gx	08h26m36s	+22°57.0'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, molto piccola, rotonda con Ø di 20" (la stessa della distanza delle 2 stelline ravvicinate sul cui prolungamento si trova la gx); una condensazione stellare è visibile a tratti a 380x.
UGC 4410	gx	08h27m54s	+55°09.5'		Lyn	16"	ottima / buono	debolissima, diffusa e molto disturbata dalla luce della SAO 26845 di 7.9 situata 2.5' NW; la gx è allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 4412	gx	08h27m19s	+37°46.9'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare abbastanza facilmente allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 4414	gx	08h27m06s	+21°38.7'		Cnc	24"	buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di 45" e con condensazione centrale piccola ed evidente (già osservata col 16" a 380x in una notte favolosa!) — 450x.
UGC 4416	gx	08h27m17s	+22°52.7'		Cnc	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" con tenuissimo bulge appena percettibile a 380x; c'è una stellina brillante a ridosso verso S.
UGC 4418	gx	08h27m28s	+25°43.4'		Cnc	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×15"; disturbata da una stellina brillante situata 2.5' a W; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4420	gx	08h29m11s	+63°20.3'		UMa	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente e contrastato; situata tra due stelline orientate nello stesso modo — 450x.
UGC 4421	gx	08h27m26s	+01°50.9'		Hya	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW — 400x.
UGC 4427	gx	08h29m15s	+55°31.4'		Lyn	16"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 263-36 situata 1' E — la 1ª è allungata da N a S con dimensioni 45"×30", di luminosità uniforme e poco più evidente; la 2ª, di aspetto simile, ha pure dimensioni 45"×30", ma orientata da NE a SW — 380x.
UGC 4429	gx	08h28m47s	+40°39.9'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina subito a SE — 291x.
UGC 4430	gx	08h28m08s	−01°32.3'		Hya	24"	buona / ottimo	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge poco contrastato sul disco; c'è una stellina a meno di 1' verso SE — 400x.
UGC 4431	gx	08h28m13s	+00°01.5'		Hya	24"	buona / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di 1'; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 200x; c'è una stella a 1' SE (fa parte di un piccolo triangolo isoscele con le componenti della stessa luminosità).
UGC 4432	gx	08h28m15s	+01°00.3'		Hya	24"	buona / buono	appare facilmente un nucleo stellare circonfuso da un tenuissimo alone che in visione distolta non supera i 30" di Ø; c'è una stellina brillante a ridosso verso S — 400x.
UGC 4433	gx	08h28m31s	+17°28.1'		Cnc	24"	ottima / m. buono	è una chiazza diffusa di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina molto debole a 1' SW — 450x.
UGC 4436	gx	08h29m50s	+48°56.8'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1' (poco meno della distanza delle 2 stelline abbastanza brillanti situate a S e a E orientate nello stesso modo) — 495x.
UGC 4438	gx	08h30m00s	+52°41.8'		Lyn	16"	ottima / m. buono	relativamente facile da vedere, rotonda di luminosità pressoché uniforme, abbastanza compatta e con Ø di ~ 40"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline, a 2' verso S e 2' WSW — 380x.
UGC 4439	gx	08h29m19s	+02°38.7'		Hya	24"	buona / ottimo	debolissimo e indistinto lucore orientato da N a S per ~ 1' e con una stellina brillante proprio nel mezzo (o a ridosso, non si capisce) che impedisce di valutarne esattamente le dimensioni — 400x.
UGC 4440	gx	08h29m42s	+15°03.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	diffusa, con bulge appena più contrastato del disco, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 4441	gx	08h30m14s	+39°53.3'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	molto debole e relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10" — 360x.
UGC 4442	gx	08h30m41s	+52°18.1'		Lyn	16"	ottima / buono	debole, ma relativamente facile a 270x, rotonda, diffusa, con tenue condensazione centrale e Ø di ~ 1'.
UGC 4444	gx	08h30m02s	+17°15.5'		Cnc	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è un minuscolo rombo di stelline molto allungato a NW — 380x.
UGC 4445	gx	08h31m27s	+60°59.7'		UMa	24"	ottima / m. buono	chiazza circolare con Ø di 1', molto debole e stemperata sul fondo cielo, situata tra una doppia molto stretta e sbilanciata a NE e una stellina a ridosso verso W; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4448	gx	08h33m41s	+74°24.2'		Cam	16"	ottima / buono	presenta una marcata condensazione centrale e un piccolo alone di luminosità un po' irregolare; è rotonda a prima vista, ma se osservata meglio appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 4449	gx	09h31m26s	+40°57.4'		Lyn	28"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina molto debole a 1.5' verso E — 495x.
UGC 4451	gx	08h34m33s	+75°09.2'		Cam	16"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 4452	gx	08h31m10s	+09°36.3'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, con piccola condensazione centrale abbastanza marcata, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso SW — 450x.
UGC 4453	gx	08h31m34s	+22°02.0'		Cnc	24"	ottima / molto buono	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con tenue bulge diffuso appena percettibile — 450x.
UGC 4455	gx	08h31m33s	−01°11.9'		Hya	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
UGC 4457	gx	08h31m58s	+19°12.7'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; un tenuissimo nucleo stellare è visibile solo a tratti; è poco più contrastata scendendo a 270x.
UGC 4459	gx	08h34m08s	+66°10.7'	q 22	UMa	16"	m. buona / mediocre	debolissima, visibile solo a momenti come una bolla circolare di una 40-ina max di secondi di Ø; è situata un paio di primi scarsi a W di una stellina — 270x.
UGC 4461	gx	08h33m22s	+52°31.9'		Lyn	16"	ottima / buono	debole, molto allungata da NE a SW, con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 4464	gx	08h33m00s	+26°00.8'		Cnc	24"	ottima / molto buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da WNW a ESE ed estesa ~ 1'; è situata a ridosso NE di una piccola losanga di 4 stelline deboli — 450x.
UGC 4465	gx	08h33m18s	+41°15.6'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; forma una coppia abbastanza ravvicinata con **MAC 0833+4115** situata 1' scarso a SE, una galassietta molto piccola e molto debole, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 291x.
UGC 4467	gx	08h32m47s	+00°13.7'		Hya	24"	buona / m. buono	debole, con bulge diffuso appena percettibile, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo N — 400x.
UGC 4468	gx	08h33m31s	+41°31.5'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; situata in mezzo a 2 stelline orientate da ENE a WSW; una stella brillante si trova un paio di primi a N — 291x.
UGC 4471	gx	08h33m42s	+41°25.2'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debole lama di luce estesa 1' scarso, orientata da ENE a WSW e con bulge appena percettibile — 291x.
UGC 4474	gx	08h43m23s	+84°38.0'		Cam	24"	ottima / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 4479	gx	08h35m09s	+39°40.1'		Lyn	28"	m. buona / buono	è una lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, estesa 1' scarso e orientata da N a S — 495x.
UGC 4480	gx	08h34m32s	+01°40.0'		Hya	24"	buona / m. buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20, con piccolo bulge diffuso abbastanza contrastato; ci sono 2 stelle brillanti a S con le quali la gx forma un piccolo arco — 400x.
UGC 4482	gx	08h35m14s	+28°45.2'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 4483	gx	08h37m03s	+69°46.5'		UMa	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare orientata da N a S con una stellina appena percettibile al margine N; nonostante la presenza delle SAO 14599 e 14600 rispettivamente di 8ª e 7ª grandezza, la gx appare meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4490	gx	08h37m59s	+66°08.2'		UMa	16"	m. buona / mediocre	molto debole, ma più evidente della precedente; appare molto allungata da E a W, con dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
UGC 4491	gx	08h35m48s	+01°43.2'		Hya	24"	buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da NE a SW, dimensioni 80"×30" e con piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 400x.
UGC 4494	gx	08h36m05s	+01°53.6'		Hya	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a meno di 1' verso S — 400x.
UGC 4495	gx	08h38m20s	+69°01.2'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una coppia di stelle brillanti a W distanti 3' in direzione N-S; la SAO 14608 di 7ª grandezza situata 6' a SE si riesce a tenere fuori campo — 450x.
UGC 4496	gx	08h36m36s	+25°08.2'		Cnc	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole e uniforme, orientata da NNE a SSW ed estesa ~ 45" — 450x.
UGC 4498	gx	08h37m27s	+40°02.1'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso S — 360x.
UGC 4499	gx	08h37m41s	+51°39.2'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	molto allungata da NNW a SSE, ma molto debole, di dimensioni 80"×30"; c'è una stellina a ridosso del bordo meridionale — 270x.
UGC 4500	gx	08h39m20s	+71°42.2'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme, molto stemperata sul fondo cielo e approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso N; meglio osservabile a 270x.
UGC 4504	gx	08h37m43s	+20°30.3'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissima, a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S; è disturbata dalla SAO 80294 di 8a, situata 4' WSW, che non si può tenere fuori campo a 270x (e a 380x la gx s'intravvede appena); .
UGC 4507	gx	08h38m44s	+43°32.8'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×20" e con piccolo bulge poco contrastato — 495x.
UGC 4508	gx	08h37m56s	−02°27.7'	q 231	Hya	16"	ottima / discreto	oggetto rotondo di luminosità uniforme con Ø di ~ 30", situato a ridosso verso N di una stellina; a un paio di primi verso N c'è una doppia stretta — 270x.
UGC 4513	gx	08h39m01s	+40°20.8'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a NE — 360x.
UGC 4514	gx	08h39m38s	+53°27.4'	q 44	UMa	16"	ottima / discreto	è relativamente facile da vedere, di luminosità uniforme, allungata da WSW a ENE, di dimensioni 60"×30"; c'è una a ridosso verso NE — 270x.
UGC 4515	gx	08h40m09s	+52°27.4'		UMa	16"	ottima / buono	è un debole ovale di 60"×30", orientato da N a S e con bulge diffuso poco più contrastato del disco 380x.
UGC 4516	gx	08h41m18s	+66°51.6'		UMa	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole orientata da NW a SE ed estesa almeno 1'; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S (quella centrale di un asterismo di 5 componenti foggiato a "Y") — 450x.
UGC 4521	gx	08h40m53s	+42°50.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×20"; c'è una debole stellina quasi a ridosso WNW e una di luminosità simile a 1' verso N — 495x.
UGC 4522	gx	08h42m27s	+70°58.1'		UMa	16"	ottima / m. buono	altra debolissima bolla rotonda di luminosità perfettamente uniforme e di 1' di Ø; c'è una stellina solo a tratti al bordo meridionale; meglio scendere a 270x, perché a 380x si stempera eccessivamente.
UGC 4526	gx	08h40m54s	+19°21.3'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	fa parte delle galassiette del **Praesepe** — molto debole, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW, di dimensioni 45"×15"; c'è una stellina evidente a ridosso del bordo meridionale — 380x.
UGC 4531	gx	08h42m53s	+32°52.1'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con tenuissimo bulge diffuso visibile a tratti a 380x.
UGC 4532	gx	08h41m41s	+18°51.6'		Cnc	24"	m. buona / buono	è una lama di luce molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa ~ 1'; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
UGC 4535	gx	08h43m35s	+64°15.5'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' N — 450x.
UGC 4536	gx	08h43m41s	+65°11.0'		UMa	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di ~ 1'; meglio tuttavia scalare a 270x; c'è una stella brillante un paio di primi a NW; subito a E c'è un asterismo di 6 stelline molto brillanti.
UGC 4538	gx	08h43m45s	+65°02.6'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
UGC 4539	gx	08h44m07s	+66°57.7'		UMa	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 4540	gx	08h42m36s	+10°35.2'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, con bassissima luminanza superficiale, rotonda con Ø di ~ 1' e di luminosità uniforme — 400x.
UGC 4543	gx	08h43m22s	+45°44.2'	q 70	Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole chiazza estesa, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 90"×45" e con condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina a ridosso E e una di luminosità simile a 1.5' SW; una 3a stellina molto debole si trova subito a W; la visione è comunque disturbata da una coppia di stelle brillanti situate a N della gx — 495x.
UGC 4545	gx	08h42m56s	+13°38.2'		Cnc	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 4548	gx	08h43m07s	+18°13.4'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S; la visione è però disturbata dalla SAO 98066 di magnitudo 7.7 situata 4' a S — 450x.
UGC 4549	gx	08h44m22s	+58°50.4'		UMa	16"	ottima / buono	rotonda, di luminosità pressoché uniforme, diffusa e con Ø > 1'; c'è una stellina a < 1' dal bordo occidentale — 380x.
UGC 4550	gx	08h43m16s	+13°05.1'		Cnc	24"	buona / buono	è posta di taglio, orientata da N a S con dimensioni 2'×20" e bulge diffuso; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 4551	gx	08h44m07s	+49°47.6'		UMa	16"	m. buona / m. buono	presenta un bulge abbastanza marcato, un nucleo stellare e un tenuissimo alone molto allungato da NNW a SSE (ossia a perpendicolo con le 2 stelline situate a SSW) di dimensioni ~ 90"×30" — 380x.
UGC 4552	gx	08h43m21s	+10°43.6'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30", diffusa e di luminosità uniforme — 400x.
UGC 4553	gx	08h43m26s	+03°36.9'		Hya	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata a 200x.
UGC 4554	gx	08h43m41s	+22°05.7'		Cnc	24"	m. buona / discreto	è una debolissima lama di luce estesa almeno 1' e orientata da E a W; salta fuori in visione distolta a 450x; c'è una stellina a ridosso SE.
UGC 4556	gx	08h44m15s	+41°43.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile a 380x, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e poco più brillante verso l'interno.
UGC 4558	gx	08h44m09s	+33°31.0'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"× 20"; meglio contrastata a 270x.
UGC 4559	gx	08h44m08s	+30°07.2'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debole lama di luce orientata da NE a SW, estesa un paio di primi, appena più brillante verso l'interno e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 4561	gx	08h43m48s	+00°50.3'		Hya	24"	buona / ottimo	molto debole, ma facilmente visibile a 570x, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15" e con tenuissimo bulge diffuso percettibile a tratti; appare tuttavia meglio contrastata a 400x.
UGC 4562	gx	08h44m55s	+47°44.7'		UMa	28"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, anche se il gradiente di luce è comunque molto basso, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina subito a SW e una a poco più di 1' verso NE — 495x.
UGC 4564	gx	08h45m23s	+55°07.1'		UMa	16"	ottima / buono	fa parte del quintetto di CGCG 263-80 — relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 4567	gx	08h44m43s	+09°48.0'		Cnc	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
UGC 4568	gx	08h44m44s	+10°28.3'		Cnc	24"	buona / buono	debole lama di luce di luminosità uniforme, estesa oltre 1' e orientata da E a W — 450x.
UGC 4571	gx	08h44m52s	+01°09.3'		Hya	24"	ottima / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni ~ di 40"×20", ma è preferibile scalare a 340x; c'è una stellina subito a NE.
UGC 4572	gx	08h45m38s	+36°56.1'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	abbastanza brillante, rotonda, con Ø di 40", poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 4575	gx	08h45m40s	+23°52.1'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta a 340x, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1.5 SW (ossia in direzione ortogonale all'asse maggiore della gx).
UGC 4578	gx	08h46m14s	+41°34.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di ~ 1', diffusa e di luminosità pressoché uniforme; appare facilmente a 380x anche in visione diretta. Questa gx e UGC 4575 si trovano diametralmente opposte rispetto a un piccolo asterismo foggiato a pentagono irregolare che costituisce un ottimo riferimento — 380x.
UGC 4580	gx	08h46m33s	+48°25.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' SW, mentre una stellina sfuocata molto debole e situata 1' a N è poi risultata essere la **PGC 2317696** (una stringa curvilinea di 4 stelline si trova 4' a W) — 495x.
UGC 4582	gx	08h45m55s	+12°46.9'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole e molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", con piccola e tenue condensazione centrale; meglio visibile scalando a 340x.
UGC 4587	gx	08h47m22s	+49°33.3'		UMa	16"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×30", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare visibile a 380x.
UGC 4588	gx	08h46m35s	+19°01.1'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce che appare a tratti in visione distolta a 270x, orientata da N a S ed estesa almeno 1'.
UGC 4590	gx	08h46m40s	+13°12.8'		Cnc	24"	buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 4592	gx	08h46m58s	+21°42.8'		Cnc	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza orientata approssim. da NW a SE con dimensioni grosso modo 45"×30"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quando si fissa la stellina situata a 1' verso S — 340x.
UGC 4593	gx	08h49m00s	+70°06.6'		UMa	24"	ottima / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 45" verso S — 450x.
UGC 4594	gx	08h46m45s	+06°57.6'		Cnc	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 4596	gx	08h47m09s	+19°37.8'		Cnc	24"	buona / buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco più brillante all'interno e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 4597	gx	08h47m40s	+25°35.6'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissima, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 270x.
UGC 4598	gx	08h48m07s	+41°51.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
UGC 4599	gx	08h47m42s	+13°25.1'		Cnc	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di > 1'; c'è una stellina a 1' NW e un'altra più debole alla stessa distanza, ma verso S; una stella brillante si trova invece un paio di primi a NE — 400x.
UGC 4601	gx	08h57m02s	+84°48.5'		Cam	24"	ottima / m. buono	relativamente facile e compatta, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso di SE — 450x.
UGC 4602	gx	08h47m56s	+25°49.8'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a tratti allungata da NW a SE, di dimensioni all'incirca 40"×20" e con nucleo stellare; è allineata ed equidistante con 2 stelline appena percettibili situate a W; anche questa si apprezza meglio a 380x.
UGC 4609	gx	08h49m01s	+41°11.9'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, con piccola condensazione centrale molto tenue; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 360x.
UGC 4610	gx	08h48m27s	+01°04.0'		Hya	24"	buona / discreto	è un debolissimo alone di forma indistinta ed esteso una 30-ina di secondi situato asimmetricamente attorno a una stellina; appare con fatica a 400x; è situata a meno di 4' WNW di UGC 4613.
UGC 4611	gx	08h48m50s	+29°52.2'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi, orientato da E a W che sembra aggettare a E e a W da una stellina; un'altra stellina della stessa luminosità si trova a ridosso N di questa; la gx era visibile solo a 450x.
UGC 4613	gx	08h48m40s	+01°02.3'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme 400x.
UGC 4614	gx	08h49m17s	+36°07.2'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	è un debole oggetto poco diffuso, rotondo con Ø di 35"-40", di luminosità uniforme e facilmente visibile a 380x; è situata a E di un piccolo triangolo ottusangolo molto allungato di stelline brillanti.
UGC 4615	gx	08h49m25s	+41°46.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge evidente — 495x.
UGC 4621	gx	08h50m12s	+35°04.6'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	si vede facilmente a 380x, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; diverse stelline brillanti presenti nel campo disturbano un po' l'osservazione.
UGC 4622	gx	08h50m20s	+41°17.3'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" — 360x.
UGC 4623	gx	08h53m11s	+76°29.2'		Cam	16"	ottima / buono	presenta una bassissima luminanza superficiale, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni di quasi 3'×1'; c'è una stellina brillante che disturba al bordo E, a circa 2/3 dell'asse maggiore della gx — 380x.
UGC 4624	gx	08h50m24s	+25°57.2'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e bulge diffuso appena percettibile — 450x.
UGC 4625	gx	08h50m18s	+03°29.9'		Hya	24"	m. buona / buono	è un'elusiva lama di luce estesa forse 1' e orientata da NW a SE; appare solo a momenti, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 4631	gx	08h51m16s	+19°20.5'		Cnc	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di 30"-35", poco più brillante all'interno e con condensazione centrale abbastanza marcata di aspetto stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso S e un'altra 1' abbondante a W — 380x.
UGC 4635	gx	08h51m55s	+40°50.2'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a ridosso S — 360x.
UGC 4638	gx	08h51m38s	−02°22.0'		Hya	24"	buona / discreto	allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", appena più brillante all'interno; ci sono 3 stelline brillanti allineate e pressoché equidistanti verso W, orientate a perpendicolo con l'asse della galassia: la dimensione di quest'ultima è quindi pari alla distanza di queste stelline — 400x.
UGC 4639	gx	08h51m57s	+16°56.7'		Cnc	24"	buona / buono	relativamente facile, diffusa, con alto gradiente di luce e piccolo nucleo stellare; è rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N e un'altra brillante a 1.5' NE — 400x.
UGC 4640	gx	08h51m44s	−02°07.9'		Hya	24"	buona / discreto	è un baffo esteso e molto tenue che si diparte a S di una stellina brillante per ~ 1' (dalla parte opposta è più corto e appena percettibile); un'altra stellina, più debole, si trova quasi a ridosso verso NNW; meglio definita a 200x.
UGC 4642	gx	08h52m56s	+42°24.9'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma di aspetto un po' confuso, forse rotonda con Ø < 1' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso del bordo occidentale osservabile a 380x.
UGC 4643	gx	08h52m40s	+21°25.3'		Cnc	16"	buona / ottimo	debole chiazza rotonda molto diffusa con Ø > 1' e condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti a 270x; c'è una stellina a 1.5' verso S.
UGC 4644	gx	08h57m09s	+79°42.2'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; a 380x non sembra uniforme come alla prima occhiata, perché a tratti appaiono lievissime discrepanze di luminosità all'interno.
UGC 4648	gx	08h53m36s	+45°20.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	appare elusivamente solo a tratti, di forma indistinta, ma non più estesa di 20" — 495x.
UGC 4649	gx	08h53m38s	+40°43.8'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra una stellina brillante a NW e una tripletta a SE — 360x.
UGC 4650	gx	08h53m37s	+39°08.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30"; presenta un bulge diffuso, poco contrastato sul disco; c'è una stellina a ridosso del bordo W — 380x.
UGC 4653	gx	08h53m55s	+35°08.7'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S per 45"; a 380x sembra a tratti di aspetto un po' irregolare e poco più evidente verso S (di fatto forma una coppia ravvicinata con MAC 0853+3509B situata a ridosso verso N).
UGC 4656	gx	08h53m53s	+18°10.8'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; disturbata dalla SAO 98207 di 8ª grandezza situata 3' a N — 450x.
UGC 4659	gx	08h54m40s	+47°06.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e assai poco contrastata sul fondo cielo, in visione distolta appare allungata da WNW a ESE con dimensioni grosso modo di 60"×30"; 3 stelline quasi allineate e orientate da NW a SE si trovano a W della gx — 495x.
UGC 4665	gx	08h56m06s	+68°15.4'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina brillante a 1' N — 450x.
UGC 4670	gx	08h55m55s	+13°13.8'		Cnc	24"	buona / buono	presenta un bulge piccolo e brillante circonfuso da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45" — 400x.
UGC 4671	gx	08h56m43s	+52°06.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	si vede facilmente, rotonda, poco diffusa e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a ridosso NNE; situata 3' NW di NGC 2692 — 380x.
UGC 4672	gx	08h55m43s	−02°17.3'		Hya	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; ci sono 2 deboli stelline a 1' scarso N e a poco più di 1' verso NE — 450x.
UGC 4673	gx	08h55m52s	+02°31.4'		Hya	24"	m. buona / buono	lucore molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, a tratti poco allungato da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×45"; è situato all'interno di una losanga di 4 stelline; meglio contrastata a 280x.
UGC 4677	gx	08h56m24s	+13°10.9'		Cnc	24"	buona / buono	debolissima, appariva in visione distolta quasi a ridosso verso SE di una stella brillante; a tratti allungata grosso modo da E a W con dimensioni 60"×40" — 400x.
UGC 4684	gx	08h56m41s	+00°22.5'		Hya	24"	buona / discreto	rotonda, poco diffusa, con Ø di 45" e piccolo bulge abbastanza contrastato sul disco; è disturbata dalla luce di 2 stelle brillanti situate 1.5' a NE — 400x.
UGC 4685	gx	08h57m02s	+13°11.9'		Cnc	24"	buona / buono	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 4686	gx	08h57m42s	+43°07.6'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 495x.
UGC 4687	gx	08h58m54s	+66°28.1'		UMa	16"	m. buona / mediocre	relativamente brillante, presenta un nucleo luminoso e un tenue alone rotondeggiante con Ø di 1' scarso — 270x.
UGC 4689	gx	08h57m39s	+39°30.3'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 360x.
UGC 4690	gx	08h58m11s	+52°11.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 4698	gx	08h58m33s	+28°16.0'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debole alone di 60"×40" orientato da E a W situato asimmetricamente attorno a una stellina brillante: la stellina si trova verso W — 380x.
UGC 4699	gx	08h58m45s	+39°30.5'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW e una poco più distante a 1.5' NE — 360x.
UGC 4700	gx	08h58m50s	+41°34.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	oggetto rotondo relativamente facile, ma disturbato dalla luce di una stellina brillante situata quasi a ridosso di NE; ha un Ø di 30"-35" e una condensazione centrale visibile a 380x.
UGC 4702	gx	08h58m51s	+38°48.6'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	più debole di UGC 4572 , rotonda e di Ø simile, ma molto più diffusa e con nucleo di aspetto stellare; c'è una stellina a ~ 1.5' W e un'altra a 1' NW che però appare solo a tratti a 380x.
UGC 4703	gx	08h58m30s	+06°19.3'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare solo a momenti in visione distolta subito a E di una stellina molto debole; non sembra comunque più estesa di 15" — 450x.
UGC 4704	gx	08h59m01s	+39°12.5'	q 70	Lyn	16"	m. buona / buono	è un elusiva lama di luce orientata all'incirca da NW a SE, visibile solo a tratti in visione distolta ed estesa un paio di primi (poco più della metà della distanza che separa le 2 stelle brillanti situate a S della galassia e orientate in direzione N-S) — 270x.
UGC 4706	gx	09h00m23s	+64°54.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo, diffuso e di luminosità uniforme, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 380x.
UGC 4709	gx	08h59m35s	+45°55.6'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NE e una poco più debole a ridosso SE — 495x.
UGC 4712	gx	08h59m24s	+11°08.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo forma indistinta 45"×15" — 450x.
UGC 4713	gx	09h00m20s	+52°29.7'		UMa	16"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda, con alto gradiente di luce e Ø di 1' — 380x.
UGC 4714	gx	09h03m15s	+78°33.8'		Cam	16"	ottima / buono	debole chiazza approssim. rotonda, di luminosità uniforme e Ø di ~ 1', con una stellina a ridosso verso N — 380x.
UGC 4716	gx	09h00m15s	+40°17.8'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante a 1' SW — 291x.
UGC 4721	gx	09h00m08s	+16°55.4'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza circolare con Ø di ~ 45", molto diffusa e di luminosità uniforme; appare con relativa facilità in visione distolta a ~ 1' S di una stellina — 450x.
UGC 4722	gx	09h00m23s	+25°36.7'		Cnc	24"	ottima / buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NNE a SSW; in visione distolta appare estesa oltre 1' — 450x.
UGC 4724	gx	09h00m32s	+17°22.7'		Cnc	24"	ottima / discreto	è una debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
UGC 4731	gx	09h01m00s	+10°37.0'		Cnc	24"	buona / buono	facile, diffusa, rotonda con Ø d 45" e nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1.5' verso NW — 400x.
UGC 4734	gx	09h01m26s	+18°58.4'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a W — 450x.
UGC 4740	gx	09h02m06s	+23°23.3'		Cnc	16"	buona / buono	debolissima, meglio definita a 270x, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20".
UGC 4742	gx	09h02m23s	+14°31.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×15" e con tenue bulge circolare poco contrastato — 450x.
UGC 4746	gx	09h02m44s	+25°25.3'		Cnc	16"	buona / buono	debolissima, diffusa, leggermente condensata, allungata da NW a SE, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; meglio definita a 270x.
UGC 4748	gx	09h03m17s	+10°01.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, solo a tratti in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15"; un debolissimo nodulo a S della gx salta fuori ogni tanto a 570x: da un controllo successivamente effettuato, questo è risultato poi essere la MAC 0903+1000.
UGC 4749	gx	09h04m34s	+51°36.9'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	rotonda, con marcata condensazione centrale di aspetto stellare e un tenue alone diffuso con Ø max di 40" — 380x.
UGC 4758	gx	09h04m47s	+22°01.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
UGC 4761	gx	09h04m56s	+17°27.3'		Cnc	16"	ottima / m. buono	diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 50"×40", con piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una stellina a 1' SE e un'altra percettibile a tratti poco più di 1' a SW (da un controllo successivamente effettuato questa è risultata essere la MCG+3-23-33) — 380x.
UGC 4764	gx	09h05m26s	+25°33.0'		Cnc	16"	buona / buono	debole oggetto rotondo, con Ø di 30"-40", con un piccolo nucleo puntiforme percepibile a tratti — 270x.
UGC 4765	gx	09h05m55s	+47°10.8'		UMa	16"	m. buona / ottimo	piccolo e debole oggetto rotondo con Ø di 35"-40", diffuso e appena più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 4767	gx	09h05m45s	+36°21.2'		Lyn	16"	buona / m. buono	piccola e diffusa, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare visibile a 380x.
UGC 4773	gx	09h06m00s	+18°45.9'		Cnc	16"	buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×20" e con nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stella brillante un paio di primi a SW — 380x.
UGC 4774	gx	09h06m18s	+25°35.0'		Cnc	16"	buona / buono	debolissima, quasi elusiva, fortemente stemperata sul fondo cielo; appare solo a tratti in visione distolta come un lucore esteso per almeno 1' — 270x.
UGC 4775	gx	09h07m39s	+66°34.5'		UMa	16"	buona / discreto	luminosa (ma non ci sarà una stellina a ridosso del nucleo?); c'è una stellina appena percettibile a 380x a ~ 1' verso S.
UGC 4777	gx	09h06m40s	+34°37.1'	q 103	Lyn	16"	buona / m. buono	molto debole, ma in visione distolta appare chiaramente molto allungata da NW a SE per 1.5', diffusa e con una stellina a ridosso del margine SE — 270x.
UGC 4778	gx	09h07m11s	+50°42.7'		UMa	16"	ottima / buono	relativamente brillante, rotonda, con alto gradiente di luce e Ø di 1' scarso — 380x.
UGC 4780	gx	09h06m39s	+19°20.1'		Cnc	16"	ottima / m. buono	è un'elusiva chiazza di luce, molto stemperata sul fondo cielo ed estesa probabilmente > 1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso E; non bisogna andare oltre i 270x (forse addirittura meglio visibile a 188x).
UGC 4781	gx	09h06m34s	+06°18.2'		Hya	24"	buona / buono	molto debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; una stella brillante situata ad appena 2.5' verso S non si riesce a tenere fuori campo; la gx è comunque meglio visibile scalando a 340x.
UGC 4784	gx	09h07m19s	+46°13.4'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme a MCG+8-17-30 e CGCG 238-11, di un terzetto di galassiette allineate in direzione ENE-WSW — più debole e poco più piccola di CGCG 238-11 (osservata per prima), salta fuori a 380x quando si osserva quest'ultima.
UGC 4787	gx	09h07m35s	+33°16.5'	q 103	Lyn	16"	m. buona / buono	debole, chiaramente allungata da N a S, di dimensioni 80"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.

UGC 4797	gx	09h08m11s	+05°55.7'		Hya	24"	buona / buono	è un debolissimo lucore che appare in visione distolta, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
UGC 4798	gx	09h08m42s	+44°48.6'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissima, molto diffusa estesa non più di 40"; appare a tratti in visione distolta con una condensazione centrale molto tenue — 270x.
UGC 4799	gx	09h08m47s	+37°30.0'		Lyn	16"	buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa per ~ 45" in direzione NE-SW; si vede a tratti, ma è meglio scalare a 270x.
UGC 4802	gx	09h08m23s	−01°36.7'		Hya	24"	buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; situata 1.5' a S di una stellina che è la più orientale di una stringa di 4 componenti molto deboli orientate da ENE a WSW) — 400x.
UGC 4804	gx	09h08m37s	−01°45.2'		Hya	24"	m. buona / buono	è di aspetto simile a UGC 4802, dalla quale dista 9' a SSE, ma poco più estesa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata a ridosso SE di una stellina che fa coppia con un'altra della stessa luminosità a ~ 1' NE — 400x.
UGC 4805	gx	09h09m30s	+45°57.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; è situata tra 2 stelline brillanti distanti 16' (lambiscono in pratica il campo del 9.7); a 270x appare sul prolungamento di 2 deboli stelline orientate da N a S: si trova un paio di primi da quella meridionale.
UGC 4807	gx	09h10m05s	+54°34.9'		UMa	16"	ottima / buono	è una bolla circolare molto tenue, di luminosità uniforme e con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 380x.
UGC 4808	gx	09h10m15s	+59°57.2'		UMa	16"	ottima / buono	debolissima e di luminosità uniforme; solo a tratti riesco a capire che è poco allungata da N a S (ossia a perpendicolo con le 3 stelline allineate a NE) con dimensioni ~ 45"×30"; è meglio tuttavia scalare a 270x.
UGC 4809	gx	09h09m20s	+20°41.8'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissima, poco diffusa, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 270x.
UGC 4812	gx	09h10m08s	+50°03.5'		UMa	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda, di luminosità uniforme con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa — 270x.
UGC 4824	gx	09h11m34s	+51°15.2'		UMa	16"	ottima / buono	debolissima, di luminosità uniforme, quasi una edge-on, orientata da E a W con dimensioni 2'×30" — 270x.
UGC 4826	gx	09h10m51s	+02°58.6'		Hya	24"	m. buona / buono	è una debole ma evidente lama di luce orientata da NE a SW, estesa 1' scarso che si diparte da una stellina abbastanza brillante; presenta un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
UGC 4827	gx	09h11m02s	+13°24.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e con nucleo stellare appena percettibile, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina una 40-ina di secondi a S.
UGC 4829	gx	09h11m40s	+46°38.4'		UMa	16"	m. buona / m. buono	abbastanza facile, relativamente compatta, rotonda, con Ø di 30" e con nucleo stellare; c'è una stellina brillante a un paio di primi SW — 270x.
UGC 4830	gx	09h11m18s	+19°17.9'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 4832	gx	09h14m52s	+79°11.8'		Cam	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4837	gx	09h12m10s	+35°32.0'	q 103	Lyn	24"	m. buona / discreto	debolissimo ovale orientato da N a S, di circa 60"×40" e che appare in visione distolta a 340x (a 450x si estingue sul fondo cielo; la visione è purtroppo disturbata dalla SAO 78917 di 7ª grandezza situata a 4' SW e fortunatamente si riesce a tenere fuori campo portandovi al bordo la gx.
UGC 4839	gx	09h11m53s	+16°16.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare estesa ~ 1' e orientata da NE a SW; situata subito a SE di una coppia serrata di stelline brillanti che interferiscono un po' con l'osservazione — 450x.
UGC 4841	gx	09h14m48s	+74°14.0'	q 7	Cam	16"	buona / discreto	debolissimo chiarore evanescente, diffuso, esteso un paio di primi; per poterlo notare, sia pur in visione indiretta, è opportuno non impiegare più di un centinaio di ingrandimenti — 270x.
UGC 4842	gx	09h12m23s	+12°29.9'		Cnc	24"	ottima / discreto	debole lama di luce, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa ~ 45"; c'è una debole stellina a poco più di 1' SSE — 450x.
UGC 4844	gx	09h13m03s	+49°38.3'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è una bolla circolare di almeno 1' di Ø osservabile senza problemi in visione diretta; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline brillanti distanti 1.5' e orientate da E a W — 270x.
UGC 4845	gx	09h12m26s	+09°57.4'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stella brillante quasi a ridosso verso NW — 450x.
UGC 4846	gx	09h13m46s	+62°19.9'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4847	gx	09h16m18s	+79°16.5'		Cam	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa 1' scarso e orientata da E a W; c'è una stellina a 1' verso S; poco disturbata dalla SAO 6790 di 8ª grandezza situata 2.5' a E — 450x.
UGC 4851	gx	09h13m26s	+52°58.9'		UMa	16"	ottima / buono	relativamente brillante, presenta un piccolo bulge abbastanza marcato circonfuso da un piccolo alone rotondo di 30"-35" di Ø; forma un triangolo rettangolo con 2 stelline brillanti situate a N e distanti un paio di primi — 380x.
UGC 4852	gx	09h17m15s	+80°02.1'		Cam	20"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 360x.
UGC 4853	gx	09h13m01s	+20°22.0'		Cnc	16"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1.5' NW di una doppia stretta con le componenti sbilanciate; forse rotonda con Ø di 45" — 270x.
UGC 4857	gx	09h13m13s	+03°13.9'		Hya	24"	buona / discreto	debolissima, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW — più o meno come l'orientamento delle 2 stelle brillanti 6' a N — di dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 200x (a 400x si "spampana" troppo).
UGC 4858	gx	09h13m22s	+19°22.1'		Cnc	24"	ottima / buono	debolissimo lucore di forma indistinta, esteso forse una 40-ina di secondi e situato a ridosso N di una stellina; appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
UGC 4860	gx	09h13m48s	+29°10.3'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
UGC 4861	gx	09h13m36s	+12°26.4'		Cnc	24"	m. buona / buono	relativamente brillante, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 4864	gx	09h14m13s	+16°44.6'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø > 1' — 400x.
UGC 4866	gx	09h14m37s	+36°06.2'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce di dimensioni 40"×10", orientata da NE a SW che salta fuori con relativa facilità in visione distolta a 380x quando si osserva CGCG 180-62 situata un paio di primi a W.
UGC 4867	gx	09h14m43s	+40°52.8'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è un debolissimo lucore molto diffuso esteso meno di 1' che si diparte verso SW da una stellina; è ubicata 6.5' WSW di NGC 2785 che non scherza in fatto a debolezza! È molto allungata da NW a SE, con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile subito a N) — 270x.
UGC 4869	gx	09h14m34s	+30°08.4'		Cnc	16"	buona / m. buono	molto allungata all'incirca da NE a SW, di dimensioni 70"×20", bulge evidente e nucleo stellare brillante — 380x.
UGC 4870	gx	09h14m56s	+46°54.2'		UMa	16"	m. buona / m. buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", di luminosità uniforme salvo una condensazione centrale molto tenue che appare però solo a tratti — 270x.
UGC 4872	gx	09h15m01s	+40°02.2'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debole lama di luce di aspetto uniforme orientata da N a S ed estesa 1.5' — 495x.
UGC 4873	gx	09h14m41s	+15°27.7'		Cnc	24"	buona / buono	relativamente brillante, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; c'è una doppia stretta e sbilanciata a 1.5' S e un'altra stellina abbastanza brillante alla stessa distanza verso W — 450x.
UGC 4879	gx	09h16m03s	+52°50.5'		UMa	16"	ottima / buono	debolissimo lucore di luminosità uniforme, approssim. rotondo con Ø di > 1', osservabile in visione distolta a 270x.
UGC 4881	gx	09h15m56s	+44°20.0'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa con Ø di ~ 40"; c'è una debole stellina a un paio di primi verso NW — 270x.
UGC 4883	gx	09h18m32s	+74°19.1'		Cam	16"	buona / discreto	relativamente brillante, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con piccola condensazione centrale abbastanza marcata — 270x.
UGC 4884	gx	09h15m55s	+10°08.0'		Cnc	24"	buona / buono	molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; è allineata con 2 deboli stelline a N — 450x.
UGC 4889	gx	09h52m21s	+39°52.3'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, estesa 45", ma visibile con grande difficoltà; presenta una zona centrale appena più brillante; c'è una stellina a ridosso verso NE; la gx è situata tra 2 stelline brillanti distanti 4' e orientate da NNE a SSW — 270x.
UGC 4890	gx	09h16m11s	+06°19.7'		Hya	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, assai stemperata sul fondo cielo, orientata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a ridosso verso N e un'altra a ridosso SW; una terza di eguale luminosità si trova a poco più di 1' verso S — 450x.
UGC 4892	gx	09h16m51s	+45°42.0'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debole e con gradiente di luce molto basso, diffusa, forse poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" — 270x.
UGC 4895	gx	09h16m50s	+27°29.4'		Cnc	16"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dm 60"×20"; presenta un tenuissimo bulge visibile a tratti; c'è una debole stellina a 1' NW — 380x.
UGC 4896	gx	09h18m23s	+69°48.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole lama di luce poco più brillante all'interno e orientata da NW a SE per quasi 2'; c'è una stellina a ~ 1' NE — 380x.
UGC 4900	gx	09h16m40s	+07°15.9'		Cnc	24"	buona / buono	debole e molto diffusa, a tratti leggermente condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4902	gx	09h17m05s	+25°25.7'		Cnc	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" con bulge diffuso abbastanza contrastato — 380x.
UGC 4904	gx	09h17m22s	+41°54.6'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debole, ma facilmente individuabile, orientata da SE a NW di dimensioni 60"×45", molto stemperata sul fondo cielo e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
UGC 4906	gx	09h17m40s	+52°59.6'		UMa	16"	ottima / buono	è una gx incredibilmente facile per essere una UGC — molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", abbastanza netta ai bordi e con bulge diffuso, poco contrastato sul disco — 380x.
UGC 4907	gx	09h16m58s	+16°18.2'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, a tratti leggermente condensata, rotonda con Ø > 20" — 450x.
UGC 4912	gx	09h17m30s	+25°58.0'		Cnc	16"	buona / m. buono	relativamente facile e compatta, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare osservabile a 380x.
UGC 4915	gx	09h17m29s	−00°37.2'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 4917	gx	09h18m16s	+47°56.9'		UMa	16"	m. buona / buono	piccolo oggetto circolare, molto debole, esteso 30" che appare quando si fissa lo sguardo su una stellina situata ~ 1' a SE — 270x.
UGC 4918	gx	09h19m18s	+69°48.1'		UMa	16"	ottima / ottimo	elusiva chiazza forse rotonda ed estesa per 1' scarso che appare a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x; c'è una stellina a 1' SE.
UGC 4919	gx	09h18m14s	+45°39.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, ma visibile senza problemi in visione distolta, forse rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 4922	gx	09h18m36s	+47°52.3'	q 71	UMa	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima macchia lattiginosa appena visibile, molto diffusa, orientata da NE a SW ed estesa ~ 3' — 270x.
UGC 4925	gx	09h18m19s	+17°45.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce, diffusa e di luminosità uniforme, estesa oltre 1' e orientata da E a W; la visione è un po' disturbata da 2 stelle brillanti di 9ª e 10ª grandezza situate rispettivamente a SW e a SE — 450x.
UGC 4927	gx	10h18m54s	+50°01.3'	q 44	UMa	16"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo stellare abbastanza marcato circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di 30" — 270x.
UGC 4937	gx	09h21m37s	+75°07.5'		Cam	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 4938	gx	09h19m11s	+20°14.6'		Cnc	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 4940	gx	09h19m37s	+27°27.3'		Cnc	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, dimensioni 50"×30" e con nucleo di aspetto quasi stellare; c'è una stellina a 1' verso NW — 380x.
UGC 4946	gx	09h19m33s	+05°52.9'		Hya	24"	buona / discreto	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti allungata da NE a SW con dm 60"×30", ma occorre scalare a 340x; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW.
UGC 4950	gx	09h20m08s	+39°09.8'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W — 495x.
UGC 4951	gx	09h21m44s	+71°32.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" — 380x.
UGC 4956	gx	09h20m02s	+01°02.3'		Hya	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e con bulge evidente, allungata da N a S con dimensioni 90"×45"; c'è una stella brillante a un paio di primi SW — 450x.
UGC 4958	gx	09h21m03s	+49°36.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 495x.
UGC 4959	gx	09h20m32s	+07°04.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 4962	gx	09h20m41s	+15°06.0'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø 45" — 450x.
UGC 4965	gx	09h21m07s	+24°18.5'		Cnc	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SW — 450x.
UGC 4967	gx	09h23m17s	+72°03.8'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
UGC 4972	gx	09h21m52s	+33°24.1'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	di aspetto simile a UGC 4974, osservata per prima, e con nucleo di aspetto quasi stellare visibile a 380x.
UGC 4974	gx	09h22m10s	+33°50.9'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e Ø di ~ 45"; c'è una stellina appena percettibile un paio di primi a S — 380x.
UGC 4977	gx	09h22m00s	+03°22.7'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 4978	gx	09h22m06s	+03°53.8'		Hya	24"	buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 400x, ma non riesco a capirne la forma: forse rotonda con Ø di 40"-45".
UGC 4981	gx	09h24m02s	+68°33.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima, appena più contrastata del fondo cielo, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; meglio tuttavia scalare a 270x.
UGC 4982	gx	09h23m03s	+44°33.3'		UMa	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×30" e luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1' verso ESE — 270x.
UGC 4985	gx	09h22m53s	+21°58.0'		Leo	16"	ottima / m. buono	molto debole, poco contrastata sul fondo cielo e di luminosità leggermente irregolare, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a ~ 1' verso W e un'altra di egual luminosità a 2' SE — 380x.
UGC 4990	gx	09h24m06s	+62°01.8'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 4991	gx	09h23m24s	+22°18.8'		Leo	24"	m. buona / buono	rotonda, diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti e Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 4993	gx	09h23m14s	+02°36.1'		Hya	24"	buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 400x, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 400x.
UGC 4994	gx	09h23m35s	+24°45.7'		Leo	16"	buona / m. buono	fa parte di un terzetto assieme a CGCG 121-77 e -81 — debole allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge diffuso appena percettibile a 380x.
UGC 4996	gx	09h23m16s	−00°43.7'		Hya	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 400x.
UGC 4998	gx	09h25m11s	+68°23.0'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; ci sono 3 stelline brillanti quasi allineate ed equidistanti a N — 450x.
UGC 5002	gx	09h24m22s	+28°17.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" — 380x.
UGC 5003	gx	09h24m14s	+11°06.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, situata a ridosso N di una stellina; a tratti appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 5009	gx	09h24m45s	+20°01.7'		Leo	16"	buona / ottimo	elusiva, osservabile in visione distolta ed estesa una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW che a 380x sembra a tratti doppia.
UGC 5012	gx	09h25m14s	+17°35.9'		Leo	24"	m. buona / buono	debole lama di luce relativamente compatta, con nucleo stellare visibile a tratti a 450x, orientata da NW a SE per almeno 1'.
UGC 5013	gx	09h26m17s	+61°22.9'		UMa	24"	m. buona / ottimo	appare molto stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; c'è una debole stellina a ridosso S — 450x.
UGC 5015	gx	09h25m48s	+34°16.6'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza rotonda di almeno 1' di Ø che si stacca a fatica dal fondo cielo; è osservabile in visione distolta, ma è meglio scalare a 188x; c'è una stellina a 1' verso SW.
UGC 5016	gx	09h26m09s	+49°18.6'		UMa	24"	discreta / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a 1' verso SE — 450x.
UGC 5020	gx	09h26m01s	+34°39.2'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20", ma è meglio scalare a 270x.
UGC 5023	gx	09h26m01s	+19°23.0'		Leo	16"	buona / ottimo	relativamente facile, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; è rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso verso NE (che fa parte di una coppia con componenti separate da 1') — 380x.
UGC 5025	gx	09h26m03s	+12°44.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola e relativamente brillante, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare marcato; si trova in mezzo a 2 stelle: una brillante a 1.5' NE e l'altra più debole a SW — 450x.
UGC 5026	gx	09h26m40s	+45°50.7'		UMa	16"	m. buona / m. buono	facile, diffusa, grosso modo rotonda con evidente nucleo stellare e Ø max di 40"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline distanti 4' in direzione ENE-WSW — 270x.
UGC 5027	gx	09h26m17s	+03°08.0'		Hya	24"	m. buona / buono	lama di luce molto tenue e uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' scarso; c'è una stellina subito a E (la quale fa parte di un piccolo asterismo foggiato a "Y") — 450x.
UGC 5028	gx	09h27m51s	+68°24.7'	q 23	UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, appare quasi screziata a 450x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 5029	gx	09h28m02s	+68°25.2'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 80"×40" (situata 1' a ENE della precedente) — 450x.
UGC 5032	gx	09h26m45s	+01°09.2'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce di aspetto uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1'; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
UGC 5035	gx	09h27m10s	+21°35.7'		Leo	16"	buona / ottimo	debolissima, molto piccola, estesa non più di 20" e di aspetto un po' confuso; c'è una stellina subito a E — 380x.
UGC 5044	gx	09h27m44s	+12°17.2'		Leo	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con Hickson 38C situata a ridosso E — le due galassiette si fondono insieme in una chiazza molto diffusa, orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; solo a momenti appaiono due condensazioni molto ravvicinate e appena percettibili: quella della UGC è più evidente; c'è una stellina a ridosso NW della coppia — 450x.
UGC 5045	gx	09h28m10s	+44°40.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e con piccola condensazione centrale molto tenue; una stellina abbastanza brillante si trova 2' a N e un'altra della stessa luminosità a 2.5' verso SE — 495x.
UGC 5046	gx	09h28m07s	+17°11.8'		Leo	16"	buona / buono	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 5048	gx	09h28m37s	+38°32.4'		LMi	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme, osservabile a tratti in visione distolta, orientata da N a S ed estesa meno di 1'; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SE — 380x.
UGC 5052	gx	09h31m14s	+73°48.6'		Dra	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 60"×30" e con tenue condensazione centrale visibile a tratti a 380x; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SE e un'altra più debole a NW (è appena tramontata la Luna).
UGC 5055	gx	09h30m12s	+55°51.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda, con condensazione centrale evidente, nucleo stellare abbastanza marcato e con Ø di ~ 40" — 380x.
UGC 5058	gx	09h31m22s	+67°46.9'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme e di aspetto a tratti un po' irregolare, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15"; è situata in mezzo a 2 stelline orientate all'incirca nella stessa maniera: quella a W è più brillante — 450x.
UGC 5061	gx	09h31m34s	+67°37.5'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante e compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; si trova praticamente in mezzo a 2 stelle: una molto brillante a ESE e l'altra più debole a NW.
UGC 5068	gx	09h34m36s	+81°08.7'		Dra	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø > di 1' — 380x.
UGC 5069	gx	09h30m36s	+06°07.3'		Hya	24"	m. buona / ottimo	presenta un alone molto tenue e una condensazione centrale marcata con al centro un nucleo stellare; orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 5070	gx	09h31m13s	+30°01.3'		Leo	16"	m. buona / buono	debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante 1.5' a E — 380x.
UGC 5074	gx	09h31m53s	+29°47.6'		Leo	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 40"-45" — 270x.
UGC 5075	gx	09h31m42s	+04°30.0'		Hya	24"	m. buona / buono	relativamente brillante, poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo quasi stellare; è rotonda con Ø di 45" — 400x.
UGC 5082	gx	09h32m21s	+10°48.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15"; purtroppo è disturbata da una stellina brillante al bordo S e come se non bastasse c'è anche la SAO 98629 di 8ª grandezza situata un paio di primi a S — 450x
UGC 5083	gx	09h32m19s	+00°19.0'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E e una più debole subito a N — 450x.
UGC 5083A	gx	09h56m37s	+88°10.3'		UMi	24"	ottima / m. buono	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, estesa ~ 1', ma di forma indistinta; disturbata da una stellina brillante al margine SE; occorre comunque scalare a 340x; a 7' verso W si nota un gruppo disperso di una decina di stelle a guisa di un piccolo ammasso aperto orientato in direzione N-S.
UGC 5084	gx	09h32m59s	+27°30.0'		Leo	24"	buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una coppia di stelline subito a SW e un'altra più distante con componenti abbastanza brillanti a un paio di primi SE; poco meglio contrastata scalando a 380x.
UGC 5088	gx	09h33m26s	+34°02.9'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e poco più brillante all'interno — 380x.
UGC 5090	gx	09h33m52s	+46°51.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' WSW — 495x.
UGC 5091	gx	09h33m51s	+44°15.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×15", molto diffusa alle due estremità E e W e con una stellina proprio al centro a meno che non si tratti del nucleo) — 495x.
UGC 5093	gx	09h34m00s	+10°01.8'		Leo	16"	ottima / discreto	debole, ma relativamente facile da vedere, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 270x.
UGC 5094	gx	09h34m14s	+24°13.6'		Leo	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare meglio contrastata a 270x.
UGC 5097	gx	09h34m11s	+00°14.5'		Hya	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 5099	gx	09h34m34s	+00°05.4'		Hya	24"	buona / m. buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W e di dimensioni simili a UGC 5097 — 400x.
UGC 5100	gx	09h34m39s	+05°50.4'		Hya	24"	buona / buono	allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; c'è una doppia stretta dalle componenti molto sbilanciate subito a N e una stellina quasi a ridosso verso SE — 400x.
UGC 5107	gx	09h35m07s	+05°07.2'		Hya	24"	buona / buono	debolissima, in visione distolta appare chiaramente molto allungata da NE a SW, con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme — 400x.
UGC 5108	gx	09h35m26s	+29°48.7'		Leo	16"	buona / m. buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 50"×40"; è situata 1' SE di una stellina abbastanza brillante che fa parte di un asterismo foggiato a "y" o "I" rovesciato — 380x.
UGC 5110	gx	09h37m21s	+73°23.1'		Dra	20"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza di forma indistinta, estesa < 30" e con una stellina appena percettibile subito a SW — 360x.
UGC 5116	gx	09h36m07s	+03°00.7'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con nucleo appena percettibile; situata a metà del lato settentrionale di un piccolo triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta a W — 450x.
UGC 5119	gx	09h37m12s	+38°05.5'		LMi	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, molto piccola e compatta, con condensazione centrale abbastanza marcata, rotonda con Ø di 20" — 380x.
UGC 5123	gx	09h37m09s	+19°50.2'		Leo	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, leggermente condensata, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
UGC 5124	gx	09h37m12s	+21°40.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, con nucleo stellare appena percettibile, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso NE; una brillante si trova a 1' NW — 450x.
UGC 5128	gx	09h44m06s	+83°48.5'		Cam	20"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 40"; c'è una stella brillante 4' a NW (la SAO 1559 di magnitudo 8.5) che non si riesce a tenere fuori campo; le 3 stelle brillanti quasi allineate situate 8' a SE (SAO 1575, 1577 e 1580 di grandezza tra la 7ª e la 9ª) non creano invece problemi all'osservazione — 360x.
UGC 5129	gx	09h37m58s	+25°29.7'		Leo	16"	ottima / m. buono	è abbastanza facile, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 30" — 380x.
UGC 5133	gx	09h38m24s	+43°30.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente brillante, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge molto contrastato — 495x.
UGC 5135	gx	09h38m36s	+43°10.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	chiazza rotonda molto debole, con Ø di 30"-35" situata tra due stelle brillanti orientate da NE a SW e distanti un paio di primi — 495x.
UGC 5138	gx	09h38m31s	+02°34.4'		Hya	24"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce di aspetto pressoché uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' — 450x.
UGC 5139	gx	09h40m29s	+71°11.0'	q 23	UMa	16"	m. buona / scarso	è un lucore estremamente debole, esteso forse un paio di primi e visibile solo a momenti con grande difficoltà; non bisogna comunque eccedere i 188x e non scendere sotto quel valore per non incrementare la luminosità del fondo cielo.
UGC 5145	gx	09h39m34s	+48°25.3'		UMa	16"	m. buona / buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30", con bulge appena più brillante e nucleo stellare visibile solo a tratti; in visione distolta sembra posta di taglio — 270x.
UGC 5148	gx	09h39m34s	+11°30.6'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme estesa ~ 1' e orientata da NE a SW; appare facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 5150	gx	09h40m31s	+47°30.6'		Lyn	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20": occorre fissare lo sguardo sulla stellina situata quasi a ridosso verso S; meglio visibile a 450x.
UGC 5151	gx	09h40m27s	+48°20.3'	q 71	UMa	16"	m. buona / buono	brillante, compatta, rotonda, con basso gradiente di luce e con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
UGC 5156	gx	09h40m33s	+25°29.4'		Leo	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
UGC 5157	gx	09h40m58s	+47°37.2'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto tenue, di luminosità uniforme che in visione distolta sembra estendersi per oltre 1' in direzione NNE-SSW (non sono riuscito a vedere la U 5150 che ho però osservato, seppure al limite, nel 24") — 270x.
UGC 5161	gx	09h40m56s	+27°46.6'		Leo	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, più che altro disturbata dalla SAO 80965 di 9ª grandezza situata 1.5' a N; è di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; un nodulo o una stellina appare solo a momenti a ridosso N — 450x.
UGC 5162	gx	09h41m00s	+27°46.2'		Leo	24"	buona / buono	debolissima e molto piccola, estesa sì e no 15", appare in visione distolta a SE della precedente — 450x.
UGC 5164	gx	09h40m50s	+11°33.2'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 5165	gx	09h41m00s	+21°11.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 5170	gx	09h41m16s	+02°49.3'		Hya	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme; solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×15"; tutto sommato resta meglio evidente a 450x.
UGC 5172	gx	09h41m52s	+48°40.2'	q 71	UMa	16"	buona / buono	tutto ciò che sono riuscito a vedere è un piccolo oggetto estremamente debole, diffuso, rotondo con Ø di una 40-ina di secondi e una stellina a ridosso verso N — 380x.
UGC 5173	gx	09h41m32s	+11°24.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa per oltre 1'; appare facilmente in visione distolta, meglio a 450x.
UGC 5177	gx	09h41m54s	+11°38.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è un tenuissimo baffo di ~ 30"×10" e orientato da N a S che aggetta verso N da una stellina; una stella brillante si trova subito a S e disturba un poco la visione 450x.
UGC 5182	gx	09h42m25s	+04°17.0'		Sex	24"	buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare — 400x.
UGC 5185	gx	09h42m55s	+28°58.9'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30"; meglio visibile a 270x (a 380x si stempera troppo).
UGC 5187	gx	09h43m06s	+41°05.6'		LMi	16"	buona / m. buono	è una debole chiazza di luminosità uniforme e di aspetto un po' confuso, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 5188	gx	09h44m10s	+65°58.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 30", compatta e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 380x.
UGC 5189	gx	09h42m57s	+09°28.4'		Leo	24"	buona / buono	debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo, orientata da E a W e di dimensioni grosso modo 80"×40"; appare facilmente in visione distolta quando si osserva MCG+2-25-21 situata 1.5' a NW, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 5192	gx	09h43m09s	+21°10.9'		Leo	16"	ottima / m. buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30"; c'è una coppia di stelline a poco più di 1' verso S, ma la componente a W è appena percettibile — 270x.
UGC 5193	gx	09h43m33s	+39°24.9'		LMi	28"	m. buona / discreto	debole chiazza molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' verso S — 495x.
UGC 5195	gx	09h43m12s	+00°24.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1'; meglio evidente a 450x.
UGC 5198	gx	09h43m57s	+41°41.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con un'evidente condensazione centrale allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 495x.
UGC 5199	gx	09h43m57s	+42°40.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 495x.
UGC 5203	gx	09h46m55s	+79°48.6'		Dra	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata in direzione E-W per un paio di primi, meglio osservabile in visione distolta a 270x; a tratti sembra di vedere qualcosa di puntiforme verso W, ma è praticamente impossibile sapere se trattasi del nucleo o di una stellina a ridosso.
UGC 5204	gx	09h43m51s	+09°39.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è un tenuissimo alone circolare con Ø di una 30-ina di secondi attorno al una stella brillante; l'effetto si nota maggiormente in visione distolta a 570x.
UGC 5211	gx	09h44m39s	−00°13.3'		Sex	24"	m. buona / ottimo	si trova purtroppo a ridosso di una stellina brillante che ne offusca un po' la visione; appare comunque facilmente il nucleo diffuso che in visione distolta sembra immerso in una debole chiazza lattescente che si confonde in parte con l'alone stellare; meglio evidente spingendo a 580x.
UGC 5213	gx	09h44m57s	+16°42.5'		Leo	24"	buona / buono	diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45" — 400x.
UGC 5215	gx	09h45m14s	+09°06.7'		Leo	24"	buona / buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×30" e con tenue bulge diffuso poco contrastato — 400x.
UGC 5216	gx	09h45m23s	+09°46.0'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, facilmente osservabile in visione distolta anche se è preferibile scalare a 340x; allungata da N a S con dimensioni 60"×30".
UGC 5218	gx	09h45m30s	+06°22.6'		Sex	24"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 60"×30"; meglio tuttavia scalare a 340x.
UGC 5225	gx	09h46m28s	+45°45.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, molto diffusa rotonda con Ø di 45" e con piccolo bulge molto contrastato; c'è una stellina subito a E e una a 1.5' verso NW — 495x.
UGC 5226	gx	09h46m04s	+04°24.2'		Sex	24"	buona / m. buono	relativamente compatte e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
UGC 5228	gx	09h46m04s	+01°40.1'		Sex	24"	buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30" e con debole bulge diffuso, poco contrastato sul disco — 400x.
UGC 5232	gx	09h46m45s	+13°46.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge stellare — 450x.
UGC 5234	gx	09h46m50s	+16°02.6'		Leo	24"	buona / ottimo	chiazza molto tenue e diffusa, appare facilmente solo in visione distolta, in quanto è disturbata da una stella brillante situata proprio al bordo E; orientata grosso modo da E a W dimensioni 50"×40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
UGC 5236	gx	09h47m00s	+21°43.8'		Leo	24"	buona / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, di forma indistinta ed estesa una 30-ina di secondi; appare solo a momenti in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 5237	gx	09h47m20s	+46°36.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×30"; allineata ed equidistante con una coppia di stelline a NE (quella più esterna è più debole); una stellina più evidente si trova 1.5' a NNW (ossia seguendo l'asse della gx); a 3' SE c'è poi una coppia di stelle brillanti — 495x.
UGC 5238	gx	09h46m54s	+00°30.4'	q 233	Sex	16"	ottima / discreto	è un debolissimo lucore di forma indistinta, esteso sì e no 1' che appare solo a tratti in visione distolta tra una stellina abbastanza brillante e un'altra molto debole situata 4' a E — 270x.
UGC 5241	gx	09h47m58s	+54°00.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	è una debole chiazza rotonda, relativamente facile e compatta, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 40" — 380x.
UGC 5245	gx	09h47m34s	−02°01.9'		Sex	24"	m. buona / buono	è un'elusiva lama di luce estesa probabilmente oltre 1' e orientata da N a S, visibile con gran difficoltà in visione distolta a 280x; situata grosso modo tra 2 stelline: una a N e l'altra, appena percettibile, a S.
UGC 5246	gx	09h47m49s	+23°43.3'		Leo	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelline a N e SW; disturbata dalla SAO 81015 di 6.5m che però si riesce a tenere fuori campo a 380x.
UGC 5247	gx	09h49m17s	+69°25.3'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta sembra aggettare verso NW da una stellina brillante; è molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" (la gx appariva, debolissima, anche nel 16") — 400x.
UGC 5249	gx	09h47m45s	+02°37.6'	q 233	Sex	16"	ottima / discreto	è una debole lama di luce di luminosità uniforme orientata da N a W ed estesa un paio di primi, che arriva quasi a lambire la più orientale di una coppia di stelline distanti 45" e situate in direzione E-W — 270x.
UGC 5252	gx	09h48m58s	+41°26.8'		UMa	16"	m. buona / buono	debolissima, molto diffusa, estesa non più di 30"; appare a tratti in visione distolta a poco più di 1' NE di una stellina percettibile — 270x.
UGC 5257	gx	09h49m26s	+21°40.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina evidente al bordo N — 450x.
UGC 5260	gx	09h50m36s	+64°29.3'		UMa	16"	buona / discreto	debolissima galassietta allungata ~ da E a W che appare a tratti in visione distolta a 380x; è disturbata dalla luce di una coppia di stelline brillanti distanti 1.5 con le quali è allineata verso S.
UGC 5267	gx	09h49m53s	+09°05.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a ridosso verso E — 450x.
UGC 5268	gx	09h50m56s	+62°11.1'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; due stelline appena percettibili a ridosso N e NW — 450x.
UGC 5270	gx	09h49m55s	+09°09.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MCG+2-25-42 situata quasi a ridosso verso W (v. voce corrispondente) — poco diffusa, con tenue nucleo stellare, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina evidente al bordo W e un'altra appena percettibile subito a NW — 450x.
UGC 5272	gx	09h50m22s	+31°29.2'	q 104	Leo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, situata tra 2 stelline che si trovano alle estremità dell'asse della galassia; è di dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 5274	gx	09h50m11s	+16°17.2'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di ~ 45" — 450x.
UGC 5276	gx	09h50m42s	+30°29.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
UGC 5277	gx	09h51m40s	+65°29.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore rotondo con Ø forse > 1' e di luminosità uniforme; bisogna scalare a 270x; forma un piccolo triangolo isoscele coi cateti di 1' con 2 stelline: una brillante a W e una più debole a SW.
UGC 5278	gx	09h50m45s	+22°45.3'		Leo	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni approssim. di 40"×20"; 380x se non altro per scurire il fondo cielo: sta sorgendo la luna.
UGC 5281	gx	09h51m02s	+30°35.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo e debolissimo oggetto di 15"-20" max di Ø che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è situato subito a S di una coppia di stelline ravvicinate.
UGC 5286	gx	09h51m06s	+09°00.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e molto stemperata sul fondo cielo, orientata da NE a SW con dimensioni 60.45; meglio definita scalando a 340x.
UGC 5287	gx	09h51m28s	+32°56.5'		LMi	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza circolare di ~ 45" che tende a confondersi col fondo cielo e che appare solo in visione distolta a 270x.
UGC 5288	gx	09h51m17s	+07°49.6'		Leo	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme,allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ~ 1 NW, ma qualcosa di appena percettibile appare a tratti a ridosso verso N — 450x.
UGC 5290	gx	09h52m04s	+40°51.5'		LMi	28"	ottima / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata al centro di un triangolo equilatero formato da una stella brillante al vertice NW, una coppia a quello E e una stellina più debole a quello S — 495x.

UGC 5291	gx	09h51m53s	+12°56.7'		Leo	24"	buona / ottimo	rotonda con Ø > 30", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
UGC 5294	gx	09h52m18s	+33°03.8'		LMi	16"	buona / m. buono	molto debole, ma abbastanza definita, con una condensazione centrale molto tenue, ma evidente a 380x; è allungata da NW a SE con dimensioni ~ 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SW.
UGC 5295	gx	09h52m54s	+42°50.9'		UMa	16"	buona / m. buono	diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×40" con nucleo quasi stellare abbastanza evidente — 270x.
UGC 5302	gx	09h54m23s	+68°20.0'		UMa	16"	buona / discreto	debole lucore approssim. rotondo con Ø forse maggiore di 1', visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 270x (a 380x è evanescente); c'è una stellina evidente a ridosso verso SW; un'altra stellina più debole si trova a poco più di 1' verso N.
UGC 5304	gx	09h53m09s	+07°52.0'		Leo	24"	buona / mediocre	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 45", solo a tratti poco più brillante all'interno; c'è una debole stellina a 1' NE; c'è un triangolo equilatero di stelle brillanti a 8' NE (vento forte!) — 280x.
UGC 5308	gx	09h53m26s	+07°51.9'		Leo	24"	buona / mediocre	più debole di UGC 5304, dalla quale dista 4' verso E, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è un asterismo di 5 stelline fatto a casetta subito a W (vento forte!) — 280x.
UGC 5309	gx	09h57m09s	+80°44.7'		Dra	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto rotondo molto diffuso, visibile senza problemi in visione distolta a 380x; ha Ø di 30"40" ed è situato all'interno di un piccolo triangolo isoscele molto stretto di stelline brillanti col vertice più acuto che punta a SW.
UGC 5313	gx	09h53m56s	+23°23.0'		Leo	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 30" — 380x.
UGC 5320	gx	09h54m18s	+23°17.2'		Leo	16"	ottima / m. buono	è molto debole, appena contrastata sul fondo cielo e di l; in visione distolta si capisce benissimo che è allungata da E a W con dimensioni 60"×30", ma è meglio scendere a 270x.
UGC 5324	gx	09h54m46s	+13°22.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a momenti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW.
UGC 5326	gx	09h55m25s	+33°15.8'		LMi	16"	buona / m. buono	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo (più evidente tuttavia di UGC 5287); forse rotonda con Ø di ~ 1'; salta fuori senza difficoltà in visione distolta a 270x.
UGC 5330	gx	09h55m34s	+19°17.8'		Leo	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 40"; c'è una doppia stretta a 1' verso S — 380x.
UGC 5339	gx	09h56m22s	+20°29.0'		Leo	16"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 123-6 che, tra l'altro, presenta un piccolo nucleo stellare più evidente; sono entrambe rotonde con Ø di 20" — 380x.
UGC 5340	gx	09h56m46s	+28°49.6'	q 104	Leo	16"	ottima / m. buono	debolissima, osservabile solo in visione distolta, ma a tratti appare una piccola zona interna più brillante di aspetto quasi stellare — 188x.
UGC 5341	gx	09h56m36s	+20°38.7'		Leo	16"	ottima / m. buono	è un'elusiva lama di luce che appare a tratti in visione distolta a 380x, orientata da NE a SW per un paio di primi scarsi; ogni tanto salta fuori qualcosa di puntiforme al centro, ma non capisco se è il nucleo o una debolissima stellina sovrapposta.
UGC 5342	gx	09h56m43s	+15°38.2'		Leo	24"	buona / mediocre	relativamente facile, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e poco più brillante all'interno; situata tra 2 stelline abbastanza brillanti (vento forte!) — 280x.
UGC 5343	gx	09h56m46s	+16°48.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	piccola, debole, ma facilmente. visibile, perché dotata di un nucleo puntiforme di aspetto stellare visibile anche in visione diretta; è rotondeggiante con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ~ 20" a W — 380x.
UGC 5344	gx	09h57m03s	+15°34.7'		Leo	24"	buona / mediocre	debolissima, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta a 280x.
UGC 5345	gx	09h57m36s	+45°13.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×15" e con evidente bulge diffuso; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E (è altresì nota come **Hickson 41A**) — 495x.
UGC 5346	gx	09h57m41s	+45°15.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×15" (altresì nota come **Hickson 41B**) — 495x.
UGC 5347	gx	09h57m16s	+04°31.7'		Sex	24"	ottima / buono	è una lama di luce molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa per ~ 1' — 450x.
UGC 5349	gx	09h58m07s	+37°17.6'	q 104	LMi	16"	buona / m. buono	è un fuso di luce molto debole, di luminosità uniforme, visibile tuttavia senza difficoltà in visione distolta; è orientata da NE a SW con dimensioni 2'×40"; ci sono 2 stelline ravvicinate all'estremità NE: debole quella più interna, brillante l'altra — 380x.
UGC 5354	gx	09h58m53s	+47°44.2'		UMa	16"	buona / m. buono	è un debole lucore molto stemperato sul fondo cielo, di luminosità uniforme, esteso per oltre 1' e orientato da E a W; purtroppo è disturbato dalla luce di una stella brillante situata a poco più di 1' verso N — 270x.
UGC 5358	gx	09h58m47s	+11°23.4'		Leo	24"	buona / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W (ossia come le 2 stelle brillanti a NE e a NW) con dimensioni che in visione distolta arrivano a 80"×40" (vento forte!) — 280x.
UGC 5359	gx	09h58m52s	+19°12.9'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare facilmente allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 5361	gx	09h59m01s	+25°12.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono due deboli stelline poste simmetricamente a SW e SE; allineata con 3 stelline a NE; meglio evidente a 450x.
UGC 5368	gx	10h00m02s	+46°14.3'		UMa	28"	m. buona / buono	presenta un nucleo stellare molto marcato circonfuso da un alone rotondo con Ø di 45", molto diffuso; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
UGC 5370	gx	09h59m40s	+00°32.5'		Sex	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è una stellina evidente a ridosso SE; sembra tuttavia meglio evidente a 450x.
UGC 5373	gx	10h00m00s	+05°19.9'	q 189	Sex	16"	ottima / scarso	è un'estesa chiazza lattescente a bassissima luminanza superficiale, grosso modo rotonda con Ø di un paio di primi; c'è una stellina a ridosso verso — 188x.
UGC 5376	gx	10h00m27s	+03°22.5'		Sex	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso E — 450x.
UGC 5377	gx	10h00m32s	+03°12.3'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø < 1'; c'è una stellina a 1.5' W e un'altra più debole alla stessa distanza verso SE; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5378	gx	10h00m32s	+04°24.5'		Sex	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 5380	gx	10h00m31s	−02°09.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, molto diffusa, orientata da N a S con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×40"; c'è una debole stellina a ridosso SE; più interessante scalando a 340x.
UGC 5381	gx	10h00m52s	+22°18.8'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 380x.
UGC 5382	gx	10h01m03s	+36°37.1'		LMi	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, rotonda con Ø di 45", diffusa, con alto gradiente di luce e nucleo di aspetto quasi stellare; appare poco più contrastata a 270x.
UGC 5383	gx	10h00m45s	+04°44.0'		Sex	16"	ottima / ottimo	molto debole, appena più brillante all'interno, rotonda, diffusa con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 5385	gx	10h01m05s	+16°56.3'		Leo	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto rotondo, di una 30-ina di secondi di Ø, ma estremamente difficile da "tirar fuori", perché il campo è quasi depleto anche a 270x.
UGC 5386	gx	10h02m41s	+70°44.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole chiazza di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; è situata 1.5' S della SAO 7035 di 8ª grandezza — 380x.
UGC 5388	gx	10h01m12s	+00°13.6'		Sex	24"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di 45" — 400x.
UGC 5391	gx	10h01m41s	+37°14.9'	q 104	LMi	16"	ottima / m. buono	è osservabile solo in visione distolta in come un debolissimo alone attorno a una stellina abbastanza brillante (in visione diretta questo scompare completamente); è estesa per una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 380x.
UGC 5393	gx	10h01m42s	+33°08.2'		LMi	16"	buona / m. buono	molto debole; in visione distolta appare appena più brillante all'interno, allungata da ESE a WNW con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina brillante a ~ 1' del margine WNW — 380x.
UGC 5395	gx	10h01m35s	+12°45.9'		Leo	24"	buona / mediocre	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; forma un triangolo rettangolo con 2 stelle brillanti: una a 3' verso W e l'altra a 6' SW (vento forte!) — 280x.
UGC 5396	gx	10h01m41s	+10°45.3'		Leo	24"	buona / mediocre	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30", diffusa e di luminosità uniforme (vento forte!) — 280x.
UGC 5400	gx	10h02m14s	+13°41.8'		Leo	24"	buona / mediocre	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare (vento forte) — 280x.
UGC 5402	gx	10h04m59s	+79°16.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 5403	gx	10h02m35s	+19°10.6'		Leo	16"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; disturbata dalla SAO 98912 di magnitudo 8.5 situata a 3' SW — 380x.
UGC 5406	gx	10h03m55s	+63°35.2'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa 40"-45" e orientata da NE a SW (ossia come la congiungente tra la stellina 3' a ENE e il piccolo triangolo alla stessa distanza verso SW); appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 5408	gx	10h03m52s	+56°26.2'		UMa	16"	m. buona / buono	piccolo oggetto compatto e rotondo, di 15" di Ø, con un nucleo puntiforme visibile a tratti — 270x.
UGC 5409	gx	10h03m03s	+10°44.7'		Leo	24"	buona / mediocre	molto debole e molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15" (in visione distolta pare quasi una edge-on), e con tenue bulge diffuso visibile a tratti a 280x; c'è una debole stellina subito a S (vento forte!).
UGC 5415	gx	10h05m14s	+72°12.0'		UMa	16"	m. buona / discreto	facile, compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e nucleo stellare — 270x.
UGC 5416	gx	10h03m58s	+39°08.7'		LMi	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE e una stella brillante a poco più di 1' sempre a NE che ne disturba un po' l'osservazione — 495x.
UGC 5420	gx	10h03m59s	+22°16.6'		Leo	16"	ottima / m. buono	relativamente facile e compatta, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di 30"; un elusivo "pendaglio" esteso 15" o 20" appare a tratti a una 40-ina di secondi verso S: in effetti si tratta di **MAC 1003+2215** — 380x.
UGC 5423	gx	10h05m30s	+70°22.0'	q 23	UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; allineata ed equidistante con due stelline a SSE — 450x.
UGC 5424	gx	10h04m18s	+03°41.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 5427	gx	10h04m41s	+29°21.7'		LMi	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore molto diffuso, a tratti appena più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di 1'; c'è un piccolo asterismo foggiato a "y" 5' a NW; meglio osservabile a 270x.
UGC 5432	gx	10h04m54s	+05°03.7'		Sex	24"	buona / mediocre	poco diffusa, rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso SW; disturbata dalla SAO 118093 di 7ª situata a meno di 4' SSW e che si fatica a tenere fuori campo (vento forte!) — 280x.
UGC 5434	gx	10h05m13s	+21°27.3'		Leo	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 1' e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 5435	gx	10h06m00s	+58°48.8'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo oggetto luminoso con nucleo stellare brillante su un piccolo disco poco diffuso, allungato da NE a SW di dimensioni ~ 40"×20" — 270x.
UGC 5436	gx	10h05m22s	+19°17.1'		Leo	16"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, con dimensioni 45"×30"; presenta una condensazione centrale molto tenue visibile a tratti a 380x.
UGC 5446	gx	10h06m31s	+32°56.8'	q 104	LMi	16"	m. buona / m. buono	debolissima, orientata come NGC 3118 da cui dista 10' verso SW, ma è di dimensioni 60"×20"; si può vedere in visione distolta più facilmente a 188x.
UGC 5447	gx	10h06m12s	−01°33.2'		Sex	24"	ottima / buono	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare visibile solo a momenti; forma una coppia ravvicinata con MAC 1006-0132, situata subito a N, che è debolissima e più piccola, estesa ~ 20"; si riesce tuttavia a separare dalla compagna solo in visione distolta a 450x.
UGC 5448	gx	10h06m34s	+14°26.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è una chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di forma indistinta, ma più che altro disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata a neanche 1' verso E; in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW che tuttavia a 580x appare chiaramente sfuocata; in effetti, da un controllo successivamente effettuato è risultata essere la piccolissima MCG+3-26-25 — 450x.
UGC 5449	gx	10h07m58s	+68°21.9'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; è un po' disturbata da una coppia di stelle brillanti a N e NE — 450x.
UGC 5451	gx	10h07m19s	+47°00.4'		UMa	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 80"×40" — 270x.
UGC 5453	gx	10h07m07s	+15°59.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo W; allineata ed equidistante con due stelline a S — 450x.
UGC 5454	gx	10h07m11s	+12°39.1'		Leo	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza di luminosità uniforme, appare a tratti in visione distolta, ma occorre scalare a 340x, forse rotonda con Ø > 30".
UGC 5455	gx	10h08m50s	+70°38.1'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore di forma indistinta esteso una 30-ina di secondi; appare in visione distolta a 340x, allineata ed equidistante con due stelline a W; un'altra stellina molto debole si trova a poco più di 1' SW.
UGC 5456	gx	10h07m19s	+10°21.8'		Leo	24"	buona / mediocre	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NNW a SSE (come le 2 stelline abbastanza brillanti situate 2' NNW e 1' SE) con dimensioni 90"×30"; appare a tratti screziata a 280x (vento forte!).
UGC 5459	gx	10h08m11s	+53°05.0'	q 45	UMa	16"	ottima / ottimo	è una bella edge-on, estesa 3' in direzione NW-SE, con un debole bulge appena visibile; c'è una stella brillante al margine orientale — 270x.
UGC 5460	gx	10h08m09s	+51°50.7'	q 45	UMa	16"	buona / discreto	estesa chiazza lattescente di luminosità uniforme e approssim. circolare, che in visione distolta pare situata tra 2 stelline brillanti, orientate da N a S e distanti ~ 3' — 270x.
UGC 5462	gx	10h08m11s	+42°25.1'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15", con bulge abbastanza evidente e un tenue nucleo stellare; c'è una stellina un paio di primi a W *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
UGC 5467	gx	10h08m13s	+18°42.4'		Leo	16"	m. buona / mediocre	rotonda, con Ø di 40", diffusa e gradatamente più brillante al centro; è situata 3' S di una stella brillante di 9a; situata 29' a N di NGC 3131 — 270x.
UGC 5470	gx	10h08m27s	+12°18.5'	q 189	Leo	16"	m. buona / buono	è un diffuso lucore osservabile in visione distolta a 132x, piuttosto estesa e leggermente allungata da E a W con dimensioni 6'×4'; è di luminosità uniforme e appare un po' più netta nella parte meridionale; si riesce comunque a individuare anche mantenendo Regolo nel campo dell'oculare. È meglio nota come Leo I.
UGC 5473	gx	10h08m45s	+09°27.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20" (per confronto le 2 stelline a SE della gx distanti poco più di 1' sono orientate da NE a SW) — 450x.
UGC 5474	gx	10h09m01s	+32°29.5'		LMi	16"	ottima / ottimo	debolissima macchia circolare molto diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 1'; si vede abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
UGC 5476	gx	10h09m14s	+40°21.1'		LMi	16"	buona / m. buono	è una galassietta molto debole e compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" situata a ridosso verso SW di una stellina brillante; questa fa parte di un piccolo asterismo di 4 stelline luminose foggiato a "L" rovesciata ed esteso 5' — 270x.
UGC 5477	gx	10h09m12s	+15°00.3'		Leo	24"	buona / mediocre	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, piccolo bulge marcato, rotonda con Ø di almeno 1'; è situata tra 2 deboli stelline distanti 2.5 e orientate da NE a SW (vento forte!) — 280x.
UGC 5478	gx	10h09m31s	+30°09.1'	q 104	LMi	16"	ottima / m. buono	è una debolissima chiazza molto diffusa, estesa meno di 1', ma comunque indistinta; poco meglio osservabile scalando a 188x.
UGC 5481	gx	10h09m52s	+30°19.2'		LMi	16"	buona / m. buono	in visione distolta appare come una debole lama di luce orientata da E a W per ~ 80" e con bulge appena percettibile; è situata a ridosso verso S di una coppia serrata di stelline brillanti distanti una 30-ina di secondi; è situata 11' NNE di UGC 5478, la gx che stavo cercando e che al momento non avevo visto — 380x.
UGC 5483	gx	10h10m00s	−02°27.8'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 400x.
UGC 5485	gx	10h11m21s	+65°16.7'		UMa	24"	m. buona / discreto	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con bulge diffuso appena più contrastato del disco — 450x.
UGC 5586	gx	10h20m34s	−02°28.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina brillante a 1' ENE; un'altra debole si trova a 1' scarso WSW, ma quest'ultima, a 450x, appare chiaramente sfuocata; da un controllo successivo effettuato è di fatto risultata essere la 2MASS 10203209 -0228231 di 14-esima grandezza.
UGC 5487	gx	10h10m28s	+02°13.7'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 5489	gx	10h10m40s	+20°04.2'		Leo	16"	ottima / m. buono	facile, diffusa e ad alto gradiente di luce, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare osservabile a 380x.
UGC 5490	gx	10h11m30s	+30°47.1'		LMi	16"	m. buona / ottimo	è una gx difficilissima nel senso che a prima vista sembra il consueto alone attorno a una stellina brillante; tuttavia a 380x e in visione distolta si nota, seppure a tratti, che questo alone è in realtà asimmetrico e pare "protrudere" verso SE.
UGC 5493	gx	10h11m18s	+00°26.6'		Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, appena più brillante verso interno, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 5496	gx	10h12m08s	+46°17.6'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 45"×12" (ossia poco superiori a quelle di CGCG 240-14 osservata poco prima, ma con le stesse proporzioni); c'è la SAO 43228 di 10a grandezza a 2.5' NNW; un'altra stellina abbastanza brillante si trova 1.5' verso SE — 495x.
UGC 5498	gx	10h12m04s	+23°05.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge diffuso; una sorta di piccolo "grumo" esteso 10"-15" appare elusivamente e a tratti al bordo NE, ma si tratta in realtà di MAC 1012+2305; ci sono 3 stelline brillanti e allineate a W — 450x.
UGC 5495	gx	10h11m53s	+16°26.4'		Leo	24"	buona / mediocre	debole lama di luce relativamente facile da vedere, con tenue bulge diffuso appena evidente, orientata da E a W ed estesa oltre 2' (vento forte!) — 280x.
UGC 5499	gx	10h12m18s	+27°51.7'		Leo	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30" — 380x.
UGC 5501	gx	10h12m12s	−04°55.4'		Sex	16"	ottima / ottimo	debole chiazza rotonda di luminosità uniforme, poco diffusa e di una 30-ina di secondi di Ø che aggetta a SW di una stellina brillante — 380x.
UGC 5506	gx	10h12m51s	+04°47.7'		Sex	16"	ottima / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
UGC 5508	gx	10h14m09s	+69°06.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a ridosso SW; meglio osservabile a 270x.
UGC 5509	gx	10h13m32s	+20°10.5'		Leo	24"	m. buona / buono	è una lama di luce facile da vedere a 450x, orientata da ENE a WSW per 1.5'; presenta un piccolo nucleo quasi stellare debolmente contrastato.
UGC 5514	gx	10h13m43s	+18°07.5'		Leo	24"	m. buona / buono	è una elusiva lama di luce estesa una 30-ina di secondi in direzione NW-SE; appare a tratti in visione distolta, ma ho dovuto forzare a 570x.
UGC 5515	gx	10h13m38s	−00°55.6'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a ridosso NE (fa parte dell'ammasso AGC 957) — 450x.
UGC 5520	gx	10h15m00s	+65°08.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	è un diffuso lucore, molto stemperato sul fondo cielo, esteso sì e no 1' situato 1.5' NW di una debole stellina; a 3' verso E c'è una stellina doppia con componenti separate da ~ 30" *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
UGC 5521	gx	10h13m53s	+00°33.1'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima e disturbata da una coppia di stelle brillanti situate un paio di primi a SW; in visione distolta appare rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 400x.
UGC 5524	gx	10h14m22s	+22°07.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole ed estesa per ~ 1.5' in direzione NE-SW; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 5522	gx	10h13m59s	+07°01.5'	q 189	Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, a tratti allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×45" — 380x.
UGC 5526	gx	10h14m29s	+15°54.2'		Leo	24"	buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 5528	gx	11h14m40s	−00°49.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE — 450x.
UGC 5529	gx	10h15m04s	+21°10.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa 1' e orientata da NNE a SSW (ossia a perpendicolo con una coppia di stelline situate a NNE distanti poco meno della dimensione della gx).
UGC 5533	gx	10h15m30s	+14°02.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 5535	gx	10h15m45s	+18°56.7'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso S — 450x.
UGC 5530	gx	10h16m09s	+65°55.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30" — 270x.
UGC 5537	gx	10h15m42s	+07°19.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce estesa oltre 1.5' e orientata da NW a SE; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x (a 340x era di fatto più confusa); c'è una debole stellina a un paio di primi verso S.
UGC 5542	gx	10h16m53s	+60°17.1'		UMa	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto e luminosità simili a NGC 3168, dalla quale dista 5' scarsi verso NE, forse appena più debole e con condensazione centrale un po' meno pronunciata; c'è una stellina un paio di primi a W — 450x.
UGC 5543	gx	10h16m20s	+04°49.3'		Sex	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a 1' verso NE — 270x.
UGC 5545	gx	10h16m59s	+49°37.6'		UMa	16"	m. buona / m. buono	osservabile senza difficoltà a ridosso verso W del cateto maggiore di un piccolo triangolo rettangolo di stelline; è poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40" — 270x.
UGC 5547	gx	00h53m55s	+24°46.3'		Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, con dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale puntiforme — 380x.
UGC 5548	gx	10h16m38s	+12°34.6'		Leo	24"	buona / discreto	debole, di luminosità a tratti un po' irregolare, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso ENE — 450x.
UGC 5552	gx	10h17m26s	+17°05.7'		Leo	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva lama di luce orientata da NW a SE ed estesa quasi 1'; appare solo a tratti in visione distolta a 380x.
UGC 5563	gx	10h18m48s	+38°28.3'		LMi	16"	m. buona / m. buono	è molto debole e di luminosità uniforme, ma in visione distolta si vede chiaramente orientata da N a S con dimensioni 60"×30" — 270x.
UGC 5573	gx	10h19m35s	+06°19.6'		Sex	24"	buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W (vento forte!) — 280x.
UGC 5576	gx	10h20m40s	+65°08.8'		UMa	16"	ottima / ottimo	chiazza grosso modo rotonda con Ø di ~ 40" (ossia i 2/3 della distanza delle 2 stelline a S che ho stimato di 1'); è appena più brillante all'interno, ma l'aspetto è un po' confuso; impiegati 380x per scurire il fondo cielo a causa della Luna.
UGC 5578	gx	10h20m18s	+42°49.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e appena più brillante all'interno, orientata da NW a SE ed estesa 1' — 495x.
UGC 5577	gx	10h20m04s	+38°37.0'		LMi	16"	buona / m. buono	debole, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ~ 1.5' verso W; un'altra debolissima, visibile solo a momenti, si trova alla stessa distanza verso N (o NW, è difficile stabilirlo) — 270x.
UGC 5583	gx	10h20m35s	+25°23.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	è una debole lama di luce orientata da E a W, estesa meno di 1', poco diffusa e appena più brillante verso l'interno — 450x.
UGC 5588	gx	10h20m57s	+25°21.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stella brillante a 1' SSE e un'altra poco più debole più o meno alla stessa distanza verso E — 450x.
UGC 5591	gx	10h21m21s	+24°20.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una coppia di stelline a E — 450x.
UGC 5592	gx	10h21m33s	+22°32.8'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5595	gx	10h21m38s	+12°34.6'		Leo	24"	buona / mediocre	molto debole e diffusa, con condensazione centrale appena percettibile, a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; disturbata da una stella brillante di 10ª che non c'è modo di tenere fuori campo (vento forte!) — 280x.
UGC 5596	gx	10h23m44s	+78°52.4'		Dra	16"	ottima / ottimo	presenta un condensazione centrale abbastanza marcata, di aspetto quasi stellare circonfusa da un tenue alone rotondo con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 5597	gx	10h21m52s	+23°51.7'		Leo	16"	discreta / ottimo	debole, ma tutto sommato abbastanza facile da osservare a 380x, molto allungata da N a S per una 40-ina di secondi (praticamente una edge-on), con bulge evidente e nucleo stellare appena spostato verso S (che si tratti di una stellina molto debole sovrapposta?); è situata 4.5' a SSE di NGC 3216.
UGC 5598	gx	10h22m14s	+20°35.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, ma facile da vedere, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 5599	gx	10h22m35s	+43°50.8'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è un asterismo arcuato di 5 stelle a N: la componente più a W è una doppia molto brillante formata dalle SAO 43305-6 rispettivamente di 8ª e 6ª grandezza — 495x.
UGC 5600	gx	10h24m10s	+78°37.7'		Dra	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare abbastanza evidente a 380x.
UGC 5602	gx	10h22m20s	+22°25.3'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissimo baffo esteso una 20-ina di secondi che aggetta verso NW da una stellina brillante; subito a E ce n'è una appena percettibile; un'altra debolissima si trova a S di quest'ultima (ossia a SE della gx) — 450x.
UGC 5604	gx	10h22m41s	+46°14.3'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è un debolissimo lucore esteso per oltre 1' visibile a tratti in visione distolta; ogni tanto appare qualcosa di puntiforme, ma non riesco a capire se trattasi del nucleo o di un a stellina a ridosso; scalando a 132x si riesce comunque a capirne l'orientamento da NE a SW.
UGC 5607	gx	10h22m24s	+03°59.8'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×30", con un bulge diffuso e poco contrastato — 400x.
UGC 5609	gx	10h24m25s	+78°36.6'		Dra	16"	ottima / ottimo	è di aspetto piuttosto confuso, estesa ~ 1' e molto stemperata sul fondo cielo; è situata 1.5' a SSE di UGC 5607 — 380x.
UGC 5611	gx	10h23m07s	+41°50.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, solo a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20"; è disturbata da una stella brillante di 10a grandezza situata un paio di primi a NW; una più debole si trova a 1.5' SW — 495x.
UGC 5612	gx	10h24m07s	+70°53.0'	q 24	UMa	16"	m. buona / mediocre	è una sorta di alone asimmetrico che circonda una stellina brillante di 11a; la gx è ovale, orientata da N a S con dimensioni 2'×1.5' — 270x.
UGC 5615	gx	10h23m47s	+53°06.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MCG+9-17-62**; si riescono a sdoppiare a 380x; la 1ª è leggermente più brillante, di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; la 2ª è di dimensioni simili e presenta nucleo stellare abbastanza evidente in visione distolta.
UGC 5618	gx	10h23m20s	+21°06.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 5619	gx	10h23m33s	+18°06.7'		Leo	16"	ottima / m. buono	debole, orientata da E a W, di dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso N; a 380x il campo oculare è praticamente depleto.
UGC 5625	gx	10h23m49s	+12°37.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline brillanti: una a 1' NW e l'altra a 2' verso W — 450x.
UGC 5627	gx	10h24m09s	+13°34.3'		Leo	24"	m. buona / buono	molto diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e con piccolo nucleo quasi stellare (presenza di un falcetto di luna prossimo al tramonto) — 450x.
UGC 5629	gx	10h24m13s	+21°03.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa e stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare a tratti grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5630	gx	10h25m34s	+70°04.5'		UMa	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è un nodulo oppure una stellina appena percettibile al bordo NW — 450x.
UGC 5632	gx	10h24m33s	+20°08.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 5633	gx	10h24m40s	+14°45.4'	q 190	Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore molto diffuso di aspetto indefinito che, tuttavia, sembra mostrare, in visione distolta, una zona centrale diffusa più evidente; una stellina brillante si trova a poco più di 1' verso SW — 380x.
UGC 5638	gx	10h25m21s	+26°27.6'		Leo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30", diffusa e con tenue condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
UGC 5639	gx	10h25m26s	+17°15.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 5642	gx	10h25m42s	+11°44.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debole lama di luce orientata da E a W, estesa per quasi 1.5' e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 5644	gx	10h25m46s	+13°43.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole e diffusa, con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; altresì denominata Hickson 47A — 450x.
UGC 5645	gx	10h27m11s	+71°25.1'		UMa	24"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 5646	gx	10h25m53s	+14°21.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30", diffusa e di luminosità uniforme; il campo a 400x è poverissimo: l'unico valido riferimento è una coppia di stelle situata 4' o 5' a N.
UGC 5648	gx	10h26m09s	+04°22.4'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 5651	gx	10h26m26s	+17°30.6'		Leo	16"	buona / ottimo	debole chiazza diffusa molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 1', facilmente visibile in visione distolta; un nucleo stellare appare a tratti a 270x.
UGC 5654	gx	10h26m32s	+15°20.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con una stellina appena percettibile a ridosso W; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5655	gx	10h26m37s	+16°08.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, ma facile da vedere a 400x, molto allungata da NE a SW, con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme.
UGC 5656	gx	10h26m50s	+34°55.1'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 70"×30"; c'è una stellina visibile a tratti a 1' SW — 270x.
UGC 5657	gx	10h26m51s	+41°53.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa per oltre 1'; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S — 495x.
UGC 5660	gx	10h26m43s	+01°00.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10"; è meglio contrastata restando a 450x.
UGC 5664	gx	10h27m08s	+00°57.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5667	gx	10h27m29s	+01°15.3'		Sex	24"	m. buona / buono	forma un terzetto abbastanza serrato con MCG+0-27-19 e CGCG 9-48 (v. le apposite sezioni) — rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, relativamente compatta e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso N — 450x.
UGC 5672	gx	10h28m21s	+22°34.3'		Leo	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, molto allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×20"; meglio visibile a 270x.
UGC 5676	gx	10h29m05s	+54°43.2'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo ed estesa una 40-ina di secondi; è osservabile in visione distolta a 380x 1.5' S di una stellina brillante.
UGC 5677	gx	10h28m38s	+03°33.5'		Sex	24"	m. buona / buono	è una sorta di tenuissimo baffo che si diparte a S di una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi; è osservabile solo in visione distolta, anche se non sono riuscito a vedere la parte più a N — 450x.
UGC 5678	gx	10h28m42s	+03°40.7'		Sex	16"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi. La stellina brillante 6' a ENE riportata sull'Uranometria è una doppia stretta — 380x.
UGC 5679	gx	10h28m53s	+26°10.2'		Leo	16"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; meglio visibile a 380x.
UGC 5682	gx	10h31m09s	+78°53.3'		Dra	20"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' N — 360x.
UGC 5683	gx	10h29m16s	+23°43.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 5687	gx	10h29m15s	+06°07.7'		Sex	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce estesa almeno 1' e orientata da WNW a ESE; meglio definita scalando a 340x.
UGC 5688	gx	10h30m25s	+70°03.0'	q 24	UMa	16"	m. buona / mediocre	è un debolissimo lucore molto esteso e di forma indistinta; a tratti appare tuttavia una zona interna appena più brillante di ~ 1' di dimensioni — 270x.
UGC 5689	gx	10h30m46s	+73°53.1'		Dra	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, visibile in visione distolta; è di dimensioni 60"×20", orientata da NW a SE; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso W — 270x.
UGC 5690	gx	10h29m29s	+19°37.4'		Leo	16"	buona / ottimo	è una bolla circolare relativamente facile a 270x, diffusa, con Ø di 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; è allineata con una coppia di stelline a W.
UGC 5691	gx	10h29m27s	+22°00.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare visibile a momenti — 450x.
UGC 5692	gx	10h30m35s	+70°37.2'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima, piccola e diffusa; appare in visione distolta a 380x, forse rotonda con Ø di ~ 30"; è situata quasi a ridosso NW di una stellina brillante (la più occidentale di 3 stelline allineate).
UGC 5693	gx	10h29m49s	+39°00.7'		LMi	28"	m. buona / buono	poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20" e di luminosità pressoché uniforme. Una stellina appena percettibile salta fuori ogni tanto a ridosso W, ma si tratta di PGC 2141493 — 495x.
UGC 5694	gx	10h29m41s	+01°55.2'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, solo in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 60"×30"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline a S e SE — 450x.
UGC 5695	gx	10h29m47s	+13°01.1'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, molto allungata da E a W, con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a meno di 1' SSE e un'altra più debole subito a W — 450x.
UGC 5698	gx	10h30m09s	+44°07.3'		UMa	28"	m. buona / buono	lama di luce molto debole, estesa oltre 1' in direzione NW-SE; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NE — 495x.
UGC 5700	gx	10h31m15s	+72°07.6'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale abbastanza evidente che a tratti appare allungata da N a S (quasi si trattasse di una piccola barra) — 450x.
UGC 5702	gx	10h30m05s	+05°02.9'		Sex	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5707	gx	10h31m14s	+43°08.2'	q 72	UMa	28"	m. buona / buono	debole e molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a ridosso E e una più debole a 1.5' verso N — 495x.
UGC 5708	gx	10h31m13s	+04°28.2'		Sex	24"	buona / m. buono	debolissima lama di luce che si diparte da una stellina brillante (che fa parte di un asterismo di 6 componenti fatto a casetta) e finisce poco dopo un'altra stellina situata quasi 1.5' più a S; la gx è orientata da N a S ed estesa ~ 1.5'; meglio definita a 200x.
UGC 5709	gx	10h31m16s	+19°23.0'		Leo	16"	m. buona / buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a un paio di primi NW di una debole stellina; appare solo a 270x (a 188x il fondo cielo è già troppo chiaro).
UGC 5710	gx	10h31m32s	+24°07.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; situata tra 2 stelle brillanti (a NW e SE) che disturbano la visione — 450x.
UGC 5713	gx	10h31m39s	+25°59.0'		Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso appena più contrastato del disco; forma un piccolo triangolo quasi equilatero con 2 deboli stelline situate rispettivamente 3' SSW e 3' W — 380x.
UGC 5714	gx	10h31m45s	+46°40.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline brillanti a 1.5' SE e 2' scarsi verso S — 495x.
UGC 5715	gx	10h31m35s	+00°28.5'		Sex	24"	buona / m. buono	diffusa, allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×40" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' verso NW — 400x.
UGC 5720	gx	10h32m32s	+54°24.0'	q 46	UMa	16"	m. buona / buono	piccola e compatta, brillante, rotonda con Ø max di 30" e nucleo stellare ben evidente; forma un triangolo equilatero con 2 stelle orientate da NW a SE e distanti 7' — 270x.
UGC 5722	gx	10h32m46s	+58°51.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo abbastanza brillante, quasi stellare, e un alone molto stemperato sul fondo cielo, orientato da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso SE a pochi secondi dal nucleo; un'altra stellina si trova subito a SW; poi ci sono 2 stelline molto deboli a 1.5' verso N e S della gx *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
UGC 5723	gx	10h32m13s	−01°29.6'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 5727	gx	10h33m23s	+64°30.1'		UMa	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 5729	gx	10h32m43s	+19°56.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x, nonostante la presenza della SAO 81407 di 9ª grandezza 3' a NNE.
UGC 5733	gx	10h33m48s	+52°22.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, Ø 35"-40" poco diffusa, con condensazione centrale visibile solo a tratti — 380x.

UGC 5734	gx	10h34m15s	+52°52.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, compatta, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 50"×20" e con marcata condensazione centrale che a 270x appare di aspetto quasi stellare; più interessante a 380x.
UGC 5735	gx	10h33m50s	+12°52.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5736	gx	10h33m51s	−00°33.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina a 1' SSW (la più occidentale nonché la più brillante di un piccolo triangolo quasi rettangolo di stelline); meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5737	gx	10h33m53s	+11°12.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 5738	gx	10h34m30s	+35°15.4'		LMi	16"	m. buona / ottimo	salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x (per scurire al massimo il fondo cielo); appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e con nucleo stellare visibile a tratti; tuttavia a questo ingrandimento il campo è depleto *(presenza di chiarore lunare)*.
UGC 5739	gx	10h34m20s	+13°45.1'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" —380x.
UGC 5740	gx	10h34m46s	+50°46.1'	q 46	UMa	16"	m. buona / buono	è un debolissimo lucore che in visione distolta sembra dipartirsi verso E da una stellina brillante; in visione diretta, invece, appare ogni tanto staccata dalla stella e di dimensioni di 30" o 40" — 270x.
UGC 5744	gx	10h35m05s	+46°34.7'		UMa	16"	buona / m. buono	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
UGC 5745	gx	10h34m45s	−01°58.1'		Sex	24"	buona / m. buono	piccolo oggetto rotondo, poco diffuso, con Ø di 30" e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso S — 570x.
UGC 5746	gx	10h35m08s	+45°05.1'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 1' verso W e una coppia di stelline orientate da N a S a NNE — 495x.
UGC 5749	gx	10h35m39s	+28°33.7'		LMi	16"	buona / ottimo	facile e relativamente compatta, rotonda con Ø di 30" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 5751	gx	10h35m46s	+21°02.9'		Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme salvo un piccolo bulge visibile a tratti; è molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina situata quasi sul prolungamento dell'asse maggiore della gx a 1.5' verso S; meglio contrastata a 270x.
UGC 5754	gx	10h36m13s	+42°39.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
UGC 5757	gx	10h38m09s	+79°22.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è un piccolo asterismo irregolare di 5 stelline subito a N — 450x.
UGC 5759	gx	10h36m34s	+38°26.3'		LMi	16"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di 45" e condensazione centrale di aspetto stellare — 270x.
UGC 5760	gx	10h36m21s	+13°42.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme — 400x.
UGC 5764	gx	10h36m43s	+31°32.8'	q 105	LMi	24"	buona / m. buono	debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo, ma che salta fuori con relativa facilità in visione distolta; appare a tratti allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 60"×30"; meglio contrastata a 200x.
UGC 5765	gx	10h37m30s	+68°49.0'		UMa	24"	buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa almeno 1' in direzione NW-SE; c'è una debole stellina a 1' SW e una percettibile solo a momenti più o meno alla stessa distanza verso NW — 450x.
UGC 5769	gx	10h37m04s	+20°25.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	assieme a UGC 5770 forma una coppia di deboli gx molto diffuse, distanti 1' scarso in direzione NE-SW; sono entrambe rotonde con Ø di 30"-35"; la 2ª presenta una condensazione centrale più marcata e di aspetto stellare; gli aloni tendono a fondersi; c'è una stellina a 1' verso SE — 400x.
UGC 5770	gx	10h37m05s	+20°26.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	v. **UGC 5769**
UGC 5771	gx	10h37m19s	+43°35.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con bulge contrastato; c'è una stellina a 1.5' NE — 495x.
UGC 5772	gx	10h36m57s	+00°13.8'		Sex	16"	m. buona / ottimo	debolissimo ovale di luminosità uniforme, orientato da E a W e di dimensioni grosso modo 45"×30" — 270x.
UGC 5776	gx	10h38m01s	+64°16.0'	q 24	UMa	16"	m. buona / mediocre	rotonda con alto gradiente di luce e Ø di una 30-ina di secondi; presenta un piccolo nucleo puntiforme circonfuso da un tenuissimo alone — 270x.
UGC 5782	gx	10h40m37s	+78°35.9'		Dra	16"	ottima / ottimo	debolissima, quasi elusiva, appare a tratti in visione distolta come un oggetto rotondo, relativamente compatto ed esteso max 20"30" — 380x.
UGC 5783	gx	10h38m05s	+01°44.7'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; situata tra 2 stelline: una a NW e l'altra più debole a S; la distanza tra queste è poco superiore alla dimensione della gx — 450x.
UGC 5784	gx	10h38m07s	+04°53.6'		Sex	24"	ottima / buono	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1' — 450x.
UGC 5787	gx	10h38m26s	−02°34.1'		Sex	24"	buona / m. buono	debolissima, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; appare solo in visione distolta a 400x.
UGC 5788	gx	10h38m47s	+05°41.8'		Sex	24"	m. buona / discreto	sarebbe facile se non fosse disturbata dalla SAO 118410 di magnitudo 7.5 situata a poco più di 2' NNW (e che quindi non si riesce a tenere fuori campo); è allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1.5' verso SW — 400x.
UGC 5790	gx	10h39m05s	+04°38.8'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, meglio contrastata scalando a 340x, rotonda con Ø di 1' scarso.
UGC 5791	gx	10h39m27s	+47°56.8'		UMa	16"	m. buona / m. buono	assieme a UGC 5798 forma una coppia di debolissime gx orientate nello stesso modo, ossia da NE a SW; la 1ª ha dimensioni 45"×15", con nucleo puntiforme visibile a tratti; la 2a, di luminosità uniforme, è di 40"×20" con una stellina quasi a ridosso verso E; tra le due c'è una stella brillante — 270x.
UGC 5793	gx	10h39m18s	+14°50.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme estesa 1' e orientata da N a S; c'è una stellina subito a SSE — 450x.
UGC 5797	gx	10h39m25s	+01°43.1'		Sex	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; salta fuori abbastanza facilmente quando si osserva la debole stellina situata 1.5' a SE — 380x.
UGC 5798	gx	10h39m47s	+47°55.9'		UMa	16"	m. buona / m. buono	v. **UGC 5791**
UGC 5804	gx	10h40m18s	+38°29.2'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, solo appena più brillante all'interno e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a meno di 1' SW; 380x per tener fuori campo una coppia stretta di stelle brillanti situata 5' verso S.
UGC 5806	gx	10h40m38s	+36°20.0'		LMi	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W; più a W ci sono 3 stelline brillanti quasi allineate in direzione NE-SW — 450x.
UGC 5808	gx	10h40m31s	+12°17.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; situata tra 2 stelle distanti 2': una abbastanza brillante a N e l'altra più debole a S — 400x.
UGC 5812	gx	10h40m57s	+12°28.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	è molto debole, ma più che altro disturbata da una stellina brillante situata a ridosso SW e dalla quale sembra aggettare; in visione distolta appare chiaramente allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; il contrasto non sembra migliorare scalando a 340x.
UGC 5813	gx	10h41m09s	+36°22.3'		LMi	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme; in visione distolta appare chiaramente allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 5814	gx	10h42m39s	+77°29.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e poco contrastata sul fondo cielo a causa di 4 stelle brillanti presenti nel campo oculare (le 2 più luminose sono SAO 7191 di 8ª grandezza e SAO 7190 di 9ª); una di queste su trova a 1' SW della gx; è allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con nucleo appena percettibile — 450x.
UGC 5816	gx	10h41m10s	+06°17.4'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole e molto allungata da NW a SE, con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1.5' verso W.
UGC 5818	gx	10h41m16s	+06°21.7'		Leo	16"	m. buona / ottimo	elusiva, appare a tratti a 380x; si trova al vertice ottuso di una piccolo triangolo isoscele formato con CGCG 37-114 a NW (vedi la pagina delle CGCG) e una stellina abbastanza brillante situata 1' a S.
UGC 5819	gx	10h41m51s	+38°43.0'		LMi	16"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce di luminosità uniforme, facilmente visibile in visione distolta, estesa 1.5' e orientata da NW a SE; verso NW punta su un piccolo arco di 3 deboli stelline — 380x.
UGC 5820	gx	10h43m29s	+80°53.5'		Dra	20"	m. buona / ottimo	molto debole, ma più che altro disturbata da una stellina brillante subito a N; in visione distolta appare poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 360x.
UGC 5822	gx	10h41m53s	+21°15.1'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è poco meglio contrastata a 270x.
UGC 5823	gx	10h41m53s	+00°47.6'		Sex	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza tondeggiante di luminosità uniforme e di una 30-ina di secondi di Ø; salta fuori in visione distolta a meno di 1' NE di una stellina; meglio contrastata a 270x; c'è un trapezio di stelle brillanti a 7' verso NE.
UGC 5825	gx	10h42m11s	+23°44.8'		LMi	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e con nucleo stellare, allungata da E a W, di dimensioni 50"×30" — 380x.
UGC 5828	gx	10h42m31s	+15°45.6'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15".
UGC 5829	gx	10h42m42s	+34°27.2'	q 105	LMi	16"	ottima / m. buono	è un debolissimo lucore visibile a tratti in visione distolta (ma sono al limite!); estesa almeno un paio di primi, sembra presentare una tenuissima zona interna leggermente più brillante — 188x.
UGC 5830	gx	10h42m38s	+23°57.1'		LMi	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme e poco contrastata sul fondo cielo, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 5832	gx	10h42m49s	+13°27.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è un bell'ovale poco diffuso e di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 450x.
UGC 5833	gx	10h43m06s	+20°25.4'		Leo	16"	buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere a 380x, abbastanza compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; presenta un nucleo puntiforme visibile a tratti.
UGC 5834	gx	10h43m53s	+69°41.4'		UMa	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' scarso verso SW — 450x.
UGC 5835	gx	10h43m51s	+69°44.8'		UMa	24"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo W; allineata ed equidistante con due stelline a SE — 450x.
UGC 5836	gx	10h43m12s	+21°39.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5838	gx	10h43m25s	+40°46.2'		LMi	16"	buona / m. buono	abbastanza facile, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30", poco diffusa e con nucleo stellare; è situata 2.5' E di una stellina brillante — 270x.
UGC 5839	gx	10h43m30s	+39°41.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15", poco diffusa e con nucleo stellare evidente; situata in una piccola plaga depleta — 495x.
UGC 5841	gx	10h44m56s	+76°41.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno; in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
UGC 5845	gx	10h44m04s	+43°54.2'		UMa	24"	ottima / m. buono	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e con condensazione centrale evidente — 450x.
UGC 5846	gx	10h44m30s	+60°22.1'	q 46	UMa	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva chiazza di forma indistinta, estesa < 1'; appare a momenti in visione distolta, ma è preferibile scalare a 340x.
UGC 5847	gx	10h43m49s	−02°31.6'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
UGC 5848	gx	10h44m23s	+56°25.3'	q 46	UMa	16"	ottima / ottimo	diffusa e assai stemperata sul fondo cielo, appena più brillante all'interno, orientata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio osservabile scalando a 188x.
UGC 5849	gx	10h43m53s	−01°17.6'		Sex	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 5854	gx	10h45m56s	+77°06.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5855	gx	10h44m37s	+26°10.9'		LMi	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata a 380x.
UGC 5858	gx	10h44m49s	+15°57.1'		Leo	24"	m. buona / buono	è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta scalando a 340x, molto diffusa, rotonda con Ø < 1'; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso SE.
UGC 5859	gx	10h45m03s	+43°42.3'		UMa	24"	ottima / m. buono	diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 450x.
UGC 5864	gx	10h45m04s	+10°11.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; allineata ed equidistante con 2 stelline a E: quella più esterna fa parte di un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti il cui vertice più acuto punta verso S — 450x.
UGC 5865	gx	10h45m10s	+04°56.7'		Sex	24"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, appare in visione distolta, ma è meglio restare a 450x, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' verso N.
UGC 5867	gx	10h45m04s	+00°06.3'		Sex	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di ~ 40"; presenta una tenue condensazione centrale visibile a tratti a 270x.
UGC 5868	gx	10h45m47s	+37°12.7'		LMi	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, diffusa, di luminosità uniforme con Ø di 45"; c'è una stellina a meno di 1' verso W che in visione distolta sembra quasi a ridosso della gx (questa stellina fa parte di un piccolo arco di 3 componenti) — 380x.
UGC 5869	gx	10h45m43s	+11°20.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 400x.
UGC 5870	gx	10h45m59s	+34°57.9'		LMi	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, gradatamente più brillante verso l'interno, diffusa, rotonda con Ø di 45" *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
UGC 5872	gx	10h46m09s	+49°32.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 495x.
UGC 5874	gx	10h46m07s	+25°54.3'		LMi	16"	m. buona / m. buono	fa parte di un terzetto — molto debole e di aspetto più uniforme di CGCG 125-5, orientata nello stesso modo — ossia da N a S, ma di dimensioni un poco inferiori — 380x.
UGC 5877	gx	10h47m53s	+76°50.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; è situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti un paio di primi — 450x.
UGC 5881	gx	10h46m43s	+25°55.9'		LMi	16"	m. buona / m. buono	fa parte dello stesso terzetto di UGC 5874 — debole e relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare — 380x.
UGC 5884	gx	10h47m03s	+26°32.6'		Leo	16"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
UGC 5885	gx	10h47m06s	+30°03.2'		LMi	16"	buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
UGC 5886	gx	10h46m51s	−01°23.4'		Sex	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra 2 deboli stelline orientate da NE a SW: quella a SW è più brillante — 380x.
UGC 5888	gx	10h47m46s	+56°05.5'		UMa	16"	buona / m. buono	piccola, debole e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di 30"-35"; è situata subito a S di un piccolo triangolo rettangolo di stelline — 270x.
UGC 5892	gx	10h47m30s	+07°15.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
UGC 5893	gx	10h47m40s	+38°55.9'		LMi	16"	buona / m. buono	rotonda, diffusa, con Ø di 45" e tenue condensazione centrale; è situata a 2' scarsi SW di una stellina brillante — 270x.
UGC 5894	gx	10h47m39s	+26°17.7'		Leo	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 80"×30" e poco più brillante all'interno; meglio tuttavia scalare a 270x.
UGC 5896	gx	10h47m31s	−01°29.5'		Sex	16"	m. buona / ottimo	è debolissima, ma a tratti, in visione distolta, appare chiaramente allungata da NW a SE con dimensioni ~ 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 380x.
UGC 5897	gx	10h47m41s	+11°04.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 2.5'×45" (all'incirca la distanza delle 2 stelline a W e NW) e di luminosità uniforme; appare meglio contrastata scalando a 188x.
UGC 5903	gx	10h48m01s	+28°14.8'		LMi	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente compatta, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×40" — 380x.
UGC 5904	gx	10h48m38s	+66°21.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa 1.5'; c'è una stellina appena percettibile a meno di 1' verso W; osservata a 380x, dopo il tramonto della Luna, mostrava una sorta di "piedino" all'estremità NW. Da un controllo successivamente effettuato sul Megastar questo è effettivamente risultato essere la **MCG+11-13-38B**.
UGC 5907	gx	10h48m58s	+66°05.7'		UMa	24"	m. buona / discreto	è una debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare a tratti poco orientata da N a S con dimensioni di 40"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 5910	gx	10h48m28s	+38°23.8'		LMi	16"	m. buona / buono	appare debolissima e diffusa, estesa ~ 45" con piccolo nucleo appena visibile; c'è una stellina situata un paio di primi scarsi verso SSE (al momento dell'osservazione non era più alta di 30° sull'orizzonte) — 270x.
UGC 5912	gx	10h48m28s	+26°35.1'		Leo	16"	buona / ottimo	debole bolla circolare di luminosità pressoché uniforme e di Ø > 1'; è molto stemperata sul fondo cielo, ma appare abbastanza facilmente a 270x.
UGC 5913	gx	10h48m19s	+00°50.4'		Sex	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; forma un triangolo rettangolo con 2 stelline (a 1.5' ESE e a 2' NE) — 450x.
UGC 5915	gx	10h48m53s	+48°03.2'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge poco contrastato; allineata ma non equidistante con due stelline a S (le più occidentali di un triangolo isoscele molto aperto) — 495x.
UGC 5917	gx	10h48m54s	+46°43.2'		UMa	20"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso W e una più evidente a poco più di 1' verso W — 360x.
UGC 5921	gx	10h49m12s	+27°58.5'		LMi	16"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni ~ 70"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 380x.
UGC 5922	gx	10h49m02s	−00°38.4'		Sex	16"	m. buona / ottimo	debole chiazza rotonda, diffusa con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; ci sono 3 stelline allineate da NW a SE che si trovano subito a N della gx — 380x.
UGC 5923	gx	10h49m07s	+06°55.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" — 450x.
UGC 5924	gx	10h49m12s	+22°01.0'		Leo	16"	buona / ottimo	relativamente facile, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e con evidente condensazione centrale — 380x.
UGC 5926	gx	10h50m45s	+76°56.2'		Dra	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, allungata da E a W con dimensioni 60"×40" e condensazione centrale evidente, diffusa, visibile a 270x.
UGC 5928	gx	10h49m47s	+51°53.6'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NE — 495x.
UGC 5929	gx	10h49m28s	+04°47.9'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; è situata in una piccola zona depleta — 450x.
UGC 5932	gx	10h50m24s	+64°48.6'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; forse poco più evidente a 380x.
UGC 5936	gx	10h50m07s	+36°20.5'		LMi	16"	m. buona / ottimo	presenta un piccolo nucleo quasi stellare abbastanza evidente a 380x e un tenuissimo alone molto stemperato sul fondo cielo con Ø di ~ 1' *(presenza di chiarore lunare)*.
UGC 5939	gx	10h51m33s	+76°55.2'		Dra	16"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da N a S, diffusa, di dimensioni 60"×20" e con tenue condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
UGC 5940	gx	10h56m33s	+05°19.6'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata a 340x.
UGC 5941	gx	10h50m22s	+41°27.8'		UMa	16"	m. buona / buono	piccolo oggetto rotondo di luminosità uniforme, relativamente compatto e con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
UGC 5943	gx	10h50m13s	−01°17.3'		Sex	24"	m. buona / buono	sorta di debolissimo baffo di luce che aggetta verso E di una stellina brillante per una 40-ina di secondi — 400x.
UGC 5944	gx	10h50m19s	+13°16.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è meglio scalare a 340x anche perché il campo è piuttosto depleto.
UGC 5945	gx	10h50m24s	+17°33.9'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo oggetto diffuso, di luminosità uniforme ed esteso una 30-ina di secondi; si vede con gran difficoltà a 270x.
UGC 5946	gx	10h52m00s	+79°09.3'		Dra	16"	ottima / ottimo	è facilmente visibile in visione distolta a 380x, rotonda con condensazione centrale evidente a 380x e con Ø di 40"; forma un sistema doppio con MCG+13-8-47.
UGC 5947	gx	10h50m31s	+19°38.8'	q 145	Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta fissando la stellina situata 2' a S; meglio a 380x per scurire il più possibile il fondo cielo.
UGC 5950	gx	10h50m50s	+15°19.6'		Leo	28"	ottima / ottimo	è un elusivo lucore di forma indistinta, esteso non più di 30" e che appare a tratti in visione distolta all'interno di un piccolo triangolo di deboli stelline, ma poco più spostato verso il vertice N (occupato dalla componente più brillante) — 495x.
UGC 5953	gx	10h51m18s	+44°34.3'	q 73	UMa	16"	m. buona / buono	è una debolissima macchiolina di luce, molto piccola e diffusa, leggermente allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con una stellina a ridosso verso W — 380x.
UGC 5955	gx	10h52m04s	+71°46.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	presenta un piccolo nucleo stellare circonfuso da un alone rotondo con Ø di 45"; si vedeva facilmente anche con la Luna usando 380x.
UGC 5957	gx	10h51m11s	+20°10.2'		Leo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da NW a SW, di dimensioni 60"×30", con bulge diffuso e poco contrastato — 380x.
UGC 5958	gx	10h51m16s	+27°51.0'		LMi	16"	buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce che si vede con difficoltà in visione distolta a 270x; quando il vento mi da tregua appare a tratti orientata da N a S per 1'.
UGC 5974	gx	10h51m35s	+04°35.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e con tenuissimo bulge diffuso (che però si risolve meglio scalando a 200x) molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina brillante a 1' verso SW — 400x.
UGC 5976	gx	10h52m03s	+55°36.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW (ci sono 3 stelline brillanti orientate da N a S a W della gx) — 495x.
UGC 5979	gx	10h52m41s	+67°59.3'	q 34	UMa	16"	m. buona / mediocre	è un debolissimo lucore esteso per 1'.5 che si diparte a SSW di una stellina brillante — 270x.
UGC 5984	gx	10h52m15s	+30°03.4'		LMi	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore di luminosità uniforme, molto stemperato sul fondo cielo, a tratti allungata da NNW a SSE (ossia come le 2 stelline a SW distanti 1') con dimensioni 60"×45"; meglio scalare a 270x. Nettamente più facile la M+5-26-25 situata 1' a NE: è molto piccola, rotonda, di max 25" di Ø e con marcata condensazione centrale — 380x.
UGC 5989	gx	10h52m32s	+19°47.5'		LMi	16"	buona / ottimo	debole, con bulge diffuso appena più contrastato del disco, allungata da NE a SE con dimensioni 60"×30" — 270x.
UGC 5990	gx	10h52m38s	+34°29.0'		LMi	16"	ottima / ottimo	debolissima, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30"; meglio scalare a 270x.
UGC 5991	gx	10h52m48s	+48°36.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; situata tra due stelline brillanti orientate da NW a SE — 450x.
UGC 5994	gx	10h52m33s	+10°01.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa per ~ 1'; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 5998	gx	10h53m09s	+50°17.0'	q 46	UMa	16"	m. buona / buono	è un debole ovale poco più brillante all'interno, di dimensioni 45"×30" e orientato da NW a SE; c'è una stellina brillante a ridosso del bordo meridionale e un'altra molto debole a ridosso di quello opposto — 270x.
UGC 6002	gx	10h54m10s	+37°25.5'		LMi	16"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 270x.
UGC 6003	gx	10h53m04s	+04°37.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo molto brillante di aspetto quasi stellare circonfuso da un piccolo alone rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso SW — 450x.
UGC 6005	gx	10h53m28s	+46°01.2'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare elusivamente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, solo a momenti sembra orientata da NW a SE ed estesa 30" o 40".
UGC 6012	gx	10h53m39s	+26°54.6'		LMi	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole estesa almeno 1' in direzione N-S; un nucleo stellare appare solo a momenti; meglio definita scalando a 340x.
UGC 6013	gx	10h54m00s	+49°39.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
UGC 6014	gx	10h53m42s	+09°43.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta, ma occorre spingere un po' gli ingrandimenti (si fatica molto a vederla a 200x); il contrasto migliore si ha a 280x: a tratti appare allungata grosso modo da E a W con dimensioni 60"×30".
UGC 6015	gx	10h54m03s	+46°01.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di aspetto molto regolare, rotonda con Ø < 40" e appena più brillante all'interno; c'è una debole stellina a 1.5' SW — 450x.
UGC 6020	gx	10h54m14s	+21°08.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto tenue estesa 1' in direzione NE-SW e che a prima vista sembra aggettare da una stella brillante situata a ridosso W — 450x.
UGC 6029	gx	10h55m02s	+49°43.6'	q 73	UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e poco più brillante all'interno — 450x.
UGC 6033	gx	10h55m33s	+42°18.0'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 495x.
UGC 6035	gx	10h55m29s	+17°08.6'		Leo	16"	buona / ottimo	debole, grosso modo rotonda con Ø di 30"-35" e con condensazione centrale abbastanza marcata; c'è forse una stellina al margine occidentale? — 380x.
UGC 6036	gx	10h55m55s	+36°51.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×30" e con bulge diffuso visibile a 380x.
UGC 6038	gx	10h56m10s	+47°23.5'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina un paio di primi a NW — 495x.
UGC 6039	gx	10h56m21s	+56°45.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×15" (praticamente una on-edge); c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 495x.
UGC 6040	gx	10h56m02s	+02°30.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante al bordo NE (la quale si trova al vertice più acuto di un piccolo triangolo rettangolo di componenti brillanti) — 450x.
UGC 6043	gx	10h56m16s	+15°13.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' SW; un piccolo asterismo triangolare di 4 stelline si trova a 2.5' NE della gx — 450x.
UGC 6046	gx	10h56m51s	+06°54.3'		Leo	16"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni ~ 40"×20" e di luminosità uniforme; 3 deboli stelline allineate grosso modo parallelamente all'asse della gx sono situate su un segmento che va da N a W della stessa; meglio visibile a 270x.
UGC 6049	gx	10h57m31s	+05°41.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 6053	gx	10h58m04s	+06°02.8'		Leo	16"	ottima / ottimo	debolissima, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 6057	gx	10h58m11s	+01°36.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø anche questa di ~ 40" e una nucleo stellare molto tenue — 450x.
UGC 6062	gx	10h58m37s	+09°03.0'		Leo	24"	buona / buono	poco allungata da N a S, di dimensioni 50"×40" e con piccola condensazione centrale marcata; c'è una doppia brillante a 5' verso N — 400x.
UGC 6063	gx	10h58m46s	+25°08.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce di luminosità uniforme, estesa per 1' in direzione ENE-WSW; c'è una stellina subito a N — 450x.
UGC 6066	gx	10h58m59s	+06°31.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; meglio tuttavia scalare a 340x, perché a 450x il campo è virtualmente depleto.
UGC 6067	gx	10h59m07s	+01°52.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale. Forma una coppia ravvicinata con MAC 1059+0153 situata a ridosso verso N: questa ultima è debolissima, in visione distolta appare filiforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 6068	gx	10h59m15s	+05°17.5'		Leo	24"	m. buona / buono	allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge diffuso e contrastato; c'è una stellina a 1' verso SW — 450x.
UGC 6070	gx	10h59m46s	+33°23.5'		LMi	16"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, rotonda con 30", poco più brillante all'interno *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
UGC 6071	gx	11h00m00s	+50°03.4'		UMa	16"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di 40"; un piccolo nucleo stellare è visibile abbastanza facilmente — 270x.
UGC 6072	gx	10h59m44s	+10°04.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a NE — 400x.
UGC 6073	gx	10h59m46s	+17°39.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso NE; in visione distolta appare facilmente un lungo baffo filiforme che aggetta a SW per ~ 40" e che di fatto appartiene alla **MAC 1059+1738B** — 450x.
UGC 6074	gx	10h59m58s	+50°54.2'		UMa	16"	m. buona / buono	debole oggetto relativamente compatto, poco allungato da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SE; una stella brillante invece situata a neppure 2' verso W — 270x.
UGC 6075	gx	11h00m11s	+45°44.3'		UMa	16"	m. buona / m. buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo; a tratti in visione distolta appare chiaramente allungata da E a W per oltre 1' — 380x.
UGC 6076	gx	11h00m10s	+45°55.0'		UMa	16"	m. buona / m. buono	più evidente di UGC 6075 — osservata subito prima — diffusa, approssim. rotonda, con Ø di 45" e con nucleo puntiforme visibile a tratti — 380x.
UGC 6078	gx	11h00m04s	+12°14.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20", poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 6081	gx	11h00m19s	+10°02.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e relativamente compatta, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 400x.
UGC 6083	gx	11h00m24s	+16°41.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 570x.
UGC 6084	gx	11h00m32s	+29°41.7'		LMi	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 6086	gx	11h00m34s	+09°57.4'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa ~ 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x.
UGC 6087	gx	11h00m32s	+02°07.0'		Leo	24"	m. buona / buono	rotonda e di luminosità uniforme, di aspetto regolare e Ø di 45" — 450x.
UGC 6090	gx	11h01m52s	+75°12.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con bulge abbastanza evidente anche se poco contrastato — 450x.
UGC 6091	gx	11h00m40s	+09°52.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 400x.
UGC 6093	gx	11h00m48s	+10°43.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso — 400x.
UGC 6097	gx	11h01m23s	+29°47.3'		LMi	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare in visione distolta allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20", poco più contrastata a 270x.
UGC 6100	gx	11h01m34s	+45°39.3'		UMa	16"	m. buona / buono	poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30", appena più brillante all'interno; è disturbata dalla luce di 2 stelle brillanti situate a NW — 270x.
UGC 6101	gx	11h01m56s	+47°05.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	sono 2 baffi di luce molto tenui che aggettano simmetricamente a NW e SW da una stellina brillante per una 20-ina di secondi; un'altra stellina più debole si trova 1.5' a NW — 495x.
UGC 6102	gx	11h01m49s	+28°41.2'		LMi	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta quasi a ridosso SE di una stellina, ma è meglio scendere sotto i 450x.
UGC 6103	gx	11h01m59s	+45°13.7'		UMa	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1.5 NW — 270x.
UGC 6104	gx	11h01m51s	+16°36.4'		Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; meglio visibile a 270x.
UGC 6106	gx	11h02m11s	+45°53.3'		UMa	16"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, per cui in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×30" e con bulge appena più evidente — 380x.
UGC 6109	gx	11h02m35s	+50°35.0'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con basso gradiente di luce; c'è una stellina al bordo SW e una poco più brillante a 1' verso W — 495x.
UGC 6110	gx	11h02m38s	+59°07.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente, poco contrastato sul disco; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
UGC 6111	gx	11h02m32s	+03°06.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole, orientata da N a S, estesa per 1' e con nucleo diffuso appena percettibile — 450x.
UGC 6112	gx	11h02m35s	+16°44.0'	q 191	Leo	16"	discreta / ottimo	è una gx debolissima, ma a tratti, in visione distolta, appare molto allungata da NW a SE per ~ 1'; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso W — 380x.
UGC 6114	gx	11h02m56s	+50°39.5'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare evidente — 495x.
UGC 6117	gx	11h03m10s	+50°12.4'		UMa	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente compatta, grosso modo rotonda con Ø di 40"; c'è una stellina 1' a NW e una brillante prolungando a ~ 3' nella stessa direzione — 270x.
UGC 6119	gx	11h03m14s	+03°20.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare evidente; situata tra due stelline distanti un paio di primi e orientate da E a W — 450x.
UGC 6121	gx	11h03m25s	+39°15.3'		UMa	28"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole, orientata da E a W, estesa 1' e con bulge diffuso abbastanza evidente — 495x.
UGC 6122	gx	11h03m32s	+11°07.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta ~ 1' SE di una stellina, ma occorre scalare a 340x; non sembra comunque più estesa di 30" (situata 5' a NE di NGC 3506).
UGC 6125	gx	11h03m39s	+45°10.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, allungata da NNE a SSW con dimensioni 40"×20", molto diffusa e con bulge poco contrastato *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
UGC 6127	gx	11h04m04s	+49°49.2'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è un diffuso lucore circolare, facilmente visibile ed esteso quasi 1' che si diparte verso NW da una stellina brillante — 270x.
UGC 6130	gx	11h04m09s	+08°22.1'		Leo	24"	buona / buono	debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 1.5' N di una stellina; approssim. rotonda con Ø di ~ 40" — 400x.
UGC 6131	gx	11h04m28s	+44°01.9'		UMa	16"	m. buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme e di aspetto un po' irregolare, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 270x.
UGC 6132	gx	11h04m27s	+38°12.4'		UMa	16"	mediocre / ottimo	molto piccola e con marcato nucleo puntiforme (a 270x può essere addirittura scambiata per una stella!), di Ø probabilmente non superiore a 10" o 15"; a 380x appare verso NE un tenuissimo "pendaglio" appena diffuso; da un controllo effettuato successivamente quest'ultimo è risultato essere la PGC 33453. La visione non sembra particolarmente disturbata dalla 51 UMa situata un paio di primi NNE. Che UGC 6132 si nasconda di fatto dietro una stella di campo?
UGC 6135	gx	11h04m37s	+45°07.6'		UMa	28"	ottima / m. buono	relativamente brillante, diffusa, debolmente screziata all'interno, con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; non sembra disturbata dalla SAO 43604 di 9ª grandezza situata ad appena un paio di primi NNW *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
UGC 6136	gx	11h04m38s	+45°59.1'		UMa	28"	ottima / ottimo	diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×20" e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a ridosso N e una appena percettibile subito a E; una coppia di stelline orientate da NW a SE si trova a 1.5' verso SW — 495x.
UGC 6137	gx	11h04m35s	+16°03.7'		Leo	24"	m. buona / buono	facile, diffusa e con alto gradiente, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e nucleo stellare visibile a tratti; disturbata da una stella brillante di 9ª situata un paio di primi a SSW.
UGC 6138	gx	11h04m40s	+27°43.5'		LMi	24"	m. buona / ottimo	debolissima e stemperata sul fondo cielo, purtroppo molto disturbata dalla SAO 81653 di 8ª situata ad appena 2.5 NNW; a tratti, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 6141	gx	11h04m39s	+05°12.0'		Leo	24"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di ~ 30" e con condensazione centrale visibile a tratti; è purtroppo molto disturbata da una stellina brillante proprio al bordo orientale (e che fa parte di un triangolo rettangolo di stelle di eguale luminosità); la SAO 118644 di magnitudo 7.7 si riesce a tenere fuori campo a 380x.
UGC 6142	gx	11h04m42s	+04°17.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e poco diffusa; presenta una piccola e tenue condensazione centrale — 450x.
UGC 6142A	gx	11h04m45s	+04°17.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	situata sì e no 1' a E di UGC 6142, è relativamente facile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata — 450x.
UGC 6143	gx	11h05m05s	+35°21.9'		UMa	16"	buona / ottimo	è una gx elusiva che solo a tratti in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni approssim. 60"×20", ma occorre scalare a 188x (a 270x è di forma indistinta).
UGC 6145	gx	11h05m34s	−01°51.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, appare in visione distolta ma occorre scalare a 340x; a tratti appare allungata grosso modo da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso SE.
UGC 6149	gx	11h06m05s	+43°19.9'		UMa	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto allungata da E a W, con dimensioni 60"×20" e poco più brillante all'interno; allineata ed equidistante con due stelline a SW — 450x *(c'era ancora un debole chiarore lunare, ma la gx appariva comunque uguale anche dopo il tramonto del falcetto di luna)*.
UGC 6151	gx	11h05m56s	+19°49.6'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissimo lucore diffuso e di forma indistinta, comunque non più esteso di 40"; c'è una stellina al bordo NW; un po' meglio evidente a 340x.

UGC 6152	gx	11h06m07s	+29°56.0'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", luminosità uniforme e con una stellina a ridosso verso S; appare poco più contrastata a 270x, ma diventa più difficile tenere fuori campo la SAO 62405 di 7ª situata 5.5 NW.
UGC 6154	gx	11h07m19s	+76°41.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso S; la gx forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline brillanti a NE e SE — 450x.
UGC 6155	gx	11h06m02s	+04°25.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina brillante all'interno decentrata verso N; un'altra stellina di luminosità simile si trova a 1.5' SE — 450x.
UGC 6156	gx	11h06m31s	+48°39.1'		UMa	28"	m. buona / m. buono	è un debole baffo di luce molto diffuso, orientato da N a S con dimensioni 45"×15"; una coppia serrata di stelline è sovrapposta alla gx — 495x.
UGC 6157	gx	11h06m25s	+17°30.5'	q 146	Leo	16"	discreta / ottimo	un altro un debolissimo lucore molto diffuso, visibile in visione distolta, esteso più o meno quanto la distanza delle 2 stelline brillanti situate a S — 380x.
UGC 6161	gx	11h06m50s	+43°43.4'	q 73	UMa	16"	mediocre / discreto	debolissima, quasi elusiva, in visione distolta appare allungata da NE a SW per oltre 1', ma è molto stemperata sul fondo cielo; meglio contrastata scalando a 188x.
UGC 6162	gx	12h06m53s	+51°12.2'	q 46	UMa	16"	ottima / ottimo	facilmente visibile; è poco estesa, di luminosità uniforme, orientata da E a W, di dimensioni 2'×1'; c'è una stellina brillante a ridosso verso est e un'altra molto più debole a NE — 270x.
UGC 6163	gx	11h06m51s	+23°01.0'		Leo	16"	ottima / ottimo	è un bell'ovale diffuso, appena più brillante all'interno, orientato da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina subito a N — 380x.
UGC 6164	gx	11h06m59s	+23°00.4'		Leo	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto di max 20" di Ø che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 6163 (dalla quale dista un paio di primi verso ESE) — 380x.
UGC 6165	gx	11h07m04s	+45°49.3'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con bulge quasi stellare appena percettibile — 450x.
UGC 6166	gx	11h07m09s	+28°35.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, probabilmente rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme; è meglio visibile a 270x.
UGC 6168	gx	11h07m04s	+07°48.2'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 2' scarsi NW — 450x.
UGC 6169	gx	11h07m03s	+12°03.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 270x.
UGC 6171	gx	11h07m10s	+18°34.2'	q 146	Leo	16"	ottima / ottimo	è una gx debolissima e relativamente estesa appena più contrastata sul fondo cielo, grosso modo orientata da NE a SW con dimensioni 2.5'×45" — 380x.
UGC 6172	gx	11h07m19s	+22°56.5'		Leo	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo molto debole, di una 20-ina di secondi di Ø e con nucleo stellare — 380x.
UGC 6172A	gx	11h07m17s	+22°56.8'		Leo	16"	ottima / ottimo	elusiva e ancora più piccola, appare solo a tratti a 380x tra UGC 6172 e una stellina molto debole.
UGC 6173	gx	11h07m19s	+23°29.0'		Leo	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale quasi stellare abbastanza evidente a 380x.
UGC 6175	gx	11h07m20s	+18°25.8'		Leo	16"	ottima / ottimo	assieme a MCG+3-28-63 forma una coppia di deboli galassiette separate da neppure una 30-ina di secondi in direzione E-W; la 1ª è rotonda con un Ø di max 20", mentre la 2ª è poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
UGC 6176	gx	11h07m25s	+21°39.4'		Leo	16"	ottima / ottimo	facile, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40", molto diffusa, con bulge evidente e nucleo stellare; c'è una stellina brillante a 2' SW — 380x.
UGC 6181	gx	11h07m47s	+19°33.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore molto diffuso e stemperato sul fondo cielo che aggetta verso SW da una stellina; non si riesce a capirne la forma, ma non è comunque più estesa di 40"; meglio non andare oltre i 400x.
UGC 6182	gx	11h08m03s	+53°37.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, poco diffusa, poco più brillante all'interno e con Ø di 45"; c'è una stellina al bordo occidentale — 380x.
UGC 6183	gx	11h08m59s	+35°27.8'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno (forma un triangolo isoscele con 2 stelline: una a 2' scarsi SSE e l'altra a 3' scarsi SW — 380x.
UGC 6184	gx	11h08m08s	+45°59.1'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 6185	gx	11h07m56s	+08°00.1'		Leo	24"	buona / buono	molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme (l'allungamento si apprezza meglio scalando a 200x).
UGC 6186	gx	11h08m17s	+53°49.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina brillante a SSE — 380x.
UGC 6187	gx	11h08m30s	+45°07.8'		UMa	16"	m. buona / buono	è un piccolo oggetto rotondo relativamente facile e compatto con Ø di ~ 30" — 270x.
UGC 6190	gx	11h08m55s	+26°36.7'		Leo	16"	buona / ottimo	facilmente visibile in visione distolta pur restando una gx molto debole; è posta quasi di taglio, di luminosità uniforme ed estesa almeno 1' in direzione E-W — 270x.
UGC 6194	gx	11h09m00s	+22°56.8'		Leo	16"	ottima / ottimo	debole chiazza molto diffusa, appena più brillante all'interno, grosso modo rotonda con Ø di 1"; è disturbata dalla luce di una stellina brillante situata 1.5' a W — 380x.
UGC 6197	gx	11h09m10s	+08°11.1'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile subito a W — 495x.
UGC 6198	gx	11h09m26s	+29°34.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di 40" e poco più brillante all'interno — 380x.
UGC 6199	gx	11h09m52s	+62°17.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce molto debole, ma relativamente facile da vedere a 380x, orientata grosso modo da N a S per ~ 1.5'.
UGC 6201	gx	11h09m44s	+46°48.9'		UMa	28"	ottima / ottimo	diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×20" e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a ridosso N e una appena percettibile subito a E; una coppia di stelline orientate da NW a SE si trova a 1.5' verso W — 495x.
UGC 6204	gx	11h09m52s	+24°15.7'		Leo	24"	m. buona / buono	sembra formare una coppia interagente con UGC 6207 situata una 40-ina di secondi a SE; è diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30".
UGC 6205	gx	11h09m59s	+46°05.7'		UMa	20"	buona / buono	debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo, a tratti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 360x.
UGC 6206	gx	11h09m49s	+12°46.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 400x.
UGC 6207	gx	11h09m54s	+24°15.4'		Leo	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 6204 situata una 40-ina di secondi a NW — è pure di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15"; in visione distolta sembrano a prima vista in contatto tra loro.
UGC 6210	gx	11h10m02s	+05°18.3'		Leo	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, a tratti molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 400x.
UGC 6212	gx	11h10m25s	+04°49.8'		Leo	24"	buona / m. buono	allungata da E a W con dimensioni 60"×30", diffusa e di luminosità uniforme — 400x.
UGC 6216	gx	11h10m45s	+04°50.8'		Leo	24"	buona / m. buono	debole e relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 570x.
UGC 6218	gx	11h10m47s	+28°16.7'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo oggetto di una 20-ina di secondi di Ø, poco diffuso e con nucleo stellare; è abbastanza facile da vedere anche in visione diretta 380x; c'è una stellina a ~ 1' verso NW.
UGC 6219	gx	11h10m57s	+19°10.9'		Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 6227	gx	11h11m27s	+47°02.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente brillante, molto diffusa, rotonda con Ø < 40", con alto gradiente di luce e un nucleo stellare ben evidente — 495x.
UGC 6228	gx	11h11m36s	+56°31.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e spampanata, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme — 495x.
UGC 6231	gx	11h11m18s	+11°33.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e un nucleo stellare evidente — 450x.
UGC 6232	gx	11h11m26s	+43°54.5'		UMa	28"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15" e con bulge evidente, anche se poco contrastato; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 495x.
UGC 6233	gx	11h11m28s	+06°54.4'		Leo	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge quasi stellare — 450x.
UGC 6239	gx	11h11m59s	+03°08.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
UGC 6243	gx	11h12m25s	+31°22.7'		UMa	16"	buona / ottimo	è un debolissimo lucore circolare esteso una 40-ina di secondi e che appare solo a tratti in visione distolta a 270x; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' NE.
UGC 6246	gx	11h12m51s	+23°15.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 6247	gx	11h12m53s	+27°26.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	diffusa, gradatamente più brillante all'interno, poco allungata da NW a SW con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina brillante un paio di primi a SW — 380x.
UGC 6249	gx	11h13m21s	+59°54.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, assai stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø > 1'; osservando in visione distolta appare un debolissimo peduncolo quasi a ridosso verso E, una sorta di stellina sfuocata; da un controllo effettuato successivamente è risultata essere la **MCG+10-16-87** — 380x.
UGC 6250	gx	11h13m10s	+27°49.1'		Leo	16"	m. buona / ottimo	compatta, rotonda con Ø di 30" e condensazione centrale marcata di aspetto stellare — 380x.
UGC 6251	gx	11h13m26s	+53°35.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore di forma indistinta, visibile solo a momenti e che in visione distolta pare esteso per ~ 1' — 270x.
UGC 6252	gx	11h13m19s	+25°51.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso SE — 450x.
UGC 6253	gx	11h13m29s	+22°09.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	meglio conosciuta come Leo II — chiazza elusiva che appare solo a momenti in visione distolta a 340x (a 210x il fondo cielo è ancora troppo chiaro); la parte visibile non è ad ogni modo superiore a 1' e si trova a ridosso S di una stellina abbastanza brillante.
UGC 6254	gx	11h13m30s	+23°10.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25" — 450x.
UGC 6255	gx	11h13m41s	+47°34.7'		UMa	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW (ossia come le 2 stelline brillanti situate a W) con dimensioni 50"×40" — 270x.
UGC 6258	gx	11h13m49s	+21°31.1'		Leo	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa un paio di primi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 6260	gx	11h13m53s	+04°17.5'		Leo	24"	ottima / ottimo	molto allungata da NE a SW, con dimensioni 80"×20", poco diffusa e appena più brillante verso l'interno; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 6265	gx	11h14m38s	+63°21.9'		UMa	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso SW; un'altra stellina molto debole e appena sfuocata si trova a 1' SE, ma questa è di fatto la **MAC 1114+6321** — 450x.
UGC 6271	gx	11h14m37s	+30°18.9'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 6273	gx	11h14m51s	+35°30.2'		UMa	16"	m. buona / ottimo	allungata da NE a SW con dimensioni 70"×30", con piccola condensazione centrale osservabile a 380x; c'è una stellina appena percettibile visibile a tratti poco al di là del margine NE *(presenza di chiarore lunare)*.
UGC 6274	gx	11h14m57s	+33°49.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 6276	gx	11h15m10s	+31°02.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, presenta un bulge abbastanza pronunciato circonfuso da un tenue alone rotondo di ~ 1' di Ø; c'è un piccolo triangolo isoscele a 4' NE — 380x.
UGC 6279	gx	11h15m22s	+35°30.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	di aspetto simile a UGC 6273, ma con condensazione centrale poco più marcata, allungata da N a S e di dimensioni 60"×30" *(presenza di chiarore lunare)* — 380x.
UGC 6284	gx	11h15m49s	+00°51.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; a una decina di primi WSW c'è un arco regolare di 6 stelline con le componenti equidistanti e la concavità rivolta a S — 450x.
UGC 6285	gx	11h16m08s	+41°23.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole macchiolina luminosa di forma vagamente circolare, ma dai bordi indistinti, con Ø di ~ 1'; è visibile abbastanza facilmente una tenue condensazione centrale — 270x.
UGC 6289	gx	11h16m17s	+02°53.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile però solo a tratti — 450x.
UGC 6292	gx	11h16m28s	+29°19.6'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø poco superiore 30" e di luminosità uniforme; è situata ~ 1' N di una stellina — 380x.
UGC 6293	gx	11h16m29s	+41°04.7'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; una stellina appena percettibile e debolmente sfuocata situata subito a W è in realtà la **PGC 200268 —** 495x.
UGC 6296	gx	11h16m51s	+17°47.9'		Leo	16"	ottima / ottimo	è un debole fuso di luminosità regolare, orientato da N a S con dimensioni 80"×30" — 380x.
UGC 6298	gx	11h17m03s	+36°08.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 380x.
UGC 6300	gx	11h17m17s	+16°19.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso S; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 6301	gx	11h17m22s	+22°20.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NW a SE ed estesa almeno 1.5'; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele di stelline di luminosità decrescente: quella più debole è al vertice che punta a SE — 450x.
UGC 6303	gx	11h17m34s	+36°03.8'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, forse rotonda con Ø max di 30"; c'è una stellina a ridosso verso N che interferisce con l'osservazione; meglio visibile a 380x.
UGC 6307	gx	11h17m41s	+38°03.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×30"; è meglio contrastata a 270x.
UGC 6309	gx	11h17m47s	+51°28.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è una bolla circolare estesa per ~ 1', diffusa e di luminosità uniforme che pare come "accendersi" in visione distolta — 270x.
UGC 6311	gx	11h17m55s	−02°05.5'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×50" e condensazione centrale visibile a 400x.
UGC 6312	gx	11h18m00s	+07°50.7'		Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge quasi stellare; c'è una stellina brillante a meno di 1' verso SW — 450x.
UGC 6314	gx	11h18m12s	+30°23.7'		UMa	16"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 156-54 situata a meno di 1' NNW — debolissima, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta una condensazione centrale molto tenue di aspetto quasi stellare; meglio definita a 270x.
UGC 6316	gx	11h18m19s	+65°01.7'		UMa	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; forma una coppia ravvicinata con MCG+11-14-15, una gx tutto sommato facile, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" — 450x.
UGC 6320	gx	11h18m17s	+18°50.8'	q 146	Leo	16"	discreta / ottimo	debole, ma relativamente facile, rotonda, poco diffusa, di luminosità uniforme e Ø < 1' — 380x.
UGC 6322	gx	11h18m17s	+28°15.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una doppia a poco più di 1' verso N — 270x.
UGC 6324	gx	11h18m22s	+18°44.3'		Leo	16"	discreta / ottimo	più piccola, appare con una certa facilità solo in visione distolta a ridosso, verso E, di una stellina; a tratti si vede una condensazione centrale; non è comunque più estesa di una 30-ina di secondi — 380x.
UGC 6325	gx	11h18m28s	+25°19.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
UGC 6329	gx	11h18m56s	+00°10.5'		Leo	16"	m. buona / m. buono	è un'elusiva chiazza circolare di luminosità uniforme e di ~ 30" di Ø; appare solo a tratti in visione distolta fra 2 stelline orientata da NW a SE (quella a NW è più brillante) e distanti 3'; meglio visibile a 270x.
UGC 6331	gx	11h19m10s	+03°13.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme (salvo qualche lievissima discrepanza visibile solo a momenti), orientata da NE a SW ed estesa 1.5' — 450x.
UGC 6332	gx	11h19m17s	+20°48.9'		Leo	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, diffusa con Ø di 45" e condensazione centrale evidente di aspetto stellare — 380x.
UGC 6333	gx	11h19m17s	+22°53.0'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 6334	gx	11h19m30s	+28°39.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×40" e con condensazione centrale abbastanza marcata che a 380x appare di aspetto stellare.
UGC 6335	gx	11h19m46s	+59°16.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 1' e di luminosità uniforme; è situata in una piccola zona depleta e pertanto il debole chiarore lunare non permette di scalare gli ingrandimenti — 495x.
UGC 6337	gx	11h19m54s	+33°05.4'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda, poco diffusa, di 30"-35" di Ø e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente a 380x.
UGC 6338	gx	11h20m01s	+36°06.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un ovale molto debole, di luminosità uniforme orientato da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 270x.
UGC 6340	gx	11h19m55s	−00°52.8'		Leo	24"	buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×30" e condensazione centrale visibile a 400x; c'è una stellina a 1' verso NE.
UGC 6342	gx	11h20m08s	+30°30.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda, di Ø < 1', con tenue condensazione centrale osservabile a 380x.
UGC 6345	gx	11h20m15s	+02°31.5'	q 236	Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 270x, poco allungata da NE a SW con dimensioni 1.5'×1'.
UGC 6347	gx	11h20m21s	+34°05.8'		UMa	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare; è meglio contrastata a 270x.
UGC 6355	gx	11h20m41s	+31°13.3'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce di luminosità pressoché uniforme che in visione distolta sembra aggettare verso E da una stellina per almeno 1' — 380x.
UGC 6359	gx	11h20m36s	−01°29.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 450x.
UGC 6361	gx	11h20m48s	+00°28.1'		Leo	24"	buona / m. buono	diffusa e con nucleo stellare, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; ci sono 2 stelline ben evidenti a ridosso verso S e W — 400x.
UGC 6362	gx	11h20m56s	+19°37.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 570x.
UGC 6363	gx	11h21m00s	+21°20.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 6366	gx	11h21m05s	+21°21.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo orientato da N a S, esteso forse una 30-ina di secondi, molto disturbato da una stellina abbastanza brillante al bordo E; appare con una certa fatica in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; meglio visibile la parte più a N della gx.
UGC 6367	gx	11h21m05s	+31°15.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, rotonda con Ø di 30" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 6375	gx	11h21m44s	+46°12.6'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 495x.
UGC 6378	gx	11h22m07s	+69°38.0'		UMa	16"	ottima / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme che salta fuori solo in visione distolta; appena più evidente a 380x; è orientata da NW a SE (ossia come le 2 stelle brillanti situate 3' a N) ed estesa un paio di primi.
UGC 6380	gx	11h22m02s	+50°35.6'		UMa	16"	m. buona / buono	debole, ma relativamente facile da vedere in visione distolta, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
UGC 6383	gx	11h22m03s	+42°49.2'		UMa	28"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da NE a SW ed estesa oltre 1' (ossia poco più della coppia di stelline abbastanza brillanti situata a NE — 495x.
UGC 6390	gx	11h22m41s	+64°04.0'		UMa	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina al bordo NW — 450x.
UGC 6393	gx	11h22m54s	+34°20.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 40" (meglio scalare a 270x, perché a 380x il campo è depleto).
UGC 6394	gx	11h22m56s	+34°06.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole chiazza rotonda, molto diffusa, con Ø > 1' e con evidente condensazione centrale; meglio scalare 270x.
UGC 6397	gx	11h23m02s	+34°29.9'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" con bulge appena percettibile; è meglio scalare a 270x.
UGC 6399	gx	11h23m23s	+50°53.5'	q 46	UMa	16"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 2'×30" e con bassissimo gradiente di luce — 270x.
UGC 6400	gx	11h23m29s	+53°40.6'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×13" (ossia con rapporto di 3:1); c'è una stellina a 1' verso S *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
UGC 6402	gx	11h23m19s	−00°55.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	in visione distolta appare come una debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa 1' — 450x.
UGC 6410	gx	11h24m06s	+45°48.6'		UMa	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole, approssim. circolare con Ø di 45" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a ridosso N che ne disturba l'osservazione — 450x.
UGC 6413	gx	11h24m00s	+02°41.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
UGC 6415	gx	11h24m11s	+27°00.8'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, con tenue bulge diffuso e poco contrastato, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 90"×30"; meglio definita scalando a 340x.
UGC 6422	gx	11h24m45s	+53°44.6'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
UGC 6425	gx	11h24m45s	+23°36.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare — 570x.
UGC 6429	gx	11h25m19s	+63°43.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, ma facilmente visibile anche in visione diretta a 270x nonostante il chiarore lunare; è rotonda, di luminosità pressoché uniforme con Ø > 1'; situata tra 2 stelline brillanti distanti ~ 4' in direzione NNE-SSW.
UGC 6432	gx	11h25m18s	+00°21.1'		Leo	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø <40"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
UGC 6433	gx	11h25m32s	+38°03.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un indistinto lucore di aspetto irregolare e debolissimo; dovrebbe essere esteso una 40-ina di secondi, ma non riesco a capire com'è fatto — 270x.
UGC 6435	gx	11h25m35s	−00°46.0'		Leo	24"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; osservata a 570x per cercar di tenere fuori campo la SAO 138201 di 9ª grandezza situata ad appena 3' verso E.
UGC 6437	gx	11h25m46s	+18°56.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, a tratti leggermente più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 6440	gx	11h26m01s	+01°59.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 6446	gx	11h26m41s	+53°45.0'	q 46	UMa	16"	buona / mediocre	chiazza molto debole e abbastanza estesa, ma di forma indistinta e poco più brillante all'interno; c'è una stella brillante al margine meridionale — 188x.
UGC 6448	gx	11h26m50s	+64°08.3'	q 25	UMa	16"	m. buona / mediocre	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×45" — 270x.
UGC 6450	gx	11h28m30s	+79°36.0'		Cam	16"	ottima / ottimo	galassietta debolissima, quasi elusiva, estesa una 30-ina di secondi; appare a 380x quando si pone l'occhio all'oculare, dopodiché tende a scomparire.
UGC 6452	gx	11h27m19s	+59°37.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, con bassissimo gradiente, allungata da NE a SW e di dimensioni 60"×30"; meglio osservabile a 270x.
UGC 6455	gx	11h27m22s	+40°00.8'		UMa	28"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni di 60"×30"; c'è una stellina a 1.5' N e una più brillante a 2.5' WNW — 495x.
UGC 6456	gx	11h28m00s	+78°59.7'	q 9	Dra	16"	m. buona / mediocre	molto debole, estesa e diffusa, allungata ~ da N a S, di dimensioni 2'×1' e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 6457	gx	11h27m13s	−00°59.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, con condensazione centrale molto tenue che pare leggermente decentrata verso N — 450x.
UGC 6462	gx	11h27m47s	+07°59.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	in visione distolta appare come un debolissimo baffo orientato da N a S ed esteso non più di 30"; solo a momenti sembra di intravvedere un nucleo puntiforme; la visione è un po' disturbata da una stellina brillante situata quasi a ridosso W della gx; in questo caso è preferibile spingere a 580x.
UGC 6465	gx	11h28m12s	+21°59.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono 2 stelline molto deboli a ridosso della gx: una a NW e l'altra, poco più brillante, verso S — 570x.
UGC 6469	gx	11h28m18s	+02°38.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W — 450x.
UGC 6473	gx	11h28m57s	+73°02.1'		Dra	20"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1' E la quale serve come riferimento per trovare la **MAC 1129-7301**, situata 1' a S: quest'ultima è molto piccola e debolissima, estesa sì e no 10"-12" — 360x.
UGC 6476	gx	11h28m36s	+23°24.3'		Leo	16"	ottima / ottimo	debole e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; è situata all'interno di un piccolo asterismo foggiato a trapezio: la stellina più a N è la più brillante ed è doppia — 380x.
UGC 6478	gx	11h28m41s	+19°43.8'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 6481	gx	11h30m40s	+79°33.5'		Cam	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto rotondo, molto diffuso ed esteso per poco più di 30", visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
UGC 6483	gx	11h29m02s	+17°13.9'		Leo	24"	discreta / m. buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, orientata da ENE a WSW ed estesa poco più di 1'; c'è una stella brillante un paio di primi a E — 450x.
UGC 6488	gx	11h29m12s	+41°46.6'		UMa	20"	buona / buono	molto debole, diffusa e con nucleo quasi stellare appena percettibile, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30" — 360x.
UGC 6489	gx	11h29m11s	+42°31.6'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta arrivano a 80"×40"; c'è una stella brillante a 2.5' verso N e una altrettanto brillante (in coppia con una più debole) alla stessa distanza verso NE — 495x.
UGC 6491	gx	11h29m24s	+34°52.3'	q 106	UMa	16"	ottima / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, approssim. circolare con Ø di 30"-40", ma visibile solo a tratti; ogni tanto appare qualcosa di più brillante: o si tratta del nucleo, o di una stellina che però non riesco a capire dov'è esattamente — 380x.
UGC 6492	gx	11h29m28s	+52°13.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce una 40-ina di secondi osservabile in visione distolta che si diparte verso W da una debole stellina; meglio visibile spingendo a 380x.
UGC 6495	gx	11h29m45s	+22°07.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, diffuso con Ø di 35"-40"; a tratti, a 380x, appare qualcosa di puntiforme, ma non riesco a capire se trattasi del nucleo o di una stellina a ridosso.
UGC 6496	gx	11h29m51s	+24°56.2'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente facile e compatta nonostante si trovi a ridosso S della SAO 81853 di 7a grandezza; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 6497	gx	11h30m09s	+38°37.2'		UMa	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva lama di luce che appare solo a tratti in visione distolta a 270x (a 380x si stempera eccessivamente sul fondo cielo), orientata da E a W ed estesa un paio di primi; dapprima si vede una tenuissima zona centrale appena più brillante, dopodiché spostando lo sguardo "si allunga".
UGC 6500	gx	11h30m40s	+44°09.5'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole e poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge appena percettibile — 495x.
UGC 6507	gx	11h31m12s	+34°12.2'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta a 380x, a tratti allungata forse da N a S (o da NW a SE, non riesco bene a capire) con dimensioni grosso modo 45"×30". Tra questa gx e UGC 6512, situata 10' a NE, c'è un triangolo equilatero di stelle brillanti: quella a SE è una doppia stretta.
UGC 6508	gx	11h31m21s	+26°17.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø maggiore di 30"; è situata all'interno di un piccolo asterismo irregolare formato da 5 stelline — 450x.
UGC 6510	gx	11h31m32s	−02°18.5'		Leo	16"	ottima / ottimo	chiazza circolare molto debole, molto diffusa e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente anche in visione diretta a 270x.
UGC 6512	gx	11h31m45s	+34°20.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo condensato con Ø di 20" e con una stellina a quasi a ridosso verso SW — 380x.
UGC 6517	gx	11h32m02s	+36°41.9'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole e con luminanza superficiale molto bassa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×45" — 380x.
UGC 6520	gx	11h32m28s	+62°30.5'	q 25	UMa	16"	non registrati	debole, ma facilmente visibile, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e poco più brillante all'interno — 188x.
UGC 6522	gx	11h32m21s	+28°02.9'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, ma facile da vedere a 380x, piccola, rotonda con Ø di 30"-35" e con nucleo stellare.
UGC 6525	gx	11h32m42s	+20°26.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; è piuttosto difficile da osservare, perché anche a 270x il campo è virtualmente depleto.
UGC 6526	gx	11h39m39s	+35°19.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce estesa da E a W per almeno 1.5' e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 6527	gx	11h32m40s	+52°57.0'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte del sistema compatto di **Hickson 56** — relativamente facile, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare marcato — 400x.
UGC 6528	gx	11h32m44s	+61°49.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole chiazza rotonda, molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme e con Ø di 1' scarso; sembra a prima vista una visione in scala ridotta della vicina NGC 3725 — 380x.
UGC 6529	gx	11h32m46s	+40°50.6'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' verso W — 495x.
UGC 6531	gx	11h32m49s	+39°05.1'	q 73	UMa	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta fissando attentamente la stella brillante situata 3' a W — 270x.
UGC 6532	gx	11h33m10s	+70°23.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
UGC 6534	gx	11h33m20s	+63°16.8'	q 25	UMa	16"	m. buona / m. buono	appare molto allungata da NE a SW, di dimensioni 2.5'×45" e di luminosità pressoché uniforme, salvo alcune irregolarità di luce molto tenui all'interno visibili però solo a momenti — 270x
UGC 6538	gx	11h33m17s	+49°17.0'		UMa	24"	m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione stellare percettibile solo a momenti — 450x.
UGC 6539	gx	11h33m24s	+32°36.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta a 270x, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; a tratti appare leggermente più brillante all'interno.
UGC 6541	gx	11h33m29s	+49°14.4'	q 73	UMa	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo S — 450x.
UGC 6544	gx	11h33m42s	+23°24.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×30"; c'è una coppia di stelline abbastanza serrata subito a SE — 450x.
UGC 6545	gx	11h33m44s	+32°38.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30", con una stellina brillante a ridosso verso S che tende a "deformarla" — 380x.
UGC 6548	gx	11h33m56s	+23°38.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole e relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 6552	gx	11h34m34s	+71°32.4'		Dra	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, diffusa allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; si vede in visione distolta a 270x.
UGC 6555	gx	11h35m00s	+51°13.1'		UMa	16"	m. buona / discreto	abbastanza facile, rotonda con Ø di 40", alto gradiente e nucleo stellare evidente; c'è una stellina brillante a 1.5' NNE — 270x.
UGC 6557	gx	11h35m07s	+29°53.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un'elusiva macchiolina rotonda, molto piccola, di max 20" di Ø, situata a ridosso di un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a "y" o "λ" — 270x.
UGC 6558	gx	11h35m05s	+02°33.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N — 450x.
UGC 6568	gx	11h35m37s	+00°07.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 6570	gx	11h35m50s	+35°20.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un ovale di ~ 60"×30" molto diffuso, poco più brillante all'interno e con nucleo stellare abbastanza netto; è orientata da NW a SE (ossia a perpendicolo con le due stelline a NE) — 380x.
UGC 6575	gx	11h36m26s	+58°11.5'		UMa	16"	m. buona / discreto	debole lama di luce appena più brillante all'interno, estesa 1.5' e orientata da N a S — 270x.
UGC 6576	gx	11h36m31s	+47°49.0'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 188x.
UGC 6578	gx	11h36m37s	+00°49.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (a tratti sembra di aspetto un po' irregolare); c'è una coppia di stelline a 1' N (quella più meridionale è appena percettibile); una stellina brillante che disturba un po' l'osservazione si trova a ridosso verso E — 450x.
UGC 6583	gx	11h36m54s	+19°58.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, con piccolo bulge di aspetto quasi stellare, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (un paio di primi a N c'è la coppia CGCG 97-23, -27) — 570x.
UGC 6586	gx	11h37m02s	+15°34.3'		Leo	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 80"×40" — 400x.
UGC 6587	gx	11h37m02s	+15°34.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; forma una coppia ravvicinata con CGCG 40-13 (v. voce corrispondente) — 400x.
UGC 6588	gx	11h37m13s	+15°26.0'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15".
UGC 6593	gx	11h33m22s	+25°44.4'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere a 380x, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso W.
UGC 6594	gx	11h37m37s	+16°33.4'		Leo	24"	buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa oltre 2; a 400x mostra a tratti un piccolo e tenuissimo bulge; la gx, tuttavia, si apprezza meglio scalando a 280x.
UGC 6603	gx	11h38m02s	+35°12.2'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debolissima, di luminosità pressoché uniforme; a tratti in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30", ma è meglio scalare a 270x.
UGC 6604	gx	11h38m09s	+58°45.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	presenta un piccolo nucleo marcato quasi stellare e un alone circonfuso molto stemperato sul fondo cielo con Ø di 1' scarso. È riportata sull'Uranometria come NGC 3795B — 270x.
UGC 6606	gx	11h38m21s	+47°26.3'		UMa	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con tenue condensazione centrale; meglio contrastata scalando a 340x; forma una coppia ravvicinata con MCG+8-21-82 situata a ridosso W.
UGC 6607	gx	11h38m25s	+20°44.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso E; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 6608	gx	11h38m33s	−01°11.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 400x.
UGC 6609	gx	11h38m29s	+20°31.7'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di ~ 2'; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
UGC 6610	gx	11h38m44s	+33°48.3'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce estesa ~ 1' e orientata da N a S; salta fuori a tratti in visione distolta a 380x quando si fissa lo sguardo sulla debole coppia di stelline a W.
UGC 6611	gx	11h38m51s	+43°09.9'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 80"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 6613	gx	11h39m11s	+39°20.0'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 6614	gx	11h39m15s	+17°08.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di 20" e nucleo stellare — 380x.
UGC 6616	gx	11h39m21s	+58°16.1'		UMa	16"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di oltre 1'; è situata tra 2 deboli stelline orientate da NE a SW e distanti 2.5': la gx si trova a ridosso di quella SW (la più debole). È riportata sull'Uranometria come NGC 3795A — 270x.
UGC 6617	gx	11h39m18s	+09°57.7'		Vir	24"	buona / ottimo	poco diffusa e con gradiente medio di luce, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso W; occupa il vertice orientale di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da NW a SE — 400x.
UGC 6622	gx	11h39m38s	+04°28.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso S; la gx è situata all'interno di un quadrilatero irregolare di stelline — 450x.
UGC 6625	gx	11h39m48s	+19°56.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, compatta, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø di ~ 30" — 380x.
UGC 6628	gx	11h40m06s	+45°56.5'	q 74	UMa	16"	m. buona / m. buono	è un debole lucore di aspetto confuso e assai stemperato sul fondo cielo, di luminosità uniforme ed esteso per un paio di primi; c'è una stellina brillante a ridosso SE — 270x.
UGC 6631	gx	11h40m12s	+17°18.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con qualche lieve screziatura all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; nucleo stellare visibile ogni tanto a 570x.
UGC 6637	gx	11h40m25s	+28°22.4'	q 107	UMa	16"	buona / buono	è un piccolo oggetto relativamente facile, poco diffuso; in visione distolta appare allungata ~ da E a W, di dimensioni 40"×20" e poco più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 6645	gx	11h40m56s	+25°46.8'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 1'; è poco più contrastata a 270x.
UGC 6646	gx	11h40m59s	+05°03.8'		Vir	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina evidente al bordo NW dalla quale sembra a prima vista aggettare — 450x.
UGC 6647	gx	11h41m04s	+10°13.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo che appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x a S di una stellina brillante; è grosso modo rotonda con Ø di 1' (a 13' ENE c'è NGC 3817, una gx rotonda, di 45" di Ø, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare; una stellina si trova a 1.5' verso W.

UGC 6652	gx	11h41m21s	+33°41.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma tutto sommato facile da vedere; è molto piccola e diffusa, estesa una 20-ina di secondi e con nucleo stellare — 380x.
UGC 6653	gx	11h41m40s	+15°58.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a UGC 6655 e UGC 6666, di un terzetto di gx allineate da ENE a WSW esteso una decina di primi — relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 70"×20", con bulge piccolo, diffuso e nucleo di aspetto stellare — 400x.
UGC 6655	gx	11h41m51s	+15°58.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme alla precedente e a UGC 6666, di un terzetto di gx allineate da ENE a WSW esteso una decina di primi — poco diffusa, con piccola condensazione centrale quasi stellare, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20".
UGC 6658	gx	11h42m02s	+32°00.0'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni ~ 40"×20"; c'è una stellina molto debole subito a S — 380x (a 270x non riesco a capire com'è orientata).
UGC 6662	gx	11h42m08s	+12°56.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di aspetto un po' confuso, solo a momenti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20"; la visione non sembra migliorare scalando a 340x.
UGC 6665	gx	11h42m13s	+00°20.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e brillante, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 6666	gx	11h42m21s	+16°00.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a UGC 6653 e UGC 6655, di un terzetto di gx allineate da ENE a WSW esteso una decina di primi — molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge quasi stellare abbastanza evidente — 400x.
UGC 6667	gx	11h42m26s	+51°35.8'	q 47	UMa	16"	ottima / ottimo	è una lama di luce molto debole, orientata da E a W ed estesa per almeno 3'; solo a tratti appare un bulge molto tenue e allungato — 270x.
UGC 6670	gx	11h42m29s	+18°19.9'	q 147	Leo	16"	scarso / m. buono	estesa, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 90"×30", ma con bassissima luminanza superficiale, appena più brillante verso l'interno; è situata tra 2 stelline brillanti distanti quasi 3' e orientate da N a S — 270x.
UGC 6674	gx	11h42m39s	+24°49.3'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso W; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 6677	gx	11h42m52s	+26°32.4'		Leo	16"	buona / ottimo	in visione distolta si vede come un piccolo segmento di luminosità uniforme esteso una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE — 380x.
UGC 6680	gx	11h43m02s	+19°39.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, ma appare senza troppi problemi in visione distolta a 380x; è estesa 25"-30" e di luminosità uniforme.
UGC 6682	gx	11h43m09s	+59°06.4'		UMa	16"	m. buona / discreto	debolissima chiazza approssim. rotonda con Ø > 1' e a bassissima luminanza superficiale, appena più brillante all'interno; si stacca a fatica dal fondo cielo, ma è visibile senza difficoltà in visione distolta a 188x.
UGC 6683	gx	11h43m16s	+19°44.9'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e relativamente compatta, allungata ~ da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente a 380x.
UGC 6686	gx	11h43m23s	+16°29.2'		Leo	24"	buona / m. buono	debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo quasi stellare visibile però solo a momenti; è orientata da NE a SW ed estesa 1.5' — 450x.
UGC 6696	gx	11h43m40s	+33°25.0'		UMa	16"	buona / m. buono	fa parte del quintetto di NGC 3855 — debolissima e di luminosità uniforme; solo a tratti in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — meglio contrastata a 270x.
UGC 6697	gx	11h43m49s	+19°58.2'		Leo	16"	buona / buono	situata 3' a W della coppia NGC 3841-2, è una debole lama di luce facilmente visibile, estesa per almeno 1.5' in direzione NW-SE — 270x.
UGC 6698	gx	11h44m10s	+71°13.0'		Dra	16"	ottima / mediocre	debolissima chiazza rotonda di ~ 1' di Ø, di luminosità pressoché uniforme salvo una condensazione centrale molto tenue quasi stellare visibile a tratti a 270x.
UGC 6711	gx	11h44m29s	+69°43.8'	q 25	Dra	16"	m. buona / mediocre	relativamente brillante, di dimensioni 45"×30", orientata da SE a NW; presenta un bulge poco più brillante dell'alone — 270x.
UGC 6713	gx	11h44m25s	+48°50.1'	q 74	UMa	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di ~ 1' e molto diffusa; è situata 6' scarsi a W di una stellina brillante — 270x.
UGC 6716	gx	11h44m42s	+35°58.1'		UMa	16"	ottima / ottimo	è una bolla circolare molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme con Ø di 70"-80"; c'è una stellina a ridosso verso NW — 270x.
UGC 6717	gx	11h44m46s	+09°12.8'		Vir	24"	buona / discreto	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta a ridosso N di una stellina; è di forma indistinta ed estesa 40"-50"; meglio comunque scalare a 340x.
UGC 6719	gx	11h44m47s	+20°07.5'		Leo	16"	buona / buono	è una gx facile anche se piuttosto debole e diffusa, rotondeggiante, con Ø di 40" e poco più brillante verso l'interno — 270x.
UGC 6725	gx	11h45m06s	+20°26.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda con Ø di 45", diffusa e appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 6726	gx	11h45m09s	+49°43.1'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", con bulge evidente e un nucleo stellare — 495x.
UGC 6727	gx	11h45m11s	+61°42.5'		UMa	16"	ottima / buono	debole ovale abbastanza evidente a 380x, di ~ 45"×30", poco diffuso e orientato da NW a SE.
UGC 6728	gx	11h45m16s	+79°40.9'		Cam	20"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è un piccolo asterismo foggiato a "y" o "λ" a un paio di primi verso S — 360x.
UGC 6731	gx	11h21m43s	+70°38.8'		UMa	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso N.
UGC 6732	gx	11h45m33s	+58°58.7'		UMa	16"	m. buona / discreto	facile, presenta un nucleo brillante circonfuso da un alone rotondo con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 6734	gx	11h45m36s	+09°07.1'		Vir	24"	buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 6736	gx	11h45m46s	+03°01.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 6740	gx	11h45m48s	+10°28.6'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 400x.
UGC 6743	gx	11h45m56s	+21°01.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e Ø di almeno 1'; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' verso W; meglio scalare a 270x.
UGC 6749	gx	11h46m52s	+65°21.9'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 6750	gx	11h46m40s	−01°59.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante al bordo settentrionale che disturba un po' l'osservazione — 450x.
UGC 6751	gx	11h46m43s	+23°57.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; meglio comunque non scendere sotto i 450x, anche perché è situata a ridosso di una stella brillante che disturba l'osservazione.
UGC 6758	gx	11h47m06s	+13°42.5'		Leo	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, rotonda, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa e con Ø di 1' scarso; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 380x.
UGC 6759	gx	11h47m08s	+16°14.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da E a W, estesa 1' e con tenue nucleo quasi stellare; nonostante sia disturbata dalla SAO 99788 di 9ª grandezza situata 3' a SW è meglio visibile scalando a 340x.
UGC 6761	gx	11h47m08s	+29°34.7'		UMa	16"	buona / m. buono	molto debole e molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' SW — 380x.
UGC 6762	gx	11h47m23s	+60°18.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, con basso gradiente di luce, rotonda, con Ø di 45"-50" e con condensazione centrale piccola e diffusa (riportata sull'Uranometria come **NGC 3835A**) — 380x.
UGC 6767	gx	11h47m39s	+57°38.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un debole oggetto visibile senza difficoltà anche in visione diretta, grosso modo rotondo, di una 40-ina di secondi di Ø e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 6768	gx	11h47m49s	+43°44.9'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' NW e un'altra più debole subito a NE — 450x.
UGC 6769	gx	11h47m44s	+01°49.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" (al momento dell'osservazione era ancora bassa) — 340x.
UGC 6771	gx	11h48m00s	+04°29.3'		Vir	16"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di oltre 1' — 270x.
UGC 6773	gx	11h48m01s	+49°48.5'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima e immersa nei bagliori della SAO 28148 di 7ª magnitudo situata a neppure 2' NW; solo a tratti appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 380x.
UGC 6775	gx	11h48m13s	+13°12.5'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 6776	gx	11h48m36s	+4343.3'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa oltre 1' in direzione NE-SW; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 6780	gx	11h48m50s	−02°02.0'	q 237	Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, molto allungata da N a S con dimensioni 2.5'×45", di luminosità pressoché uniforme; solo a tratti, in visione distolta, sembra di vedere a 270x un tenuissimo bulge appena più brillante; c'è una stellina situata verso NW; un'altra stella, brillante, è invece situata poco verso N.
UGC 6782	gx	11h46m57s	+23°50.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	è un debolissimo e indistinto lucore esteso ~ 1' che appare tutto sommato abbastanza facilmente in visione distolta a un paio di primi W di una doppia stretta e sbilanciata; non ho notato un sensibile miglioramento scalando a 340x.
UGC 6789	gx	11h49m32s	+75°59.8'		Dra	20"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" (o poco più); c'è una stellina quasi a ridosso NE e 1 a 1' verso SE — 360x.
UGC 6791	gx	11h49m24s	+26°44.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S ed estesa 1.5'; è situata a ridosso SE di un piccolo arco formato da 4 stelline; le due più a N appaiono però solo a momenti — 450x.
UGC 6792	gx	11h49m23s	+39°46.3'		UMa	16"	buona / m. buono	è una debolissima lama di luce che in visione distolta sembra estendersi per oltre 2' in direzione N-S; a tratti appare un tenuissimo bulge diffuso; meglio contrastata a 270x.
UGC 6793	gx	11h49m24s	−01°05.1'		Vir	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20"; è situata un paio di primi a W di NGC 3907 — 380x.
UGC 6794	gx	11h49m24s	+16°38.5'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 400x.
UGC 6798	gx	11h50m34s	+77°50.0'		Cam	28"	buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; situata a ridosso NW di un piccolo triangolo di stelline brillanti — 388x.
UGC 6802	gx	11h50m07s	+51°51.3'		UMa	16"	ottima / scarso	è un oggetto molto debole e veramente difficile; solo a tratti appare molto allungato all'incirca da N a S per un paio di primi — 188x.
UGC 6805	gx	11h50m12s	+42°04.5'		UMa	16"	buona / m. buono	relativamente facile, molto piccola e compatta, con nucleo stellare visibile a tratti e Ø di 20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE — 380x.
UGC 6806	gx	11h50m20s	+25°57.7'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto allungata da NE a SW, con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 270x.
UGC 6816	gx	11h50m48s	+56°27.3'	q 47	UMa	16"	ottima / ottimo	è una chiazza di luce molto debole, probabilmente rotonda, con Ø di 1'.5 e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 6817	gx	11h50m53s	+38°52.8'	q 107	UMa	16"	buona / m. buono	è un debolissimo lucore esteso un paio di primi con un piccolo nucleo diffuso visibile a tratti — 380x.
UGC 6818	gx	11h50m47s	+45°48.4'	q 74	UMa	16"	mediocre / discreto	debolissima, allungata all'incirca da E a W per 1.5'; è situata a ~ 3.5' NE di una stella brillante — 270x.
UGC 6820	gx	11h50m51s	+20°29.8'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto allungata da NW a SE, con bulge abbastanza evidente a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW.
UGC 6821	gx	11h51m01s	+20°24.0'		Leo	16"	buona / buono	debole, molto diffusa e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 6827	gx	11h51m28s	+35°26.0'		UMa	16"	mediocre / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30", con bulge evidente e piccolo nucleo quasi stellare ben visibile a 380x.
UGC 6831	gx	11h51m35s	+15°28.5'		Leo	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stella brillante a 1' WNW — 570x.
UGC 6836	gx	11h51m48s	+36°35.6'		UMa	16"	mediocre / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 30"-35"; un nucleo stellare appare a tratti a 380x.
UGC 6838	gx	11h51m56s	−02°38.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso SE (la più occidentale di un piccolo arco con la concavità rivolata a S) — 450x.
UGC 6840	gx	11h52m07s	+52°06.5'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	debolissimo lucore molto diffuso, esteso per ~ 1.5' e forse circolare; ho preferito scalare a 188x; tuttavia a 270x sembra di vedere, a tratti, qualcosa di puntiforme: o si tratta del nucleo decentrato o di una stellina a ridosso verso S.
UGC 6842	gx	11h52m12s	+34°47.6'		UMa	16"	mediocre / ottimo	debolissimo oggetto molto piccolo e assai stemperato sul fondo cielo, non più esteso di 20"-25"; appare a momenti in visione distolta a ~ 1' S di una stellina — 380x.
UGC 6846	gx	11h52m37s	+23°35.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco allungata da NE a SW, diffusa e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso NW — 380x.
UGC 6847	gx	11h52m38s	+24°18.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20"; è meglio scalare a 340x, in quanto situata in una piccola zona depleta.
UGC 6850	gx	11h52m37s	−02°28.1'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 6853	gx	11h52m47s	+29°19.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40", diffusa con bulge piccolo abbastanza marcato e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso NE — 380x.
UGC 6854	gx	11h52m43s	+01°44.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di ~ 1', diffusa e poco più brillante all'interno — 400x.
UGC 6855	gx	11h52m46s	+23°28.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo con Ø di 30", di luminosità uniforme e diffuso — 380x.
UGC 6858	gx	11h52m58s	+61°13.0'		UMa	16"	ottima / buono	debolissima, estesa una 40-ina di secondi e osservabile solo in visione distolta a 270x.
UGC 6861	gx	11h53m11s	+25°26.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40" — 450x.
UGC 6865	gx	11h53m40s	+43°27.5'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare percettibile solo a tratti; è molto difficile a 380x, perché tenendola al centro il campo è praticamente depleto.
UGC 6871	gx	11h53m46s	+10°24.2'		Leo	24"	buona / ottimo	relativamente brillante, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40" e con piccolo bulge abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso NE — 400x.
UGC 6875	gx	11h54m01s	+07°19.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 6876	gx	11h54m00s	+20°34.4'		Leo	16"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 270x.
UGC 6879	gx	11h54m25s	−02°19.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, con dimensioni 2'×30" e con tenue bulge diffuso appena più evidente del disco; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele ottusangolo: la stellina al vertice ottuso sembra lambirne, in visione distolta, il bordo meridionale — 400x.
UGC 6886	gx	11h55m11s	+06°10.2'		Vir	24"	buona / ottimo	allungata da E a W con dimensioni 60"×45", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 400x.
UGC 6887	gx	11h55m13s	+22°41.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	chiazza lattiginosa e oblunga, orientata da N a S ed estesa 1' scarso; ma è molto difficile capirne la forma, perché è disturbata da una stella brillante al bordo W — 450x.
UGC 6893	gx	11h55m25s	+39°13.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale poco contrastata; allineata ed equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti a S; una stellina più debole si trova a 1' SE — 495x.
UGC 6900	gx	11h55m39s	+31°31.1'	q 107	UMa	16"	buona / buono	è un debolissimo lucore che in visione distolta appare sotto una sorta di appannamento asimmetrico attorno a una stellina brillante; rispetto a quest'ultima sembra aggettare verso SW; dovrebbe essere estesa oltre 1'; c'è un piccolo arco di 3 stelline situato a NE; è meglio osservabile a 188x.
UGC 6901	gx	11h55m38s	+43°02.7'		UMa	16"	m. buona / m. buono	debole, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e poco più brillante all'interno — 380x.
UGC 6903	gx	11h55m37s	+01°14.2'	q 237	Vir	16"	ottima / ottimo	è un diffuso chiarore circolare con Ø di almeno 1.5' e di luminosità pressoché uniforme; si vede facilmente in visione distolta a 270x.
UGC 6911	gx	11h56m06s	+15°08.0'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; è poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 6912	gx	11h56m17s	+58°11.8'	q 47	UMa	16"	ottima / ottimo	è una debole chiazza lattiginosa molto confusa, di dimensioni attorno a 1', molto disturbata dalla luce di una brillante stella di 8ª situata un paio di primi verso S — 270x.
UGC 6913	gx	11h56m15s	+17°01.8'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 80"×30" — 450x.
UGC 6916	gx	11h56m28s	+39°44.3'		UMa	16"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"× 20"; meglio contrastata a 270x (a 380x il campo è quasi depleto).
UGC 6917	gx	11h56m30s	+50°25.7'	q 47	UMa	16"	buona / discreto	debolissima! Nonostante ciò è preferibile osservarla a 243x per limitare il fastidio di una stellina brillante a ridosso del nucleo verso W; è comunque osservabile solo in visione distolta — 270x.
UGC 6919	gx	11h56m38s	+55°38.0'		UMa	16"	ottima / scarso	è una edge-on orientata da E a W per ~ 1', debole; a tratti appare una tenue condensazione centrale — 188x.
UGC 6922	gx	11h56m52s	+50°49.0'		UMa	16"	m. buona / discreto	diffuso lucore rotondo a bassissima luminanza superficiale e con Ø di ~ 80"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso S e un'altra visibile a solo tratti presso il bordo orientale; meglio visibile a 188x.
UGC 6923	gx	11h56m50s	+53°09.6'	q 47	UMa	16"	buona / mediocre	debole e molto diffusa, con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30", ma di aspetto a tratti un po' irregolare; a 188x è un po' disturbata dalla SAO 28197, una stella giallo-arancio di 8ª grandezza situata ad appena 4' verso S e che non si riesce ovviamente a tenere fuori campo.
UGC 6927	gx	11h57m09s	+30°23.5'		UMa	16"	mediocre / ottimo	oggetto diffuso, rotondo, con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale facilmente visibile a 380x; c'è una stellina a ~ 1.5' verso NE.
UGC 6929	gx	11h57m20s	+36°25.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda, più brillante all'interno e Ø di 1' scarso; meglio evidente a 270x.
UGC 6930	gx	11h57m17s	+49°17.1'	q 47	UMa	28"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di un paio di primi, debolmente screziata a 495x, anche se è più interessante scalando a 291x; c'è una stellina a SSW che in visione distolta appare inglobata nella parte più esterna del disco; una stella brillante si trova invece a NW.
UGC 6931	gx	11h57m25s	+57°55.8'		UMa	16"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare poco allungata da E a W (o NE-SW, è difficile stabilirlo) con dimensioni 50"×40"; è situata tra 2 stelline orientate da ENE a WSW e distanti 3'; la gx è poco spostata verso S; come ottimo riferimento per trovarla c'è un piccolo triangolo di stelline brillanti ~ 4' SE — 270x.
UGC 6933	gx	11h57m32s	+32°20.5'		UMa	24"	m. buona / buono	appare come un piccolo nodulo brillante situato al margine NE di NGC 3991; non è presente nel database del Megastar, ma è riportata sul catalogo **PGC** con la sigla **200277** — 450x.
UGC 6934	gx	11h57m32s	−01°15.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per ~ 1' — 450x.
UGC 6939	gx	11h57m43s	+57°33.9'		UMa	16"	m. buona / discreto	presenta una evidente condensazione centrale di aspetto stellare circonfusa da un alone rotondo molto diffuso con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 6945	gx	11h57m55s	+36°23.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	poco più evidente di UGC 6929 ma molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 1' — 380x.
UGC 6955	gx	11h58m30s	+38°04.5'	q 107	UMa	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo lucore, esteso e di aspetto alquanto confuso; in visione distolta, a 132x, appare grosso modo orientato da E a W per ~ 3'; c'è una stellina verso il bordo settentrionale.
UGC 6956	gx	12h58m26s	+50°55.1'		UMa	16"	ottima / scarso	è un altro debolissimo chiarore, assai stemperato sul fondo cielo dal quale si "stacca" solo a tratti; è probabilmente esteso per oltre 2' — 188x.
UGC 6957	gx	11h58m27s	+57°35.8'		UMa	16"	m. buona / discreto	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×50"; è appena più brillante all'interno; meglio osservabile a 188x.
UGC 6958	gx	11h58m24s	−02°16.6'		Vir	16"	m. buona / discreto	gx circolare molto diffusa, con Ø di ~ 1' e di luminosità pressoché uniforme; è situata nello stesso campo di NGC 4006 dalla quale dista 10.5' a SSE — 188x.
UGC 6968	gx	11h58m45s	+28°17.4'		Com	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto molto debole con tenue condensazione centrale puntiforme poco allungato da NW a SE e con dimensioni 40"×30" — 380x.
UGC 6969	gx	11h58m48s	+56°25.4'		UMa	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W, ma visibile solo a tratti — 340x.
UGC 6970	gx	11h58m45s	−01°27.7'		Vir	24"	m. buona / buono	è una sorta di baffo molto debole e di luminosità uniforme che aggetta verso E per ~ 1' da una stellina brillante che disturba — 570x.
UGC 6976	gx	11h59m02s	+21°48.5'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 6978	gx	11h59m10s	−02°35.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo estesa forse una 40-ina di secondi, ma indistinta; c'è una coppia di stelline brillanti a un paio di primi a S che disturbano la visione; meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 6983	gx	11h59m09s	+52°42.4'	q 47	UMa	16"	ottima / m. buono	è un debole lucore molto diffuso e stemperato sul fondo cielo, poco allungato da E a W con dimensioni 90"×60" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 6986	gx	11h59m27s	+17°45.4'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 6997	gx	12h00m51s	+31°52.7'		UMa	16"	buona / ottimo	piccola ed elusiva, appare a momenti tra una stella brillante a NW e una doppia stretta a SE; forse rotonda con Ø < 30" — 380x.
UGC 6998	gx	12h00m47s	−00°01.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo, di forma indistinta ed estesa ~ 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 7000	gx	12h01m11s	−01°17.8'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 7003	gx	12h01m21s	+14°27.0'		Com	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza di forma indistinta, estesa forse una 30-ina di secondi; salta fuori solo a momenti in visione distolta, ma è meglio comunque scalare a 340x.
UGC 7004	gx	12h01m28s	−00°43.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a 1'; c'è una stellina a 1.5' verso E; meglio contrastata scalando a 280x.
UGC 7009	gx	12h01m43s	+62°19.7'	q 25	UMa	16"	m. buona / mediocre	debole, molto allungata da N a S per un paio di primi; un debolissimo bulge è visibile solo a tratti — 270x.
UGC 7012	gx	12h02m13s	+29°50.9'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45" — 380x.
UGC 7016	gx	12h02m24s	+14°50.6'		Com	24"	buona / ottimo	molto allungata da NW a SE, con dimensioni 80"×20" e piccolo bulge esteso; c'è una probabile stellina a ridosso del nucleo verso NW — 450x.
UGC 7017	gx	12h02m23s	+29°31.6'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, poco più evidente di UGC 7016, molto allungata da ENE a WSW (ossia come le 2 stelline a SE e SW distanti 4'), di dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 7020	gx	12h02m36s	+41°03.2'		UMa	16"	m. buona / m. buono	rotonda, molto debole e diffusa, con Ø > 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E; la visione migliora un poco scalando a 188x.
UGC 7020A	gx	12h02m37s	+64°22.5'	q 25	UMa	16"	non registrati	presenta un piccolo nucleo brillante, marcato e con un tenue alone diffuso non bene definito; sembra allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×30" — 188x.
UGC 7028	gx	12h03m10s	+16°27.5'		Com	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appena più brillante all'interno, a tratti appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" — 400x.
UGC 7031	gx	12h03m22s	+29°25.2'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NE a SW e estesa oltre 1'; in visione distolta appare poco meglio contrastata a 380x.
UGC 7032	gx	12h03m27s	+16°29.1'		Com	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, poco più brillante al centro, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
UGC 7033	gx	12h03m25s	+47°21.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 495x.
UGC 7034	gx	12h03m38s	+02°02.8'		Vir	16"	buona / discreto	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 188x.
UGC 7035	gx	12h03m40s	+02°38.5'		Vir	24"	discreta / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 7039	gx	12h03m51s	+16°33.3'		Com	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in parte disturbata da una stellina brillante situata 1' NW; più che altri appare un piccolo nucleo diffuso, ma la gx in sé non dovrebbe essere più estesa di 40" — 400x.
UGC 7040	gx	12h03m54s	+25°26.0'		Com	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, con tenue condensazione centrale, allungata grosso modo da N a S con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 280x.
UGC 7042	gx	12h03m54s	+01°53.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, solo a tratti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 400x.
UGC 7046	gx	12h04m00s	+49°06.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a NE — 495x.
UGC 7049	gx	12h04m09s	+20°11.1'		Com	16"	discreta / scarso	debolissima, quasi elusiva; è una chiazza di forma indistinta che appare a tratti in visione distolta — 270x.
UGC 7057	gx	12h04m20s	+01°34.0'		Vir	24"	m. buona / buono	è una lama di luce con gradiente molto basso e finemente screziata quasi in tutta la sua lunghezza, orientata da E a W per 1.5'; la SAO 119195 di magnitudo 7.7, situata 6.5' a S, si riesce fortunatamente a tenere fuori campo a 400x.
UGC 7058	gx	12h04m08s	+79°23.0'		Cam	28"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, a tratti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 40"×20"; c'è una stellina a ridosso NW — 388x.
UGC 7059	gx	12h04m19s	+79°24.5'		Cam	28"	buona / buono	più evidente di UGC 7058, situata un paio di primi scarsi a S, ma comunque molto debole, di luminosità uniforme e dimensioni poco maggiori (~ 45"×30") — 388x.
UGC 7064	gx	12h04m43s	+31°10.6'		UMa	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, Ø di 1', con condensazione centrale piccola e diffusa; c'è una stellina appena percettibile, a 380x, a 1' NNE e un'altra più brillante a 1.5' NNW.
UGC 7065	gx	12h04m47s	−02°43.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge diffuso poco contrastato sul disco; c'è una coppia di stelline a S — 400x.
UGC 7069	gx	12h04m58s	+43°09.0'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×15" — 495x.
UGC 7071	gx	12h05m15s	+38°14.2'		UMa	16"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di oltre 30"; meglio visibile a 270x, anche perché a 380x il campo è depleto.
UGC 7072	gx	12h05m13s	+28°46.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole chiazza circolare con Ø di ~ 1', diffusa e di luminosità uniforme; è meglio visibile scalando a 270x (a 380x si stempera troppo sul fondo cielo); c'è una stellina a un paio di primi verso S.
UGC 7073	gx	12h05m23s	+17°53.1'		Com	16"	buona / buono	diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' e bassissimo gradiente di luce — 270x.
UGC 7074	gx	12h05m24s	+17°55.2'		Com	16"	buona / buono	più evidente, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
UGC 7078	gx	12h05m29s	+46°46.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW — 495x.
UGC 7079	gx	12h05m21s	+63°09.4'		UMa	16"	buona / scarso	è un elusivo oggetto rotondo di una 30-ina di secondi che appare solo a tratti in visione distolta a 270x (il seeing in questo momento non permette di spingere di più).
UGC 7084	gx	12h05m38s	+33°05.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45", con piccolo bulge quasi stellare abbastanza contrastato sul disco — 380x.
UGC 7085	gx	12h05m42s	+08°59.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata a 400x (a 570x tende a diffondersi troppo); a pochi primi verso E ci sono 3 stelline abbastanza brillanti poste ad arco.
UGC 7086	gx	12h05m56s	+77°30.3'		Cam	28"	buona / buono	è una lama di luce molto debole, orientata da E a W ed estesa 1.5'; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo S; una più debole si trova a 1' verso W — 388x.
UGC 7089	gx	12h05m59s	+43°08.9'	q 74	UMa	28"	m. buona / ottimo	è una gx piuttosto estesa e con basso gradiente di luce, molto allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta arrivano a quasi 3'×1'; presenta un bulge molto diffuso, ma poco contrastato sul disco — 495x.
UGC 7094	gx	12h06m11s	+42°57.4'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20"; situata in mezzo a 2 stelline distanti 6' in direzione E-W — 495x —
UGC 7097	gx	12h06m42s	+80°55.2'		Cam	28"	buona / buono	è un debolissimo baffo di luce rettilineo che in visione distolta appare esteso ~ 1' in direzione E-W — 388x.
UGC 7098	gx	12h06m33s	+39°14.3'		CVn	16"	buona / m. buono	è un ovale di ~ 60"×40" orientato da E a W con bulge evidente e diffuso e situato ove sono presenti solo deboli stelline — 270x.
UGC 7100	gx	12h06m44s	+17°42.9'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 7104	gx	12h07m09s	+16°55.3'		Com	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima "righetta" abbastanza netta che aggetta verso W per una 30-ina di secondi da una stella brillante di 11-esima; appare solo in visione distolta, ma occorre spingere a 570x.
UGC 7105	gx	12h07m19s	+36°39.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	abbastanza facile, ma con basso gradiente, allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 7109	gx	12h07m25s	+16°53.3'		Com	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole, orientata da NE a SW ed estesa 1' che sembra aggettare da una stellina brillante — 570x.
UGC 7115	gx	12h08m16s	+25°14.2'		Com	16"	buona / buono	facile, relativamente brillante, rotonda con Ø 45", alto gradiente e nucleo di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 7124	gx	12h08m46s	+24°56.8'		Com	16"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a UGC 7143 e a CGCG 128-41, di un terzetto di deboli galassiette poste ad arco — presenta un nucleo stellare circonfuso da un alone poco allungato da NE a SW di dimensioni 30"×20" — 380x.
UGC 7125	gx	12h08m42s	+36°48.2'	q 107	CVn	16"	buona / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare molto allungata da E a W per ~ 3', con una stellina abbastanza brillante nei pressi del bordo NE — 270x.
UGC 7129	gx	12h08m55s	+41°44.4'		CVn	16"	buona / m. buono	diffuso lucore relativamente facile e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina a 1.5' verso NE — 380x.
UGC 7132	gx	12h09m10s	+31°34.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, diffusa, con Ø di ~ 45" e con condensazione centrale evidente a 380x.
UGC 7133	gx	12h09m20s	+18°59.9'		Com	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza di luminosità uniforme estesa una 40-ina di secondi e osservabile in visione distolta a 270x.
UGC 7137	gx	12h09m28s	+22°06.3'		Com	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
UGC 7138	gx	12h09m29s	+26°13.5'		Com	16"	buona / buono	debolissima e diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; si localizza facilmente perché è situata subito a E di un piccolo arco formato da 3 stelline brillanti; meglio osservabile a 188x.
UGC 7141	gx	12h09m39s	+23°17.3'		Com	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15"; c'è una debole stellina subito a E — 450x.
UGC 7143	gx	12h09m47s	+25°01.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' verso NNW — 380x.
UGC 7144	gx	12h09m45s	+56°31.6'		UMa	16"	m. buona / discreto	abbastanza facile, diffusa e con gradiente medio di luce; è rotonda con Ø > 1' — 270x.
UGC 7145	gx	12h09m51s	+38°13.1'		UMa	16"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da NNW a SSE (si confronti l'orientamento delle 2 stelle brillante a NE), con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1' SW — 380x.
UGC 7153	gx	12h09m47s	+62°16.1'		UMa	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa per oltre 1' — 450x.
UGC 7155	gx	12h10m11s	+49°17.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso SE — 495x.
UGC 7157	gx	12h10m15s	+25°18.5'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante e con alto gradiente, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; è in parte disturbata dalla SAO 82164 di magnitudo 9.4 situata 2.5 ENE — 380x.
UGC 7159	gx	12h10m08s	+39°03.1'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' SE — 495x.
UGC 7164	gx	12h10m22s	+70°30.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di forma indistinta, non più estesa di 30"; appare solo in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 7168	gx	12h10m31s	+70°22.2'		Dra	24"	ottima / m. buono	debole, ma facilmente visibile a 450x anche in visione diretta, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a E e un'altra poco più evidente a 1' SW. UGC 7160, situata 3' a NW, risulta invisibile anche spingendo a 580x; occorre tuttavia fare attenzione a una stellina di 17-esima visibile solo a momenti e situata subito a N della presunta posizione della galassia: ciò potrebbe talvolta dare l'impressione di un piccolo oggetto nebuloso.
UGC 7170	gx	12h10m37s	+18°49.7'	q 148	Com	16"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa un paio di primi; meglio visibile a 270x; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE.
UGC 7175	gx	12h10m54s	+39°45.5'		CVn	16"	m. buona / buono	è una galassietta elusiva che appare solo a tratti in visione distolta; è molto piccola con dimensioni max di 20" (bisogna tenere fuori campo una stella brillante di 6.5 situata 8' a N) — 270x.
UGC 7177	gx	12h11m04s	+00°58.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, leggermente condensata e con Ø > 30"; facilmente osservabile in visione distolta a 400x.
UGC 7178	gx	12h11m04s	+02°00.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente e solo a tratti in visione distolta, estesa 40"-45", ma di forma assolutamente indistinta; meglio comunque scalare a 340x.
UGC 7179	gx	12h10m58s	+63°54.9'		Dra	16"	ottima / ottimo	in visione distolta appare come una lama di luce molto debole, di luminosità pressoché uniforme ed estesa almeno 1.5' in direzione NW-SE — 380x.
UGC 7180	gx	12h10m54s	+66°55.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" (è situata sul lato orientale di un triangolo isoscele formato da 3 stelline e il cui vertice più acuto punta a N) — 450x.
UGC 7184	gx	12h11m04s	+00°58.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, leggermente condensata e con Ø > 30"; facilmente osservabile in visione distolta a 400x.
UGC 7187	gx	12h11m21s	+35°50.7'		CVn	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 7188	gx	12h11m17s	+39°24.2'		CVn	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 7189	gx	12h11m19s	+74°48.5'		Dra	16"	ottima / buono	è molto debole, allungata ~ da N a S, di dimensioni 2' ×1'; presenta una condensazione centrale molto tenue visibile a tratti. È come "compressa" tra due stelline poste a ridosso lungo l'asse della galassia — 270x.
UGC 7190	gx	12h11m32s	+29°05.3'		Com	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo relativamente facile, di 20" di Ø, diffuso e con nucleo stellare; c'è una stellina evidente quasi a ridosso verso NW — 380x.
UGC 7194	gx	12h11m55s	+16°13.9'		Com	16"	buona / buono	è una galassietta elusiva e molto diffusa, estesa una 30-ina di secondi che appare solo a tratti in visione distolta; scalando a 188x la visione non migliora; c'è una stellina un paio di primi a N.
UGC 7196	gx	12h11m59s	+15°24.1'		Com	28"	m. buona / ottimo	molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20", relativamente compatta di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina; c'è una stellina a 1' SE — 495x.
UGC 7208	gx	12h12m28s	+39°06.6'		CVn	16"	m. buona / buono	debole, rotondeggiante, diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 1' scarso; c'è una stellina a 1.5' verso NW — 270x.
UGC 7210	gx	12h12m31s	+15°16.2'		Com	28"	m. buona / ottimo	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15", poco diffusa e con piccolo bulge evidente; c'è una stellina subito a S — 495x.
UGC 7213	gx	12h12m41s	+40°33.8'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina brillante una paio di primi a SE — 495x.
UGC 7218	gx	12h12m54s	+52°15.8'	q 47	CVn	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una debole stellina a ridosso verso E — 270x.
UGC 7221	gx	12h13m14s	+28°50.2'		Com	16"	ottima / ottimo	molto deboli, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 380x.
UGC 7224	gx	12h13m18s	+21°38.0'		Com	16"	buona / buono	relativamente facile, rotonda, diffusa, Ø ~ 1', con basso gradiente di luce e nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina molto debole un paio di primi NE — 270x.
UGC 7226	gx	12h13m18s	+75°02.0'		Dra	20"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza di forma indistinta estesa grosso modo una 30-ina di secondi — 360x.
UGC 7228	gx	12h13m36s	+46°29.7'		Cvn	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina al bordo NE — 450x.
UGC 7230	gx	12h13m38s	+16°07.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo qualche lieve irregolarità di luce che però appare solo a tratti a 400x; è allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 400x.
UGC 7242	gx	12h14m08s	+66°05.6'		Dra	16"	m. buona / m. buono	difficilissima, in quanto totalmente "soffocata" dalla luce della SAO 15747 di magnitudo 6.7; si riesce a scovare a 380x in visione distolta quando a tratti sembra aggettare dalla stella per oltre 1' verso S; non bisogna tuttavia fissare la stella, ma guardare preferibilmente sopra di essa — 270x
UGC 7243	gx	12h14m23s	+32°24.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di 45", gradatamente più brillante verso l'interno e con condensazione centrale facilmente visibile a 380x.
UGC 7248	gx	12h14m37s	+24°18.1'		Com	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 7249	gx	12h14m38s	+12°48.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 90"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.

UGC 7257	gx	12h15m03s	+35°57.6'	q 107	CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme; a 270x appare allungata da N a S con dimensioni 50"×30".
UGC 7263	gx	12h15m25s	+19°17.5'		Com	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda con Ø di ~ 1' e appena più brillante all'interno; presenta un nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 7266	gx	12h15m29s	+24°05.6'		Com	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 7267	gx	12h15m24s	+51°21.0'	q 47	CVn	16"	ottima / ottimo	è poco più luminosa di NGC 7218 e di dimensioni del tutto simili; è allungata da NE a SW e si presenta di luminosità uniforme — 270x.
UGC 7270	gx	12h15m34s	+21°49.9'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, molto allungata da NNW a SSE (a perpendicolo, cioè, con le 2 stelline situate 2' SE e 4' SE), con dimensioni 60"×20" — 380x.
UGC 7271	gx	12h15m33s	+43°26.1'	q 74	CVn	28"	ottima / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina a 1' verso E — 495x.
UGC 7280	gx	12h15m52s	+00°24.0'		Vir	24"	m. buona / buono	poco diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 50"×25" 400x.
UGC 7286	gx	12h15m59s	+27°26.5'		Com	16"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio visibile a 270x.
UGC 7287	gx	12h16m09s	+28°07.8'		Com	16"	ottima / discreto	è un debolissimo lucore di luminosità uniforme, approssim. circolare, con Ø di una 40-ina di secondi; in visione diretta si "diluisce" sul fondo cielo — 270x.
UGC 7289	gx	12h16m14s	+28°45.7'		Com	16"	ottima / ottimo	debolissima, a 270x in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"× 20" e di luminosità uniforme (non sono riuscito a vedere UGC 7300).
UGC 7295	gx	12h16m34s	+33°27.1'		CVn	24"	ottima / buono	è un baffo di luce molto tenue e di luminosità uniforme che in visione distolta sembra a prima vista aggettare a S di una stellina per una 40-ina di secondi; a poco più di 1' SW si nota un'altra stellina appena percettibile e debolmente sfuocata: da un controllo successivamente effettuato è risultata essere la MAC 1216+3326A — 450x.
UGC 7301	gx	12h16m42s	+46°04.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, estesa ~ 80" in direzione E-W; c'è una coppia di stelline distanti 1' e orientate da NE a SW a W della gx — 495x.
UGC 7314	gx	12h17m14s	+08°56.5'		Vir	28"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, si luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; situata tra 2 stelline orientate da WNW a ESE e distanti 4.5' (quella orientale è più brillante) — 495x.
UGC 7320	gx	12h17m29s	+44°48.7'		CVn	28"	ottima / m. buono	è una debolissima chiazza oblunga, orientata da E a W; in visione distolta appare grosso modo di dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso W — 495x.
UGC 7321	gx	12h17m34s	+22°32.5'	q 148	Com	16"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa forse 4' (un po' meno della distanza tra la stellina appena percettibile subito a E e un'altra poco più brillante situata a W) in direzione E-W — 380x.
UGC 7324	gx	12h17m26s	+46°34.0'		CVn	28"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 45"×15", con bulge diffuso e poco contrastato sul disco; c'è una stellina a 1.5' verso N — 495x.
UGC 7325	gx	12h17m29s	+46°49.7'		Cvn	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
UGC 7331	gx	12h17m53s	+17°26.5'		Com	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; a 188x si apprezza meglio la forma, mentre a 270x si vede abbastanza facilmente un piccolo nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' S.
UGC 7332	gx	12h17m56s	+00°26.3'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissimo lucore di aspetto irregolare e di forma indistinta, esteso per 30" o 40"; salta fuori in visione distolta ~ 1' a S di una stellina — 400x.
UGC 7340	gx	12h18m13s	+44°10.4'		CVn	16"	m. buona / m. buono	debole ma relativamente facile, poco allungata da E a W, dimensioni 40"×30", con nucleo piccolo e abbastanza evidente — 380x.
UGC 7346	gx	12h18m42s	+17°43.1'		Com	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza rotonda, molto stemperata sul fondo cielo, con Ø di ~ 1.5' e di luminosità uniforme; è meglio scalare a 270x.
UGC 7354	gx	12h19m10s	+03°51.4'	q 238	Vir	16"	buona / m. buono	piccola e debole bolla rotonda di 30"-35" di Ø e di luminosità uniforme; è facilmente visibile anche in visione diretta a 380x.
UGC 7355	gx	12h19m02s	+13°58.9'		Com	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **IC 3142** situata subito a E — è debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
UGC 7356	gx	12h19m09s	+47°05.4'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza diffusa e molto stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 7357	gx	12h19m13s	+22°25.9'		Com	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
UGC 7358	gx	12h19m12s	+49°21.2'		CVn	16"	m. buona / buono	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30" — 270x.
UGC 7366	gx	12h19m29s	+17°13.8'		Com	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 7367	gx	12h19m32s	+49°48.9'		CVn	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con nucleo marcato di aspetto quasi stellare — 270x.
UGC 7370	gx	12h19m40s	+02°04.8'		Vir	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni di 60"×20"; c'è una stellina brillante subito a E; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 7374	gx	12h19m44s	+28°51.4'		Com	16"	ottima / ottimo	è la più debole di un quartetto di galassiette allineate da N a S — questa è visibile a tratti a 270x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
UGC 7379	gx	12h19m43s	+53°03.5'		UMa	16"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di ~ 40"; salta fuori in visione distolta in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti distanti 4' in direzione ENE-WSW — 270x.
UGC 7383	gx	12h20m02s	+08°36.5'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×30" — 450x.
UGC 7394	gx	12h20m28s	+01°28.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole lama di luce di aspetto uniforme, estesa per oltre 1' in direzione NW-SE; due stelline abbastanza brillanti situate a E ed ENE sono poste a perpendicolo con la galassia — 450x.
UGC 7395	gx	12h20m28s	+31°10.2'		Com	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 30" (ossia come la distanza della coppia situata 2.5' a SE) — 380x.
UGC 7396	gx	12h20m34s	+00°47.3'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30" — 450x.
UGC 7399A	gx	12h20m49s	+17°29.3'		Com	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×40" e con piccolo bulge evidente, anche se poco contrastato sul disco — 450x.
UGC 7406	gx	12h21m05s	+61°05.2'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di aspetto un po' confuso, probabilmente rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 7408	gx	12h21m15s	+45°48.7'	q 74	CVn	16"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo osservabile in visione distolta, allungata da E a W, con dimensioni 2'×1' — 380x.
UGC 7410	gx	12h21m22s	+82°40.5'		Cam	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma visibile senza difficoltà in visione distolta, molto allungata da N a S, con dimensioni 50"×20", di luminosità uniforme e in parte disturbata dalla luminosità di una stellina brillante di 9ª situata 2' SE; solo a tratti sembra d'intravedere qualche lieve irregolarità di luce — 380x.
UGC 7416	gx	12h21m37s	+40°50.9'		CVn	16"	m. buona / buono	diffusa e di aspetto un po' irregolare, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; presenta un nucleo stellare visibile a momenti — 270x.
UGC 7422	gx	12h22m01s	+05°06.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 7424	gx	12h21m58s	+08°40.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza forse circolare, molto spampanata e con Ø di una 40-ina di secondi; è situata a ridosso SE di una stellina; non sembra meglio definita scalando gli ingrandimenti — 450x.
UGC 7425	gx	12h21m54s	+15°38.8'		Com	24"	m. buona / discreto	debolissima e diffusa, estesa una 30-ina di secondi, forse rotonda; c'è una coppia di deboli stelline a 15' verso S.
UGC 7428	gx	12h22m03s	+32°05.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di almeno 1'; c'è una stellina brillante a ~ 1' verso E — 380x.
UGC 7436	gx	12h22m20s	+14°45.6'		Vir	16"	buona / ottimo	è un debolissimo lucore esteso ~ 1.5' che appare solo in visione distolta, ma la forma resta assolutamente indistinta — 270x.
UGC 7444	gx	12h12m22s	+45°03.5'		CVn	16"	buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con nucleo contrastato quasi stellare — 380x.
UGC 7464	gx	12h23m41s	+02°56.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	lama di luce relativamente facile, poco più spessa al centro, con tenue bulge diffuso poco contrastato, orientata da NW a SE per 1'; c'è un piccolo asterismo foggiato a "S" subito a E della gx — 450x.
UGC 7486	gx	12h24m14s	+44°56.2'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio definita scalando a 340x.
UGC 7487	gx	12h24m27s	+00°09.2'		Vir	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 7490	gx	12h24m25s	+70°20.1'	q 25	Dra	16"	m. buona / mediocre	appare come un debole alone asimmetrico attorno a una stellina brillante; è rotonda, di luminosità uniforme e Ø di un paio di primi; si noti, per confronto, la stella di magnitudo simile situata ~ 6' a NE che è priva di alone — 270x.
UGC 7512	gx	12h25m42s	+02°09.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 60"×30" (il campo visivo è disturbato dalla SAO 119392 di 7ª situata a 8.5' SE della gx, né è possibile restringerlo aumentando gli ingrandimenti in quanto l'oggetto scompare).
UGC 7513	gx	12h25m43s	+07°13.0'		Vir	16"	ottima / ottimo	debole lama di luce relativamente compatta, orientata da NNW a SSE ed estesa oltre 2'; c'è una stellina appena percettibile verso l'estremità NNW osservabile a 380x; la gx appare però meglio contrastata 270x (riportata sul Megastar come IC 3322A).
UGC 7516	gx	12h25m47s	+04°30.5'		Vir	24"	discreta / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 7522	gx	12h25m58s	+03°25.8'		Vir	24"	buona / buono	è una lama di luce orientata da NW a SE, estesa 2.5' e di luminosità uniforme; c'è una stellina all'interno abbastanza brillante verso il bordo NW — 450x.
UGC 7525	gx	12h25m54s	+45°16.9'		CVn	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 7531	gx	12h26m12s	−01°18.3'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 50"×30" — 400x.
UGC 7534	gx	12h26m08s	+58°19.2'	q 47	UMa	16"	m. buona / buono	appare solo in visione distolta come un alone debolissimo di aspetto circolare e molto eccentrico che circonda una stella brillante aggettando verso N; è importante un confronto con un paio di stelle di luminosità simile situate rispettivamente 8' NE e 12' NNE che osservate in visione indiretta mostrano il classico debole alone simmetrico di diffusione — 270x.
UGC 7557	gx	12h27m11s	+07°15.8'		Vir	16"	ottima / ottimo	debolissimo e indistinto lucore molto disturbato da una coppia di stelle brillanti situate subito a SW; appare solo a tratti in visione distolta, ma bisogna scalare almeno a 188x; a 132x appare poco più esteso e leggermente condensato.
UGC 7559	gx	12h27m05s	+37°08.6'	q 108	CVn	16"	buona / buono	debolissima, assai stemperata sul fondo cielo e a bassissima luminanza superficiale ed estesa un paio di primi; non è tuttavia difficile da vedere in visione distolta a 188x.
UGC 7560	gx	12h26m57s	+48°16.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso E — 380x.
UGC 7577	gx	12h27m42s	+43°29.6'	q 75	CVn	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, orientata da NW a SE con dimensioni di 2.5'×1.5' e di luminosità uniforme; c'è una stellina al margine SE; una stella brillante si trova 3' a W; la visione è tuttavia più interessante scalando gli ingrandimenti.
UGC 7580	gx	12h27m55s	+08°05.4'		Com	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 400x.
UGC 7590	gx	12h28m19s	+08°43.8'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, solo a tratti leggermente condensata, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso NE — 380x.
UGC 7593	gx	12h28m15s	+44°27.1'		CVn	24"	m. buona / buono	forma una coppia serrata con **MCG+8-23-39** situata a W: si separano abbastanza facilmente a 450x: appaiono 2 nuclei quasi stellari che in visione distolta sembrano immersi in un alone comune; a tratti un tenuissimo baffo aggetta verso S per 10" o 15"; il nucleo della UGC è più puntiforme (la coppia non era separabile nel 16" neppure a 380x).
UGC 7596	gx	12h28m34s	+08°38.4'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 7599	gx	12h28m29s	+37°14.0'	q 108	CVn	16"	buona / buono	oggetto molto debole che appare a tratti in visione distolta poco allungato grosso modo da NW a SE con dimensioni 40"×30"; è situata a ridosso N di una stellina — 270x.
UGC 7605	gx	12h28m39s	+35°43.1'	q 108	CVn	16"	buona / buono	appare solo a tratti ed elusivamente in visione distolta come una debolissima macchia approssim. circolare ed estesa sì e no 1'; è situata in mezzo a 2 stelline orientate da NE a SW e distanti 4' — 270x.
UGC 7608	gx	12h28m45s	+43°13.5'	q 75	CVn	16"	ottima / m. buono	debolissima, diffusa, forse rotonda con Ø di ~ 1'; è meglio osservabile scalando a 188x.
UGC 7612	gx	12h29m03s	+02°43.3'		Vir	24"	buona / buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme che in visione distolta appare chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni 90"×45", anche se occorre scalare a 200x.
UGC 7617	gx	12h29m06s	+44°39.3'		CVn	16"	buona / scarso	è una lama di luce molto debole, quasi elusiva, visibile solo a tratti in visione distolta ed estesa un paio di primi in direzione E-W — 188x.
UGC 7618	gx	12h29m08s	+57°54.9'		UMa	28"	m. buona / buono	debolissima lama di luce estesa 1.5' e orientata da NE a SW; c'è una stellina brillante a 1.5' NE — 495x.
UGC 7635	gx	12h29m45s	+56°49.6'		UMa	16"	m. buona / discreto	relativamente brillante, compatta, con nucleo stellare, rotonda, con Ø di 35"40"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi dal bordo occidentale — 270x.
UGC 7639	gx	12h29m53s	+47°31.8'	q 75	CVn	16"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40" e appena più brillante all'interno — 270x.
UGC 7642	gx	12h30m14s	+02°37.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; allineata ed equidistante con due stelline a SW; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 7652	gx	12h30m45s	+12°22.0'		Vir	24"	ottima / ottimo	assieme a MAC 1230+1221 situata una 40-ina di secondi a SW forma una coppia di debolissime galassiette all'interno dell'alone finemente screziato di M87; sono rotonde con Ø di una 15-ina di secondi; la UGC è poco più evidente — 450x.
UGC 7661	gx	12h31m07s	+52°24.8'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 495x.
UGC 7664	gx	12h30m24s	+84°46.8'		Cam	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW; sempre verso S c'è una stellina brillante a 1' dalla gx — 450x.
UGC 7678	gx	12h32m01s	+39°49.9'		CVn	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni ~ 80"×60" — 270x.
UGC 7688	gx	12h32m32s	+08°02.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta a ridosso W di una stellina brillante che offusca un po' la visione; meglio restare a 450x; un'altra stellina più debole si trova poco più distante a NW.
UGC 7689	gx	12h32m29s	+39°35.4'		CVn	28"	m. buona / scarso	debole lama di luce di aspetto uniforme, orientata da E a W ed estesa 1.5' — 495x.
UGC 7690	gx	12h32m27s	+42°42.3'	q 75	CVn	16"	ottima / m. buono	è una gx incredibilmente facile, rotonda, molto diffusa, con gradiente medio e Ø di quasi 1.5'; è di luminosità non perfettamente regolare — 270x.
UGC 7697	gx	12h32m52s	+20°11.0'		Com	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W e che in visione distolta appare estesa per oltre 1'; c'è una stellina a 1.5' SE — 450x.
UGC 7698	gx	12h32m54s	+31°32.3'	q 108	CVn	16"	buona / buono	debolissima, elusiva, appare solo a tratti; estesa forse un paio di primi; sembra di vedere qualcosa di puntiforme all'interno, ma non riesco a capire se trattasi del nucleo o di una stellina a ridosso — 188x.
UGC 7699	gx	12h32m48s	+37°37.2'	q 108	CVn	16"	buona / buono	è una bella gx estesa e molto allungata in direzione NE-SW, di dimensioni 4'×1' (estesa cioè come la distanza delle 2 stelline situate subito a E e a N); presenta un bulge diffuso poco più brillante visibile a tratti; la piena estensione si apprezza però solo in visione distolta — 270x.
UGC 7707	gx	12h33m19s	+17°27.6'		Com	24"	ottima / m. buono	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20"; meglio tuttavia non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 7708	gx	12h33m11s	+48°03.0'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso S e una appena percettibile subito a NE o NNE — 450x.
UGC 7715	gx	12h25m47s	+04°30.5'		Vir	24"	discreta / buono	debolissima chiazza pressoché circolare con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta subito a W di una debole stellina, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 7719	gx	12h34m00s	+39°01.2'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce che a tratti, in visione distolta, appare estesa per almeno 1.5' e orientata da N a S — 380x.
UGC 7720	gx	12h34m09s	−00°21.3'		Vir	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di deboli stelline subito a NW — 450x.
UGC 7730	gx	12h34m06s	+64°34.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza rotondeggiante con Ø di 30"-35", poco meglio evidente scalando a 340x; c'è una stellina a 1' SW e un'altra appena percettibile subito a S, ma quest'ultima è risultata essere la **2MASS 12340686+6433073** — 450x.
UGC 7739	gx	12h34m45s	+06°18.0'		Vir	24"	ottima / ottimo	è una debolissima chiazza diffusa estesa per quasi 1' che appare con gran difficoltà in visione distolta a un paio di primi SW di una stellina; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 7740	gx	12h34m42s	+49°19.5'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10" — 450x.
UGC 7750	gx	12h35m09s	+29°44.6'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SW, di dimensioni 60"×20", con piccola condensazione centrale visibile a tratti; è meglio osservabile a 270x.
UGC 7752	gx	12h35m30s	−02°19.6'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×15"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
UGC 7754	gx	12h35m24s	+29°29.5'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 7755	gx	12h35m39s	−00°12.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa ~ 45" e orientata da NE a SW; appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 7763	gx	12h35m55s	−01°51.2'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 7767	gx	12h35m32s	+73°40.6'		Dra	20"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata al vertice rettangolo di un triangolo formato da due stelle brillanti a E e a S — 360x.
UGC 7774	gx	12h36m23s	+40°00.3'	q 75	CVn	16"	ottima / ottimo	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme orientata da E a W ed estesa per oltre 2'; c'è una stellina a ~ 45" SE — 380x.
UGC 7779	gx	12h36m30s	+32°04.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15", con condensazione centrale piccola e abbastanza evidente — 380x.
UGC 7795	gx	12h37m45s	+07°06.3'		Vir	16"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore appena percettibile, di forma indistinta ed esteso meno di 1'; salta fuori in visione distolta a 270x .
UGC 7798	gx	12h38m03s	−02°15.8'		Vir	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 7800	gx	12h38m05s	−00°01.7'		Vir	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15", a tratti appena più brillante all'interno; c'è una stellina a poco più di 1' verso W — 450x.
UGC 7802	gx	12h38m21s	+07°53.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, lama di luce di luminosità uniforme orientata da NE a SW ed estesa 1.5'; c'è una stellina a 1' scarso NW *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 7806	gx	12h38m36s	+01°24.1'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa 1.5'; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina brillante subito a SE.
UGC 7807	gx	12h38m38s	+01°28.4'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una debole stellina a N; meglio definita scalando a 340x.
UGC 7811	gx	12h38m49s	+31°59.1'		CVn	16"	m. buona / ottimo	allungata da E a W, dimensioni 50"×25", diffusa e con nucleo stellare evidente a 380x c'è una debole stellina a 2' verso W e una brillante a 2' SSE.
UGC 7811	gx	12h38m48s	+32°05.5'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è una sorta di bolla relativamente compatta, di aspetto abbastanza uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso N e osservabile a 380x.
UGC 7813	gx	12h39m01s	+00°21.9'		Vir	24"	ottima / ottimo	relativamente brillante, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 7820	gx	12h39m11s	+00°43.0'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debolissima macchia rotonda molto diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di ~ 1'; stranamente meglio visibile spingendo a 450x.
UGC 7823	gx	12h39m34s	+47°37.4'		CVn	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni di 60"× 30"; è situata all'interno di un triangolo isoscele quasi rettangolo formato da stelle brillanti di luminosità crescente a partire da quella più a N — 380x.
UGC 7824	gx	12h39m50s	+01°40.3'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima e piuttosto estesa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 90"×45"; poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 7836	gx	12h40m56s	+29°27.9'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, appena più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; meglio tuttavia scendere a 270x.
UGC 7840	gx	12h41m11s	−01°35.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa, estesa una 30-ina di secondi, ma di forma indistinta; situata 11' a SW della brillante Gamma Vir che fortunatamente si riesce a tenere fuori campo — 450x.
UGC 7841	gx	12h41m11s	+01°24.6'		Vir	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina molto debole al bordo NE che a prima vista potrebbe essere scambiata per il nucleo della gx — 450x.
UGC 7846	gx	12h41m08s	+48°19.6'		CVn	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; situata tra una stellina a SE e una coppia della stessa luminosità a NW — 450x.
UGC 7848	gx	12h40m57s	+63°31.2'		Dra	16"	ottima / ottimo	debolissima, assai diffusa e stemperata sul fondo cielo, grosso modo orientata da E a W, di dimensioni 80"×40"; c'è una debole stellina a 1' verso SW e un'altra appena percettibile a SE — 380x.
UGC 7854	gx	12h41m52s	+09°24.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 7857	gx	12h41m54s	+13°46.4'		Com	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NE e una debole quasi a ridosso verso W — 450x.
UGC 7872	gx	12h41m53s	+75°18.4'		Dra	28"	ottima / ottimo	è una gx debolissima e oltretutto disturbata dalla SAO 7635 di 8ª grandezza situata 3' a N; in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30" e di luminosità uniforme; un'altra stellina brillante se trova un paio di primi a SW — 495x.
UGC 7873	gx	12h42m41s	+01°20.7'		Vir	24"	ottima / ottimo	è una debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; disturbata dalla SAO 119545 di 8a grandezza situata 3' a WSW — 450x.
UGC 7883	gx	12h42m57s	−01°13.7'		Vir	24"	buona / buono	molto allungata da ENE a WSW con dimensioni di 2'×30", diffusa e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 7890	gx	12h43m05s	+27°42.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 7904	gx	12h43m57s	+40°43.8'		CVn	28"	mediocre / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa per ~ 1'; c'è una stellina a ridosso NE — 388x.
UGC 7905	gx	12h43m50s	+54°54.6'		UMa	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MCG+9-21-34** situata a ridosso SSW — è una chiazza irregolare molto diffusa e di luminosità uniforme, estesa 30"-35" — 450x.
UGC 7908	gx	12h43m38s	+73°36.8'		Dra	28"	buona / buono	è un elusivo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi in direzione NE-SW; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 388x.
UGC 7910	gx	12h44m07s	+45°00.3'		CVn	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 7911	gx	12h44m28s	+00°28.1'		Vir	24"	mediocre / ottimo	è una debolissima chiazza probabilmente circolare con Ø di un paio di primi e molto stemperata sul fondo cielo; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 7913	gx	12h44m34s	−02°19.1'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni 60"×40"; ciò nonostante è meglio evidente a 450x; allineata ed equidistante con 3 stelline abbastanza brillanti della stessa luminosità situate a E.
UGC 7922	gx	12h44m32s	+56°09.0'		UMa	28"	buona / buono	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1' — 495x.
UGC 7934	gx	12h45m33s	+35°07.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	è una piccola e debolissima galassietta molto diffusa, estesa max 30", ma non riesco a capire com'è fatta; si riesce a catturare solo a 380x.
UGC 7940	gx	12h46m11s	+46°43.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 7941	gx	12h46m01s	+64°34.2'	q 26	Dra	16"	m. buona / mediocre	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S per oltre 2' — 270x.
UGC 7942	gx	12h46m38s	+09°18.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; la visione è disturbata dalla SAO 119582 di magnitudo 7.5' situata 3' a SW — 450x.
UGC 7943	gx	12h46m46s	+05°57.3'		Vir	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 90"×60"; c'è una stellina a ridosso verso E; molto disturbata dalla SAO 119585 di 6ª grandezza situata ad appena 4' E e che a 400x non si riesce a tenere fuori campo.
UGC 7945	gx	12h47m01s	−01°34.7'		Vir	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da WNW a ESE con dimensioni grosso modo di 80"×40"; c'è una coppia di deboli stelline a NE; è meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 7950	gx	12h46m56s	+51°36.8'		Cvn	28"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; è un po' disturbata dalla SAO 28513 di 8ª grandezza situata un paio di primi scarsi a NW — 495x.
UGC 7956	gx	12h46m23s	+83°24.6'		Cam	28"	buona / buono	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 40"-45"; quasi allineata ed equidistante con 2 stelline a E; la gx è molto disturbata da una coppia abbastanza serrata di stelle molto brillanti di 6ª e 5ª grandezza (SAO 2101 e 2102) situate 5' a E — 388x.
UGC 7956A	gx	12h47m08s	+87°47.3'		UMi	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa di forma indistinta, ma comunque non più estesa di 30"-40"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 340x; c'è una coppia di deboli stelline: a E e a SE.
UGC 7959	gx	12h47m42s	+26°58.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge contrastato sul disco — 380x.
UGC 7960	gx	12h47m42s	+03°52.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 7976	gx	12h49m16s	+04°39.4'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza circolare diffusa e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio definita scalando a 340x; una stellina percettibile solo a momenti si trova a ridosso S.
UGC 7978	gx	12h49m40s	+12°37.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa forse 1' e orientata da NE a SW; appare con difficoltà in visione distolta, perché situata in una piccola zona depleta; meglio comunque scalare a 450x.
UGC 7979	gx	12h49m37s	+30°40.7'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; meglio scalare a 270x.
UGC 7982	gx	12h49m50s	+02°51.1'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debole lama di luce facile da vedere, orientata da N a S, estesa ~ 2.5' e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 7991	gx	12h50m39s	+01°27.8'		Vir	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole, filiforme, estesa 1.5' e orientata da N a S; c'è una stellina a ridosso del bordo N — 450x.
UGC 7992	gx	12h50m37s	+27°25.5'		Com	16"	discreta / scarso	è molto debole, ma si riesce a vedere anche in visione diretta come una piccola chiazza di forma indistinta — 270x.
UGC 7993	gx	12h50m32s	+52°07.3'		Cvn	28"	m. buona / buono	debole lama di luce di aspetto uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1.5'; c'è una stellina subito a N — 495x.
UGC 8002	gx	12h49m53s	+80°36.3'		Cam	28"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 388x.
UGC 8004	gx	12h51m38s	+31°21.1'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce, di luminosità uniforme ed estesa un paio di primi che appare solo in visione distolta a 270x (a 380x si confonde col fondo cielo).
UGC 8012	gx	12h52m03s	+51°40.8'		UMa	16"	m. buona / discreto	è un debole ovale di luminosità uniforme, di dimensioni 40"×30" orientato da NW a SE (ossia come le 2 stelline situate rispettivamente 3' a S e WSW distanti 4') — 270x.
UGC 8013	gx	12h52m36s	+26°45.0'		Com	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme (salvo un nucleo puntiforme visibile però solo a momenti), molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; disturbata dalla SAO 82547d 7a grandezza che si fatica a tenere fuori campo — 450x.
UGC 8015	gx	12h52m54s	+09°59.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30", con piccolo bulge marcato e nucleo stellare (ma non si tratterà di una stellina sovrapposta? Sembra di fatto leggermente spostata verso NE) — 570x.
UGC 8017	gx	12h52m54s	+28°22.3'		Com	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente compatta, si vede facilmente a 380x, molto allungata da NE a SW con dimensioni di 60"×20".
UGC 8025	gx	12h54m02s	+29°36.1'		Com	16"	ottima / ottimo	è molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 80"×20", di luminosità pressoché uniforme e abbastanza definita ai bordi — 380x.
UGC 8032	gx	12h54m44s	+13°14.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	bella, è posta praticamente di taglio, orientata da N a S con dimensioni 2'×30", di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo bulge diffuso che appare ogni tanto a 400x.
UGC 8039	gx	12h54m49s	+44°09.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", con piccola e tenue condensazione centrale — 495x.
UGC 8040	gx	12h54m44s	+58°46.6'		UMa	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce relativamente facile, orientata da NE a SW, estesa 1' e con lievi discrepanze di luce all'interno — 450x.
UGC 8041	gx	12h55m13s	+00°07.0'	q 239	Vir	10"	buona / buono	debolissima, di luminosità uniforme, percettibile in visione distolta a 118x; a prima vista appare di forma indistinta, ma a momenti sembra in effetti orientata da N a S con dimensioni superiori a 2'×1'.
UGC 8042	gx	12h55m10s	+07°55.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; è molto disturbata dalla SAO 11966 di magnitudo 9.5 a un paio di primi a S.
UGC 8045	gx	12h55m23s	+07°54.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 8046	gx	12h55m04s	+58°47.4'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
UGC 8047	gx	12h55m06s	+55°09.0'		UMa	24"	buona / ottimo	presenta un nucleo stellare marcato (ma non si tratterà di una stellina al centro?) circonfuso da un alone rotondo molto tenue con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
UGC 8050	gx	12h55m25s	+52°16.1'		Cvn	24"	buona / ottimo	è una debole bolla circolare diffusa, di luminosità uniforme con Ø di 45"; c'è una stellina brillante a 1' W e una più debole alla stessa distanza verso NW — 450x.
UGC 8052	gx	12h54m53s	+73°10.7'		Dra	16"	ottima / ottimo	è un debole fuso di luminosità uniforme, orientato da NW a SE con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina brillante a ~ 1' verso S — 380x.
UGC 8053	gx	12h55m49s	+04°00.8'	q 239	Vir	16"	m. buona / ottimo	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, di aspetto confuso e dimensioni ~ 1'; meglio scendere a 188x.
UGC 8056	gx	12h56m20s	+10°11.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8058	gx	12h56m14s	+56°52.5'		UMa	16"	buona / m. buono	elusiva e molto piccola; appare solo a tratti a circa 1' SE di una stellina — 380x.
UGC 8066	gx	12h57m00s	+01°01.7'		Vir	24"	ottima / ottimo	è un'elusiva chiazza forse circolare estesa 30" o 40"; appare solo a momenti in visione distolta a 340x.
UGC 8067	gx	12h57m12s	−02°42.4'		Vir	24"	ottima / ottimo	debole fuso di aspetto regolare, di luminosità uniforme, orientato da NW a SE ed esteso 1.5' — 450x.
UGC 8069	gx	12h57m11s	+29°01.7'		Com	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 380x.
UGC 8074	gx	12h57m44s	+02°41.6'	q 239	Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima, appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; sembra rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra una stellina a N e una coppia di stelline molto deboli a S — 450x.
UGC 8076	gx	12h57m50s	+29°39.3'		Com	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, diffuso e di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
UGC 8080	gx	12h58m02s	+26°51.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina brillante a ridosso SE — 380x.
UGC 8084	gx	12h58m22s	+02°47.6'	q 239	Vir	24"	ottima / ottimo	chiazza circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 45" — 450x.
UGC 8085	gx	12h58m18s	+14°33.3'		Com	24"	m. buona / ottimo	è un debole fuso di luminosità uniforme, orientato da NE a SW e di dimensioni 1.5'×20" — 450x.
UGC 8087	gx	12h57m10s	+78°37.0'		Cam	28"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 388x.
UGC 8088	gx	12h58m23s	+13°52.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una debole stellina a 1' SW — 450x.
UGC 8089	gx	12h58m30s	+09°32.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente in visione distolta a 450x al vertice meridionale di un triangolo equilatero formato con 2 stelline: a N c'è quella situata quasi a ridosso di CGCG 71-84, mentre l'altra più brillante si trova a WNW — 450x.
UGC 8091	gx	12h58m40s	+14°13.1'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e di aspetto un po' confuso, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; appare facilmente in visione distolta a 450x.
UGC 8093	gx	12h58m51s	+09°39.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 8094	gx	12h58m39s	+49°59.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso W, mentre una doppia dalle componenti sbilanciate si trova a 1' NE — 380x.
UGC 8095	gx	12h58m11s	+71°25.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NNW a ESE, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge poco contrastato; c'è una stellina a 1' ESE e una più debole subito a N — 450x.
UGC 8101	gx	12h56m52s	+84°06.1'		Cam	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno; più interessante, nonché meglio definita, scalando a 340x.
UGC 8105	gx	12h59m58s	+02°02.9'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a bordo NW — 450x.
UGC 8107	gx	12h59m40s	+53°20.4'		UMa	16"	m. buona / discreto	debole, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40"; presenta una sorta di "barra" centrale poco più brillante del disco e orientata come la gx — 270x.
UGC 8114	gx	13h00m25s	+13°40.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima e poco meglio definita scalando a 450x; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×30".
UGC 8119	gx	13h00m30s	+48°18.5'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con bulge diffuso, evidente; c'è un piccolo triangolo molto aperto di stelline a N della gx — 495x.
UGC 8120	gx	12h59m56s	+73°41.5'		Dra	16"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e di luminosità uniforme; è situata subito a N di un piccolo triangolo di stelline brillanti; c'è una stellina appena percettibile, a 380x, a ridosso verso N; una doppia strettissima e brillante si trova invece a poco più di 3' verso E.
UGC 8122	gx	13h00m50s	+27°24.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme; a tratti sembra poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; appare tuttavia poco più contrastata e con un cenno di condensazione centrale scalando a 270x.
UGC 8127	gx	13h01m04s	−01°57.2'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, ma in visione distolta appare facilmente molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×20"; c'è una stellina a 1' verso E e una appena percettibile a ridosso S — 450x.
UGC 8136	gx	12h50m32s	+77°33.6'		Cam	20"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso SE — 360x.
UGC 8146	gx	13h02m08s	+58°42.0'	q 48	UMa	16"	ottima / ottimo	lama di luce relativamente facile da vedere in condizioni di ottima trasparenza; è estesa un paio di primi in direzione NE-SW; c'è una stellina a ridosso verso SE — 270x.
UGC 8147	gx	13h00m15s	+80°04.1'		Cam	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 30"×10" e con tenue condensazione centrale; c'è una doppia subito a NW con le componenti uguali — 450x.
UGC 8148	gx	13h00m23s	+80°07.3'		Cam	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
UGC 8153	gx	13h03m05s	+03°59.2'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, diffuso con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SW — 450x.
UGC 8155	gx	13h03m15s	+07°48.1'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 1.5 e piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare; è osservabile abbastanza facilmente a 270x.
UGC 8158	gx	13h01m37s	+79°55.5'		Cam	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8161	gx	13h03m29s	+26°33.0'		Com	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE (come le due stelline a E), di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge poco contrastato — 450x.
UGC 8162	gx	13h03m16s	+50°37.2'		Cvn	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 8164	gx	13h02m18s	+78°32.5'		Cam	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.

UGC 8170	gx	13h04m15s	+09°13.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø 45"; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' verso NE — 400x.
UGC 8172	gx	13h04m12s	+61°11.7'		UMa	16"	m. buona / discreto	debolissima, appare solo a tratti a 132x (ho dovuto scalare drasticamente perché a 270x il campo oculare è depleto); è situata tra una stellina e una coppia con componenti separate da 1'.
UGC 8174	gx	13h04m28s	+55°36.3'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 8179	gx	13h05m14s	+32°00.0'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole, purtroppo disturbata dalla luce della SAO 63333 di 8.6 situata a soli 2.5' NW; è molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 8183	gx	13h04m11s	+78°23.3'		Cam	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; è disturbata da una stellina brillante a ridosso N — 450x.
UGC 8192	gx	13h06m18s	+10°22.6'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, di luminosità uniforme, diffusa, con Ø di ~ 45"; meglio osservabile a 270x.
UGC 8198	gx	13h06m25s	+48°57.8'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1.5' verso W — 495x.
UGC 8199	gx	13h06m45s	+35°06.1'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debole, poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a un paio di primi verso W — 380x.
UGC 8200	gx	13h06m56s	+35°07.9'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare in visione distolta quando si osserva UGC 8199, ma è difficile valutarne l'estensione e la forma; meglio comunque scalare a 270x, perché a 380x il campo è depleto.
UGC 8201	gx	13h06m25s	+67°42.3'	q 26	Dra	16"	m. buona / mediocre	è un oggetto esteso, appena più brillante del fondo cielo, con bassissimo gradiente di luce, forse orientata da E a W per circa 3' — 270x.
UGC 8204	gx	13h07m40s	+06°20.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto diffusa orientata da E a W, di dimensioni grosso modo 45"×30" e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante verso il bordo orientale — 450x.
UGC 8205	gx	13h07m14s	+58°08.1'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; una coppia di stelline a ESE sono poco più distanti della dimensione della gx — 450x.
UGC 8214	gx	13h07m37s	+62°12.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, poco diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 45" — 380x.
UGC 8217	gx	13h08m27s	+04°22.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1308+0422; di fatto quest'ultima, pur essendo debole, è la prima che appare e anche facilmente: è diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; UGC , invece, appare elusivamente in visione distolta a ridosso NW della compagna, ma non dovrebbe essere più estesa di 20" — 450x.
UGC 8222	gx	13h08m18s	+52°00.5'		Cvn	24"	buona / ottimo	molto debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 8223	gx	13h08m43s	−02°08.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; disturbata da una stella brillante situata a poco più di 1' SSW — 450x.
UGC 8225	gx	13h08m19s	+45°21.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	brillante, diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; sembra a prima vista "disegnata" a isofote: un nucleo stellare, un anello che rappresenta il bulge centrale e l'alone esterno — 495x.
UGC 8229	gx	13h08m54s	+28°11.0'		Com	16"	buona / ottimo	è appena più brillante di NGC 4983, dalla quale dista 10' a SE, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e presenta una condensazione centrale osservabile a momenti — 380x.
UGC 8231	gx	13h08m38s	+54°04.5'		UMa	28"	m. buona / buono	molto diffusa e molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30" e con un tenue bulge poco contrastato sul disco — 495x.
UGC 8233	gx	13h09m23s	+06°59.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	difficilissima in quanto situata nell'alone della SAO 119793 di magnitudo 7.5; spingendo a 570x appare a tratti come un tenuissimo aggetto verso E esteso una 30-ina di secondi.
UGC 8234	gx	13h08m45s	+62°16.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto facile, compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare; è situata a meno di 7' NW di NGC 5007 — 380x.
UGC 8237	gx	13h08m54s	+62°18.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	piccola, compatta, poco allungata ~ da N a S, dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; è situata 3' a NNE di UGC 8234 — 380x.
UGC 8238	gx	13h09m41s	−01°02.9'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta a 450x; a tratti appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30", ma per questo occorre scalare a 340x.
UGC 8245	gx	13h08m36s	+78°56.2'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 270x; è allungata da E a W con dimensioni 70"×30".
UGC 8246	gx	13h10m05s	+34°10.8'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa almeno un paio di primi; forse la visione migliore si ha scalando a 132x (riportata sull'Uranometria, ma la posizione sembra un poco più a S).
UGC 8248	gx	13h10m27s	+18°26.3'		LMi	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 8255	gx	13h10m57s	+11°28.7'		Vir	16"	ottima / ottimo	è un diffuso lucore molto debole e di luminosità uniforme, rotondo con Ø di ~ 1'; meglio contrastata a 270x.
UGC 8257	gx	13h10m51s	+49°53.6'		CVn	16"	ottima / ottimo	elusiva lama di luce orientata da NW a SE ed estesa per 40"-45"; appare solo a tratti in visione distolta a 270x.
UGC 8262	gx	13h11m26s	−00°15.0'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 8264	gx	13h08m29s	+84°37.8'		Cam	16"	ottima / ottimo	galassietta brillante, compatta, rotonda, con Ø di 30"-35", con evidente condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
UGC 8265	gx	13h11m37s	+00°40.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina evidente al bordo N e un'altra appena percettibile a quello opposto — 450x.
UGC 8266	gx	13h11m23s	+34°25.1'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45" e con nucleo stellare visibile a 380x; meglio tenere fuori campo la SAO 63392 di 8ª situata 5' NNE.
UGC 8268	gx	13h11m18s	+45°39.6'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×15" — 495x.
UGC 8272	gx	13h11m27s	+47°33.0'		CVn	16"	m. buona / m. buono	è debolissima, ma in visione distolta, mentre cercato di scovare MCG+8-24-68 situata meno di 2' a W e che non visto, mi è apparsa abbastanza chiaramente allungata ~ da N a S per 1' — 380x.
UGC 8281	gx	13h12m02s	+44°48.9'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10"; forma una coppia ravvicinata con MCG+8-24-79 situata a ridosso SW — 450x.
UGC 8282	gx	13h11m51s	+60°14.8'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
UGC 8283	gx	13h12m06s	+44°40.7'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 8285	gx	13h12m33s	+07°11.1'	q 195	Vir	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; appare solo in visione distolta, meglio a 380x.
UGC 8287	gx	13h11m03s	+78°24.8'		Cam	24"	m. buona / buono	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con evidente condensazione stellare (tuttavia le dimensioni si apprezzano meglio scalando a 340x).
UGC 8290	gx	13h12m42s	+22°49.9'	q 150	Com	16"	buona / discreto	debole e di aspetto un po' confuso a 188x; in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45" e di luminosità pressoché uniforme.
UGC 8296	gx	13h13m10s	+09°41.4'		Vir	24"	m. buona / buono	molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; in pratica si nota un nucleo abbastanza brillante con 2 tenui baffi che aggettano in quelle direzioni — 450x.
UGC 8298	gx	13h13m20s	+10°11.6'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 8299	gx	13h13m13s	+33°59.1'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso N e un'altra a poco più di 1' verso E — 380x.
UGC 8303	gx	13h13m18s	+36°12.8'	q 109	CVn	16"	buona / mediocre	chiazza lattiginosa molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta, approssim. circolare con Ø di un paio di primi e gradiente di luce molto basso; a tratti appare una stellina a ridosso verso S — 188x.
UGC 8304	gx	13h13m10s	+50°34.6'		CVn	16"	m. buona / discreto	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30" e a tratti appena più brillante all'interno; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
UGC 8306	gx	13h13m34s	+15°59.5'		Com	24"	buona / buono	è una lama di luce facilmente visibile, poco diffusa, orientata da NE a SW, estesa 1.5' e con tenue nucleo stellare abbastanza brillante evidente — 450x.
UGC 8309	gx	13h13m21s	+51°27.6'		Cvn	24"	buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1.5' SE — 450x.
UGC 8313	gx	13h13m54s	+42°12.6'		CVn	16"	m. buona / m. buono	molto debole, orientata da NE a SW, di dimensioni 2'×1' e solo appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1.5' verso SW — 270x.
UGC 8315	gx	13h14m10s	+39°08.8'		CVn	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" (il campo circostante è quasi depleto) — 495x.
UGC 8317	gx	13h14m23s	+30°29.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; meglio definita a 380x.
UGC 8318	gx	13h14m30s	+35°23.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 270x quando si osserva la coppia di stelline situate rispettivamente 3' a S e 4' a SE; è estesa ~ 1', ma di forma indistinta; bisogna tenere fuori campo la SAO 63429 di 7ª situata 8.5' a NE.
UGC 8320	gx	13h14m28s	+45°55.3'		CVn	16"	ottima / m. buono	debole e diffusa, ma facilmente visibile in visione distolta, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 3'×1' — 188x.
UGC 8322	gx	13h15m01s	+12°43.5'		Vir	24"	buona / buono	relativamente facile e compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con evidente nucleo stellare — 450x.
UGC 8323	gx	13h14m48s	+34°52.7'	q 109	CVn	16"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza di luminosità uniforme e di aspetto un po' confuso, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1'; meglio visibile a 270x.
UGC 8327	gx	13h15m14s	+44°24.5'		CVn	16"	buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con MCG+8-24-96 — molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø < 30" — 380x.
UGC 8331	gx	13h15m31s	+47°29.8'	q 76	CVn	16"	ottima / m. buono	in visione distolta appare molto allungata da NW a SE per ~ 1.5'; in visione diretta si vede invece, solo a momenti, un piccolo nucleo stellare — 188x.
UGC 8335	gx	13h15m35s	+62°07.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MCG+10-19-57** situata una 40-ina di secondi a NW; la 1ª è poco più evidente, compatta e con Ø di 15"20"; la 2ª è poco più estesa, con dimensioni 20"-25" e più diffusa; si sdoppiano facilmente a 380x; sono situate a ridosso verso S di una coppia di stelline distanti anch'esse ~ 40".
UGC 8338	gx	13h16m08s	+35°02.6'		CVn	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" 380x.
UGC 8340	gx	13h16m35s	−02°05.5'		Vir	24"	buona / m. buono	appare a prima vista di aspetto simile a UGC 8360, anche se poco più evidente e appena più brillante all'interno; pure questa è rotonda, ma con Ø di 1' scarso.
UGC 8341	gx	13h16m13s	+36°04.8'		CVn	16"	m. buona / ottimo	gx debolissima; solo a tratti in visione distolta, a 270x, si nota una condensazione centrale molto tenue molto piccola e si capisce che è molto allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×20".
UGC 8343	gx	13h16m42s	+21°58.8'		Com	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, ma si vede senza problemi in visione distolta a 270x, approssim. rotonda con Ø di ~ 45".
UGC 8347	gx	13h16m30s	+52°56.0'		UMa	24"	buona / ottimo	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un tenue alone circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso N; una doppia abbastanza stretta si trova subito a SSW — 450x.
UGC 8349	gx	13h17m02s	+06°21.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa con Ø di 45" e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso SE — 400x.
UGC 8357	gx	13h17m59s	−00°18.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con gradiente di luce molto basso, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; un piccolo oggetto diffuso e condensato che a ingrandimenti più bassi pare una debole stellina sfuocata salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva la gx; da un controllo successivo è risultata effettivamente essere la PGC 200296 — 450x.
UGC 8359	gx	13h17m45s	+27°34.2'		Com	16"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, con nucleo stellare brillante, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 8360	gx	13h18m10s	−01°14.6'		Vir	24"	buona / m. buono	debole chiarore rotondo con Ø di ~ 1', diffuso e di luminosità uniforme; appare poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8361	gx	13h18m19s	+06°20.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
UGC 8365	gx	13h18m45s	+41°57.0'	q 76	CVn	16"	m. buona / m. buono	è una gx debolissima situato subito a W di una coppia di stelline molto deboli, distanti 1' e orientate da N a S; presenta un bulge chiaramente più brillante dell'alone ed è forse orientata da NW a SE — 270x.
UGC 8370	gx	13h19m33s	+16°59.2'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa, leggermente più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ~ 1' verso N — 450x.
UGC 8374	gx	13h18m51s	+72°45.9'		UMi	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8377	gx	13h19m56s	+30°07.1'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una coppia di stelline a SW distanti una 20-ina di secondi:quella più vicina alla gx è appena percettibile a 380x.
UGC 8379	gx	13h20m20s	+06°20.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1.5' verso W — 450x.
UGC 8382	gx	13h20m33s	+05°24.3'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8383	gx	13h20m28s	+14°32.1'		Com	24"	m. buona / buono	è un debole lucore circolare con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme che in visione distolta sembra aggettare a SE di una stellina brillante — 450x.
UGC 8385	gx	13h20m38s	+09°47.2'	q 195	Vir	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo e diffuso lucore che a prima vista pare totalmente amorfo; prolungando l'osservazione a 270x, e guardando nei pressi in diversi punti del campo, appare poco allungata da E a W con dimensioni 1.5'×1'; solo a tratti sembra appena più brillante all'interno.
UGC 8392	gx	13h21m13s	+31°13.3'		CVn	16"	m. buona / ottimo	fa parte di un quartetto assieme alle 2 successive e a CGCG 161-27 — appare molto stemperata sul fondo cielo e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; appare in visione distolta a ridosso W di una stellina — 380x.
UGC 8394	gx	13h18m02s	+84°29.6'		Cam	24"	ottima / m. buono	piccolo e debolissimo oggetto forse circolare con Ø di una 15-ina di secondi situato a ridosso NW di una stellina — 450x.
UGC 8395	gx	13h21m32s	+12°11.2'		Vir	24"	buona / buono	chiazza molto debole e diffusa, con condensazione centrale percettibile solo a momenti; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 450x.
UGC 8397	gx	13h21m41s	+31°21.0'		CVn	16"	m. buona / ottimo	piccola chiazza molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina a ridosso verso SW e un'altra a 1' scarso NW — 380x.
UGC 8399	gx	13h21m46s	+31°14.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 50"×30" — 380x.
UGC 8400	gx	13h21m36s	+42°17.2'		CVn	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e con basso gradiente di luce — 495x.
UGC 8409	gx	13h23m01s	+23°18.4'	q 150	Com	16"	buona / buono	è un debolissimo lucore osservabile a tratti in visione distolta a 188x, ma di aspetto confuso; forse poco allungata da E a W con dimensioni 80"×60".
UGC 8416	gx	13h23m17s	+52°39.2'		UMa	28"	m. buona / buono	forma una coppia serrata con **MCG+9-22-55** situata a ridosso SE — le due gx si separano un po' a fatica a 495x: la UGC è relativamente facile, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale abbastanza evidente; la MCG è piccola, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; sembra più che altro un'appendice della compagna.
UGC 8427	gx	13h24m35s	+06°31.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	facile, ma con gradiente di luce molto basso, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina brillante a 1' verso E (la quale fa parte di un asterismo di una 12-ina di stelle foggiato a "V") — 570x.
UGC 8436	gx	13h24m34s	+63°05.6'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 8438	gx	13h25m29s	+16°10.8'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8440	gx	13h25m36s	+36°22.8'		CVn	16"	buona / ottimo	fa parte del quartetto cui appartengono NGC 5142, 5142 e 5143 — debolissimo lucore quasi elusivo, rotondo, con Ø di 45" visibile con una certa facilità solo in visione distolta a 380x.
UGC 8441	gx	13h25m29s	+57°49.4'	q 48	UMa	16"	m. buona / buono	debolissima, in visione distolta appare leggermente ovale, di dimensioni 90"×60", orientata da NE a SW e di luminosità uniforme *(presenza di chiarore lunare)* — 270x.
UGC 8448	gx	13h26m40s	+19°56.7'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, probabilmente rotonda con Ø ~ 1' e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 8450	gx	13h27m01s	+10°03.4'		Vir	24"	buona / buono	debolissima chiazza circolare, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 8451	gx	13h26m54s	+32°11.6'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, ma visibile anche in visione diretta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; è situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti 2.5'; meglio osservabile a 270x.
UGC 8452	gx	13h27m10s	+15°05.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo stellare molto marcato circonfuso da un tenuissimo alone rotondo esteso 35"-40"; meglio definita a 400x; a 570x l'alone tende a stemperarsi sul fondo cielo.
UGC 8454	gx	13h22m40s	+84°30.1'		Cam	24"	ottima / m. buono	debolissima, appare in visione distolta quando si osserva MCG+14-6-25 dalla quale dista 1' verso W; è orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo simili — 450x.
UGC 8461	gx	13h28m04s	+34°20.0'		CVn	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un tenuissimo alone molto stemperato sul fondo cielo, approssim. rotondo con Ø di 45" — 380x.
UGC 8467	gx	13h27m44s	+62°46.0'		UMa	16"	buona / buono	è un debole oggetto rotondo, diffuso, con Ø di ~ 45" e di luminosità pressoché uniforme e diffusa — 270x.
UGC 8473	gx	13h29m25s	−00°24.0'		Vir	24"	m. buona / buono	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta, estesa forse una 30-ina di secondi ma di aspetto assolutamente indistinto; è meglio tuttavia non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 8481	gx	13h29m49s	−00°17.7'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina a poco più di 1' NW; tutto sommato resta meglio visibile a 450x.
UGC 8483	gx	13h29m39s	+29°46.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, presenta una piccola condensazione centrale circonfusa da un tenuissimo alone rotondo con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
UGC 8484	gx	13h29m37s	+32°24.1'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" con bulge diffuso poco contrastato sul disco e nucleo stellare visibile però solo a tratti — 380x.
UGC 8486	gx	13h29m57s	+11°04.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio evidente scalando a 450x.
UGC 8489	gx	13h29m39s	+45°23.2'	q 76	CVn	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio osservabile a 188x.
UGC 8492	gx	13h30m06s	+31°23.3'		CVn	16"	ottima / ottimo	rotonda, poco diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale evidente a 380x.
UGC 8496	gx	13h30m17s	+31°20.0'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso W — 380x.
UGC 8497	gx	13h30m26s	+30°01.7'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debolissima, si vede solo in visione distolta; a tratti appare orientata da E a W con dimensioni ~ 40"×20", ma bisogna scalare a 270x.
UGC 8498	gx	13h30m26s	+31°37.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×30", con bulge evidente e nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 8502	gx	13h30m36s	+31°17.2'		CVn	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto di 15"-20" max di Ø che appare con relativa facilità in visione distolta a 380x a una 30ina di secondi E di MCG+5-32-35.
UGC 8506	gx	13h30m39s	+49°08.2'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione N-S e che appare tutto sommato abbastanza facilmente in visione distolta — 495x.
UGC 8507	gx	13h30m59s	+19°26.2'	q 150	UMa	16"	buona / buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme; a 270x appare allungata da N a S con dimensioni 60"×40".
UGC 8508	gx	13h30m44s	+54°54.6'	q 49	UMa	16"	m. buona / buono	è una chiazza lattescente molto debole e diffusa, di forma indistinta e di almeno 1' di dimensioni; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SE — 380x.
UGC 8511	gx	13h30m53s	+62°13.5'		UMa	16"	buona / buono	molto debole, appena visibile in visione distolta a ridosso di una stellina situata a N; non è più estesa di 30"; sembra a prima vista un appannamento dell'oculare — 270x.
UGC 8514	gx	13h31m00s	+62°01.5'		UMa	16"	ottima / discreto	debolissima, osservabile in visione distolta alternando gli occhi; è molto piccola, allungata da NE a SE con dimensioni 30"×15"; presenta un tenuissimo nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
UGC 8516	gx	13h31m52s	+20°00.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	è di aspetto un po' confuso, ma è grosso modo allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; presenta una zona centrale poco più brillante e diffusa; si trova all'interno di un triangolo equilatero perfetto, a ~ 1' S dal vertice settentrionale — 270x.
UGC 8520	gx	13h29m57s	+80°30.1'		Cam	20"	buona / scarso	chiazza molto debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme — 360x.
UGC 8521	gx	13h32m31s	+01°50.8'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di ~ 1'; a tratti leggermente screziata a 450x.
UGC 8525	gx	13h31m34s	+71°28.8'		UMi	16"	ottima / discreto	debole, ma relativamente facile, presenta nucleo puntiforme e un piccolo bulge rotondo esteso ~ 20" circonfuso da un tenue alone con Ø di 30"-35" — 270x.
UGC 8526	gx	13h32m55s	−01°09.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 8527	gx	13h32m54s	+09°31.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10" — 450x.
UGC 8532	gx	13h33m13s	+05°46.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza molto stemperata sul fondo cielo, meglio contrastata scalando a 340x, anche se così è praticamente impossibile tenere fuori campo la 64 Vir di magnitudo 6.8 situata 5' a N; in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi.
UGC 8534	gx	13h33m33s	+01°18.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una coppia larga di stelline della stessa luminosità situate rispettivamente 1' a ENE e 2' a NE della gx.
UGC 8535	gx	13h33m29s	+17°28.2'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x (bisogna cercar di tenere fuori campo una coppia di stelle brillanti distanti 3' e situate a E e SE della gx).
UGC 8539	gx	13h33m29s	+33°02.6'		CVn	16"	ottima / ottimo	fa parte di un terzetto di gx allineate da NW a SE, assieme a CGCG 190-22 / 23 — allungata da N a S, di dimensioni 70"×30" con piccolo bulge abbastanza contrastato sul disco visibile a 380x.
UGC 8541	gx	13h32m09s	+76°50.4'		Cam	20"	buona / scarso	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 360x.
UGC 8543	gx	13h34m04s	+04°45.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni che in visione distolta arrivano a 80"×20", con bulge diffuso e appena più contrastato del disco; c'è una stellina a ridosso verso W.
UGC 8548	gx	13h34m15s	+31°25.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva macchiolina di luce estesa max 30" che appare a tratti in visione distolta a 380x.
UGC 8557	gx	13h32m59s	+78°16.2'		Cam	20"	buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W, dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale percettibile solo a momenti — 360x.
UGC 8560	gx	13h34m55s	+31°23.6'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore rotondo con Ø > 1', assai stemperato sul fondo cielo; si vede abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x.
UGC 8561	gx	13h34m57s	+34°02.6'		CVn	16"	ottima / ottimo	debole bolla circolare, diffusa, di aspetto molto regolare, appena più luminosa all'interno e con Ø di 1'. A 1.5' NW appare a tratti, in visione distolta a 380x, un'altra galassietta molto piccola ed elusiva che è risultata poi essere la MCG+6-30-45.
UGC 8562	gx	13h35m14s	+10°41.1'		Vir	24"	ottima / buono	assieme alla successiva costituisce una coppia di galassiette relativamente facili da vedere, molto ravvicinate in direzione N-S; la 1ª è più diffusa e di aspetto più uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la 2ª è più compatta e poco più brillante, anch'essa rotonda con Ø di 15" — 450x.
UGC 8563	gx	13h35m15s	+10°41.5'		Vir	24"	ottima / buono	v. **UGC 8562**
UGC 8564	gx	13h34m58s	+38°27.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare ben evidente a 380x; c'è una stellina un paio di primi SW.
UGC 8569	gx	13h35m38s	+06°11.6'		Vir	24"	buona / buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina subito a W e una brillante a 1' NNW — 450x.
UGC 8571	gx	13h34m42s	+61°59.6'	q 26	UMa	16"	m. buona / mediocre	molto debole; in visione distolta sembra una lama di luce estesa un paio di primi da E a W, appena più brillante verso l'interno. È situata all'interno di un triangolo isoscele quasi rettangolo di stelline di luminosità simile (riportata sull'Uranometria come **NGC 5216A**) — 270x.
UGC 8572	gx	13h35m38s	+07°32.7'		Vir	24"	buona / m. buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", diffusa alle estremità e con piccolo bulge brillante; c'è una stellina a < 1' verso NW — 450x.
UGC 8575	gx	13h35m45s	+08°57.9'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; a tratti appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15".
UGC 8576	gx	13h35m37s	+13°19.5'		Vir	24"	ottima / buono	baffo di luce molto tenue e diffuso, orientato da NW a SE ed esteso una 40-ina di secondi; appare facilmente a ridosso NE di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 8581	gx	13h35m59s	+01°43.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	è un debole ovale diffuso e di luminosità pressoché uniforme, orientato da NE a SW con dimensioni 60"×30"; non sembra meglio contrastato scalando a 340x.
UGC 8583	gx	13h35m50s	+34°59.9'		CVn	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile a tratti a 380x e con Ø di ~ 1'; bisogna tener fuori campo SAO 63630 di magnitudo 7.8.
UGC 8584	gx	13h36m14s	−01°02.3'		Vir	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con MCG+0-35-12 situata a ridosso NW — sono molto deboli, ma si separano facilmente a 450x, entrambe di luminosità uniforme e orientate nello stesso modo, ossia da NW a SE; la UGC ha dimensioni 30"×15", mentre la MCG è più sottile e in visione distolta sembra di 30"×10".
UGC 8585	gx	13h36m13s	+10°28.7'		Vir	24"	buona / buono	debole, molto diffusa, appena più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante poco più di 1' a SW — 400x.
UGC 8588	gx	13h35m43s	+45°55.8'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; poco meglio evidente scalando a 340x.
UGC 8591	gx	13h36m28s	+16°05.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa ~ 1' — 450x.
UGC 8595	gx	13h35m10s	+75°01.7'		UMi	16"	ottima / discreto	più debole di NGC 5262 situata un paio di primi a E; in visione distolta appare relativamente compatta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 188x.
UGC 8596	gx	13h36m47s	+06°29.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1.5' verso S — 450x.
UGC 8597	gx	13h36m15s	+46°12.0'		CVn	16"	m. buona / m. buono	è di aspetto e di dimensioni simili a UGC 8611, di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso N che però in visione distolta sembra situata all'interno dell'alone — 270x.
UGC 8598	gx	13h36m41s	+20°12.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso appena più contrastato del disco — 380x.
UGC 8600	gx	13h36m42s	+34°44.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto allungata da NE a SW, con dimensioni 60"×20" e nucleo stellare visibile a 380x.
UGC 8603	gx	13h36m34s	+44°36.0'		CVn	24"	m. buona / m. buono	allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con tenue condensazione centrale diffusa — 450x.
UGC 8604	gx	13h36m02s	+66°18.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8607	gx	13h37m17s	−02°09.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' SSE — 450x.
UGC 8610	gx	13h37m20s	+06°29.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
UGC 8611	gx	13h36m39s	+44°52.9'	q 76	CVn	16"	ottima / m. buono	debole chiazza circolare molto diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di almeno 1'; ci sono 2 stelline brillanti di egual magnitudo distanti 45": una a ridosso del margine di NE e l'altra, più lontana dalla galassia, verso E — 270x.
UGC 8613	gx	13h37m24s	+06°26.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, meglio contrastata a 450x, in visione distolta appare molto allungata da E a W, dimensioni 80"×30" e con tenue bulge appena percettibile.
UGC 8614	gx	13h37m26s	+07°38.6'	q 196	Boo	16"	ottima / ottimo	è una sorta di tenuissimo baffo che si diparte verso S da una stellina brillante per ~ 1'; visibile solo in visione distolta a 270x (si faccia un confronto con la stellina di egual magnitudo situata 6' NE.
UGC 8617	gx	13h37m43s	+05°14.6'		Vir	24"	ottima / buono	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NNE a SSW con dimensioni 60"×45"; è relativamente facile da vedere e meglio contrastata scalando a 340x; ci sono tre stelline allineate da N a S situate a E della gx: quella di mezzo è molto debole.
UGC 8619	gx	13h37m31s	+38°37.3'		CVn	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, abbastanza compatta, con bulge evidente e nucleo stellare; è allungata da N a S con dimensioni 45"×20"; presenta una compagna molto debole subito a SW, rotonda con Ø di ~ 20" e appena condensata: si tratta di MCG+7-28-39 — 380x.
UGC 8621	gx	13h37m40s	+39°09.3'		CVn	16"	m. buona / m. buono	sembra di aspetto leggermente irregolare, ma approssim. rotonda con Ø di 40"; presenta un piccolo bulge poco contrastato sul disco — 380x.
UGC 8626	gx	13h38m23s	+06°53.2'		Vir	24"	buona / buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con tenue condensazione centrale diffusa — 400x.
UGC 8627	gx	13h38m13s	+32°49.4'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima macchiolina rotonda, poco diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 40"; meglio visibile scalando a 270x.
UGC 8630	gx	13h38m26s	+33°07.0'		CVn	16"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce di luminosità pressoché uniforme orientata da E a W ed estesa un paio di primi; relativamente facile da vedere a 380x.
UGC 8631	gx	13h38m40s	+00°32.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente in visione distolta a 450x a poco più di 1' W di una stellina abbastanza brillante; è di forma indistinta e non sembra comunque più estesa di 30"; è situato un paio di primi scarsi a E di IC 904 (ma per osservarla ho dovuto attendere che la luna tramontasse dietro la montagna).
UGC 8635	gx	13h39m13s	+04°37.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
UGC 8636	gx	13h39m11s	+28°57.5'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 40"; è relativamente facile in visione distolta; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
UGC 8637	gx	13h39m38s	+06°09.3'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 280x, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; l'oggetto di aspetto quasi stellare che appare a tratti a 1' verso N è la **MAC 1339+0610**.
UGC 8638	gx	13h39m19s	+24°46.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, estesa per ~ 1'; appare in visione distolta a 270x.
UGC 8639	gx	13h39m00s	+51°25.8'	q 49	UMa	16"	buona / m. buono	debolissimo lucore esteso 30" o 40", diffuso e che a tratti sembra protendersi a W di una stellina brillante; a 30" di questa stellina ce n'è un'altra appena percettibile — 380x.
UGC 8649	gx	13h39m12s	+61°30.3'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; un oggetto molto piccolo esteso sì e no 10" salta fuori in visione distolta a 1' S, ma questo è risultato essere la **MAC 1339+6129** — 450x.
UGC 8650	gx	13h40m12s	+02°28.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×15" e con piccolo bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina molto debole al bordo NW e una abbastanza brillante a 1' verso SW: quest'ultima fa parte di un piccolo triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta a SW (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
UGC 8651	gx	13h39m53s	+40°44.4'	q 76	CVn	16"	m. buona / discreto	è una debolissima chiazza lattescente molto diffusa e stemperata sul fondo cielo; a tratti, in visione distolta, appare chiaramente orientata da E a W per un paio di primi — 270x.
UGC 8656	gx	13h40m30s	+42°59.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge diffuso appena percettibile — 450x.
UGC 8657	gx	13h41m05s	+05°06.3'		Vir	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme e osservabile in visione distolta; è allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×40" — 270x.
UGC 8658	gx	13h40m40s	+54°20.0'	q 49	UMa	16"	buona / m. buono	relativamente facile, ma molto diffusa e stemperata sul fondo cielo e con bassissima luminanza superficiale; è poco allungata da E a W, di dimensioni 1.5'×1'; solo a momenti appare una tenue condensazione centrale e qualche lievissima irregolarità di luce all'interno — 380x.
UGC 8663	gx	13h41m39s	+05°02.0'		Vir	24"	buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con condensazione centrale abbastanza marcata, poco allungata da NE a SW con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina brillante un paio di primi a S — 400x.
UGC 8670	gx	13h41m42s	+40°52.4'		CVn	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e appena condensata, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1.5' SW e un'altra molto debole a 1.5' SE — 380x.
UGC 8671	gx	13h41m24s	+55°38.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	facile, rotonda, diffusa e con Ø di 40"; presenta una marcata nucleo stellare ben visibile a 380x.
UGC 8682	gx	13h42m37s	+29°51.3'		CVn	16"	buona / ottimo	debolissima e visibile con molta difficoltà; è diffusa, ma non riesco a capire com'è orientata — 380x.
UGC 8683	gx	13h42m32s	+39°39.5'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, a tratti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8684	gx	13h41m25s	+60°42.2'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole, estesa un paio di primi in direzione NE-SW, poco più brillante all'interno e che tuttavia salta fuori senza problemi in visione distolta — 380x.
UGC 8685	gx	13h43m09s	+30°20.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40", molto diffusa e appena più brillante all'interno; meglio tuttavia scalare a 270x.
UGC 8686	gx	13h43m40s	+03°53.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 8688	gx	13h43m30s	+43°27.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; poco meglio evidente scalando a 340x.
UGC 8690	gx	13h44m34s	+04°46.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole lucore molto diffuso, approssim. circolare ed esteso 40"-50" che in visione distolta pare aggettare verso NW da un stellina abbastanza brillante; l'osservazione e resa forse un po' critica dalla luna all'ultimo quarto — 450x.
UGC 8691	gx	13h44m24s	+20°24.7'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 8693	gx	13h44m28s	+35°11.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30"; c'è una doppia stretta a 1.5 NW e un'altra stellina debole a egual distanza verso S — 380x.
UGC 8696	gx	13h44m42s	+55°53.0'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è una piccola gx relativamente compatta, poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; è situata a poco più di 1' S di una stellina brillante; disturbata dalla SAO 28878 di magnitudo 6.5 — 380x.
UGC 8698	gx	13h45m10s	+35°13.1'		CVn	16"	ottima / ottimo	più debole di UGC 8693, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 8701	gx	13h45m45s	+22°05.3'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata a 270x; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso N che dà fastidio.
UGC 8702	gx	13h45m27s	+47°55.3'		UMa	16"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata a 270x.
UGC 8703	gx	13h46m09s	+21°53.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30", ma bisogna scalare a 270x; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso NE.
UGC 8705	gx	13h46m32s	+20°50.9'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×30"; meglio osservabile a 270x.
UGC 8708	gx	13h46m51s	+07°23.4'		Boo	24"	buona / buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW (come la coppia di stelline situate 1.5' a W), con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×30" — 400x.
UGC 8713	gx	13h45m05s	+33°52.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	assieme a UGC 8715 forma una coppia di gx molto deboli, diffuse e di luminosità pressoché uniforme la 1ª è molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; la 2ª, a poco più di 1' SE, è leggermente più brillante, rotonda con Ø di 40"-45"; solo a tratti mostra una nucleo stellare visibile a 380x.
UGC 8715	gx	13h47m07s	+33°52.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	v. **UGC 8713**
UGC 8718	gx	13h47m18s	+34°09.0'		CVn	16"	buona / buono	rotonda, diffusa, poco più brillante all'interno e con Ø di una 40-ina di secondi (meglio a 270x, perché a 380x contrasta con la gx il campo risulta depleto, salvo una stellina brillante al bordo SE).
UGC 8720	gx	13h47m45s	+17°43.1'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissima, a tratti in visione distolta appare poco allungata da N a S, con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; meglio scendere a 270x, perché a 380x sembra di fatto sparire!.

UGC 8721	gx	13h47m34s	+40°21.1'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W — 495x.
UGC 8724	gx	13h47m50s	+37°45.0'		CVn	16"	ottima / m. buono	piccola, diffusa, sembra poco allungata grosso modo nella stessa direzione di NGC 5305, dalla quale dista 5' verso S, con dimensioni 45"×30" — 270x.
UGC 8726	gx	13h47m49s	+40°29.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole estesa 1.5' in direzione NW-SE e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelline brillanti a 1' verso N e NW— 495x.
UGC 8728	gx	13h48m13s	+07°23.7'		Boo	24"	buona / buono	a prima vista sembra rotonda, ma in visione distolta appare chiaramente orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30" e a tratti leggermente screziata nella parte centrale osservando a 400x.
UGC 8730	gx	13h48m15s	+24°46.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissima ed evanescente; a 270x appare a tratti appena più brillante all'interno e con Ø di 30"-35"; c'è una stellina appena percettibile a 1' E.
UGC 8732	gx	13h47m08s	+72°04.2'		UMi	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso S.
UGC 8733	gx	13h48m39s	+43°24.7'		CVn	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, dimensioni ~ 2' ×1' e allungata da N a S (orientata come la coppia di stelle brillanti distanti 3.5' e situate 8 a SW) — 270x.
UGC 8736	gx	13h49m04s	+39°29.9'		CVn	16"	m. buona / m. buono	debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", diffusa e con bassissimo gradiente di luce; una brillante stella di 9ª grandezza situata 3' NNW disturba un po' l'osservazione — 380x.
UGC 8737	gx	13h48m17s	+68°05.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce relativamente facile e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE ed estesa un paio di primi — 450x.
UGC 8739	gx	13h49m14s	+35°15.4'		CVn	16"	buona / buono	debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; meglio scendere a 270x.
UGC 8740	gx	13h49m39s	+04°14.3'		Vir	16"	buona / ottimo	rotonda con Ø di 1' (pari alla distanza delle 2 stelline a NNE), molto diffusa e leggermente più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
UGC 8747	gx	13h48m57s	+74°15.0'		UMi	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8748	gx	13h50m36s	+28°09.0'		CVn	16"	buona / buono	debolissima, approssim. rotonda, molto diffusa, di luminosità uniforme e Ø di ~ 30"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 deboli stelline (a N e NW) che fanno parte di un piccolo arco di 3 componenti — 380x.
UGC 8750	gx	13h50m53s	+02°19.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW, ma questa è in realtà la **2MASS 13505100+0219386** di 15-esima — 450x.
UGC 8752	gx	13h50m33s	+35°07.9'		CVn	16"	buona / buono	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta a 380x; dovrebbe avere dimensioni grosso modo di 40"×20", ma ogni tanto appare orientata da NE a SW, altre volte da N a S! C'è una stellina a ~ 1' verso NE.
UGC 8754	gx	13h50m39s	+35°02.3'		CVn	16"	buona / buono	relativamente facile, rotonda con Ø di 40", poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 8756	gx	13h50m36s	+42°32.5'		CVn	16"	m. buona / m. buono	è una lama di luce estesa ~ 1.5', orientata da E a W con bulge diffuso appena evidente; c'è una stella brillante situata 5' verso W — 380x.
UGC 8759	gx	13h51m01s	+21°59.5'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 40"; è meglio contrastata a 270x, ma a 380x appare a tratti una nucleo stellare.
UGC 8769	gx	13h52m03s	+09°31.9'		Boo	24"	buona / buono	debole e molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con tenue condensazione centrale — 400x.
UGC 8778	gx	13h52m07s	+38°04.0'		CVn	16"	buona / buono	molto debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", con bulge diffuso appena accennato a 380x.
UGC 8781	gx	13h52m23s	+21°32.3'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 8786	gx	13h52m53s	−01°53.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa per oltre 1' — 450x.
UGC 8787	gx	13h52m50s	+02°15.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20" (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
UGC 8788	gx	13h52m37s	+24°44.9'		Boo	16"	ottima / m. buono	relativamente brillante, rotonda, poco diffusa, con Ø di 40" e nucleo stellare — 380x.
UGC 8795	gx	13h52m48s	+37°29.5'		CVn	16"	buona / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, estesa una 40-ina di secondi che aggetta verso N da una stellina; un'altra debole stellina si trova a ~ 1' verso N — 270x.
UGC 8798	gx	13h52m48s	+43°49.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	tenuissimo baffo di luce esteso 1' scarso e orientato in direzione N-S; poco meglio evidente a 450x, ma la visione è comunque disturbata da una stellina abbastanza brillante situata al bordo E o NE.
UGC 8801	gx	13h53m32s	−01°11.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W ed estesa 1' — 450x.
UGC 8806	gx	13h53m14s	+38°13.6'		CVn	16"	buona / buono	debolissima, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" (estesa all'incirca come la distanza della coppia di stelline brillanti situate 5' a N) e di luminosità uniforme; meglio evidente a 380x.
UGC 8807	gx	13h53m16s	+40°47.7'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; ci sono due stelline a 1' S e SE — 450x.
UGC 8811	gx	13h52m14s	+72°44.0'		UMi	16"	ottima / ottimo	piccola gx relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare visibile senza difficoltà a 380x.
UGC 8816	gx	13h54m04s	+03°57.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline subito a S: quella a E è più evidente — 450x.
UGC 8818	gx	13h54m06s	+05°21.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale appena percettibile.
UGC 8823	gx	13h53m03s	+69°18.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, presenta un nucleo stellare relativamente brillante che ne confonde un po' la forma, grosso modo orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 8827	gx	13h54m31s	+15°02.6'		Boo	24"	buona / buono	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare abbastanza marcata — 570x.
UGC 8829	gx	13h54m20s	+32°55.8'		CVn	16"	buona / buono	diffusa, rotonda, di 45" di Ø, gradatamente più brillante verso l'interno e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x; c'è una doppia stretta dalle componenti brillanti a 7' SSW.
UGC 8837	gx	13h54m45s	+53°54.1'	q 49	UMa	16"	m. buona / buono	molto debole, visibile con una certa fatica a 270x, molto allungata da N a S con dimensioni ~ 4'×1'.
UGC 8840	gx	13h55m07s	+39°56.2'		CVn	16"	buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta a ridosso E di una stellina abbastanza brillante; a tratti appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 8841	gx	13h55m08s	+40°10.1'		CVn	16"	buona / discreto	debolissima, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme salvo una condensazione centrale molto tenue visibile però solo a tratti; è allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata a 270x.
UGC 8844	gx	13h55m59s	−01°15.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a 1' NW; un piccolo triangolo equilatero di stelline brillanti si trova subito a S — 450x.
UGC 8845	gx	13h53m24s	+78°49.2'		UMi	20"	buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 360x.
UGC 8850	gx	13h56m03s	+18°22.3'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole, ma si vede senza problemi anche in visione diretta a 380x, allungata ~ da E a W, di dimensioni 50"×30" e con bulge evidente, diffuso — 380x.
UGC 8854	gx	13h55m53s	+37°11.8'		CVn	16"	buona / buono	poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale diffusa — 380x.
UGC 8859	gx	13h55m36s	+59°37.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore visibile con gran difficoltà e che in visione distolta appare a tratti orientato da NW a SE con dimensioni 60"×45" — 285x.
UGC 8861	gx	13h56m35s	+10°11.5'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta a 380x, estesa > 30"; c'è un piccolo triangolo di deboli stelline a NW come unico valido riferimento.
UGC 8864	gx	13h56m52s	+23°13.8'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto diffuso rotondo, diffuso e condensato con Ø di una 30-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta a 270x (ultima galassia osservata: albeggia).
UGC 8871	gx	13h57m25s	+05°57.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con due stelle brillanti a NW — 450x.
UGC 8872	gx	13h57m19s	+15°27.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con nucleo quasi stellare — 380x.
UGC 8873	gx	13h57m15s	+24°15.4'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole e molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con nucleo di aspetto stellare; la gx appare più contrastata a 380x, ma il nucleo si nota meglio a 270x.
UGC 8876	gx	13h56m58s	+45°58.4'		CVn	16"	m. buona / discreto	è una piccola galassietta relativamente brillante e con bulge molto marcato; è orientata da NNE a SSW di dimensioni 60"×20"; è situata 18' a S di NGC 5391, ossia l'oggetto che stavo cercando — 270x.
UGC 8877	gx	13h57m07s	+41°47.7'		CVn	24"	buona / ottimo	debolissima e di aspetto confuso, estesa forse una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta, meglio a 450x (per scurire il fondo cielo: è appena sorta la Luna); c'è una coppia di stelle brillanti a E.
UGC 8878	gx	13h57m50s	+09°52.4'		Boo	24"	buona / buono	anche questa pare rotonda a prima vista, ma osservando più attentamente si nota che è orientata da E a W con dimensioni 40"×30"; a 400x appare a tratti leggermente screziata.
UGC 8881	gx	13h57m59s	+07°09.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' scarso — 450x.
UGC 8882	gx	13h57m14s	+54°06.0'		UMa	16"	buona / buono	è molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 8883	gx	13h58m05s	+15°19.0'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 35"-40" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 8889	gx	13h58m06s	+21°47.8'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge appena diffuso, ma meglio osservabile scalando a 270x; si trova all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline deboli.
UGC 8892	gx	13h57m40s	+57°00.1'	q 49	UMa	16"	buona / m. buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a ridosso verso S di una stellina; non riesco tuttavia a capirne l'eventuale orientamento — 380x.
UGC 8896	gx	13h58m39s	+07°13.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce relativamente facile e compatta, orientata all'incirca da E a W , estesa almeno 1' e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
UGC 8902	gx	13h59m03s	+15°34.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 8906	gx	13h59m23s	+05°32.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 8907	gx	13h59m26s	+12°47.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale evidente, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 8909	gx	13h58m38s	+60°47.8'		UMa	16"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — 380x.
UGC 8917	gx	13h59m48s	+40°22.9'		CVn	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole ed estesa ~ 1' in direzione NW-SE; forma una coppia ravvicinata con MCG+7-29-27 a NW, ma dalla quale si separa a fatica — 450x.
UGC 8918	gx	14h00m14s	+08°58.0'		Boo	24"	buona / buono	è una debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1' — 450x.
UGC 8920	gx	14h00m25s	+12°57.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
UGC 8922	gx	14h00m09s	+39°40.4'		CVn	24"	m. buona / buono	molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30", con piccola e tenue condensazione centrale — 450x.
UGC 8924	gx	14h00m46s	+02°01.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15"; poco meglio contrastata scalando a 340x, anche se c'è ancora presenza di un debole chiarore lunare.
UGC 8927	gx	14h01m10s	+07°28.9'		Boo	24"	buona / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso NW che confonde un po' — 450x.
UGC 8932	gx	14h00m56s	+41°00.4'		CVn	28"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 388x.
UGC 8934	gx	14h01m22s	+10°28.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 8936	gx	14h00m53s	+49°22.5'		Boo	28"	m. buona / buono	è una debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo e di forma indistinta; in visione distolta appare estesa 40"-45" — 495x.
UGC 8939	gx	14h02m05s	−01°21.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina a 1' verso SE — 450x.
UGC 8945	gx	14h01m49s	+37°00.7'		CVn	16"	buona / ottimo	è un piccolo ovale di 45"×30", orientato da N a S, diffuso e con nucleo stellare evidente a 380x.
UGC 8948	gx	14h02m33s	+09°04.8'		Boo	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa e con gradiente di luce molto basso, orientata da NE a SW con dimensioni 80"×30"; situata 1' a S di una stella brillante — 450x.
UGC 8955	gx	14h02m36s	+34°51.3'		CVn	16"	buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme. allungata da N a S, di dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a una 20-ina di secondi NE — 380x.
UGC 8960	gx	14h02m43s	+39°10.1'		CVn	28"	buona / ottimo	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30" — 388x.
UGC 8961	gx	14h03m04s	+28°02.0'		CVn	16"	buona / buono	molto debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con bulge appena percettibile a 380x; 3 stelline poste ad arco subito a E ne facilitano l'identificazione: quella più a S è riportata sull'Uranometria.
UGC 8962	gx	14h02m46s	+39°08.1'		CVn	28"	buona / ottimo	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso verso E — 388x.
UGC 8964	gx	14h00m40s	+78°51.2'		UMi	20"	buona / scarso	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 60"×20" — 360x.
UGC 8966	gx	14h03m32s	+06°46.2'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a poco più di 1' SE; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8967	gx	14h03m27s	+09°28.0'		Boo	16"	buona / discreto	è appena più debole di NGC 5434, dalla quale dista 1.5' a NE, e si presenta molto allungata all'incirca da E a W per almeno 1' — 270x.
UGC 8972	gx	14h03m39s	+11°23.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	assieme a UGC 8973 forma una coppia di deboli gx diffuse che alla prima occhiata, a 340x, sembrano fondersi in un unico oggetto molto allungato da N a S; si separano senza problemi a 450x, anche se restano a contatto; sono di luminosità simile ed entrambe di dimensioni 45"×30"; la 1ª è orientata da N a S e presenta una condensazione centrale appena percettibile; la compagna a N è invece orientata da NW a SE ed è di aspetto più uniforme.
UGC 8973	gx	14h03m38s	+11°23.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	v. **UGC 8972**
UGC 8975	gx	14h03m17s	+38°31.9'		CVn	16"	buona / ottimo	debole ovale di 60"×30" orientato da N a S che a 380x mostra un timido bulge appena evidente.
UGC 8977	gx	14h03m49s	+15°24.1'		Boo	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; è situata tra due stelline brillanti che disturbano un po' l'osservazione; nonostante questo appare meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 8980	gx	14h03m36s	+39°03.2'		CVn	28"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45" — 388x.
UGC 8983	gx	14h04m03s	+12°00.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce che appare solo a momenti in visione distolta, meglio a 450x; è orientata da NW a SE ed estesa 1' scarso.
UGC 8984	gx	14h03m48s	+35°44.5'		CVn	16"	buona / ottimo	relativamente facile, ovale di dimensioni 60"×30", orientata da NE a SW, con un bulge evidente, abbastanza marcato e nucleo stellare — 380x.
UGC 8986	gx	14h04m16s	+04°06.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 340x, forse rotonda con Ø non superiore a 30".
UGC 8991	gx	14h04m36s	+15°28.4'		Boo	24"	ottima / buono	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 8992	gx	14h02m53s	+73°04.9'		UMi	20"	buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 360x.
UGC 8993	gx	14h04m52s	−00°37.5'		Vir	16"	buona / ottimo	assieme a UGC 8994 forma una coppia di oggetti molto deboli distanti un paio di primi in direzione N-S — la 1ª è rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con tenue nucleo stellare; la 2ª è di aspetto più uniforme, a tratti appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 380x.
UGC 8994	gx	14h04m53s	−00°36.7'		Vir	16"	buona / ottimo	v. **UGC 8993**
UGC 8995	gx	14h04m47s	+08°48.1'	q 196	Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo 80"×40" — 270x.
UGC 8996	gx	14h04m43s	+14°16.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa almeno 1' e orientata da E a W; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 8999	gx	14h04m37s	+29°12.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 30-ina di secondi, diffuso e di luminosità pressoché uniforme; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è situato ~ 4' NNE della SAO 83151 di 8ª grandezza.
UGC 9000	gx	14h04m51s	+10°48.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata assieme a UGC 9001 — debolissima e diffusa, tuttavia appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x quando si osserva la compagna situata quasi a ridosso verso SE; è orientata da NW a SE con dimensioni di una 20-ina di secondi.
UGC 9001	gx	14h04m54s	+10°48.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	situata quasi a ridosso SE di UGC 9000, è molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
UGC 9002	gx	14h04m53s	+12°43.3'		Boo	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta fissando la stellina brillante situata 2.5' WNW; appare tuttavia meglio definita scalando a 280x; è allungata da N a S con dimensioni grosso modo 60"×30". Decisamente più facile è CGCG 74-88 situata subito a S.
UGC 9003	gx	14h04m37s	+35°32.7'		CVn	16"	buona / ottimo	debolissimo ovale di 45"×20" e orientato come UGC 8984 (dalla quale dista 15' a SE); presenta un nucleo stellare visibile a tratti, ma è meglio scalare a 270x.
UGC 9006	gx	14h05m06s	−00°03.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole ovale diffuso e di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina al bordo N — 450x.
UGC 9007	gx	14h05m06s	+09°20.4'		Boo	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a tratti, forse meglio a 450x (a 340x tende un po' a sparire nel fondo cielo), ma è solo un piccolo e indistinto lucore esteso sì e no una 30-ina di secondi.
UGC 9008	gx	14h05m02s	+11°00.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 9012	gx	14h05m28s	+30°46.0'		CVn	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, con piccola condensazione centrale appena percettibile a 270x; probabilmente rotonda con Ø di ~ 30".
UGC 9015	gx	14h05m56s	+09°01.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
UGC 9022	gx	14h06m16s	+35°47.7'		CVn	16"	buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e appena più brillante all'interno; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 270x (a 380x si stempera troppo sul fondo cielo).
UGC 9023	gx	14h06m51s	+09°19.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e osservabile con una certa difficoltà in visione distolta a 450x; a tratti appare grosso modo allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso N.
UGC 9025	gx	14h06m59s	+12°33.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo orientale; una stellina brillante si trova a ridosso SE.
UGC 9032	gx	14h07m08s	+56°32.4'		UMa	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 9035	gx	14h07m55s	+29°52.3'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45"; appare più brillante all'interno, ma è meglio scalare a 270x.
UGC 9037	gx	14h08m29s	+07°03.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina visibile solo a momenti a 1' SE — 450x.
UGC 9041	gx	14h08m33s	+11°49.0'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, grosso modo rotonda, di una 40-ina di secondi di Ø e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
UGC 9043	gx	14h08m41s	+16°05.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con bulge evidente; c'è una stellina quasi a ridosso E — 450x.
UGC 9044	gx	14h09m02s	+14°19.0'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; la gx è meglio definita a 270x, ma a 380x appare più facilmente una stellina subito a SW.
UGC 9047	gx	14h08m21s	+55°18.1'		UMa	16"	buona / buono	è una gx debolissima, a 270x si capisce che è poco allungata da NNE a SSW con dimensioni di ~ 40"×30"; è situata fra 2 deboli stelline distanti un paio di primi e orientate da NE a SW.
UGC 9051	gx	14h09m53s	+54°55.6'		UMa	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni poco inferiori a 30"×20" — 450x.
UGC 9052	gx	14h07m17s	+75°55.8'		UMi	20"	buona / scarso	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 360x.
UGC 9054	gx	14h09m49s	+09°51.5'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole e poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile solo a momenti; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N (fa parte di una piccola stringa di 4 stelline allineate ed equidistanti) — 450x.
UGC 9055	gx	14h09m52s	+14°52.4'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza forse rotonda, di 30" o 40" di Ø osservabile in visione distolta a 270x (a 380x si stempera troppo); è situata 5' a NE di IC 979.
UGC 9056	gx	14h09m21s	+49°02.3'		Boo	16"	buona / discreto	molto debole e relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 380x.
UGC 9057	gx	14h00m13s	−02°34.5'		Vir	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo 2'×30"; c'è una stellina a 1.5' SE; meglio definita a 270x.
UGC 9060	gx	14h09m19s	+55°16.9'		UMa	16"	buona / buono	galassietta elusiva, piccola e rotonda, con Ø di 25"-30"; è visibile a tratti in visione distolta a 380x.
UGC 9067	gx	14h10m45s	+15°12.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole ovale diffuso di luminosità uniforme, orientato da N a S con dimensioni 60"×30"; è disturbata dalla luce di 2 stelle brillanti che non si riescono a tenere fuori campo neppure a 380x: la SAO 100894 di 6° a 5' N e la SAO 100896 ad appena 2.5' E; una stellina di 12-esima si trova a 1' NE.
UGC 9071	gx	14h10m03s	+54°13.1'		Boo	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30" — 450x.
UGC 9077	gx	14h10m55s	+39°46.3'		Boo	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline brillanti — 380x.
UGC 9078	gx	14h11m18s	+17°30.4'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa, estesa per oltre 1' con marcata condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
UGC 9081	gx	14h11m39s	+39°38.5'		Boo	16"	buona / m. buono	allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; presenta un piccolo bulge diffuso abbastanza marcato — 380x.
UGC 9083	gx	14h11m27s	+50°12.6'	q 83	Boo	16"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N — 270x.
UGC 9084	gx	14h12m13s	+08°38.7'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 9087	gx	14h12m17s	+18°18.0'		Boo	16"	m. buona /ottimo	è di aspetto un po' confuso, ma grosso modo di dimensioni 60"×40", orientata NNE-SSW e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 9088	gx	14h11m54s	+38°11.7'		Boo	16"	buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da ENE a WSW (ossia poco più "inclinata" rispetto alle 2 stelline distanti ~ 30" con le quali la gx è allineata da NE a SE); a 380x appare un nucleo di aspetto stellare — 380x.
UGC 9089	gx	14h12m30s	+11°14.4'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; allineata ed equidistante con una coppia di stelline situata un paio di primi a S e una stella più brillante ancora più a S — 450x.
UGC 9090	gx	14h12m24s	+18°24.7'		Boo	16"	m. buona /ottimo	più debole di UGC 9088, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 40", appena più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
UGC 9098	gx	14h12m27s	+45°41.4'		Boo	16"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con M+8-26-12, con la quale tende a fondersi in un unico oggetto di forma un po' irregolare e allungato da E a W; si riescono a sdoppiare, seppur con molta fatica, a 380x; appaiono a tratti 2 piccoli nuclei puntiformi; UGC è più evidente e più grande.
UGC 9101	gx	14h13m16s	+27°00.6'		Boo	16"	ottima /ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" e appena più brillante all'interno; appare facilmente in visione distolta a 270x.
UGC 9103	gx	14h13m42s	+08°13.2'		Boo	24"	buona / buono	elusiva e molto piccola, appare solo a tratti in visione distolta a 570x, ma non riesco a capirne la forma.
UGC 9104	gx	14h13m42s	+12°30.2'		Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 9105	gx	14h13m40s	+43°52.0'		Boo	16"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø 45"; c'è una stellina a poco più di 1' verso SW; meglio evidente a 380x.
UGC 9107	gx	14h13m57s	+31°33.9'		Boo	16"	buona / buono	debolissima e diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 30" e nucleo stellare; c'è una stellina a poco più di 1' verso SW — 380x.
UGC 9108	gx	14h14m23s	+02°58.6'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1.5 SSE — 450x.
UGC 9109	gx	14h14m18s	+12°20.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; la gx sarebbe di luminosità pressoché uniforme, ma un tenue rinforzo di luce all'interno l'estremità N tradisce la presenza della minuscola PGC 50851; da non confondere, ovviamente, con una stellina situata a ridosso NE — 580x.
UGC 9110	gx	14h14m13s	+15°37.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, allungata da N a S, di dimensioni 70"×40" e con tenue condensazione centrale appena percettibile — 380x.
UGC 9112	gx	14h13m46s	+47°39.6'		Boo	16"	buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta, solo a tratti molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 80"×30", ma occorre scalare a 188x.
UGC 9117	gx	14h14m52s	+14°07.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" con piccolo bulge diffuso poco contrastato sul disco — 380x.
UGC 9118	gx	14h15m08s	+03°06.8'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, assai disturbata dalla SAO 120370 di 7ª grandezza situata a 3' ENE; allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 9120	gx	14h15m12s	+04°49.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 450x.
UGC 9121	gx	14h15m12s	+15°44.5'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge esteso poco contrastato — 450x.
UGC 9125	gx	14h15m08s	+45°35.7'		Boo	16"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40" — 270x.
UGC 9126	gx	14h15m41s	+16°33.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza di forma indistinta, forse circolare ed estesa una 40-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta poco a W della congiungente di due deboli stelline situate a NE e a SE della gx; tutto sommato è meglio visibile a 450x per ridurre la luminosità della SAO 100941 di 10ª grandezza situata 3.5' a SW e che non si riesce a tenere fuori campo.
UGC 9130	gx	14h16m09s	+23°00.7'		Boo	16"	m. buona /ottimo	debolissimo oggetto rotondo di Ø max 30" che salta fuori con relativa facilità a 380x.
UGC 9134	gx	14h16m35s	+09°59.1'		Boo	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, purtroppo molto disturbata da un piccolo triangolo rettangolo di stelle brillanti situato a W; la gx appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 50"×25" — 400x.
UGC 9135	gx	14h16m37s	+24°30.1'		Boo	16"	discreta / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; meglio osservabile a 270x.
UGC 9138	gx	14h16m47s	+23°00.1'		Boo	16"	m. buona /ottimo	è un'elusiva lama di luce estesa ~ 1' (ossia 1.5 volte la distanza delle 2 stelline subito a W) e orientata da N a S — 380x.
UGC 9155	gx	14h18m19s	+28°58.1'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø di ~ 40" e nucleo stellare appena percettibile a 270x; c'è una stellina a 1' NE e un'altra molto debole a 1.5' SE.
UGC 9159	gx	14h18m35s	+14°16.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
UGC 9162	gx	14h18m48s	+10°50.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di aspetto un po' confuso, ma grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una doppia stretta a 3' NE — 450x.
UGC 9163	gx	14h18m51s	+11°17.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa 1' scarso; appare un po' a fatica in visione distolta, ma è preferibile scalare a 340x perché la zona limitrofa è piuttosto depleta.
UGC 9165	gx	14h18m48s	+24°56.4'		Boo	16"	discreta / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata a 270x.
UGC 9167	gx	14h19m37s	+17°38.7'		Boo	16"	discreta / ottimo	molto debole e "soffocata" dalla SAO 100977 di 9ª grandezza situatale a ridosso verso S; in visione distolta sembra aggettare verso NE; è di luminosità uniforme con dimensioni ~ 30"×20" — 380x.
UGC 9169	gx	14h19m45s	+09°21.8'	q 197	Boo	16"	ottima / ottimo	è una tenuissima lama di luce di luminosità uniforme estesa oltre 2' e orientata da NE a SW; appare più facilmente a 188x.
UGC 9171	gx	14h19m51s	+17°50.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	è una piccola ed elusiva lama di luce che a tratti, in visione distolta, sembra dipartirsi verso SE da una stellina molto debole; è estesa max 30", ma si riesce a catturare solo a 380x.
UGC 9177	gx	14h20m30s	+10°25.9'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa, approssim. rotonda con Ø > 1' — 270x.
UGC 9182	gx	14h20m46s	+21°56.1'		Boo	16"	m. buona /ottimo	è un debole fuso di dimensioni 3'×1', orientato da NW a SE che appare facilmente in visione distolta a 270x; a tratti mostra un bulge molto tenue; c'è una stellina brillante a 4' verso E.
UGC 9185	gx	14h20m53s	+15°00.0'		Boo	24"	ottima / ottimo	è un fuso di aspetto uniforme, debole ma ben evidente, relativamente compatto, orientato da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 9194	gx	14h21m06s	+39°29.9'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 495x.
UGC 9195	gx	14h21m33s	+23°56.9'		Boo	16"	discreta / ottimo	debolissimo oggetto di luminosità uniforme che a tratti, in visione distolta, appare poco allungato da E a W con dimensioni 30"×20" — 380x.
UGC 9199	gx	14h22m00s	+11°06.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa almeno 1' in direzione NW-SE; situata sul lato meridionale di un piccolo triangolo molto allungato formato da deboli stelline — 450x.
UGC 9203	gx	14h21m53s	+39°58.7'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata a 270x.
UGC 9206	gx	14h22m27s	+15°05.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N e una poco più luminosa a 1' scarso verso SW — 450x.
UGC 9211	gx	14h22m32s	+45°23.0'	q 77	Boo	16"	m. buona / m. buono	elusiva, in visione distolta appare solo a tratti la zona centrale di una 30-ina di secondi, ma la gx è molto disturbata da una stellina situata a ~ 1' NW; occorre tuttavia spingere a 380x.
UGC 9212	gx	14h23m04s	+18°16.7'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, leggermente allungata da E a W con dimensioni 50"×40" e poco più brillante all'interno; un tenuissimo nucleo stellare appare a tratti a 380x.
UGC 9213	gx	14h22m47s	+37°59.7'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" (l'asse maggiore della gx è circa uguale alla distanza delle 2 stelline brillanti situate a S — 380x.
UGC 9214	gx	14h22m55s	+32°51.1'		Boo	16"	buona / ottimo	piccolo oggetto relativamente compatto con Ø di 30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1.5' W — 380x.
UGC 9215	gx	14h23m27s	+01°43.4'		Vir	16"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" — 380x.
UGC 9216	gx	14h22m57s	+40°25.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	è una debolissima bolla circolare osservabile solo in visione distolta, molto stemperata sul fondo cielo e con Ø di ~ 1'; meglio scalare a 188x; fa parte del quartetto di NGC 5598 (q 77).
UGC 9221	gx	14h23m45s	+34°01.0'		Boo	16"	buona / ottimo	assieme a UGC 9222 forma una coppia di gx che si separano facilmente anche a 270x; la 1° è rotonda, diffusa, con Ø di 45" e appena più brillante all'interno; la 2° è allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con bulge abbastanza evidente 380x.
UGC 9222	gx	14h23m46s	+34°01.0'		Boo	16"	buona / ottimo	v. **UGC 9221**
UGC 9223	gx	14h23m45s	+40°01.4'		Boo	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, allungata da N a S con dimensioni 50"×25", diffusa e con nucleo stellare brillante — 380x.
UGC 9225	gx	14h24m25s	+08°16.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; si fatica a vederla a 580x, ma per lo meno si riesce a tenere fuori campo la SAO 126200 di 6ª grandezza situata 6' a WSW (il cielo sta schiarendo perché sta per sorgere la luna calante).
UGC 9229	gx	14h24m33s	+01°10.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 9233	gx	14h24m35s	+35°16.8'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; meglio visibile a 270x.
UGC 9234	gx	14h24m46s	+26°08.4'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo e leggermente condensato con Ø max di 20" — 380x.
UGC 9235	gx	14h24m42s	+35°16.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	poco più evidente, allungata da NE a SW (ossia a perpendicolo con UGC 9234), di dimensioni 40"×20" con piccolo bulge diffuso visibile a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW.
UGC 9238	gx	14h24m49s	+35°17.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	è un elusivo oggetto esteso sì e no una 20-ina di secondi; salta fuori a tratti in visione distolta quando si osserva la coppia formata da UGC 9233-5, ma occorre scalare a 270x.
UGC 9240	gx	14h24m44s	+44°31.6'	q 77	Boo	16"	m. buona / m. buono	debole oggetto rotondo molto diffuso, di luminosità uniforme e con Ø di 1.5' — 270x.
UGC 9241	gx	14h25m21s	+32°28.8'		Boo	16"	buona / ottimo	debole, ma relativamente facile a 380x, rotonda con Ø di 30", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1' SE — 380x.
UGC 9242	gx	14h25m21s	+39°32.4'		Boo	16"	m. buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce, estesa almeno 4' e orientata grosso modo da E a W e che tuttavia appare solo a tratti in visione distolta; presenta un nucleo puntiforme, a meno che non si tratti di una stellina a ridosso (purtroppo in visione diretta la gx sparisce!); meglio scalare a 188x.
UGC 9243	gx	14h25m33s	+33°50.9'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme e di aspetto confuso; si stacca a fatica dal fondo cielo; estesa meno di 1'; è situata a metà strada del lato nord-occidentale di un trapezio sghembo di stelline brillanti — 380x.
UGC 9245	gx	14h25m27s	+56°19.2'		UMa	16"	buona / buono	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta; scalando a 188x si riesce a fatica a capire che è allungata da N a S, ma è arduo valutarne le dimensioni.
UGC 9246	gx	14h26m31s	+05°58.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 45"×15"; è poco meglio evidente spingendo a 580x, ma anche così non si riesce a tenere fuori campo la SAO 120464 di 7ª grandezza situata 3' a SE.
UGC 9249	gx	14h27m00s	+08°41.1'		Boo	24"	buona / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, estesa forse un paio di primi e orientata da E a W — 400x.
UGC 9253	gx	14h26m58s	+31°31.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	è debolissima e di luminosità uniforme, si apprezza meglio a 270x, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×20" (praticamente è posta di taglio); c'è una stellina evidente quasi a ridosso verso S.
UGC 9258	gx	14h27m30s	+04°46.8'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
UGC 9259	gx	14h27m28s	+11°02.4'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 9262	gx	14h27m09s	+35°55.1'		Boo	16"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW, con dimensioni 60"×20"; salta fuori più facilmente a 380x; un piccolo asterismo di 4' stelle situato 5' a SE costituisce un comodo riferimento.
UGC 9263	gx	14h27m45s	−00°36.1'		Vir	24"	discreta / m. buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme che aggetta a S di una stellina relativamente brillante; non è più estesa di 30"; un'altra stellina appena percettibile si trova a ridosso verso SW.
UGC 9266	gx	14h27m29s	+29°57.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 270x, rotonda di ~ 30' Ø di, molto diffusa e con condensazione centrale visibile a momenti; c'è una stellina a 2' SW.
UGC 9267	gx	14h27m50s	+11°33.6'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, gradatamente più brillante verso l'interno, ma con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 45" — 450x.
UGC 9273	gx	14h28m11s	+13°33.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto simile a UGC 9259 osservata subito prima, anche questa allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; è situata tra due stelline: una a 1.5' verso E e l'altra poco più vicina a SW — 450x.
UGC 9274	gx	14h28m02s	+21°18.2'		Boo	16"	ottima /ottimo	è una debole chiazza a basso gradiente di luce, orientata da NE a SW con dimensioni 80"×40" (non sono riuscito a vedere UGC 9282) — 270x.
UGC 9277	gx	14h28m33s	+03°15.7'		Vir	24"	discreta / m. buono	facile, relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge molto diffuso; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 450x.
UGC 9284	gx	14h28m23s	+33°15.2'		Boo	16"	ottima / m. buono	è un debole fuso di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 380x.
UGC 9285	gx	14h29m04s	+03°09.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 9286	gx	14h28m57s	+11°11.8'		Boo	24"	buona / buono	molto debole e assai disturbata da una stellina brillante situata proprio a ridosso verso N; molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25" e di luminosità uniforme — 570x.

UGC 9288	gx	14h28m58s	+13°51.7'		Boo	24"	ottima / ottimo	presenta un piccolo nucleo molto brillante e contrastato circonfuso da un alone rotondo con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' N e un'altra poco più brillante a un paio di primi NW — 450x.
UGC 9291	gx	14h28m36s	+38°59.9'		Boo	16"	m. buona / m. buono	è un debole chiarore diffuso di luminosità uniforme e forma indistinta; è estesa ~ 1' ed è situata a ridosso verso W, di un piccolo arco di stelline con la concavità rivolta nella stessa direzione — 380x.
UGC 9292	gx	14h29m11s	+02°17.2'		Vir	24"	buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15", con tenue bulge diffuso; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
UGC 9294	gx	14h28m57s	+25°33.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" (ossia poco più della metà della distanza della coppia di stelle situate a NE che ho stimato di 1.5') — 380x.
UGC 9295	gx	14h27m32s	+69°56.2'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente brillante e compatta, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
UGC 9299	gx	14h29m35s	−00°01.1'		Vir	16"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni ~ 60"×30"; a 380x appare un nucleo stellare (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta).
UGC 9307	gx	14h29m08s	+41°49.8'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; un po' disturbata dalla SAO 45075 di 6a grandezza situata 5.5' a SE — 450x.
UGC 9309	gx	14h29m39s	+10°35.1'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge diffuso appena percettibile — 450x.
UGC 9310	gx	14h30m01s	+03°13.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di tenuissimo baffo di dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme che aggetta verso N da una stellina brillante (la quale fa parte di una coppia stretta e sbilanciata); la gx è situata 5' a SE di NGC 5638 — 450x.
UGC 9314	gx	14h29m23s	+45°04.4'		Boo	16"	buona / discreto	debolissima, ma a 380x sembra relativamente compatta, molto allungata da NW a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso verso SW.
UGC 9315	gx	14h29m48s	+35°34.5'		Boo	16"	buona / m. buono	si vede abbastanza facilmente, allungata da NE a SW per una 40-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con MCG+6-32-47 che è invece decisamente più debole, di luminosità uniforme e orientata da N a S (situate 7' a NNE di NGC 5646) — 270x.
UGC 9316	gx	14h30m18s	+21°44.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata ~ da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 9317	gx	14h30m11s	+27°31.9'		Boo	16"	ottima / ottimo	è una debolissima chiazza a bassissima luminanza superficiale, forse rotonda con Ø di ~ 1', ma è alquanto confusa — 270x.
UGC 9320	gx	14h29m58s	+36°52.4'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissima, forse rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di 40"; c'è una stellina a 1' verso S e una brillante a 3' SW — 380x.
UGC 9322	gx	14h30m20s	+23°03.7'		Boo	16"	ottima / ottimo	altra gx molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; forse è un po' meglio contrastata a 270x; un elusivo e minuscolo oggetto rotondo — che a prima vista, a 380x, sembra una stellina leggermente sfuocata — appare a poco meno di 1' verso W: da un controllo effettuato successivamente è risultata essere la MAC 1430+2303.
UGC 9323	gx	14h30m00s	+39°56.4'		Boo	28"	m. buona / buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa ~ 1'; è praticamente delimitata da 2 stelline, una a NE e l'altra appena percettibile a SW — 495x.
UGC 9324	gx	14h29m51s	+44°26.9'	q 77	Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, salta fuori in visione distolta, ma solo a momenti appare allungata da E a W per 1' scarso — 270x.
UGC 9326	gx	14h30m45s	+00°14.9'		Vir	24"	buona / m. buono	assieme a UGC 9327 forma una coppia di debolissime gx di luminosità uniforme; la 1ª è molto piccola, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; la 2ª è invece allungata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20" e di aspetto pure uniforme; una stellina appena percettibile si trova a ridosso verso N (v. disegno) — 450x.
UGC 9327	gx	14h30m46s	+00°14.9'		Vir	24"	buona / m. buono	v. **UGC 9326**
UGC 9336	gx	14h30m30s	+40°01.0'		Boo	28"	m. buona / buono	relativamente facile da vedere, poco diffusa e molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW — 495x.
UGC 9337	gx	14h30m30s	+40°49.5'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 495x.
UGC 9338	gx	14h31m12s	+05°18.4'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 9339	gx	14h31m18s	+07°56.7'		Boo	24"	buona / buono	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 9340	gx	14h31m01s	+25°29.3'		Boo	16"	m. buona / buono	è una galassia a bassissima luminanza superficiale, rotondeggiante e molto debole, con Ø di ~ 1'; si vede tuttavia abbastanza facilmente in visione distolta — 270x.
UGC 9343	gx	14h30m55s	+40°42.8'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso SW — 495x.
UGC 9350	gx	14h32m01s	+36°18.3'		Boo	16"	buona / m. buono	appare facilmente, è di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, dimensioni 30"×15" ed è situata quasi a ridosso verso W di una stellina brillante — 270x.
UGC 9355	gx	14h29m20s	+79°14.5'		UMi	20"	buona / scarso	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina brillante un paio di primi a W (fa parte di una coppia larga con componenti distanti 2' in direzione NNW-SSE) — 360x.
UGC 9356	gx	14h32m53s	+11°35.7'		Boo	16"	ottima / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; forma un piccolo triangolo con 2 stelline: una a poco più di 1' NE e l'altra a poco più di 2' NNW — 380x.
UGC 9362	gx	14h33m17s	+03°54.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 9365	gx	14h33m31s	+03°41.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 9367	gx	14h33m18s	+34°44.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, rotonda, molto diffusa, di luminosità uniforme e Ø di ~ 45"; meglio evidente a 270x.
UGC 9371	gx	14h33m59s	+03°46.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø > 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante al bordo orientale — 450x.
UGC 9372	gx	14h33m37s	+35°58.0'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; è situata in mezzo a 2 stelle brillanti distanti una dozzina di primi e orientate da N a S: quella meridionale possiede una debole compagna a S — 380x.
UGC 9373	gx	14h33m34s	+40°48.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
UGC 9374	gx	14h34m11s	+10°12.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N (2 stelle brillanti a ESE, tra cui una coppia stretta e sbilanciata, sembrano indicare il percorso verso la gx) — 450x.
UGC 9376	gx	14h33m47s	+40°04.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 220-30 situata a meno di 1' NNE — debole, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40" — 450x.
UGC 9379	gx	14h33m58s	+40°14.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 9380	gx	14h34m39s	+04°15.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore di aspetto indistinto, esteso < 1'; non conviene tuttavia scalare a 340x o meno, in quanto aumenta l'abbagliamento dovuto a 2 stelle brillanti a E e a SW della gx.
UGC 9386	gx	14h34m51s	+40°44.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 9387	gx	14h35m17s	+22°57.7'		Boo	16"	discreta / ottimo	debolissima e molto diffusa, a tratti poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×30" e appena più brillante all'interno — 270x.
UGC 9389	gx	14h35m33s	+12°54.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1.5' SW (sul prolungamento dell'asse della gx); meglio visibile a 270x.
UGC 9391	gx	14h34m37s	+59°20.3'	q 50	Dra	16"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, approssim. circolare, estesa ~ 1'; appare in visione distolta e a momenti sembra addirittura appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 9394	gx	14h35m40s	+13°10.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa ~ 80" e situata a ridosso verso N di una stellina; meglio osservabile a 380x se non altro per tenere fuori campo una brillante stella di 9ª a 6.5' NW e un'altra di 10ª equidistante a SE.
UGC 9396	gx	14h35m46s	+24°43.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	è di aspetto un po' irregolare a 380x, grosso modo rotonda, con Ø di 45" e con tenue condensazione centrale.
UGC 9397	gx	14h35m34s	+36°49.1'		Boo	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con piccolo bulge abbastanza evidente a 380x; è situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti 4':quella a W è poco più brillante.
UGC 9401	gx	14h36m03s	+21°50.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 80"×40", con condensazione centrale evidente, stellare; c'è una galassietta 3' verso NNW, con Ø di ~ 30" che salta fuori facilmente in visione distolta a 270x.
UGC 9410	gx	14h37m14s	+08°38.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 9411	gx	14h37m16s	+10°00.4'		Boo	24"	buona / buono	debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline brillanti a 1.5' verso N — 400x.
UGC 9412	gx	14h36m22s	+58°47.7'		Dra	16"	ottima / ottimo	è una galassietta brillante, piccola e compatta, rotonda con Ø di 30" e marcata nucleo stellare — 380x.
UGC 9413	gx	14h34m08s	+77°54.0'		UMi	24"	m. buona / buono	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (o poco più); c'è una doppia stretta subito a S; una debole stellina si trova a 1' verso W — 450x.
UGC 9422	gx	14h37m14s	+43°41.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce di aspetto uniforme, estesa oltre 1' e orientata da N a S; c'è una stella brillante a 1.5' NW — 450x.
UGC 9429	gx	14h38m00s	+40°06.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	è un debole ovale molto diffuso e con basso gradiente di luce, orientato da E a W con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 9437	gx	14h39m10s	+18°42.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, si riesce a catturare con relativa facilità a 380x; a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20".
UGC 9438	gx	14h39m01s	+30°57.4'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da N a S, dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale — 380x.
UGC 9441	gx	14h38m49s	+41°00.5'		Boo	16"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e con tenue bulge diffuso, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 9442	gx	14h38m38s	+52°34.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata quasi a ridosso W della più meridionale di un piccolo arco formato da 3 stelline — 450x.
UGC 9443	gx	14h39m32s	+09°14.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa 45"; è un po' disturbata da una stellina brillante situata subito a NE — 450x.
UGC 9444	gx	14h39m22s	+17°00.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	presenta un nucleo abbastanza marcato, stellare, circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di 45" (purtroppo neppure a 380x si riesce a tenere fuori campo una brillante stella di 9ª situata 3.5' W).
UGC 9448	gx	14h38m59s	+51°07.2'		Boo	28"	m. buona / m. buono	debole lama di luce orientata da E a W ed estesa 1.5', con bulge molto tenue; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE (fa parte di un asterismo esteso una dozzina di primi, arcuato e orientato come la gx) — 495x.
UGC 9454	gx	14h40m24s	+06°18.5'		Vir	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' SW — 270x.
UGC 9463	gx	14h40m59s	+03°08.2'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso E e una percettibile solo a momenti subito a NW — 450x.
UGC 9469	gx	14h41m44s	−01°48.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, probabilmente rotonda con Ø di 45"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; 2 stelline molto deboli si trovano a poco più di 1' NE e NW.
UGC 9470	gx	14h41m48s	+00°41.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" — 450x.
UGC 9471	gx	14h41m43s	+05°57.2'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 400x.
UGC 9473	gx	14h41m33s	+38°51.2'		Boo	16"	buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di ~ 45", molto diffusa e appena più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 9474	gx	14h41m58s	+08°27.9'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, osservabile abbastanza facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
UGC 9476	gx	14h41m32s	+44°30.8'		Boo	16"	m. buona / m. buono	è un diffuso lucore a bassissima luminanza superficiale, molto uniforme, approssim. rotonda con Ø superiore a 1' — 270x.
UGC 9479	gx	14h42m33s	+04°25.8'		Vir	24"	buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"× 20"; purtroppo è molto disturbata dalla SAO 120614 di 8ª grandezza situata 3' a N — 450x.
UGC 9480	gx	14h42m22s	+22°20.0'		Boo	16"	m. buona / ottimo	poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30", diffusa e con tenue condensazione centrale — 380x.
UGC 9482	gx	14h42m47s	+00°39.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare chiaramente allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 9491	gx	14h44m15s	+04°13.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare — 450x.
UGC 9492	gx	14h44m12s	+07°57.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 9495	gx	14h43m52s	+41°14.1'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 495x.
UGC 9497	gx	14h44m12s	+42°37.6'		Boo	28"	m. buona / buono	è una debolissima lama di luce estesa ~ 1' in direzione NE-SW; c'è una stellina a 1' verso E; c'è un piccolo triangolo rettangolo isoscele di deboli stelline subito a N — 495x.
UGC 9503	gx	14h45m26s	+19°28.0'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 9510	gx	14h45m45s	+32°37.8'		Boo	16"	buona / ottimo	è una debolissima lama di luce estesa ~ 1' e orientata da NE a SW che salta fuori solo in visione distolta a un paio di primi SW di una stellina; bisogna però scalare a 270x.
UGC 9513	gx	14h46m09s	+13°01.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo condensato e con Ø di 20"-25"; è situato meno di 1' SE di una debole stellina; la brillante SAO 101197 di magnitudo 6.6, situata a 6' NW, si riesce appena a mantenere fuori campo a 380x.
UGC 9515	gx	14h46m21s	+13°01.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; solo a tratti appare una nucleo stellare — 380x.
UGC 9517	gx	14h46m41s	+12°36.3'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" e di luminosità pressoché uniforme; solo a tratti appare un nucleo quasi stellare, anche se si nota meglio scalando a 280x.
UGC 9518	gx	14h46m22s	+32°46.6'		Boo	16"	buona / ottimo	rotonda, con Ø di 40", molto diffusa e con marcata condensazione centrale quasi stellare — 380x.
UGC 9519	gx	14h46m21s	+34°22.3'		Boo	16"	buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; presenta una condensazione centrale evidente a 380x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW.
UGC 9521	gx	14h47m00s	+11°35.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa; alcune debolissime galassiette si trovano nei dintorni (vedi) — 380x.
UGC 9523	gx	14h47m06s	+11°35.6'		Boo	16"	ottima / ottimo	situata 1.5' a E di UGC 9521 è debole, diffusa, rotonda con Ø stellare e Ø di 45"; c'è una stellina una 40-ina di secondi a SE — 380x.
UGC 9529	gx	14h45m54s	+68°55.8'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×20", diffusa alle estremità N e S e con piccolo bulge abbastanza evidente; quasi equidistante con una coppia di stelline brillanti a NE — 450x.
UGC 9530	gx	14h47m42s	+09°39.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 9533	gx	14h48m21s	+13°57.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a NW; è un poco disturbata dalla SAO 101223 di 9ª grandezza situata 4' a W — 450x.
UGC 9534	gx	14h48m36s	+11°19.5'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
UGC 9537	gx	14h48m27s	+34°59.8'		Boo	16"	ottima / m. buono	è una debole lama di luce orientata da NW a SE ed estesa ~ 1.5'; presenta un bulge abbastanza contrastato e un nucleo stellare visibile a tratti; appare un po' meglio contrastata a 270x; c'è una stellina sul prolungamento dell'asse della gx verso SE.
UGC 9542	gx	14h49m01s	+42°27.8'		Boo	16"	m. buona / m. buono	debolissima, poco diffusa, con condensazione centrale appena accennata, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 380x.
UGC 9544	gx	14h46m36s	+25°22.9'		Boo	16"	buona / mediocre	appare debole e molto diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' e poco più brillante all'interno; c'è una stellina a un paio di primi SSE — 270x.
UGC 9545	gx	14h49m05s	+49°56.8'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 495x.
UGC 9548	gx	14h50m16s	+16°43.1'		Boo	24"	ottima / buono	assieme a UGC 9550 forma una coppia di gx molto deboli, diffuse e di luminosità uniforme ed entrambe orientate da N a S; la 1ª ha dimensioni 30"×20", mentre la 2ª è poco più estesa, di dimensioni 40"×20" e poco più evidente — 450x.
UGC 9550	gx	14h50m27s	+16°44.7'		Boo	24"	ottima / buono	v. **UGC 9548**
UGC 9551	gx	14h50m42s	−01°46.6'		Lib	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi; diviene relativamente facile in visione distolta a 450x.
UGC 9556	gx	14h49m46s	+60°23.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; ci sono 2 deboli stelline, una subito a NE e l'altra a 1' verso N; a 1' E ce n'è una più brillante che fa parte di un asterismo di 4 componenti foggiato a "L" molto stretta orientato da N a S — 495x.
UGC 9558	gx	14h51m10s	+17°11.4'		Boo	16"	m. buona / buono	e un debolissimo lucore diffuso e di luminosità uniforme, probabilmente rotondo con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a ~ 1' verso S — 270x.
UGC 9559	gx	14h50m39s	+42°44.4'		Boo	16"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 380x.
UGC 9560	gx	14h50m57s	+35°34.3'		Boo	16"	m. buona / ottimo	piccola, con condensazione centrale quasi stellare, approssim. circolare con dimensioni max 30" — 270x.
UGC 9562	gx	14h51m14s	+35°32.5'	q 111	Boo	16"	m. buona / ottimo	è una chiazza lattescente abbastanza facile, di luminosità pressoché uniforme, forse poco allungata da NE a SW e di dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante a 3' scarsi verso ESE — 270x.
UGC 9567	gx	14h51m47s	+43°38.6'		Boo	16"	buona / ottimo	è poco più debole di UGC 9569 situata 5' NNE e osservata per prima; a tratti, in visione distolta, appare poco allungata da NW a SE, diffusa e con dimensioni 60"×40" — 380x.
UGC 9569	gx	14h52m00s	+43°43.2'		Boo	16"	buona / ottimo	è una bolla rotonda molto debole e stemperata sul fondo cielo con Ø > 1' e di luminosità uniforme; si vede comunque senza problemi in visione distolta — 380x.
UGC 9577	gx	14h53m33s	+18°05.9'		Boo	16"	buona / mediocre	è un debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e con Ø di 30" che appare a tratti a ~ 1' W di una stellina brillante — 270x.
UGC 9578	gx	14h53m47s	+20°06.9'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, con piccola condensazione centrale appena più evidente del disco; salta fuori solo in visione distolta a 270x; c'è un piccolo arco di 3 stelline a WSW e una stellina un paio di primi scarsi verso S.
UGC 9584	gx	14h54m15s	+04°30.8'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 9589	gx	14h53m36s	+54°09.5'		Boo	28"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×15"; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a 1' W (situata verso il margine SW dell'ammasso **AGC 1999**) — 495x.
UGC 9594	gx	14h54m45s	+24°05.8'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso S — 270x.
UGC 9598	gx	14h55m09s	+43°49.1'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 380x.
UGC 9601	gx	14h56m02s	−01°23.2'		Lib	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, appena più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' verso E — 380x.
UGC 9607	gx	14h55m00s	+62°16.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, stemperata sul fondo cielo, ma con nucleo stellare abbastanza evidente, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso SW — 450x.
UGC 9612	gx	14h56m04s	+45°24.3'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di 40"-45" e di luminosità uniforme; è disturbata dalla SAO 45285 di 9ª grandezza situata ad appena 1.5' verso E — 380x.
UGC 9613	gx	14h56m46s	+05°35.0'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni ~ 40"×20"; a tratti appare un tenuissimo oggetto nebuloso a 1' NW esteso una 20-ina di secondi e condensato che è risultato poi essere la MAC 1456+0535.
UGC 9616	gx	14h56m53s	+09°16.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE; meglio contrastata a 270x.
UGC 9618	gx	14h57m00s	+24°36.4'		Boo	16"	m. buona / ottimo	costituisce assieme a MCG+4-35-19 una coppia serrata che si riesce a risolvere a 380x; UGC è rotonda, di 30" di Ø e con nucleo stellare; la MCG sembra aggettare verso N dalla UGC per una 30-ina di secondi ed è di luminosità uniforme.
UGC 9620	gx	14h57m11s	+19°41.9'		Boo	16"	buona / mediocre	poco più debole e di aspetto più confuso di UGC 9622, osservata per prima, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×30" — 270x.
UGC 9621	gx	14h52m13s	+82°31.7'		UMi	20"	buona / scarso	molto debole, ma più che altro è molto disturbata dalla SAO 2459 di 6ª grandezza situata 4' scarsi a W; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 360x.
UGC 9622	gx	14h57m21s	+19°40.3'		Boo	16"	buona / mediocre	è un debole ovale a bassissimo gradiente di luce, molto diffuso, orientato da N a S con dimensioni 60"×30" — 270x.
UGC 9623	gx	14h56m51s	+38°45.4'		Boo	16"	buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo, diffuso, con Ø di 35"-40" con una nucleo stellare abbastanza evidente a 380x.
UGC 9625	gx	14h57m45s	+06°37.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge evidente anche se poco contrastato sul disco — 450x.
UGC 9626	gx	14h57m09s	+48°38.0'		Boo	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge evidente — 495x.
UGC 9629	gx	14h57m11s	+52°20.7'		Boo	16"	ottima / ottimo	facile, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente e diffuso; meglio osservabile a 380x.
UGC 9632	gx	14h57m56s	+53°47.1'		Boo	16"	buona / mediocre	(allineata verso SW con la coppia NGC 5821-5820) — molto debole, e stemperata sul fondo cielo, ma si vede facilmente in visione distolta; è grosso modo rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 9633	gx	14h59m03s	+08°41.4'		Boo	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo baffo che a tratti, in visione distolta, aggetta verso SW da una debole stellina per 20" o 30" (difficile stabilirlo); meglio osservabile a 380x.
UGC 9635	gx	14h59m04s	+19°35.2'		Boo	16"	m. buona / ottimo	è un'elusiva galassietta rotonda, diffusa, con Ø che in visione distolta pare di una 40-ina di secondi e con una condensazione centrale visibile a tratti a 380x; è disturbato dalla luce di una stellina brillante situata a 1' SSE (la quale fa parte di un asterismo regolare di 5 componenti foggiato a rettangolo).
UGC 9636	gx	14h59m11s	+13°25.3'		Boo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 9638	gx	14h58m10s	+58°52.3'	q 50	Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; una stellina, o forse un nodulo, appare solo a momenti al margine N; c'è un triangolo rettangolo di stelline brillanti subito a S: la componente più a W si trova 1' a S della gx — 495x.
UGC 9639	gx	14h58m36s	+44°53.2'		Boo	16"	buona / ottimo	abbastanza facile, diffusa, con gradiente di luce medio e nucleo stellare visibile a tratti; è rotonda con Ø di 45" — 380x.
UGC 9640	gx	14h59m28s	+16°38.7'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, poco diffusa, rotonda, di 45" di Ø e con nucleo stellare — 380x.
UGC 9641	gx	14h59m03s	+41°26.8'		Boo	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, presenta un nucleo stellare evidente circonfuso da un tenuissimo alone appena evidente e molto stemperato sul fondo cielo; è rotonda con Ø una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 9644	gx	14h59m34s	+27°07.0'		Boo	16"	buona / mediocre	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 9650	gx	14h53m50s	+83°35.5'		UMi	16"	ottima / ottimo	bella, molto allungata da N a S, di dimensioni 90"×30", con bulge evidente e nucleo di aspetto stellare — 380x.
UGC 9652	gx	15h00m37s	+16°10.3'		Boo	24"	ottima / buono	debole e molto diffusa, ma relativamente facile da vedere, anche se meglio contrastata scalando a 340x, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina a 1' scarso W; a poco più di 3' verso S c'è una coppia di stelle brillanti con le quali la gx è allineata.
UGC 9654	gx	15h00m57s	+11°31.0'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 9656	gx	15h01m20s	+09°09.1'		Boo	24"	m. buona / buono	baffo di luce molto debole e uniforme, esteso almeno 45" e che in visione distolta sembra aggettare a W di una stellina brillante — 450x.
UGC 9657	gx	15h00m49s	+48°21.7'		Boo	16"	m. buona / m. buono	debolissima, ma appare facilmente in visione distolta a 270x, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15".
UGC 9659	gx	15h01m49s	+04°56.0'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e molto diffusa alle due estremità; una stellina brillante situata 1.5' a WSW interferisce un po' con l'osservazione — 450x.
UGC 9660	gx	15h01m09s	+44°41.9'		Boo	16"	buona / ottimo	è un debole ovale poco diffuso, di luminosità pressoché uniforme, allungato da E a W con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 9661	gx	15h02m04s	+01°50.5'		Vir	24"	buona / ottimo	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso NE — 450x.
UGC 9663	gx	15h01m14s	+52°35.7'	q 50	Boo	16"	buona / m. buono	altra galassia debolissima visibile solo a tratti con gran difficoltà alternando gli occhi; non sembra più estesa di 40" — 380x.
UGC 9665	gx	15h01m33s	+48°19.1'		Boo	16"	m. buona / m. buono	abbastanza facile, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20", poco diffusa e appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 9668	gx	14h56m10s	+83°31.4'		UMi	16"	ottima / ottimo	abbastanza compatta, ma di aspetto un po' irregolare, approssim. rotonda con Ø di 30" e poco più brillante al centro; c'è una stellina a ridosso NE — 380x.
UGC 9669	gx	14h54m08s	+85º00.5'		UMi	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE; il campo è disturbato da una coppia di stelle brillanti di 9ª grandezza (SAO 2484 e -5) situate 4' a NE; la brillante SAO 2477 di magnitudo 6.7 che si trova 7' scarsi a N si riesce invece a tenere fuori campo a 450x).
UGC 9671	gx	15h02m04s	+42°11.0'		Boo	16"	buona / ottimo	debolissimo lucore molto diffuso e di forma indistinta, ma non più esteso di una 40-ina di secondi, con nucleo stellare percettibile a tratti a 380x; è situata a ridosso verso E del vertice nord-orientale di un piccolo triangolo isoscele: la stellina più a W è brillante ed è riportata sull'Uranometria.
UGC 9675	gx	15h03m22s	+10°39.4'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una doppia 1' verso S — 570x.
UGC 9682	gx	15h04m30s	−00°51.1'		Lib	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa almeno 1.5', purtroppo molto disturbata dalla SAO 140303 di 8ª grandezza situata 3.5' SSW: l'unico modo per tenerla fuori campo era di spingere a 570x; la gx è situata tra 2 stelline: una abbastanza brillante a W e l'altra molto debole a E; è comunque visibile anche a 450x con la SAO presente nel campo.
UGC 9683	gx	14h59m33s	+81°24.1'		UMi	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; c'è una debole stellina al bordo SW — 450x.
UGC 9684	gx	15h03m50s	+42°06.9'		Boo	16"	buona / ottimo	è una chiazza rotondeggiante molto debole estesa non più di 40" e di luminosità pressoché uniforme salvo, al limite, un piccolo nucleo visibile tuttavia solo a tratti; c'è una debole stellina a 1' verso S — 380x.
UGC 9685	gx	15h04m47s	+08°10.2'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso NW e un'altra poco più distante a NE — 400x.
UGC 9688	gx	15h04m03s	+52°55.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 9689	gx	15h05m03s	+07°50.0'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi; appare meglio spingendo a 570x; è in parte disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a SE.
UGC 9691	gx	15h04m38s	+40°22.3'		Boo	16"	m. buona / m. buono	debolissima, ma appare facilmente in visione distolta, poco diffusa e di luminosità uniforme, a tratti allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 270x.
UGC 9695	gx	15h05m28s	+14°25.8'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele rettangolo coi cateti lunghi un paio di primi — 450x.
UGC 9696	gx	15h05m31s	+08°31.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo, poco diffuso, di 30" di Ø e con nucleo stellare — 380x.
UGC 9697	gx	15h05m47s	−00°42.9'		Lib	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 9699	gx	15h05m53s	+09°31.7'		Boo	24"	buona / ottimo	è una sorta di tenue "grumo" di luce di forma indistinta che sembra intaccare verso S l'alone della SAO 120834 di 9ª grandezza situata una 30-ina di secondi a N; l'effetto è poco più evidente spingendo a 580x.
UGC 9701	gx	15h05m37s	+31°09.8'		Boo	16"	buona / ottimo	debolissima e in parte disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a SW; in visione distolta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 9703	gx	15h05m27s	+46°33.8'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 380x.
UGC 9705	gx	15h06m10s	+25°46.9'		Boo	16"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20", con piccola ed evidente condensazione centrale — 380x.
UGC 9708	gx	15h06m33s	+09°27.0'		Boo	24"	buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
UGC 9711	gx	15h06m37s	+09°26.3'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
UGC 9712	gx	15h06m45s	+12°33.7'		Boo	24"	buona / ottimo	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme che salta fuori in visione distolta a 400x.
UGC 9713	gx	15h06m42s	+23°38.5'		Boo	16"	buona / mediocre	relativamente facile, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", con nucleo stellare visibile, però, solo a tratti; c'è una stellina a ~ 1' verso S — 270x.
UGC 9718	gx	15h07m04s	+21°12.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, di luminosità pressoché uniforme, poco diffuso e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
UGC 9719	gx	15h06m42s	+40°34.8'		Boo	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, presenta un piccolo bulge oblungo di ~ 20"×15" circonfuso da un alone molto tenue, grosso modo rotondo con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
UGC 9721	gx	15h07m25s	+12°34.8'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di 30"-35" e di luminosità uniforme.
UGC 9722	gx	15h06m31s	+51°54.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, diffusa, con Ø di ~ 40"; a tratti, osservando a 380x, appare una tenue nucleo stellare.
UGC 9730	gx	15h04m02s	+77°38.2'		UMi	24"	m. buona / ottimo	chiarore circolare molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, con Ø di 45"; c'è una stellina quasi a ridosso S; forma un triangolo equilatero con due stelline a N e NW; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 9732	gx	15h08m10s	+01°15.0'		Vir	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, con piccola nucleo stellare visibile a tratti a 380x e Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 9734	gx	15h06m55s	+66°10.6'		UMi	24"	m. buona / ottimo	chiazza diffusa molto debole e stemperata sul fondo cielo, estesa una 40-ina di secondi; situata a ridosso S di una stellina molto brillante che ne confonde un po' la forma — 450x.
UGC 9737	gx	15h07m48s	+55°11.1'		Dra	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×40" e con piccolo bulge quasi stellare; c'è una stellina brillante quasi a ridosso WSW — 450x.
UGC 9741	gx	15h08m33s	+52°17.7'	q 50	Boo	16"	m. buona / scarso	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme (riportata sull'Uranometria come **5875A**) — 188x.
UGC 9744	gx	15h09m51s	+01°46.7'		Vir	24"	buona / ottimo	rotonda con Ø > 30", diffusa e con tenue condensazione centrale poco contrastata sul disco — 450x.
UGC 9746	gx	15h10m16s	+01°56.0'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta appaiono di 80"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
UGC 9748	gx	15h07m22s	+76°03.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con una condensazione centrale poco contrastata *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 9750	gx	15h07m32s	+76°08.8'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina al bordo orientale; situata al margine W di un asterismo di 4 stelle foggiato come lo "stemma della Mercedes" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 9755	gx	15h11m13s	+10°27.0'		Ser	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 77-32 situata subito a N; si distinguono facilmente anche a 340x; sono entrambe di luminosità pressoché uniforme; la UGC è diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; la CGCG è invece molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" 450x.
UGC 9756	gx	15h11m24s	+06°20.6'		Ser	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata e forse interagente con PGC 54209 situata a ridosso SW; relativamente facile, molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; la coppia appare comunque meglio definita scalando a 340x; le due gx sono situate al centro dell'ammasso AGC 2033.
UGC 9757	gx	15h11m37s	+05°23.8'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo una condensazione centrale molto tenue visibile pero solo a tratti; è allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30 — 400x.
UGC 9758	gx	15h11m28s	+13°29.0'		Ser	24"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 40" e tenue nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S e una più debole a N; una terza stellina appena percettibile appare a tratti a ridosso SE — 450x.
UGC 9759	gx	15h10m41s	+55°21.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	relativamente estesa, diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina subito a NE; occorre comunque tenere fuori campo la SAO 29434 di magnitudo 8.5 situata 4' a N — 495x.
UGC 9760	gx	15h12m02s	+01°41.9'		Ser	24"	buona / m. buono	debolissima lama di luce che in visione distolta aggetta verso SW da una stellina abbastanza brillante per una 40-ina di secondi (dalla parte opposta se ne nota solo un cenno) — 450x.
UGC 9761	gx	15h11m13s	+46°09.1'		Boo	16"	buona / ottimo	facile, presenta un bulge abbastanza marcato con nucleo puntiforme circonfuso da un alone diffuso, rotondo e con Ø poco superiore a 1' — 380x.
UGC 9763	gx	15h12m02s	+21°17.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 9765	gx	15h12m27s	+20°39.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e poco più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile e di aspetto nebuloso al margine SE: di fatto questa è risultata essere la PGC 214363 — 450x.
UGC 9766	gx	15h11m18s	+61°07.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole chiazza diffusa di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a S — 450x.
UGC 9767	gx	15h12m47s	+07°26.0'		Ser	24"	buona / m. buono	debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; disturbata dalla SAO 120895 di magnitudo 8.7 e situata 2' a S — 450x.
UGC 9770	gx	15h13m28s	+25°12.4'		Ser	16"	buona / discreto	debolissimo lucore diffuso, approssim. rotondo con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso N; meglio osservabile a 270x.
UGC 9777	gx	15h14m15s	+20°28.7'		Ser	16"	buona / mediocre	molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø di ~ 40"; presenta una condensazione centrale visibile a tratti — 270x.
UGC 9780	gx	15h14m01s	+44°35.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e relativamente compatta, orientata da NW a SE e che in visione distolta appare estesa 1.5'; poco meglio evidente scalando a 340x.
UGC 9781	gx	15h14m39s	+05°32.9'		Ser	24"	ottima / ottimo	tenuissimo lucore molto diffuso, a tratti condensato ed esteso una 40-ina di secondi; sembra a prima vista una sorta di alone asimmetrico attorno a una stellina brillante — 400x (c'è un asterismo di 7 stelle una 20-ina di primi a SE, abbastanza compatto e di forma irregolare: la componente più a N è una doppia stretta).
UGC 9785	gx	15h15m14s	+05°11.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E; un piccolo gruppo serrato di 8 stelline brillanti esteso un paio di primi si trova a 6' NE — 450x.
UGC 9786	gx	15h13m12s	+71°12.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 9787	gx	15h15m43s	+01°27.4'		Ser	24"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø poco superiore a 30" — 450x.
UGC 9788	gx	15h15m39s	+08°18.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 9791	gx	15h14m31s	+58°50.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; situata all'interno di un piccolo triangolo irregolare di deboli stelline situate a 1' SSE, 1' a W e una molto debole a 1' NW — 495x.
UGC 9794	gx	15h16m10s	+10°30.4'		Ser	16"	buona / ottimo	debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni ~ 90"×30"; a tratti, osservando a 380x, sembra di aspetto leggermente irregolare.

UGC 9795	gx	15h16m32s	+07°44.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 9798	gx	15h16m42s	+07°23.8'		Ser	24"	buona / m. buono	allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale diffusa; c'è una stellina al bordo N — 450x.
UGC 9799	gx	15h16m45s	+07°01.3'		Ser	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, oblunga, con piccolo bulge appena più evidente del disco; è orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; fa parte dell'ammasso AGC 2052 di cui rappresenta forse il membro più cospicuo) — 380x.
UGC 9804	gx	15h17m49s	+04°09.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 9807	gx	15h17m59s	+10°53.7'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, con bulge rotondo appena più contrastato del disco, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; è situata all'interno di una losanga regolare: la stellina più a S è quella più brillante — 400x.
UGC 9808	gx	15h18m08s	+13°49.7'		Ser	16"	buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina brillante proprio al margine orientale — 380x.
UGC 9809	gx	15h18m00s	+30°41.4'		CrB	16"	ottima / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e di una 30-ina di secondi di Ø, disturbato dalla luce di una stellina brillante situata proprio a ridosso verso SW; nonostante questo la gx si vede meglio scalando a 270x.
UGC 9812	gx	15h19m07s	+09°47.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa ~ 1'; due stelline appena percettibili si trovano rispettivamente a 1' NE e NW; poco meglio contrastata restando a 450x.
UGC 9813	gx	15h18m58s	+20°48.9'		Ser	16"	buona / mediocre	è un lucore molto debole e diffuso, ma visibile senza difficoltà in visione distolta a W di una coppia di stelline distanti 1' in direzione N-S — 270x.
UGC 9814	gx	15h59m25s	+11°03.3'		Ser	24"	ottima / ottimo	più debole di UGC 9807, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20"; presenta un disco uniforme e un tenue bulge appena percettibile orientato come la gx — 400x.
UGC 9815	gx	15h19m15s	+44°54.9'		Boo	28"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce estesa 1' e orientata da N a S — 495x.
UGC 9816	gx	15h18m48s	+59°27.8'		Dra	24"	ottima / ottimo	debolissima e purtroppo disturbata da due stelle brillanti di cui una, la meno luminosa, ad appena 1' a NNE (quella molto luminosa è la SAO 29480 di 8ª grandezza ed è situata 3.5' a N); solo in visione distolta appare a momenti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 40"×20" (ossia più corta di come è in realtà) — 450x.
UGC 9820	gx	15h21m24s	+28°33.6'		CrB	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda, Ø di 45" e con condensazione centrale quasi stellare abbastanza evidente a 380x.
UGC 9821	gx	15h21m40s	+08°24.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole lucore molto stemperato sul fondo cielo, rotondo con Ø di un 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile però solo a momenti scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso SW e un'altra brillante a 1' verso S; la gx è un poco disturbata dalla SAO 120958 di magnitudo 8.4 situata un paio di primi a N.
UGC 9825	gx	15h21m46s	+23°09.1'		Ser	16"	buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W — 380x.
UGC 9826	gx	15h21m33s	+39°12.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×15" — 450x.
UGC 9827	gx	15h21m59s	+41°07.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce estesa 1' scarso e orientata da NE a SW; c'è una doppia stretta a un paio di primi verso S — 450x.
UGC 9829	gx	15h23m02s	−01°20.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con alcune irregolarità di luce molto tenui all'interno osservabili a 450x.
UGC 9831	gx	15h33m45s	+29°46.2'		CrB	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N.
UGC 9833	gx	15h23m52s	+23°32.8'		Ser	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto rotondo, elusivo, con Ø di una 30-ina di secondi; appare solo a tratti in visione distolta a 380x; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline: una a un paio di primi NNE e l'altra appena percettibile a WNW.
UGC 9834	gx	15h23m56s	+38°07.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	è di aspetto simile a CGCG 166-20 , molto debole, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di 30"-35"; c'è una stellina a 1' verso NNW; appare un po' meglio contrastata a 270x.
UGC 9835	gx	15h23m56s	+46°36.0'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 9837	gx	15h23m52s	+58°03.2'		Dra	16"	m. buona / ottimo	è un debole lucore di luminosità uniforme, facilmente visibile in visione distolta, con Ø di ~ 1'; si faccia attenzione all'unico valido riferimento costituito da una doppia stretta situata 6' NNE — 270x.
UGC 9838	gx	15h25m12s	+07°09.3'		Ser	24"	buona / m. buono	diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a 1' NW e un'altra più debole a una 30-ina di secondi verso W.
UGC 9841	gx	15h25m34s	+18°16.6'		Ser	16"	buona / mediocre	lama di luce molto debole, di luminosità pressoché uniforme, osservabile senza difficoltà in visione distolta; è estesa un paio di primi in direzione NE-SW; c'è una stellina brillante a poco più di 1' dal bordo SW — 270x.
UGC 9842	gx	15h25m06s	+37°57.6'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole, appena più brillante all'interno; salta fuori in visione distolta meglio a 380x: è allungata da E a W con dimensioni 40"×20".
UGC 9843	gx	15h25m39s	+20°47.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza di luminosità uniforme che in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S e un'altra simile subito a E — 450x.
UGC 9844	gx	15h25m53s	+07°49.2'		Ser	16"	buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa di luminosità uniforme ed estesa ~ 1'; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta solo a 380x.
UGC 9845	gx	15h26m06s	+09°12.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1'; poco disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a SE — 450x.
UGC 9846	gx	15h26m03s	+16°19.4'		Ser	16"	buona / ottimo	poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 40"; meglio scalare a 270x.
UGC 9850	gx	15h25m46s	+48°29.5'		Boo	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e di aspetto abbastanza uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 495x.
UGC 9853	gx	15h25m47s	+52°26.7'		Boo	24"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa 2' scarsi; c'è una stellina quasi a ridosso NW; resta comunque più interessante scalando a 340x.
UGC 9855	gx	15h25m05s	+66°15.3'		UMi	24"	ottima / m. buona	debole e diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta arrivano a 80"×30"; è situata tra due stelline brillanti orientate da E a W e grosso modo distanti come la lunghezza della gx — 450x.
UGC 9856	gx	15h26m29s	+41°17.4'		Boo	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole orientata da NW a SE e che in visione distolta appare estesa oltre 1'; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
UGC 9858	gx	15h26m41s	+40°33.9'	q 78	Boo	16"	buona / ottimo	facile, molto allungata da ENE a WSW per almeno 2.5' (quasi una edge-on), poco diffusa e appena più brillante all'interno; è situata un paio di primi a S di una brillante stellina di 8ª grandezza — 380x.
UGC 9859	gx	15h27m02s	+26°42.3'		CrB	16"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa, piccola, di una 30-ina di secondi di Ø e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 9861	gx	15h27m45s	+28°55.7'		CrB	28"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2079** — molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una coppia di stelline a 1.5' verso N. Forma una coppia ravvicinata con **PGC 55149**; c'è una debole stellina a 1' SSW della coppia — 495x.
UGC 9864	gx	15h29m26s	+05°05.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, si vede molto bene in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 80"×20" e con nucleo stellare molto tenue; a SSW arriva quasi a lambire una stellina: questa fa parte di un terzetto allineato in direzione NNW-SSE — 450x.
UGC 9873	gx	15h29m50s	+42°37.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 60"×15" — 450x.
UGC 9874	gx	15h27m15s	+77°09.4'		UMi	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina molto debole a 1' scarso SSE *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 9878	gx	15h24m31s	+83°04.6'		UMi	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e appena più brillante all'interno — 450x.
UGC 9881	gx	15h27m13s	+79°48.2'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso SE; disturbata dalla SAO 8261 di 9ª grandezza situata un paio di primi a S — 450x.
UGC 9885	gx	15h29m34s	+70°33.4'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare approssim. rotonda con Ø di 35"-40"; c'è una coppia di stelline sbilanciate in luminosità a 1.5' verso W — 450x.
UGC 9886	gx	15h32m32s	+04°40.8'		Ser	24"	m. buona / mediocre	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; subito a W notasi un debolissimo oggetto diffuso, molto piccolo e condensato, non più esteso di 10" o 15": da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la PGC 214384 — 450x.
UGC 9887	gx	15h32m44s	+04°44.9'		Ser	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e con bassissima luminanza superficiale, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 9889	gx	15h33m05s	+00°33.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
UGC 9892	gx	15h32m52s	+41°11.5'		Boo	16"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a ~ 1' verso S — 380x.
UGC 9893	gx	15h32m57s	+46°27.2'		Boo	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; è meglio visibile a 380x.
UGC 9894	gx	15h33m51s	+05°16.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 50-25 situata a poco più di 1' NNW — molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina al bordo W — 450x.
UGC 9896	gx	15h31m45s	+67°33.4'		UMi	16"	ottima / discreto	è una debole chiazza diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø > di 1'; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 deboli stelline: quella poco più brillante si trova a un paio di primi a S — 270x.
UGC 9897	gx	15h33m52s	+11°00.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; è situata tra 2 stelline: una abbastanza brillante a NNE e l'altra appena percettibile a SSW — 400x.
UGC 9901	gx	15h34m27s	+12°16.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da N a S ed estesa 1'; allineata e quasi equidistante con due deboli stelline a NE — 450x.
UGC 9912	gx	15h35m10s	+16°33.0'	q 199	Ser	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza approssim. rotonda con Ø di ~ 1', appena più evidente del fondo cielo; è meglio osservabile scalando a 188x.
UGC 9917	gx	15h35m19s	+20°50.5'		CrB	16"	buona / discreto	è un'elusiva macchiolina forse rotonda, di ~ 30" di Ø e di luminosità uniforme; appare a tratti in visione distolta a un paio di primi SE di una stellina molto debole, ma bisogna scalare a 270x.
UGC 9919	gx	15h35m40s	+12°36.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1'; appare facilmente in visione distolta, ma è poco meglio contrastata a 450x.
UGC 9920	gx	15h35m17s	+30°48.1'		CrB	16"	buona / discreto	lama di luce molto debole che appare come tale solo a momenti in visione distolta a 188x; è orientata da NE a SW ed estesa ~ 1'; c'è una debole stellina a una 20-ina di secondi N.
UGC 9924	gx	15h35m46s	+44°50.1'		Boo	16"	m. buona / m. buono	è un piccolo e debole oggetto rotondo di luminosità uniforme e con Ø di 30" o 35" — 380x.
UGC 9925	gx	15h36m32s	+16°26.4'		Ser	24"	ottima / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, ma visibile in visione distolta; a tratti appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30", ma ho dovuto scalare a 280x.
UGC 9927	gx	15h36m28s	+22°30.0'		CrB	16"	buona / discreto	debole ovale poco diffuso, orientato da E a W con dimensioni 40"×30" e appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 9934	gx	15h36m07s	+59°34.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; allineata ed equidistante con 2 stelline a N; una stellina appena percettibile si trova a 1' verso W — 495x.
UGC 9937	gx	15h37m23s	+20°33.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce relativamente facile, orientata da N a S, estesa 1' e con piccolo bulge evidente e contrastato; situata tra una stellina abbastanza brillante a W e una debole a E — 450x.
UGC 9944	gx	15h35m48s	+73°27.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da N a S, diffusa, di dimensioni 80"×20" e con bulge evidente *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
UGC 9945	gx	15h38m55s	+04°35.0'		Ser	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' — 380x.
UGC 9950	gx	15h33m18s	+82°13.8'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a ridosso W; un'altra brillante si trova invece subito a ESE — 450x.
UGC 9951	gx	15h39m20s	+15°23.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	presenta un nucleo di aspetto quasi stellare circonfuso da un tenuissimo alone osservabile in visione distolta, ma di forma indistinta, forse rotondo con Ø di 30" o 40" — 400x.
UGC 9953	gx	15h39m39s	+03°11.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ridosso di NE.
UGC 9954	gx	15h39m17s	+24°27.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
UGC 9958	gx	15h39m39s	+21°47.0'		Ser	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2107** — molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW — 450x.
UGC 9959	gx	15h39m08s	+43°51.9'		Boo	16"	buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti a 380x — anche per ridurre l'effetto di riverberazione di una stellina brillante — allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme.
UGC 9960	gx	15h40m06s	+01°56.0'		Ser	24"	buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa per 1' scarso, orientata da NE a SW e di luminosità uniforme; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso W (comincia a farsi chiaro) — 450x.
UGC 9964	gx	15h40m22s	+07°17.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con una piccola zona centrale poco contrastata orientata nella stessa direzione estesa una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 9968	gx	15h41m10s	−01°42.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 450x.
UGC 9972	gx	15h39m49s	+59°48.9'		Dra	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20".
UGC 9976	gx	15h41m50s	+05°51.2'		Ser	24"	ottima / ottimo	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 400x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
UGC 9977	gx	15h42m00s	+00°42.8'		Ser	16"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, abbastanza evidente in visione distolta, orientata da E a W ed estesa ~ 3' — 380x.
UGC 9979	gx	15h42m20s	+00°28.3'		Ser	24"	buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce che appare solo a tratti in visione distolta a non meno di 450x per smorzare l'abbagliamento della SAO 121129 di 7ª grandezza, situata 4.5' a WSW e che si fatica a tenere fuori dal campo; la gx è orientata da NW a SE e dovrebbe essere estesa 30" o 40".
UGC 9980	gx	15h42m34s	+02°00.9'		Ser	24"	buona / m. buono	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S (sta rischiarando) — 450x.
UGC 9981	gx	15h41m47s	+45°33.4'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15", molto diffusa alle due estremità del fuso; presenta un nucleo quasi stellare evidente — 450x.
UGC 9982	gx	15h40m08s	+70°44.4'		UMi	24"	ottima / m. buona	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di ~ 1'; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso W; meglio contrastata scalando a 340x; c'è un asterismo di 4 stelline molto allungato da N a S che sembra indicarne la posizione — 450x.
UGC 9984	gx	15h42m42s	+22°52.9'		CrB	16"	buona / discreto	debolissima e diffusa, appena più brillante all'interno, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso SW; una doppia è invece situata a ~ 3' W — 380x.
UGC 9986	gx	15h40m39s	+68°48.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; poco meglio definita scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso W.
UGC 9989	gx	15h43m16s	+09°43.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W — 450x.
UGC 9990	gx	15h43m30s	+04°47.6'		Ser	24"	m. buona / mediocre	è un'elusiva lama di luce orientata da N a S che appare solo a momenti in visione distolta, non bisogna scendere sotto i 450x; non sembra più estesa di 45".
UGC 9991	gx	15h43m24s	+14°26.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce orientato da E a W con dimensioni ~ 40"×20"; a 270x appare in visione distolta a SW di una debole stellina.
UGC 9992	gx	15h41m48s	+67°15.3'	q 28	CrB	16"	m. buona / mediocre	debolissima chiazza con una piccola condensazione centrale molto tenue e che solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 270x.
UGC 9995	gx	15h43m11s	+47°45.2'		Boo	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25"; disturbata dalla SAO 45695 di 8a grandezza situata un paio di primi a ENE; c'è una debole stellina a 1' SW — 450x.
UGC 9996	gx	15h44m29s	+11°33.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa oltre 1' — 450x.
UGC 9997	gx	15h43m47s	+43°47.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 9999	gx	15h44m23s	+25°19.6'		Ser	16"	buona / mediocre	relativamente facile, situata in un piccolo campo depleto, allungata da NE a SW, di dimensioni 50"×30" con condensazione centrale marcata e nucleo stellare — 270x.
UGC 10001	gx	15h43m55s	+44°18.3'		Boo	16"	m. buona / m. buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme; a tratti in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40"; meglio contrastata scalando a 270x.
UGC 10005	gx	15h45m14s	+00°46.4'		Ser	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti, ma è preferibile scalare a 270x; forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a ENE: quella più distante è la più debole.
UGC 10008	gx	15h38m54s	+82°19.8'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una debole stellina quasi a ridosso E; è poco disturbata dalla SAO 2587 di 9a grandezza situata 3.5' a NW e che non si riesce a tenere fuori campo — 450x.
UGC 10010	gx	15h44m46s	+46°04.7'		Boo	24"	buona / buono	è una piccola chiazza elusiva osservabile a tratti in visione distolta a ridosso SW di una stellina; non sembra più estesa di 20"-30" — 400x.
UGC 10011	gx	15h45m22s	+25°26.3'		Ser	16"	buona / mediocre	debolissima, appare a tratti in visione distolta quando si fissano le 2 stelline situate 1.5' a S distanti 45" in direzione NE-SW; la galassia appare orientata a perpendicolo ed estesa all'incirca come la distanza delle stelline — 270x.
UGC 10012	gx	15h44m59s	+36°06.6'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40"; forzando a 380x, appare, solo a tratti, una stellina a ridosso verso E, ma la visione risulta molto difficoltosa, perché a questi ingrandimenti il campo è depleto.
UGC 10013	gx	15h44m25s	+55°39.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge appena più contrastato del disco; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
UGC 10018	gx	15h43m40s	+67°45.6'		Dra	24"	ottima / m. buona	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 10019	gx	15h45m34s	+30°08.8'		Boo	16"	buona / ottimo	fa parte del terzetto di CGCG 166-53 — debolissima, ma appare senza problemi in visione distolta, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio evidente a 270x.
UGC 10020	gx	15h45m45s	+20°33.6'		Ser	16"	buona / mediocre	debole lucore rotondo a bassissima luminanza superficiale, con Ø di ~1.5; è visibile anche in visione diretta, ma è meglio scalare a 188x.
UGC 10023	gx	15h46m10s	+06°53.9'		Ser	24"	mediocre / ottimo	debolissima e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 10026	gx	15h46m18s	+10°45.5'		Ser	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta a 450x, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso NE.
UGC 10029	gx	15h46m54s	+05°53.5'		Ser	24"	buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' verso E; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10030	gx	15h47m00s	−00°59.1'		Ser	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccola condensazione centrale visibile solo a tratti — 380x.
UGC 10034	gx	15h46m45s	+31°00.7'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 45"; a 380x appare a tratti una piccola e tenue condensazione centrale.
UGC 10035	gx	15h47m36s	+26°03.8'		CrB	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda di 30"-35" di Ø e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 10037	gx	15h48m13s	+11°16.8'		Ser	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 340x.
UGC 10039	gx	15h48m35s	+11°38.8'		Ser	24"	ottima / buono	debolissimo baffo di luminosità uniforme, orientato da E a W ed esteso una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 10040	gx	15h48m44s	+17°51.7'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15", poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 10042	gx	15h48m57s	+07°13.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa quasi 1.5; c'è una stella brillante a ridosso NW — 450x.
UGC 10043	gx	15h48m41s	+21°52.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso AGC 2147 — molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ridosso SSW — 450x.
UGC 10045	gx	15h49m19s	+00°11.0'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e con tenue bulge diffuso appena più contrastato, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15".
UGC 10046	gx	15h49m28s	+00°13.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1549+0014 situata a ridosso verso N a mo' di un "8"; molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e tenue condensazione centrale; la MAC è pure rotonda, ma con Ø poco inferiore, diffusa e con nucleo stellare; si sdoppiano facilmente a 450x; la coppia è tuttavia meglio osservabile a 570x a causa di una stella brillante situata a ridosso di NE.
UGC 10049	gx	15h49m17s	+21°49.2'		Ser	16"	ottima / ottimo	oggetto rotondo molto debole, di 25"-30" max di Ø con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline deboli: una a SW e l'altra poco più distante verso E.
UGC 10050	gx	15h49m45s	+18°31.6'		Ser	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa, orientata ~ da N a S, di dimensioni 45"×20" con nucleo evidente di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 10053	gx	15h47m51s	+69°28.2'		Dra	24"	ottima / m. buona	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40"; meglio contrastata scalando a 340x, ma così diventa impossibile tenere fuori campo la SAO 16854 di 7ª grandezza situata 4.5' a W.
UGC 10054	gx	15h43m55s	+81°48.6'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, solo a momenti appena più brillante all'interno, molto allungata da N a SSE con dimensioni grosso modo di 90"×30"; è praticamente situata tra due stelline poste alle estremità del fuso: quella a S è appena percettibile; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10057	gx	15h48m17s	+68°13.2'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge poco contrastato — 450x.
UGC 10062	gx	15h51m12s	+21°56.5'		Ser	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; meglio scalare a 270x.
UGC 10063	gx	15h51m25s	+25°45.6'		CrB	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10" — 450x.
UGC 10064	gx	15h51m13s	+25°42.1'		CrB	24"	m. buona / ottimo	allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW e una abbastanza brillante subito a S — 450x.
UGC 10065	gx	15h59m47s	+37°02.2'		CrB	16"	buona / ottimo	molto debole, con tenue bulge diffuso appena più contrastato sul disco, grosso modo rotonda con Ø di ~ 45" — 380x.
UGC 10068	gx	15h52m04s	+12°53.9'		Ser	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 1' (a 380x il campo è molto povero).
UGC 10070	gx	15h51m13s	+47°15.3'		Her	16"	buona / ottimo	sembra di aspetto un po' irregolare, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40", diffusa e con bulge bene evidente — 380x.
UGC 10071	gx	15h51m01s	+51°47.2'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole chiazza molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"-35"; allineata ed equidistante con 2 stelline a E — 495x.
UGC 10072	gx	15h49m31s	+71°14.8'		UMi	24"	ottima / m. buona	è una debole chiazza uniforme, diffusa e approssim. circolare con Ø di ~ 45" — 450x.
UGC 10073	gx	15h52m21s	+24°37.6'		Ser	16"	ottima / m. buono	molto debole e di aspetto un po' confuso; solo a tratti appare effettivamente orientata da NNW a SSE (ossia parallelamente alla congiungente delle 2 stelline distanti 6' all'interno delle quali si trova) e con dimensioni ~ 60"×30"; un nucleo stellare va e viene; meglio osservabile a 270x.
UGC 10074	gx	15h52m48s	+24°23.4'		Ser	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 10077	gx	15h53m06s	+13°14.1'		Ser	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; disturbata dalla SAO 101792 di 6ª grandezza situata 2.5' SSE — 340x (non è possibile spingere ulteriormente a causa del vento).
UGC 10078	gx	15h51m05s	+67°09.5'		Dra	16"	ottima / discreto	debole, poco diffusa, con condensazione centrale di aspetto quasi stellare, rotonda con Ø di 45" — 270x.
UGC 10082	gx	15h54m19s	+12°07.5'		Ser	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; meglio osservabile a 450x.
UGC 10084	gx	15h54m24s	+18°39.1'		Ser	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere in visione distolta; a 380x appare rotonda, poco diffusa, con Ø di un 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno.
UGC 10085	gx	15h54m26s	+18°31.4'		Ser	16"	m. buona / m. buono	più debole e diffusa di UGC 10084 e poco più estesa; appare solo in visione distolta, ma è preferibile scalare a 270x.
UGC 10086	gx	15h54m41s	+16°37.1'	q 200	Ser	16"	buona / ottimo	è debolissima, ma a 380x appare relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20".
UGC 10087	gx	15h54m05s	+41°37.1'		Her	16"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è preferibile scalare a 270x; è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
UGC 10095	gx	15h55m20s	+45°25.6'		Her	24"	buona / buono	è una galassietta elusiva visibile solo a tratti in visione distolta a 400x, ma non riesco a capire com'è fatta.
UGC 10097	gx	15h55m43s	+47°52.1'		Her	16"	buona / ottimo	è un ovale di 40"×30" orientato da NW a SE, con nucleo brillante di aspetto quasi stellare; c'è una debole stellina a 1' verso S — 380x.
UGC 10099	gx	15h56m36s	+41°52.8'		Her	28"	m. buona / buono	molto piccola, brillante e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; forma una coppia con **CGCG 223-17** situata 1' a NNW — 495x.
UGC 10104	gx	15h57m28s	+30°03.6'		CrB	16"	m. buona / ottimo	è una debole macchia di aspetto un po' confuso, ma facilmente visibile in visione distolta a 380x; condensazione centrale appena più contrastata del disco; allineata con 2 stelline in direzione NW-SE: la 1ª delle 2 è brillante ed è doppia.
UGC 10109	gx	15h57m21s	+47°10.0'		Her	24"	buona / buono	debole, diffusa, ma con evidente condensazione centrale di aspetto quasi stellare, allungata da NW a SE e di dimensioni 40"×20" — 400x.
UGC 10112	gx	15h58m19s	+19°58.0'		Ser	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 380x.
UGC 10114	gx	15h58m19s	+36°53.2'		CrB	16"	buona / ottimo	debolissima, solo a tratti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15", ma bisogna scalare a 270x.
UGC 10115	gx	15h57m08s	+63°55.1'		Dra	24"	ottima / m. buona	facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×40" e con nucleo stellare; c'è un piccolo e debolissimo batuffolo rotondo situato a ridosso S, esteso 10"-12" e di aspetto uniforme, che è poi risultato essere la **PGC 56460** — 450x.
UGC 10118	gx	15h58m40s	+48°41.0'		Her	28"	m. buona / buono	relativamente facile, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 50"×25" e con nucleo stellare marcato — 495x.
UGC 10119	gx	15h54m38s	+79°10.4'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo osservabile in visione distolta a 1' S di una debole stellina; in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30", ma occorre scalare a 340x.
UGC 10120	gx	15h59m09s	+35°01.8'		CrB	16"	m. buona / ottimo	rotonda, molto diffusa, di 45" di Ø e con nucleo piccolo di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 10121	gx	15h59m46s	+18°78.0'		Ser	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" e appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 10122	gx	15h59m29s	+39°49.7'		Her	16"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza lattescente di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso NW; meglio definita a 380x.
UGC 10123	gx	15h59m03s	+51°18.3'		Dra	28"	m. buona / m. buono	relativamente brillante e con alto gradiente di luce, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 495x.
UGC 10127	gx	16h00m24s	+20°50.9'		Ser	16"	m. buona / m. buono	è una debole chiazza lattiginosa, abbastanza evidente, ma resa irregolare da 3 stelline brillanti sovrapposte; le 2 più luminose, distanti ~ 1' delimitano grosso modo la gx da NE a SW; a 380x appare tra queste 2 un tenue bulge diffuso.
UGC 10128	gx	16h00m31s	+30°23.1'		CrB	16"	buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 30-ina — 380x.
UGC 10130	gx	16h01m20s	+08°50.1'		Ser	16"	buona / ottimo	debolissima e disturbata dalla luce di una stellina brillante situata 2' NE (un'altra stellina di luminosità simile si trova, rispetto a quest'ultima, a 4' NE: di fatto la gx è allineata con queste stelle); appare in visione distolta a 380x ed è estesa max 40".
UGC 10134	gx	16h01m21s	+16°18.4'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, estesa non più di una 30-ina di secondi; appare solo a tratti in visione distolta, ma bisogna scalare a 270x.
UGC 10137	gx	16h01m50s	+08°08.9'		Ser	24"	mediocre / ottimo	è una chiazza elusiva che appare a tratti in visione distolta e sembra aggettare verso NE da una stellina; occorre però scalare a 280x.
UGC 10138	gx	16h01m40s	+21°21.2'		Her	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente e nucleo stellare osservabile a 380x.
UGC 10142	gx	15h59m33s	+70°20.0'		UMi	24"	ottima / m. buona	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
UGC 10143	gx	16h02m17s	+15°58.5'		Her	16"	buona / ottimo	fa parte di un terzetto di galassie allineate all'incirca da N a S — molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" — 380x.
UGC 10144	gx	16h02m20s	+16°20.8'		Her	16"	buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, rotonda con Ø di 40", poco diffusa, e appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 10145	gx	16h01m59s	+47°05.8'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
UGC 10146	gx	06h03m05s	+05°06.5'		Ser	24"	m. buona / discreto	debolissima, appare con difficoltà in visione distolta a NW di una stellina; usati 570x a causa di alcune stelle molto brillanti altrimenti presenti nel campo.
UGC 10147	gx	16h03m16s	+05°38.5'		Ser	24"	mediocre / ottimo	debolissima e molto diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SSW; è allineata con 3 stelline relativamente brillanti situate a NW.
UGC 10150	gx	16h02m16s	+49°12.2'		Her	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 495x.
UGC 10151	gx	16h03m00s	+27°00.6'		CrB	16"	ottima / m. buono	è una debole bolla rotonda di aspetto molto regolare, diffusa e poco più brillante all' interno, con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono 3 stelline limitrofe a 1' verso W, a 1.5' N e infine a 1.5' SW — 380x.
UGC 10152	gx	16h02m42s	+41°11.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con **MCG+7-33-30** situata a ridosso E e dalla quale si separa facilmente a 450x; diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (o poco più) e di luminosità uniforme.
UGC 10153	gx	16h03m19s	+20°38.2'		Her	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"— 35"; meglio contrastata a 270x; c'è una stellina a ~ 1' verso SW.
UGC 10155	gx	16h03m02s	+39°38.7'		Ser	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"-50" — 380x.
UGC 10156	gx	16h02m50s	+47°13.5'		Her	24"	m. buona / discreto	è una debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione E-W e purtroppo molto disturbata dalla SAO 45863 di 5a grandezza situata un paio di primi a NW; c'è una stellina al bordo N e un'altra più debole a 1' scarso sempre a N; una appena percettibile si trova a 1' verso E (quest'ultima è allineata con altre due stelline più evidenti a E); una sorta di "nodulo" appare elusivamente a ridosso E della gx: si tratta di fatto di MCG+8-29-39 di cui però non riesco a capirne la forma — 450x.
UGC 10158	gx	16h03m55s	+11°43.7'		CrB	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 380x.
UGC 10162	gx	16h01m26s	+71°23.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15"; equidistante ma non esattamente allineata con una coppia di stelline a S; una terza stellina si trova a 1' NE — 450x.
UGC 10164	gx	16h04m28s	+14°46.9'		Ser	16"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare in visione distolta a 380x a 1' SW di una stellina; forse rotonda con Ø di 30"-35".
UGC 10166	gx	16h03m52s	+39°59.1'		Her	16"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 10167	gx	16h03m50s	+41°31.3'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
UGC 10168	gx	16h03m31s	+49°20.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	facile e relativamente brillante, molto diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso; presenta una piccola condensazione centrale molto evidente; si apprezza meglio scalando a 340x.
UGC 10169	gx	16h04m32s	+14°49.1'		Ser	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, estesa più o meno come UGC 10168; a 380x appare abbastanza chiaramente un nucleo di aspetto stellare — 380x.
UGC 10172	gx	16h04m47s	+14°17.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' scarso — 450x.
UGC 10176	gx	16h05m02s	+13°42.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da ENE a WSW ed estesa per oltre 1'; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N.
UGC 10181	gx	15h58m50s	+81°41.6'		UMi	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×15" e con bulge abbastanza evidente, anche se poco contrastato — 450x.
UGC 10183	gx	16h00m06s	+79°51.8'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; allineata con una coppia di stelline a SSW — 450x.
UGC 10184	gx	16h05m39s	+03°04.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti subito a S — 450x.
UGC 10187	gx	16h05m26s	+16°26.6'		Her	24"	ottima / buono	più debole e più piccola di MCG+3-41-95, dalla quale dista 1' scarso verso NW, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile — 340x.
UGC 10193	gx	16h05m45s	+16°12.2'		Her	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE e che in visione distolta appare estesa una 40-ina di secondi; presenta un nucleo stellare (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta al centro); situata verso il margine SE dell'ammasso **AGC 2152** — 450x.
UGC 10195	gx	16h05m52s	+18°13.2'		Her	16"	m. buona / discreto	è nella parte settentrionale di AGC 2151 — molto debole, ma visibile anche in visione diretta, molto allungata da NW a SE per almeno 1' e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 10200	gx	16h05m46s	+41°20.6'		Her	16"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di 40" e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
UGC 10201	gx	18h06m25s	+15°41.0'		Her	16"	ottima / m. buono	fa parte di un gruppo abbastanza nutrito di gx molto difficili a cavallo tra Ercole e Testa del Serpente — debole e molto diffusa, con piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare, rotonda con Ø di 40" — 380x.
UGC 10203	gx	16h06m54s	+03°47.6'		Ser	24"	m. buona / mediocre	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con bulge diffuso e poco contrastato — 450x.
UGC 10204	gx	16h06m42s	+16°19.1'		Her	24"	ottima / ottimo	brillante, diffusa e con bulge evidente, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una debole stellina a ridosso S; la SAO 101931 di 8ª grandezza situata 3' scarsi a NE non disturba gran che — 450x.
UGC 10205	gx	16h06m40s	+30°06.0'		CrB	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e poco più brillante all'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
UGC 10207	gx	16h06m43s	+31°53.7'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto debole, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; a tratti appare, a 380x, una tenuissima nucleo stellare.
UGC 10211	gx	16h07m07s	+22°03.6'		Ser	16"	ottima / m. buono	abbastanza facile da vedere, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" — 380x.
UGC 10213	gx	16h17m25s	+10°25.5'		Her	16"	buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme, diffuso e con Ø max di 35"-40" — 380x.
UGC 10214	gx	16h06m04s	+55°25.5'		Dra	16"	buona / mediocre	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 2'×30" e appena più brillante verso l'interno — 270x.
UGC 10216	gx	16h07m40s	+13°43.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stringa di 4 stelline allineate ed equidistanti a NW della gx — 450x.
UGC 10222	gx	16h01m25s	+81°52.0'		UMi	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo alone visibile in visione distolta attorno a una coppia di stelline distanti ~ 15" in direzione grosso modo E-W; a 380x l'alone appare leggermente decentrato verso N — 380x.
UGC 10224	gx	16h08m50s	+22°02.5'		Her	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; è meglio definita a 380x.
UGC 10225	gx	16h09m21s	+08°45.8'		Ser	16"	ottima / m. buono	debolissimo lucore molto stemperato sul fondo cielo, approssim. rotondo con Ø > 1'; è grosso modo allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a SW — 270x.
UGC 10226	gx	16h09m01s	+35°47.6'		CrB	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare abbastanza facilmente allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30", ma è preferibile scalare a 270x.
UGC 10231	gx	16h07m56s	+64°21.1'		UMi	24"	ottima / m. buona	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.

UGC 10234	gx	16h09m43s	+30°27.2'		CrB	16"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo abbastanza marcato di aspetto quasi stellare e un tenuissimo alone diffuso, probabilmente rotondo con Ø di 30"-35"; c'è un piccolo asterismo foggiato a croce subito a W — 380x.
UGC 10237	gx	16h04m46s	+79°37.8'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø 45"; c'è una debole stellina a poco più di 1' NE — 450x.
UGC 10238	gx	16h10m26s	+12°18.3'		Ser	16"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, orientata da E a W con dimensioni ~ 60"×30"; si vede senza problemi in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x.
UGC 10239	gx	16h10m26s	+12°49.5'		Ser	24"	ottima / buono	debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
UGC 10241	gx	16h09m48s	+42°20.0'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10243	gx	16h10m30s	+19°57.2'		Her	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 10244	gx	16h09m55s	+43°07.7'		Her	28"	m. buona / buono	relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 495x.
UGC 10249	gx	16h11m17s	+13°52.0'		Her	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" (estesa più o meno come la distanza della coppia di stelline situata un paio di primi a N); appare meglio definita scalando a 270x.
UGC 10252	gx	16h10m44s	+41°08.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", con piccolo bulge diffuso e contrastato; c'è una stellina molto debole subito a SE — 450x.
UGC 10255	gx	16h10m57s	+35°59.2'		CrB	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, leggermente condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina visibile a tratti a 45" SW; il campo è ricco di stelle brillanti — 380x.
UGC 10257	gx	16h11m08s	+38°15.0'		CrB	16"	m. buona / ottimo	è una debole lama di luce di luminosità uniforme ed estesa per oltre 1' che si diparte verso S da una stellina brillante — 380x.
UGC 10258	gx	16h11m26s	+29°21.1'		CrB	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata ~ da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 10260	gx	16h11m58s	+20°55.4'		Her	16"	m. buona / buono	debolissima, quasi elusiva, leggermente condensata, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
UGC 10261	gx	16h11m04s	+52°27.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40".
UGC 10262	gx	16h11m58s	+29°50.3'		CrB	16"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 40" e appena più brillante all'interno; a tratti, in visione distolta, appare un oggetto molto piccolo di 15" o 20" di Ø a meno di 1' verso SW: da un controllo effettuato successivamente, questo è risultato essere la **MAC 1611+2949** — 380x.
UGC 10264	gx	16h12m57s	−00°05.8'		Ser	16"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 10271	gx	16h11m30s	+58°47.1'		Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" — 450x.
UGC 10278	gx	16h12m19s	+49°24.0'		Her	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo il fatto che ogni tanto sembra di ravvisare qualche lieve discrepanza di luce; è allungata da N a S con dimensioni 45"×20" — 450x.
UGC 10279	gx	16h11m47s	+60°34.9'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; un nodulo di aspetto quasi stellare e appena percettibile che appare a ridosso NW è risultato essere la MAC 1611+6035 — 450x.
UGC 10280	gx	16h07m29s	+81°18.1'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare evidente; c'è una coppia di stelline brillante a 2.5' SSW — 450x.
UGC 10282	gx	16h12m58s	+32°30.7'		CrB	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni ~ 45"×30" — 380x.
UGC 10284	gx	16h12m00s	+61°10.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con bulge evidente, seppure poco contrastato; molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; una stellina debolmente sfocata appare facilmente anche in visione diretta quasi a ridosso SE: da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la **MAC 1612+6110** — 450x.
UGC 10287	gx	16h14m03s	+14°17.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	presenta una sorta di barra di 30"×10" orientata da NE a SW circonfusa da un alone poco allungato da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
UGC 10288	gx	16h14m25s	−00°12.4'		Ser	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce, più difficile di UGC 9977, osservata subito prima; solo in visione distolta appare a tratti nella sua interezza, orientata da E a W per oltre 3'; forse un po' meglio contrastata a 270x.
UGC 10296	gx	16h14m50s	+39°30.9'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una doppia stretta e sbilanciata quasi a ridosso W — 495x.
UGC 10297	gx	16h15m29s	+18°54.3'		Her	16"	ottima / m. buono	è una debolissima lama di luce estesa ~ 80" in direzione N-S e di luminosità uniforme; è meglio visibile scalando gli ingrandimenti a 270x il grande campo dell'oculare UWA non permette di tenere fuori campo la 16 Her arancione di magnitudo 5.7.
UGC 10298	gx	16h13m47s	+63°42.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina al bordo S — 450x.
UGC 10306	gx	16h16m43s	+00°14.8'		Ser	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30", con piccola e tenue nucleo stellare — 380x.
UGC 10310	gx	16h16m18s	+47°02.8'		Her	16"	discreta / buono	debole lucore di luminosità uniforme e di aspetto molto confuso ed estesa un paio di primi — 188x.
UGC 10312	gx	16h17m32s	+31°11.7'		CrB	16"	m. buona / ottimo	è un ovale molto debole, appena più brillante all'interno, diffuso, orientato da E a W con dimensioni 45"×30"; appare poco più contrastato a 270x.
UGC 10318	gx	16h16m18s	+64°06.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 10320	gx	16h18m07s	+21°04.0'		Her	16"	ottima / m. buono	debolissima, ma abbastanza compatta, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" (anche a 380x non si riesce a tenere fuori campo la SAO 84293 di 8ª situata a neppure 4' SE).
UGC 10322	gx	16h18m08s	+22°13.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 10327	gx	16h18m30s	+22°09.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina al bordo N che all'inizio ne confonde un po' la forma; meglio visibile a 450x.
UGC 10330	gx	16h18m12s	+40°05.7'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10331	gx	16h17m21s	+59°19.2'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×20" e con bulge diffuso, appena più contrastato del disco; c'è una stellina a 1' W e una molto debole a 1' verso SW; forma una coppia ravvicinata con CGCG298-27 subito a E — 450x.
UGC 10334	gx	16h17m16s	+63°51.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 10335	gx	16h19m12s	+16°39.0'		Her	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 10337	gx	16h19m28s	+07°16.7'		Her	16"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso verso N; un paio di primi a WSW, proseguendo quindi lungo l'asse della gx, ce n'è un'altra di eguale luminosità — 380x.
UGC 10339	gx	16h20m08s	+02°00.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 10341	gx	16h18m40s	+60°48.5'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare rotonda con Ø grosso modo di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1.5' SSW — 495x.
UGC 10344	gx	16h19m45s	+38°14.1'		Her	16"	m. buona / ottimo	abbastanza facile, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×45", diffusa e con nucleo stellare visibile a momenti (non è riportata sull'Uranometria: situata 27' NW di NGC 6129) — 270x.
UGC 10349	gx	16h20m54s	+40°06.3'		Her	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×40" con nucleo stellare visibile a tratti — 380x.
UGC 10351	gx	16h21m28s	+28°38.5'		CrB	16"	buona / discreto	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme; a 380x appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30".
UGC 10354	gx	16h21m22s	+40°48.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
UGC 10357	gx	16h22m00s	+40°26.8'		Her	28"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SE — 495x.
UGC 10360	gx	16h23m11s	+16°56.0'		Her	16"	discreta / buono	piccolo oggetto molto debole di dimensioni 40"×30", orientato da E a W e con condensazione centrale visibile a tratti a 270x.
UGC 10361	gx	16h22m10s	+57°16.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da NE a SW, dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale rotonda con Ø, poco contrastata sul disco — 450x.
UGC 10362	gx	16h22m56s	+39°47.5'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, assai stemperata sul fondo cielo e di aspetto un po' confuso; dovrebbe comunque essere estesa ~ 1'; c'è una stellina a 1.5 SW; una stellina brillante si trova 4' verso W — 380x.
UGC 10367	gx	16h23m17s	+39°55.2'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, rotonda, diffusa di luminosità uniforme con Ø > di 1', facilmente visibile in visione distolta — 380x.
UGC 10368	gx	16h20m33s	+73°51.9'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×25" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' NW e un'altra abbastanza brillante alla stessa distanza verso SW (quest'ultima è la più occidentale di 3 stelline allineate con la stessa luminosità) — 450x.
UGC 10370	gx	16h23m35s	+45°44.7'		Her	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a 1' SE — 495x.
UGC 10372	gx	16h24m12s	+30°09.7'		CrB	16"	buona / discreto	è debolissima e di luminosità uniforme, ma si riesce a catturare abbastanza facilmente a 380x; appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una doppia stretta a 3' SSW.
UGC 10373	gx	16h24m42s	+07°10.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 10374	gx	16h23m39s	+50°58.2'		Her	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco più brillante all'interno e con nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
UGC 10375	gx	16h24m50s	+09°36.4'		Her	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole, orientata da NW a SE ed estesa 1' scarso: appare facilmente in visione distolta 1.5' a S di una stellina brillante — 450x.
UGC 10378	gx	16h16m01s	+84°00.9'		UMi	24"	buona / ottimo	debolissimo batuffolo molto diffuso, forse rotondo con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare con una certa difficoltà tra una coppia di stelline brillanti a WNW e una stellina di luminosità simile a SSE — 450x.
UGC 10380	gx	16h25m50s	+16°34.6'		Her	24"	buona / m. buono	molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×15" (praticamente una edge-on), poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a ridosso verso N — 450x.
UGC 10381	gx	16h25m26s	+39°52.2'		Her	16"	buona / ottimo	è un debole ovale di 60"×30" orientato da E a W, molto diffuso alle 2 estremità E e W e con piccolo bulge visibile a tratti; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 380x.
UGC 10383	gx	16h24m43s	+64°30.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; non sembra granché più contrastata scalando a 340x.
UGC 10384	gx	16h26m47s	+11°34.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce, molto affusolata alle estremità, orientata da E a W, estesa per 1' e poco più brillante all'interno — 450x.
UGC 10386	gx	16h27m20s	+01°55.3'		Oph	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa per oltre 1' in direzione NE-SW; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10387	gx	16h27m14s	+12°58.7'		Her	24"	ottima / buono	debolissima chiazza forse circolare con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme, situata a ridosso N di una stellina — 450x.
UGC 10388	gx	16h27m03s	+16°22.9'		Her	24"	buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con bulge diffuso abbastanza contrastato; c'è una debole stellina a ridosso NW, mentre un'altra brillante si trova a 1.5' NE — 450x.
UGC 10389	gx	16h26m37s	+39°07.6'		Her	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" (situata verso la parte SW dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
UGC 10392	gx	16h26m41s	+45°36.4'		Her	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a 1' verso S — 495x.
UGC 10394	gx	16h27m50s	−01°45.8'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto debole e molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina subito a W — 450x.
UGC 10395	gx	16h25m05s	+70°11.1'		UMi	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo circolare con Ø di 45"; nel campo sono presenti alcune stelline brillanti: una di queste si trova un paio di primi a W della gx; 3' a S c'è una doppia stretta e sbilanciata; meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 10398	gx	16h28m10s	+17°38.5'		Her	24"	ottima / buono	debolissima, ma appare senza grandi difficoltà in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
UGC 10399	gx	16h27m17s	+48°08.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi con piccola condensazione quasi stellare evidente; c'è una doppia stretta a ridosso NE — 450x.
UGC 10402	gx	16h28m41s	+12°45.8'		Her	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E — 450x.
UGC 10404	gx	16h28m12s	+39°49.3'		Her	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45" (fa parte dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
UGC 10405	gx	16h28m54s	+17°53.5'		Her	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø < 1' e solo a tratti leggermente condensata; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline subito a SE i cui cateti sono disposti lungo le direzioni N-S ed E-W — 270x.
UGC 10406	gx	16h29m16s	+03°06.9'		Oph	24"	buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE estesa almeno 1' — 450x.
UGC 10407	gx	16h28m28s	+41°13.1'		Her	28"	ottima / ottimo	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; presenta qualche lieve irregolarità di luce verso S (fa parte di un piccolo gruppo appartenente all'ammasso **AGC 2197**) — 495x.
UGC 10410	gx	16h29m03s	+25°42.8'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30", con piccola e tenue condensazione centrale — 380x.
UGC 10411	gx	16h27m49s	+62°41.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 10412	gx	16h29m36s	+15°39.5'		Her	24"	buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge ben contrastato sul disco — 450x.
UGC 10413	gx	16h29m27s	+21°20.2'		Her	16"	m. buona / m. buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo; solo a tratti appare decisamente allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; è situata a ridosso verso E di un piccolo arco di 3 stelline equidistanti — 380x.
UGC 10414	gx	16h29m47s	+08°38.6'		Her	24"	buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale appena percettibile — 450x.
UGC 10415	gx	16h29m00s	+41°17.0'		Her	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
UGC 10416	gx	16h30m20s	+08°37.7'		Her	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; si trova all'interno di un triangolo isoscele di stelline brillante — 450x .
UGC 10417	gx	16h29m41s	+40°41.2'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — è una lama di luce molto debole, orientata da NW a SE ed estesa una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
UGC 10418	gx	16h26m53s	+74°53.3'		UMi	16"	ottima / discreto	debolissimo oggetto rotondo, relativamente compatto, con Ø di 15" o 20" e che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
UGC 10420	gx	16h29m51s	+39°46.0'		Her	16"	buona / ottimo	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — è molto stemperata sul fondo cielo, probabilmente rotonda con Ø di 80" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 10423	gx	16h29m54s	+41°36.3'		Her	16"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, estesa non più di 30", visibile solo a tratti in visione distolta; è situata sul prolungamento orientale di 2 stelline brillanti distanti 4' e orientate da E a W — 270x.
UGC 10426	gx	16h30m50s	+16°15.0'		Her	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso E e NE (quest'ultima è appena percettibile) — 450x.
UGC 10427	gx	16h30m19s	+41°06.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con basso gradiente di luce — 450x.
UGC 10429	gx	16h30m33s	+39°49.8'		Her	16"	buona / ottimo	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — è un debole oggetto rotondo, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 30" — 380x.
UGC 10430	gx	16h30m27s	+41°29.0'		Her	16"	m. buona / buono	situata all'estremità NE del nutrito ammasso **AGC 2197** — molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, ma poco più visibile di UGC 10429; è estesa ~ 40" e si nota in visione distolta a un paio di primi S di una debole stellina — 270x.
UGC 10432	gx	16h30m39s	+41°12.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10435	gx	16h31m22s	+22°41.8'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di 30"-35", poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso NW — 380x.
UGC 10436	gx	16h31m04s	+41°09.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
UGC 10437	gx	16h31m08s	+43°20.9'		Her	28"	m. buona / ottimo	debole chiazza molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso W — 495x.
UGC 10438	gx	16h26m13s	+81°25.8'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina quasi a ridosso S e un minuscolo triangolo serrato di stelline subito a SE — 450x.
UGC 10441	gx	16h33m11s	−00°12.8'		Oph	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare abbastanza facilmente orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 10445	gx	16h33m48s	+28°59.1'		Her	16"	buona / ottimo	debolissimo chiarore osservabile in visione distolta a 270x, appena più evidente del fondo cielo; è di forma indistinta, ma grosso modo rotonda con Ø di 1.5'; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
UGC 10447	gx	16h28m15s	+80°21.3'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; il campo è ricco di stelline brillanti fra le quali spicca un piccolo asterismo irregolare di 4 componenti capeggiato dalla SAO 2729 di 9ª grandezza e situato 6' a SE della gx — 450x.
UGC 10449	gx	16h32m45s	+62°40.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità uniforme; appare in visione distolta, ma è meglio restare a 450x.
UGC 10454	gx	16h33m50s	+56°08.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina situata a S; è situata all'interno di un trapezio molto schiacciato e orientato come la galassia formato da 4 stelline di luminosità simile — 450x.
UGC 10456	gx	16h34m15s	+52°56.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; poco meglio definita scalando a 340x; c'è la SAO 29991 di 9ª grandezza a un paio di primi W che disturba un po' l'osservazione.
UGC 10457	gx	16h34m46s	+45°19.3'		Her	28"	ottima / buono	debole chiazza rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina al bordo W — 495x.
UGC 10463	gx	16h36m20s	+10°21.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 10464	gx	16h28m29s	+82°53.6'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a ridosso W; forma una coppia ravvicinata con MCG+14-8-7 situata a SE (v. voce corrispondente) — 450x.
UGC 10465	gx	16h36m46s	+01°40.7'		Ser	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 380x.
UGC 10466	gx	16h32m25s	+76°44.4'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", con piccola e tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a ridosso N; poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 10471	gx	16h30m43s	+81°32.7'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
UGC 10473	gx	16h36m54s	+36°25.4'		Her	16"	ottima / buono	è un ovale abbastanza regolare, orientato da N a S, di dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; meglio osservabile a 270x.
UGC 10474	gx	16h37m50s	−01°22.0'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, poco più luminosa all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"× 30"; c'è una stellina a ridosso del bordo orientale e un'altra quasi a ridosso verso NW — 450x.
UGC 10476	gx	16h35m28s	+68°32.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
UGC 10477	gx	16h37m34s	+37°17.2'		Her	16"	buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce, di luminosità uniforme che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non superare i 270x, orientata da N a S ed estesa oltre 1'; è situata tra 2 stelline brillanti (facenti parte di un trapezio irregolare) che ne disturbano la visione.
UGC 10478	gx	16h35m44s	+68°25.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 45"; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 450x.
UGC 10480	gx	16h37m30s	+44°08.7'		Her	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; non riesco a capire se presenta un nucleo stellare o se c'è una stellina a ridosso — 270x.
UGC 10481	gx	16h37m07s	+54°55.1'		Dra	16"	buona / mediocre	debolissima, molto diffusa, forse rotonda con Ø di ~ 30"; appare solo in visione distolta — 270x.
UGC 10483	gx	16h34m29s	+76°01.8'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline di diversa luminosità a SSW (quella più a S è brillante); meglio definita scalando a 340x.
UGC 10486	gx	16h34m24s	+50°20.8'		Her	16"	m. buona / m. buono	facile, rotonda, con alto gradiente, relativamente compatta con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
UGC 10487	gx	16h37m44s	+49°26.7'		Her	28"	ottima / buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina a 1' NE — 495x.
UGC 10488	gx	16h38m09s	+39°55.1'		Her	28"	m. buona / ottimo	diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con basso gradiente di luce — 495x.
UGC 10490	gx	16h38m50s	+17°21.3'		Her	16"	m. buona / ottimo	debolissima bolla circolare di luminosità uniforme e Ø di 45" situata sull'ipotenusa di un piccolo triangolo di stelline molto deboli (una presunta stellina a ridosso NW non sono riuscito a vederla) — 380x.
UGC 10491	gx	16h38m14s	+41°56.4'	q 80	Her	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; appare maggiormente "sfilacciata" verso W e a tratti presenta una tenue concavità verso S. Forma una coppia ravvicinata con **PGC 58674** situata a ridosso S; quest'ultima è molto piccola (a prima vista è di aspetto stellare), compatta e condensata, con dimensioni di 10"-12" — 495x.
UGC 10492	gx	16h39m23s	−02°24.3'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso NE — 450x.
UGC 10493	gx	16h38m00s	+55°25.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 10495	gx	16h39m26s	+07°17.1'		Her	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso N — 450x.
UGC 10497	gx	16h36m48s	+72°24.2'		Dra	16"	ottima / discreto	debole, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con bulge diffuso poco più evidente del disco — 270x.
UGC 10499	gx	16h39m27s	+49°02.5'		Her	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 495x.
UGC 10500	gx	16h39m00s	+57°43.5'		Dra	16"	buona / ottimo	facile, poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con Ø di 45" — 270x.
UGC 10502	gx	16h37m38s	+72°22.4'		Dra	16"	ottima / discreto	diffusa chiazza approssim. rotonda con Ø di oltre 1', di luminosità uniforme e molto stemperata sul fondo cielo — 270x.
UGC 10504	gx	16h40m23s	+33°40.8'		Her	16"	ottima / buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 50"×30" e con tenue condensazione centrale; è poco più contrastata a 270x.
UGC 10505	gx	16h41m30s	−00°06.5'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10509	gx	16h37m15s	+78°08.0'		UMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; è situata tra 2 deboli stelline distanti 2.5' e orientate da NNW a SSE — 450x.
UGC 10510	gx	16h40m31s	+58°05.5'		Her	16"	buona / ottimo	è un debole lucore esteso per meno di 1', di forma indistinta, situata all'interno di un piccolo triangolo ottusangolo di stelline brillanti la cui luce disturba la visione — 270x.
UGC 10511	gx	16h41m15s	+51°11.1'		Her	24"	m. buona / discreto	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge poco contrastato — 450x.
UGC 10512	gx	16h41m47s	+39°59.1'		Her	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un piccolo nucleo brillante; c'è una stellina a ridosso NE — 495x.
UGC 10513	gx	16h42m51s	+00°38.3'		Oph	24"	buona / ottimo	debolissima, appare con un certa difficoltà in visione distolta, ma solo a tratti sembra allungata da N a S con dm grosso modo 40"×20"; c'è un piccolo asterismo di 5 stelle abbastanza brillanti subito a S — 450x.
UGC 10514	gx	18h42m24s	+25°05.1'		Her	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 380x.
UGC 10515	gx	16h41m06s	+19°49.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 340x.
UGC 10517	gx	16h41m09s	+61°19.6'		Dra	16"	ottima / discreto	abbastanza facile, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; presenta un bulge evidente e nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
UGC 10518	gx	16h41m07s	+62°24.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; meglio contrastata scalando a 340x, ma così non si riesce a tenere fuori campo la SAO 17187 di magnitudo 6.5 situata 5.5' a S.
UGC 10519	gx	16h40m52s	+65°47.4'		Dra	16"	ottima / discreto	relativamente facile e compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
UGC 10520	gx	16h42m40s	+47°56.4'		Her	28"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza forse circolare estesa una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1.5' verso S — 495x.
UGC 10522	gx	16h42m02s	+61°50.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a 1' verso SE — 450x.
UGC 10528	gx	16h44m49s	+22°31.3'		Her	16"	m. buona / m. buono	è un alone molto tenue che circonda una stellina brillante; questa appare leggermente decentrata verso SW; a 380x sembra addirittura sdoppiarsi; che si tratti del nucleo della gx a ridosso di essa? Un baffo appena più evidente del disco corre lungo l'asse della galassia.
UGC 10535	gx	16h46m01s	+06°27.7'		Her	24"	buona / ottimo	diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una debolissima stellina quasi a ridosso SE e un'altra poco più distante a W, ma quest'ultima si vede solo a momenti — 450x.
UGC 10536	gx	16h44m06s	+62°05.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina subito a N — 450x.
UGC 10539	gx	16h45m02s	+58°02.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce che in visione distolta appare estesa 40"-45" e orientata da N a S; una coppia di stelle brillanti a NE (tra cui la SAO 30078 di 8ª grandezza) disturba l'osservazione — 495x.
UGC 10544	gx	16h46m41s	+36°05.4'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare visibile a momenti, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 495x.
UGC 10545	gx	16h46m53s	+34°24.6'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, solo a tratti in visione distolta appare allungata grosso modo da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole un paio di primi a NE; meglio osservabile a 270x (a 380x si stempera troppo).
UGC 10547	gx	16h46m57s	+34°09.3'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e molto allungata da N a S, con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 10548	gx	16h45m52s	+59°37.3'		Dra	16"	buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da NNW a SSE (l'asse della gx è grosso modo perpendicolare alla congiungente delle 2 stelline situate a NE e a W: quella a W è più luminosa), con dimensioni 60"×40"; presenta un bulge poco più brillante del disco e un piccolo nucleo che appare a tratti a 380x.
UGC 10550	gx	16h47m02s	+40°08.6'		Her	28"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina brillante a 2' NE e una coppia di stelline appena percettibili alla stessa distanza verso NW — 495x.
UGC 10552	gx	16h42m55s	+78°23.8'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono due stelline appena percettibili, a 1' SSE e 1' SSW; una doppia stretta si trova a 3' SSW — 450x.
UGC 10553	gx	16h47m15s	+40°14.7'		Her	28"	ottima / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 495x.
UGC 10554	gx	16h48m21s	−01°37.1'		Oph	24"	buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NNW a SSE, estesa ~ 1' e praticamente delimitata da 2 stelline orientate nella stessa direzione — 450x.
UGC 10561	gx	16h45m36s	+62°49.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole lama di luce estesa 2' scarsi e orientata da NW a SE; poco disturbata dalla SAO 17214 (un paio di primi a W) e SAO 17219 (stessa distanza a SE) di 9ª e 8ª grandezza rispettivamente; resta tuttavia meglio contrastata scalando a 340x; ci sono due stelline subito a SW e a NE della galassia.
UGC 10562	gx	16h44m37s	+75°44.4'	q 11	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 10565	gx	16h48m21s	+48°44.2'		Her	28"	ottima / buono	debolissima chiazza molto diffusa, di forma grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono 2 deboli stelline quasi a ridosso S ed E — 495x.
UGC 10566	gx	16h49m02s	+36°11.5'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, solo a tratti in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 380x.
UGC 10567	gx	16h49m10s	+36°13.5'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 2 stelline molto deboli, una a 1' NE e l'altra a 1.5' verso E — 380x.
UGC 10569	gx	16h50m00s	+09°26.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	appare con difficoltà in quanto immersa nei bagliori della SAO 121893 di 6ª grandezza; occorre spingere a 580x e in tal caso si riesce a capire facilmente che si tratta di una lama di luce estesa per 1' e orientata da NW a SE.
UGC 10571	gx	16h49m14s	+48°37.4'		Her	28"	ottima / buono	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale appena percettibile; ci sono 3 stelline a W leggermente arcuate in direzione N-S — 495x.
UGC 10578	gx	16h51m23s	−02°27.2'		Oph	24"	buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, appare facilmente in visione distolta, meglio a 340x; molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"
UGC 10579	gx	16h49m56s	+53°57.2'		Dra	28"	m. buona / ottimo	brillante, diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" c'è una doppia serrata a 1' verso E; tra questa e la gx notasi una stellina appena percettibile — 495x.
UGC 10583	gx	16h50m15s	+53°33.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; meglio definita scalando a 340x.
UGC 10585	gx	16h51m29s	+19°25.0'		Her	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, con debole nucleo stellare, molto allungata da NW a SE e di dimensioni 45"×15" — 380x.
UGC 10586	gx	16h50m48s	+45°24.1'		Her	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, probabilmente rotonda con Ø < 1'; per localizzarla senza difficoltà è sufficiente appoggiare lo sguardo su un piccolo triangolo situato subito a N — 270x.
UGC 10587	gx	16h49m03s	+68°45.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 10589	gx	16h50m23s	+55°50.3'		Dra	28"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, a tratti debolmente screziata, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30"; una stella di 11-esima situata a 1' N disturba un po' l'osservazione; una stellina debole si trova alla stessa distanza verso W — 495x.
UGC 10590	gx	16h50m57s	+59°43.1'		Dra	28"	ottima / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; situata tra una stellina abbastanza brillante a S e una più debole a N — 495x.
UGC 10593	gx	16h52m19s	+55°54.3'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×30" e con nucleo stellare poco contrastato; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
UGC 10594	gx	16h52m49s	+51°03.7'		Her	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; una stellina sfuocata appena percettibile situata quasi a ridosso NE è in realtà la **PGC 214550** — 495x.
UGC 10596	gx	16h54m16s	+10°27.0'		Oph	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
UGC 10599	gx	16h53m52s	+39°45.4'		Her	16"	m. buona / buono	facile, relativamente brillante, nucleo marcato, rotonda con Ø di 45" — 270x.
UGC 10601	gx	16h53m34s	+54°34.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, che in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10602	gx	16h54m22s	+41°20.1'		Her	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE — 495x.
UGC 10610	gx	16h54m59s	+43°03.6'		Her	28"	m. buona / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1' NW. Forma una coppia ravvicinata con **MCG+7-35-5** situata a ridosso ESE — 495x.
UGC 10611	gx	16h55m10s	+36°54.4'		Her	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con nucleo molto tenue; è disturbata da una coppia di stelline brillanti a ridosso E — 495x.
UGC 10614	gx	16h54m33s	+65°18.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme approssim. circolare con Ø 40"-45"; sembra tutto sommato meglio evidente a 450x.
UGC 10615	gx	16h56m10s	+34°50.2'		Her	28"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 495x.
UGC 10622	gx	16h54m52s	+70°26.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	appare facilmente in visione distolta, ma è molto disturbata dalla SAO 8657 di 7a grandezza situata ad appena 2.5' verso NW; molto allungata da E a W ed estesa ~ 1' — 450x.
UGC 10623	gx	16h57m52s	+02°29.8'		Oph	24"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a 340x a ~ 1' N di una debole stellina.
UGC 10626	gx	16h56m35s	+58°01.7'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole e diffusa, grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi e piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una debole stellina subito a S — 495x.
UGC 10631	gx	16h57m53s	+36°24.5'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; situata tra 2 stelline brillanti orientate come la gx (quella a NNW è in realtà una coppia sbilanciata) — 495x.
UGC 10635	gx	16h57m53s	+36°24.5'		Her	16"	buona / ottimo	è un debolissimo alone rotondo di 30" di Ø che circonda una stellina brillante (quest'ultima fa parte di un vistoso asterismo di 6 componenti): quella situata a ~ 4' NW, poco più luminosa, ne è privo — 380x.
UGC 10636	gx	16h56m20s	+70°26.9'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è una piccola chiazza elusiva e di forma indistinta, estesa sì e no una 20-ina di secondi e situata a ridosso N di una stellina — 450x.
UGC 10639	gx	16h59m08s	+28°59.5'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, osservabile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, poco allungata grosso modo da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N.
UGC 10640	gx	16h59m46s	+02°30.6'		Oph	24"	buona / m. buono	appare solo in visione distolta a 340x, debolissima e diffusa, orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso W.
UGC 10644	gx	16h58m36s	+54°52.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una doppia brillante stretta e molto sbilanciata a 1.5' verso S che disturba un po' l'osservazione — 450x.
UGC 10646	gx	16h58m27s	+59°07.2'		Dra	24"	m. buona / m. buono	diffusa, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×20" e con nucleo stellare evidente — 450x.
UGC 10648	gx	16h58m33s	+59°45.3'		Dra	28"	ottima / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso SE; una coppia di stelline appena percettibili si trova 1.5' a W, ma quella più esterna, visibile solo a momenti, è risultata essere la **PGC 2593785** — 495x.
UGC 10650	gx	17h00m15s	+23°06.7'	q 157	Her	16"	discreta / m. buono	debolissima! Solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da N a S per oltre 1' e con un nucleo appena percettibile di aspetto quasi stellare (erroneamente riportata sull'Uranometria come NGC 6276) — 270x.
UGC 10653	gx	17h00m15s	+27°35.0'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 40"; c'è una debole stellina a 1' SE e un'altra appena percettibile diametralmente opposta; meglio osservabile a 270x.
UGC 10654	gx	17h00m35s	+29°43.5'		Her	16"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso del bordo SW — 270x.
UGC 10655	gx	16h59m36s	+56°04.1'		Dra	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 495x.

UGC 10658	gx	17h00m52s	+28°01.3'		Her	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MAC 1700+2801B situata a meno di 2' W — sono 2 debolissimi oggetti rotondi molto piccoli e condensati, di aspetto uguale e di 20" di Ø; appaiono abbastanza facilmente, ma occorre spingere a 380x.
UGC 10659	gx	17h01m27s	+06°55.6'		Oph	24"	m. buona / discreto	molto debole e di aspetto confuso, immersa in un campo ricco di stelline brillanti; a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×30" — 450x.
UGC 10662	gx	17h01m30s	+30°10.0'		Her	16"	m. buona / buono	è poco più brillante di UGC 10663, osservata per prima e situata 9.5 più a N; è diffusa e dimensioni simili, ma con piccola ed evidente condensazione centrale — 270x.
UGC 10663	gx	17h01m29s	+30°19.5'		Her	16"	m. buona / buono	rotonda, di luminosità uniforme, relativamente compatta con Ø di ~ 40"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 270x.
UGC 10666	gx	17h02m14s	+30°44.4'		Her	16"	m. buona / buono	debolissima e stemperata sul fondo cielo, estesa ~ 1', ma di aspetto un po' confuso — 270x.
UGC 10668	gx	17h02m16s	+30°42.2'		Her	16"	m. buona / buono	poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ~ 1' verso N — 270x.
UGC 10672	gx	17h03m21s	+24°56.1'		Her	16"	buona / buono	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con bulge diffuso e poco contrastato sul disco; meglio osservabile a 270x.
UGC 10673	gx	17h03m02s	+29°52.4'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina al bordo WSW — 380x.
UGC 10674	gx	17h03m40s	+09°17.8'		Oph	24"	m. buona / ottimo	si riesce a osservare solo il bulge molto tenue situato a ridosso E di una stellina brillante; è orientato da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; la gx è tuttavia molto più estesa, anche se le parti esterne non sono visibili — 450x.
UGC 10677	gx	17h03m31s	+36°25.1'		Her	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di 30", poco più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 380x.
UGC 10678	gx	17h03m58s	+24°10.9'		Her	16"	buona / buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di 30" e piccola condensazione centrale; situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele di stelline deboli — 380x.
UGC 10680	gx	17h03m11s	+51°22.0'		Dra	28"	ottima / buono	è un ovale diffuso con basso gradiente di luce, orientato da E a W con dimensioni 60"×30" — 495x.
UGC 10685	gx	17h04m51s	+12°55.5'		Her	16"	discreta / buono	debolissima, appare solo in visione distolta, ma è si aspetto confuso; non sembra più estesa di 35" o 40" — 270x.
UGC 10686	gx	17h04m59s	+41°56.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15", con bulge diffuso, evidente, ma poco contrastato — 450x.
UGC 10687	gx	17h03m28s	+59°43.5'		Dra	28"	ottima / buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare con gran fatica perché situata quasi a ridosso ESE della SAO 30227 di 10ª grandezza che ne offusca la visione — 495x.
UGC 10688	gx	17h04m43s	+34°33.5'		Her	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva gx forse rotonda con Ø di ~ 45"; appare solo a tratti, ma occorre scalare a 188x.
UGC 10692	gx	17h05m28s	+23°09.2'		Her	16"	buona / buono	debolissima, a prima vista di aspetto indistinto, mentre in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge appena accennato; c'è una stellina subito a NW — 270x.
UGC 10693	gx	17h04m53s	+41°51.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 80"×60", con bulge evidente e contrastato; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10695	gx	17h05m06s	+43°02.6'		Her	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 45" — 495x.
UGC 10697	gx	17h02m44s	+72°53.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante un paio di primi a W (che in pratica è la più luminosa di un piccolo triangolo) — 450x.
UGC 10699	gx	17h06m19s	+10°22.4'		Oph	24"	m. buona / discreto	rotonda con Ø di ~ 30", poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, a tratti debolmente screziata verso la periferia — 450x.
UGC 10702	gx	17h06m36s	+24°46.5'		Her	16"	m. buona / buono	molto debole, rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e con Ø ~ 40"; c'è una doppia stretta appena percettibile a 1.5' SE — 380x.
UGC 10704	gx	17h01m49s	+79°02.3'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale poco contrastata; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 10705	gx	17h07m12s	+11°25.3'		Oph	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E — 450x.
UGC 10706	gx	17h06m28s	+38°21.8'		Her	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 40"×20" — 380x.
UGC 10708	gx	17h06m46s	+35°39.5'		Her	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, a tratti molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso N e un'altra appena percettibile a S; la gx è meglio visibile scalando a 270x.
UGC 10710	gx	17h06m52s	+43°07.3'		Her	28"	ottima / m. buono	debole lama di luce estesa oltre 1', orientata da NW a SE, con tenue bulge diffuso che corre lungo l'asse della gx; c'è una debole stellina subito a E — 495x.
UGC 10713	gx	07h04m34s	+72°26.8'		Dra	16"	ottima / discreto	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme — 270x.
UGC 10715	gx	17h07m27s	+31°14.9'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 40" (a tratti sembra d'intravvedere qualcosa all'interno verso W); c'è una stellina quasi a ridosso W — 380x.
UGC 10717	gx	17h08m05s	+26°22.7'		Her	16"	buona / buono	debolissima, quasi elusiva. Probabilmente rotonda con Ø max di 30"; c'è una stellina a 1' verso S — non posso andare oltre i 270x a causa del vento!.
UGC 10720	gx	17h08m39s	+09°35.3'		Oph	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso SE — 450x.
UGC 10721	gx	17h08m25s	+25°31.0'		Her	16"	m. buona / m. buono	facile, allungata d E a W, di dimensioni 80"×40" e a prima vista di luminosità uniforme; osservando attentamente a 380x mostra un bulge rotondo, diffuso appena più brillante del disco.
UGC 10722	gx	17h08m19s	+42°57.4'		Her	28"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 495x.
UGC 10726	gx	17h04m27s	+78°38.4'		UMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; appare facilmente in visione distolta a 450x.
UGC 10728	gx	17h09m25s	+22°12.8'		Her	16"	buona / buono	debolissimo lucore di forma indistinta che aggetta dalla più brillante di una coppia di stelline di luminosità diseguale e distanti 30"; a tratti appare una condensazione centrale "staccata" dalla stella, ma l'alone non riesco a capire com'è orientato; 285x per tener fuori campo la SAO 84877 di magnitudo 7.
UGC 10731	gx	17h08m10s	+63°37.9'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è praticamente "nascosta" dietro una stellina brillante; in visione distolta sembra rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; un tenue rinforzo dell'alone appare a tratti verso S — 450x.
UGC 10732	gx	17h09m42s	+36°24.9'		Her	16"	buona / discreto	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a un paio di primi NW di una stellina brillante; forse rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
UGC 10733	gx	17h10m05s	+32°20.0'		Her	16"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e poco diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; è situata a ridosso verso N di una stellina brillante; meglio visibile a 380x.
UGC 10734	gx	17h06m06s	+77°07.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	è una sorta di piccolo e debole lucore approssim. circolare che aggetta a NE di una stellina molto brillante; in visione distolta non sembra comunque più estesa di 20" — 450x.
UGC 10736	gx	17h08m05s	+69°27.8'	q 29	Dra	24"	m. buona / ottimo	è un'estesa chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30" od 80"×40" (è difficile stabilirlo); la parte centrale è appena più evidente; c'è una stellina a ridosso E; la visione migliore si ottiene scalando a 210x.
UGC 10738	gx	17h11m06s	+05°51.1'		Oph	24"	buona / ottimo	è una lama di luce molto debole orientata da NE a SW ed estesa per ~ 1'; presenta un tenue bulge diffuso appena più brillante; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 450x.
UGC 10740	gx	16h53m29s	+86°35.5'		UMi	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale; sembra poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 10743	gx	17h11m31s	+07°59.7'		Oph	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, ma di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 10749	gx	17h12m14s	+30°10.1'		Her	16"	ottima / ottimo	debolissima, a tratti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni di almeno 40"×20", ma questo si apprezza meglio scalando a 270x; c'è una stellina a 1' verso S.
UGC 10754	gx	17h12m13s	+46°32.1'		Her	24"	m. buona / discreto	debolissima e "annegata" nel bagliore della SAO 46567 di 9a grandezza situata quasi a ridosso E; appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20" — 450x.
UGC 10758	gx	17h12m15s	+53°07.2'		Dra	28"	ottima / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' E e una brillante 1.5' verso SE — 495x.
UGC 10759	gx	17h12m48s	+42°48.9'		Her	16"	m. buona / ottimo	presenta una condensazione centrale abbastanza marcata e stellare circonfuso da una alone rotondo poco diffuso che a 380x, in visione distolta, sembra poco più esteso della distanza della doppia situata a N.
UGC 10760	gx	17h12m48s	+44°09.6'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso S — 450x.
UGC 10765	gx	17h13m25s	+42°53.9'		Her	16"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1' — 380x.
UGC 10767	gx	17h11m01s	+73°36.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10770	gx	17h13m07s	+59°19.3'		Dra	16"	buona / ottimo	è una debolissima chiazza di luminosità uniforme che in visione distolta sembra a tratti di aspetto un po' irregolare; a 270x appare allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×30".
UGC 10774	gx	17h14m09s	+58°49.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline subito a E (inizia ad albeggiare) — 495x.
UGC 10775	gx	17h16m05s	+06°50.4'		Oph	16"	discreta / buono	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina a ridosso verso N — 270x.
UGC 10778	gx	17h16m24s	+06°33.6'		Oph	16"	discreta / buono	debole oggetto rotondo con Ø di ~ 40", con piccola e tenue condensazione centrale visibile a 270x.
UGC 10779	gx	17h16m31s	+06°25.9'		Oph	16"	discreta / buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 270x; c'è una stellina a 1' verso SE; dovrebbe avere un nucleo puntiforme, a meno che non si tratti di una debolissima stellina sovrapposta (questa gx è stata successivamente riosservata in migliori condizioni di visibilità: era sempre debolissima, ma in visione distolta appariva orientata da E a W con dimensioni 60"×20".
UGC 10781	gx	17h16m11s	+31°47.5'		Her	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma a 380x appare abbastanza facilmente in visione distolta; è di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni ~ 40"×20" — 380x.
UGC 10785	gx	17h16m26s	+37°20.7'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×20", con bulge esteso molto tenue e appena più brillante del disco — 380x.
UGC 10789	gx	17h17m45s	+07°36.8'		Oph	24"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce situato praticamente a cavallo di una stellina; è estesa una 40-ina di secondi e orientata da N a S; un'altra stellina poco più debole si trova a SE — 450x.
UGC 10791	gx	17h14m39s	+72°23.9'		Dra	24"	buona / ottimo	debolissima, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme — meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10793	gx	17h18m25s	+10°56.3'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; la visione è disturbata dalla SAO 102725 di 5ª grandezza situata ad appena 5' SSE — 450x.
UGC 10796	gx	17h16m48s	+61°55.2'		Dra	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa, forse rotonda con Ø di ~ 40"; si vede in visione distolta a 270x.
UGC 10797	gx	17h18m54s	+08°26.4'		Oph	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina subito a NNW — 450x.
UGC 10802	gx	17h19m33s	+11°12.4'		Oph	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e con condensazione centrale marcata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a ridosso di NW; la gx non sembra particolarmente disturbata dalla SAO 102738 di magnitudo 7.7 situata ad appena 4.5' SW — 450x.
UGC 10803	gx	17h16m05s	+73°26.2'		Dra	16"	ottima / discreto	abbastanza brillante ma con basso gradiente, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
UGC 10805	gx	17h19m51s	+14°24.0'	q 202	Her	24"	buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; a tratti sembra grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso.
UGC 10806	gx	17h18m51s	+49°53.0'	q 81	Her	16"	buona / discreto	piuttosto debole, ma relativamente facile, oblunga, orientata da E a W con dimensioni ~ 2'×1' e molto diffusa ai bordi; non presenta bulge vero e proprio, ma è appena più luminosa verso l'interno; c'è una debole stellina a ridosso verso E — 270x.
UGC 10811	gx	17h18m44s	+58°08.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10812	gx	17h19m29s	+40°55.3'		Her	16"	ottima / buono	piccolo oggetto molto debole, abbastanza compatto, di dimensioni max 30" e orientato da WNW a ESE — 270x.
UGC 10813	gx	17h20m11s	+23°50.5'		Her	16"	buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 30"-35", abbastanza contrastata sul fondo cielo e con condensazione centrale quasi stellare ben evidente a 380x.
UGC 10814	gx	17h19m21s	+49°02.4'		Her	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 10816	gx	17h19m19s	+49°57.7'		Her	16"	ottima / ottimo	debolissima, visibile a tratti in visione distolta; è orientata ~ E-W, con un'estensione massima di una 40-ina di secondi — 270x.
UGC 10819	gx	17h19m56	+60°08.9'		Dra	28"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a NW — 495x.
UGC 10820	gx	17h20m57s	+42°09.3'		Her	28"	ottima / ottimo	è una debolissima lama di luce orientata da NW a SE e che in visione distolta appare estesa ~ 1'; ci sono 2 stelline molto deboli a 1.5' W e NW (la 2a è più debole) — 495x.
UGC 10821	gx	17h20m30s	+52°38.6'		Dra	28"	ottima / buono	debole, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 50"×40" e con tenue condensazione centrale che a tratti appare orientata a perpendicolo; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E — 495x.
UGC 10824	gx	17h22m20s	+02°01.1'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 10825	gx	17h22m34s	+00°57.5'		Oph	24"	m. buona / m. buono	si vede una debole stellina (il nucleo della gx?) circonfusa da un tenuissimo e diffuso lucore di aspetto indistinto; per confronto, la stellina di luminosità simile subito a N appare più netta — 450x.
UGC 10828	gx	17h23m26s	+23°38.6'		Her	16"	buona / buono	sembra un piccolo ammasso globulare irrisolto, diffuso, rotondo con Ø di 1' scarso e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1' NW, una debolissima quasi a ridosso verso W e una percettibile a tratti a S — 380x.
UGC 10830	gx	17h22m39s	+60°26.7'		Dra	16"	buona / ottimo	si vede facilmente a 380x, debole ma abbastanza contrastata, di luminosità pressoché uniforme salvo una tenuissima nucleo stellare che appare solo a tratti; la gx è allungata da E a W con dimensioni 45"×30".
UGC 10831	gx	17h24m28s	+24°58.3'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, salta fuori solo in visione distolta; è di luminosità uniforme e molto stemperata sul fondo cielo, forse rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
UGC 10837	gx	17h24m45s	+24°58.3'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, a tratti in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; presenta un piccolo bulge appena più brillante del disco; si vede abbastanza facilmente quella copia serrata di stelline situate quasi a ridosso verso SE; meglio osservabile a 270x.
UGC 10838	gx	17h23m54s	+48°28.8'		Her	28"	ottima / buono	lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, estesa 45" in direzione e orientata da E a W — 495x.
UGC 10839	gx	17h23m41s	+52°00.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; situata 2' a W di una stellina brillante — 450x.
UGC 10840	gx	17h24m51s	+23°44.1'		Her	16"	buona / ottimo	rotonda, con Ø di ~ 45", diffusa e con evidente condensazione centrale; c'è una coppia di stelline a S distanti una 20-ina di secondi (quella a W è più brillante) — 380x.
UGC 10842	gx	17h24m52s	+28°04.7'		Her	16"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; meglio evidente a 270x; forma un piccolo trapezio regolare con 3 stelline le cui basi sono orientata come la gx.
UGC 10843	gx	17h23m59s	+51°57.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 10844	gx	17h25m25s	+10°16.7'		Oph	24"	buona / ottimo	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da ENE a WSW con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 10845	gx	17h24m24s	+44°56.5'		Her	16"	m. buona / ottimo	facile, poco diffusa, ma con bassissimo gradiente, rotonda con Ø di 1' — 380x.
UGC 10847	gx	17h25m18s	+23°19.0'		Her	16"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme; solo a tratti in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20", ma bisogna spingere a 380x.
UGC 10849	gx	17h25m34s	+20°46.4'		Her	16"	ottima / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a < 1' NW; meglio visibile a 270x.
UGC 10853	gx	17h22m34s	+74°22.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un piccolo gruppo — debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 10859	gx	17h25m47s	+59°36.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso E — 495x.
UGC 10862	gx	17h28m09s	+07°23.3'	q 203	Oph	16"	m. buona / discreto	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø maggiore di 1', molto diffusa e stemperata sul fondo cielo; c'è una stellina brillante a ridosso del bordo nord-orientale; anche scalando a 188x la gx si estingue quasi del tutto sul fondo cielo: meglio visibile a 132x.
UGC 10863	gx	17h26m14s	+62°09.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W ed estesa 1'; c'è una stellina subito a E — 450x.
UGC 10864	gx	17h28m19s	+14°10.1'		Oph	16"	discreta / buono	relativamente brillante, piccola e compatta, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a meno di 1' verso W — 270x (ma regge bene anche i 380x).
UGC 10865	gx	17h25m13s	+72°53.9'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40"; la visione è disturbata da un piccolo asterismo pentagonale di stelle brillanti fra cui la SAO 8794 di magnitudo 7.4 a 4.5' NW, e la SAO 8799 di 8.7 a un paio di primi verso S — 450x.
UGC 10868	gx	17h29m00s	+06°19.7'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa soprattutto nella parte meridionale, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 10869	gx	17h27m27s	+58°30.9'		Dra	16"	m. buona / ottimo	facile, compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; ci sono 2 debolissime stelline situate a ridosso verso E e verso W; quella a W, leggermente sfocata, è risultata poi essere la galassia IC 1259 — 270x.
UGC 10870	gx	17h27m10s	+60°01.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale — 450x.
UGC 10873	gx	17h29m16s	+16°09.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa oltre 1'; c'è una stellina brillante a ridosso S — 450x.
UGC 10878	gx	17h29m49s	+23°19.4'		Her	16"	m. buona / buono	è una sorta di diffuso lucore molto debole "incastrato" tra 2 stelline abbastanza luminose che m'impediscono di capire com'è orientata; grosso modo estesa poco meno della distanza delle 2 stelline (che è di circa 1') — 380x.
UGC 10879	gx	17h29m56s	+24°53.0'		Her	16"	buona / buono	molto debole, ma visibile anche in visione diretta, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 10888	gx	17h29m59s	+60°21.0'		Dra	16"	buona / ottimo	molto debole, poco più brillante all'interno, orientata da NW a SE con dimensioni 50"×30" (poco meno della distanza della coppia di stelline a SW che è di ~ 1'; un'altra coppia ravvicinata di stelline si trova a poco più di 1' verso E — 380x.
UGC 10899	gx	17h33m36s	+20°46.1'		Her	16"	buona / ottimo	debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo e di luminosità uniforme; a tratti osservando a 380x appare orientata da N a S ed estesa per ~ 1'.
UGC 10905	gx	17h34m06s	+25°20.6'		Her	16"	buona / buono	relativamente facile a 380x, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; presenta un bulge marcato e un nucleo di aspetto stellare; c'è una stellina a ~ 30" verso E.
UGC 10907	gx	17h29m59s	+77°23.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N — 450x.
UGC 10909	gx	17h34m38s	+25°34.1'		Her	16"	buona / buono	piccola ed elusiva macchiolina estesa una 20-ina di secondi e situata a ridosso della più orientale di una coppia di deboli stelline distanti 30"; visibile tuttavia solo a tratti a 270x.
UGC 10912	gx	17h33m37s	+70°50.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina molto debole a ridosso E e una ben evidente a 1' verso S — 450x.
UGC 10914	gx	17h36m18s	+40°08.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra una stellina abbastanza brillante a 1' W e una coppia sbilanciata a NE; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10918	gx	17h37m33s	+11°07.3'		Oph	16"	discreta / buono	debole, diffusa, con condensazione centrale piccola e appena visibile, approssim. rotonda con Ø di ~ 40" — 270x.
UGC 10919	gx	17h37m33s	+17°32.0'		Her	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, ma di aspetto non chiaro; forse rotonda con Ø di ~ 1'; meglio scalare a 270x.
UGC 10922	gx	17h36m39s	+60°16.8'		Dra	28"	ottima / m. buono	è una debolissima chiazza approssim. rotonda con Ø si e no di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; la visione è tuttavia disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a W; un'altra stellina abbastanza brillante si trova a 1.5' SSW — 495x.
UGC 10923	gx	17h19m28s	+86°44.3'		UMi	24"	buona / ottimo	è di aspetto un po' irregolare, con condensazione centrale poco contrastata, grosso modo allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
UGC 10926	gx	17h38m27s	+24°57.2'		Her	16"	buona / buono	debolissima, a tratti allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia ravvicinata di stelline quasi a ridosso verso SE — 380x.
UGC 10928	gx	17h38m16s	+35°32.1'		Her	16"	buona / buono	debolissimo lucore di forma indistinta, esteso non più di 30"; appare a tratti in visione distolta a 380x, ma non riesco a capire com'è orientata.
UGC 10929	gx	17h38m16s	+35°32.1'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso NE — 380x.
UGC 10933	gx	17h38m36s	+39°13.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge appena percettibile; una coppia di stelline abbastanza brillanti a ridosso W disturbano un po' l'osservazione — 450x.
UGC 10936	gx	17h38m27s	+61°02.4'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina molto debole a ridosso W — 450x.
UGC 10938	gx	17h39m33s	+49°36.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo brillante circonfuso da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di 1'; ci sono 3 stelline raggruppate a 1.5' verso N, una coppia di stelline a 2' W e una a 1' verso E; 3 stelle brillanti arcuate si trovano a E della gx che appare meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10940	gx	17h39m14s	+63°57.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
UGC 10941	gx	17h41m18s	+17°22.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' scarso verso N; allineata ed equidistante con due stelline a NE; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10942	gx	17h40m17s	+51°01.7'		Dra	28"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 495x.
UGC 10943	gx	17h42m12s	+03°11.9'		Oph	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo lucore molto diffuso orientato da WNW a ESE (ossia come le 2 stelline situate rispettivamente a ridosso N e a 2.5' WNW), esteso forse 1'; due stelline appena percettibili si trovano a ridosso S e WNW; la visione non sembra migliorare scalando gli ingrandimenti — 450x.
UGC 10944	gx	17h41m51s	+18°17.3'		Her	16"	buona / ottimo	relativamente facile, compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
UGC 10946	gx	17h41m12s	+45°09.1'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10948	gx	17h42m32s	+00°13.0'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce estesa per oltre 1' in direzione WNW-0ESE e poco più brillante al centro; c'è una stellina subito a E — 450x.
UGC 10949	gx	17h38m53s	+74°50.3'		Dra	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
UGC 10950	gx	17h42m51s	+16°12.9'		Her	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 450x.
UGC 10952	gx	17h42m13s	+56°08.6'		Dra	28"	buona / ottimo	è una debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre tenere fuori campo la SAO 30525 di 8ª grandezza situata 5' a SSW — 495x.
UGC 10953	gx	17h41m10s	+66°40.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
UGC 10954	gx	17h39m56s	+74°02.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a 1' SSE (che è la più settentrionale di un asterismo irregolare di 6 componenti) — 450x.
UGC 10955	gx	17h42m15s	+55°59.2'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
UGC 10956	gx	17h43m53s	+04°33.1'		Oph	24"	m. buona / m. buono	chiazza rotonda molto debole e stemperata sul fondo cielo, con Ø di 45" e di luminosità uniforme; appare senza problemi in visione distolta a 450x, ma occorre assolutamente tenere fuori campo la β Ophiuchi di 3ª grandezza situata 6' a W.
UGC 10963	gx	17h42m15s	+68°20.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce poco diffusa, orientata da E a W ed estesa per oltre 1'; presenta un piccolo bulge evidente, ma poco contrasto — 450x.
UGC 10966	gx	17h45m14s	+18°08.3'		Her	16"	buona / ottimo	è una debole lama di luce che a prima vista appare di luminosità uniforme, estesa per ~ 1.5' che si diparte verso W da una stellina; solo a tratti salta fuori un tenue bulge diffuso — 380x.
UGC 10970	gx	17h45m48s	+24°21.5'		Her	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto spampanata, estesa probabilmente più di 30", ma non riesco a capire com'è orientata; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso SE — 380x.
UGC 10971	gx	17h44m49s	+55°21.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 10972	gx	17h46m22s	+26°32.6'		Her	16"	buona / ottimo	un'altra debole lama di luce situata a ridosso SE di un piccolo triangolo di stelle; è orientata da NE a SW per un paio di primi; c'è una stellina quasi a ridosso dell'estremità SW — 380x.
UGC 10976	gx	17h46m28s	+30°42.3'		Her	24"	discreta / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30".
UGC 10977	gx	17h46m31s	+30°41.9'		Her	24"	discreta / buono	debolissima, appare in visione distolta a 450x, quasi a ridosso di UGC 10976; a tratti si vede orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15".
UGC 10979	gx	17h47m08s	+20°51.6'		Her	16"	buona / discreto	debole baffo di luce appena più brillante all'interno che si diparte verso NE per 45" da una stellina brillante — 270x.
UGC 10980	gx	17h45m58s	+57°15.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo occidentale (fa parte di un piccolo trapezio orientato da NE a SW) — 450x.
UGC 10981	gx	17h47m39s	+09°32.8'		Oph	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina subito a NE.
UGC 10982	gx	17h46m02s	+59°19.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa ~ 45" in direzione NE-SW; solo a tratti appare un nucleo stellare, ma non bisogna scendere sotto i 450x; ci sono 3 stelline molto deboli subito a SW.
UGC 10983	gx	17h41m57s	+45°40.7'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×20"; solo a momenti appare una condensazione centrale molto tenue; disturbata da una coppia di stelline brillanti a 1' NE e SE; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 10984	gx	17h46m40s	+51°16.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; allineata e quasi equidistante con due stelline brillanti a S — 450x.
UGC 10985	gx	17h48m04s	+14°44.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile — ancorché disturbata dalla SAO 103119 di 7ª grandezza situata ad appena un paio di primi a WNW — ma con basso gradiente di luce, molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 80"×40"; c'è una tripletta molto serrata e allineata a ridosso NW; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 10987	gx	17h48m20s	+17°56.9'		Her	16"	ottima / m. buono	piccolo e debole oggetto rotondo di luminosità uniforme e di 20"-25" di Ø, con una stellina appena percettibile a ridosso W (da un controllo successivamente effettuato, quest'ultima è risultata essere in realtà la PGC 60887) — 380x.
UGC 10988	gx	17h46m47s	+59°14.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina al bordo N e una brillante a 1' scarso SSW; la visione è però disturbata dalla SAO 30576 di magnitudo 7.6 situata a 1.5' verso E — 450x.
UGC 10993	gx	17h47m42s	+55°11.5'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme (fatto salvo un nucleo stellare visibile tuttavia solo a momenti), a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 495x.
UGC 10995	gx	17h47m33s	+64°01.6'		Dra	24"	ottima / m. buona	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" (anche a 450x il campo è abbastanza ricco di stelline brillanti).
UGC 10999	gx	17h49m48s	+25°47.8'		Her	16"	buona / buono	è una sorta di debole alone asimmetrico attorno a una stellina, spostato verso NW; a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; meglio osservabile a 270x.
UGC 11000	gx	17h49m26s	+36°08.7'	q 116	Her	16"	ottima / buono	relativamente facile e compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso di NW — 270x.
UGC 11001	gx	17h50m14s	+14°17.2'		Oph	16"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta, a 270x, appare chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30".
UGC 11002	gx	17h48m41s	+58°24.3'		Dra	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme; una stellina abbastanza brillante al bordo W disturba un po' l'osservazione; c'è una coppia serrata di stelline subito a SE — 495x
UGC 11003	gx	17h50m42s	+14°49.3'		Her	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso S (o SW); la galassia è tuttavia poco meglio evidente a scalando a 340x.
UGC 11005	gx	17h49m19s	+63°45.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 11006	gx	17h50m40s	+51°02.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con evidente condensazione centrale, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' SE e una appena percettibile subito a S — 495x.
UGC 11017	gx	17h52m09s	+29°51.7'		Her	16"	m. buona / buono	debolissima, appare elusivamente e solo ogni tanto in visione distolta; non dovrebbe essere estesa più di 40" o 45" — 270x.
UGC 11019	gx	17h50m47s	+62°52.9'		Dra	28"	m. buona / discreto	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge diffuso poco contrastato — 495x.
UGC 11024	gx	17h52m54s	+23°12.7'		Her	16"	buona / buono	molto debole, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme salvo, una tenuissima nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 11025	gx	17h52m57s	+27°40.4'		Her	16"	buona / ottimo	abbastanza facile, rotonda, con Ø di ~ 40", poco diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale; è situata tra 2 stelline distanti 1.5' e orientate da N a S; quella settentrionale è più brillante — 380x.
UGC 11027	gx	14h53m17s	+24°34.6'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta a 270x appare poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40".
UGC 11028	gx	17h52m06s	+60°35.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo SE che disturba un po' l'osservazione — 495x.
UGC 11029	gx	17h53m52s	+24°28.0'		Her	16"	buona / ottimo	debole bolla di luminosità uniforme, assai stemperata sul fondo cielo e con Ø superiore a 1'; appare facilmente in visione distolta a 270x; c'è una stellina a un paio di primi verso W.
UGC 11035	gx	17h54m30s	+32°53.1'		Her	16"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 1.5' verso W — 270x.
UGC 11036	gx	17h53m37s	+58°21.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	è un debolissimo filo di luce esteso una 40-ina di secondi e orientato da NE a SW; appare solo a momenti in visione distolta, anche perché c'è una stellina brillante subito a W che tende a offuscarne un po' la visione — 495x.
UGC 11038	gx	17h51m58s	+72°08.9'		Dra	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SE (la quale fa parte di un piccolo arco a 4 componenti) — 450x.
UGC 11041	gx	17h54m52s	+34°46.5'		Her	16"	m. buona / buono	abbastanza brillante, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con bulge evidente e nucleo stellare; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline — 270x.
UGC 11042	gx	17h55m18s	+26°22.3'		Her	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, rotonda con Ø di ~ 1'; presenta un bulge diffuso abbastanza contrastato sul disco; a 380x appare una stellina debolissima a ridosso verso E.
UGC 11044	gx	17h55m35s	+18°55.5'		Her	16"	buona / buono	debolissima chiazza lattescente di forma indistinta, estesa 30" o 40" e situata a poco più di 1' N di una stellina (la distanza è simile a quella della coppia di stelle brillante ubicata 3.5' a NE) — 270x.
UGC 11045	gx	17h55m21s	+31°50.8'		Her	24"	ottima / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una evidente condensazione stellare; c'è una stellina brillante a 1' E — 450x.
UGC 11046	gx	17h55m31s	+28°49.6'		Her	16"	m. buona / buono	relativamente brillante e compatta, allungata da E a W, di dimensioni 50"×25" e con nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
UGC 11052	gx	17h56m18s	+18°49.0'		Her	16"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, ma abbastanza facilmente visibile in visione distolta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 270x.
UGC 11054	gx	17h53m36s	+71°32.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza diffusa orientata da N a S con dimensioni grosso modo 60"×30"; allineata ed equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti a S — 450x.
UGC 11055	gx	17h57m04s	+12°14.4'		Oph	16"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' — 380x.
UGC 11057	gx	17h57m15s	+12°10.8'		Oph	16"	m. buona / buono	è una debole chiazza molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 80"×60", appena più brillante all'interno, ma di aspetto un po' irregolare; c'è una stellina brillante a ridosso verso SW — 380x.
UGC 11058	gx	17h56m55s	+32°38.2'		Her	16"	m. buona / buono	è una chiazza approssim. rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e Ø di quasi 1.5'; c'è un piccolo triangolo di stelline deboli a ridosso verso E di cui quella più occidentale lambisce la gx — 270x.
UGC 11060	gx	17h57m11s	+27°57.7'		Her	16"	buona / ottimo	relativamente facile a 380x, molto allungata da NW a SW, di dimensioni 60"×20", con bulge evidente e diffuso; c'è una stellina a ridosso SE (sul prolungamento dell'asse); una stellina brillante si trova invece a 1' verso NE.
UGC 11063	gx	17h57m35s	+23°01.6'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, forse rotonda con Ø max di 30", diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
UGC 11064	gx	17h57m41s	+27°50.2'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, disturbata dalla luce di una coppia di stelle brillanti distanti una 20-ina di secondi e orientate da NE a SW; il nucleo appare a tratti a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso del margine SE.
UGC 11065	gx	17h57m05s	+47°44.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza diffusa con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; poco meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile subito a S.
UGC 11066	gx	17h54m53s	+71°32.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30" (ossia di aspetto simile a UGC 11054 osservata subito prima); è un po' disturbata da una stellina brillante situata 1' a W e forse per questo è meglio evidente se non si scende sotto i 450x.
UGC 11068	gx	17h58m05s	+28°14.6'		Her	16"	m. buona / buono	oggetto elusivo, approssim. rotondo con Ø > 30"; bisogna fare attenzione perché a ~ 1' N c'è una stellina doppia molto debole dalle componenti serrate che trae in inganno — 270x.
UGC 11070	gx	17h58m14s	+27°15.8'		Her	16"	buona / buono	elusiva, salta fuori a tratti in visione distolta a 380x quando si fissa la stellina appena percettibile situata a S; non è comunque più estesa di una 20-ina di secondi; c'è un asterismo di 6 stelle brillanti fatto a freccia a N della gx.
UGC 11072	gx	17h58m00s	+43°23.2'		Her	28"	ottima / ottimo	la gx è molto debole, ma si fatica a scorgerla perché situata ad appena un paio di primi a S della SAO 47096 di 7ª grandezza il cui bagliore tende a offuscarla; in visione distolta appare come una lama di luce a tratti estesa per una 40-ina di secondi in direzione NW-SE — 495x.
UGC 11073	gx	17h58m59s	+10°32.3'		Oph	24"	ottima / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso E — 340x.
UGC 11074	gx	17h59m08s	+07°08.6'		Oph	24"	m. buona / m. buono	è una chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, orientata da NW a SE e con dimensioni grosso modo 60"×30"; si trova tra una stellina a SW e un piccolo triangolo serrato a NE; anche a 450x il campo è comunque molto ricco e si fatica un po' ad arrivare sul bersaglio.
UGC 11076	gx	17h58m52s	+34°00.4'		Her	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 50"×25" e con evidente condensazione centrale — 450x.
UGC 11080	gx	17h59m58s	+26°21.3'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, quasi elusiva, appare solo a tratti a 380x, molto piccola, con dimensioni non superiori ai 20"-25"; c'è una coppia serrata di deboli stelline quasi a ridosso verso E — 380x.
UGC 11082	gx	18h00m06s	+26°22.0'		Her	16"	buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 40" e alto gradiente; a 380x diviene evidente un nucleo di aspetto quasi stellare; è situata tra 2 stelline distanti > 1' e orientate ~ da N a S: quella spostata verso quella N (che di fatto si trova subito a NW della galassia).
UGC 11086	gx	18h00m24s	+28°47.3'		Her	16"	m. buona / buono	abbastanza compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; presenta un tenue bulge visibile a tratti (c'è una maledetta stella di 7° situata 4.5' S che non si riesce a tenere fuori campo!) — 270x.
UGC 11087	gx	18h00m19s	+34°38.4'		Her	24"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a S — 450x.

UGC 11088	gx	17h59m58s	+44°51.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma ben definita in visione distolta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stella brillante quasi a ridosso verso W che disturba un po' l'osservazione — 450x.
UGC 11089	gx	17h59m19s	+58°32.3'		Dra	28"	ottima / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20", ma la visione è molto disturbata da una stellina brillante al bordo N dalla quale la gx sembra a prima vista aggettare — 495x.
UGC 11090	gx	18h00m43s	+28°42.7'		Her	16"	m. buona / buono	situata 6' SE di UGC 11086, è molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
UGC 11093	gx	18h01m52s	+06°58.0'		Oph	16"	m. buona / buono	è una debolissima lama di luce estesa almeno 3' e orientata da N a S, poco orientata al centro e molto stemperata alle 2 estremità; c'è una stellina brillante nel mezzo che in visione distolta è palesemente decentrata verso N; meglio a 270x: a 380x si diluisce troppo.
UGC 11097	gx	18h02m25s	+26°02.6'		Her	16"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e situata tra 2 stelline appena percettibili a 380x; una a NE e l'altra a SW.
UGC 11099	gx	18h01m07s	+67°25.6'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una doppia stretta e molto sbilanciata a 1' S; 3 stelline allineate da E a W ed estese come la gx si trovano a 1.5' NE — 450x.
UGC 11101	gx	18h03m04s	+45°15.4'		Her	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso — 450x.
UGC 11104	gx	18h04m38s	+20°05.8'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare; meglio contrastata a 270x; c'è una doppia a 1.5' SE con componenti in direzione E-W.
UGC 11105	gx	18h04m36s	+21°38.3'	q 159	Her	16"	buona / ottimo	elusiva; in visione diretta appare a tratti solo il nucleo a mo' di stellina appena sfocata, ma solo con quella distolta sembra sfocarsi maggiormente; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NE — 270x.
UGC 11106	gx	18h02m04s	+69°42.8'		Dra	24"	ottima / m. buona	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 11107	gx	18h05m05s	+17°16.1'		Her	24"	ottima / scarso	debolissimo lucore molto diffuso, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; 2 stelline molto deboli si trovano a 1' scarso S e alla stessa distanza verso SE — 340x.
UGC 11111	gx	18h05m18s	+23°06.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	elusiva, appare solo con gran difficoltà spingendo a 570x; purtroppo si trova in mezzo a 2 stelline brillanti — distanti circa 1' in direzione NE-SW — che tendono a offuscarla; a momenti pare addirittura orientata da NE a SW, ma potrebbe essere un effetto indotto dalle 2 stelle; una stellina appena percettibile si trova subito a S di quella più settentrionale; riosservando successivamente la zona a 450x la gx sembra un poco spostata verso la stella a SW, quasi si trattasse di una sorta di "aggetto" da questa.
UGC 11112	gx	18h04m44s	+46°16.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline subito a N — 450x.
UGC 11113	gx	18h05m31s	+23°16.4'	q 159	Her	16"	buona / ottimo	altra gx debolissima che appare solo a momenti in visione distolta diffusa, piccola, con dimensioni max 25"-30" e una condensazione centrale appena percettibile — 270x.
UGC 11116	gx	18h03m42s	+67°03.1'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 11123	gx	18h07m38s	+28°29.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso E e una poco più debole subito a N — 450x.
UGC 11124	gx	18h07m27s	+35°33.8'	q 116	Her	16"	ottima / buono	debolissimo chiarore molto diffuso, esteso 40"-50" e osservabile solo in visione distolta subito a E di una stellina brillante — 270x.
UGC 11129	gx	18h09m11s	+30°19.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare evidente; ci sono due deboli stelline quasi a ridosso della gx a SW e SE — 450x.
UGC 11130	gx	18h06m51s	+69°49.5'		Dra	24"	ottima / m. buona	relativamente brillante, molto piccola, leggermente diffusa e con condensazione stellare marcata; ha un Ø di appena una decina di secondi ed è quindi meglio evidente spingendo a 580x (a 340x rimane ancora di aspetto quasi stellare).
UGC 11133	gx	18h04m39s	+78°34.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 11141	gx	18h11m49s	+12°05.4'		Oph	16"	m. buona / buono	debolissimo oggetto, piccolo e molto diffuso, con Ø di ~ 30" e che in visione distolta a 380x appare condensato; è allineata ed equidistante con 2 stelline situate a NW e separate da 30"; una debole stellina si trova a ~ 1' W: quest'ultima assieme alle due precedenti forma un mini triangolo isoscele.
UGC 11145	gx	18h10m59s	+49°31.8'		Her	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con bulge molto tenue; disturbata da una coppia di stelline a 1' verso E tra cui la SAO 47287 di 9ª grandezza — 450x.
UGC 11146	gx	18h11m02s	+49°54.7'		Her	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MCG+8-33-30** a ridosso E — relativamente facile, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una evidente condensazione centrale — 450x.
UGC 11147	gx	18h10m57s	+53°20.2'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; ci sono 2 stelline molto deboli rispettivamente a E e SSW — 495x.
UGC 11149	gx	18h11m10s	+49°51.9'		Her	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11150	gx	18h12m07s	+25°35.7'		Her	16"	buona / ottimo	piccola ed elusiva lama di luce orientata da N a S ed estesa per ~ 45"; è visibile solo a tratti in visione distolta a 380x; ogni tanto appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è il nucleo o una stellina sovrapposta.
UGC 11151	gx	18h12m06s	+29°09.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×30" e con bulge diffuso abbastanza evidente — 450x.
UGC 11152	gx	18h12m32s	+18°36.0'	q 159	Her	16"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 270x.
UGC 11154	gx	18h12m01s	+42°29.1'		Her	28"	ottima / ottimo	debole diffusa e con tenue condensazione centrale, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è un piccolo asterismo di forma triangolare formato da 6 stelline di luminosità diseguale a E — 495x.
UGC 11155	gx	18h12m32s	+25°26.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza estesa una 40-ina di secondi che appare con difficoltà subito a W di una coppia di deboli stelline; stranamente meglio visibile a 450x; solo a momenti appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è il nucleo della gx o una stellina sovrapposta appena percettibile.
UGC 11156	gx	18h12m37s	+25°32.2'		Her	16"	buona / ottimo	facile, rotonda, con di Ø 45" e con marcata condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 11157	gx	18h12m25s	+30°12.1'		Her	24"	ottima / m. buono	è un elusivo baffo di luce orientato grosso modo da N a S ed esteso una 40-ina di secondi che appare solo a momenti in visione distolta quasi a ridosso SW di una stellina brillante — 450x.
UGC 11158	gx	18h12m54s	+20°40.4'		Her	16"	buona / ottimo	è una debole lama di luce facilmente osservabile a 380x, orientata da NE a SW, estesa 1' scarso e con nucleo stellare; c'è una stellina a 30" SE (fa parte di un piccolo asterismo di 6 stelline abbastanza brillanti foggiato a esagono irregolare, molto utile per localizzare la galassia).
UGC 11163	gx	18h13m19s	+33°49.8'		Her	16"	m. buona / buono	rotonda, molto diffusa, con Ø di ~ 1' e nucleo stellare abbastanza evidente — 270x.
UGC 11165	gx	18h11m33s	+68°42.0'		Dra	24"	ottima / m. buona	è una debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa almeno 1'; è situata tra due deboli stelline orientate da NW a SE e grosso modo distanti come la dimensione della gx; c'è un piccolo asterismo di forma triangolare formato da 5 stelline brillanti subito a N — 450x.
UGC 11167	gx	18h13m27s	+33°44.5'		Her	16"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, più piccola di UGC 11163, estesa 35" o 40"; c'è una stellina a ridosso verso W — 270x.
UGC 11168	gx	18h14m00s	+13°16.5'		Oph	16"	m. buona / buono	debole, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di 1' scarso; c'è una stellina brillante a ridosso verso S — 380x.
UGC 11171	gx	18h14m10s	+30°40.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale evidente; c'è una stellina al bordo N — 450x.
UGC 11172	gx	18h11m45s	+69°55.1'		Dra	24"	ottima / m. buona	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; la visione è disturbata da due stelle brillanti di 11-esima distanti 3' e orientate da NNW a SSE in mezzo alle quali si trova la gx — 450x.
UGC 11173	gx	18h14m03s	+49°02.6'		Her	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da E a W, con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme; poco disturbata da una stella brillante situata 1' scarso a SE — 450x.
UGC 11177	gx	18h16m03s	+06°44.8'		Oph	16"	m. buona / buono	debolissima, tuttavia salta fuori con relativa facilità a 270x, allungata da E a W con dimensioni 60"×30".
UGC 11179	gx	18h15m47s	+25°22.6'		Her	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti a 400x; appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
UGC 11186	gx	18h16m18s	+47°50.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 50"×40" — 450x.
UGC 11190	gx	18h16m57s	+40°48.2'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra due deboli stelline orientate da E a W — 450x.
UGC 11193	gx	18h15m00s	+71°00.4'		Dra	24"	ottima / m. buona	è una chiazza grosso modo circolare con Ø di ~ 1', molto debole e stemperata sul fondo cielo; appare facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
UGC 11194	gx	18h17m57s	+26°45.4'		Her	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma visibile senza alcun problema in visione distolta a 380x, allungata grosso modo da E a W con dimensioni 60"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N.
UGC 11195	gx	18h17m57s	+30°39.0'		Lyr	16"	m. buona / buono	debolissima, in visione distolta appare orientata grosso modo da NW a SE con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso S — 270x.
UGC 11197	gx	18h18m23s	+21°17.6'		Her	16"	m. buona / ottimo	abbastanza facile, rotonda, diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e con piccolo bulge diffuso; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso NE — 380x.
UGC 11198	gx	18h18m59s	+16°15.0'		Her	24"	buona / m. buono	lama di luce molto debole, estesa 1', orientata da NE a SW e con piccolo bulge appena evidente; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso S; una coppia stretta e sbilanciata si trova a 1' NE — 450x.
UGC 11199	gx	18h18m29s	+36°19.2'		Lyr	16"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda, con Ø di 35" o 40", con nucleo stellare abbastanza marcato — 270x.
UGC 11202	gx	18h18m39s	+50°16.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 45", diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina quasi a ridosso NNW e una molto debole subito a S; una molto brillante si trova a un paio di primi scarsi NNE — 450x.
UGC 11204	gx	18h19m01s	+47°44.9'		Dra	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso N — 450x.
UGC 11205	gx	18h19m11s	+41°48.4'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina percettibile a momenti (o forse un nodulo del disco) al bordo N; una stellina si trova a ridosso NW e un'altra a 1' verso W; meglio definita scalando a 340x.
UGC 11206	gx	18h19m44s	+48°33.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45", poco meglio contrastata scalando a 340x; ci sono 3 stelline allineate a N della gx e la brillante SAO 47397 di 9a grandezza a un paio di primi scarsi ESE.
UGC 11207	gx	18h20m21s	+47°54.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo puntiforme circonfuso da un alone estremamente debole che in visione distolta non appare più esteso di 30"-35"; c'è una debole stellina subito a SW; una coppia di stelline più evidenti si trova a SE — 450x.
UGC 11208	gx	18h18m39s	+68°21.1'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al margine orientale; una stella brillante di 10ª grandezza situata un paio di primi a NW disturba un po' la visione — 450x.
UGC 11213	gx	18h21m39s	+52°26.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge poco contrastato; c'è una stellina al bordo N e una brillante a 1' verso W — 495x.
UGC 11214	gx	18h22m53s	+12°25.8'		Her	24"	ottima / scarso	è una debole chiazza molto diffusa e indistinta situata tra 2 stelline, una a ridosso verso E e l'altra appena percettibile a W; forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 340x.
UGC 11217	gx	18h22m16s	+48°06.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un tenue nucleo stellare — 450x.
UGC 11222	gx	18h21m56s	+68°07.7'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al margine orientale; una stella brillante di 10ª grandezza situata un paio di primi a NW disturba un po' la visione — 450x.
UGC 11228	gx	18h24m46s	+41°29.6'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente; ci sono due stelline a ridosso: una a S e l'altra a SW — 450x.
UGC 11229	gx	18h25m38s	+22°19.6'		Her	16"	buona / buono	relativamente compatta, orientata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale visibile a momenti; forma un piccolo triangolo con 2 stelline brillanti: una 1' scarso a SW e l'altra 1.5' NW — 380x.
UGC 11230	gx	18h24m02s	+65°18.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	è un'elusiva lama di luce orientata da N a S e che in visione distolta appare a tratti estesa per ~ 1'; preferibile tuttavia scalare a 340x.
UGC 11233	gx	18h25m44s	+32°10.7'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e marcata condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina a 1' scarso W e un'altra più debole alla stessa distanza verso SW — 450x.
UGC 11234	gx	18h26m33s	+22°25.2'		Her	16"	buona / buono	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; meglio osservabile a 270x.
UGC 11237	gx	18h27m17s	+24°53.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso S — 400x.
UGC 11244	gx	18h27m14s	+46°55.6'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme orientata da N a S e con dimensioni di 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11245	gx	18h26m57s	+56°05.3'		Dra	28"	ottima / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline a SSE e una stellina abbastanza brillante a 1' SW — 495x.
UGC 11246	gx	18h28m24s	+22°44.2'		Her	16"	buona / buono	molto debole, poco diffusa, allungata da NNW a SSE con dimensioni 50"×25" e di luminosità uniforme; c'è una stellina sul prolungamento dell'asse verso SSW — 380x.
UGC 11252	gx	18h28m42s	+48°14.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso NW — 450x.
UGC 11260	gx	18h30m25s	+34°06.1'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima macchiolina di luminosità uniforme, molto diffusa che appare con relativa facilità in visione distolta a 380x; poco allungata all'incirca da N a S con dimensioni 30"×20".
UGC 11261	gx	18h31m07s	+22°24.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore molto diffuso, di luminosità uniforme ed esteso una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x.
UGC 11262	gx	18h30m36s	+42°41.6'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 60"×30"; meglio definita scalando a 340x.
UGC 11264	gx	18h31m46s	+31°05.4'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una debole stellina subito a N — 450x.
UGC 11265	gx	18h31m35s	+33°56.3'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile (era già visibile col cielo crepuscolare a 380x); è una gx compatta, rotonda, di 30" max di Ø e con evidente nucleo stellare.
UGC 11268	gx	18h32m07s	+37°36.8'		Lyr	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; ci sono 3 deboli stelline a ridosso N, NW e SW; una quarta più brillante si trova a 1 NW — 450x.
UGC 11270	gx	18h28m06s	+78°45.0'		Dra	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; è situata in mezzo a 2 stelline di luminosità simile distanti 1' e orientate da ENE a WSW — 450x.
UGC 11278	gx	18h33m44s	+38°37.1'		Lyr	24"	m. buona / buono	diffusa allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20", con condensazione centrale quasi stellare; c'è una debole stellina a ridosso N e una poco più brillante subito a S — 450x.
UGC 11281	gx	18h34m05s	+38°35.9'		Lyr	24"	m. buona / buono	alla prima occhiata appaiono 4 stelline immerse in una tenue chiazza lattescente molto allungata da N a S che in visione distolta pare estesa oltre 1'; la componente più a N dovrebbe essere il nucleo della gx — 450x.
UGC 11285	gx	18h35m14s	+22°30.0'		Her	16"	discreta / buono	è un'elusiva e piccola gx che salta fuori solo a tratti in visione distolta a ~ 1' a SE di una stellina molto debole; riosservata successivamente in migliori condizioni di visibilità, appariva poco più evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 270x e 380x.
UGC 11287	gx	18h34m45s	+47°02.1'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa, approssim. circolare con Ø di 40"-45" e con nucleo stellare evidente; due stelline appena percettibili si trovano a ridosso N e NW; 3 stelline serrate e leggermente arcuate si trovano a 1' SE — 450x.
UGC 11289	gx	18h35m48s	+22°28.2'		Her	16"	discreta / buono	debolissima macchiolina rotonda di 30"-35" di Ø e di luminosità uniforme; è situata tra 2 stellina: una abbastanza brillante a NE e l'altra molto più debole a SW — 270x.
UGC 11291	gx	18h36m05s	+30°50.4'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare molto allungata da NNW a SSE con dimensioni grosso modo di 80"×20"; meglio evidente scalando a 340x; c'è una stellina brillante a ridosso ESE — 450x.
UGC 11292	gx	18h35m20s	+52°43.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	presenta un bulge di 30"×15" con all'interno un nucleo stellare circonfuso da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo di dimensioni circa 60"×30"; c'è una stellina a ridosso del bulge verso N; una doppia stretta si trova subito a E — 450x.
UGC 11294	gx	18h36m37s	+19°55.3'		Her	16"	buona / ottimo	è un'elusiva macchiolina estesa ~ 30" che appare solo a tratti in visione distolta a 270x; il campo è molto ricco di stelline.
UGC 11296	gx	18h37m00s	+30°37.0'		Lyr	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una coppia di stelline molto deboli a ridosso E — 450x.
UGC 11298	gx	18h36m20s	+51°28.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" (ossia poco maggiori di MCG+9-30-23 situata 3' a W); 3 stelline quasi a ridosso fanno da contorno alla gx a W, SW e S — 450x.
UGC 11303	gx	18h37m32s	+33°16.9'		Lyr	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a ridosso W — 450x.
UGC 11304	gx	18h37m32s	+36°51.3'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, con basso gradiente, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso del bordo NW — 380x.
UGC 11306	gx	18h36m58s	+53°45.9'		Dra	28"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa orientata da N a S e che in visione distolta appare grosso modo di dimensioni 30"×15"; situata tra una doppia a NNE e una stellina appena percettibile a S — 495x.
UGC 11307	gx	18h37m55s	+27°47.6'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso S — 400x.
UGC 11312	gx	18h38m50s	+37°57.1'		Lyr	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina quasi a ridosso verso E; la gx è meglio evidente scalando a 340x.
UGC 11315	gx	18h40m20s	+24°12.0'		Her	16"	discreta / buono	relativamente brillante, poco diffusa, con bulge evidente e piccolo nucleo quasi stellare; è allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N e un'abbastanza brillante e poco più distante a SSW (ossia lungo l'asse della gx) — 270x.
UGC 11320	gx	18h40m48s	+23°41.0'		Her	16"	discreta / buono	è un'elusiva lama di luce orientata da E a W ed estesa ~ 1.5' (ossia poco più della distanza delle 2 stelline situate a S e SE e orientate come la gx); appare solo a tratti in visione distolta a 270x.
UGC 11321	gx	18h39m13s	+44°15.2'		Lyr	24"	ottima / ottimo	debolissimo lucore approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; la gx è disturbata da una stellina abbastanza brillante a ridosso N (la più meridionale di una coppia); meglio tuttavia non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 11322	gx	18h40m30s	+36°07.6'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	anche a 380x appare solo come un tenuissimo alone diffuso asimmetrico attorno a una stellina brillante; l'alone è spostato verso NE; è facile fare un confronto con una stellina di egual magnitudo situata ~ 2.5 NW.
UGC 11325	gx	18h40m44s	+36°09.6'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	molto debole, in visione distolta a 380x appare allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con bulge diffuso appena percettibile.
UGC 11329	gx	18h40m52s	+45°15.7'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo meridionale; meglio definita scalando a 340x.
UGC 11331	gx	18h39m00s	+73°36.6'		Dra	16"	m. buona / buono	è un debolissimo lucore tondeggiante visibile a tratti con gran difficoltà alternando gli occhi (non è riportata sull'Uranometria; situata 2.5' a NW di NGC 6654A) — 270x.
UGC 11337	gx	18h43m11s	+18°43.6'		Her	16"	buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, di una 30-ina di secondi di Ø e condensazione centrale visibile a tratti a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso verso W.
UGC 11338	gx	18h42m42s	+35°37.6'		Lyr	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 11339	gx	18h23m15s	+86°53.4'		UMi	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 450x.
UGC 11341	gx	18h42m51s	+39°32.9'		Lyr	24"	ottima / ottimo	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso N e una appena più evidente a ridosso SE — 450x.
UGC 11343	gx	18h42m58s	+53°02.8'		Dra	28"	ottima / m. buono	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, un po' disturbata da una stellina brillante situata 1' a E; in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso N — 495x.
UGC 11344	gx	18h44m15s	+24°08.5'		Her	16"	discreta / buono	è un debolissimo baffo di luminosità uniforme che protrude verso N di una stellina (che fa parte di un piccolo asterismo) per una 40-ina di secondi — 270x.
UGC 11350	gx	18h46m17s	+22°36.9'		Her	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, diffuso di luminosità uniforme e Ø di una 40-ina di secondi; si vede senza problemi in visione distolta, ma meglio è scalare a 270x.
UGC 11352	gx	18h46m03s	+48°50.6'		Dra	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 11353	gx	18h47m44s	+23°20.8'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline subito a SE — 380x.
UGC 11355	gx	18h47m57s	+22°56.5'		Her	16"	m. buona / ottimo	elusiva, estesa max 30" e molto diffusa, appare solo a tratti in visione distolta a 270x; è allineata con 2 stelline distanti poco più di 1' e orientate da NW a SE.
UGC 11359	gx	18h41m44s	+81°24.8'		Dra	24"	buona / ottimo	chiazza molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø di 30"-35"; è situata tra 2 stelline orientate da N a S e distanti poco più di 1'; quella a N è più debole — 450x.
UGC 11363	gx	18h47m35s	+70°44.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 11368	gx	18h51m30s	+26°29.0'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale evidente a 380x; forma un minuscolo piccolo triangolo con 2 stelline: una a ridosso di NW e l'altra, più debole, a ridosso verso E.
UGC 11369	gx	18h51m38s	+23°38.1'		Her	16"	discreta / buono	debolissima macchiolina rotonda di ~ 30" di Ø e appena più brillante all'interno; è situata tra 2 stelline: una quasi a ridosso NE e l'altra a NW — 270x.
UGC 11371	gx	18h51m56s	+26°29.2'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta a 380x a ridosso NW di una stellina; a 270x sembra una sorta di alone asimmetrico attorno alla suddetta stellina [non ho visto UGC 11370 situata 5' NW].
UGC 11376	gx	18h54m15s	+48°55.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline a 1' verso S e una stellina abbastanza brillante a 1' NE — 450x.
UGC 11380	gx	18h56m51s	+36°37.4'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	facile, ma in visione distolta appare di forma alquanto irregolare, allungata da N a S con dimensioni 80"×40" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 11385	gx	18h59m36s	+19°25.7'		Sge	16"	buona / m. buono	è un debolissimo lucore appena accennato, visibile a tratti a 380x ed esteso non più di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso W; a NE ce n'è invece una appena percettibile.
UGC 11386	gx	18h57m20s	+73°16.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11390	gx	18h50m43s	+84°35.0'		Dra	24"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme orientata da E a W ed estesa per almeno 1'; appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
UGC 11393	gx	19h02m45s	+27°18.5'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a ridosso verso S; il campo è ricchissimo di stelline anche a 400x: un piccolo raggruppamento simile a un ammasso aperto si trova a SE della gx.
UGC 11397	gx	19h03m49s	+33°50.7'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	approssim. rotonda, molto diffusa, poco più brillante verso l'interno e di Ø inferiore a 1'; è grosso modo situata tra 2 stelline orientate da N a S e distanti 1': quella a N è più luminosa — 380x.
UGC 11398	gx	19h03m11s	+54°05.7'		Cyg	28"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW; una coppia serrata di stelline poco sbilanciata in luminosità si trova a 1' SW; c'è un'altra debole stellina a 1' NNW — 495x.
UGC 11402	gx	19h03m17s	+73°02.6'		Dra	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa e stemperata sul fondo cielo, più che altro disturbata da una stellina brillante a ridosso verso E; in visione distolta pare estesa una 40-ina di secondi, ma è difficile capirne la forma; una debole stellina si trova subito a S — 450x.
UGC 11403	gx	19h06m05s	+40°53.0'		Lyr	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di ~ 45", situata a ridosso S di una stellina abbastanza brillante; rimane tuttavia meglio visibile a 450x.
UGC 11404	gx	19h07m03s	+29°00.4'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	è un diffuso lucore di forma indistinta che si manifesta come un accentuato alone attorno a una stellina abbastanza brillante; in corrispondenza di quest'ultima ci dovrebbe essere il nucleo della gx, in quanto la stellina situata 30" ENE, poco più brillante, presenta un alone minore presenta un alone minore; una terza stellina più debole, situata 40" NNE ne è priva — 380x.
UGC 11406	gx	19h08m19s	+43°04.1'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	è un tenue lucore molto diffuso approssim. circolare, esteso ~ 45"; praticamente delimitato da due stelline abbastanza brillanti orientate da NE a SW; una 3ª stellina più debole si trova quasi a ridosso S della componente di NE — 450x.
UGC 11408	gx	19h09m49s	+41°34.6'		Lyr	24"	buona / buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con bulge poco contrastato; c'è una doppia abbastanza stretta a 1' NW; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11410	gx	19h07m55s	+73°06.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno; in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 11411	gx	19h08m44s	+70°17.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante a 1' verso NE; un piccolo arco di 4 stelline brillanti e orientato da NE a SW si trova a S della gx (la componente più orientale è una doppia stretta e sbilanciata) — 450x.
UGC 11412	gx	19h10m47s	+52°09.0'		Cyg	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; poco disturbata da una stellina brillante situata 1' verso N — 450x.
UGC 11413	gx	19h12m30s	+53°10.1'		Cyg	28"	ottima / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (sono presenti numerose stelline di campo) — 495x.
UGC 11415	gx	19h11m05s	+73°25.6'		Dra	24"	buona / ottimo	è praticamente occultata da una stellina molto brillante sovrapposta; spingendo a 580x si nota in effetti un alone molto tenue che tende leggermente ad aggettare verso S; come confronto c'è una stellina situata a 1' scarso NW che pur essendo di luminosità simile risulta priva di alone.
UGC 11416	gx	19h13m20s	+50°52.8'		Cyg	28"	ottima / m. buono	piccola e debolissima chiazza diffusa, estesa una 20" o poco più, situata a ridosso NW di una stellina abbastanza brillante (questa stellina ha una compagna appena percettibile a SE) — 495x.
UGC 11418	gx	19h14m08s	+40°09.2'		Lyr	24"	buona / buono	debolissimo lucore di forma approssim. circolare e Ø di una 30-ina di secondi; è situata a 1' SW di un trio serrato di stelline allineate da NW a SE; meglio tuttavia non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 11419	gx	19h14m18s	+53°43.8'		Cyg	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni ~ 40"×20"; c'è una stellina molto debole (di 16-esima) a ridosso S e un piccolo triangolo di stelline di luminosità simile a ridosso N; queste stelline tendono a confondere un po' la forma della gx — 495x.
UGC 11420	gx	19h15m32s	+42°54.6'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo E — 450x.
UGC 11421	gx	19h15m33s	+44°06.3'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	è un evidente alone circolare, poco asimmetrico verso S situato attorno a una stella brillante; una stellina più debole si trova a ridosso di questa verso NW; un'altra stellina abbastanza brillante è a ridosso S della gx — 450x.
UGC 11422	gx	19h15m46s	+43°26.4'		Lyr	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole, orientata da WNW a ESE ed estesa ~ 1'; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' WNW; una visibile solo a momenti si trova subito a NE — 450x.
UGC 11423	gx	19h12m33s	+77°56.0'		Dra	24"	buona / buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 45"×30" (ossia estesa e orientata come la coppia di stelline a SW — 450x).
UGC 11426	gx	19h18m22s	+34°50.2'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso SE, mentre una brillante si trova subito a NE — 380x.
UGC 11427	gx	19h15m58s	+72°46.5'		Dra	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata all'incirca da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 11428	gx	19h20m28s	+30°49.5'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
UGC 11430	gx	19h21m08s	+43°19.5'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	debole bolla circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina evidente al bordo NE — 450x.
UGC 11435	gx	19h23m51s	+55°59.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole lama di luce poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa un paio di primi; c'è una stellina al bordo occidentale — 450x.
UGC 11436	gx	19h23m20s	+70°21.3'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale visibile a momenti; una stella brillante situata un paio di primi a E crea un po' di disturbo nell'osservazione — 450x.
UGC 11439	gx	19h27m08s	+43°52.7'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso E — 450x.
UGC 11441	gx	19h22m20s	+81°00.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 11444	gx	19h28m10s	+52°53.7'		Cyg	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" (il campo è ricco di stelline brillanti, soprattutto verso S e SW della gx) — 450x.
UGC 11445	gx	19h28m43s	+56°41.3'		Cyg	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso W — 450x.
UGC 11446	gx	19h29m33s	+41°18.3'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, rotonda con Ø di 45", molto diffusa e con piccolo bulge che a tratti appare poco allungato da N a S — 450x.
UGC 11448	gx	19h30m33s	+35°46.6'		Cyg	16"	m. buona / ottimo	rimane elusiva anche a 380x; appare solo a tratti in visione distolta subito a W di una coppia di stelline appena percettibili distanti una 40-ina di secondi in direzione N-S; la gx non è più estesa di 30".
UGC 11450	gx	19h30m58s	+46°42.8'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
UGC 11455	gx	19h29m57s	+72°06.8'		Dra	24"	buona / buono	debole lama di luce che in visione distolta appare estesa per un paio di primi in direzione NE-SW; presenta una zona centrale leggermente più spessa, ma non più brillante del disco — 450x.
UGC 11462	gx	19h36m29s	+71°21.1'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30", ma occorre scalare a 340x.
UGC 11463	gx	19h38m19s	+61°36.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; un piccolo e debolissimo nodulo esteso non più di 15" appare abbastanza facilmente a ridosso SE: da un controllo successivamente effettuato è risultata essere PGC 2801003 — 450x.
UGC 11464	gx	19h41m26s	+51°49.2'		Cyg	28"	buona / ottimo	diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; allineata ma non equidistante con due stelline a NE — 495x.
UGC 11465	gx	19h41m42s	+50°37.9'		Cyg	28"	buona / ottimo	facile, rotonda con Ø di 45", diffusa e con alto gradiente di luce; presenta un nucleo quasi stellare evidente — 495x.
UGC 11472	gx	19h42m46s	+73°01.3'		Dra	24"	buona / buono	debolissima chiazza diffusa estesa una 30-ina di secondi e situata subito a NE di una coppia di deboli stelline; appare a tratti in visione distolta, ma è preferibile scalere a 340x.
UGC 11475	gx	19h46m41s	+59°42.0'		Dra	28"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso N — 495x.
UGC 11476	gx	19h45m59s	+67°59.3'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, più che altro offuscata da una stellina brillante situata proprio al centro; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 450x.
UGC 11477	gx	19h46m59s	+56°54.6'		Cyg	28"	buona / ottimo	è una debole lama di luce di luminosità uniforme orientata da E a W ed estesa oltre 1'; occorre tuttavia cercar di tenere fuori campo la SAO 32001 di magnitudo 6.7 situata ad appena 4' verso E — 495x.
UGC 11479	gx	19h44m30s	+78°22.6'		Dra	24"	buona / buono	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; c'è una stellina brillante a 1' NNW e una appena percettibile dalla parte opposta.
UGC 11485	gx	19h48m59s	+50°18.8'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, approssim. circolare con Ø di 30"-35" e una condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
UGC 11486	gx	19h49m49s	+50°41.8'		Cyg	28"	buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da E a W, dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge poco contrastato; situata tra due stelline abbastanza brillanti orientate da NW a SE e distanti 1.5' — 495x.
UGC 11487	gx	19h49m25s	+63°30.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, a tratti appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 11492	gx	19h52m40s	+57°27.6'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	debole ovale diffuso e di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni 80"×40"; c'è una doppia serrata a S; meglio evidente a 340x, anche se è più difficoltoso tenere fuori campo la 23 Cyg di 5a grandezza situata 6' a NE.
UGC 11495	gx	19h35m00s	+87°16.5'		UMi	24"	buona / ottimo	è una chiazza circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø con Ø di ~ 45"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso S e un'altra di luminosità simile a 1' SE; un curioso gruppo disperso di una dozzina di stelle allungato da N a S simile a un ammasso aperto si trova una decina di primi a E — 450x.
UGC 11496	gx	19h53m02s	+67°39.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza molto spampanata e di forma indistinta; appare senza difficoltà in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; forse rotonda con Ø di almeno 45".
UGC 11497	gx	19h55m38s	+02°10.9'		Aql	16"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, di luminosità pressoché uniforme; a 380x appare rotonda con Ø max di 30"; il campo è molto ricco di stelline.
UGC 11500	gx	19h57m02s	+50°10.9'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata in mezzo a due stelline orientate da E a W e distanti 1.5' — 450x.
UGC 11501	gx	19h58m37s	+02°36.2'		Aql	16"	ottima / ottimo	è una sorta di elusivo baffo esteso una 30-ina di secondi che in visione distolta, a 380x, si diparte verso SW da una stellina; a 270x questo alone appare poco più esteso e sembra inglobare la stellina.
UGC 11502	gx	19h57m46s	+52°52.8'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e con una condensazione centrale piccola ed evidente; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11503	gx	19h58m42s	+50°02.2'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale evidente; situata tra 2 stelline (una 3a più debole è quasi a ridosso verso E) — 340x.
UGC 11505	gx	20h02m28s	+01°38.9'		Aql	24"	buona / buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline molto deboli a ridosso della gx verso N — 400x.
UGC 11508	gx	20h02m02s	+53°48.0'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente, in un campo abbastanza ricco di stelline, a 1' N di una stellina molto brillante; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, ma la visione è meglio definita scalando a 340x; c'è una debole stellina subito a S (fa parte di un piccolo quadrato in po' irregolare).
UGC 11509	gx	20h01m50s	+57°01.6'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	debole gx diffusa di aspetto uniforme, "schiacciata" tra due stelline brillanti orientate da N a S e distanti una 30-ina di secondi; meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 11510	gx	20h02m56s	+53°53.1'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; disturbata dalla SAO 32232 di 8a grandezza, ma nonostante questo sembra meglio definita scalando a 340x.
UGC 11512	gx	20h04m34s	+12°44.3'		Aql	16"	buona / buono	molto debole e immersa in un campo abbastanza ricco; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 50"×25" — 270x.
UGC 11515	gx	20h04m57s	+62°47.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø che in visione distolta arriva a 45"-50" e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso NW e una poco più distante e brillante a NE — 450x.
UGC 11516	gx	20h07m53s	−00°15.5'		Aql	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta a 450x, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso ESE; c'è un piccolo triangolo di stelline brillanti a SE che costituisce un comodo riferimento — 450x.
UGC 11517	gx	20h08m36s	+05°57.3'		Aql	24"	m. buona / ottimo	è un debolissimo baffo che aggetta verso E da una stellina brillante per meno di 30"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x (di fatto risulta meglio visibile a 580x).

UGC 11518	gx	20h08m21s	+15°00.8'		Aql	24"	m. buona / discreto	è un debolissimo lucore diffuso e di forma indistinta, situato a ridosso N di una stellina brillante; solo a momenti appare poco allungata da E a W, ma solo in visione distolta e scalando a 340x (il campo è molto ricco di stelline anche luminose che confondono un po' la visione).
UGC 11521	gx	20h10m54s	+02°08.2'		Aql	24"	buona / buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale poco contrastata sul disco — 400x.
UGC 11522	gx	20h11m49s	+05°45.8'		Aql	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 450x.
UGC 11523	gx	20h12m00s	+05°31.1'		Aql	24"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 450x.
UGC 11524	gx	20h12m04s	+05°45.8'		Aql	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti orientate da E a W — 450x .
UGC 11525	gx	20h12m18s	+01°57.5'		Aql	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1.5' — 450x.
UGC 11526	gx	20h13m36s	+07°16.9'		Aql	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; ci sono 3 stelline brillanti quasi allineate ed equidistanti a ridosso verso E — 450x.
UGC 11527	gx	20h13m54s	−01°09.5'		Aql	24"	buona / buono	quasi un edge-on, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×20" — 400x.
UGC 11529	gx	20h13m19s	+66°17.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, con una stellina abbastanza brillante al centro che confonde l'osservazione; in pratica da quest'ultima si dipartono 2 baffi molto tenui: quello a S è appena più evidente; quello a N arriva a lambire una stellina appena percettibile situata subito a E — 450x.
UGC 11532	gx	20h16m43s	+07°23.8'		Aql	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e con tenue nucleo stellare, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 11535	gx	20h17m21s	+05°14.4'		Aql	24"	m. buona / ottimo	appare piuttosto elusivamente a ridosso N di una debole stellina (una stellina brillante si trova invece subito a E); risulta visibile solo a 580x, ma non sembra più estesa di 20".
UGC 11536	gx	20h12m51s	+79°24.4'		Cep	24"	buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale marcata (a prima vista sembra una stellina sovrapposta); c'è una stellina brillante quasi a ridosso NW che disturba un po' l'osservazione — 450x.
UGC 11537	gx	20h18m38s	−00°09.0'		Aql	24"	buona / buono	nella posizione riportata si vedono 2 stelline brillanti, distanti una 30-ina di secondi e orientate da E a W, che in visione distolta appaiono immerse in una tenuissima chiazza lattescente; questa si estende a E e a W delle stelline per una lunghezza totale di ~ 1.5' — 400x.
UGC 11539	gx	20h18m31s	+62°41.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 40" e nucleo stellare poco contrastato; c'è una stellina a ridosso N e una appena percettibile dalla parte opposta; un'altra stellina si trova subito a SE — 450x.
UGC 11541	gx	20h22m26s	+00°17.6'		Aql	24"	buona / m. buono	debolissimo lucore di forma indistinta, appare solo a momenti in visione distolta a E di una stellina; sembra esteso meno di 1', ma occorre restare a 450x per tenere fuori campo la SAO 125739 (è in realtà una doppia stretta) situata 5' a SE della galassia.
UGC 11543	gx	20h22m39s	+09°35.1'		Del	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NW; situata tra 2 stelline brillanti distanti 4' e orientate da NW a SE — 450x.
UGC 11547	gx	20h21m57s	+60°42.6'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza rotondeggiante con Ø di una 30-ina di secondi situata a 1' SW di una stellina brillante; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 11549	gx	20h24m22s	+07°10.7'		Del	24"	ottima / m. buono	molto debole, ma più che altro disturbata da una stella brillante situata a ridosso verso SE; a 450x, in visione distolta, appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×15".
UGC 11551	gx	20h24m36s	+06°54.6'		Del	24"	ottima / m. buono	debole lama di luce orientata da E a W, poco diffusa e di luminosità uniforme che in visione distolta si estende per oltre 1' — 450x.
UGC 11552	gx	20h24m36s	+12°26.6'		Del	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; è contornata da deboli stelline situate a ridosso della galassia; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 11555	gx	20h25m12s	+05°15.8'		Del	24"	ottima / m. buono	debole e molto diffusa, solo a momenti appare più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40"; meglio contrastata scalando a 340x (il campo è molto ricco).
UGC 11557	gx	20h24m01s	+60°11.7'	q 55	Cep	16"	buona / m. buono	è un debolissimo lucore, molto diffuso, di forma grosso modo circolare e con Ø di ~ 1.5' che appare però solo in visione distolta; è situato 2.5' o 3' a NE di una stellina brillante — 380x.
UGC 11559	gx	20h26m10s	+01°09.4'		Aql	24"	buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale marcata; ci sono due stelline abbastanza brillanti a ridosso S e NE — 450x.
UGC 11561	gx	20h26m38s	+02°38.5'		Del	16"	ottima / ottimo	rotonda, molto diffusa, poco più brillante verso l'interno e con Ø di ~ 45"; è situata tra 2 stelline distanti 1.5' e orientate da E a W; meglio visibile a 380x.
UGC 11562	gx	20h26m42s	+02°41.7'		Del	16"	ottima / ottimo	più debole di UGC 11561 e di luminosità più uniforme, pure rotonda e di dimensione simile, con Ø di 40"-45" — 380x.
UGC 11564	gx	20h27m39s	+10°45.4'		Del	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa per oltre 1'; è disturbata da un piccolo triangolo isoscele schiacciato di stelline abbastanza brillanti situato a ridosso SW; una stellina debole si trova a 1' scarso SE; una coppia serrata di stelline appena percettibili si trova invece poco più di 1' a E della gx.
UGC 11565	gx	20h28m03s	+04°57.8'		Del	24"	buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x; è molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15".
UGC 11566	gx	20h28m12s	+00°17.3'		Aql	16"	ottima / ottimo	debole baffo di luminosità uniforme, di dimensioni ~ 45"×30" che si diparte verso SW da una stellina — 380x.
UGC 11567	gx	20h28m10s	+00°28.4'		Aqr	16"	ottima / ottimo	bolla circolare molto debole, diffusa, luminosità uniforme e di una 40-ina di secondi di Ø — 380x.
UGC 11568	gx	20h28m19s	+10°45.3'		Del	16"	buona / buono	fa parte di un quartetto assieme a UGC 11569, 11571 e 11572 — debolissima e diffusa, ma appare senza difficoltà in visione distolta a 270x; è molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×30".
UGC 11569	gx	20h28m45s	+10°37.8'		Del	16"	buona / buono	è un'elusiva e piccola chiazza circolare estesa ~ 30" che appare solo a tratti a 380x a una 30-ina di secondi SW di una stellina.
UGC 11571	gx	20h29m02s	+10°40.7'		Del	16"	buona / buono	si trova lungo l'ipotenusa di un piccolo triangolo rettangolo allungato, ma è debolissima e appare solo a tratti in visione distolta a 270x (a 380x sparisce); è comunque estesa oltre 1.5'.
UGC 11572	gx	20h29m10s	+10°44.6'		Del	16"	buona / buono	fa parte di un quartetto assieme alle 3 precedenti — è la più facile delle 4, una piccola chiazza rotonda di 30" di Ø relativamente compatta; ci sono 2 stelline a ridosso: una S e l'altra a NW — 270x.
UGC 11575	gx	20h30m08s	+03°03.0'		Del	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; situata tra due debolissime stelline orientate da E a W: è più vicina a quella W — 400x.
UGC 11576	gx	20h30m21s	−01°00.5'		Aql	24"	buona / buono	debole e molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso e nucleo stellare — 400x.
UGC 11577	gx	20h30m35s	+01°22.5'		Aql	16"	m. buona / buono	debole chiazza lattescente molto diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1' verso W; meglio visibile a 270x.
UGC 11578	gx	20h30m43s	+09°11.5'		Del	24"	buona / ottimo	debolissimo lucore approssim. circolare ed esteso forse una 40-ina di secondi; appare solo in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 11579	gx	20h30m55s	−00°38.9'		Aql	24"	buona / buono	è una debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per oltre 1' — 400x.
UGC 11581	gx	20h31m02s	−01°56.1'		Aql	24"	buona / buono	debole, diffusa e leggermente più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 11583	gx	20h30m16s	+60°26.6'		Cep	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto allungata da E a W, con dimensioni grosso modo di 90"×30"; appare con una certa difficoltà in visione distolta perché il campo è molto ricco di stelle; la visione non migliora, né peggiora passando da 340x a 450x e viceversa; forse il contrasto maggiore si ottiene scalando a 210x.
UGC 11584	gx	20h31m49s	+01°32.6'		Aql	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e relativamente compatta, orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso; in visione distolta pare più affusolata verso NE, dalla parte opposta c'è una stellina al bordo che ne altera un poco la visione — 450x.
UGC 11585	gx	20h32m16s	−02°14.9'		Aql	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una doppia stretta dalle componenti molto sbilanciate a ridosso verso S — 380x.
UGC 11586	gx	20h32m12s	+04°50.6'		Del	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, disturbata da una stella brillante a ridosso verso SW, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 11587	gx	20h32m19s	+11°22.0'		Del	16"	buona / buono	è allungata da N a S, gradatamente più brillante verso l'interno, con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 270x.
UGC 11591	gx	20h33m19s	+01°45.6'		Aql	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, con lievi discrepanza di luce all'interno osservabili a 450x, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30".
UGC 11593	gx	20h34m42s	+07°59.4'		Del	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di 30" scarsi; c'è una stellina a ridosso verso SW — 400x.
UGC 11594	gx	20h34m36s	+12°56.8'		Del	24"	buona / ottimo	lama di luce molto debole estesa 1' in direzione NE-SW; c'è una doppia stretta subito a NE (sul prolungamento dell'asse della gx); una stellina molto debole si trova a ridosso verso S — 450x.
UGC 11595	gx	20h35m05s	+01°56.3'		Aql	24"	buona / buono	debolissima lama di luce che solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S ed estesa per ~ 1'; forse poco meglio evidente scalando a 340x.
UGC 11596	gx	20h35m44s	+01°22.0'		Aql	16"	m. buona / buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 380x quasi a ridosso NE di una stellina; è estesa sì e no una 30-ina di secondi.
UGC 11598	gx	20h36m28s	+13°26.1'		Del	24"	buona / buono	debolissimo lucore molto stemperato su un fondo molto ricco di stelline (una di queste si trova proprio al margine N); esteso meno di 1' ed è meglio visibile a 400x (a 200x resta un po' ... soffocata dal fondo cielo.
UGC 11599	gx	20h36m34s	+11°29.7'		Del	16"	buona / buono	molto diffusa, rotonda, con bulge poco più luminoso del disco; in visione distolta a 270x appare con un Ø di ~ 1.5'.
UGC 11601	gx	20h38m01s	−02°02.3'		Aql	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce osservabile in visione distolta, orientata da NE a SW (come la coppia di stelle brillanti a SE) ed estesa ~ 45" — 450x.
UGC 11602	gx	20h37m55s	+10°37.9'		Del	24"	buona / discreto	rotonda con Ø di 45", molto diffusa e con nucleo quasi stellare brillante; c'è una stellina appena percettibile al margine NW; altre due stelline più evidenti si trovano rispettivamente subito a N e a W (nonostante la presenza di un debole chiarore lunare, la descrizione è praticamente identica a quella di un'osservazione effettuata alcuni anni fa in condizioni di cielo simili senza Luna) — 450x.
UGC 11603	gx	20h36m14s	+63°44.4'		Cep	28"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; situata in mezzo a 2 stelline orientate da ENE a WSW (quella a WSW è debole); una stella brillante si trova un paio di primi a W — 495x.
UGC 11605	gx	20h39m21s	+10°48.3'		Del	24"	buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di 45", e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante al bordo meridionale — 400x.
UGC 11606	gx	20h39m46s	+01°04.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima e, come se non bastasse, immersa nel bagliore della SAO 126072 di magnitudo 8.8 che fa coppia con la SAO 126075 di 9.4 situata 2' a ENE (entrambe riportate sulla Uranometria); appare solo in visione distolta, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×20"; in pratica ciò che si nota è una sorta di prolungamento verso S dell'alone stellare; a nord delle 2 stelle c'è una stringa di 5 stelline allineate ed equidistanti con luminosità crescente: quella mediana è una doppia stretta — 340x.
UGC 11607	gx	20h39m45s	+02°01.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, con tenue bulge diffuso, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso verso N e un'altra molto debole al bordo meridionale — 340x.
UGC 11610	gx	20h40m05s	+07°15.6'		Del	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stella brillante a 1' verso W — 400x.
UGC 11611	gx	20h40m32s	+14°16.5'		Del	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" — 400x.
UGC 11612	gx	20h40m52s	+00°39.2'		Aqr	24"	buona / ottimo	lama di luce molto debole, estesa per 1' e orientata da NE a SW; appare facilmente in visione distolta, ma è preferibile non scendere sotto i 450x.
UGC 11613	gx	20h39m44s	+63°35.9'		Cep	28"	m. buona / discreto	è un'elusiva lama di luce orientata da NW a SE, ma appare solo a momenti in visione distolta, estesa forse una 40-ina di secondi; situata sul lato SE di un trapezio orientato da NE a SW formato da 4 stelline — 495x.
UGC 11614	gx	20h41m30s	+13°04.4'		Del	24"	m. buona / ottimo	lama di luce relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, estesa per 1' e orientata da ENE a WSW — 450x.
UGC 11616	gx	20h41m13s	+63°30.7'		Cep	28"	m. buona / discreto	debolissima chiazza molto spampanata, di forma indistinta ed estesa sì e no una 40-ina di secondi: sembra infatti compresa tra 2 stelline molto deboli orientate da NW a SE — 495x.
UGC 11617	gx	20h43m39s	+14°17.9'		Del	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza molto piccola e diffusa che sembra aggettare a NE di una stellina: quest'ultima è la più brillante di un mini asterismo formato da 4 stelline di cui 3 allineate; la gx non è più estesa di 20", ma è meglio evidente spingendo a 580x.
UGC 11620	gx	20h44m10s	+12°25.1'		Del	24"	buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW (come le 2 stelline quasi a ridosso verso SE) con dimensioni 30"×20" — 400x.
UGC 11622	gx	20h44m37s	−01°43.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso NW — 340x.
UGC 11623	gx	20h44m27s	+12°29.9'		Del	24"	buona / buono	molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta a 400x, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale visibile a tratti.
UGC 11631	gx	20h48m00s	−00°10.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15", poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a ridosso verso W — 450x.
UGC 11634	gx	20h48m17s	+16°43.6'		Del	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W; forma una coppia ravvicinata con MAC 2048+1643 a S (v. voce corrispondente) — 450x.
UGC 11632	gx	20h46m09s	+69°17.3'		Cep	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti circa della stessa luminosità a una decina di primi SW; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11635	gx	20h43m29s	+80°09.4'		Cep	24"	buona / buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30" e con bulge poco contrastato sul disco — 450x.
UGC 11636	gx	20h47m27s	+64°28.8'		Cep	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza diffusa, forse circolare con Ø di una 40-ina di secondi, allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a SW; non sembra meglio definita scalando a 340x.
UGC 11638	gx	20h49m36s	+16°51.9'		Del	24"	ottima / ottimo	chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare visibile a tratti, grosso modo rotonda con Ø di 1'; c'è una coppia stretta di stelline brillanti verso il bordo orientale e una più debole a quello opposto — 450x.
UGC 11639	gx	20h49m51s	+06°13.2'		Del	16"	buona / buono	presenta un piccolo nucleo relativamente brillante circonfuso da una tenuissimo alone molto stemperato; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø max di 40" — 270x.
UGC 11642	gx	20h48m55s	+70°13.9'		Cep	24"	m. buona / discreto	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1'; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
UGC 11643	gx	20h51m26s	+18°58.1'		Del	16"	buona / m. buono	debole, di aspetto un po' confuso, estesa 23"-30" e leggermente condensata; è situata all'interno di un piccolo triangolo: la componente a NNE è la più brillante ed è una doppia stretta — 380x.
UGC 11644	gx	20h53m02s	+07°09.6'		Del	24"	buona / buono	debolissima lama di luce estesa 1' scarso e orientata da N a S; appare a 400x in visione distolta; c'è un piccolo trapezio sbilenco di stelline a NE.
UGC 11645	gx	20h53m25s	+00°39.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti — 450x.
UGC 11646	gx	20h54m04s	+00°46.6'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 11647	gx	20h54m12s	+17°46.7'		Del	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa per ~ 1'; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina appena percettibile al bordo S; una doppia molto stretta e sbilanciata si trova subito a E; altra stellina alla stessa distanza verso W.
UGC 11648	gx	20h53m10s	+67°10.5'		Cep	28"	m. buona / discreto	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 495x.
UGC 11649	gx	20h55m28s	−01°13.5'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza rotonda molto diffusa, con Ø di 45" e con piccola condensazione centrale visibile a tratti a 380x *(presenza di chiarore lunare)*.
UGC 11650	gx	20h56m28s	+12°02.5'		Del	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare estesa per ~ 1' e orientata da NW a SE; situata a W di un piccolo arco formato da 3 stelline abbastanza brillanti: la componente più orientale è una doppia serrata — 450x.
UGC 11651	gx	20h57m15s	+25°58.1'		Vul	16"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30" e di luminosità uniforme; è situata in un campo stellare molto ricco — 270x.
UGC 11652	gx	20h57m31s	+14°14.6'		Del	24"	ottima / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N (la quale fa parte di una piccola losanga di stelline di luminosità simile — 450x.
UGC 11653	gx	20h57m29s	+18°47.8'		Del	24"	buona / buono	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e assai stemperata sul fondo cielo, disturbata da una stellina brillante situata subito a SE; c'è una coppia di deboli stelline a ridosso NE (quella più a E è appena percettibile); poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 11656	gx	20h59m05s	+11°16.9'		Equ	24"	buona / ottimo	elusiva lama di luce orientata da N a S che salta fuori solo a momenti in visione distolta tra due stelline distanti 1' in direzione E-W; non sembra più estesa di 30" — 450x.
UGC 11657	gx	20h59m47s	−01°53.3'		Aqr	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, forse rotonda con Ø di 30"-35" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 11658	gx	20h59m48s	−01°52.4'		Aqr	16"	ottima / ottimo	più debole appare a tratti in visione distolta a NE di UGC 11657; rotonda con Ø non superiore a 20"; ogni tanto, osservando a 380x, appare tra le 2 un'elusiva stellina *(è sorta la Luna)*.
UGC 11659	gx	21h00m05s	+09°35.0'		Equ	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo alone, molto stemperato sul fondo cielo ed esteso una 30-ina che circonda una stellina brillante; (per confronto a 4' scarsi ESE ce n'è una di luminosità simile che ne è priva); una stellina più debole si trova a 1' verso S — 380x.
UGC 11661	gx	21h00m26s	+16°51.6'		Del	16"	buona / buono	molto debole, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40"; potrebbe darsi, tuttavia, che l'allungamento sia un effetto prodotto da una stellina appena percettibile situata al margine occidentale; un'altra debole stellina si trova subito a SE — 270x.
UGC 11664	gx	20h54m08s	+84°04.9'		Cep	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, a tratti appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
UGC 11665	gx	21h02m18s	+07°25.9'		Equ	24"	buona / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; è un baffo di luce orientato da E a W ed esteso non e una 30-ina di secondi situato a ridosso SW di una stellina.
UGC 11666	gx	21h02m17s	+15°07.9'		Del	24"	buona / buono	molto debole e disturbata da una stellina situata al bordo SW; è estesa una 30-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità uniforme — 400x.
UGC 11669	gx	21h03m04s	+13°10.6'		Del	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta quasi a ridosso verso W e una stellina appena percettibile subito a S — 400x.
UGC 11671	gx	21h04m34s	+09°39.7'		Equ	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, con condensazione centrale appena accennata; purtroppo è molto disturbata da una stella brillante situata all'interno della gx verso NW; è grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
UGC 11672	gx	21h04m29s	+16°05.0'		Del	16"	ottima / ottimo	debole, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×50", diffusa e poco più brillante all'interno; a tratti appaiono delle discrepanze di luce e sembra proprio di vedere un 2° nucleo quasi a ridosso verso W, anche se elusivo; questo appartiene effettivamente alla MAC 2104+1605 con la quale forma una coppia serrata; la visione è meglio contrastata spingendo a 380x.
UGC 11675	gx	21h05m55s	+07°40.6'		Equ	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a N della gx e una debole doppia serrata a poco più di 1' sempre verso N — 400x.
UGC 11676	gx	21h05m50s	+18°28.1'		Del	16"	buona / m. buono	molto debole, allungata da N a S con dimensioni 40"×20", diffusa e con piccola condensazione centrale; c'è un piccolo triangolo serrato di stelline deboli a 1.5 NE — 380x.
UGC 11678	gx	21h05m07s	+66°46.5'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole chiazza molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso NW, mentre un'altra si trova a 1' scarso verso E; c'è poi una percettibile solo a momenti all'interno della gx, poco decentrata verso NW — 450x.
UGC 11680	gx	21h07m41s	+03°52.3'		Equ	24"	discreta / buono	è una chiazza diffusa di aspetto regolare e di luminosità uniforme; facile da vedere a 450x; c'è una doppia stretta dalle componenti simili a 1' verso S.
UGC 11682	gx	21h08m23s	+17°49.2'		Cyg	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" con bulge piccolo e marcato; a tratti, in visione distolta, appare una stellina a ridosso del bulge verso S, ma va e viene anche a 380x.
UGC 11683	gx	21h08m27s	+18°11.4'		Del	16"	buona / buono	elusiva, appare solo a tratti, poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×20", ma occorre scalare a 270x perché è molto stemperata; c'è una doppia stretta subito a SSE.
UGC 11685	gx	21h09m11s	−01°47.9'		Aqr	24"	buona / buono	è una lama di luce molto debole, di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W ed estesa oltre 1' — 450x.
UGC 11686	gx	21h08m07s	+65°44.4'		Cep	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza di forma indistinta, estesa 30"-40" che appare solo a momenti a ridosso W di una stellina; un'altra stellina di luminosità simile si trova poco più distante verso W; la gx pare appena più evidente restando a 450x.
UGC 11688	gx	21h11m12s	+04°24.0'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e poco diffusa, solo a momenti leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; non sembra particolarmente disturbata dalla SAO 126602 di 10ª grandezza situata a meno di 2' SE — 450x.
UGC 11689	gx	21h09m37s	+66°10.2'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11694	gx	21h11m52s	+11°16.6'		Equ	16"	ottima / ottimo	è un alone diffuso e lattiginoso esteso una 40-ina di secondi che circonda una stellina brillante (quest'ultima forma un triangolo isoscele perfetto con altre 2 stelline di luminosità simile); meglio contrastata a 270x.
UGC 11695	gx	21h12m10s	−01°28.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 11697	gx	21h12m10s	+11°39.5'		Equ	24"	m. buona / m. buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20", diffusa e con tenue condensazione centrale quasi stellare — 400x.
UGC 11698	gx	21h12m14s	+13°01.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	si separa abbastanza facilmente da CGCG 426-17, alla quale si trova a ridosso verso W, appare molto piccola e condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 380x.
UGC 11699	gx	21h12m21s	+12°36.8'		Peg	24"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta a 400x, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
UGC 11700	gx	21h12m25s	+11°24.5'		Equ	24"	ottima / buono	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina al bordo NW — 450x.
UGC 11706	gx	21h14m22s	+15°14.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1.5' e che in visione distolta pare delimitata da 2 stelline ai bordi NE e SW — 450x.
UGC 11707	gx	21h14m32s	+26°44.1'	q 165	Vul	16"	ottima / buono	è un debolissimo lucore di forma indistinta, forse rotondo ed esteso, direi, almeno 1'; è comunque osservabile senza difficoltà in visione distolta — 270x.
UGC 11713	gx	21h17m28s	+15°34.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	elusiva, appare solo in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; a tratto appare allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso SW.
UGC 11714	gx	21h17m46s	+02°22.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 11715	gx	21h17m48s	+13°35.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa sì e no 40" in direzione E-W; appare abbastanza facilmente in visione distolta tra due stelline abbastanza brillanti orientate da N a S; la visione è però un po' disturbata dalla SAO 107000 di 9a grandezza situata 3' a S — 450x.
UGC 11716	gx	21h17m42s	+25°57.8'		Vul	24"	ottima / m. buono	elusiva, appare soltanto in visione distolta subito a E di una stellina brillante che tende a cancellarla; non dovrebbe comunque essere più estesa di 20"; meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 11717	gx	21h18m35s	+19°43.1'		Peg	16"	buona / m. buono	è un elusivo oggetto di forma indistinta, ma comunque non più esteso di una 20-ina di secondi, molto disturbato da una stella situata a ridosso verso N; c'è una stellina appena percettibile subito a W, mentre un'altra debolissima si nota a S della gx — 380x.
UGC 11719	gx	21h18m53s	+15°40.8'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debolissima, purtroppo disturbata da una stellina situata a ridosso verso E; in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; 2 stelline brillanti, 1.5' NW e 1.5' SW, ne disturbano la visione; anche se il seeing non lo consente è meglio forzare a 450x.
UGC 11720	gx	21h19m15s	+06°01.3'		Equ	16"	ottima / ottimo	chiazza rotondeggiante, molto debole, e di luminosità uniforme con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata a 270x; c'è una coppia di stelline deboli subito a E; un piccolo triangolo serrato di stelline brillanti si trova invece 4' a SW.
UGC 11721	gx	21h19m27s	+14°03.4'		Peg	24"	ottima / buono	debole lama di luce facile da vedere, orientata da N a S per 1' e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E; un'altra stellina si trova a 1' scarso verso W — 340x.
UGC 11722	gx	21h19m38s	+21°58.3'		Vul	16"	buona / m. buono	molto debole, allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con bulge appena percettibile a 380x.
UGC 11723	gx	21h20m18s	−01°41.0'		Aqr	16"	m. buona / buono	debolissima lama di luce estesa forse 1', orientata da NE a SW e che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x subito a W di una stellina molto debole.
UGC 11724	gx	21h20m38s	+01°02.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce che nondimeno si osserva abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, estesa ~ 1' e orientata da NW a SE; c'è una doppia stretta con componenti molto deboli a poco più di 1' verso NE.
UGC 11725	gx	21h21m02s	+09°10.7'		Equ	24"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x; c'è una stellina a 1' verso S.
UGC 11728	gx	21h21m07s	+26°16.1'		Vul	16"	buona / m. buono	debolissima bolla circolare molto diffusa con Ø i 30" e di luminosità uniforme; bisogna tenere fuori campo la SAO 89636 arancione di 7ª grandezza — 380x.
UGC 11733	gx	21h22m01s	+07°08.7'		Equ	24"	m. buona / mediocre	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa ~ 45"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
UGC 11735	gx	21h22m39s	+15°16.9'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo, diffuso, poco più brillante all'interno e con Ø di 30" — 380x.
UGC 11736	gx	21h22m46s	+03°31.0'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a E — 450x.
UGC 11738	gx	21h16m58s	+83°49.3'		Cep	24"	buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina brillante a SW e una appena percettibile subito a NE — 450x.
UGC 11740	gx	21h26m14s	+09°47.9'		Equ	16"	ottima / ottimo	debolissima, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con bulge diffuso visibile solo a tratti; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline molto deboli a ridosso verso N: il cateto maggiore è orientato come l'asse maggiore della gx — 380x.
UGC 11749	gx	21h28m48s	+20°30.7'		Peg	16"	m. buona / buono	è un debolissimo alone esteso una 40-ina di secondi che circonda asimmetricamente verso N una stellina (per confronto la stellina situata ~ 1' verso E, anche se poco più debole, ne è privo) — 270x.
UGC 11751	gx	21h29m00s	+11°23.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a meno di 1' verso W — 380x.
UGC 11754	gx	21h29m31s	+27°19.3'		Vul	16"	buona / buono	è un'elusiva chiazza rotonda di 30" di Ø, molto stemperata sul fondo cielo e osservabile solo a tratti a 270x.
UGC 11758	gx	21h30m58s	+13°59.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa per oltre 1' — 450x.
UGC 11760	gx	21h31m40s	+02°27.1'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo; appare solo a tratti in visione distolta, meglio a 380x; ci sono 2 stelle brillanti a N e NE.
UGC 11761	gx	21h31m42s	+34°31.7'		Cyg	16"	m. buona / ottimo	nella posizione riportata dal POSS si vede solo una stellina brillante; o si tratta di un errore o la gx è piccolissima e completamente nascosta dalla stella — 380x.
UGC 11765	gx	21h33m33s	+08°46.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma facilmente visibile in visione distolta, allungata da E a W con dimensioni 50"×25" e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 400x.
UGC 11769	gx	21h34m22s	+26°21.3'		Vul	16"	buona / ottimo	debolissima e molto disturbata dalla SAO 89804 di magnitudo 8.7 situata ad appena 1' NW; in visione distolta appare a tratti allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 11770	gx	21h34m59s	+01°27.3'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
UGC 11773	gx	21h36m07s	+09°39.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e molto allungata da NE a SW, con dimensioni 45"×15" e nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 400x.
UGC 11775	gx	21h35m48s	+35°21.0'		Cyg	16"	m. buona / ottimo	è un alone grosso circolare, con una piccola condensazione centrale appena evidente a 380x, che si diparte a NW di una stellina abbastanza brillante.
UGC 11776	gx	21h36m23s	+12°14.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×10"; c'è una debole stellina a 1' scarso verso NW — 450x.
UGC 11780	gx	21h37m02s	+00°25.7'		Aqr	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, solo a tratti appare allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; meglio osservabile a 340x.
UGC 11781	gx	21h36m39s	+35°41.7'		Cyg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma con gradiente molto basso, poco allungata ~ da NE a SW con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina a poco più di 1' NE (sul prolungamento dell'asse) — 380x.
UGC 11782	gx	21h38m09s	+08°57.6'	q 211	Peg	16"	buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, ma facilmente visibile anche in visione diretta; solo a tratti in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina verso il bordo meridionale d'aspetto stranamente diffuso — 270x.
UGC 11785	gx	21h39m27s	+02°49.6'		Aqr	24"	buona / buono	debolissima lama di luce estesa per ~ 1' in direzione NE-SW, poco più spesa al centro e con una stellina a ridosso verso NW — 450x.
UGC 11787	gx	21h40m04s	+25°02.5'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, con nucleo stellare, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
UGC 11788	gx	21h40m26s	+25°10.1'		Peg	24"	ottima / buono	debolissimo oggetto esteso una 20-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SW e un'altra debole più o meno alla stessa distanza verso E — 450x.
UGC 11789	gx	21h41m00s	+01°20.1'		Aqr	16"	m. buona / buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme che salta fuori in visione distolta, estesa una 30-ina di secondi, ma di forma indistinta; molto disturbata da una coppia di stelle brillanti, situate 2.5' SE, che fanno parte di un piccolo asterismo foggiato a triangolo rettangolo — 380x.
UGC 11790	gx	21h41m30s	+00°53.7'		Aqr	16"	m. buona / buono	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e molto stemperata sul fondo cielo, con Ø di ~ 1'; è meglio contrastata a 188x; c'è una stellina a 1' verso E.
UGC 11792	gx	21h42m13s	+05°36.9'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW; la gx è disturbata dalla 7 Pegasi di 5ª grandezza situata a meno di 4' verso N — 450x.
UGC 11793	gx	21h41m59s	+22°42.8'		Peg	16"	buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø i 30"-40" (difficile da stabilire in quanto molto stemperata sul fondo cielo); c'è una stellina quasi a ridosso NE e un'altra appena percettibile al bordo settentrionale; meglio scalare a 270x.
UGC 11803	gx	21h44m29s	+14°54.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una coppia di stelline a N di cui una a ridosso della gx; appare poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11809	gx	21h46m38s	+08°17.6'		Peg	24"	buona / buono	poco diffusa, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina evidente al bordo N — 450x.
UGC 11814	gx	21h48m26s	−01°40.4'		Aqr	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina 1' verso S e un'altra più debole 1.5' NW — 380x.
UGC 11816	gx	21h49m07s	+00°26.9'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø forse > 1'; tutto sommato è meglio visibile a 380x.
UGC 11818	gx	21h47m16s	+72°28.3'		Cep	24"	buona / buono	debole chiazza circolare di luminosità uniforme, molto stemperata sul fondo cielo e con Ø di 1' scarso; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11820	gx	21h49m28s	+14°13.9'		Peg	24"	ottima / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta, ma è stranamente meglio visibile a 450x, grosso modo rotonda con Ø di 40"-45".
UGC 11821	gx	21h49m35s	+15°47.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è una piccola lama di luce relativamente facile, ma molto disturbata dalla SAO 107415 di 6ª grandezza situata ad appena 4' SW; è orientata da E a W ed estesa ~ 1' — 400x.
UGC 11823	gx	21h50m00s	+34°56.9'		Peg	16"	buona / buono	io la vedo stellare anche a 380x! C'è una debole stellina ~ 30" NE e una relativamente brillante a 1' verso W.
UGC 11825	gx	21h50m42s	+00°54.7'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso E; alla stessa distanza verso NW notasi un piccolo oggetto diffuso appena percettibile a 450x: quest'ultimo, da un controllo effettuato successivamente, è risultato essere MAC 2150+0055.
UGC 11827	gx	21h50m41s	+22°51.1'		Peg	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; è situata tra 2 stelline, a E e a W — 450x.
UGC 11828	gx	21h51m05s	+02°46.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso SW — 450x.
UGC 11830	gx	21h51m07s	+25°51.8'		Peg	16"	buona / m. buono	è un debolissimo lucore rotondo esteso poco più di 30" e che in visione distolta sembra aggettare verso E da una stellina (la più meridionale di 3 stelline poste a arco) — 380x.
UGC 11832	gx	21h51m44s	+11°34.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	appare in visione distolta come una debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per ~ 45"; ci sono 2 stelline molto deboli a SSW e a S allineate con una terza più brillante a SE e distante un paio di primi dalla gx — 450x.
UGC 11834	gx	21h51m44s	+25°15.3'		Peg	16"	buona / buono	è un debole alone rotondo con Ø inferiore a 1' che circonda una stellina brillante; l'alone è poco decentrato verso N — 270x.
UGC 11837	gx	21h52m13s	+36°06.0'		Peg	24"	ottima / molto buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina al bordo NW e una più debole a ridosso W (queste due stelline tendono a prima vista a confonderne la forma) — 450x.
UGC 11838	gx	21h52m36s	+28°18.3'		Peg	24"	ottima / molto buono	lama di luce molto debole ed estesa almeno 1' in direzione NNE-SSW; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
UGC 11839	gx	21h52m40s	+36°27.7'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole, a tratti appena più brillante all'interno, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10"; è situata tra una doppia stretta a NW e una stellina a SE; un'altra stellina si trova quasi a ridosso verso NE — 450x.
UGC 11840	gx	21h53m18s	+04°14.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, estesa max 20", probabilmente rotonda; salta fuori in visione distolta quando si osserva la stellina situata a poco più di 1' verso S — 450x.
UGC 11845	gx	21h54m28s	+15°01.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta tra due stelline orientate da N a S — 450x.
UGC 11846	gx	21h54m45s	+06°25.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 400x.
UGC 11849	gx	21h55m40s	+24°53.9'		Peg	16"	buona / buono	debolissima, diffusa, a tratti in visione distolta appare allungata ~ da E a W con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina sul prolungamento dell'asse verso W, a un paio di primi dalla gx — 270x.
UGC 11851	gx	21h55m59s	+05°54.8'		Peg	24"	m. buona / mediocre	diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 50"×40" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso S. Ha una compagna molto piccola subito a NE, la MAC 2156+0554, che pur essendo debolissima salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; è relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 20"×10".
UGC 11852	gx	21h55m39s	+27°53.9'		Peg	16"	buona / buono	debole, ma relativamente facile, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40", con bulge diffuso; c'è una doppia stretta a 2' W; stellina debole a 1' verso E e un'altra visibile solo a 380x verso SE; la gx è però meglio contrastata a 270x.
UGC 11853	gx	21h56m18s	−01°10.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" (poco meno della distanza delle 2 stelline brillanti situate a E) — 340x.
UGC 11854	gx	21h56m30s	+15°56.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una debolissima stellina a SW che a sua volta è allineata ed equidistante con due stelline brillanti — 450x.
UGC 11855	gx	21h56m26s	+30°47.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva lama di luce orientata grosso modo da E a W ed estesa per ~ 1'; è visibile solo in visione distolta, meglio a 380x; a tratti appare rotonda, come se in realtà fosse visibile solo il bulge centrale; c'è una stellina a ridosso verso W.
UGC 11857	gx	21h56m53s	+12°19.0'		Peg	24"	m. buona / buono	molto debole, allungata da E a W, di dimensioni ~ 60"×30" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso verso E e un'altra più brillante a 1' scarso SE — 450x.
UGC 11858	gx	21h57m29s	+41°14.9'		Cyg	16"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni 70"×30"e di luminosità pressoché uniforme; c'è una doppia strettissima a ridosso verso SE che si separa facilmente a 380x.
UGC 11859	gx	21h58m07s	+01°00.6'		Aqr	24"	buona / buono	elusiva lama di luce osservabile in visione distolta a 450x; è orientata da NE a SW ed estesa per 1.5'.

UGC 11861	gx	21h56m25s	+73°15.6'	q 14	Cep	24"	m. buona / discreto	è una debole ed estesa chiazza lattescente, grosso modo circolare con Ø di un paio di primi; a tratti appare una piccola zona centrale appena più evidente; meglio contrastata scalando a 340x; una stellina a ridosso NNW e due deboli stelline a S e SSW ne delimitano in qualche modo le dimensioni.
UGC 11863	gx	21h58m25s	−00°44.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 340x, ma solo a tratti la vedo orientata all'incirca da N a S con dimensioni 45"×30".
UGC 11865	gx	21h58m36s	+12°02.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, piccola, abbastanza compatta, con nucleo quasi stellare e Ø di 30"; è situata tra 2 coppie di stelline, a S e ENE — 380x.
UGC 11866	gx	21h58m34s	+14°07.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto diffuso, rotondo con Ø < 30" e nucleo stellare (a 400x si riesce a tener fuori campo la SAO 107553 di magnitudo 6.5).
UGC 11867	gx	21h58m54s	−01°59.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 340x.
UGC 11868	gx	21h59m05s	+18°10.7'		Peg	16"	m. buona / buono	è un diffuso lucore molto debole e di luminosità uniforme, ma di aspetto un po' irregolare, approssim. rotondo con Ø di 1.5'; meglio osservabile a 188x.
UGC 11870	gx	22h00m29s	+06°26.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare orientata da N a S ed estesa 40"-45" — 450x.
UGC 11871	gx	22h00m41s	+10°33.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo di aspetto stellare circonfuso da un piccolo alone poco allungato da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
UGC 11877	gx	22h02m20s	+11°51.6'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata grosso modo da N a S con dimensioni 30"×20"; ci sono 2 stelline appena percettibili: a ~ 1' verso N e a una 30-ina di secondi W — 450x.
UGC 11878	gx	22h02m23s	+18°19.1'		Peg	16"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, probabilmente rotonda con Ø di 45"; presenta un nucleo stellare ben visibile — 270x.
UGC 11879	gx	22h02m40s	+15°15.3'		Peg	24"	ottima / m. buono	è una galassietta elusiva che forma una coppia ravvicinata con un altrettanto elusiva PGC 1479727; quest'ultima, anzi, sembra appena più evidente; ciò che si vede a prima vista è un piccolo triangolo isoscele di debolissime stelline col vertice più acuto che punta a NE; la PGC appare come un baffo orientato da N a S ed esteso < 30"; UGC salta fuori a tratti a ridosso S della stellina più meridionale del piccolo triangolo, ma non riesco a capirne l'orientamento — 450x.
UGC 11890	gx	22h03m33s	+38°33.4'		Lac	16"	m. buona / buono	facile da vedere, relativamente compatta e i luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 11891	gx	22h03m33s	+43°45.1'		Lac	16"	ottima / ottimo	tenuissimo lucore molto diffuso, esteso forse un paio di primi e osservabile solo in visione distolta; è situata a ridosso, verso N, delle 2 più occidentali di 3 stelline grosso modo allineate da E a W; quella a W è la più brillante; bisogna scalare a 132x: a 270x è virtualmente invisibile!.
UGC 11892	gx	22h03m52s	+35°59.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	facile da vedere, piccola, rotonda con Ø di 30"-35" e gradatamente più brillante verso l'interno; presenta nucleo stellare visibile a 380x.
UGC 11893	gx	22h04m07s	+35°56.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE per ~ 1' e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare che però appare solo a tratti; è meglio visibile a 270x.
UGC 11894	gx	22h04m07s	+41°49.2'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; situata tra due stelline a NNE e SSW; una stellina molto debole si trova a E — 450x.
UGC 11895	gx	22h04m22s	+39°34.6'		Lac	16"	m. buona / ottimo	è un debole ovale facilmente visibile in visione distolta, di luminosità pressoché uniforme, orientato ~ da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante a S e una più debole quasi a ridosso verso NE — 380x.
UGC 11896	gx	22h04m47s	+15°47.6'		Peg	24"	buona / m. buono	è un debole ovale molto diffuso e di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni 45"×30"; ci sono 3 stelline allineate a S — 450x.
UGC 11897	gx	22h04m30s	+41°24.7'		Lac	16"	m. buona / ottimo	è una bolla grosso modo circolare, molto diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di almeno 1'; c'è una stellina a 1' verso SE — 380x.
UGC 11898	gx	22h04m36s	+42°19.6'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, a tratti appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; allineata ma non equidistante con due stelline a SW e SSW; la visione è comunque disturbata dalla SAO 51621 di 8ª grandezza situata 1.5' a E — 450x.
UGC 11901	gx	22h05m22s	+05°11.0'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto debole e molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con tenuissimo bulge diffuso; occorre impiegare 450x per tenere fuori campo la SAO 127284 di 9ª grandezza a 6' NE e soprattutto la Ny Peg di 5ª a 8.5' SE.
UGC 11902	gx	22h05m36s	+16°43.3'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e piccola; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' SE di una stellina; non riesco tuttavia a capirne la forma — 270x.
UGC 11903	gx	22h05m19s	+34°59.4'		Peg	24"	ottima / molto buono	lucore molto debole e stemperato sul fondo cielo con un nucleo stellare visibile solo a momenti; in visione distolta appare circolare con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra due stelline orientate da E a W (quella a E è quasi a ridosso della gx); meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11905	gx	22h05m55s	+20°38.3'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, visibile senza difficoltà a 380x malgrado sia disturbata dalla SAO 90223 di 8.5 e situata a 4' NE.
UGC 11907	gx	22h06m21s	+02°20.9'		Aqr	16"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda, di 30" di Ø e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 1' SW; la brillante SAO 127303 di magnitudo 6.5 si riesce a tener facilmente fuori campo a 380x.
UGC 11908	gx	22h06m35s	+16°03.4'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è meglio evidente a 340x, ma a 450x appare meglio una stellina a ridosso di SE.
UGC 11909	gx	22h06m17s	+47°15.0'	q 87	Lac	16"	m. buona / buono	è una debole lama di luce facilmente osservabile anche in visione diretta ed estesa ~ 3'; appare poco più luminosa verso l'interno e sembra dipartirsi verso S da una stellina doppia brillante; c'è una stellina a ridosso del bordo meridionale — 270x.
UGC 11911	gx	22h07m08s	+44°18.0'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole chiazza diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con tenue condensazione centrale evidente; c'è una stellina a 1' scarso N — 450x.
UGC 11912	gx	22h07m24s	+38°44.9'		Lac	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con piccolo bulge diffuso molto piccolo visibile a tratti a 380x.
UGC 11913	gx	22h07m29s	+41°02.1'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x, a tratti grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
UGC 11915	gx	22h08m09s	+04°21.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	è una gx elusiva che sono riuscito a catturare solo alternando gli occhi e scalando a 188x; dovrebbe essere grosso modo rotonda con Ø < 1'.
UGC 11916	gx	22h08m22s	+18°27.3'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" ; meglio definita scalando a 340x.
UGC 11919	gx	22h08m10s	+41°10.6'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, con evidente condensazione centrale, ma di aspetto un po' confuso, grosso modo circolare con Ø di 45" — 450x.
UGC 11920	gx	22h08m27s	+48°26.4'		Lac	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante e compatta, con alto gradiente e condensazione centrale di aspetto stellare; grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
UGC 11921	gx	22h09m15s	+14°21.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; meglio visibile a 270x, ma a 380x appare, seppur a tratti, una debolissima stellina a ridosso di NE.
UGC 11923	gx	22h08m51s	+44°32.5'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza di forma indistinta, estesa 40"-45" e situata a ridosso S di una triade di stelline molto brillanti che ne offuscano un po' la visione; meglio tuttavia non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 11924	gx	22h09m15s	+21°31.1'		Peg	16"	m. buona / buono	debolissima e assai stemperata suo fondo cielo, allungata da E a W con dimensioni 80"×40"; è immersa in un campo abbastanza ricco di stelline — 270x.
UGC 11927	gx	22h09m27s	+40°59.3'		Lac	16"	m. buona / ottimo	debole bolla circolare, assai diffusa e stemperata sul fondo cielo, con Ø di 45"; la visione non migliora scalando a 270x (comincia ad albeggiare).
UGC 11928	gx	22h09m50s	+16°53.6'		Peg	24"	discreta / m. buono	molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta a poco più di 1' NNE di una stellina; è approssim. rotonda con Ø di 35"-40" — 400x.
UGC 11929	gx	22h09m37s	+39°16.9'		Lac	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge evidente; c'è una stellina brillante a 1' scarso SW — 380x.
UGC 11933	gx	22h10m14s	+41°34.4'		Lac	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto molto diffuso e appena condensato, esteso per una 30-ina di secondi; appare solo a tratti in visione distolta quasi a ridosso di una debole stellina situata a SE — 380x.
UGC 11935	gx	22h10m38s	+42°01.3'		Lac	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, poco diffusa, con Ø di 45", e con condensazione centrale evidente; è situata a ridosso di un paio di stelline: una abbastanza brillante a W e l'altra, poco più debole a NE — 380x.
UGC 11936	gx	22h10m51s	+41°15.5'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa 1' scarso e orientata da NE a SW; appare solo in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina a 1' NE.
UGC 11937	gx	22h11m04s	+41°17.0'		Lac	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×10"; ci sono un paio di deboli stelline a ridosso W e NW — 450x.
UGC 11943	gx	22h11m51s	+26°09.0'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole e disturbata dalla SAO 90312 di 8ª grandezza situata 3' a SW; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E (la quale fa parte di un piccolo asterismo triangolare di 4 componenti) — 450x.
UGC 11944	gx	22h12m00s	+17°44.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; occorre tuttavia scalare a 340x; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE.
UGC 11946	gx	22h11m39s	+46°18.6'		Lac	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; appare con relativa facilità a 380x; è orientata ~ da E a W con dimensioni 45"×30".
UGC 11947	gx	22h12m18s	+11°29.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, di 15" o 20" max di Ø; è situata a ridosso di un piccolo triangolo irregolare di stelline — 380x.
UGC 11948	gx	22h12m22s	+14°01.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda, diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 35"-40"; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline molto deboli: il vertice più acuto punta a NE — 380x.
UGC 11949	gx	22h12m23s	+39°16.7'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15", stemperata alle due estremità del fuso; c'è una stellina a ridosso SE; una abbastanza brillante si trova a 1' SW — 450x.
UGC 11950	gx	22h12m32s	+38°40.9'		Lac	24"	ottima / molto buono	relativamente facile, ma disturbata da una stellina brillante situata verso il bordo NE della gx; è allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
UGC 11953	gx	22h13m56s	+13°45.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" (le dimensioni e l'orientamento sono simili a quelli di CGCG 428-49 dalla quale dista 3' a SE) — 450x.
UGC 11955	gx	22h13m49s	+39°14.2'		Lac	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza di luminosità uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi e diffusa; è situata a ridosso verso E di una stellina appena percettibile — 380x.
UGC 11957	gx	22h14m29s	+05°01.9'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25" — 450x.
UGC 11961	gx	22h14m46s	+42°10.9'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa almeno 1'; meglio non scalare gli ingrandimenti, perché il campo è ricco di stelline, fra le quali spicca un triangolo di componenti molto brillanti situato 4'-5' a SW — 450x.
UGC 11964	gx	22h15m29s	+19°13.2'		Peg	24"	buona / buono	debolissima lama di luce che appare abbastanza facilmente in visione distolta, meglio a 340x, orientata da NE a SW ed estesa almeno 1'.
UGC 11966	gx	22h15m51s	+08°39.6'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso SSW; la gx pare meglio evidente a 340x, ma così si fatica molto a tenere fuori campo la SAO 127420 di 6ª grandezza situata a 7' SSE.
UGC 11973	gx	22h16m50s	+41°30.1'		Lac	16"	ottima / ottimo	abbastanza facile, poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×40" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 11974	gx	22h17m16s	+33°30.2'		Peg	16"	m. buona / buono	è un debole ovale di luminosità uniforme, di dimensioni 60"×30", orientato da NE a SW; si vede abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; c'è una stellina a 1' verso S.
UGC 11975	gx	22h17m19s	+35°34.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	baffo di luce relativamente facile, diffuso e con tenue condensazione centrale quasi stellare che aggetta per ~ 40" verso E da una stellina — 380x.
UGC 11978	gx	22h17m40s	+28°16.9'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme; in visione distolta è grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; è disturbata da una doppia brillante e sbilanciata situata subito a SW; un'altra stellina si trova a 1' verso E; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 11981	gx	22h18m32s	+29°14.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore diffuso, di luminosità uniforme ed esteso per ~ 1'; a 380x appare, a tratti, una condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE; una debole doppia stretta si trova poco più distante, sempre a NE; la gx è però meglio visibile a 270x.
UGC 11982	gx	22h18m53s	−01°13.5'		Aqr	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole e di luminosità pressoché uniforme, estesa per ~ 1' e orientata da N a S; c'è una debole stellina al bordo W — 450x.
UGC 11987	gx	22h20m08s	+09°01.1'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 11990	gx	22h20m30s	+35°58.4'		Lac	24"	ottima / molto buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue nucleo stellare; allineata ed equidistante con due deboli stelline a E e una brillante a W — 450x.
UGC 11991	gx	22h20m22s	+47°42.3'		Lac	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con piccola e tenue condensazione centrale visibile a tratti; la condensazione è meglio visibile a 270x; anche la gx pare poco più contrastata scalando gli ingrandimenti.
UGC 11994	gx	22h20m53s	+33°17.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce di luminosità uniforme che nondimeno appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è orientata da NW a SE ed estesa almeno 1'; c'è una stellina al bordo SE.
UGC 11995	gx	22h21m09s	+36°35.4'		Lac	16"	ottima / ottimo	relativamente facile da vedere, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge diffuso abbastanza contrastato; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' NW (lungo l'asse della gx) — 380x.
UGC 11997	gx	22h21m26s	+45°29.3'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; è situata tra 2 stelline molto deboli a NE e SW (poco più vicina a quella di NE) — 450x.
UGC 11998	gx	22h22m15s	+05°09.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta quando si osserva IC 1444, dalla quale dista un paio di primi a NW, ma solo a momenti appare orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 12000	gx	22h22m26s	+02°51.6'		Peg	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 12002	gx	22h22m08s	+41°19.8'		Lac	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 12006	gx	22h22m30s	+37°06.4'		Lac	16"	m. buona / buono	diffusa, orientata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×40"; una condensazione centrale quasi stellare è visibile abbastanza facilmente a 380x.
UGC 12007	gx	22h22m41s	+36°11.7'		Lac	16"	ottima / ottimo	debole baffo di luminosità uniforme che aggetta da una stellina brillante per una 30-ina di secondi verso SW — 380x.
UGC 12008	gx	22h22m38s	+37°40.3'		Lac	24"	ottima / molto buono	è un lucore molto debole e stemperato sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di 40"-45"; si trova in mezzo tra a una doppia larga a NE e una stellina più brillante a SW — 450x.
UGC 12009	gx	22h22m40s	+37°58.5'		Lac	16"	m. buona / buono	facile, poco diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 380x.
UGC 12010	gx	22h23m19s	+05°32.0'		Peg	24"	discreta / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" (in visione distolta sembra una edge-on); c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso WNW — 400x.
UGC 12011	gx	22h23m01s	+30°55.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	rotonda, con Ø di 30" e con evidente nucleo stellare; è situata 1.5' SE di una stellina brillante — 380x.
UGC 12012	gx	22h23m02s	+35°49.3'		Lac	24"	ottima / molto buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina al bordo SW — 450x.
UGC 12013	gx	22h23m03s	+36°03.2'		Lac	24"	ottima / molto buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E (la quale fa parte di una piccola losanga irregolare) — 450x.
UGC 12015	gx	22h23m25s	+19°51.0'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza forse rotonda con Ø di ~ 45"; appare in visione distolta a 340x, ma il campo è un po' disturbato da una stella brillante situata a 5' SW della galassia.
UGC 12016	gx	22h23m12s	+40°03.4'		Lac	16"	ottima / ottimo	relativamente facile e compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30", con bulge evidente e piccolo nucleo stellare visibile a 380x.
UGC 12017	gx	22h23m35s	+11°51.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole e di aspetto un po' confuso, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (difficile da stabilire in quanto molto stemperata); c'è una debole stellina al bordo orientale; altra stellina, ma stavolta brillante, a ~ 1' SE — 380x.
UGC 12018	gx	22h23m37s	+30°51.4'		Peg	16"	m. buona / buono	è una debole lama di luce, orientata da NE a SW ed estesa un paio di primi; si vede facilmente in visione distolta a 380x.
UGC 12020	gx	22h23m47s	+35°23.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di ~ 40" e di luminosità uniforme; è situata tra 2 stelline appena percettibile: una a SE e l'altra, visibile solo a tratti, a NW — 380x.
UGC 12021	gx	22h24m12s	+06°00.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa; a tratti appare allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' SW; è poco meglio definita a 380x.
UGC 12022	gx	22h24m03s	+33°26.2'		Peg	24"	ottima / molto buono	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
UGC 12023	gx	22h14m16s	+05°21.6'		Peg	24"	buona / m. buono	debole ovale diffuso e di luminosità uniforme, orientato da NW a SE con dimensioni 45"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12024	gx	22h23m54s	+41°29.4'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a NE — 450x.
UGC 12030	gx	22h24m33s	+44°52.6'		Lac	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente a E di una stellina abbastanza brillante come una chiazza di forma indistinta, forse grosso modo circolare ed estesa si e no 40"; non riesco a capire se la stellina appena percettibile che appare a ridosso E di quella di riferimento è tale o si tratti del nucleo della gx — 450x.
UGC 12032	gx	22h25m19s	+42°43.0'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da WNW a ESE, di dimensioni 80"×20", molto diffusa alle estremità e con bulge abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso N del bulge e una più evidente all'estremità WNW della gx — 450x.
UGC 12036	gx	22h26m36s	+25°06.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø max di 30" e nucleo stellare osservabile a 380x; c'è una stellina a ridosso verso SW.
UGC 12037	gx	22h26m37s	+36°43.7'		Lac	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo con Ø di ~ 40", diffuso e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' NE; la gx è in parte disturbata dalla SAO 72343 di 8ª situata 3' NNE — 380x.
UGC 12038	gx	22h26m54s	+19°32.9'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 380x.
UGC 12039	gx	22h26m49s	+35°31.2'		Peg	16"	m. buona / buono	abbastanza facile, molto diffusa, approssim. Rotonda con Ø di 80"; a 380x appare una condensazione centrale di aspetto stellare.
UGC 12040	gx	22h27m06s	+36°21.7'		Lac	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, ovale, di dimensioni 40"×30", orientata da E a W con evidente condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
UGC 12041	gx	22h26m50s	+39°47.6'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da ENE a WSW (come le 2 stelline brillanti a N e NW) con dimensioni grosso modo di 40"×20"; meglio non scalare gli ingrandimenti, se non altro per tenere fuori campo la SAO 72358 di 6ª grandezza situata 7' a E — 450x.
UGC 12044	gx	22h27m48s	+38°35.2'		Lac	24"	ottima / molto buono	debole e abbastanza estesa, molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30", con bulge diffuso, poco contrastato e un nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina al bordo E; più interessante e meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12046	gx	22h28m20s	+29°51.2'		Peg	16"	m. buona / buono	è un elusivo oggetto molto piccolo ed esteso non più di 20"; appare solo a tratti in visione distolta a 380x (bisogna stare attenti a non farsi confondere da una doppia stellina molto debole situata quasi a ridosso di NW).
UGC 12050	gx	22h29m03s	+19°06.0'		Peg	16"	m. buona / buono	debolissimo ovale di 30"×15" orientato da E a W appena più brillante all'interno; situata tra 2 stelline distanti poco più di 1' e orientate da NE a SW — 380x.
UGC 12051	gx	22h29m17s	+37°45.1'		Lac	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; a tratti, osservando a 380x, sembra di vedere all'interno qualcosa di puntiforme, ma non capisco se vi sia una stellina a ridosso o il nucleo della gx.
UGC 12052	gx	22h29m11s	+38°31.8'		Lac	24"	ottima / molto buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva — sono due debolissimi baffi di luce orientati da N a S ed estesi una 40-ina di secondi; il 1° è poco più largo e ha una stellina al bordo S, mentre l'altro è poco più evidente; meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 12053	gx	22h29m14s	+38°31.7'		Lac	24"	ottima / molto buono	v. **UGC 12052**
UGC 12054	gx	22h29m32s	+07°43.6'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta anche a 380x (nonostante a quest'ingrandimento il campo sia molto povero), orientata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; meglio comunque scendere a 270x.
UGC 12056	gx	22h29m53s	+36°43.2'		Lac	16"	ottima / ottimo	chiazza lattescente molto diffusa, estesa per almeno 1' e situata eccentricamente verso N rispetto a una coppia di stelline distanti 20" e orientate ~ da N a S: quella meridionale è brillante; a 380x si nota, a tratti, un piccolo bulge diffuso, esteso 10"-15" che forma un piccolo triangolo rispetto alle suddette stelline.
UGC 12057	gx	22h30m13s	+42°47.4'		Lac	16"	ottima / ottimo	piccola, rotonda, poco diffusa, con Ø di ~ 30' e con nucleo stellare facilmente visibile a 380x.
UGC 12059	gx	22h30m44s	+22°32.6'		Peg	16"	m. buona / buono	è un debolissimo lucore molto diffuso e di luminosità uniforme, esteso una 40-ina di secondi che in visione distolta sembra aggettare verso E da una debole stellina — 380x.
UGC 12060	gx	22h30m34s	+33°49.2'	q 123	Peg	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore molto diffuso e di forma indistinta; non riesco a capire com'è orientato; situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da NE a SE (quella a NW è una doppia stretta); meglio scalare a 270x [probabile leggera perdita di contrasto a causa della Luna calante di 3 giorni].
UGC 12061	gx	22h30m33s	+37°53.4'		Lac	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole estesa 1' che sembra aggettare a S di una stellina brillante — 450x.
UGC 12062	gx	22h30m55s	+39°26.7'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; situata tra una coppia di stelline a S e un piccolo gruppo serrato di forma romboidale di 5 stelline a N — 450x.
UGC 12063	gx	22h31m11s	+35°22.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
UGC 12064	gx	22h31m21s	+39°21.5'		Lac	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina subito a W; forma una coppia ravvicinata con **MAC 2231+3922A** situata subito a N — 450x.
UGC 12066	gx	22h31m51s	+19°41.6'		Peg	16"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×20" — 270x.
UGC 12067	gx	22h31m46s	+20°36.2'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25" — 380x.
UGC 12068	gx	22h32m07s	+00°02.2'		Aqr	16"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di 35"-40" — 270x.
UGC 12069	gx	22h30m46s	+76°30.7'	q 14	Cep	24"	m. buona / discreto	chiazza lattescente molto debole e di aspetto un po' confuso, forse rotonda con Ø di 1' e di luminosità uniforme; meglio evidente a 340x; è situata al limitare E di una stringa di 4 stelline orientate grosso modo da E a W.
UGC 12071	gx	22h32m24s	+30°50.2'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, ma a 380x, in visione distolta, appare abbastanza chiaramente allungata da N a S, di luminosità uniforme e dimensioni grosso modo 60"×30".
UGC 12073	gx	22h32m33s	+39°12.9'		Lac	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata ~ da E a W, di dimensioni 60"×30" con bulge poco più contrastato del disco — 380x.
UGC 12074	gx	22h33m06s	+08°05.9'	q 212	Peg	16"	buona / m. buono	relativamente facile e compatta, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" e con lievi discrepanze di luce all'interno osservabili a 380x.
UGC 12075	gx	22h32m49s	+39°12.6'		Lac	16"	ottima / ottimo	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 380x; appare più che altro come un debolissimo appannamento asimmetrico rispetto a una stellina situata al bordo E.
UGC 12077	gx	22h33m19s	+38°56.5'		Lac	24"	ottima / molto buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' NE che disturba un po' l'osservazione — 450x.
UGC 12081	gx	22h34m04s	+10°10.3'		Peg	24"	buona / m. buono	è un bel fuso di 80"×20" orientato da NW a SE e con bulge diffuso abbastanza contrastato — 450x.
UGC 12082	gx	22h34m11s	+32°51.6'	q 123	Peg	16"	buona / buono	debolissimo lucore estremamente diffuso e stemperato sul fondo cielo di forma indistinta ed esteso 1' 1.5' situata a NW di una coppia di stelline; è meglio visibile a 270x; c'è un gruppetto triangolare di una decina di stelline situato 4 a SW: sembra un piccolo ammasso aperto.
UGC 12084	gx	22h34m26s	+25°01.8'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda, appena più brillante all'interno e con Ø di ~ 45" — 380x.
UGC 12085	gx	22h34m25s	+35°08.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 12086	gx	22h34m19s	+41°19.2'		Lac	16"	ottima / ottimo	è una tenue bolla circolare con Ø < 1' con un piccolo nucleo diffuso; c'è una stellina a ridosso verso NW; è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti — 380x.
UGC 12088	gx	22h34m24s	+43°48.5'		Lac	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con ~ 40" e appena più brillante all'interno — 380x.
UGC 12090	gx	22h34m47s	+15°56.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; è difficile a 340x e meglio evidente a 450x; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso S.
UGC 12092	gx	22h34m57s	+06°18.4'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima, molto diffusa e con luminanza superficiale molto bassa, approssim. rotonda con Ø < 1' — 450x.
UGC 12093	gx	22h34m49s	+18°38.3'		Peg	16"	buona / m. buono	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; appare poco più contrastata a 270x.
UGC 12107	gx	22h36m47s	+19°22.9'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 35"-40"; meglio contrastata scalando a 270x.
UGC 12109	gx	22h36m38s	+38°50.1'		Lac	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con nucleo stellare percettibile solo a momenti; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12110	gx	22h36m54s	+14°24.8'		Peg	24"	m. buona / mediocre	fa parte di un terzetto assieme a MCG+2-57-6 e CGCG 429-12 — relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15"e con piccolo bulge marcato; c'è una stellina a ridosso verso NW — 450x.
UGC 12117	gx	22h36m56s	+50°11.7'		Lac	28"	buona / ottimo	chiazza circolare molto debole, diffusa e di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E — 495x.
UGC 12119	gx	22h37m31s	+18°47.6'		Peg	24"	buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, a tratti allungata da N a E con dimensioni 30"×20", ma è disturbata da una stellina brillante situata a poco più di 1' verso NNE — 450x.
UGC 12124	gx	22h37m53s	+25°20.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, poco allungata da WNW a ESE, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
UGC 12125	gx	22h37m43s	+40°19.1'		Lac	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; situata tra una doppia stretta a SW e una stellina abbastanza brillante a NE — 450x.
UGC 12127	gx	22h38m29s	+35°19.8'		Peg	24"	ottima / molto buono	relativamente brillante, rotonda con Ø di 1', diffusa e con evidente condensazione centrale; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di deboli stelline molto allungato in direzione N-S — 450x.
UGC 12131	gx	22h38m44s	+37°35.8'		Lac	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 12132	gx	22h38m51s	+34°18.2'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare allungata da N a S, con dimensioni 50"×30" e appena più brillante all'interno; meglio visibile a 380x.
UGC 12133	gx	22h39m32s	+08°36.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per almeno 1'; appare anche in visione diretta, ma occorre non scendere sotto i 450x; c'è una stellina subito a NW.
UGC 12135	gx	22h38m48s	+72°32.8'		Cep	24"	buona / buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x (forse a causa delle numerose stelline presenti nel campo); appare a tratti allungata da E a W ed estesa per 1' scarso; situata sul lato occidentale di un triangolo formato da stelline molto deboli: quella al vertice SE è una doppia molto stretta.
UGC 12137	gx	22h39m50s	+38°13.0'		Lac	16"	m. buona / buono	è un diffuso lucore molto debole e stemperato sul fondo cielo, approssim. rotondo con Ø di almeno 1.5'; si vede facilmente in visione distolta, ma bisogna scalare a 270x.
UGC 12139	gx	22h40m17s	+08°34.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15".
UGC 12140	gx	22h40m29s	+16°00.7'		Peg	24"	buona / m. buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge diffuso — 450x.
UGC 12141	gx	22h38m14s	+80°40.6'		Cep	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una coppia di deboli stelline subito a N; è meglio visibile restando a 450x.
UGC 12143	gx	22h40m26s	+31°50.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, a 380x appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una doppia appena percettibile subito a W con componenti separate da una 20-ina di secondi; altra debole stellina a 1' SW; la gx è disturbata dalla SAO 72604 di 8ª che non si riesce a tenere fuori campo.
UGC 12144	gx	22h40m34s	+33°28.0'		Peg	24"	ottima / molto buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 12147	gx	22h41m14s	+18°47.5'		Peg	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
UGC 12149	gx	22h41m08s	+32°10.2'		Peg	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, con Ø di 45", diffusa, con piccolo bulge evidente e contrastato sul disco — 380x.
UGC 12150	gx	22h41m12s	+34°15.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 1'; c'è una stellina a ~ 1' verso SE — 380x.
UGC 12151	gx	22h41m34s	+00°24.0'		Aqr	24"	m. buona / buono	è un debole lucore uniforme molto stemperato sul fondo cielo, poco allungato da N a S con dimensioni 1.5'×1'; meglio visibile scalando a 340x.
UGC 12154	gx	22h40m36s	+72°51.9'	q 14	Cep	24"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NNE a SSW ed estesa 1'; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SE — 450x.
UGC 12155	gx	22h41m30s	+35°16.0'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge abbastanza evidente, ma poco contrastato sul disco — 450x.
UGC 12156	gx	22h41m26s	+39°17.5'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza circolare estesa una 30-ina di secondi; appare in visione distolta ed è tutto sommato meglio visibile a 450x.
UGC 12157	gx	22h41m54s	+34°55.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, disturbata da alcune stelline quasi sovrapposte che ne confondono un po' la forma; in visione distolta si nota la zona centrale orientata da E a W di dimensioni grosso modo 30"×15"; una prima stellina abbastanza brillante si trova a ridosso NW; un'altra a ridosso E (che in realtà è una doppia serrata, anche se la compagna si vede solo a tratti); una terza stellina brillante si trova a 1' SW — 450x.
UGC 12158	gx	22h42m10s	+19°59.8'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di ~ 1" (poco meno della distanza delle 2 stelline a S e SE), diffusa e di luminosità uniforme; è poco più contrastata a 270x.
UGC 12160	gx	22h40m54s	+75°09.9'		Cep	24"	buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45", ma occorre scalare a 340x; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E.
UGC 12161	gx	22h42m12s	+33°12.2'		Peg	16"	ottima / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e Ø di 20"-25" situato 1' SE di una stella brillante giallo-arancio che disturba — 380x.
UGC 12163	gx	22h42m39s	+29°43.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	un altro debolissimo oggetto rotondo di 20" di Ø con nucleo stellare marcato (ma non si tratterà di una debole stellina sovrapposta?); c'è una doppia stretta a meno di 1' verso N, mentre una stella brillante si trova a 1' W — 380x.
UGC 12164	gx	22h42m50s	+30°30.2'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una coppia serrata di stelline quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 12172	gx	22h43m57s	+07°23.5'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole, allungata da E a W con dimensioni 50"×20", diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 12173	gx	22h43m52s	+38°22.6'		Lac	16"	m. buona / buono	è una debole chiazza di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W e di dimensioni 90"×60"; è poco più evidente di UGC 12137 ma anche in questo caso è meglio scendere a 270x.
UGC 12176	gx	22h44m20s	+48°46.9'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza estesa 40"-45", a tratti approssim. circolare, situata a ridosso W di una stellina abbastanza brillante; ci sono anche 2 stelline appena percettibili al margine NE e NW; meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 12177	gx	22h44m46s	+33°27.7'		Peg	16"	m. buona / buono	relativamente brillante, ma disturbata dalla luce di una stellina luminosa situata proprio al margine W; probabilmente rotonda con Ø di 1' scarso e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
UGC 12178	gx	22h45m08s	+06°25.8'	q 213	Peg	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo baffo che si diparte verso S da una stellina brillante; a 380x sembra a tratti di dimensioni 40"×20"; sempre a tratti appare qualcosa di puntiforme a ~ 40" S della stella, ma non capisco se trattasi di un nodulo o di una stellina appena percettibile.
UGC 12179	gx	22h45m04s	+33°59.7'		Peg	16"	m. buona / buono	rotonda, con Ø di ~ 1', gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1' verso E; c'è un trapezio di stelline brillanti subito a SW — 380x.
UGC 12181	gx	22h46m09s	+38°03.2'		Lac	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti distanti un paio di primi in direzione NW-SE — 380x.
UGC 12182	gx	22h45m38s	+73°09.8'	q 14	Cep	24"	m. buona / discreto	è un debole ovale diffuso orientato da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; ci sono 2 deboli stelline a 1.5' ENE e 1.5' ESE — 450x.
UGC 12183	gx	22h47m04s	−00°04.4'		Aqr	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
UGC 12185	gx	22h47m25s	+31°22.4'		Peg	16"	m. buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme (salvo una condensazione centrale molto tenue che però appare solo in visione distolta a 380x), poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45".
UGC 12186	gx	22h47m13s	+50°07.8'		Lac	28"	buona / ottimo	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi che aggetta a SW di una stellina brillante che ne disturba l'osservazione; la gx è grosso modo compresa tra questa stellina e una percettibile solo a momenti al bordo SW — 495x.
UGC 12188	gx	22h47m37s	+39°52.8'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
UGC 12189	gx	22h48m06s	+03°55.7'		Peg	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; è situata a ridosso verso S di un piccolo triangolo di stelline deboli — 450x.
UGC 12190	gx	22h48m07s	+18°17.4'		Peg	24"	ottima / buono	debole lama di luce orientata da N a S, estesa per oltre 1' e con bulge appena percettibile — 450x.
UGC 12191	gx	22h48m43s	+27°36.7'		Peg	16"	m. buona / buono	assieme a UGC 12193 forma una coppia di galassiette abbastanza facili da vedere in visione distolta, distanti un paio di primi in direzione NNW-SSE; la 1ª ha dimensioni ~ 40" con evidente nucleo stellare; c'è una debole stellina a 1' verso W; la 2ª è più facile ed estesa, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; anche qui c'è una stellina a 1' verso W — 270x.
UGC 12192	gx	22h48m36s	+37°12.1'		Lac	24"	ottima / molto buono	debolissima, appare elusivamente in visione distolta subito a W di una stellina molto debole; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio comunque non scendere sotto i 450x a causa di una stellina brillante situata un paio di primi a SE che disturba l'osservazione.
UGC 12193	gx	22h48m44s	+27°35.0'		Peg	16"	m. buona / buono	v. **UGC 12191**
UGC 12194	gx	22h48m51s	+27°57.8'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
UGC 12195	gx	22h48m49s	+33°14.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	piccola ed elusiva macchiolina di luce estesa max 30", forse rotonda, con una stellina a ridosso SE; appare a tratti in visione distolta a 380x, ma la visione è disturbata da una stella brillante situata 4' a S.
UGC 12196	gx	22h48m58s	+07°13.1'		Peg	24"	ottima / buono	allungata da NNW a SSE, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge diffuso abbastanza contrastato — 450x.
UGC 12198	gx	22h49m11s	+27°51.9'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
UGC 12199	gx	22h49m04s	+40°00.1'		Lac	16"	discreta / m. buono	debole, appena condensata, di aspetto un po' confuso, ma grosso modo orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso NE — 380x.
UGC 12200	gx	22h49m20s	+19°17.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1.5 NW — 380x.
UGC 12201	gx	22h49m09s	+34°59.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per ~ 1'; a 380x appare più luminosa all'interno.
UGC 12202	gx	22h49m29s	+11°18.3'		Peg	24"	m. buona / discreto	poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45", diffusa e con piccolo nucleo appena percettibile — 450x.
UGC 12205	gx	22h49m45s	+15°05.5'		Peg	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SSE — 450x.
UGC 12206	gx	22h49m33s	+33°21.6'		Peg	16"	ottima / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto di luminosità uniforme, forse rotondo con Ø di 30"; è situato in mezzo a 2 stelline orientate da NE a SW (quella a NE è più brillante) e distanti 1' — 380x.
UGC 12208	gx	22h50m06s	−01°03.0'		Aqr	16"	m. buona / buono	è una debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme di una 40-ina di secondi di Ø e molto stemperata sul fondo cielo; appare tuttavia meglio contrastata scalando a 188x.

UGC 12210	gx	22h50m11s	+31°22.7'		Peg	16"	m. buona / buono	molto debole, situata quasi a ridosso verso E di una stellina; osservandola a 380x e in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30".
UGC 12212	gx	22h50m30s	+29°08.3'		Peg	24"	ottima / molto buono	elusivo lucore di forma indistinta, esteso sì e no 30"; appare in visione distolta a ridosso N di una stellina, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 12213	gx	22h51m03s	+07°17.8'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo con Ø di 30" e molto diffuso; appare con relativa facilmente a 270x in visione distolta (a 380x si stempera troppo e sparisce!); è situato tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da N a S.
UGC 12214	gx	22h51m01s	+31°22.5'		Peg	16"	m. buona / buono	piccolo oggetto rotondo, relativamente compatto, di 30"-35" di Ø, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
UGC 12215	gx	22h50m56s	+34°51.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo, molto piccolo e diffuso, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a NE e un'altra doppia a uguale distanza verso SW — 380x.
UGC 12218	gx	22h51m22s	+32°21.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 50"×30" (la stima è stata effettuata sulle 2 stelline a NW che sono orientate nello stesso modo e distanti ~ 1' — 380x.
UGC 12221	gx	22h50m29s	+11°39.7'		Cep	16"	m. buona / buono	lama di luce molto debole di luminosità uniforme estesa almeno 3' o 4' in direzione E-W; 3 stelline brillanti (di cui 2 avvicinate) si trovano a ridosso della galassia verso S — 270x.
UGC 12222	gx	22h52m33s	+11°39.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45", molto diffusa e appena più brillante all'interno; è meglio contrastata a 270x.
UGC 12223	gx	22h52m12s	+49°26.7'		And	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina doppia molto stretta e sbilanciata al bordo NE; una più evidente si trova al bordo SE — 450x.
UGC 12226	gx	22h52m48s	+15°49.0'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
UGC 12229	gx	22h53m08s	+32°45.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale evidente — 450x.
UGC 12231	gx	22h53m33s	+31°37.1'		Peg	24"	ottima / molto buono	è un debolissimo baffo di luce esteso 30" o 40" e che appare solo a momenti in visione distolta a ridosso S di una debole stellina (la più meridionale di un asterismo di 6 componenti foggiato a "Y"); è preferibile comunque non scendere al di sotto dei 450x.
UGC 12233	gx	22h53m45s	+25°50.7'		Peg	16"	buona / ottimo	debolissima chiazza forse rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 30"; c'è una debole stellina a meno di 1' verso S e un'altra appena percettibile a 1' NW — 270x.
UGC 12234	gx	22h53m41s	+33°42.6'		Peg	16"	buona / buono	è un debole ovale di dimensioni 60"×40", orientato da NW a SE, molto disturbato dalla luce di una stella brillante sovrapposta verso il bordo occidentale; meglio evidente a 380x.
UGC 12235	gx	22h54m04s	+32°22.4'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto diffusa, allungata da NE a SW, dimensioni 45"×30" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina a 1' scarso SSE e un'altra a 1.5 NE — 450x.
UGC 12236	gx	22h53m57s	+36°14.5'		Lac	24"	ottima / m. buono	chiazza diffusa molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata a 340x.
UGC 12237	gx	22h54m20s	+11°46.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole, orientata da E a W ed estesa per 1'; la luminosità sembra presentare un leggero rinforzo verso W — 450x.
UGC 12238	gx	22h54m17s	+32°15.1'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata da una stella brillante a ridosso N — 450x.
UGC 12242	gx	22h54m25s	+32°27.1'		Peg	24"	ottima / molto buono	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole al bordo NE — 450x.
UGC 12243	gx	22h54m43s	+11°42.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a E e un'altra più debole a SW — 450x.
UGC 12245	gx	22h54m50s	+21°48.5'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' verso E; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12247	gx	22h54m00s	+75°14.8'	q 14	Cep	24"	m. buona / discreto	è una debolissima lama di luce estesa 1' scarso che si diparte a S di una stellina abbastanza brillante; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una debole stellina quasi a ridosso SE.
UGC 12249	gx	22h55m20s	+28°20.8'		Peg	24"	ottima / molto buono	elusiva lama di luce orientata da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi; appare come tale solo in visione distolta, ma anche in questo caso non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 12250	gx	22h55m36s	+12°47.4'		Peg	24"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 12251	gx	22h55m55s	+06°22.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; c'è una stella brillante a 2.5 SE — 380x.
UGC 12252	gx	22h55m43s	+31°46.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi e orientato da N a S; appare con una certa difficoltà in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina a ridosso NE.
UGC 12253	gx	22h56m02s	+12°46.0'		Peg	24"	buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da NW a SE ed estesa per ~ 1'; presenta un nucleo stellare appena percettibile, ma osservabile solo a momenti.
UGC 12255	gx	22h56m13s	+05°23.0'		Peg	24"	buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
UGC 12257	gx	22h56m16s	+19°23.0'		Peg	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, disturbata da una stella brillante di 9ª situata a 3' SW; meglio contrastata a 450x.
UGC 12258	gx	22h56m31s	+17°47.0'		Psc	16"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole, orientata da E a W ed estesa forse più di 1' — 380x.
UGC 12260	gx	22h56m32s	+37°44.3'		Lac	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso S; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12265	gx	22h57m36s	+19°47.4'		Peg	24"	buona / buono	debole e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e nucleo stellare; c'è una debole stellina a ridosso verso S e un'altra più distante e più brillante a SW — 450x.
UGC 12266	gx	22h58m00s	+06°04.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno; approssim. rotonda con Ø di 40" — 380x.
UGC 12271	gx	22h58m21s	+02°17.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme e aspetto un po' confuso, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1'; meglio a 270x; forma un triangolo rettangolo con 2 stelline: una 2' a N e l'altra 3' a NE.
UGC 12272	gx	22h58m17s	+25°46.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" e nucleo quasi stellare; fa parte di una curiosa formazione stellare foggiata a triangolo curvilineo comprendente 6 stelle — 380x.
UGC 12274	gx	22h58m20s	+26°03.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, poco più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina brillante al bordo NW; una appena percettibile si trova invece a ridosso verso N — 450x.
UGC 12278	gx	22h58m50s	+20°17.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12280	gx	22h58m45s	+24°38.4'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
UGC 12281	gx	22h59m13s	+13°36.4'	q 213	Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NE a SW (ossia a perpendicolo con le 2 stelline a W); a 380x sembra estesa per oltre 1'.
UGC 12282	gx	22h58m55s	+40°55.9'		And	16"	discreta / m. buono	debole, ma relativamente facile, appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" — 380x.
UGC 12283	gx	22h59m20s	+24°06.4'		Peg	16"	m. buona / buono	debolissima, visibile a tratti in visione distolta, estesa una 40-ina di secondi e situata 5' a WSW di UGC 12285 osservata per prima — 270x.
UGC 12284	gx	22h59m08s	+28°56.9'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole chiazza diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 12285	gx	22h59m27s	+12°42.9'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e con condensazione centrale quasi stellare abbastanza contrastato, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 12287	gx	22h59m23s	+53°44.4'		Cas	28"	buona / ottimo	debole lucore molto diffuso e stemperato sul fondo cielo; la gx è molto disturbata dalla presenza di 4 stelle brillanti poste a "V" molto aperta che non si riescono a tenere fuori campo; è allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo E — 495x.
UGC 12289	gx	22h59m41s	+24°04.5'		Peg	16"	m. buona / buono	gx elusiva, che m'ha fatto cilecca al primo tentativo; sono riuscito a "recuperarla" più tardi a 188x — forse perché la trasparenza nel corso della serata è migliorata — ma è molto piccola, con dimensioni max di 20".
UGC 12291	gx	22h59m48s	+26°18.1'		Peg	16"	buona / ottimo	debolissima, a tratti appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina molto debole a 1.5' NW; meglio contrastata se si scala sino a 188x.
UGC 12293	gx	22h59m52s	+26°02.0'		Peg	16"	buona / ottimo	chiazza rotondeggiante molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, con Ø di 40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 45" NW — 270x.
UGC 12295	gx	23h00m24s	+01°37.6'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima chiazza rotondeggiante di ~ 1' di Ø, ma è molto diffusa; appare poco più evidente scalando a 188x.
UGC 12296	gx	23h00m18s	+19°07.6'		Peg	16"	buona / ottimo	è una galassietta elusiva che salta fuori in visione distolta a ~ 1' NW di una stellina; solo a tratti appare allungata da E a W per una 40-ina di secondi; meglio tuttavia scalare sino a 188x.
UGC 12297	gx	23h00m09s	+31°24.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20", con bulge abbastanza marcato sul disco e nucleo stellare ben visibile a 380x.
UGC 12298	gx	23h00m14s	+39°14.2'		And	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con tenue bulge piccolo e poco contrastato; c'è una stellina molto debole a 1' SE — 450x.
UGC 12300	gx	23h00m37s	+12°47.0'		Peg	24"	buona / m. buono	relativamente facile, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" (o poco più), con bulge diffuso poco contrastato sul disco — 450x.
UGC 12301	gx	12h00m44s	+02°30.2'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø max di 20" e di luminosità uniforme; è situata a ridosso verso S di una stellina — 450x.
UGC 12302	gx	23h01m00s	+06°45.0'		Psc	16"	buona / mediocre	debole e di aspetto un po' confuso; a tratti sembra di vedere una "barra" molto tenue orientata da NE a SW che si stacca leggermente dall'alone; c'è una stellina brillante a ~ 1' verso E — 270x.
UGC 12303	gx	23h00m49s	+26°44.4'		Peg	16"	m. buona / buono	debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di 45"-50" e poco più brillante all'interno — 270x.
UGC 12307	gx	23h01m12s	+12°43.3'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima, a tratti pare una edge-on, orientata da N a S con dimensioni grosso modo 60"×15".
UGC 12308	gx	23h01m19s	+14°20.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'×30" (estesa cioè come la distanza delle 2 stelline brillanti situate a S e SW che sono orientate nello stesso modo) — 270x.
UGC 12310	gx	23h01m20s	+28°24.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	a 380x spicca subito un nucleo stellare circonfuso da un tenuissimo alone poco allungato da E a W e di dimensioni 30"×20".
UGC 12311	gx	23h01m25s	+30°14.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una coppia sbilanciata di stelline a 1' N e un'altra poco più larga alla stessa distanza verso SW — 450x.
UGC 12318	gx	23h02m08s	+25°40.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare senza difficoltà in visione distolta, meglio a 340x, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso N.
UGC 12323	gx	23h02m33s	+32°35.6'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW e un'altra molto debole a 1' SE; una stella abbastanza brillante si trova a poco più di 1' verso S; meglio evidente a 340x.
UGC 12326	gx	23h02m46s	+22°05.8'		Peg	16"	buona / ottimo	è un elusivo oggetto rotondo di una 30-ina di secondi di Ø che appare solo a tratti in visione distolta quasi a ridosso verso W di una stellina — 380x.
UGC 12328	gx	23h02m55s	+26°50.1'		Peg	24"	ottima / buono	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 12330	gx	23h03m09s	+09°22.6'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima bolla circolare di luminosità uniforme e molto diffusa, di 35"-40" di Ø; appare abbastanza facilmente in visione distolta scalando a 270x; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da NE a SW.
UGC 12331	gx	23h02m59s	+34°43.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12333	gx	23h03m18s	+19°57.3'		Peg	24"	buona / buono	debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' scarso S (ossia proseguendo lungo l'asse della gx) — 450x.
UGC 12334	gx	23h03m58s	+27°18.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è poco più contrastata a 270x.
UGC 12336	gx	23h04m06s	+01°54.5'		Psc	16"	m. buona / buono	relativamente facile, rotonda, di 40" di Ø, poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' SE — 380x.
UGC 12338	gx	23h04m15s	+17°54.0'		Peg	24"	buona / buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a ridosso verso N di una stellina; non sembra più estesa di 30"; meglio a 450x per ridurre il fastidio di una coppia di stelle brillanti a SE e a E della gx.
UGC 12340	gx	23h04m34s	+27°09.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina a 1' N — 450x.
UGC 12341	gx	23h04m30s	+44°13.3'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; disturbata da una stella brillante situata 1' a E (che è in realtà costituita da una tripletta molto sbilanciata); una coppia di deboli stelline si trova a SW; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 12342	gx	23h04m54s	+16°40.5'		Peg	24"	buona / buono	debole, diffusa e condensata, a tratti di aspetto irregolare se osservata a 450x ed estesa una 30-ina di secondi.
UGC 12345	gx	23h04m42s	+44°32.6'		And	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo lucore forse circolare ed esteso una 30-ina di secondi; appare in visione distolta a ridosso NE di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x; un'altra stellina di luminosità simile si trova subito a NE.
UGC 12346	gx	23h05m13s	+00°50.0'		Psc	16"	m. buona / discreto	è un debolissimo oggetto di forma indistinta, molto piccola, forse rotondo con Ø di 20"-25"; meglio osservabile a 270x.
UGC 12347	gx	23h05m12s	+18°52.1'		Peg	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di oltre 30"; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
UGC 12348	gx	23h05m19s	+00°11.4'		Psc	24"	m. buona / buono	è una sorta di "baffo" di dimensioni 40"×20" che si estende a SE di una stellina brillante; presenta un nucleo stellare abbastanza evidente a 450x.
UGC 12350	gx	23h05m20s	+16°52.0'		Peg	16"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, situata a ridosso verso N, della più occidentale di 2 stelline di luminosità simile e distanti un paio di primi; è molto allungata da E a W per oltre 2'; è meglio visibile a 188x.
UGC 12351	gx	23h05m45s	+18°59.2'		Peg	24"	buona / ottimo	è debolissima, ma in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 60"×20" — 450x.
UGC 12352	gx	23h05m40s	+27°39.9'		Peg	16"	m. buona / buono	è una chiazza di luce diffusa che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, estesa oltre 1'; c'è una stellina praticamente a ridosso di NE; un'altra stellina, verso E, è poco più distante — 270x.
UGC 12354	gx	23h05m56s	+14°21.4'		Peg	24"	buona / m. buono	debole, relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge molto tenue e diffuso — 340x.
UGC 12356	gx	23h05m49s	+31°05.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo quasi stellare; è allineata con 2 stelline distanti 30" e orientate da E a W — 380x.
UGC 12357	gx	23h05m51s	+31°03.8'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta a 380x; ogni tanto sembra allungata da N a S, ma non è più estesa di 30".
UGC 12358	gx	23h05m48s	+34°09.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10", ma la forma è un po' disturbata da una stellina a ridosso verso SW — 340x .
UGC 12359	gx	23h06m05s	+14°52.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 45"; è situata tra 2 stelline orientata da NW a SE e distanti 3' — 450x.
UGC 12362	gx	23h06m15s	+31°53.0'		Peg	24"	ottima / buono	debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW; la gx è poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 12363	gx	23h06m32s	+00°10.3'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N — 450x.
UGC 12370	gx	23h07m06s	+09°57.7'		Peg	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa poco più di 1'; è disturbata da una stella brillante situata quasi a ridosso verso N — 450x.
UGC 12372	gx	23h07m00s	+35°46.6'		And	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme e Ø di ~ 40"; a 380x appare una stellina a ridosso verso NE, mentre un'altra più brillante si trova a una 15-ina di secondi poco più in là nella stessa direzione.
UGC 12374	gx	23h07m28s	+15°22.0'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
UGC 12377	gx	23h03m26s	+86°46.0'		Cep	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta quando di osserva UGC 12387 dalla quale dista 1' verso NW — 450x.
UGC 12380	gx	23h07m40s	+11°31.6'		Peg	24"	buona / ottimo	chiazza molto debole, di luminosità uniforme e di aspetto un po' confuso, grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; non sembra disturbata dalla stella brillante situata 1' a SE — 450x.
UGC 12381	gx	23h07m23s	+43°36.2'		And	24"	m. buona / m. buono	debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12383	gx	23h07m49s	+22°42.6'		Peg	16"	buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa e di forma indistinta, forse rotonda con Ø di ~ 40"; appare poco più contrastata scalando sino a 188x.
UGC 12384	gx	23h07m46s	+24°57.6'		Cet	24"	buona / buono	debolissimo lucore circolare di 30"-35" di Ø, molto stemperato sul fondo cielo; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso verso E e NE.
UGC 12385	gx	23h07m49s	+30°18.9'		Peg	24"	buona / ottimo	molto diffusa e con nucleo quasi stellare; è situata in mezzo a due stelline che tendono a confonderne un po' la forma; una terza stellina, più debole, si trova a ridosso E; la gx è forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
UGC 12386	gx	23h08m01s	+24°58.4'		Cet	24"	buona / buono	galassietta elusiva, appare a tratti in visione distolta a 400x, non più estesa di 20" e con tenuissimo nucleo stellare; c'è una stellina a 1' SW.
UGC 12387	gx	23h04m20s	+86°45.0'		Cep	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 12388	gx	23h08m30s	+12°49.8'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 90"×30" e con bulge appena accennato; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12390	gx	23h08m58s	+23°22.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; un nucleo stellare appare abbastanza facilmente; tuttavia è più interessante scalando a 340x.
UGC 12394	gx	23h09m31s	+32°40.5'		Peg	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' NE; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12396	gx	23h10m00s	+42°34.0'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stella brillante quasi a ridosso SW (fa parte di un piccolo asterismo di 3 componenti di luminosità simile) — 450x.
UGC 12398	gx	23h10m22s	+02°37.3'		Peg	24"	buona / buono	è una debole lama di luce orientata da E a W ed estesa per ~ 1; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 12400	gx	23h10m36s	+21°42.7'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 12402	gx	23h10m29s	+48°37.6'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza rotondeggiante estesa sì e no 30"; c'è una debole stellina a ridosso S e un'altra appena più evidente a 1' verso E — 450x.
UGC 12405	gx	23h11m21s	+06°15.8'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; poco meglio definita scalando a 340x.
UGC 12413	gx	23h12m20s	+28°43.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un piccolo nucleo poco contrastato; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12416	gx	23h12m43s	+10°43.8'		Peg	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale evidente — 450x.
UGC 12421	gx	23h11m50s	+77°34.7'		Cep	24"	buona / ottimo	di aspetto simile a UGC 12504 — osservata subito prima — anche questa molto debole, ma di aspetto più uniforme e regolare; è molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12423	gx	23h13m13s	+06°25.8'	q 214	Psc	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole, orientata da NW a SE, estesa per oltre 2' e con una piccola zona centrale poco più evidente; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
UGC 12425	gx	23h13m10s	+24°14.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, ma facilmente visibile anche in visione diretta, molto allungata da N a S, di dimensioni 80"×20" e con bulge appena più evidente; c'è una stellina brillante un paio di primi verso W — 380x.
UGC 12426	gx	23h13m33s	+06°34.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi e orientata da N a S; appare in visione distolta in una piccola zona di cielo depleta, poco meglio evidente a 450x .
UGC 12427	gx	23h13m24s	+28°57.4'		Peg	24"	ottima / ottimo	è una piccola e debolissima chiazza molto diffusa e di forma indistinta, non più estesa di 20"-25"; è situata a ridosso NE di una stellina abbastanza brillante — 450x.
UGC 12429	gx	23h13m49s	+22°41.8'		Peg	16"	buona / m. buono	debolissimo lucore molto stemperato sul fondo cielo ed esteso ~ 1'; appare solo a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 188x.
UGC 12430	gx	23h13m43s	+29°00.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa per oltre 1.5' — 450x.
UGC 12433	gx	23h13m44s	+49°40.6'		And	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo e con Ø di 20"-30", visibile solo a tratti in visione distolta a 380x; c'è una doppia stretta quasi a ridosso verso SW.
UGC 12434	gx	23h14m05s	+13°10.7'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge quasi stellare; c'è una stellina a 1' verso E; un'altra stellina appena più si trova quasi a ridosso NE 450x.
UGC 12435	gx	23h14m08s	+32°02.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N — 450x.
UGC 12436	gx	23h14m12s	+05°20.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata, e forse interagente, con PGC 70768 situata a ridosso NNE (v. voce corrispondente); appare come una debolissima lama di luce estesa per ~ 1' — 450x.
UGC 12439	gx	23h13m56s	+48°19.6'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 30"; la visione è un po' disturbata dalla presenza di alcune stelle brillanti nel campo oculare — 450x.
UGC 12440	gx	23h14m22s	+16°27.3'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 12444	gx	23h14m29s	+31°33.0'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di 45"; presenta nucleo quasi stellare abbastanza contrastato sul disco; c'è una stellina subito a SE — 380x.
UGC 12445	gx	23h14m18s	+49°47.9'		And	16"	discreta / m. buono	è un piccolo oggetto rotondo molto debole, con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
UGC 12446	gx	23h14m33s	+00°14.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile e compatta, pur restando un oggetto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
UGC 12451	gx	23h14m45s	+05°24.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce estesa ~ 1' in direzione N-S; appare in visione distolta a 450x (a 340x tende a perdersi nei bagliori di una stella di 10ª grandezza situata un paio di primi a NW).
UGC 12452	gx	23h15m03s	+01°26.1'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa oltre 1'; solo a tratti appare un tenuissimo bulge molto diffuso — 450x.
UGC 12454	gx	23h15m09s	+09°40.8'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con bulge diffuso poco più contrastato del disco; una debolissima stellina sfuocata che appare solo a tratti in visione distolta a 380x sul prolungamento dell'asse della gx è la PGC 70822.
UGC 12459	gx	23h15m39s	+24°54.0'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; disturbata dalla SAO 91128 di 8ª grandezza situata 2.5' a N — 450x.
UGC 12461	gx	23h15m53s	+05°07.7'		Psc	16"	m. buona / discreto	molto debole, rotonda, diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale di aspetto quasi stellare visibile a tratti a 270x.
UGC 12462	gx	23h15m50s	+09°31.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per ~ 45"; meglio osservabile a 270x.
UGC 12466	gx	23h15m59s	−01°50.8'		Psc	16"	m. buona / buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina a 1' verso S — 270x.
UGC 12470	gx	23h16m22s	+28°29.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 12471	gx	23h16m28s	+18°33.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a 1' SW.
UGC 12474	gx	23h16m43s	+33°59.8'		Peg	16"	m. buona / ottimo	facilmente visibile a 380x, ma di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20".
UGC 12475	gx	23h16m59s	+03°42.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da E a W e che in visione distolta appare estesa per almeno 1'; meglio contrastata a 450x.
UGC 12476	gx	23h17m03s	+30°20.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma molto disturbata dalla luce di una stella brillante di 7° situata 2.5' NNW e che quindi non si riesce a tenere fuori campo neppure a 380x; è allungata da E a W, con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme.
UGC 12479	gx	23h17m26s	−01°35.2'		Psc	16"	m. buona / discreto	molto debole e molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; a tratti appare un tenuissimo bulge diffuso — 270x.
UGC 12482	gx	23h17m44s	+29°01.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda, con Ø di 30" e con condensazione centrale facilmente visibile a 380x.
UGC 12490	gx	23h18m38s	+25°14.0'		Peg	16"	m. buona / buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme; è situata al vertice SW di un piccolo triangolo rettangolo formato con 2 stelline — 270x.
UGC 12491	gx	23h18m38s	+42°57.5'		And	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 40"; presenta un nucleo evidente di aspetto quasi stellare a 380x.
UGC 12492	gx	23h18m54s	−01°03.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	abbastanza facile, rotonda, diffusa con Ø di 40"; presenta una condensazione centrale evidente a 380x.
UGC 12494	gx	23h18m52s	+06°52.6'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e per di più situata in una piccola zona di cielo depleta; meglio dunque scalare a 340x; in visione distolta appare di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20".
UGC 12495	gx	23h18m49s	+16°37.6'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore molto diffuso che in visione distolta si diparte verso E da una coppia serrata di deboli stelline; a tratti appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30", ma è meglio scendere a 270x.
UGC 12496	gx	23h18m51s	+42°03.9'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge evidente e contrastato — 450x.
UGC 12502	gx	23h19m12s	+22°26.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con bulge appena percettibile; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
UGC 12503	gx	23h19m19s	+00°56.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole e molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×10" e con tenue bulge diffuso appena percettibile — 450x.
UGC 12504	gx	23h18m29s	+77°19.2'		Cep	24"	buona / buono	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12506	gx	23h19m30s	+16°04.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W per 1.5'; c'è una stellina appena percettibile al bordo S — 450x.
UGC 12507	gx	23h19m20s	+43°58.5'		And	16"	discreta / m. buono	molto debole, ma relativamente facile da vedere a 380x, allungata da NW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo di aspetto stellare; c'è una coppia di stelline un paio di primi a NW orientate grosso modo come la gx.
UGC 12508	gx	23h19m37s	+01°28.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da NW a SE e di dimensioni 45"×30"; a tratti, osservando a 380x, appare un piccolo oggetto a ~ 1' verso N che da un controllo successivamente effettuato è risultato in realtà essere la MAC 2319-0129.
UGC 12514	gx	23h19m55s	+26°00.7'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme; solo a tratti in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 50"×25", ma bisogna scalare a 270x.
UGC 12515	gx	23h19m51s	+26°15.7'		Peg	16"	m. buona / buono	facile, diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a neppure 1' verso N — 270x.
UGC 12517	gx	23h19m54s	+43°57.4'		And	16"	discreta / m. buono	rotonda, diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale e Ø di ~ 40"; c'è una debolissima stellina quasi a ridosso NE osservabile a 380x.
UGC 12518	gx	23h20m13s	+07°55.9'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima, molto allungata da NNE a SSW (l'asse della gx punta di fatto a una stellina situata 3' NNE) con dimensioni 60"×20"; meglio osservabile a 270x nonostante si faccia più fatica a tenere fuori campo la SAO 128119 di 7ª situata 7' NW.
UGC 12519	gx	23h20m03s	+15°57.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con tenue bulge abbastanza evidente, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×20"; è allineata con 2 deboli stelline a SSE distanti 1' — 450x.
UGC 12521	gx	23h20m11s	−01°51.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a un paio di primi verso NNW (vale a dire sul prolungamento dell'asse della gx); meglio scalare a 380x.
UGC 12522	gx	23h20m16s	+08°00.3'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, estesa una 30-ina di secondi; salta fuori a tratti in visione distolta a 380x .
UGC 12524	gx	23h20m09s	+42°58.0'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; allineata ed equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti a E; la gx è un po' disturbata dalla SAO 52915 di 6ª grandezza situata 3' a W — 450x.
UGC 12525	gx	23h20m27s	+01°33.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	più debole di UGC 12521 e di aspetto un po' confuso, poco allungata ~ da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
UGC 12528	gx	23h20m20s	+35°29.5'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e appena più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW e un'altra poco più debole subito a N — 450x.
UGC 12530	gx	23h20m32s	+29°18.4'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole bolla circolare di luminosità uniforme e con Ø di 1'; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x.
UGC 12533	gx	23h20m53s	+23°48.5'		Peg	24"	buona / ottimo	debole lama di luce orientata da N a S ed estesa 1', con tenue condensazione centrale poco contrastata; ho dovuto spingere a 580x per cercar di tenere fuori campo la τ Peg di magnitudo 4.6 situata 5' a SW.
UGC 12537	gx	23h21m08s	+29°32.9'		Peg	16"	m. buona / ottimo	presenta un tenue nucleo stellare circonfuso da un debolissimo alone forse rotondo ed esteso una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 12538	gx	23h21m10s	+33°24.0'		Peg	16"	ottima / buono	debole, ma relativamente facile da vedere a 270x, molto allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×20'; a 380x è un po' meno definita, ma appare un tenue bulge diffuso lungo l'asse della gx; c'è un piccolo triangolo serrato subito a SW.
UGC 12543	gx	23h21m33s	+27°07.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	è un debolissimo baffo orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; è la componente di un trio, assieme alla coppia UGC 12545-6, che non ero riuscito a scorgere col 16" a 270x — 450x.
UGC 12544	gx	23h21m45s	+09°04.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; si trova al vertice rettangolo di un piccolo triangolo formato con 2 deboli stelline a SE e SW; c'è una stella brillante a 2' NE.
UGC 12545	gx	23h21m41s	+27°05.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole e spampanata, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso verso W (osservabile elusivamente nel 16" a 270x) .
UGC 12546	gx	23h21m41s	+27°05.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole e appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" (già precedentemente osservata, seppure molto debolmente, col 16" a 270x in buone condizioni di cielo) — 450x.
UGC 12550	gx	23h21m47s	+43°59.6'		And	16"	discreta / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda, con Ø di 45" e con bulge appena più contrastato del disco; è situata subito a W di un piccolo asterismo di stelline foggiato a "Y" — 380x.
UGC 12551	gx	23h22m09s	+09°16.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 12552	gx	23h22m05s	+13°02.1'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debole e relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; qualche lieve discrepanza di luce appare ogni tanto a 450x.
UGC 12553	gx	23h22m13s	+09°23.0'		Peg	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza di aspetto indistinto, molto stemperata sul fondo cielo ed estesa una 40-ina di secondi; appare con difficoltà in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 12557	gx	23h22m28s	+29°10.9'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta a 380x, orientata da N a S ed estesa per oltre 1'.
UGC 12558	gx	23h22m19s	+50°09.6'		And	28"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; ci sono 3 stelline abbastanza brillanti allineate a SW, mentre una coppia di stelline più deboli si trova a 1' verso S — 495x.
UGC 12564	gx	23h22m47s	+22°56.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni che in visione distolta sembrano di 45"×15" — 450x.
UGC 12565	gx	23h22m45s	+23°12.7'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x, rotonda con Ø > 30".
UGC 12566	gx	23h22m46s	+29°08.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso; presenta una tenue condensazione centrale visibile a 380x.
UGC 12567	gx	23h22m39s	+43°57.9'		And	16"	discreta / m. buono	situata 6' a W di UGC 12573 è piccolo e debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente solo in visione distolta a 380x.
UGC 12568	gx	23h22m58s	+42°41.1'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza forse circolare estesa una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; allineata ed equidistante con due stelline a SW — 450x.
UGC 12569	gx	23h23m12s	+14°54.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; si vede abbastanza facilmente in visione distolta, ma bisogna scalare a 270x.
UGC 12570	gx	23h23m10s	+32°31.6'		Peg	16"	ottima / buono	debole oggetto rotondo, poco diffuso, di luminosità uniforme e Ø 30"; c'è una doppia stretta a 40" NW — 380x.
UGC 12571	gx	23h23m22s	+13°19.2'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 270x.
UGC 12573	gx	23h23m12s	+43°57.5'		And	16"	discreta / m. buono	relativamente facile, diffusa e ad alto gradiente, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
UGC 12574	gx	23h23m41s	+19°34.2'		Peg	24"	buona / buono	debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e un piccolo bulge abbastanza contrastato — 450x.
UGC 12577	gx	23h24m01s	+20°41.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce di luminosità uniforme, estesa 1' e orientata da NE a SW — 450x.
UGC 12580	gx	23h24m34s	+08°37.0'		Peg	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con bulge appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SSE — 450x.
UGC 12581	gx	23h24m34s	+09°16.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 45" e appena più brillante all'interno — 270x.
UGC 12582	gx	23h24m31s	+16°52.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	è situata al margine NE di un piccolo ammasso di gx denominato AGC 2589 e il cui membro più brillante è rappresentato da NGC 7647 — molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø > 30"; meglio visibile scalando a 340x.
UGC 12583	gx	23h24m34s	+23°59.2'		Peg	24"	buona / ottimo	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa forse 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre spingere a 580x per tenere fuori campo la SAO 91241 di 8ª grandezza situata 3' a W — 450x.
UGC 12584	gx	23h24m40s	−02°00.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare tuttavia solo in visione distolta a 340x; forma una coppia ravvicinata con MCG+0-59-39 (v. la voce nell'apposita sezione).
UGC 12585	gx	23h24m39s	+08°25.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima bolla circolare assai stellina e di almeno 1' di Ø; appare un po' meglio scalando a 270x.
UGC 12587	gx	23h24m50s	+26°38.7'		Peg	16"	buona / m. buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø > 30" e di luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo con 2 stelline situate 1' S e 1.5' SE — 270x.
UGC 12588	gx	23h24m43s	+41°20.9'	q 88	And	16"	m. buona / buono	estesa chiazza circolare di luminosità pressoché uniforme, diffusa, facilmente visibile in visione distolta nonostante la Luna poco dopo il primo quarto sorta da poco; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW (la galassia era osservabile anche nel 25 cm a 118x) — 270x.
UGC 12589	gx	23h25m02s	+00°00.1'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 12590	gx	23h25m11s	+15°12.0'		Peg	24"	m. buona / discreto	relativamente facile e compatta, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge poco contrastato — 450x.
UGC 12591	gx	23h25m22s	+28°29.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con condensazione centrale abbastanza marcata a 380x.
UGC 12593	gx	23h25m24s	+32°40.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso; in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 12596	gx	23h23m41s	+19°34.2'		Peg	24"	buona / buono	debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e piccolo bulge abbastanza contrastato — 450x.
UGC 12599	gx	23h26m48s	+25°41.2'		Peg	24"	buona / ottimo	relativamente facile, con nucleo quasi stellare evidente, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; situata tra due stelline brillanti distanti un paio di primi in direzione NW-SE — 450x.

UGC 12601	gx	23h27m10s	+15°01.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; è molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina a 1' verso NW.
UGC 12604	gx	23h27m40s	+22°45.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" e di luminosità pressoché uniforme, salvo una tenue condensazione stellare visibile però solo a momenti.
UGC 12609	gx	23h28m01s	+31°00.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	è un ovale molto debole e stemperato sul fondo cielo, orientato da NW a SE con dimensioni 60"×30"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; c'è una stellina a ridosso W.
UGC 12611	gx	23h28m13s	+27°41.3'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso poco contrastato; presenta un nucleo quasi stellare visibile a momenti; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
UGC 12613	gx	23h28m34s	+14°44.8'	q 214	Peg	16"	ottima / discreto	è un debolissimo lucore che si stacca a fatica in un campo molto ricco di stelline; in visione distolta appare solo la parte centrale più brillante estesa ~ 3' e molto allungata in direzione NW-SE; talvolta la chiazza lattescente sembra abbracciare una zona poco più ampia, ma potrebbe essere un effetto prodotto dalle stelline di campo — 270x.
UGC 12619	gx	23h28m45s	+22°14.1'		Peg	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30".
UGC 12624	gx	23h29m07s	+21°33.8'		Peg	24"	buona / ottimo	debolissima lama di luce diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa forse 1'; poco più evidente restando a 450x; ci sono due stelline molto deboli a S orientate come la galassia.
UGC 12625	gx	23h29m07s	+29°46.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, lama di luce relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme (qualche discrepanza appena percettibile appare a tratti lungo l'asse), orientata da N a S ed estesa 1'; c'è una stellina subito a N; è situata a S di un piccolo asterismo triangolare formato da 5 stelle brillanti — 450x.
UGC 12626	gx	23h29m15s	+26°22.7'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 12627	gx	23h29m11s	+35°02.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×30"; poco meglio evidente restando a 450x.
UGC 12628	gx	23h29m22s	+03°23.4'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme; si apprezza molto meglio scalando a 188x: è rotonda con Ø di 1' scarso.
UGC 12629	gx	23h29m51s	+32°42.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso E — 450x.
UGC 12630	gx	23h29m54s	+08°57.9'		Peg	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; si trova in mezzo a 2 stelline distanti un paio di primi o poco più e orientate quasi a perpendicolo con la gx — 450x.
UGC 12631	gx	23h30m01s	+27°05.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo ovale di 40"×20" orientato da NW a SE e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 380x.
UGC 12632	gx	23h29m59s	+40°59.4'	q 88	And	16"	ottima / m. buono	è tenuissimo lucore di forma indistinta, ma comunque non più esteso di 40", visibile solo a momenti in visione distolta a 270x; è situato subito a S di un piccolo asterismo di 5 stelline che ricorda una sorta di Cefeo in miniatura.
UGC 12633	gx	23h30m13s	+15°45.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e poco più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (a tratti sembra di vedere qualcosa subito a NE: forse una debolissima stellina — 450x.
UGC 12634	gx	23h30m07s	+40°13.5'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo 45"×15"; c'è un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti abbastanza serrato a NE — 450x.
UGC 12635	gx	23h30m26s	−00°09.4'		Psc	16"	m. buona / discreto	è un'elusiva chiazza grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; appare solo a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 188x; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE.
UGC 12636	gx	23h30m19s	+27°08.0'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima macchiolina rotonda di 20"-25" di Ø che a prima vista in visione distolta sembra dipartirsi verso E da una stellina — 380x.
UGC 12639	gx	23h30m27s	+30°13.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, solo appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di ~ 1'; maglio scalare a 270x.
UGC 12641	gx	23h30m54s	+20°15.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12644	gx	23h31m27s	+29°11.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce che in visione distolta sembra aggettare a W della più meridionale di una coppia di stelline; non sembra più esteso di 30" — 450x.
UGC 12645	gx	23h31m29s	+32°28.9'		Peg	16"	ottima / mediocre	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" (che vento!) — 270x.
UGC 12646	gx	23h31m39s	+25°56.8'		Peg	16"	m. buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso S — 270x.
UGC 12648	gx	23h31m53s	−02°09.4'		Psc	16"	m. buona / discreto	è una debole chiazza rotonda, molto diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 1'; è allineata ed equidistante con 2 stelline distanti 1.5' e orientate da NE a SW: quella a NE, più vicina alla gx, è più brillante — 270x.
UGC 12649	gx	23h31m53s	+44°49.3'		And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 45", con bulge rotondo, di una 20-ina di secondi evidente; c'è un piccolo piccolo triangolo allungato da N a S di 4 stelline (quella mediana è appena percettibile) a ridosso SW — 450x.
UGC 12650	gx	23h32m02s	+32°25.3'		Peg	16"	ottima / mediocre	appena più debole di UGC 12645, ma a tratti pare meglio definita; è di luminosità uniforme e molto allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×20" — 270x.
UGC 12651	gx	23h56m07s	+49°29.9'		Cas	24"	ottima / ottimo	chiazza circolare molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra due stelline che ne lambiscono i margini NE w SW: la 2ª è più debole — 450x.
UGC 12652	gx	23h32m16s	+44°58.2'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' SE e una debole subito a N — 450x.
UGC 12653	gx	23h32m31s	+14°49.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo alone oblungo esteso sì e no 1' che si diparte a E e a W da una stellina brillante situata proprio nel centro della gx — 380x.
UGC 12655	gx	23h32m29s	+23°55.9'		Peg	16"	m. buona / buono	è un oggetto facile, poco diffuso e appena più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40", ma è disturbata dalla luce di una stella brillante di 6ª situata 5' verso S — 270x.
UGC 12656	gx	23h32m32s	−01°44.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15", con tenue condensazione centrale e un piccolo bulge diffuso abbastanza evidente — 450x.
UGC 12657	gx	23h32m43s	+29°27.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, a 380x appare di 60"×30", orientata da NW a SE con condensazione centrale poco più evidente del disco; c'è una stellina a 1.5' verso NW; forse si apprezza meglio a 270x.
UGC 12658	gx	23h32m45s	+31°06.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; non ne capisco la forma, ma in visione distolta non sembra più estesa di 20"-25".
UGC 12659	gx	23h32m44s	−01°47.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, solo a tratti in visione distolta appare molto allungata da E a W ed estesa > 40"; meglio comunque non scendere sotto i 450x.
UGC 12661	gx	23h33m29s	−01°59.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile però solo a tratti, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 12663	gx	23h33m31s	+24°01.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, rotonda e molto diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' WSW — 380x.
UGC 12664	gx	23h33m33s	+15°33.1'		Peg	24"	m. buona / mediocre	piccola e debolissima, forse rotonda, diffusa ed estesa non più di 15" o 20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
UGC 12665	gx	23h33m39s	+30°02.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, di fatto appare solo in visione distolta a 270x, molto stemperata sul fondo cielo ed estesa non più di una 30-ina di secondi.
UGC 12666	gx	23h33m41s	+32°23.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina brillante al bordo NW (la quale fa parte di una coppia orientata da N a S); una stellina appena percettibile si trova a ridosso E — 450x.
UGC 12667	gx	23h33m49s	+30°03.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	situata a 2.7' NE di UGC 12665 è relativamente facile e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso S e un'altra poco più lontana a SE (seguendo cioè l'asse maggiore della galassia) — 380x.
UGC 12669	gx	23h33m58s	+44°40.8'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; c'è un piccolo triangolo rettangolo a ridosso SE — 450x.
UGC 12670	gx	23h34m15s	+12°33.2'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" (ossia poco più estesa della coppia di stelline subito a E distanti una 30-ina di secondi in direzione E-W); a tratti sembra di aspetto un poco irregolare — 450x.
UGC 12671	gx	23h34m20s	+43°22.8'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima, a tratti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S e un'altra al bordo NE (altre stelline appena percettibili si trovano subito a N della gx) — 450x.
UGC 12672	gx	23h34m23s	+34°37.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima e di aspetto un po' confuso a 380x, grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso NE.
UGC 12677	gx	23h34m48s	+16°51.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a NW — 450x.
UGC 12678	gx	23h34m49s	+26°18.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con bulge appena percettibile; allineata ed equidistante con 2 stelline a S (quella più vicina alla gx è la più brillante) — 450x.
UGC 12681	gx	23h34m55s	+18°04.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza di luminosità uniforme, all'incirca rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a N che in visione distolta sembra quasi a ridosso della galassia — 380x.
UGC 12682	gx	23h34m53s	+18°13.7'	q 169	Peg	16"	m. buona / ottimo	debole lucore molto diffuso e stemperato sul fondo cielo, di aspetto alquanto irregolare ed esteso almeno 1'; è situata 4.5' a W di un piccolo asterismo formato da 4 stelline brillanti — 270x.
UGC 12690	gx	23h35m39s	+01°11.9'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza molto diffusa ed estesa < 1'; è stranamente meglio individuabile a 450x (così diviene anche più facile tenere fuori campo la SAO 128270 di 6ª grandezza situata 7' NNW); a tratti salta fuori una stellina appena percettibile subito a N della gx.
UGC 12692	gx	23h35m43s	+20°17.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 12693	gx	23h35m44s	+32°23.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa ~ 1'; c'è una stellina a ridosso SW; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 12696	gx	23h36m01s	+23°02.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; è poco più evidente a 270x.
UGC 12705	gx	23h36m37s	+14°09.5'		Cet	24"	buona / buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, appare in visione distolta, ma è di aspetto un po' confuso, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
UGC 12707	gx	23h36m41s	+17°30.9'		Peg	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" e di luminosità uniforme; meglio scalare a 188x.
UGC 12710	gx	23h37m33s	+17°59.7'	q 169	Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø di 45"; è praticamente allineata con 2 stelline; praticamente allineata ed equidistante con 2 stelline distanti poco più di 1' e orientate da E a W — 270x.
UGC 12711	gx	23h37m59s	+31°59.7'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è una debole bolla rotonda di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1' verso N — 380x.
UGC 12713	gx	23h38m14s	+30°42.5'	q 124	Peg	16"	ottima / buono	è una gx elusiva, molto diffusa, estesa 40"-45" e che appare solo a momenti in visione distolta a 270x.
UGC 12714	gx	23h38m13s	+32°20.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una coppia di stelline situate a 1' S e SE — 450x.
UGC 12717	gx	23h38m37s	+05°26.0'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina al bordo W e un'altra quasi a ridosso verso SW; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12719	gx	23h38m42s	+26°46.4'		Peg	16"	buona / m. buono	è una debolissima macchiolina che in visione distolta si vede aggettare a NW da una stellina brillante; a tratti appare poco allungata da NE a SW per max 30" — 270x.
UGC 12720	gx	23h39m11s	+05°29.0'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"×10" — 450x.
UGC 12722	gx	23h39m26s	+09°12.4'		Psc	24"	buona / m. buono	debole poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
UGC 12725	gx	23h39m36s	+21°54.9'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 12728	gx	23h40m10s	+47°58.4'		And	24"	buona / discreto	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30": c'è una stellina a ridosso W; meglio evidente scalando a 340x.
UGC 12729	gx	23h40m21s	+01°14.7'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni ~ 60"×30"; si trova a ridosso di un piccolo asterismo foggiato a "y" — 270x.
UGC 12731	gx	23h40m39s	+20°26.5'		Peg	24"	buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa oltre 1'; appare facilmente in visione distolta, ma è poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12733	gx	23h40m47s	+26°50.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena sfocata a 1' verso E (da un controllo effettuato successivamente quest'ultima è risultata la MAC 2340+2649B) — 380x.
UGC 12735	gx	23h41m23s	+16°09.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, con tenue e piccola condensazione centrale, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso W e un'altra a 1' scarso verso S — 450x.
UGC 12739	gx	23h41m46s	−01°21.1'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debole, piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme e con Ø max di 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW; un'altra stellina poco più evidente si trova sempre a SW, ma a 1' di distanza dalla gx — 380x.
UGC 12741	gx	23h41m56s	+30°34.9'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da E a W, di dimensioni 45"×20" e con nucleo quasi stellare ben evidente a 380x; è allineata ed equidistante con 2 stelline orientate da NW a SE.
UGC 12742	gx	23h41m50s	+44°58.5'		And	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso SE; una piccolo quadrilatero di deboli stelline si trova subito a N — 450x.
UGC 12746	gx	23h42m47s	+27°17.8'		Peg	16"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce estesa per poco più di 1' in direzione NE-SW, con condensazione centrale molto tenue di aspetto stellare — 270x.
UGC 12747	gx	23h43m02s	+19°25.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole oggetto rotondo relativamente compatto, di 30" di Ø e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 12748	gx	23h43m10s	+10°23.3'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, ma più che altro disturbata dalla brillante 77 Pegasi di 5ª grandezza situata 4' a SE; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
UGC 12750	gx	23h43m15s	+49°58.7'		Cas	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina al margine NW e un'altra più debole a SW — 450x.
UGC 12752	gx	23h43m28s	+11°39.0'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza lattescente, molto diffusa, di luminosità uniforme e Ø di ~ 40"; disturbata da una stella brillante di 8ª a 3' S, ma se la si osserva a 380x si stempera eccessivamente.
UGC 12755	gx	23h43m50s	+28°20.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere in visione distolta, grosso modo rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso W e una più debole a 1' SE; c'è un piccolo triangolo serrato di stelline a 3' N — 380x.
UGC 12756	gx	23h43m57s	+11°30.9'		Peg	16"	m. buona / ottimo	poco più evidente di UGC 12755 (forse perché più lontana dalla stella di cui sopra) e poco più piccola, estesa max 30"; a 380x sembra orientata come le 2 stelline situate a S e WSW, con dimensioni 30"×20".
UGC 12762	gx	23h44m32s	+21°56.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 45"×30"; c'è una stellina brillante a 1' NW — 450x.
UGC 12764	gx	23h44m39s	+22°04.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	poco più debole di UGC 12762, dalla quale dista 4.5' a NNE; è di aspetto grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
UGC 12765	gx	23h44m49s	+44°36.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
UGC 12767	gx	23h45m10s	+07°02.5'		Psc	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo baffo che protrude per una 30-ina di secondi a N di una stellina brillante; c'è una stellina molto debole subito a NE — 380x.
UGC 12774	gx	23h46m03s	−01°53.5'		Psc	16"	ottima / scarso	debole, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 3' NE (situate a perpendicolo con un'altra coppia situata 6' a N) — 270x.
UGC 12775	gx	23h46m14s	+05°52.1'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso verso W; meglio osservabile a 340x.
UGC 12776	gx	23h46m12s	+33°22.2'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccolo nucleo evidente; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a WNW e due più deboli a E; meglio non scendere sotto i 450x, perché la gx si trova in mezzo a due stelle molto brillanti (la SAO 73497 di 9a grandezza a NE e la SAO 73487 di 7a a SW) che altrimenti non si riescono a tenere fuori campo.
UGC 12784	gx	23h48m04s	+17°28.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore molto stemperato sul fondo cielo e di aspetto un po" confuso; grosso modo rotonda, di ~ 1' di Ø e con tenue condensazione centrale — 270x.
UGC 12785	gx	23h48m00s	+27°22.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 380x.
UGC 12792	gx	23h49m02s	+26°47.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 270x.
UGC 12793	gx	23h49m15s	+11°48.2'		Peg	24"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare con relativa facilità in visione distolta a 450x.
UGC 12795	gx	23h49m11s	+46°33.2'		And	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450x.
UGC 12796	gx	23h49m20s	+47°55.1'		And	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una doppia serrata a S; meglio definita scalando a 340x.
UGC 12798	gx	23h49m40s	+29°55.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da E a W ed estesa 1' — 450x
UGC 12799	gx	23h49m54s	+02°42.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa per 1'; c'è una stellina brillante a meno di 1' NW — 450x.
UGC 12800	gx	23h50m19s	+10°45.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, poco ~ da N a S, di dimensioni 60"×30", con piccolo nucleo evidente a 380x; è situata tra 2 stelline distanti 1' (la lunghezza della gx è stata in effetti stimata sulla distanza di queste 2 stelline) e orientate da NW a SE.
UGC 12801	gx	23h50m27s	+26°08.8'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto diffusa e molto debole, in visione distolta appare come una sorta di alone asimmetrico che aggetta verso SE da una stellina brillante per una 40-ina di secondi — 380x.
UGC 12803	gx	23h50m34s	+28°59.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata ~ da E a W, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale abbastanza netta a 380x; c'è una stellina a ridosso verso E.
UGC 12804	gx	23h50m37s	+24°33.4'		Peg	24"	buona / buono	debole bolla circolare diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
UGC 12809	gx	23h51m03s	+46°43.4'		And	24"	ottima / ottimo	debole chiazza circolare con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo N — 450x.
UGC 12811	gx	23h51m08s	+08°43.7'		Peg	24"	m. buona / buono	poco diffusa, orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20" e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
UGC 12812	gx	23h51m19s	+20°34.6'		Peg	16"	ottima / ottimo	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta, preferibilmente a 270x; non riesco a capirne la forma, ma è comunque molto piccola; c'è una stellina appena percettibile a 1' S.
UGC 12814	gx	23h51m21s	+49°04.7'		And	24"	buona / discreto	debolissima lama di luce estesa 1' scarso e orientata da E a W; c'è una stellina subito a E e una debole quasi a ridosso NE — 450x.
UGC 12816	gx	23h51m51s	+03°05.0'		Psc	16"	ottima / scarso	molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1.5' verso W; la 22 Psc di magnitudo 5.6 lambisce il campo oculare a SSE — 270x.
UGC 12817	gx	23h51m52s	+29°15.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma più che altro disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso NW; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
UGC 12818	gx	23h52m11s	+08°23.7'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è debolissima, ma in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da come le 2 stelline brillanti situate a E (ossia da NNE a SSW); è di luminosità uniforme e ha dimensioni 60"×20" — 380x.
UGC 12822	gx	23h52m36s	+14°33.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 45" e gradiente medio; presenta una piccola condensazione centrale, evidente a 380x, di aspetto quasi stellare.
UGC 12823	gx	23h52m44s	+27°07.9'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, appena più brillante all'interno, molto diffusa, rotonda con Ø di ~ 40"; meglio evidente a 270x.
UGC 12826	gx	23h53m10s	+29°34.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge quasi stellare; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
UGC 12835	gx	23h53m57s	+28°29.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge ben contrastato — 450x.
UGC 12838	gx	23h54m26s	−01°56.0'		Psc	16"	ottima / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; appare senza difficoltà in visione distolta a 270x; la SAO 146971 di magnitudo 8.5, situata a soli 3' ESE, non si riesce a tenere fuori campo.
UGC 12839	gx	23h54m30s	+28°18.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso S — 450x.
UGC 12840	gx	23h54m29s	+28°52.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	Anche questa è relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. circolare con Ø di 45" — 450x.
UGC 12843	gx	23h55m30s	+17°55.3'	q 125	Peg	16"	ottima / m. buono	è un debolissimo baffo di luce esteso ~ 40" che sembra dipartirsi verso SW da una stellina brillante; una stellina debole si trova a 1' SW di quest'ultima — 380x.
UGC 12844	gx	23h55m39s	+19°31.0'		Peg	24"	buona / buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 12845	gx	23h55m42s	+31°54.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e spampanata, appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; è rotonda con Ø di almeno 1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE.
UGC 12847	gx	23h55m52s	+00°33.5'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo di aspetto quasi stellare (NGC 7787, situata 4' a E, è stranamente più difficile: è di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" ed è disturbata da una stellina brillante situata a ridosso N; appare meglio contrastata scalando a 340x) — 450x.
UGC 12850	gx	23h56m06s	+29°22.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
UGC 12853	gx	23h56m32s	+45°24.3'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo E, mentre un'altra molto debole ma poco più evidente si trova subito a NE; la gx è meglio evidente scalando a 340x.
UGC 12854	gx	23h56m42s	+13°43.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, ma facilmente visibile anche in visione diretta, approssim. rotonda con Ø di 40"45"; a 380x appare a tratti una condensazione centrale; c'è una stellina a 1' scarso verso E.
UGC 12855	gx	23h56m37s	+27°06.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
UGC 12856	gx	23h56m45s	+16°48.8'	q 125	Peg	16"	ottima / m. buono	debolissima, diffusa, di luminosità pressoché uniforme; a tratti in visione distolta appare come una chiazza di 80"×40" orientata da N a S; ho notato un maggior contrasto a 380x.
UGC 12857	gx	23h56m47s	+01°21.2'		Psc	16"	ottima / scarso	debole, ma relativamente facile, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×20", con tenue bulge diffuso appena percettibile a 270x.
UGC 12858	gx	23h56m46s	+44°38.0'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12859	gx	23h56m52s	+05°30.5'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso S — 450x.
UGC 12860	gx	23h56m58s	+10°49.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce estesa forse per più di 1', orientata da E a W e di luminosità pressoché uniforme; è situata a ridosso di un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti di luminosità molto simile — 270x.
UGC 12861	gx	23h57m07s	+29°50.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' ESE — 450x.
UGC 12862	gx	23h57m01s	+47°31.0'		And	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa; si tratta più che altro di un alone molto tenue attorno a una stellina; è abbastanza evidente in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
UGC 12863	gx	23h57m19s	+08°30.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo W — 450x.
UGC 12864	gx	23h57m24s	+30°59.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	appare una sorta di bulge centrale molto allungato da E a W con dimensioni 30"×10" circonfuso da un alone molto stemperato di 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12867	gx	23h58m17s	+29°21.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"230"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 450x.
UGC 12869	gx	23h58m29s	+32°13.9'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di forma indistinta e solo approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGC 12870	gx	23h58m25s	+44°34.0'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
UGC 12871	gx	23h58m31s	+09°58.6'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme; appare in visione distolta a 270x, grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso.
UGC 12873	gx	23h58m32s	+26°12.9'		Peg	24"	buona / buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 45"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12874	gx	23h58m42s	+27°08.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
UGC 12875	gx	23h58m47s	+08°24.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una coppia di stelline situate a N distanti come le dimensioni della gx e orientate nello stesso modo; altre due stelline appena percettibili si trovano a S e SE — 450x.
UGC 12878	gx	23h58m50s	+41°34.3'		And	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare di luminosità uniforme, orientata da NW a SW con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 3 stelline a SW (quella più vicina alla gx è molto debole) — 450x.
UGC 12879	gx	23h59m01s	+18°50.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 30" scarsi e di luminosità uniforme — 380x.
UGC 12881	gx	23h59m19s	+04°45.6'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, con bulge molto tenue e poco contrastato, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
UGC 12886	gx	23h59m30s	+18°12.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, in visione distolta appare circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; ci sono due stelline a un paio di primi N e NW; meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12887	gx	23h59m45s	+48°32.5'		And	24"	buona / discreto	è una debolissima chiazza rotondeggiante, estesa sì e no una 40-ina di secondi; appare a fatica in visione distolta, ma è comunque meglio scalare a 340x; c'è una doppia serrata subito a W.
UGC 12888	gx	23h59m54s	+46°53.1'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
UGC 12889	gx	00h00m02s	+47°16.5'		And	24"	buona / ottimo	relativamente facile da vedere, ma molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, con gradiente di luce molto basso, orientata da N a S con dimensioni 90"×60"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S; poco meglio contrastata scalando a 340x.
UGC 12890	gx	00h00m07s	+08°16.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×40".
UGC 12891	gx	00h00m19s	+22°59.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NW — 380x.
UGC 12892	gx	00h00m25s	+07°51.2'		Psc	24"	discreta / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno — 450x.
UGC 12893	gx	00h00m28s	+17°13.2'		Peg	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo lucore estremamente diffuso, forse rotondo con Ø di almeno 1'; si riesce a vedere con gran difficoltà in visione distolta scalando a 188x; c'è una stellina un paio di primi a N e un'altra appena percettibile a 1.5' SE.
UGC 12896	gx	00h00m31s	+26°19.5'		Peg	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' — 380x.
UGC 12897	gx	00h00m38s	+28°23.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge poco contrastato; c'è una stellina brillante al bordo meridionale dalla quale, a prima vista, la gx sembra aggettare verso N — 450x.
UGC 12899	gx	00h00m47s	+28°24.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 498-61** situata a ridosso W — diffusa, rotonda con Ø poco più di 30" e nucleo stellare evidente — 450x.
UGC 12900	gx	00h00m56s	+20°20.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa poco più di 1' in direzione WNW-ESE (ossia come le due stelline quasi a ridosso a SE e a W); appare abbastanza facilmente in visione distolta ma non bisogna scendere sotto i 450x.
UGC 12901	gx	00h00m59s	+28°54.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con nucleo stellare abbastanza netto; c'è una stellina al bordo SW; meglio tuttavia scalare a 270x.
UGC 12904	gx	00h01m09s	+34°40.0'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma coppia con MCG+6-14 situata 2.5' a SW (v. voce corrispondente) — 450x
UGC 12907	gx	00h01m27s	+18°11.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa e di forma indistinta, estesa sì e no 30" e con nucleo stellare appena percettibile; appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
UGC 12912	gx	00h01m34s	+09°00.7'		Psc	24"	m. buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
UGC 12914	gx	00h01m40s	+23°29.1'		Peg	16"	m. buona / m. buono	assieme alla successiva forma una coppia di gx relativamente facili: la 1ª è un bel fuso regolare, allungata da NW a SE di dimensioni 60"×30" e termina a SE con una stellina brillante (che è praticamente a ridosso); la 2ª è poco più corta e più sottile, di dimensioni 50"×20" e con l'asse maggiore quasi parallelo a quello della compagna (l'angolo di posizione è solo leggermente inferiore); entrambe non riportate sull'Uranometria — 270x.
UGC 12915	gx	00h01m42s	+23°29.7'		Peg	16"	m. buona / m. buono	v. **UGC 12914**
UGC 12917	gx	00h01m52s	+40°20.2'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' E e una appena percettibile a ridosso NE — 450x.
UGC 12920	gx	00h02m23s	+27°12.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa 1' scarso, orientata da NE a SW e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' W e una molto debole praticamente a ridosso verso E — 450x.
UGC 12921	gx	00h02m21s	+77°15.4'		Cep	24"	buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di ~ 1'; c'è una stellina appena percettibile al margine SE — 450x.
UGCA 14	gx	00h47m47s	−09°54.0'		Cet	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce estesa per oltre 1' e orientata da E a W; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, ma bisogna scalare a 270x (4' più a N c'è la MCG-2-3-15).
UGCA 17	gx	01h26m14s	−06°05.6'		Cet	16"	ottima / m. buono	è una debole lama di luce orientata da N a S ed estesa almeno un paio di primi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso NE e un'altra appena percettibile diametralmente opposta — 380x.
UGCA 21	gx	01h49m10s	−10°03.7'		Cet	16"	ottima / m. buono	debolissima bolla approssim. circolare, ma dai bordi un po' confusi, di luminosità uniforme e Ø > 1' — 270x.
UGCA 23	gx	02h03m02s	−09°39.3'		Cet	24"	m. buona / buono	debole lama di luce, molto sottile, di luminosità uniforme ed estesa almeno un paio di primi in direzione NE-SW; meglio evidente scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S.
UGCA 24	gx	02h04m31s	−06°11.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare come un diffuso lucore che si diparte verso W da una stellina; un'altra stellina, appena percettibile, si trova a una 30-ina di secondi NW dalla precedente; meglio definita a 280x.
UGCA 33	gx	02h30m41s	−03°48.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissimo lucore molto stemperato sul fondo cielo, forse rotondo con Ø di una 40-ina di secondi; meglio osservabile a 270x.
UGCA 34	gx	02h36m35s	+59°39.3'	q 38	Cas	16"	ottima / ottimo	a 270x è un diffuso lucore estremamente debole e di aspetto irregolare, assai stemperato sul fondo cielo e situato nella parte più orientale di un pentagono irregolare di stelline; questo piccolo asterismo, quando è osservato a bassi ingrandimenti, può creare uno spurio effetto di diffusione e dare la falsa impressione che la galassia sia osservabile anche in un 25 cm (meglio conosciuta come **Maffei 1**).
UGCA 38	gx	02h40m30s	−06°06.3'		Cet	24"	buona / ottimo	è una piccola ed elusiva chiazza di luce non più estesa di 30"; appare solo a momenti a ridosso SE di una stellina brillante — 450x.
UGCA 39	gx	02h41m56s	+59°36.3'	q 38	Cas	16"	ottima / ottimo	è debolissima, piccola, rotonda con Ø di 30"-35" e di luminosità uniforme; è immersa in un campo abbastanza ricco; salta fuori in visione distolta a 380x fissando una stellina situata ~ 40" NE (meglio conosciuta come **Maffei 2**).
UGCA 47	gx	02h58m24s	−04°17.7'		Eri	16"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×30"; appare poco più contrastata scalando a 188x, ma è meglio riuscire a tener fuori campo la SAO 130214 di 7ª situata 6.5' NE.
UGCA 52	gx	03h07m04s	−14°00.3'		Eri	16"	ottima / m. buono	debolissimo lucore di aspetto molto confuso; appare solo a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 188x.
UGCA 59	gx	03h12m08s	−25°07.8'		For	24"	discreta / mediocre	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e una condensazione centrale appena percettibile — 340x.
UGCA 61	gx	03h13m40s	−25°11.5'		For	24"	discreta / mediocre	molto debole, diffusa e di forma un po' irregolare, sfilacciata alle estremità, molto allungata da N a S con dimensioni 2'×30" — 340x.
UGCA 64	gx	03h18m33s	−25°50.2'		For	24"	discreta / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta sono di ~ 2.5'×45" — 340x.
UGCA 67	gx	03h22m55s	−11°12.1'		Eri	16"	ottima / ottimo	chiazza lattescente molto stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; appare poco più contrastata ed evidente a 188x.
UGCA 69	gx	03h26m59s	+72°51.2'		Cas	24"	buona / m. buono	debolissima e diffusa, osservabile in visione distolta, ma solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20"; c'è da rilevare che è disturbata da una stellina situata al centro e da un'altra subito a N che per quanto molto deboli interferiscono con l'osservazione; occorre tuttavia scalare a 340x.
UGCA 71	gx	03h25m25s	−16°14.3'		Eri	24"	buona / buono	è una lama di luce molto debole, relativamente compatta, di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa almeno un paio di primi; appare facilmente in visione distolta a 200x, ma anche a 400x non perde contrasto; c'è una stellina appena percettibile a ridosso del bordo settentrionale, ma un poco spostata verso E.
UGCA 73	gx	03h28m14s	−17°25.2'		Eri	16"	buona / ballerino	molto debole; a 270x e in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15".
UGCA 75	gx	03h29m33s	−15°14.3'		Eri	24"	buona / m. buono	debolissima e leggermente condensata, appare in visione distolta, ma non bisogna superare i 200x.
UGCA 77	gx	03h32m19s	−17°43.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissimo lucore di aspetto confuso, osservabile con difficoltà in visione distolta a 340x (a 200x il fondo cielo è troppo chiaro); solo a tratti appare orientata da NW a SE (ossia a perpendicolo con 2 stelline a SW distanti 2.5') con dimensioni grosso modo 45"×30".
UGCA 80	gx	03h36m21s	−06°42.9'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30"; occorre tuttavia scendere a 340x.
UGCA 81	gx	03h40m07s	+66°42.8'		Cam	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 60"×30"; c'è una stellina molto debole a ridosso NW e un'altra più evidente a poco più di 1' verso W; c'è un triangolo rettangolo di stelle brillanti a S della gx — 340x.
UGCA 82	gx	03h38m26s	−04°18.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore a bassissima luminanza superficiale, a tratti in visione distolta appare orientato da N a S con dimensioni grosso modo di 90"×45", ma occorre scalare a 340x.
UGCA 86	gx	03h59m51s	+67°08.6'		Cam	24"	m. buona / m. buono	ancora una debolissima chiazza di forma indistinta "annegata" dalla luce di tre stelle brillanti poste ad arco più due stelle molto luminose situate a S e SE; in visione distolta appare soltanto la zona centrale di circa 60"×30"; un'altra debolissima chiazza circolare appare verso S, ma con ogni probabilità si tratta di una regione H II della galassia (indicata dalla freccia) — 340x.
UGCA 87	gx	04h06m00s	−17°46.5'		Eri	24"	buona / mediocre	è una galassia debolissima e diffusa, ma a 340x in visione distolta appare chiaramente molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30"; c'è una debole stellina sul prolungamento del suo asse verso SW.
UGCA 88	gx	04h07m13s	−17°12.1'		Eri	16"	buona / ottimo	è una galassia debolissima e molto stemperata suo fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di 1.5'; scalando a 132x salta fuori subito in visione distolta.
UGCA 94	gx	04h42m57s	−08°05.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø > 1'; meglio contrastata scalando a 340x.
UGCA 101	gx	05h09m09s	−09°15.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40"; disturbata da una stellina situata 1' verso E; meglio contrastata scalando a 340x.

UGCA 102	gx	05h10m48s	−02°40.9'		Ori	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 450x.
UGCA 104	gx	05h11m41s	−14°47.3'	q 262	Lep	16"	ottima / buono	debole chiazza lattescente molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di quasi 2'; c'è una stellina a ridosso verso S — 270x.
UGCA 105	gx	05h14m14s	+62°34.5'	q 19	Cam	16"	m. buona / mediocre	è un debole lucore molto diffuso e stemperato sul fondo cielo e disturbato dalle molte stelline di campo presenti, fra cui la SAO 13423 di magnitudo 8.5 situata subito a SW; in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 3'×2', ma occorre comunque scalare a 132x.
UGCA 114	gx	05h50m54s	−14°46.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	estesa chiazza molto diffusa e poco più brillante verso l'interno, orientata da NW a SE con dimensioni 2'×1.5'; c'è una stellina brillante a ridosso ESE e una più debole dalla parte opposta — 450x.
UGCA 127	gx	06h20m56s	−08°29.7'		Mon	16"	ottima / buono	è un debolissimo e diffuso lucore con piccola condensazione centrale visibile a tratti; solo in visione distolta e scalando a 188x si riesce a capire che è orientata da ENE a WSW con dimensioni all'incirca 45"×30"; c'è una coppia di stelline brillanti a 3' verso NE.
UGCA 147	gx	08h51m07s	−17°33.8'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni che in visione distolta appaiono di 2'×40"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile al bordo N.
UGCA 150	gx	09h10m49s	−08°53.5'		Hya	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma molto disturbata da una stella brillante situata al bordo W; molto allungata da NE a SW con dimensioni 3'×45" e di luminosità uniforme; è meglio visibile a 450x.
UGCA 154	gx	09h16m46s	+53°26.6'	q 44	UMa	16"	m. buona / buono	piccolo oggetto compatto, esteso max 15" o 20" situato verso la parte NE di uno strano asterismo formato da 8 stelle brillanti — 270x.
UGCA 167	gx	19h33m15s	−16°46.1'		Hya	16"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di 1' (è sorta la Luna: ultima gx osservata) — 270x.
UGCA 171	gx	09h44m19s	+76°21.1'	q 8	Dra	16"	ottima / scarso	molto debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" — 270x.
UGCA 173	gx	09h43m25s	−05°16.9'		Sex	24"	m. buona / buono	forma una coppia assieme UGCA 174 — sono 2 lame di luce molto deboli, orientate da E a W, estese ~ 1' e che a prima vista paiono identiche; osservando più attentamente ci si accorge invece che la 2ª è leggermente più "spessa" e appena più evidente; meglio contrastate scalando a 340x.
UGCA 174	gx	09h43m28s	−05°16.7'		Sex	24"	m. buona / buono	v. **UGCA 173**
UGCA 175	gx	09h43m36s	−05°54.8'		Sex	24"	m. buona / buono	bolla circolare con Ø di 1.5', di aspetto uniforme a 200x, mentre a 400x presenta qualche lieve discrepanza di luce all'interno; c'è una stellina verso il bordo NW e un'altra della stessa luminosità subito all'esterno, sempre a NW.
UGCA 188	gx	09h55m29s	+08°23.5'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; meglio comunque non scendere sotto i 450x.
UGCA 193	gx	10h02m36s	−06°00.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa 1.5'; appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
UGCA 201	gx	10h06m18s	+28°56.7'	q 104	LMi	16"	buona / m. buono	relativamente facile, rotonda, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
UGCA 205	gx	10h11m00s	−04°42.0'	q 234	Sex	16"	ottima / scarso	in visione distolta appare un diffuso lucore molto tenue di ~ 1' di Ø situato tra 2 stelline distanti 3' in direzione N-S — 188x.
UGCA 216	gx	10h42m14s	+47°46.0'	q 72	UMa	16"	buona / m. buono	piccolo oggetto circolare molto debole con Ø max 20" o 30", relativamente compatto e con nucleo puntiforme visibile a tratti — 380x.
UGCA 217	gx	10h43m36s	−09°51.3'		Sex	16"	m. buona / scarso	è un lucore molto debole, grosso modo circolare con Ø > 1', ma che appare poco più contrastato scalando a 188x.
UGCA 219	gx	10h49m05s	+52°20.1'	q 46	Peg	16"	m. buona / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e con nucleo puntiforme visibile a tratti — 270x.
UGCA 228	gx	11h11m16s	−09°58.3'		Leo	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø di 1.5' e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole a ridosso verso SW — 270x.
UGCA 233	gx	11h19m53s	+54°27.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' N e una molto debole appena sfuocata alla stessa distanza verso W; quest'ultima, tuttavia, è risultata essere la **2MASS 11194608+5428025** *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
UGCA 241	gx	11h40m35s	−10°05.1'		Crt	24"	m. buona / scarso	estesa chiazza di luminosità uniforme, piuttosto diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 2'×1.5'; c'è una coppia di stelline a ridosso N — 340x.
UGCA 242	gx	11h41m22s	−06°28.9'		Vir	24"	m. buona / scarso	debole e molto diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 60"×45" e con tenue condensazione centrale decentrata verso NE; c'è una doppia stretta un paio di primi a SW — 340x.
UGCA 245	gx	11h45m26s	−10°06.1'		Crt	24"	m. buona / scarso	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'×30" — 340x.
UGCA 249	gx	11h52m32s	−03°40.5'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e spampanata, con bassissima luminanza superficiale, rotonda con Ø > 1'; la visione migliora scalando a 280x.
UGCA 252	gx	11h54m22s	−12°28.8'		Crt	24"	m. buona / scarso	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40" — 340x.
UGCA 254	gx	11h54m50s	−16°51.8'		Crt	24"	buona / ottimo	debolissima, appare soltanto in visione distolta (in visione diretta diviene preponderante la coppia serrata di stelline abbastanza brillanti situate a ridosso verso E); è orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30"; stranamente meglio contrastata a 450x.
UGCA 258	gx	11h58m25s	−14°31.5'		Crv	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø 45" (o comunque 1' scarso); è situata in mezzo a 2 stelline orientate da N a S e distanti 2.5': quella a N è più brillante — 450x.
UGCA 266	gx	12h02m24s	−14°31.9'		Crv	24"	m. buona / m. buono	è un elusivo baffo di luce che sembra dipartirsi a momenti da una stellina verso N (questa stellina fa parte di un piccolo trapezio con le basi orientate da NNW a SSE; meglio evidente forzando a 570x.
UGCA 272	gx	12h07m48s	+67°23.2'	q 25	Dra	16"	m. buona / mediocre	relativamente facile, compatta, con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di ~ 30" — 270x.
UGCA 279	gx	12h24m14s	+04°13.5'	q 238	Vir	16"	buona / m. buono	è una galassietta debolissima e molto piccola, estesa non più di una 15-ina di secondi; salta fuori senza problemi in visione distolta a 380x.
UGCA 281	gx	12h26m17s	+48°29.6'		CVn	16"	ottima / m. buono	facile, rotonda con Ø di 40", poco diffusa e con evidente condensazione centrale; è situata ~ 1' NE di una stellina brillante che fa parte di un piccolo asterismo di 4 stelline — 380x.
UGCA 282	gx	12h30m16s	−08°23.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma molto stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 1.5' e di luminosità uniforme; meglio tuttavia scalare a 340x.
UGCA 289	gx	12h35m37s	−07°52.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e fortemente stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 2'×1' — 340x (a 450x si spampana troppo!).
UGCA 294	gx	12h44m38s	+28°28.3'		Com	16"	buona / buono	diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 30"×20"; è situata all'interno di un triangolo equilatero di stelline abbastanza brillanti e coi lati di 6' o 7' — 270x.
UGCA 295	gx	12h44m54s	−09°07.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di grosso modo di 1'; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso N e un'altra di luminosità simile a 1.5' SE; meglio evidente a 340x.
UGCA 296	gx	12h45m36s	+71°19.2'	q 28	Dra	16"	m. buona / buono	è un oggetto debole, piccolo e molto compatto, esteso per max 20" e con nucleo di aspetto stellare — 270x.
UGCA 298	gx	12h46m55s	+26°33.8'	q 148	Com	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
UGCA 304	gx	12h52m27s	−09°45.2'		Vir	24"	ottima / buono	è una vistosa lama di luce orientata da ENE a WSW ed estesa 2.5'; sembra "accendersi" in visione distolta quando si osserva MCG-1-33-34, situata un paio di primi a SE; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N; più interessante scalando a 340x.
UGCA 310	gx	12h57m12s	−04°09.5'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è una stellina a 1' S; meglio comunque scalare a 340x.
UGCA 311	gx	12h57m47s	−09°37.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per oltre 2' — 450x.
UGCA 314	gx	13h00m17s	−12°20.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto deboli e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
UGCA 320	gx	13h03m16s	−17°25.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 4'×40" (praticamente una edge-on); c'è una coppia di stelline verso il bordo NW di cui una a ridosso della gx; meglio contrastata scalando a 340x.
UGCA 322	gx	13h04m31s	−03°34.3'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme appare facilmente in visione distolta a 340x, approssim. rotonda con Ø di un paio di primi; è delimitata da 3 stelline: una molto debole a S, una più evidente a ridosso SW e una 3ª abbastanza brillante a ridosso di NE.
UGCA 330	gx	13h09m48s	−10°19.2'		Vir	24"	buona / ottimo	è un debolissimo lucore che aggetta solo in parte verso NE dal fastidioso alone prodotto dalla SAO 157760 di 6ª grandezza; l'effetto si riesce solo in parte a smorzare forzando a 570x.
UGCA 332	gx	13h11m58s	−12°03.8'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debolissima chiazza di aspetto un po' confuso a 450x; a 340x appare grosso modo rotonda con Ø di ~ 1 e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso S; 2 deboli stelline si trovano rispettivamente a 1' NE e a 1' verso W.
UGCA 336	gx	13h12m44s	+41°27.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza circolare molto stemperata sul fondo cielo con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
UGCA 338	gx	13h13m34s	−15°25.9'		Vir	24"	m. buona / discreto	lucore molto debole, diffuso e stemperato sul fondo cielo, grosso modo rotondo con Ø di oltre 1'; c'è una stellina al margine NW; disturbata da 3 stelle brillanti che formano un triangolo molto allungato in direzione NE-SW; la gx si trova in mezzo alle 2 più brillanti di 8ª e 9ª grandezza rispettivamente; nonostante questo la gx è meglio contrastata scalando a 340x.
UGCA 367	gx	13h37m05s	−11°49.8'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø > 1'; c'è una stellina a ridosso verso N; meglio contrastata scalando a 340x.
UGCA 394	gx	14h47m24s	−17°26.5'		Lib	24"	mediocre / ottimo	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme estesa un paio di primi e orientata da N a S — 450x.
UGCA 396	gx	14h52m35s	−03°33.7'		Lib	16"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore molto diffuso, visibile con difficoltà persino in visione distolta; forse rotonda con Ø > 1'; c'è una stellina a ~ 1' verso NW e un'altra appena percettibile dalla parte opposta — 270x.
UGCA 400	gx	15h09m25s	−10°41.7'		Lib	24"	mediocre / ottimo	è una chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di almeno 1'; non è facile da catturare a 450x in quanto situata in una piccola zona di cielo depleta; appare tuttavia meglio contrastata scalando a 340x.
UGCA 409	gx	15h27m10s	−12°08.1'		Lib	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva chiazza grosso modo rotonda e di luminosità uniforme, estesa non più di 40"; appare solo a momenti in visione distolta, ma è meglio restare a 450x; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti fatto a "L" stretta situato un paio di primi a NW.
UGCA 410	gx	15h37m04s	+55°15.8'	q 51	Dra	16"	buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 20" ed evidente condensazione centrale — 380x.
UGCA 411	gx	16h02m02s	+18°49.0'		Her	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile e diffusa, rotonda con Ø di 40" e luminosità pressoché uniforme; a 380x appare una stellina a ridosso verso SW.
UGCA 413	gx	16h36m15s	+66°14.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con bulge molto tenue — 450x.
UGCA 414	gx	16h51m32s	−03°05.8'		Oph	16"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø > 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo NW — 380x.
UGCA 424	gx	22h01m59s	−12°11.4'		Aqr	16"	ottima / buono	è una gx elusiva, estesa oltre 1', ma molto confusa e osservabile solo a tratti a 270x (ho provato a scalare a 188x, ma stranamente sparisce!).
UGCA 428	gx	22h24m12s	−03°29.0'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme; bisogna scalare a 188x; stellina quasi a ridosso verso W e un'altra brillante a 1.5' SW.
UGCA 429	gx	22h26m45s	+16°11.1'		Peg	24"	discreta / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme; solo in visione distolta appare a tratti poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S (o SE); un'altra stellina più brillante si trova invece quasi a ridosso NE — 400x.
UGCA 431	gx	22h37m21s	−08°27.7'		Aqr	24"	discreta / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo e di forma indistinta, appare a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
UGCA 432	gx	22h38m57s	−05°51.2'		Aqr	16"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 80"×30"; c'è una doppia stretta dalle componenti brillante al bordo occidentale — 270x.
UGCA 439	gx	23h26m33s	+18°16.0'		Peg	24"	buona / ottimo	piccola, relativamente facile e compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
UGCA 440	gx	23h35m41s	+18°18.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è osservabile in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso NE; un piccolo asterismo di 4 stelle brillanti si trova a 6' SW.
UGCA 441	gx	23h37m39s	+30°07.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un tenue nucleo stellare; c'è una stellina subito a E — 450x.
UGCA 444	gx	00h01m57s	−15°27.0'	q 260	Cet	16"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore che in visione diretta appare pressoché indistinto; solo in visione distolta e scalando a 132x si riesce abbastanza facilmente a capire che è allungata da N a S con dimensioni di ~ 8'×2'; regge bene a 188x con un fondo cielo più scuro nel quale appare poco più contrastata; si dissolve invece a 270x; una stellina ne lambisce il bordo meridionale; un'altra stellina si trova quasi a ridosso verso W.
MCG+0-1-2	gx	23h56m04s	−00°10.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	sorta di debolissimo baffo di luminosità uniforme situato all'interno di un piccolo asterismo allungato di 4 stelline brillanti; a 450x appare orientata da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+0-1-3	gx	23h56m03s	−01°29.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; stellina abbastanza brillante a 1' N — 450x.
MCG+0-1-26	gx	00h07m07s	+03°27.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; forma un piccolo triangolo isoscele molto schiacciato con 2 stelline: una brillante subito a NNW che disturba un po' l'osservazione e l'altra più debole a 1' verso N — 450x.
MCG+0-1-29	gx	00h09m12s	−01°19.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza diffusa e di forma indistinta, forse circolare con Ø di una 30-ina di secondi; appare a tratti a ridosso S di una coppia di stelline appena percettibili e visibili solo a momenti — 450x.
MCG+0-1-30	gx	00h09m36s	+00°53.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; situata quasi a ridosso SW di una stellina (la quale fa parte di un piccolo triangolo isoscele col vertice più acuto che punta a NE) — 450x.
MCG+0-1-32	gx	00h10m33s	−01°33.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+0-1-33	gx	00h10m39s	+01°32.4'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme; a tratti, in visione distolta, appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+0-1-47	gx	00h15m22s	+02°33.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; è un poco disturbata da una stellina brillante situata subito a N — 450x.
MCG+0-1-51	gx	00h16m18s	+01°32.1'		Psc	16"	ottima / buono	è un debolissimo oggetto rotondo condensato di max 20" di Ø situato 1' NW di una stellina — 380x.
MCG+0-1-52	gx	00h16m34s	+02°19.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata da una stellina brillante situata quasi a ridosso SE — 450x.
MCG+0-1-54	gx	00h16m39s	+01°35.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 382-39 situata a ridosso N — molto debole, ma relativamente compatta, in visione distolta appare molto allungata da E a W, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare — 450x.
MCG+0-1-56	gx	00h16m55s	−00°05.3'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme salvo un tenue nucleo stellare visibile perso solo a tratti, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+0-1-57	gx	00h17m09s	−00°57.5'		Psc	24"	buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x a meno di 2' W di una stellina; la galassia è rotonda con Ø < 1'.
MCG+0-2-1	gx	00h19m42s	+00°22.5'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10" — 450x.
MCG+0-2-2	gx	00h19m47s	+00°35.4'		Psc	24"	m. buona / buono	più facile di MCG+0-2-1, dalla quale dista 13' verso N, poco diffusa, piccola e condensata; appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x.
MCG+0-2-6	gx	00h20m29s	−00°33.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SE — 450x.
MCG+0-2-7	gx	00h20m35s	−00°28.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce orientato da NW a SE che appare solo a momenti e con gran difficoltà in visione distolta a 1' W di una debole stellina; occorre comunque spingere a 580x, anche perché la visione è piuttosto disturbata da una coppia di stelle brillanti situate a W e SW della gx — 450x.
MCG+0-2-8	gx	00h20m35s	−00°28.2'		Psc	24"	discreta / buono	piccola e debolissima, diffusa e di luminosità uniforme rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+0-2-9	gx	00h20m56s	−01°49.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva MCG+0-2-10 forma una coppia di debolissime lame di luce di aspetto simile, entrambe orientate da NW a SE, estese una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; sono distanti ~ 1.5' in direzione NE-SW; appaiono in visione distolta, ma la visione è poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+0-2-10	gx	00h20m56s	−01°49.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+0-2-9**
MCG+0-2-12	gx	00h22m09s	−01°25.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa 1' scarso, situata tra due stelline brillanti ~ 4' in direzione ESE-WNW — 450x.
MCG+0-2-17	gx	00h23m40s	−00°07.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale appena percettibile; meglio evidente non scendendo sotto i 450x.
MCG+0-2-19	gx	00h23m38s	−00°30.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con UGC 224 a ridosso S, ma il sistema è molto disturbato dalla SAO 128735 situata un paio di primi a SSE — la UGC è più evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare; la MCG sembra a prima vista un'estensione della UGC e presenta anch'essa un nucleo stellare appena percettibile; la coppia è comunque meglio evidente spingendo a 580x.
MCG+0-2-28	gx	00h27m04s	+00°27.6'		Cet	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG+0-2-34	gx	00h27m40s	+00°31.0'		Cet	24"	discreta / buono	anche questa è molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG+0-2-46	gx	00h28m29s	+00°46.9'		Cet	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG+0-2-54	gx	00h29m28s	−00°12.7'		Cet	24"	discreta / buono	poco più evidente ed estesa di MCG+0-2-55, osservata subito prima e dalla quale dista un paio di primi a NW, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MCG+0-2-55	gx	00h29m36s	−00°14.1'		Cet	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' scarso NW — 450x.
MCG+0-2-60	gx	00h29m47s	+00°09.7'		Cet	24"	discreta / buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 0029+0010 situata una 40-ina di secondi a NW — quest'ultima appare di fatto per prima come una stellina sfuocata; la MCG è invece debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+0-2-77	gx	00h34m29s	−02°13.5'		Cet	24"	buona / buono	è un'elusiva macchiolina estesa, penso, neppure 30" che salta fuori con gradatamente più brillante verso l'interno difficoltà a ridosso verso W di una stellina abbastanza evidente; meglio tuttavia scalare a 340x.
MCG+0-2-81	gx	00h35m09s	−00°08.0'		Cet	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+0-2-84	gx	00h35m15s	+00°41.7'		Cet	24"	discreta / buono	chiazza circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo con Ø di 45" di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una coppia di stelline molto brillanti a SSE e un'altra coppia più debole a W con le componenti distanti uguali.
MCG+0-2-86	gx	00h35m25s	+03°25.8'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; appare facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 349 situata a un paio di primi a N — 450x.
MCG+0-2-90	gx	00h36m25s	+02°25.6'		Cet	24"	discreta / buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina al bordo N e un'altra della stessa luminosità a 1' verso W — 450x.
MCG+0-3-4	gx	00h45m34s	−01°06.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore molto diffuso e di forma indistinta, esteso 30" o 40" e situato a ridosso NW di una stellina (la visione è anche un po' disturbata dalla SAO 128940 di magnitudo 9.4 situata 5' a SSE e che a 340x non si riesce a tenere fuori campo.
MCG+0-3-11	gx	00h50m02s	−00°07.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E; la visione è purtroppo disturbata dalla SAO 128974 di magnitudo 6.6 situata 6' a SSW e che non si riesce a tenere fuori campo — 450x.
MCG+0-3-13	gx	00h51m01s	+01°44.0'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima chiazza circolare con Ø di una 20-ina di secondi e a tratti condensata; c'è una stellina visibile solo a momenti a ridosso S — 450x.
MCG+0-3-14	gx	00h51m25s	+01°22.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e con bulge appena evidente; in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+0-3-27	gx	00h55m17s	−00°55.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG+0-3-30	gx	00h56m06s	+00°37.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+0-3-40	gx	00h57m17s	−00°40.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+0-3-43	gx	00h57m52s	−01°08.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; una stellina a ridosso S è visibile solo a momenti forzando a 580x.
MCG+0-3-44	gx	00h58m20s	−01°56.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (già osservata, seppure al limite, col 16" in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
MCG+0-3-61	gx	01h03m06s	+01°40.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di ~ 45"; risulta stranamente meglio osservabile a 450x.
MCG+0-3-54	gx	01h01m17s	−01°05.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+0-4-1	gx	01h07m42s	+02°07.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme a MCG+0-4-2 ed MCG+0-4-6, dell'ammasso **AGC 147** — molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø di 20"-25".
MCG+0-4-2	gx	01h07m46s	+02°09.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+0-4-6	gx	01h08m15s	+02°10.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme alle due precedenti, dell'ammasso **AGC 147** —molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+0-4-10	gx	01h08m43s	−02°08.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+0-4-51	gx	01h14m31s	+00°19.5'		Cet	24"	buona / discreto	è una chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; meglio definita scalando a 340x.
MCG+0-4-59	gx	01h15m04s	+00°24.3'		Cet	24"	buona / discreto	relativamente facile, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e appena più brillante all'interno; a prima vista sembra aggettare da una stella al bordo SE — 450x.
MCG+0-4-74	gx	01h18m34s	−00°13.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso SE — le 2 galassie si riescono a sdoppiare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; la 1ª è più piccola e debole, non più estesa di 15" e con nucleo stellare visibile a momenti; la 2a è rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme.
MCG+0-4-75	gx	01h18m36s	−00°14.0'		Cet	24"	ottima / ottimo	v. **MCG+0-4-74**
MCG+0-4-94	gx	01h21m18s	−00°35.8'		Cet	16"	m. buona / ottimo	molto piccola, diffusa, con Ø di max 20"; salta fuori facilmente in visione distolta a 380x.
MCG+0-4-110	gx	01h23m24s	+01°39.1'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e poco contrastata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; fa parte dell'ammasso AGC 189 — 450x.
MCG+0-4-113	gx	01h23m55s	+00°16.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; si trova all'interno di un asterismo molto irregolare di stelline brillanti — 450x.
MCG+0-4-135	gx	01h25m43s	+01°54.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+0-4-140	gx	01h25m51s	−01°19.1'		Cet	16"	buona / ottimo	molto piccola, di aspetto stellare a prima vista; tuttavia osservando a 380x si vede chiaramente che è un oggetto diffuso con Ø di ~ 20"; occupa il vertice orientale di un minuscolo piccolo triangolo equilatero formato con 2 stelline di 14ª grandezza — 380x.
MCG+0-4-145	gx	01h26m35s	−01°06.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
MCG+0-4-147	gx	01h26m44s	−01°18.4'		Cet	16"	ottima / discreto	elusiva, visibile solo a tratti in visione distolta, molto piccola, estesa max 20" — 188x.
MCG+0-4-156	gx	01h27m55s	−01°38.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 3 stelline a SE — 450x.
MCG+0-5-5	gx	01h33m15s	−00°38.2'		Psc	24"	m. buono /m. buono	assieme a **MCG+0-5-8** forma una coppia di galassiette molto deboli distanti 1.5' in direzione NNW-SSE; la 1ª è debolissima e appare solo a momenti in visione distolta, estesa una 15-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile; la 2ª è poco più evidente, rotonda con Ø < 30" e tenue condensazione centrale solo accennata (situate 4' a NE di IC 138) — 450x.
MCG+0-5-6	gx	01h33m17s	−00°39.5'		Psc	16"	m. buono /m. buono	v. **MCG+0-5-5**
MCG+0-5-18	gx	01h38m24s	−00°12.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a 1.5' SSW — 450x.
MCG+0-5-29	gx	01h40m46s	−01°17.9'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole e assai poco contrastata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+0-5-40	gx	01h51m27s	−02°15.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina subito a NW — 450x.
MCG+0-6-2	gx	01h56m17s	+01°03.0'		Cet	24"	m buono. / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 450x.
MCG+0-6-10	gx	01h58m05s	+03°05.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, molto piccola e compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a 1' scarso verso E. Forma una coppia ravvicinata con UGC 1449 situata a ridosso NE — 380x.
MCG+0-6-13	gx	01h58m01s	+03°27.2'		Psc	24"	buona / m. buono	è un piccolo alone diffuso, molto debole attorno a una stellina ed esteso non più di 30"; una piccola zona centrale più brillante aggetta verso SW dalla suddetta stellina per una decina di secondi — 450x.
MCG+0-6-17	gx	02h00m05s	−01°00.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare a tratti elusivamente a ridosso NW di MCG+0-6-18, ma non riesco a capirne la forma; meglio comunque non scendere sotto i 450x.
MCG+0-6-18	gx	02h00m08s	−01°00.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo lucore rotondeggiante, molto stemperato sul fondo cielo e di luminosità uniforme; nonostante questo sembra meglio visibile a 450x.
MCG+0-6-48	gx	02h11m08s	−00°39.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 387-52 situata a ridosso verso W — è diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare abbastanza marcato; la CGCG è molto debole e di luminosità uniforme; appare facilmente in visione distolta a 450x.
MCG+0-6-53	gx	02h13m07s	+01°23.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo che nondimeno sembra poco più evidente a 450x, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
MCG+0-7-2	gx	02h19m57s	+01°56.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 1797 dalla quale dista 1' a NW — 450x.
MCG+0-7-34	gx	12h31m53s	+01°12.6'		Cet	16"	ottima / buono	è un'elusiva macchiolina rotonda, molto piccola, di 15"-20" di Ø; appare a tratti in visione distolta a 380x.
MCG+0-7-69	gx	02h38m28s	−01°02.8'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, poco diffuso, molto piccolo e con Ø di una 20-ina di secondi; è situato a ridosso NE di una stellina abbastanza brillante — 380x.
MCG+0-7-80	gx	02h40m48s	+00°19.5'		Cet	24"	ottima / m. buono	debolissimo lucore diffuso, approssim. circolare ed esteso sì e no 30"; c'è una stellina subito a SE — 450x.
MCG+0-8-2	gx	02h44m04s	+00°46.5'		Cet	24"	ottima / m. buono	piccola, debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MCG+0-8-5	gx	02h45m07s	+00°57.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+0-8-18	gx	02h48m08s	−00°45.1'		Cet	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 20"-25" e tenue condensazione centrale — 450x.
MCG+0-8-27	gx	02h50m10s	−00°52.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+0-8-28	gx	02h50m15s	+00°05.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+0-8-41	gx	02h52m54s	+03°03.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' NE.
MCG+0-8-54	gx	02h57m05s	−01°21.5'		Eri	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+0-8-79	gx	03h03m54s	−01°11.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1.5' SW — 450x.
MCG+0-8-82	gx	03h04m36s	−00°02.2'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, lama di luce poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso — 450x.
MCG+0-8-86	gx	03h05m10s	−00°18.9'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; è un poco disturbata da 2 stelline abbastanza brillanti: una una a 1' NE e l'altra, poco più debole, alla stessa distanza verso S — 450x.
MCG+0-8-88	gx	03h05m10s	−01°04.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, meglio contrastata scalando a 340x, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un piccolo arco di 3 deboli stelline a S.
MCG+0-9-13	gx	03h11m03s	+01°46.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+0-9-14	gx	03h11m17s	+02°34.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; una debolissima stellina diffusa appare a tratti a ridosso SE, ma da un controllo successivamente effettuato è risultata essere la PGC 1230962.
MCG+0-9-28	gx	03h14m01s	−01°19.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare con difficoltà in visione distolta a ~ 1' SW di una debole stellina; non riesco a capirne la forma, ma non sembra più estesa di 30" — 450x.
MCG+0-9-78	gx	03h23m41s	−00°07.1'		Tau	24"	m. buona / ottimo	si separa facilmente da UGC 2713 — dalla quale si trova a ridosso verso W — piccola e relativamente compatta, orientata nello stesso modo e con dimensioni 20"×15" — 450x.
MCG+0-10-20	gx	03h48m58s	−01°08.7'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole e di luminosità uniforme, purtroppo disturbata da un triangolo rettangolo di stelle brillanti in mezzo alle quali si trova (quella più a N, la più luminosa, è la SAO 130744 di 10ª grandezza); in visione distolta appare solo a momenti orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+0-11-1	gx	03h56m52s	+00°49.5'		Tau	24"	discreta / buono	è una debolissima chiazza circolare e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+0-11-4	gx	03h59m12s	+01°13.3'		Tau	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+0-11-11	gx	04h06m38s	+00°16.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+0-11-12	gx	04h07m27s	+01°45.7'		Tau	24"	m. buona / mediocre	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+0-11-13	gx	04h07m33s	−02°26.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 450x.
MCG+0-11-14	gx	04h07m54s	−02°32.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; situata quasi a ridosso della più meridionale di una coppia di stelline abbastanza brillanti — 450x.
MCG+0-11-16	gx	04h08m41s	−01°19.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, forse circolare con Ø sì e no di 30" — 450x.
MCG+0-11-17	gx	04h08m45s	+00°13.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni ~ 30"×10"; c'è una stellina subito a NW — 450x.
MCG+0-11-19	gx	04h09m12s	−01°28.6'		Eri	24"	ottima / discreto	situata una 30-ina di secondi a SW di CGCG 392-4 è poco più debole e più piccola, diffusa e con nucleo stellare — 450x.
MCG+0-11-21	gx	04h09m24s	−00°11.4'		Eri	24"	m. buona /m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa, a 450x appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' scarso verso SW — 450x.
MCG+0-11-24	gx	04h12m08s	+02°50.2'		Tau	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×20", ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è un piccolo triangolo serrato di deboli stelline a 1.5' NNE.
MCG+0-11-29	gx	04h15m07s	−00°56.0'		Eri	24"	m. buona / mediocre	appare a tratti come una debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+0-11-30	gx	04h15m11s	−00°50.9'		Eri	24"	m. buona / mediocre	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 450x.
MCG+0-11-33	gx	04h15m31s	−00°58.7'		Eri	24"	m. buona / mediocre	minuscola galassietta a tratti condensata ed estesa non più di 10" (a bassi ingrandimenti potrebbe essere scambiata per una stellina debolmente sfuocata).
MCG+0-11-38	gx	04h16m51s	+02°34.3'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme (salvo un nucleo stellare visibile tuttavia solo a momenti), allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+0-11-46	gx	04h17m35s	+01°32.5'		Tau	24"	m. buona /m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+0-11-50	gx	04h18m49s	+02°21.5'		Tau	24"	m. buona / ottimo	è una sorta di diffusa lattescenza, molto stemperata sul fondo cielo e di aspetto un po' confuso, ma comunque non più estesa di 30"-40"; a 450x sembra posta eccentricamente attorno a una stellina; un'altra stellina appena percettibile e debolmente sfuocata si trova a ridosso NW, all'interno della stessa chiazza: quest'ultima è effettivamente la minuscola galassietta PGC 3094685; una terza stellina molto debole si trova a 1' N della coppia.
MCG+0-11-51	st?	04h18m53s	+02°10.0'		Tau	24"	m. buona / ottimo	nella posizione indicata si trova una doppia stretta orientata da E a W, la cui componente occidentale è leggermente più brillante; non si nota traccia di nebulosità circostante, nemmeno spingendo a 580x; una gx molto debole e diffusa si trova invece subito a W ed è la MAC 0418+0210; quest'ultima, tuttavia, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20".
MCG+0-12-4	gx	04h19m52s	−01°48.9'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo puntiforme appena percettibile; poco disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata 3' a S — 450x.
MCG+0-12-5	gx	04h20m05s	+00°13.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; il campo è disturbato da due stelle brillanti tra cui la SAO 111752 di 9ª grandezza situata 4' scarsi a NW — 450x.
MCG+0-12-8	gx	04h20m34s	−00°45.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa ~ 1' e orientata da N a S; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MCG+0-12-17	gx	04h21m48s	−02°11.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+0-12-19	gx	04h22m04s	−02°39.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo SE — 450x.
MCG+0-12-20	gx	04h23m04s	−00°03.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+0-12-21	gx	04h23m00s	−00°04.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, a tratti orientata da E a W e con dimensioni simili alla precedente; c'è una stellina a poco più di 1' verso S — 450x.
MCG+0-12-23	gx	04h23m17s	−00°07.9'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso NW — 450x.
MCG+0-12-34	gx	04h30m00s	−00°55.8'		Eri	24"	ottima / discreto	è una debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme; si vede senza tanti problemi in visione distolta a 450x, ma solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; si trova al vertice orientale di un triangolo quasi equilatero formato con 2 stelle brillanti che interferiscono un po' con l'osservazione (situata 11' a S di CGCG 393-26).
MCG+0-12-48	gx	04h35m54s	−02°14.0'		Eri	24"	ottima / ottimo	debolissima, nonché disturbata dalla SAO 131343 di magnitudo 6.4 situata un paio di primi a E; è praticamente una lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N e una più debole dalla parte opposta; meglio evidente spingendo a 580x.
MCG+0-12-53	gx	04h36m36s	−02°18.2'		Eri	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø; appare in visione distolta a poco più di 1' SW di UGC 3104 *(presenza di debole chiarore lunare)* — 380x.
MCG+0-13-2	gx	04h44m19s	−02°09.9'		Eri	24"	buona / scarso	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso W; è situata all'interno di un triangolo isoscele formato da stelline brillanti (soprattutto quella a E) il cui vertice più acuto punta a SW — 340x.
MCG+0-13-30	gx	04h54m40s	+02°02.2'		Ori	24"	m. buona / discreto	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; ci sono 4 stelline allineate ed equidistanti a N (quella a W è la più brillante) — 450x.

MCG+0-14-5	gx	05h13m11s	−03°20.4'		Ori	24"	ottima / discreto	è una debolissima lama di luce orientata da E a W che in visione distolta appare estesa una 40-ina di secondi; è situata tra due stelline brillanti della stessa luminosità distanti 3' e orientate come la gx — 450x.
MCG+0-14-8	gx	05h10m10s	−00°43.1'		Ori	24"	ottima / discreto	relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
MCG+0-14-20	gx	05h21m04s	+02°36.8'		Ori	24"	m. buona / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso SE di una stellina — 450x.
MCG+0-22-3	gx	08h20m42s	−01°25.0'		Hya	24"	buona / ottimo	in visione distolta appare a tratti come un debolissimo getto filiforme che si diparte da UGC 4352 e punta verso SW per ~ 1'; purtroppo il sistema è disturbato da una stella brillante di 10ª e situata a meno di 2' SW — 570x.
MCG+0-22-7	gx	08h23m39s	−00°10.1'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+0-22-8	gx	08h23m39s	−00°10.5'		Hya	24"	buona / discreto	poco più debole di MCG+0-22-7 — situata a ridosso verso N — rotonda, con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare visibile a tratti — 450x.
MCG+0-24-12	gx	09h23m43s	+01°19.8'		Hya	24"	m. buona / buono	piccola e compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" e nucleo stellare brillante (ma non si tratterà di una stellina sovrapposta?) — 400x.
MCG+0-27-19	gx	10h27m29s	+01°14.8'		Sex	24"	m. buona / buono	fa parte del terzetto di UGC 5667, dalla quale dista 30" verso S — molto debole, poco diffusa e condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+0-35-12	gx	13h36m12s	−01°01.9'		Vir	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 8584 situata a ridosso SE — sono molto deboli, ma si separano facilmente a 450x, entrambe di luminosità uniforme e orientate nello stesso modo, ossia da NW a SE; la UGC ha dimensioni 30"×15", mentre la MCG è più sottile e in visione distolta sembra di 30"×10".
MCG+0-36-3	gx	13h56m27s	−00°17.3'		Her	16"	m. buona / ottimo	debolissima e piccola, appare solo a tratti in visione laterale quando si osserva NGC 5366 (dalla quale dista 2.5' verso S) — 270x.
MCG+0-52-12	gx	20h27m13s	+01°27.5'		Aql	24"	m. buona / ottimo	debolissima, visibile in visione distolta e solo a momenti appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline a NE — 450x.
MCG+0-52-38	gx	20h35m31s	−02°45.9'		Aql	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"× 20"; presenta un bulge diffuso appena più evidente del disco; c'è una stellina a meno di 1' verso N; 3 stelline allineate nello stesso verso della gx si trovano 4' a SE — 380x.
MCG+0-54-20	gx	21h28m12s	+00°18.0'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, ma più che altro disturbata da una stella brillante situata a poco più di 1' SW; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a 1' scarso NE — 450x.
MCG+0-54-23	gx	21h29m03s	−00°28.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quando di fissa una stellina molto debole situata a poco più di 1' a SW; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG+0-56-9	gx	22h07m57s	+00°22.2'		Aqr	16"	ottima / discreto	è un debolissimo oggetto piccolo e diffuso, esteso per max 30"; appare in visione distolta focalizzando l'attenzione su una delle stelline limitrofe — 270x.
MCG+0-57-4	gx	22h34m37s	+00°10.4'		Aqr	24"	m. buona / buono	è una gx difficilissima che appare a tratti in visione distolta, ma non riesco a capire com'è fatta; meglio comunque non scendere sotto i 450x (a 340x non sono riuscito a vederla).
MCG+0-58-4	gx	22h49m42s	+03°07.2'		Peg	16"	m. buona / buono	debolissima, molto diffusa, con Ø > 30"; situata a tra 2 stelline orientate da N a S e distanti un paio di primi: a prima vista, in visione distolta, sembra quasi aggettare da quella più a S che è più brillante — 270x.
MCG+0-58-23	gx	23h03m21s	+01°53.2'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima, estesa grosso modo come CGCG 379-25, dalla quale dista 4.5' a NW; appare in visione distolta a 1' NE di una stellina appena percettibile — 450x.
MCG+0-59-39	gx	23h24m38s	−01°59.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con UGC 12584 situata a ridosso E — 450x.
MCG+0-60-4	gx	23h33m19s	−00°27.0'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissimo oggetto rotondo di max 20" o 25" di Ø e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
MCG+0-60-6	gx	23h33m26s	−01°58.0'		Psc	24"	m buono. / ottimo	debolissima e molto piccola, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; è posta praticamente a perpendicolo con l'asse di UGC 12661 situata a poco più di 1' verso SE — 450x.
MCG+0-60-10	gx	23h34m40s	−01°26.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, meglio a 450x; solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 40"×20".
MCG+0-60-13	gx	23h35m26s	+01°03.5'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina percettibile solo a tratti un paio di primi a E — 450x.
MCG+0-60-25	gx	23h38m44s	−01°28.3'		Psc	16"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con piccolo bulge pressoché puntiforme — 270x.
MCG+0-60-28	gx	23h40m05s	−00°37.6'		Psc	24"	m buono. / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20", ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MCG+0-60-32	gx	23h40m33s	−00°33.1'		Psc	24"	m buono. / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ci dovrebbe essere una stellina percettibile solo a tratti a ridosso verso N o NE (osservabile, seppur elusivamente, anche nel 16") — 450x.
MCG+0-60-47	gx	23h47m08s	−00°36.7'		Psc	16"	ottima / scarso	relativamente facile, compatta, con piccola condensazione centrale marcata, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
MCG+1-1-50	gx	00h19m21s	+06°36.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale quasi stellare, seppure poco contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo occidentale — 450x.
MCG+1-2-1	gx	00h20m03s	+06°28.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	assieme a MCG+1-2-1 forma una coppia serrata di gx molto deboli che però si separano abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; la 1ª è più facile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; la 2ª appare come un baffo uniforme orientato da NE a SW, esteso ~ 30" e situato a ridosso W di una stellina brillante che disturba.
MCG+1-2-2	gx	00h20m03s	+06°20.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	v. MCG+1-2-1
MCG+1-2-9	gx	00h25m37s	+07°28.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, con Ø di 20"-25"; appare con relativa facilità a 380x.
MCG+1-2-29	gx	00h33m57s	+07°16.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	è di aspetto simile a UGC 335 situata a 1' NW, ma a differenza di quest'ultima presenta un'evidente condensazione centrale — 380x.
MCG+1-2-31	gx	00h35m09s	+05°32.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola e relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata ~ da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+1-2-36	gx	00h36m17s	+07°50.1'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø < 1'; non ho notato un miglioramento scalando a 340x.
MCG+1-3-8	gx	00h57m03s	+07°27.6'		Psc	24"	buona / ottimo	è un'elusiva macchiolina che appare solo a tratti in visione distolta a 380x quando si fissa la debolissima coppia di stelline a S della gx.
MCG+1-4-3	gx	01h13m27s	+04°14.4'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
MCG+1-4-39	gx	01h22m20s	+06°28.4'		Psc	24"	buona / m. buono	chiazza molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di 30"-35" e con condensazione centrale appena percettibile; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+1-4-61	gx	01h26m34s	+08°11.4'		Psc	24"	buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e con nucleo stellare evidente — 450x.
MCG+1-5-22	gx	01h42m04s	+07°39.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	presenta un debolissimo nucleo stellare, ma la gx in sé è elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 380x; non è comunque estesa più di 15" o 20".
MCG+1-6-5	gx	01h56m12s	+05°35.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+1-6-20	gx	01h28m44s	+08°17.4'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+1-6-21	gx	01h58m54s	+08°21.1'		Psc	24"	buona / buono	elusiva e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, solo a tratti allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina brillante a 1' NW.
MCG+1-6-24	gx	01h58m51s	+05°21.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, situata a 1' N di una stellina brillante che ne disturba l'osservazione; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+1-6-60	gx	02h14m46s	+07°27.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+1-8-11A	gx	02h53m31s	+06°28.4'		Cet	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza rotonda di 30"-35" di Ø; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x [non ho visto UGC 2364, la gx che stavo cercando e che è stata poi osservata successivamente col 24"].
MCG+1-8-34	gx	03h00m00s	+05°58.0'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta a SE di una stellina brillante; è rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG+1-8-36	gx	03h00m10s	+05°42.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 2469 situata 2.5' più a W — 450x.
MCG+1-10-2	gx	03h37m21s	+05°21.3'		Tau	24"	buona / buono	debolissima, appare senza tanti problemi in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG+1-12-11	gx	04h34m47s	+08°10.1'		Tau	24"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda con Ø di 30"-35" e tenue condensazione centrale; forma una coppia abbastanza ravvicinata con **CGCG 419-18** situata 1.5' a SSW — 450x.
MCG+1-14-36	gx	05h23m38s	+05°34.1'		Ori	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+1-31-30	gx	12h15m18s	+05°45.7'		Vir	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo, poco diffuso e condensato, con Ø max di 20" — 380x.
MCG+1-32-119	gx	12h38m16s	+07°49.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di aspetto un po' confuso, ma grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una doppia stretta a 3' NE — 450x.
MCG+1-32-120	gx	12h38m12s	+07°48.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG+1-32-119**
MCG+1-35-14	gx	13h36m29s	+03°29.7'		Vir	24"	ottima / buono	appare elusivamente in visione distolta a un paio di primi N di una debole stellina, ma anche a 450x sembra di aspetto quasi stellare.
MCG+1-52-15	gx	23h34m45s	+07°59.2'		Del	24"	buona / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme orientata da NW a SE ed estesa 45"; si riesce a separare da UGC 11593, ma è meglio visibile spingendo a 570x.
MCG+1-54-8	gx	21h22m02s	+08°32.8'		Equ	24"	m. buona / m. buono	piccola galassietta rotonda relativamente facile, con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; si trova a ridosso verso N di un piccolo asterismo di forma triangolare formato da 5 stelline fra cui una doppia stretta situata a subito a SW della gx — 450x.
MCG+1-55-3	gx	21h34m03s	+08°47.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente a 1' NE di una stellina brillante che ne disturba la visione; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20"; meglio tuttavia non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MCG+1-55-14	gx	21h51m27s	+05°26.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	è debolissima, ma appare senza problemi in visione distolta a 450x, molto diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta a 1.5' SSW — 450x.
MCG+1-57-12	gx	22h36m00s	+04°03.0'		Peg	24"	buona / buono	è una chiazza circolare molto debole e spampanata, di luminosità uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+1-58-8	gx	22h48m57s	+07°14.3'		Peg	24"	m. buona / buono	debolissima e stranamente disturbata da una debole stellina situata a subito a W; in visione distolta appare a tratti orientata grosso modo da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+1-58-19	gx	22h59m59s	+06°57.1'		Psc	24"	buona / ottimo	relativamente facile da vedere, anche se la forma è un po' compromessa da una stellina abbastanza brillante situata al bordo NE; grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MCG+1-58-23	gx	23h02m25s	+06°55.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia serrata subito a W — 450x.
MCG+1-59-1	gx	23h09m09s	+07°30.4'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
MCG+1-59-3	gx	23h10m03s	+07°34.1'		Psc	24"	buona / ottimo	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, relativamente compatta, orientata da E a W ed estesa una 30-ina di secondi; è un po' difficile da scovare a 450x perché a tale ingrandimento il campo è virtualmente depleto.
MCG+1-59-6	gx	23h10m26s	+07°24.2'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, solo a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+1-59-36	gx	23h17m55s	+09°26.9'		Peg	16"	buona / mediocre	piccola, abbastanza compatta, circolare, con Ø di 20"-30" (situata a circa 1' NE di NGC 7584) — 270x.
MCG+1-59-41	gx	23h18m52s	+06°53.7'		Psc	24"	buona / m. buono	piccola e debolissima, tuttavia salta fuori più facilmente di UGC 12494, dalla quale dista 1' verso N; è rotonda con Ø < 30".
MCG+1-59-43	gx	23h19m12s	+09°17.4'		Peg	16"	buona / mediocre	debole, ma facile da vedere, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20", con tenue nucleo di aspetto stellare visibile a tratti — 270x.
MCG+1-59-61	gx	23h21m25s	+08°32.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso N che offusca un po' l'osservazione — 450x.
MCG+1-59-84	gx	23h28m15s	+09°36.8'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debolissima, ma più che altro disturbata da una stellina brillante situata a ridosso verso E; forse rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme; una debole stellina si trova a quasi a ridosso W.
MCG+1-60-10	gx	23h37m19s	+04°52.9'		Psc	16"	ottima / scarso	debolissimo oggetto diffuso molto piccolo, esteso una 20-ina di secondi e con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti a 380x; appare in visione distolta a ~ 40" S di una stellina.
MCG+1-60-11	gx	23h37m21s	+04°54.3'		Psc	16"	ottima / scarso	debolissima e di forma indistinta, estesa comunque non più di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a < 1' verso SW — 270x.
MCG+1-60-18	gx	23h39m05s	+07°48.9'		Psc	24"	buona / buono	debolissima, in parte disturbata dalla luce di una stellina brillante situata a 1.5' NW, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
MCG+1-60-24	gx	23h44m25s	+09°09.8'		Peg	24"	buona / ottimo	è di aspetto e Ø simili a MAC 2344+0909B, dalla quale dista una 30-ina di secondi verso NW, ma presenta una condensazione centrale più marcata — 380x.
MCG+1-60-28	gx	23h44m40s	+04°49.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a momenti in visione distolta a ~ 1' N di una stellina; meglio visibile a 450x; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG+1-60-32	gx	23h45m23s	+04°35.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, ma ciò nonostante salta all'occhio abbastanza facilmente a 450x; è di forma indistinta, ma comunque non più estesa di 40".
MCG+1-60-36	gx	23h48m01s	+05°35.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una doppia dalle componenti brillanti a 1.5' verso N — 450x.
MCG+1-60-39	gx	23h50m51s	+06°09.0'		Psc	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di 35"-40" e piccola condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina al bordo SW; un'altra stellina appena percettibile che salta fuori in visione distolta si trova a 1' verso W: sembra a tratti leggermente nebulosa, ma forse trattasi di un'impressione — 450x.
MCG+1-60-44	gx	23h53m22s	+08°08.9'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima, quasi elusiva, piccola, estesa non più di 25"-30", appare solo a tratti in visione distolta a 380x a una 40-ina di secondi E di una stellina.
MCG+2-1-16	gx	00h03m36s	+10°36.2'		Psc	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo oggetto relativamente compatto, molto debole, ma facilmente visibile a 380x; è approssim. rotonda con Ø di 20"-25".
MCG+2-1-20	gx	00h07m53s	+11°51.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a momenti in visione distolta tra due stelline orientate da E a W e distanti oltre 4'; non riesco a capirne la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 30" — 450x.
MCG+2-1-31	gx	00h18m12s	+13°11.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	è debolissima, ma a 380x in visione distolta appare chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni 50"×20" e di luminosità uniforme.
MCG+2-2-2	gx	00h20m25s	+10°15.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina subito a SE — 450x.
MCG+2-2-7	gx	00h24m22s	+10°06.2'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' verso S; un'altra stellina di luminosità simile si trova a 1.5' NW — 450x.
MCG+2-2-19	gx	00h34m14s	+10°05.6'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza rotondeggiante con Ø di una 40-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, in quanto appare meglio contrastata.
MCG+2-3-7	gx	00h51m02s	+11°31.6'		Psc	24"	m. buona / buono	è un debole fuso di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×25"; c'è una stellina evidente al bordo W — 400x.
MCG+2-3-19	gx	00h58m41s	+12°41.6'		Psc	16"	ottima / m. buono	è un debolissimo e minuscolo oggetto concentrato che appare a tratti a 380x.
MCG+2-3-27	gx	01h03m20s	+14°01.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con UGC 644 situata una 40-ina di secondi a NW; sono entrambe debolissime, ma si riescono a sdoppiare abbastanza facilmente anche a 270x; UGC è orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; la MCG è leggermente più piccola, ma ha una luminosità specifica più alta, orientata da N a S con dimensioni 30"×15".
MCG+2-3-28	gx	01h03m32s	+10°49.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+2-3-29	gx	01h03m48s	+14°32.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	è una debolissima macchiolina circolare estesa una 20-ina di secondi e di aspetto uniforme, "incastrata" in un piccolo triangolo irregolare formato da 3 stelline di luminosità differente; la gx si trova a ridosso della componente occidentale — 450x.
MCG+2-3-30	gx	01h03m50s	+10°35.4'		Psc	24"	buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e tenue condensazione centrale abbastanza evidente a 450x.
MCG+2-4-13	gx	01h13m33s	+11°31.4'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; è meglio evidente scalando a 340x; c'è un piccolo asterismo molto serrato di 4 stelline di luminosità simile a 5' SW.
MCG+2-5-4	gx	01h34m10s	+13°29.0'		Psc	24"	buona / m. buono	elusiva e molto piccola, appare solo a momenti in visione distolta subito a SE di UGC 1121, meglio a 340x.
MCG+2-5-20	gx	01h44m59s	+10°20.5'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+2-5-22	gx	01h45m03s	+10°26.6'		Psc	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, estesa 15" o 20", appare in visione distolta, a 450x, a ~ 30" SE di una stellina appena percettibile.
MCG+2-5-24	gx	01h45m15s	+10°20.9'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+2-5-39	gx	01h48m57s	+10°30.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	appare a tratti in visione distolta a 1' SE di IC 162; è piccola, di luminosità pressoché uniforme e non più estesa di una 20-ina di secondi — 380x.
MCG+2-5-57	gx	01h55m00s	+13°28.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente quasi a ridosso S di UGC 1386, ma è di aspetto confuso; sembra comunque molto piccola e non più estesa di 20" — 450x.
MCG+2-6-30	gx	02h06m39s	+15°13.4'		Ari	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso SW — sono di aspetto simile, molto deboli, allungate e allineate in direzione NE-SW e di dimensioni 45"×15"; poco meglio contrastate scalando a 340x.
MCG+2-6-31	gx	02h06m37s	+15°13.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	v. **MCG+2-6-30**
MCG+2-6-50	gx	02h16m37s	+12°58.5'		Ari	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; è situata all'interno di un piccolo triangolo quasi equilatero di stelline di luminosità decrescente (a partire da quella da N e ruotando in senso orario) — 450x.
MCG+2-7-15	gx	02h33m51s	+11°12.2'		Ari	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **IC 1847** situata a ridosso W — si separano abbastanza facilmente a 450x: la MCG è allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; la IC invece è piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e presenta un nucleo stellare visibile a momenti.
MCG+2-8-2	gx	02h45m12s	+14°10.5'		Ari	24"	ottima / ottimo	piccola chiazza molto debole e diffusa che aggetta per 20"-25" a SE di una stellina abbastanza brillante che ne confonde la forma — 450x.
MCG+2-8-12	gx	02h49m16s	+14°31.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+2-8-14	gx	02h50m09s	+12°50.6'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile a momenti — 450x.
MCG+2-8-18	gx	02h50m40s	+14°58.9'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+2-8-20	gx	02h51m13s	+13°11.5'		Ari	16"	ottima / scarso	è situata a ridosso verso N di NGC 1117 e nonostante il cattivo seeing si riesce a separare; è un piccolo oggetto rotondo, abbastanza compatto di una 20-ina di secondi di Ø — 188x.
MCG+2-8-26	gx	02h53m32s	+12°38.7'		Ari	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina a 1' verso NW; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+2-8-30	gx	02h54m02s	+14°58.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **UGC 2369** situata a ridosso S — si sdoppiano abbastanza facilmente a 450x; questa è allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", diffusa e con tenue condensazione centrale; la compagna è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione centrale più evidente e diffusa; una stellina appena percettibile appare a tratti subito a E della coppia.
MCG+2-8-37	gx	02h57m29s	+10°27.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma rimane di aspetto stellare anche a 450x; è situata a ridosso S di UGC 2433.
MCG+2-8-42	gx	02h58m16s	+11°07.1'		Ari	16"	m. buona / ottimo	debolissima, quasi elusiva, appare a tratti in visione distolta a 380x a ~ 1' SE di CGCG 440-3.
MCG+2-18-3	gx	06h58m02s	+12°40.1'		Gem	16"	m. buona / scarso	più evidente della successiva MCG+2-18-4, osservata per prima, e più compatta, rotonda di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 30"; è situata a ridosso verso E di un piccolo triangolo di stelle — 380x.
MCG+2-18-4	gx	06h58m37s	+12°40.0'		Gem	16"	m. buona / scarso	piccolo e debole oggetto rotondo di 20"-25" di Ø con una stellina a ridosso verso E — 380x.
MCG+2-20-3	gx	07h35m43s	+11°42.6'		CMi	16"	buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, disturbata dalla luce di alcune stelline nelle immediate vicinanze, di cui una NW e l'altra a SW molto prossime — 270x.
MCG+2-25-21	gx	09h42m53s	+09°29.5'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG+2-25-42	gx	09h49m53s	+09°09.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	appare stellare a prima vista; osservando a 570x si nota che in realtà di stellare ha solo il nucleo dal quale si dipartono, a NE e a SW, 2 tenuissimi baffi estesi una decina di secondi.
MCG+2-26-11	gx	09h59m09s	+13°03.5'		Leo	24"	buona / ottimo	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa per ~ 1' — 450x.
MCG+2-26-12	gx	09h59m09s	+13°03.9'		Leo	24"	buona / buono	situata a ridosso di MCG+2-26-11 verso NE si separa abbastanza facilmente dalla compagna a 450x; è molto piccola, compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E (queste 2 gx apparivano come un unico indistinto lucore nel 16" in una serata con le stesse condizioni di visibilità).
MCG+2-27-4	gx	10h23m24s	+12°50.1'		Leo	24"	buona / mediocre	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ci sono 2 stelline quasi a ridosso: una a ~ 30" N e l'altra alla stessa distanza verso SW (vento forte!) — 280x.
MCG+2-27-5	gx	10h23m26s	+12°48.9'		Leo	24"	buona / mediocre	appare facilmente in visione distolta quando si osserva MCG+2-27-4, dalla quale dista poco più di 1' verso SSE; è più piccola e più debole, probabilmente rotonda e condensata, con Ø max di 15"; c'è una debole stellina a ridosso NE (vento forte!) — 280x.
MCG+2-27-10	gx	10h24m52s	+09°34.2'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NW — 450x.
MCG+2-27-35	gx	10h38m47s	+12°08.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+2-27-36	gx	10h38m50s	+12°07.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale — 450x.
MCG+2-29-2	gx	15h08m35s	+13°40.2'		Boo	24"	buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW; ha una compagna molto piccola e debolissima a ridosso NW: quest'ultima, denominata MCG+2-29-3 ed estesa sì e no una 10-ina di secondi, appare solo a momenti a metà strada tra la galassia principale e la stessa stellina a ridosso W — 450x.
MCG+2-29-3	gx	15h08m34s	+13°40.5'		Boo	24"	buona / ottimo	v. **MCG+2-29-2**
MCG+2-32-132	gx	12h33m14s	+12°51.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con IC 3492 situata a poco più di 1' verso E — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+2-33-17	gx	12h46m34s	+11°53.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
MCG+2-33-18	gx	12h46m23s	+11°52.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 450x.
MCG+2-33-25	gx	12h48m35s	+09°07.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	situata a ridosso SE della successiva è molto piccola, rotonda con Ø < 20" e un nucleo stellare evidente; ho dovuto spingere a 580x per tenere fuori campo la SAO 119602 di magnitudo 6.5 situata 4' a WSW.
MCG+2-33-26	gx	12h48m34s	+09°07.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; 580x per tenere fuori campo la SAO 119602 di magnitudo 6.5 situata 3.5' a WSW.
MCG+2-36-57	gx	14h13m46s	+08°13.3'		Boo	24"	buona / buono	forma una coppia molto serrata con CGCG 46-67 situata a ridosso SW — sono 2 piccoli oggetti rotondi, con Ø di una 20-ina di secondi, relativamente compatti e condensati, che si sdoppiano con facilità solo a 570x; sono orientati come la coppia di stelline che si trova a E.
MCG+2-38-34	gx	15h03m06s	+11°12.3'		Boo	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MCG+2-38-35 situata a ridosso E — le 2 gx sono molto deboli, ma si sdoppiano facilmente a 450x: la 1a è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; si trova tra una stellina evidente a 1' W e una debole a E; la 2a è invece molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-12" e appare a ridosso SW della debole stellina di cui sopra.
MCG+2-38-35	gx	15h03m08s	+11°12.2'		Boo	24"	buona / ottimo	v. **MCG+2-38-34**
MCG+2-41-16	gx	16h11m17s	+14°15.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	appare come una sorta di debolissima pendice meridionale e molto piccola a S di NGC 6074; anche a 450x si separa a fatica dalla gx principale; a 340x pare a prima vista un unico oggetto orientato da NNE a SSW; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso W.
MCG+2-41-18	gx	16h12m06s	+14°12.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-15" e di luminosità pressoché uniforme; è situata a ridosso S di NGC 6078, dalla quale si separa facilmente a 450x.
MCG+2-54-6	gx	21h12m07s	+13°00.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo, diffuso di 30"-35" di Ø e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stellina a ridosso verso W.
MCG+2-55-19	gx	21h52m29s	+12°24.7'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda con Ø < 30", poco diffusa e leggermente condensata — 450x.
MCG+2-55-20	gx	21h52m32s	+12°25.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	debolissima, solo a tratti appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MCG+2-57-2	gx	22h23m45s	+11°50.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, con condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti a 380x, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20".
MCG+2-57-2	gx	22h23m45s	+11°50.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme; appare in visione distolta a 380x ed è estesa ~ 20".
MCG+2-57-6	gx	22h37m01s	+14°24.3'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a poco più di 1' W di una stellina, forse rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG+2-58-8	gx	22h46m12s	+10°33.4'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso N; un piccolo triangolo isoscele con componenti della stessa luminosità si trova subito a S — 450x.
MCG+2-58-11	gx	22h49m00s	+11°10.9'		Peg	24"	buona / ottimo	debolissimo lucore di aspetto confuso, forse circolare con Ø di una 40-ina di secondi; meglio comunque scalare a 340x, in quanto a 450x si spampana troppo!
MCG+2-58-12	gx	22h49m10s	+11°33.0'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, a tratti poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG+2-58-23	gx	22h50m18s	+11°37.7'		Peg	24"	m. buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, con nucleo stellare visibile a tratti a 450x, rotonda con Ø di 15"-20".
MCG+2-58-24	gx	22h50m42s	+11°25.5'		Peg	24"	buona / ottimo	è una galassietta elusiva che sono riuscito a vedere solo a 570x a causa della vicinanza di una stella brillante (situata quasi a ridosso verso E) che disturba l'osservazione; non sembra comunque più estesa di una 20-ina di secondi.
MCG+2-58-29	gx	22h51m56s	+15°40.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata all'interno di un piccolo triangolo allungato e irregolare di stelline: la componente più a N è abbastanza brillante — 450x.
MCG+2-58-30	gx	22h52m16s	+11°33.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, appare solo a tratti in visione distolta a 270x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG+2-58-47	gx	23h00m02s	+15°40.7'		Peg	24"	buona / m buono	debole lucore rotondo, molto diffuso e di luminosità uniforme, con Ø una 40-ina di secondi; è situato a ridosso S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MCG+2-58-48	gx	23h00m16s	+13°35.6'		Peg	24"	m. buona / buono	molto debole, con nucleo quasi stellare molto tenue, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×60"; meglio definita scalando a 340x.
MCG+2-58-55	gx	23h01m31s	+12°05.2'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante subito a W — 450x.
MCG+2-59-16	gx	23h16m39s	+15°35.3'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30"-35"; c'è una stellina a ridosso S e un'altra appena percettibile che in visione distolta pare immersa nell'alone della gx verso E; una coppia stretta e sbilanciata si trova invece a 1' verso E — 450x.
MCG+2-59-17	gx	23h16m48s	+15°35.0'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
MCG+2-59-42	gx	23h26m54s	+15°43.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo molto debole, ma abbastanza compatto, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi 380x.
MCG+3-1-5	gx	23h57m56s	+16°31.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	è un minuscolo e debolissimo oggetto rotondo, con Ø di 10"-15" che appare a tratti in visione distolta a 380x.
MCG+3-1-15	gx	00h02m38s	+16°38.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, con condensazione centrale marcata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso verso W; forma una coppia ravvicinata con la successiva situata subito a N (altresì nota come **Arp 130**, nonché riportata sul software Aladin come **UGC 1**) — 450x.
MCG+3-1-16	gx	00h02m38s	+16°39.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore che appare solo in visione distolta scalando a 340x; forse è rotonda con Ø anch'essa di una 30-ina di secondi; in visione diretta appare soltanto la **MCG+3-1-15** situata al bordo meridionale.
MCG+3-1-24	gx	00h06m22s	+17°26.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con UGC 46 situata a ridosso S — poco più evidente della compagna, dalla quale si separa facilmente, relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
MCG+3-2-21	gx	00h39m33s	+21°14.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta anche se la visione è disturbata dalla SAO 74175 di 6ª grandezza situata 2.5' a NW; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte dell'ammasso AGC 75) — 450x.
MCG+3-3-8	gx	00h54m45s	+16°26.3'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+3-4-14	gx	01h17m18s	+16°15.9'		Psc	16"	ottima / buono	è un minuscolo e debolissimo oggetto che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; non è più estesa di 15" o 20".
MCG+3-4-34	gx	01h24m44s	+17°00.3'		Psc	24"	buona / m. buono	è una piccola e debolissima chiazza circolare con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme; equidistante, anche se non proprio allineata, con 2 stelline a WSW — 450x.
MCG+3-4-37	gx	01h26m34s	+19°20.4'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a 1' NE; la visione è disturbata dalla SAO 92441 di 9ª grandezza situata 2.5' a S, ma soprattutto dalla SAO 92444 di magnitudo 5.5 distante 6' (quest'ultima si riesce tuttavia a tenere fuori campo a 450x).
MCG+3-6-31	gx	02h04m36s	+21°35.5'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+3-6-36	gx	02h08m03s	+20°21.3'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG+3-6-37	gx	02h09m28s	+19°46.6'		Ari	24"	ottima / molto buono	debole, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
MCG+3-7-7	gx	02h23m37s	+16°58.2'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto spampanata e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; la visione non sembra migliorare scalando a 340x.
MCG+3-8-11	gx	02h47m52s	+17°16.5'		Ari	24"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a E (situata al margine orientale dell'ammasso DoDz1) — 450x.
MCG+3-8-32	gx	02h56m33s	+15°54.6'		Ari	16"	m. buona / scarso	forma una coppia ravvicinata con UGC 2413 situata 1' a WNW — si riescono a sdoppiare anche a 132x, ma è meglio osservarle a 270x, malgrado il seeing scarso; è rotonda ma con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione centrale visibile a momenti.
MCG+3-8-34	gx	02h57m23s	+16°05.7'		Ari	24"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme.
MCG+3-8-37	gx	02h57m53s	+15°44.6'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore di forma a prima vista indistinta, "schiacciato" da due stelline abbastanza brillanti (che fanno parte di tre stelline allineate in direzione NW-SE e quasi equidistanti); a tratti appare rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG+3-8-39	gx	02h59m43s	+17°03.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 450x.
MCG+3-8-40	gx	02h59m46s	+17°04.5'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 10" o 15" — 450x.
MCG+3-9-1	gx	03h07m58s	+17°46.8'		Ari	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata tra una stellina abbastanza brillante a S (in coppia larga con un'altra più debole a SSW) e una molto debole a N — 495x.
MCG+3-9-9	gx	03h14m17s	+16°31.6'		Ari	16"	m. buona / scarso	poco più evidente di UGC 2602, dalla quale dista 3' a NW; di fatto salta fuori per prima, poco più piccola, rotonda con Ø di 40" — 270x.
MCG+3-23-22	gx	08h57m52s	+20°07.3'		Cnc	16"	buona / m. buono	molto debole e assai diffusa, rotonda con Ø di 35"-40"; appare abbastanza facilmente a 270x fissando la stellina situata a 1.5' NW.
MCG+3-23-24	gx	09h00m14s	+17°23.7'		Cnc	24"	ottima / discreto	debolissima e molto piccola appare nel bagliore di una stellina brillante situata a ridosso di NE; in visione distolta appare a momenti orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; non bisogna scendere sotto i 450x (situata 1' scarso a S di CGCG 90-49).
MCG+3-23-33	gx	09h04m51s	+17°27.0'		Cnc	16"	ottima / m. buono	appare solo a momenti in visione distolta a 380x come una stellina leggermente sfuocata situata a poco più di 1' W di UGC 4761.
MCG+3-24-13	gx	13h16m52s	+14°24.9'		Com	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta a 450x; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 15" — 450x.
MCG+3-24-21	gx	09h16m07s	+17°44.0'		Cnc	16"	buona / m. buono	piccola, rotonda, relativamente facile, con un Ø non superiore una 20-ina di secondi — 270x.
MCG+3-24-22	gx	09h16m10s	+17°39.6'		Cnc	16"	buona / m. buono	situata a un paio di primi NE di NGC 2795, è molto debole, di luminosità uniforme e leggermente allungata da NE a SW — 270x.
MCG+3-24-49	gx	09h20m41s	+18°14.4'		Cnc	16"	buona / m. buono	fa parte del quartetto cui appartengono CGCG 91-78 e -80 — debolissima, di molto diffusa e di forma indistinta; salta fuori in visione distolta a 1' E di una stellina appena percettibile, ma bisogna spingere a 380x.
MCG+3-25-2	gx	09h38m39s	+17°02.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	è un debolissimo oggetto di aspetto stellare, appare abbastanza facilmente, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una doppia serrata a 1.5' NE.
MCG+3-25-15	gx	09h39m31s	+16°46.2'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e "soffocata" dalla luce di una stella brillante situata a ridosso SW; è grosso modo rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG+3-25-16	gx	09h39m30s	+16°45.5'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme, anche questa estesa < 20", che sembra aggettare a S di una stella brillante; poco meglio evidente a forzando a 580x.
MCG+3-26-13	gx	10h00m51s	+17°24.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di piccole dimensioni, forse circolare con Ø sì e no di 20"; è situata a ridosso N di una brillante stella di 10ª grandezza che disturba l'osservazione — 450x.
MCG+3-26-25	gx	10h06m33s	+14°26.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina a ridosso SW di UGC 5448; solo spingendo a 580x si nota che è di fatto debolmente sfuocata.
MCG+3-26-45	gx	00h52m12s	+29°40.5'		Leo	16"	ottima / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx debolissime, osservabili in visione distolta e che tuttavia si riescono a sdoppiare facilmente anche a 270x; la 2ª più facile è rotonda con Ø di ~ 20", mentre la 1ª appare a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 380x.
MCG+3-26-46	gx	10h14m03s	+14°31.7'		Leo	16"	ottima / ottimo	v. **MCG+3-26-45**.
MCG+3-27-23	gx	10h25m01s	+17°17.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" e un nucleo abbastanza evidente — 450x.
MCG+3-27-26	gx	10h25m11s	+17°15.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+3-28-15	gx	10h49m44s	+16°14.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata a ridosso NE di **NGC 3405** — 450x.
MCG+3-28-63	gx	11h07m23s	+18°25.8'		Leo	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con UGC 6175 situata una 20-ina di secondi a SW; è poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
MCG+3-29-7	gx	11h12m12s	+19°39.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+3-29-9	gx	11h12m33s	+19°50.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
MCG+3-29-12A	gx	11h14m56s	+16°49.4'		Leo	24"	m. buona / buono	assieme a MCG+3-29-12B forma una coppia di deboli galassiette distanti 1' in direzione N-S: la 1ª è diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale; c'è una brillante a 1' verso SE; la 2ª è nel complesso poco più debole, anche se la condensazione centrale sembra invece appena più evidente; la gx è rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG+3-29-12B	gx	11h14m56s	+16°50.3'		Leo	24"	m. buona / buono	v. **MCG+3-29-12A**.
MCG+3-29-18	gx	11h16m35s	+18°07.1'		Leo	16"	ottima / ottimo	debolissima, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
MCG+3-29-24	gx	11h17m38s	+17°49.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissimo chiarore molto diffuso, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso e appena più brillante all'interno; occorre osservarla a 200x, perché a 400x il campo è totalmente depleto, salvo una debole stellina di 15-esima situata a 4' NNW.
MCG+3-29-30	gx	11h19m12s	+18°03.6'		Leo	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto rotondo, molto diffuso di max 30" di Ø; appare solo in visione distolta a 380x.

MCG+3-30-9	gx	11h34m45s	+19°02.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto deboli e diffusa, rotonda con Ø di 45" e tenue nucleo quasi stellare visibile a tratti a 400x.
MCG+3-30-35	gx	11h40m06s	+17°41.6'		Leo	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso S — 495x.
MCG+3-30-52	gx	11h42m22s	+16°05.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo e diffuso con Ø > 20"; appare facilmente in visione distolta a 400x (situata a 5' N di UGC 6666).
MCG+3-30-94	gx	11h45m07s	+19°58.0'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; costituisce una sorta di propagine di **NGC 3861**, una gx molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 2'×1' e con un bulge ovale di 40"×20" orientato invece da N a S; il campo è disturbato dalla SAO 81972 di magnitudo 7.5 situata a 6.5' a SE — 450x.
MCG+3-30-99	gx	11h45m19s	+15°29.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	assieme a MCG+3-30-100 ed MCG+3-30-102 costituisce un terzetto di debolissime e piccole galassiette rotonde, di aspetto simile e con Ø di una 20-ina di secondi; la più difficile è la 2ª anche se è l'unica che presenta una condensazione centrale apprezzabile; contrariamente alle aspettative la visione non migliora spingendo a 570x e conviene invece restare a 400x.
MCG+3-30-100	gx	11h45m22s	+15°29.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG+3-30-99**
MCG+3-30-102	gx	11h45m23s	+15°31.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG+3-30-99**
MCG+3-31-22	gx	12h03m02s	+16°29.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	è ancora più debole di UGC 7028, dalla quale dista 2.5' verso NW, in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 400x.
MCG+3-31-26	gx	12h03m20s	+16°30.5'		Com	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 98-33 situata a ridosso NE; sono 2 galassiette molto piccole e relativamente compatte con Ø di una 20-ina di secondi; i dischi si sovrappongono a mo' di un "8", ma i nuclei stellari si riescono a separare a 400x.
MCG+3-31-71	gx	12h12m19s	+15°29.0'		Com	28"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme; è difficile capirne la forma: in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø max di 30"; c'è una stellina a 1' SW; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a SE — 495x.
MCG+3-32-32	gx	12h25m36s	+15°50.9'		Com	24"	m. buona / ottimo	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, appare solo a momenti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; meglio contrastata scalando a 340x anche se così diventa quasi impossibile tenere fuori campo la SAO 100095 di 6ª grandezza (forma una coppia ravvicinata con IC 3313 situata 1' a S.
MCG+3-32-42	gx	12h27m13s	+15°58.8'		Com	28"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina a un paio di primi verso W — 495x.
MCG+3-34-25	gx	13h24m49s	+16°08.7'		Com	24"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di piccole galassiette di aspetto simile, molto ravvicinate in direzione E-W, rotonde con Ø di una 15-ina di secondi; la 2ª, stranamente situata più a W, presenta una tenue condensazione centrale che manca invece nella 1ª — 450x.
MCG+3-34-26	gx	13h24m48s	+16°08.7'		Com	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+3-34-25**
MCG+3-36-4	gx	13h56m00s	+17°30.7'		Boo	16"	m. buona / ottimo	abbastanza ben visibile a 380x, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; IC 960, situata a ridosso verso S, è invece un oggetto elusivo, molto diffuso e appare solo a momenti in visione distolta.
MCG+3-36-18	gx	13h59m05s	+15°50.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente in visione distolta a 450x come una debolissima chiazza molto diffusa che aggetta verso W da una debole stellina.
MCG+3-36-52	gx	14h07m34s	+16°06.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, di aspetto un po' confuso a prima vista, a tratti grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SW e una poco più evidente alla stessa distanza verso SE — 450x.
MCG+3-36-75	gx	14h10m49s	+14°23.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale evidente di aspetto quasi stellare; disturbata dalla SAO 100891 di 8ª grandezza situata 5' a W e che non si riesce a tenere fuori campo — 450x.
MCG+3-36-79	gx	14h12m13s	+15°52.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG+3-36-80	gx	14h12m11s	+18°20.4'		Boo	16"	ottima / ottimo	galassietta elusiva, estesa non più di 20" e appare solo a tratti in visione distolta a 380x (situata a 2.8' NNW di UGC 9087).
MCG+3-38-5	gx	14h44m26s	+15°33.1'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso W e una appena percettibile al margine SE — 450x.
MCG+3-38-12	gx	14h47m10s	+16°17.2'		Boo	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata 1' scarso a E — molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; una stellina percettibile solo a momenti a ridosso E è risultata essere la PGC 1505194 — 450x.
MCG+3-38-13	gx	14h47m14s	+16°17.1'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con la precedente situata 1' scarso a W — 450x.
MCG+3-38-70	gx	15h01m46s	+15°06.8'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima e molto disturbata da una stella brillante di 9ª grandezza situata a 1' ESE, in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MCG+3-38-71	gx	15h01m56s	+16°58.6'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+3-38-72	gx	15h01m57s	+15°04.4'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, anche questa con dimensioni 30"×15"; disturbata dalla stessa stella brillante di 9ª grandezza situata un paio di primi a NNW — 450x.
MCG+3-38-83	gx	14h04m37s	+17°41.2'		Boo	24"	buona / ottimo	fa parte di un trio assieme a CGCG 105-104 e CGCG 105-105 — debolissima, appare in visione distolta, ma è disturbata da una stellina brillante situata quasi a ridosso NW; in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20", ma è comunque meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+3-39-14	gx	15h12m31s	+19°09.5'		Ser	16"	buona / mediocre	molto piccola ed elusiva, appare solo a tratti, ma è in parte "soffocata" dalla luce di 2 stelle brillanti di 7ª che a 270x sono entrambe presenti nel campo (quella a N, doppia, è particolarmente fastidiosa).
MCG+3-40-35	gx	15h45m02s	+16°55.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	è un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso neanche 30" e orientato da NE a SW; appare con difficoltà in visione distolta a 450x.
MCG+3-40-41	gx	15h47m58s	+17°49.4'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+3-40-42	gx	15h48m04s	+17°48.5'		Ser	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S e una più debole al bordo NW — 450x.
MCG+3-40-46	gx	15h49m20s	+16°17.4'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MCG+3-41-28	gx	16h00m54s	+16°20.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, di luminosità pressoché uniforme rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+3-41-29	gx	16h00m55s	+16°20.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20" (situata quasi a ridosso N della precedente) — 450x.
MCG+3-41-45	gx	16h01m50s	+17°38.4'		Her	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza circolare diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una coppia di stelline a NE — 450x.
MCG+3-41-46	gx	16h02m02s	+15°40.7'		Her	24"	ottima / buono	molto debole, appare facilmente in visione distolta a ridosso N di una stellina, estesa una 15-ina di secondi e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente — 280x.
MCG+3-41-59	gx	16h03m13s	+15°50.9'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; ci sono 2 stelline appena percettibili: una subito a E e l'altra a ridosso verso S — 450x.
MCG+3-41-75	gx	16h04m38s	+16°28.2'		Her	24"	ottima / buono	debole e diffusa, a tratti condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 340x.
MCG+3-41-76	gx	16h04m34s	+16°28.8'		Her	24"	ottima / buono	poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30", molto diffusa e con nucleo stellare molto debole — 340x.
MCG+3-41-95	gx	16h05m29s	+16°26.1'		Her	24"	ottima / buono	rotonda con Ø > 30", poco diffusa e con condensazione centrale evidente (la gx era già stata osservata nel 16") — 340x.
MCG+3-41-96	gx	16h05m27s	+17°54.6'		Her	16"	discreta / m. buono	molto debole, va e viene; nei momenti in cui è visibile, tuttavia, si effettivamente una piccola macchia orientata da N a S ed estesa ~ 40" — 270x.
MCG+3-41-124	gx	16h06m26s	+15°41.6'		Her	16"	ottima / m. buono	più piccola d UGC 10201, dalla quale dista 30" N, rotonda di una 30-ina di secondi di Ø e con condensazione centrale quasi stellare — 380x.
MCG+3-41-132	gx	06h07m10s	+18°38.5'		Her	16"	ottima / buono	oggetto rotondo molto debole, poco diffuso, con Ø di 30" e condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
MCG+3-45-16	gx	17h42m53s	+16°12.4'		Her	24"	buona / ottimo	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG+3-45-26	gx	17h48m10s	+17°39.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW e una brillante a 1' verso SE — 450x.
MCG+3-45-33	gx	17h49m34s	+16°40.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø poco maggiore di 20"; c'è una stellina a ridosso SW; a prima vista la galassia sembra fondersi con MCG+3-45-34 in un unico oggetto di forma un po' irregolare; a tratti, tuttavia, la compagna appare in realtà come un baffo di luce molto tenue orientato da N a S ed esteso una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+3-45-34	gx	17h49m35s	+16°40.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+3-45-33**
MCG+3-57-2	gx	22h24m24s	+18°04.2'		Peg	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG+3-57-4	gx	22h24m33s	+18°04.0'		Peg	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, presenta una piccola zona centrale poco più brillante, ma non riesco a capirne l'orientamento; meglio visibile scalando a 340x.
MCG+3-57-14	gx	22h30m37s	+17°05.2'		Peg	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di oltre 30" — 450x.
MCG+3-58-11	gx	22h54m52s	+20°15.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con NGC 7415 situata a ridosso verso E — debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MCG+3-58-28	gx	23h04m12s	+20°05.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	situata a ridosso NE di NGC 7475 è una gx molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme; si separa facilmente dalla principale anche a 340x.
MCG+3-59-1	gx	23h08m11s	+18°06.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, solo a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+3-59-3	gx	23h09m04s	+18°33.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta a 270x (a 380x il campo è troppo povero), rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG+3-59-39	gx	23h20m28s	+19°00.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+3-59-50	gx	23h23m25s	+20°35.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, approssim. circolare con Ø < 30" e una tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
MCG+4-1-9	gx	00h00m32s	+26°18.3'		Peg	16"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; si trova nel mezzo tra UGC 12896, situata a poco più di 1' N, e una stella situata alla stessa distanza verso S.
MCG+4-1-16	gx	00h03m32s	+25°06.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+4-1-20	gx	00h05m52s	+22°31.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
MCG+4-2-37	gx	00h37m05s	+25°41.9'		And	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso NW — 450x.
MCG+4-2-39	gx	00h37m51s	+26°19.2'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a fatica nei bagliori della SAO 74157 di 9ª grandezza situata a 1' NW; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20" — 450x.
MCG+4-1-40	gx	00h12m56s	+23°42.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG+4-2-41	gx	00h39m19s	+24°43.7'		And	24"	buona / buono	debolissima chiazza estesa una 40-ina di secondi, appare in visione distolta, ma non ho notato differenza di contrasto tra 340x e 450x.
MCG+4-2-45	gx	00h42m23s	+25°33.7'		And	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+4-2-46	gx	00h42m27s	+25°37.2'		And	24"	ottima / ottimo	più debole della precedente e più diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø simile — 450x.
MCG+4-3-3	gx	00h47m19s	+23°02.9'		And	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e a tratti condensata, orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; appare facilmente in visione distolta quando si osserva IC 1585 situata a 1' a W — 450x.
MCG+4-3-21	gx	00h56m42s	+27°01.6'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta sembra a prima vista aggettare a W di una stellina; è di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MCG+4-3-24	gx	00h58m04s	+26°53.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; meglio comunque non scendere sotto i 450x a causa di una doppia stretta e molto brillante a 1.5' verso N che disturba un po' la visione.
MCG+4-3-27	gx	00h58m29s	+22°19.5'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima, ma in visione distolta appare più facilmente di UGC 605, dalla quale dista 1' verso ESE, forse perché più compatta; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+4-3-30	gx	00h59m04s	+27°02.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso W — 450x.
MCG+4-3-33	gx	01h00m34s	+27°05.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	di aspetto simile a CGCG 480-31, dalla quale dista 4.5' a NNE, rotonda, molto diffusa e con Ø analogo — 450x.
MCG+4-6-5	gx	02h09m05s	+24°23.0'		Ari	16"	ottima / m. buono	debolissima, molto diffusa e a tratti condensata, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
MCG+4-6-8	gx	02h11m24s	+25°51.6'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+4-6-9	gx	02h11m22s	+25°49.3'		Ari	24"	m. buona / m. buono	piccola, rotonda con Ø simile a MCG+4-6-8, poco diffusa e con tenue condensazione centrale — 450x.
MCG+4-6-10	gx	02h11m55s	+22°35.5'		Ari	24"	ottima / molto buono	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG+4-6-11	gx	02h13m06s	+22°51.3'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è disturbata da una stellina brillante a 1' NE; un'altra stellina molto debole si trova tra questa e la gx — 450x.
MCG+4-6-43	gx	02h26m55s	+23°48.0'		Ari	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con evidente condensazione centrale quasi stellare; c'è una debole stellina a 1' E — 450x.
MCG+4-6-58	gx	02h29m50s	+23°06.5'		Ari	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile al bordo E — 380x.
MCG+4-6-60	gx	02h29m54s	+23°05.8'		Ari	16"	m. buona / m. buono	più debole di MCG+4-6-58, dalla quale dista ~ 1' a SW, di Ø simile, ma di aspetto ancora più uniforme; salta fuori abbastanza facilmente a 380x quando si osserva la precedente.
MCG+4-7-19	gx	02h37m38s	+25°46.2'		Ari	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; si trova a ridosso W di un asterismo di 4 stelline (fra cui una molto brillante a 2.5' verso E) foggiato a triangolo — 450x.
MCG+4-8-2	gx	02h58m04s	+25°27.0'		Ari	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a W — 495x.
MCG+4-9-1	gx	03h24m24s	+25°41.0'		Ari	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' N, una poco più evidente alla stessa distanza verso W; 3 stelline serrate quasi allineate da E a W si trovano un paio di primi a NW — 495x.
MCG+4-10-13	gx	04h02m38s	+25°14.0'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso W e altre 2 appena percettibili a ridosso S e SE — 495x.
MCG+4-11-3	gx	04h29m29s	+26°31.9'		Tau	24"	ottima / buono	debolissima chiazza molto diffusa ed estesa oltre 1'; appare a tratti in visione distolta a 270x.
MCG+4-16-3	gx	06h49m57s	+25°38.4'		Gem	24"	ottima / discreto	è situata a ridosso NW di UGC 3555; a 450x si separa facilmente dalla galassia principale, ma è molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme.
MCG+4-18-21	gx	07h29m41s	+24°26.3'		Gem	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo orientato da NW a SE ed esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N e una appena percettibile dalla parte opposta — 450x.
MCG+4-22-18	gx	09h09m04s	+20°34.9'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
MCG+4-22-25	gx	09h13m22s	+23°04.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva — sono due piccoli e debolissimi oggetti, di aspetto simile, estesi 10"-12" e distanti 30" in direzione N-S; appaiono abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+4-22-26	gx	09h13m22s	+23°04.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+4-22-25**
MCG+4-22-38	gx	09h23m19s	+22°16.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale — 450x.
MCG+4-22-40	gx	09h23m24s	+22°14.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, probabilmente rotonda con Ø < 20"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline brillanti situate a ridosso verso N e NE — 450x.
MCG+4-22-54	gx	09h26m58s	+24°39.3'		Leo	24"	buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso N e una più debole a 1' verso S; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+4-25-14	gx	10h23m19s	+22°23.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE e una appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso SW — 450x.
MCG+4-25-47	gx	10h43m51s	+21°28.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza circolare con Ø < 40" e di luminosità uniforme; la visione è un po' disturbata dalla SAO 81493 di 9ª grandezza situata 2' a NW — 450x.
MCG+4-26-12	gx	10h49m27s	+21°46.8'		Leo	16"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta una condensazione centrale visibile a 380x.
MCG+4-26-26	gx	11h02m24s	+22°15.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; situata tra due stelline brillanti orientate da N a S — 450x.
MCG+4-28-26	gx	11h41m36s	+25°53.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	assieme a MCG+4-28-27 forma una coppia abbastanza serrata, ma facilmente separabile anche a 340x; la 1a, che è quella a S, è molto piccola, condensata e con Ø di 15"-20"; la 2ª è di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+4-28-27	gx	11h41m36s	+25°53.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+4-28-26**
MCG+4-28-31	gx	11h42m08s	+25°58.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 30" SE — 450x.
MCG+4-28-32	gx	11h42m17s	+26°01.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+4-28-65	gx	11h50m56s	+21°58.4'		Leo	16"	buona / buono	piccolo oggetto molto debole e compatto che mostra, a tratti, un nucleo di spetto stellare; è situato al vertice W di un triangolo equilatero formato con la coppia NGC 3926A/B ed NGC 3925 — 380x.
MCG+4-29-40	gx	12h09m26s	+22°05.0'		Com	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, diffusa e di luminosità uniforme; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20" (situata poco più di 1' a S di UGC 7137) — 450x.
MCG+4-34-4	gx	14h13m05s	+20°24.0'		Boo	16"	m. buona / buono	appare facilmente in visione distolta a 270x, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", con bulge evidente e nucleo stellare; a 380x salta fuori una stellina a 1' SW (situata a 1.3' SW di NGC 5513).
MCG+4-35-19	gx	14h57m01s	+24°37.0'		Boo	16"	m. buona / ottimo	costituisce assieme a UGC 9618 una coppia serrata che si riesce a risolvere a 380x; questa sembra aggettare verso N dalla UGC per una 30-ina di secondi e appare di luminosità uniforme.
MCG+4-36-43	gx	15h24m03s	+20°46.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	appare facilmente anche in visione diretta a ridosso W di MCG+4-36-44; è poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
MCG+4-36-44	gx	15h24m06s	+20°46.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione stellare; c'è una stellina subito a E — 450x.
MCG+4-43-27	gx	18h19m43s	+23°42.1'	q 159	Her	24"	buona / buono	debolissimo galassietta rotonda estesa una 15-ina di secondi che ogni tanto a 400x e in visione distolta, si "stacca" verso S dalla 6623 (osservata in altra data); è riportata sulla Uranometria come 6623A.
MCG+4-48-2	gx	20h28m35s	+25°44.0'	q 159	Vul	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+4-51-10	gx	21h53m09s	+22°27.6'		Peg	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+4-51-12	gx	21h55m08s	+21°48.4'		Peg	24"	ottima / buono	nella posizione indicata dal Megastar c'è solo una stellina brillante di 12-esima; non ho notato la presenza di alcun alone attorno a essa (e la cosa pare confermata dall'immagine del DSS) — 450x.
MCG+4-51-15	gx	21h58m49s	+25°30.1'		Peg	24"	ottima / buono	debolissima, solo a momenti appare leggermente condensata, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
MCG+4-52-9	gx	22h21m29s	+25°15.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una doppia stretta a 1' verso E — 450x.
MCG+4-52-11	gx	22h22m33s	+25°17.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi poco diffusa e con nucleo stellare; si trova tra 2 deboli stelline distanti ~ 1.5' in direzione NE-SW; a 1.5' verso N c'è una piccola losanga di 4 componenti con la stessa luminosità — 450x.
MCG+4-53-3	gx	22h31m43s	+24°45.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di oltre 30" e nucleo stellare visibile a tratti a 450x; allineata ed equidistante con 2 stelline situate a S.
MCG+4-54-7	gx	22h57m59s	+26°07.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	appare solo a momenti come una stellina appena percettibile, e a tratti diffusa, a 1' scarso E di NGC 7435 — 450x.
MCG+4-54-23	gx	23h04m28s	+27°21.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo SE — 380x.
MCG+4-54-33	gx	23h13m57s	+25°27.0'		Peg	24"	buona / ottimo	v. **MCG+4-54-34**
MCG+4-54-34	gx	23h13m58s	+25°26.6'		Peg	24"	buona / ottimo	sarebbe anche abbastanza facile da vedere se non fosse immersa nei bagliori della SAO 91108 di 8ª grandezza situata 1' scarso a NE; a 580x appare chiaramente orientata da NW a SE (come la doppia a 1.5' SW), con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; una sorta di stellina sfuocata appena percettibile è visibile, sempre ad alti ingrandimenti, a ridosso NW: da un controllo successivamente effettuato, questa è risultata essere la MCG+4-54-33.
MCG+4-55-33	gx	23h37m54s	+25°45.3'		Peg	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, visibile tuttavia senza problemi in visione distolta; a tratti appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è meglio non scendere sotto i 450x a causa di un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti situato 1.5' a N e un'altra stellina brillante alla stessa distanza verso S.
MCG+4-56-1	gx	23h44m27s	+27°36.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+5-1-7	gx	23h58m33s	+28°50.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile; molto disturbata dalla SAO 91624 di 8a grandezza situata un paio di primi a W — 450x.
MCG+5-1-26	gx	00h01m34s	+31°26.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è un elusivo baffo esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare in visione distolta a ridosso E della coppia NGC 7805-6 e subito a S di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+5-1-37	gx	00h09m49s	+28°41.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, situata sul lato maggiore di un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti; non ne capisco la forma, ma a tratti pare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; un nucleo stellare estremamente tenue salta fuori solo a momenti spingendo a 580x.
MCG+5-1-73	gx	00h19m43s	+29°56.1'		And	16"	ottima / m. buono	è un piccolo oggetto quasi elusivo con Ø max di 20" situato subito a SW di una stellina molto debole; appare solo a 380x.
MCG+5-4-12	gx	01h16m33s	+32°53.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a 1.5' E; una debole stellina si trova alla stessa distanza verso N — 450x.
MCG+5-4-17	gx	01h19m35s	+32°10.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso SW — 450x.
MCG+5-4-50	gx	01h24m12s	+32°35.6'		Psc	28"	m. buona / buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una coppia di stelle brillanti orientate da NE a SW a N della gx — 495x.
MCG+5-4-66	gx	01h32m09s	+32°06.2'		Psc	24"	m. buona / buono	è decisamente più facile di UGC 1095, dalla quale dista 1' scarso a W, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+5-7-34	gx	02h43m11s	+32°16.0'		Tri	16"	ottima / m. buono	debolissima, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, appare in visione distolta a 270x, ma scalando a 188x sembra di vedere, seppur a tratti, una condensazione centrale molto tenue.
MCG+5-7-46	gx	02h44m25s	+32°21.0'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ~ 1' W di una stellina; occorre tuttavia cercare di tenere fuori campo la SAO 55822 di 7ª grandezza situata 5' a WSW 450x.
MCG+5-13-1	st?	05h14m16s	+32°45.3'		Aur	24"	m. buona / m. buono	assieme alle due sigle seguenti forma un terzetto di oggetti fantasma, in quanto nella posizione riportata ci sono in realtà tre stelline, due delle quali abbastanza brillanti; in corrispondenza di MCG+5-13-1 si nota effettivamente un alone molto tenue che potrebbe anche non essere imputato a un mero effetto di diffusione della stellina sovrapposta, dal momento che questa è piuttosto debole (quello che si vede attorno alle altre 2 è però dubbio); occorre tuttavia ricordare che questi oggetti si trovano all'estremità NW di un gruppo molto disperso formato da una dozzina di stelle e siglato Dolidze 6: quest'ultimo, a sua volta, è situato subito a S del vasto e noto complesso nebulare IC 405; non si può quindi escludere che gli accenni di nebulosità attorno a queste stelline siano in realtà residui della sunnominata nebulosa — 340x.
MCG+5-13-3	st?	05h14m22s	+32°48.3'		Aur	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG+5-13-1**
MCG+5-13-4	st?	05h14m27s	+32°48.0'		Aur	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG+5-13-1**
MCG+5-21-6	gx	08h46m32s	+29°36.0'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 450x.
MCG+5-22-25	gx	09h15m03s	+29°16.2'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	è relativamente facile da vedere, molto diffusa e con bassissima luminanza superficiale, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; a tratti pare leggermente più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' NE — 270x e 380x.
MCG+5-22-39	gx	09h20m02s	+26°55.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina a 1' scarso verso E; la SAO 80769 di 9ª grandezza situata 3' a E disturba un po' l'osservazione — 450x.
MCG+5-23-7	gx	22h36m03s	+32°32.3'		Peg	24"	ottima / buono	debolissimo lucore che in visione distolta non sembra più esteso di 30", situato a ridosso S di una stellina; la visione è comunque disturbata da 3 stelle brillanti fra cui la SAO 72515 di magnitudo 8.4 subito a W della gx; le altre 2 si trovano invece a S; a 340x la gx risulta invisibile — 450x.
MCG+5-23-14	gx	09h34m02s	+27°21.8'		Leo	24"	buona / buono	difficilissima, appare a fatica nel bagliore della SAO 80906 di 8ª grandezza dalla quale si trova meno 1' a NNE; solo a momenti, quando "emerge" appare orientata da E a W ed estesa 30"-40"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E — 450x.
MCG+5-23-15	gx	09h34m07s	+27°21.5'		Leo	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **MCG+5-23-16** — sono due piccole galassiette molto deboli distanti una 30-ina di secondi in direzione N-S; appaiono a 1.5' E della SAO 80906 di 8ª grandezza che ne disturba la visione; la prima delle due è più evidente, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, mentre la seconda è più difficile e poco più piccola — 450x.
MCG+5-23-16	gx	09h34m06s	+27°21.0'		Leo	24"	buona / buono	v. **MCG+5-23-15**
MCG+5-23-40	gx	09h50m11s	+28°00.8'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è un oggetto rotondo molto debole, di luminosità uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi; è situata a ~ 1' SE di una stellina brillante — 380x.
MCG+5-24-5	gx	10h07m54s	+29°27.6'		Leo	24"	buona / buono	relativamente facile, ancorché a ridosso NW di una stellina abbastanza brillante, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
MCG+5-25-23	gx	10h36m11s	+26°57.2'		Leo	16"	buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta; a tratti in visione distolta appare allungata da NE a SW, di dimensioni grosso modo 30"×15" e con nucleo puntiforme — 380x.
MCG+5-26-25	gx	10h52m18s	+30°04.3'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto piccola, rotonda, di max 25" di Ø e con marcata condensazione centrale — 380x.
MCG+5-26-27	gx	10h53m56s	+26°54.5'		LMi	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+5-26-55	gx	11h06m46s	+28°43.1'		LMi	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NE a SW, 45"×30" con condensazione centrale evidente a 380x.
MCG+5-27-20	gx	11h12m04s	+27°34.0'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole e piccola, appare facilmente in visione distolta a 1' W di NGC 3574; è poco diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MCG+5-27-33A	gx	11h15m18s	+29°31.6'		UMa	16"	buona / ottimo	è poco più evidente di CGCG 156-35 (dalla quale dista un paio di primi scarsi a E), di Ø simile, ma con nucleo stellare visibile a 380x.
MCG+5-27-44	gx	11h17m51s	+26°39.5'		Leo	24"	buona / ottimo	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+5-28-24	gx	11h43m11s	+26°34.5'		Leo	16"	buona / ottimo	poco più piccola e più debole di NGC 3830, dalla quale dista 1' N; è rotonda con Ø di 15"-20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' W; entrambe le gx sono meglio osservabili a 380x.
MCG+5-30-105	gx	12h51m22s	+27°26.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, appare a tratti a 380x, estesa per max 15"-20".
MCG+5-31-141	gx	13h08m57s	+28°16.8'		Com	16"	buona / ottimo	debolissimo lucore, piccolo e di forma indistinta, osservabile solo in vis. distolta a W di una coppia di stelline distanti poco più di 1' — 270x.
MCG+5-32-35	gx	13h30m39s	+31°17.0'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
MCG+5-33-9	gx	13h48m15s	−30°33.0'		Cen	16"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme e Ø di 20" — 270x.
MCG+5-33-37	gx	14h00m01s	+28°30.0'		CVn	16"	buona / ottimo	salta fuori molto debole a 380x, rotonda, diffusa, con Ø di ~ 30"; c'è una stellina a 1' NW.
MCG+5-33-47	gx	14h05m14s	+29°25.2'		Boo	16"	buona / ottimo	assieme a MCG+5-33-48 forma una coppia di oggetti difficilissimi; la 1ª è elusiva: appare solo a tratti a ridosso SW della successiva, estesa non più di una 20-ina di secondi, ma anche a 380x non riesco a capire com'è fatta; la 2ª è un debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo visibile a tratti a 380x ed esteso non più di 30"-35".
MCG+5-33-48	gx	14h05m16s	+29°25.5'		Boo	16"	buona / ottimo	v. MCG+5-33-47
MCG+5-33-50	gx	14h05m24s	+30°44.6'		CVn	16"	ottima / m. buono	salta fuori solo a tratti a un paio di primi scarsi SW di UGC 9012, ma è molto piccola, condensata ed estesa non più di 15" o 20" — 270x.
MCG+5-35-18	gx	14h49m28s	+27°46.9'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda, di 30" di Ø e con condensazione centrale evidente a 270x.
MCG+5-36-17	gx	15h22m15s	+27°42.0'		CrB	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+5-36-20**
MCG+5-36-18	gx	15h22m16s	+27°48.4'		CrB	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+5-36-20**
MCG+5-36-19	gx	15h22m23s	+27°44.3'		CrB	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+5-36-20**
MCG+5-36-20	gx	15h22m24s	+27°42.8'		CrB	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, diffusa, rotonda con Ø di 12"-15"; nondimeno è l'unica apprezzabile del nutrito ammasso **AGC 2065** comprendente molte altre galassiette estremamente piccole e appena percettibili; oltre a questa, le uniche 11 che sono riuscito a individuare spingendo a 580x sono MCG+5-36-17 (situata 1' scarso a SW di una stellina brillante), MCG+5-36-18, MCG+5-36-19, MCG+5-36-21 ed MCG+5-36-23 (quest'ultima appare a 1' SW di una stellina); la coppia PGC 54881 e 54883 che a prima vista tendono a fondersi in un unico oggetto allungato da N a S; PGC 54894, difficilissima, in quanto priva di punti di riferimento; MAC 1522+2734; MAC 1522+2746A (appare a tratti in visione distolta a 1' NW di una stellina brillante); infine MAC 1522+2740.
MCG+5-36-21	gx	15h22m28s	+27°41.2'		CrB	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+5-36-20**
MCG+5-36-23	gx	15h22m39s	+27°40.7'		CrB	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+5-36-20**
MCG+5-36-29	gx	15h25m33s	+26°32.8'		CrB	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+5-36-30	gx	15h25m34s	+26°33.3'		CrB	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente quasi a ridosso NE di MCG+5-36-29, ma non riesco a capirne la forma; non sembra comunque più estesa di 10"-12"; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
MCG+5-36-34	gx	15h28m02s	+29°00.0'		CrB	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, in visione distolta non sembra più estesa di 10"; c'è una stellina subito a W (situata verso il margine N dell'ammasso **AGC 2079**) — 495x.
MCG+5-38-9	gx	16h00m31s	+30°22.6'		CrB	16"	buona / ottimo	appare solo a tratti come un'elusiva stellina leggermente sfuocata a ridosso verso S di UGC 10128; meglio evidente a 380x.
MCG+5-40-2	gx	16h52m23s	+30°42.7'		Her	28"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con bulge evidente, abbastanza contrastato — 495x.
MCG+5-40-3	gx	16h52m30s	+30°43.3'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10" — 495x.
MCG+5-40-20	gx	16h59m21s	+29°56.4'		Her	16"	ottima / buono	appare solo a momenti in visione distolta come un baffo che si protende a SE di NGC 6274; è estesa una 30-ina di secondi, ma non si riesce a separare dalla galassia principale neanche a 380x.
MCG+5-40-23	gx	17h00m45s	+27°49.7'		Her	16"	m. buona / m. buono	è debolissima e tuttavia appare senza troppi problemi in visione distolta a 380x osservando la coppia di stelline situate a S e con le quali la gx è allineata.
MCG+5-40-24	gx	17h00m54s	+27°43.4'		Her	16"	m. buona / m. buono	debole, rotonda, diffusa, di luminosità uniforme con Ø poco superiore a 30"; è meglio contrastata a 270x.
MCG+5-40-27	gx	17h01m25s	+27°44.4'		Her	16"	m. buona / m. buono	anche questa è debolissima e molto piccola, con Ø max di 20"; appare a tratti in visione distolta a 380x, ma è poco più evidente 270x.
MCG+5-42-7	gx	17h52m40s	+29°48.3'		Her	16"	m. buona / buono	piccolo oggetto rotondo relativamente compatto con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 40" verso S — 270x.
MCG+5-54-8	gx	22h54m20s	+32°29.1'		Peg	16"	buona / buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø non superiore a 30"; si vede senza problemi in visione distolta a 380x; a 1' verso S c'è una stellina di egual magnitudo.
MCG+5-54-11	gx	22h54m38s	+32°24.5'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto piccola e debole, diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø max di 15"; è situata a ridosso NE di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MCG+5-54-12	gx	22h54m45s	+32°12.8'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole e diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MCG+5-54-13	gx	22h54m40s	+32°18.5'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un tenue nucleo stellare — 450x.
MCG+5-54-54	gx	23h16m04s	+28°41.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+5-55-7	gx	23h22m58s	+29°14.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, a 380x appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e leggermente più brillante verso l'interno.
MCG+5-55-18	gx	23h26m45s	+32°16.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+5-55-19	gx	23h27m05s	+32°17.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	situata 4' a E della precedente è molto debole, poco diffusa e condensata, anch'essa rotonda con Ø analogo; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
MCG+5-55-41	gx	23h37m16s	+31°48.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; è purtroppo disturbata da una stellina brillante situata quasi a ridosso NE che la offuscarla — 450x.
MCG+5-55-51	gx	23h43m58s	+29°06.9'		Peg	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di aspetto più uniforme di CGCG 497-52 — dalla quale dista 1' verso S — allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a NW — 495x.
MCG+5-55-52	gx	23h44m05s	+29°07.3'		Peg	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MCG+5-56-3	gx	23h46m43s	+28°01.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con condensazione centrale appena più contrastata del disco; c'è una debole stellina a ridosso W — 450x.
MCG+5-56-17	gx	23h52m26s	+33°25.2'		And	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina a 1' SE — 495x.
MCG+6-1-4	gx	00h01m09s	+34°40.0'		And	24"	m. buona / m. buono	debole diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø 30"-35"; forma una coppia con UGC 12904 situata 2.5' a NE (v. voce corrispondente) — 450x.
MCG+6-1-18	gx	00h13m43s	+36°37.1'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; la SAO 53733 di 9ª grandezza si trova 3' a W — 495x.
MCG+6-1-24	gx	00h18m19s	+38°13.8'		And	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; un piccolo oggetto appare facilmente in visione distolta a ridosso SE, ma questo è risultato essere la **2MASS 00182148+3813287** — 450x.
MCG+6-1-26	gx	00h21m05s	+34°30.9'		And	16"	ottima / ottimo	nella posizione indicata si vede solo una stellina; non ho notato traccia di alone neppure a 380x.
MCG+6-1-29	gx	00h21m31s	+38°04.6'		And	24"	buona / discreto	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una coppia serrata di deboli stelline a 1' NW (situata 1' SSW di CGCG 518-25) — 450x.
MCG+6-2-3	gx	00h24m36s	+38°08.0'		And	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di 30"-35" e di luminosità uniforme; ci sono 2 stelline di eguale luminosità a 1' E e a 1' verso S — 450x.
MCG+6-2-4	gx	00h26m51s	+36°57.1'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MCG+6-2-5	gx	00h27m05s	+36°57.0'		And	24"	m. buona / ottimo	(situata 3' scarsi a E della precedente) debole, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale — 450x.

MCG+6-3-13	gx	01h07m47s	+33°48.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia serrata con componenti molto deboli a 1' SW; una stellina brillante si trova invece alla stessa distanza verso SE — 450x.
MCG+6-3-17	gx	01h08m58s	+37°29.0'		And	24"	m. buona / m. buono	chiazza rotondeggiante molto debole e di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi; si fatica un po' a vederla a 340x (meglio quindi restare a 450x).
MCG+6-4-15	gx	01h24m18s	+34°33.0'		And	16"	ottima / ottimo	è una sorta di debolissimo alone asimmetrico che aggetta leggermente verso N da una stellina; quest'ultima è la più brillante di un piccolo asterismo di 4 componenti foggiato a "y"; non è comunque più estesa di 15"-20" — 380x.
MCG+6-4-23	gx	01h26m37s	+36°26.8'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; quasi allineata ed equidistante con due stelle brillanti a S; una stellina debole si trova a 1' scarso NNW; forma una coppia serrata con MCG+6-4-24 situata a ridosso S che però non ho visto — 450x.
MCG+6-5-18	gx	01h51m19s	+34°52.4'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale abbastanza contrastata — 450x.
MCG+6-5-21	gx	01h51m46s	+36°08.0'		And	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline subito a W (fa parte dell'ammasso **AGC 262**) — 495x.
MCG+6-5-46	gx	01h55m01s	+36°24.5'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG+6-5-80	gx	02h04m46s	+35°59.6'		And	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 495x.
MCG+6-5-82	gx	02h04m54s	+35°07.7'		Tri	24"	m. buona / buono	chiazza molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, grosso modo circolare con Ø < 30" — 450x.
MCG+6-5-88A	gx	02h09m42s	+35°47.6'		Tri	28"	ottima / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 12"-15"; situata a ridosso E di **UGC 1651** — 495x.
MCG+6-5-97	gx	02h10m48s	+34°58.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, in visione distolta, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso E — 495x.
MCG+6-6-12	gx	02h18m18s	+37°27.8'		And	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
MCG+6-6-18	gx	02h19m37s	+37°16.1'		Tri	24"	m. buona / buono	presenta un nucleo stellare evidente circonfuso da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo; c'è una stellina subito a S e una appena percettibile alla stessa distanza verso W — 450x.
MCG+6-6-19	gx	02h19m23s	+36°39.5'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme; in visione distolta sembra rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; stranamente meglio evidente a 450x; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' NNE.
MCG+6-6-20	gx	02h19m40s	+37°05.4'		Tri	24"	m. buona / buono	è una sorta di alone oblungo quasi impercettibile attorno a una stellina (che tuttavia potrebbe anche essere il nucleo della gx) — 450x.
MCG+6-6-27	gx	02h24m55s	+35°17.5'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SSW — 495x.
MCG+6-6-77	gx	02h42m35s	+36°32.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina 1.5' a NW e una più evidente a un paio di primi verso S — 495x.
MCG+6-7-7	gx	02h46m53s	+39°36.7'		Per	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **UGC 2244** situata a ridosso S — debole, diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale appena percettibile — 495x.
MCG+6-7-24	gx	02h59m01s	+33°54.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10". Forma una coppia ravvicinata con **UGC 2448** situata subito a E — 495x.
MCG+6-8-30	gx	03h32m56s	+36°15.2'		Per	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto esteso una 20-ina di secondi e osservabile solo a tratti in visione distolta a 270x.
MCG+6-15-1	gx	06h28m13s	+35°28.0'		Aur	24"	m. buona / mediocre	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella luminosa a 1' scarso NNE; una coppia di stelline brillanti, con le quali è allineata la gx, si trova a 1.5' SSE — 450x.
MCG+6-16-11	gx	07h03m22s	+33°46.7'		Gem	24"	m. buona / mediocre	è debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x (a 340x non l'ho vista); appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" (al momento dell'osservazione era quasi allo zenit).
MCG+6-16-12	gx	07h23m26s	+33°46.7'		Gem	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+6-16-16	gx	07h04m34s	+37°30.8'		Aur	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, purtroppo assai disturbata dalla SAO 59741 di 6.6m situata a soli 4.5 NW e che quindi non si può tenere fuori campo; approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
MCG+6-20-26	gx	09h07m15s	+37°30.3'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 40"; presenta un tenue nucleo quasi stellare visibile a tratti — 380x.
MCG+6-20-36	gx	09h09m20s	+33°07.3'	q 103	Lyn	16"	buona / m. buono	debolissima, appare a tratti leggermente allungata da E a W a circa 3' di distanza verso W dalla cospicua NGC 2770 (e in effetti è riportata sull'Uranometria come **NGC 2770B**) — 380x.
MCG+6-21-24	gx	09h20m46s	+33°42.3'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo e relativamente compatto, con Ø di 20"-25"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x quando si osserva quella stellina situata a un paio di primi a NW.
MCG+6-21-72	gx	09h39m26s	+32°21.9'		Leo	16"	ottima / m. buono	è una gx abbastanza facile da vedere, piccola, compatta, rotonda, con Ø max di 30", situata a ridosso verso E di una stellina brillante — 270x.
MCG+6-22-58	gx	10h02m37s	+32°42.4'		LMi	16"	buona / m. buono	debole, approssim. circolare con Ø max di 40", diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale — 380x.
MCG+6-24-40	gx	10h57m53s	+37°30.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	è ancora più debole di MCG+6-24-41, osservata per prima e dalla quale dista 1.5' verso S; a tratti in visione distolta appare orientata ~ da E a W con dimensioni 30"×15", ma bisogna spingere a 380x (a 270x è di aspetto indistinto).
MCG+6-24-41	gx	10h57m54s	+34°32.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, molto diffuso e di luminosità uniforme, con Ø di 30" — 380x.
MCG+6-25-5	gx	11h06m58s	+35°33.1'		UMa	16"	buona / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di 45", ma sono riuscito a scorgerla solo scalando a 188x.
MCG+6-25-27	gx	11h14m52s	+35°29.3'		UMa	16"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x quando si osserva UGC 6273.
MCG+6-25-46	gx	11h20m22s	+35°04.2'		UMa	16"	buona / ottimo	debolissima, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare; appare abbastanza facilmente in visione distolta, meglio a 380x.
MCG+6-26-18	gx	11h41m18s	+35°43.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35", ma è meglio scalare a 270x.
MCG+6-27-2	gx	12h05m40s	+36°44.9'		UMa	24"	ottima / buono	è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 30"×15"; situata in una piccola zona depleta, per cui è meglio scalare a 340x.
MCG+6-29-39	gx	13h07m21s	+35°47.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debolissima, visibile con gran difficoltà a 270x (a 380x si stempera troppo); forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è praticamente allineata ed equidistante con 2 stelline a ENE: quella più lontana è più brillante.
MCG+6-29-63	gx	13h13m43s	+33°58.8'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 270x, forse rotonda con Ø > 30".
MCG+6-29-72	gx	13h06m16s	+35°45.7'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è un ovale molto debole, di luminosità uniforme, orientato da N a S, con dimensioni ~ 40"×20" e relativamente compatto; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
MCG+6-29-77	gx	13h20m16s	+33°08.6'		CVn	16"	m. buona / ottimo	assieme MCG+6-29-78 forma una coppia di galassiette rotonde di ~ 30" di Ø e distanti 1' in direzione E-W; entrambe hanno una nucleo stellare, ma quella della 2ª è poco più marcata — 380x.
MCG+6-29-78	gx	13h20m18s	+33°08.7'		CVn	16"	m. buona / ottimo	v. **MCG+6-29-77**
MCG+6-30-13	gx	13h28m05s	+34°18.7'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, forse rotonda con Ø di 30" e diffusa; si trova a metà strada tra UGC 8461 e una stellina situata a ~ 1' a S — 380x.
MCG+6-30-19	gx	13h29m44s	+33°20.3'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 30"; è disturbata dalla SAO 63750 a 5' SE — 380x.
MCG+6-30-20	gx	13h29m46s	+33°21.1'		CVn	16"	m. buona / ottimo	situata a 1' NNE di MCG+6-30-19, presenta un nucleo stellare circonfuso da un tenue alone molto piccolo e allungato da E a W con dimensioni 30"×15" — 380x.
MCG+6-30-25	gx	13h30m49s	+34°38.4'		CVn	16"	buona / ottimo	poco più debole e piccola della successiva MCG+6-30-26, ma anche in questo caso sembra di vedere, a tratti, una piccola condensazione centrale — 380x.
MCG+6-30-26	gx	13h31m05s	+34°41.1'		CVn	16"	buona / ottimo	debole, rotonda, con Ø di ~ 30", di luminosità pressoché uniforme, salvo una tenue e piccola condensazione centrale che appare a tratti in visione distolta — 380x.
MCG+6-30-45	gx	13h34m51s	+34°03.3'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto piccola, appare e solo elusivamente in visione distolta a 380x quando si osserva UGC 8561 situata a poco più di 1' SE.
MCG+6-30-57	gx	13h36m00s	+34°49.1'		CVn	16"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; è situata 1' scarso a SW di una stellina brillante; a 380x, appare a tratti qualcosa di puntiforme ma non riesco a capire se trattasi nel nucleo o di una debolissima stellina sovrapposta.
MCG+6-30-71	gx	13h41m20s	+36°56.1'		CVn	16"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, appare abbastanza facilmente a 270x, rotonda con Ø di ~ 30".
MCG+6-30-84	gx	13h47m11s	+34°05.3'		CVn	16"	buona / buono	debolissimo lucore diffuso, esteso una 30-ina di secondi; si nota anche in visione diretta, ma bisogna spingere a 380x.
MCG+6-30-91	gx	13h49m35s	+35°15.1'		CVn	16"	buona / buono	debolissimo oggetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø e di luminosità uniforme; appare in visione distolta a 380x.
MCG+6-30-97	gx	13h50m34s	+33°44.1'		CVn	16"	m. buona / buono	molto debole e piccola, ma si vede anche in visione diretta; è di forma indistinta, ma non è comunque più estesa di 20" — 380x.
MCG+6-31-18	gx	13h54m04s	+37°25.0'		CVn	16"	m. buona / buono	molto piccola, rotonda, Ø 20" e con nucleo stellare; è più debole di CGCG 191-14 osservata precedentemente e dalla quale dista un paio di primi verso N — 380x.
MCG+6-31-38	gx	13h59m11s	+34°04.3'		CVn	16"	m. buona / buono	è un elusivo oggetto rotondo esteso max 25"-30" che appare ogni tanto a 270x, ma è molto difficile (non sono riuscito a vederlo a 380x).
MCG+6-31-49	gx	14h02m20s	+32°26.9'		CVn	16"	m. buona / buono	gx debole, ma facilmente visibile, compatta, allungata da NW a SE per una 30-ina di secondi; presenta una debole condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
MCG+6-31-84	gx	14h15m16s	+34°20.9'		Boo	16"	buona / ottimo	è una debolissima macchia molto diffusa e di forma indistinta, estesa max 30" o 40", situata a ridosso NW di una stellina (che a sua volta forma una coppia con un'altra più brillante a 30" SE) — 270x.
MCG+6-31-92	gx	14h17m12s	+35°24.6'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto piccola, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; a 380x sembra di vedere, a tratti, una nucleo stellare.
MCG+6-32-12	gx	14h22m45s	+38°00.7'		Boo	16"	ottima / m. buono	è un debolissimo oggetto molto piccola, esteso 15"-20"; appare in visione distolta a 380x quando si osserva UGC 9213 dalla quale dista 1' verso NNW.
MCG+6-32-24	gx	14h24m12s	+35°08.7'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda, diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 30" — 380x.
MCG+6-32-25	gx	14h24m18s	+35°14.5'		Boo	16"	ottima / m. buono	piccolo oggetto rotondo, diffuso e condensato con Ø di 20" — 380x.
MCG+6-32-47	gx	14h29m50s	+35°34.2'		Boo	16"	buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **UGC 9315**, ma è decisamente più debole, di luminosità uniforme e orientata da N a S (situate 7' a NNE di NGC 5646) — 270x.
MCG+6-32-55	gx	14h31m13s	+35°19.9'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissima, molto piccola, rotonda, di 20"-25" di Ø e con condensazione centrale di aspetto stellare; meglio evidente a 380x.
MCG+6-32-66	gx	14h33m30s	+34°33.7'		Boo	16"	ottima / m. buono	è una debolissima macchiolina rotonda di luminosità uniforme e Ø max di 30"; c'è una debole stellina a 1' SE; forse è un po' meglio contrastata a 270x.
MCG+6-32-69	gx	14h33m42s	+34°59.1'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissima, rotonda di luminosità uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; salta fuori senza troppa difficoltà in visione distolta, ma bisogna scalare a 270x.
MCG+6-32-70	gx	14h35m18s	+35°07.1'		Boo	16"	buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø < 40", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un debole nucleo stellare visibile a 380x; c'è una stellina debolissima quasi a ridosso verso NW e un'altra più brillante un paio di primi a N.
MCG+6-34-13	gx	15h31m39s	+35°16.8'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di deboli stelline a un paio di primi SW — 495x.
MCG+6-35-44	gx	16h11m12s	+35°56.3'		CrB	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa con condensazione centrale visibile a tratti, forse rotonda e di Ø simile a UGC 10255 (dalla quale dista 4' SE); il campo è ricco di stelle brillanti — 380x.
MCG+6-36-24	gx	16h19m22s	+37°04.1'		CrB	16"	buona / ottimo	molto piccola, non più estesa di 20"; appare a tratti in visione distolta a circa metà strada tra NGC 6117, dalla quale dista un paio di primi a SSE, e una stellina brillante situata a 3' SSE — 270x.
MCG+6-39-9	gx	17h40m32s	+35°38.7'		Her	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **MCG+6-39-10** situata a ridosso NE — molto debole diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+6-39-10	gx	17h40m34s	+35°39.2'		Her	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **MCG+6-39-9** situata a ridosso SW — è simile a prima vista alla precedente ma con Ø inferiore, di ~ 30" — 450x.
MCG+6-39-29	gx	17h58m54s	+36°58.8'		Her	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la SAO 66534 di 9ª grandezza si trova 1.5' a W — 450x.
MCG+6-47-6	gx	21h46m31s	+38°28.8'		Cyg	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo qualche tenue irregolarità di luce all'interno visibile solo a momenti, approssim. rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina subito a E — 450x.
MCG+6-48-2	gx	21h58m32s	+36°51.7'		Peg	24"	ottima / molto buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 30" e un'evidente condensazione centrale — 450x.
MCG+6-48-13	gx	22h11m13s	+38°53.3'		Lac	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x a ridosso verso N di una stellina.
MCG+6-49-27	gx	22h30m41s	+39°17.5'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; sembra di aspetto a prima vista simile a UGC 12064 situata 8.8' a NE; 3 stelle brillanti di 9a e 10a grandezza orientate da NE a SW si trovano a N della gx — 450x.
MCG+6-49-31	gx	22h32m39s	+37°13.3'		Lac	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30"; poco meglio definita scalando a 340x.
MCG+6-49-56	gx	22h38m25s	+35°22.0'		Peg	24"	ottima / molto buono	facile e relativamente brillante, diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge evidente e contrastato; un debolissimo nodulo di 10"-12" si "stacca" a momenti verso N, ma si tratta in realtà di **MAC 2238+3522B** — 450x.
MCG+6-49-60	gx	22h38m35s	+35°20.5'		Peg	24"	ottima / molto buono	piccolo oggetto rotondo molto debole e condensato, con Ø di 25"-30", situato tra 2 deboli stelline: una a ridosso verso N e l'altra a SE — 450x.
MCG+6-49-62	gx	22h38m38s	+35°19.5'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MCG+6-50-11	gx	22h55m44s	+39°16.9'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' E e una stella brillante a 2.5' verso W; meglio visibile a 450x.
MCG+7-2-2	gx	00h25m55s	+40°57.1'		And	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, rotonda con Ø di una decina di secondi, situata tra 2 stelline distanti 1' in direzione NE-SW (più vicina a quella di NE) — 450x.
MCG+7-2-3	gx	00h26m00s	+40°58.4'		And	24"	m. buona / ottimo	situata 1.5' a NE della precedente appare elusivamente in visione distolta, anche questa molto piccola ed estesa non più di 10" — 450x.
MCG+7-3-14	gx	01h01m43s	+44°04.0'		And	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e con condensazione centrale visibile solo a momenti, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
MCG+7-3-16	gx	01h04m41s	+41°40.2'		And	24"	buona / discreto	debolissima chiazza di dimensioni grosso modo 30"×20" che in visione distolta pare aggettare a S di una stellina; poco meglio definita restando a 450x.
MCG+7-3-31	gx	01h21m09s	+40°28.2'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG+7-5-6	gx	01h02m58s	+44°51.6'		And	28"	m. buona / buono	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a SW (fa parte di un piccolo gruppo di gx già osservato col 24" in altra data: questa era rimasta di fuori) — 495x.
MCG+7-5-8	gx	02h01m56s	+44°55.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; situata in mezzo a una coppia di stelline appena percettibili orientate da E a W — 450x.
MCG+7-5-36	gx	02h19m09s	+43°17.2'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso W — 495x.
MCG+7-5-41	gx	02h21m12s	+42°51.8'		And	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso N e una più debole al bordo W — 495x.
MCG+7-5-42	gx	02h21m23s	+42°52.6'		And	28"	m. buona / buono	poco più debole della precedente — situata un paio di primi a WSW — molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15": situata tra due stelline orientate da NE a SW: brillante quella a SW e più debole quella a NE — 495x.
MCG+7-6-18	gx	02h26m23s	+42°51.6'		And	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione stellare molto tenue; c'è una stellina molto debole subito a E — 495x.
MCG+7-6-20	gx	02h26m46s	+41°50.1'		And	16"	m. buona / discreto	debole, approssim. circolare, con Ø di 1' scarso e di luminosità uniforme — 270x.
MCG+7-6-36	gx	02h34m22s	+40°32.5'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a ridosso NE; un'altra appena percettibile si trova subito a SW — 495x.
MCG+7-6-57	gx	02h43m02s	+40°28.3'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+7-6-69	gx	02h51m38s	+40°44.5'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; forma una coppia ravvicinata con UGC 2334 situata a ridosso SW — 450x.
MCG+7-7-3	gx	02h54m25s	+41°34.6'		Per	28"	m. buona / m. buono	è una sorta di nodulo vistoso esteso una 15-ina di secondi, con una stellina appena percettibile a SW, situato a ridosso W del bulge di **NGC 1129** — 495x.
MCG+7-7-5	gx	02h54m28s	+41°30.8'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e molto debole, appare in visione distolta a ridosso SW di una stellina, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MCG+7-7-7	gx	02h54m39s	+42°09.6'		Per	24"	m. buona / buono	sarebbe di per sé una gx relativamente facile se non fosse disturbata da una stella brillante situata ad appena 1' S (un'altra stellina si trova alla stessa distanza verso N), molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG+7-7-9	gx	02h55m02s	+41°36.4'		Per	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata da una stella brillante di 9ª grandezza quasi a ridosso NE — 495x.
MCG+7-7-64	gx	03h21m20s	+41°55.7'		Per	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con **IC 316** situata a ridosso N — è un piccolo baffo di luce molto tenue, orientato da NW a SE, esteso non più di 20" e con un nucleo stellare (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 495x.
MCG+7-7-70	gx	03h20m22s	+41°38.5'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NW e una più debole alla stessa distanza verso NE — 495x.
MCG+7-7-71	gx	03h20m25s	+42°32.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, presenta un piccolo bulge abbastanza brillante circonfuso da un alone molto stemperato sul fondo cielo; in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina a ridosso NE — 495x.
MCG+7-8-16	gx	03h29m35s	+40°52.1'		Per	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **UGC 2756** situata a ridosso verso N — molto debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30 e una condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
MCG+7-13-6	gx	06h07m58s	+39°16.0'		Aur	28"	buona / mediocre	debolissima chiazza che in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; solo a momenti s'intravvede il nucleo stellare; c'è una debole stellina subito a NE, mentre una coppia di stelline appena percettibili si trova a NW — 495x.
MCG+7-14-5	gx	06h33m40s	+40°40.0'		Aur	28"	buona / mediocre	è un elusivo baffo di luce esteso sì e no una 30-ina di secondi, orientato da NW a SE e che salta fuori in visione distolta quando si osserva UGC 3487 situata 1' più a N — 495x.
MCG+7-17-2	gx	07h55m44s	+41°12.2'		Lyn	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e debolmente condensata, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×30" — 495x.
MCG+7-18-3	gx	08h27m39s	+40°43.3'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debolissima chiazza molto diffusa e solo a tratti condensata, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un minuscolo triangolo isoscele di deboli stelline a NW — 291x.
MCG+7-18-9	gx	08h29m22s	+43°21.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole e poco diffusa, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×10" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 495x.
MCG+7-18-12	gx	08h30m59s	+39°50.4'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme alle 2 successive, di una tripletta arcuata in direzione NW-SE — molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 360x.
MCG+7-18-13	gx	08h31m04s	+39°49.3'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 360x.
MCG+7-18-14	gx	08h30m53s	+39°50.8'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	sembra a prima vista la meno difficile delle 3, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con condensazione stellare — 450x.
MCG+7-18-18	gx	08h32m29s	+44°11.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e condensazione centrale molto tenue; c'è una debole stellina a ridosso SW — 495x.
MCG+7-18-21	gx	08h33m37s	+42°08.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 495x.
MCG+7-18-35	gx	08h40m55s	+42°28.7'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a SW; un piccolo triangolo isoscele rettangolo di stelline abbastanza brillanti si trova a E; la gx è poco disturbata dalla SAO 42487 di 9ª grandezza situata 3' a S e che si fatica a tenere fuori campo — 495x.
MCG+7-18-36	gx	08h41m41s	+40°39.4'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva — le due galassiette, entrambe rotonde e poco diffuse, si separano facilmente a 360x: la 1a ha un Ø di 30" e presenta un tenue nucleo stellare; la 2a, situata a ridosso S, è più piccola, con Ø di una 20-ina di secondi e più uniforme.
MCG+7-18-37	gx	08h41m41s	+40°39.0'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	v. **MCG+7-18-36**
MCG+7-19-13	gx	09h02m52s	+40°19.5'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 360x.
MCG+7-19-15	gx	09h03m20s	+40°27.9'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina a 1' N e un'altra di luminosità simile alla stessa distanza verso W — 360x.
MCG+7-19-18	gx	09h04m27s	+41°29.2'		Lyn	28"	m. buona / buono	appare soltanto come una stellina, ma è probabile che in realtà ne abbia visto soltanto il nucleo — 495x.
MCG+7-19-28	gx	09h07m00s	+41°29.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 495x.
MCG+7-19-29	gx	09h07m03s	+40°39.2'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debolissima chiazza di forma indistinta, estesa sì e no 30"; c'è una stellina molto debole a 1' NW — 291x.
MCG+7-19-33	gx	09h07m21s	+40°27.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NW — 495x.
MCG+7-20-14	gx	09h29m33s	+39°21.5'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; c'è una coppia di stelline a un paio di primi verso NW — 495x.
MCG+7-20-19	gx	09h32m37s	+41°46.3'		UMa	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta come una macchiolina rotonda di luminosità uniforme, diffusa con Ø di ~ 30" — 270x.
MCG+7-20-22	gx	09h37m01s	+41°22.4'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione centrale appena percettibile; forma un trio relativamente compatto col le due seguenti — 495x.
MCG+7-20-23	gx	09h37m03s	+41°22.4'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debolissima, aggetta per 20"-25" a E della precedente — 495x.
MCG+7-20-24	gx	09h37m09s	+41°22.6'		Lyn	28"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20" — 495x.
MCG+7-20-38	gx	09h43m52s	+42°39.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccolo baffo di luce molto tenue esteso una 20-ina di secondi e situato a ridosso W di una stellina — 495x.
MCG+7-20-41	gx	09h43m59s	+42°38.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa < 20", allineata ma non equidistante con 2 stelline a SE (fanno parte di un piccolo triangolo quasi rettangolo la cui 3ª componente, che è anche la più brillante, si trova più a N) — 495x.
MCG+7-20-43	gx	09h44m07s	+42°25.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata 1.5' a E di CGCG 210-30 — 495x.
MCG+7-20-44	gx	09h44m40s	+39°23.1'		LMi	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' NE — 495x.
MCG+7-20-66	gx	09h50m33s	+44°18.8'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è situata a 4' a ENE della 3009, ma pur essendo del tutto simile per luminosità, dimensioni e gradiente non è riportata sull'Uranometria; è soltanto un poco più piccola, con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
MCG+7-20-69	gx	09h50m57s	+43°41.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1.5' verso W — 495x.
MCG+7-21-13	gx	10h10m17s	+43°04.2'		UMa	28"	m. buona / buono	piccola, relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina percettibile solo a momenti quasi a ridosso SE — 495x.
MCG+7-21-14	gx	10h10m22s	+39°46.8'		LMi	28"	m. buona / buono	è un debolissimo baffo di luce esteso < 30" e che in visione distolta appare orientato da E a W — 495x.
MCG+7-21-19	gx	10h13m48s	+38°40.5'		LMi	16"	buona / m. buono	debolissima, visibile solo a momenti a poco più di 1' NE di NGC 3159; è molto piccola, orientata da E a W con dimensioni 30"×20". Fa parte del gruppo di NGC 3158 — 270x.
MCG+7-21-31	gx	10h14m59s	+40°51.7'		LMi	28"	m. buona / buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; è disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza a ridosso NW — 495x.
MCG+7-21-46	gx	10h21m56s	+41°42.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia serrata di stelline brillanti a 1.5' verso S — 495x.
MCG+7-22-17	gx	10h31m26s	+42°57.6'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20" o poco più — 495x.
MCG+7-22-18	gx	10h31m51s	+42°51.8'		UMa	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è un piccolo triangolo isoscele di stelline a un paio di primi verso W — 495x.
MCG+7-22-20	gx	10h32m16s	+43°00.4'		UMa	28"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1.5' SW, mentre 2' a SE c'è una coppia di stelline orientate da NE a SW — 495x.
MCG+7-22-23	gx	10h33m00s	+42°55.7'		UMa	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e appena più all'interno, rotonda con Ø < 40" — 495x.
MCG+7-22-29	gx	10h35m22s	+40°52.6'		UMa	28"	m. buona / buono	piccola e debolissima chiazza di forma indistinta, non più estesa di 20"-25" e molto disturbata dalla SAO 43392 di 8ª grandezza che brilla ad appena 1.5' verso W — 495x.
MCG+7-22-32	gx	10h37m07s	+39°46.6'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW (fa parte di una losanga irregolare con 4 componenti orientata da E a W) — 495x.
MCG+7-22-37	gx	10h39m25s	+39°04.9'		LMi	28"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con la successiva situata a ridosso W — sono due piccole galassiette rotonde con Ø di una 20-ina di secondi, diffuse e di aspetto simile; la prima presenta un nucleo stellare più evidente — 495x.
MCG+7-22-38	gx	10h39m23s	+39°04.8'		LMi	28"	ottima / ottimo	v. **MCG+7-22-37**
MCG+7-22-40	gx	10h40m06s	+39°06.5'		LMi	28"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20". Una stellina molto debole e leggermente sfuocata situata a ridosso S è risultata essere la **2MASS 10400680+3905572** — 495x.
MCG+7-22-42	gx	10h40m39s	+39°03.9'		LMi	28"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NE a SW, con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme; forma una coppia con la successiva situata 1' a NE — 495x.
MCG+7-22-43	gx	10h40m44s	+39°04.5'		LMi	28"	ottima / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline molto deboli subito a NE — 495x.
MCG+7-22-52	gx	10h44m33s	+39°09.4'		LMi	28"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole, orientata da E a W ed estesa 45" — 495x.
MCG+7-22-57	gx	10h45m25s	+39°10.5'		LMi	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e con tenue condensazione centrale; forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso S — 495x.
MCG+7-22-58	gx	10h45m25s	+39°09.8'		LMi	28"	ottima / ottimo	poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 40"×15" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente (forma una coppia ravvicinata con la precedente situata a ridosso N); c'è un trio di stelline abbastanza brillanti a 2' W della coppia — 495x.
MCG+7-22-59	gx	10h45m49s	+43°54.2'		UMa	24"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta al vertice orientale di un piccolo triangolo equilatero formato con 2 stelline brillanti; non più estesa di 20"; è meglio non scendere sotto i 450x.
MCG+7-22-62	gx	10h47m38s	+38°55.5'		LMi	16"	buona / m. buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta come una stellina leggermente sfuocata a ridosso verso SW di UGC 5893 — 270x.
MCG+7-23-41	gx	11h21m45s	+38°27.2'		LMi	16"	m. buona / buono	debolissima, appare solo a tratti, molto piccola con dimensioni di 20" o 30"; a 188x sembra poco più di una stellina sfuocata (purtroppo era più bassa di 30° sull'orizzonte) — 270x.
MCG+7-24-14	gx	11h29m25s	+41°52.2'		UMa	20"	buona / buono	forma una coppia serrata con MAC 1129+4152 a ridosso E, ma le due galassiette non sono separabili; di fatto appare un unico oggetto diffuso orientato da E a W, di dimensioni 30"×20" e con un rinforzo di luce appena percettibile verso SE (ossia in corrispondenza della gx principale); la coppia è situata tra 2 stelline molto deboli distanti 2.5' in direzione E-W — 360x.
MCG+7-25-38	gx	12h09m49s	+43°14.1'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa di forma approssim. circolare con Ø di 30"-40"; appare in visione distolta a 1' scarso E di una debole stellina — 495x.
MCG+7-26-2	gx	12h21m57s	+42°18.8'		CVn	16"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø di 20" visibile abbastanza facilmente in visione distolta — 270x.
MCG+7-26-11	gx	12h28m52s	+42°10.7'		CVn	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, osservabile in visione distolta, ma ho dovuto scalare a 188x.
MCG+7-26-23	gx	12h33m51s	+39°31.1'		CVn	28"	m. buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 495x.
MCG+7-26-24	gx	12h33m53s	+39°37.6'		CVn	28"	m. buona / buono	appare elusivamente e solo a momenti, ma non riesco a capirne la forma, anche perché si trova in una piccola zona depleta (l'unico riferimento è una stellina di 15-esima situata un paio di primi a N); non dovrebbe comunque essere più estesa di 20"-30" — 495x (scalando gli ingrandimenti la visione peggiora).
MCG+7-26-28	gx	12h34m46s	+39°35.3'		CVn	28"	m. buona / scarso	piccola, debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra una debole stellina 2' a N e una brillante più o meno alla stessa distanza verso S — 495x.
MCG+7-26-32	gx	12h37m16s	+39°29.0'		CVn	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, piccola e poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale osservabile a 380x.
MCG+7-27-22	gx	13h02m49s	+43°12.9'		CVn	16"	m. buona / buono	è un debolissimo lucore esteso una 30-ina di secondi, molto diffuso situato a ridosso, verso W, di una coppia di stelline molto deboli distanti sì e no 20" — 270x.
MCG+7-27-26	gx	13h04m58s	+43°33.2'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di 20"-25" e di luminosità uniforme — 270x.
MCG+7-27-28	gx	13h05m02s	+43°33.2'		CVn	16"	ottima / ottimo	più piccola e compatta di MCG+7-27-26, dalla quale dista sì e no 1' a E, orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; in visione distolta salta fuori prima della precedente — 380x.
MCG+7-27-29	gx	13h05m11s	+40°03.0'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa, con Ø di 30" o poco più e nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stellina a ridosso verso SW.
MCG+7-27-31	gx	13h06m37s	+42°02.9'		CVn	16"	ottima / ottimo	è un elusiva macchiolina rotonda di max 20" di Ø che appare solo a tratti in visione distolta; occorre tuttavia scalare a 270x, nonostante la stellina brillante situata a 1' SE.
MCG+7-27-35	gx	13h09m35s	+41°55.2'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 380x.
MCG+7-27-37	gx	13h10m42s	+42°17.1'		CVn	16"	ottima / buono	molto debole, osservabile in visione distolta, di forma indistinta, con una piccola ed evidente condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
MCG+7-27-39	gx	13h11m09s	+39°13.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	è li membro più evidente dell'ammasso AGC 1691 — debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' S e una appena percettibile a 1.5' verso E, ma quest'ultima è in realtà la MAC 1311+3943 — 450x.
MCG+7-27-41	gx	13h11m41s	+44°10.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' NNE e un'altra di luminosità simile a un paio di primi verso N — 450x.
MCG+7-27-42	gx	13h12m06s	+39°09.4'		UMa	24"	m. buona / m. buono	è situata verso il margine orientale del difficile ammasso **AGC 1691** — debolissima, in visione distolta appare a tratti grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso W — 450x.
MCG+7-27-47	gx	13h13m50s	+38°53.7'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 40" — 380x.
MCG+7-27-49	gx	13h14m07s	+38°16.9'		CVn	16"	m. buona / ottimo	poco più evidente ed estesa di MCG+7-27-47, ma di aspetto più irregolare, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1' e appena più brillante all'interno — 380x.
MCG+7-28-18	gx	13h29m07s	+41°17.1'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a E (questa stellina è erroneamente riportata sul Megastar come MCG+7-28-19) — 495x.
MCG+7-28-24	gx	13h30m37s	+41°10.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a 1.5' NW — 450x.
MCG+7-28-25	gx	13h31m51s	+44°09.1'		CVn	16"	buona / discreto	molto debole, diffusa e con condensazione centrale quasi stellare molto tenue, approssim. rotonda con Ø < 40" (a poco più di 1' SE c'è CGCG 218-19) — 380x.
MCG+7-28-27	gx	13h32m08s	+40°30.0'		CVn	28"	m. buona / m. buono	molto debole e poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" (o poco meno); c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 495x.
MCG+7-28-29	gx	13h32m47s	+41°51.9'		CVn	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di baffo molto debole che aggetta a SW per una 30-ina di secondi da NGC 5214 — 450x.
MCG+7-28-39	gx	13h37m27s	+38°36.9'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina si secondi e appena condensata — 380x.
MCG+7-28-42	gx	13h38m42s	+43°53.7'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+7-28-44	gx	13h39m05s	+43°47.0'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
MCG+7-28-47	gx	13h40m03s	+40°25.3'		CVn	16"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 380x.
MCG+7-28-57	gx	13h43m40s	+41°41.7'		CVn	16"	buona / buono	debolissima, appena osservabile in visione distolta; dovrebbe essere estesa ~ 30" — 270x.
MCG+7-28-60	gx	13h45m20s	+41°23.3'		CVn	16"	ottima / ottimo	è un lucore molto debole, di forma vagamente circolare, ma molto stemperata ai bordi, con Ø di ~ 1'; si trova a ridosso, verso NW, di una debole stellina — 270x.
MCG+7-28-64	gx	13h46m50s	+42°39.1'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina al bordo N e una percettibile solo a momenti subito a E — 450x.
MCG+7-28-81	gx	13h50m53s	+38°14.5'	q 110	CVn	16"	buona / buono	appare elusivamente in visione distolta spingendo a 380x a un paio di primi S di NGC 5325; non sembra più estesa di 20" (riportata sull'Uranometria come **5323A**).
MCG+7-29-27	gx	13h59m43s	+40°23.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di aspetto confuso, in visione distolta appare a tratti grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con UGC 8917 a SE dalla quale si separa a fatica — 450x.
MCG+7-29-41	gx	14h02m48s	+39°07.6'		CVn	28"	buona / ottimo	piccola e molto debole a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione distolta quasi a ridosso SE di UGC 8962 — 388x.
MCG+7-29-58	gx	14h16m26s	+39°39.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; disturbata da una stella molto brillante di magnitudo 6.6 situata 6' a N — 450x.
MCG+7-30-34	gx	14h36m42s	+39°56.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø do una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso NE — 450x.
MCG+7-30-64	gx	14h46m43s	+42°18.4'		Boo	28"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 495x.
MCG+7-31-17	gx	15h00m24s	+43°17.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con **MCG+7-31-18** — sono due galassiette rotonde relativamente facili, situate a ridosso l'una dell'altra in direzione NE-SW, diffuse e con condensazione centrale evidente; la 1ª è leggermente più estesa (25" contro i 20" della 2ª) — 450x.
MCG+7-31-18	gx	15h00m25s	+43°17.2'		Boo	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG+7-31-17**
MCG+7-31-27	gx	15h05m30s	+39°57.8'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata a 1' N della successiva) — 450x.
MCG+7-31-28	gx	15h05m29s	+39°56.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e con evidente condensazione centrale, allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con due stelline a NW, la più distante delle quale è la SAO 45367 di 9ª grandezza — 450x.
MCG+7-31-37	gx	15h13m00s	+40°32.4'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+7-32-27	gx	15h34m15s	+43°14.8'		Boo	24"	m. buona / discreto	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N — 450x.
MCG+7-32-53	gx	15h48m27s	+41°58.9'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; una stellina appena percettibile situata a ridosso W è risultata essere in realtà la **PGC 2190301** — 495x.
MCG+7-33-3	gx	15h52m00s	+42°43.6'		Her	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; situata a ridosso SW di una coppia serrata e sbilanciata di stelline orientate nello stesso modo; poco disturbata dalla SAO 45761 di 9ª grandezza a WNW che si fatica a tenere fuori campo; una coppia di stelle brillanti (le SAO 45764 e 45767 rispettivamente di 8ª e 9ª grandezza) si trovano 4' a S — 495x.
MCG+7-33-13	gx	15h55m34s	+42°36.8'		Her	28"	m. buona / buono	appare a fatica nel bagliore della 4 Herculis di 6ª grandezza, piccola, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.

MCG+7-33-14	gx	15h55m48s	+42°36.4'		Her	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto disturbata dalla 4 Herculis di 6ª grandezza che a mala pena si riesce a tenere fuori campo; è situata 2.5' a E della precedente e presenta un Ø simile — 495x.
MCG+7-33-28	gx	16h02m38s	+41°17.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un tenue nucleo stellare; c'è una debole stellina a ridosso W — 450x.
MCG+7-33-30	gx	16h02m45s	+41°11.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con **UGC 10152** situata a ridosso W e dalla quale si separa facilmente a 450x; molto piccola e debole, orientata da E a W con dimensioni 20"×10".
MCG+7-33-36	gx	16h05m28s	+40°43.3'		Her	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+7-33-41	gx	16h06m12s	+40°24.7'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra una doppia molto sbilanciata a SW e una stellina molto brillante a NW — 450x.
MCG+7-33-54	gx	16h17m17s	+40°05.5'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina quasi a ridosso di NW; un poco disturbata dalla SAO 46006 di 6a grandezza situata 7' scarsi a SW (più evidente di UGC 10330 osservata subito prima e che si trova 10' più a E) — 450x.
MCG+7-34-5	gx	16h22m00s	+38°54.9'		CrB	16"	buona / ottimo	debolissima e piccola, appare a tratti in visione distolta poco allungata da NE a SW (ossia come le 2 stelline ubicate rispettivamente 1' a S e 1' a E — 270x.
MCG+7-34-9	gx	16h22m54s	+41°31.2'		Her	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø < 40" e con condensazione centrale appena percettibile; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+7-34-10	gx	16h26m08s	+39°18.8'		CrB	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 495x.
MCG+7-34-13	gx	16h23m28s	+39°11.5'		CrB	28"	m. buona / buono	fa parte di un sestetto (MCG+7-34-18 e CGCG 224-10 sono però state osservate in altra data col 16") — molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco disturbata dalla SAO 65271 di 9ª grandezza situata 2.5' a W — 495x
MCG+7-34-18	gx	16h24m37s	+39°07.6'		Her	16"	m. buona / m. buono	fa parte assieme alla precedente del sestetto di CGCG 224-10 dalla quale dista 12.5' verso E; è debolissima e molto diffusa, osservabile abbastanza facilmente in visione distolta, a tratti allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' verso S — 380x.
MCG+7-34-19	gx	16h24m47s	+39°44.0'		Her	28"	m. buona / discreto	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20"; sembra come "incastrata" tra una coppia di stelline orientate in direzione opposta — 495x.
MCG+7-34-22	gx	16h25m02s	+40°55.3'		Her	24"	buona / ottimo	appare solo a momenti e in visione distolta come una stellina debolmente sfuocata a meno di 1' SW di NGC 6147 (una galassietta rotonda già di per sé molto debole) — 450x.
MCG+7-34-27	gx	16h25m44s	+40°28.5'		Her	28"	ottima / buono	debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×10" e di luminosità uniforme (forma una coppia con **NGC 6150** situata 1' a NE) — 495x.
MCG+7-34-43	gx	16h27m55s	+39°15.5'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale molto tenue; forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso SE (fa parte dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
MCG+7-34-44	gx	16h27m57s	+39°15.2'		Her	28"	m. buona / discreto	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con la precedente situata a ridosso NW — 495x.
MCG+7-34-45	gx	16h27m59s	+39°18.2'		Her	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" (fa parte del nutrito ammasso **AGC 2199**) — 495x.
MCG+7-34-48	gx	16h28m23s	+39°34.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e piccola condensazione centrale abbastanza contrastata — 450x.
MCG+7-34-49	gx	16h28m23s	+39°36.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — più debole e decisamente piccola della precedente, dalla quale dista un paio di primi a N, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo E — 450x.
MCG+7-34-50	gx	16h28m31s	+39°31.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con evidente condensazione centrale — 450x.
MCG+7-34-51	gx	16h28m25s	+41°10.1'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (fa parte assieme alla successiva dell'ammasso **AGC 2197**) — 495x.
MCG+7-34-52	gx	16h28m27s	+41°09.6'		Her	28"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente — 495x.
MCG+7-34-55	gx	16h28m35s	+39°29.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, forse rotonda con Ø di una 10-ina di secondi — 450x.
MCG+7-34-56	gx	16h28m44s	+39°28.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a W; una stellina percettibile solo a momenti a ridosso N è in realtà risultata essere la **MCG+7-34-65** — 450x.
MCG+7-34-57	gx	16h28m38s	+39°05.3'		Her	28"	m. buona / discreto	piccolo oggetto molto debole e diffuso, di forma indistinta e che aggetta verso N da una stella brillante; non dovrebbe essere più esteso di 20"; situata a circa 2/3 verso S dal centro dell'ammasso **AGC 2199** — 495x.
MCG+7-34-58	gx	16h28m38s	+41°09.8'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a E (fa parte dell'ammasso **AGC 2197**) — 495x.
MCG+7-34-65	gx	16h28m44s	+39°29.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+7-34-56**
MCG+7-34-66	gx	16h28m46s	+39°31.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — assieme a **MCG+7-34-70**, situata 45" a S, sono una coppia di gx deboli, piccole e di aspetto simile, rotonde con Ø di una 15-ina di secondi; la seconda più evidente — 450x.
MCG+7-34-67	gx	16h28m45s	+39°26.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — (erroneamente riportata sul Megastar come **MCG+7-34-65**) debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
MCG+7-34-69	gx	16h28m46s	+39°27.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — situata a ridosso S di MCG+7-34-56 è poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+7-34-70	gx	16h28m44s	+39°30.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+7-34-66**
MCG+7-34-73	gx	16h28m50s	+39°37.0'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto piccola e relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 15"×10"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
MCG+7-34-78	gx	16h28m54s	+40°52.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile — 450x.
MCG+7-34-79	gx	16h29m07s	+39°29.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a S e SE (la seconda è molto debole) — 450x.
MCG+7-34-81	gx	16h29m11s	+40°51.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
MCG+7-34-92	gx	16h30m16s	+40°39.6'		Her	28"	m. buona / discreto	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" (o poco meno); c'è una stellina appena percettibile a ridosso W (fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197**) — 495x.
MCG+7-34-96	gx	16h30m37s	+41°35.5'		Her	16"	m. buona / buono	è un tenuissimo oggetto rotondo con Ø ~ 20" situato a ridosso verso S di una debole stellina che assieme ad altre 2 costituisce un minuscolo piccolo arco; a prima vista, in visione distolta, sembra un piccolo alone asimmetrico di questa stellina — 270x.
MCG+7-34-112	gx	16h33m42s	+39°11.1'		Her	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NW e una più debole alla stessa distanza verso N — 495x.
MCG+7-34-114	gx	16h35m39s	+42°27.7'		Her	28"	ottima / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1.5" verso W (quella più a N di 3 stelline allineate ed equidistanti); la SAO 46176 di 9ª grandezza situata 4' a S non crea particolari problemi — 495x.
MCG+7-34-134	gx	16h41m16s	+39°17.5'		Her	28"	ottima / buono	è una chiazza diffusa estremamente debole e di aspetto uniforme, in visione distolta appare vagamente circolare con Ø grosso modo di 40"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E — 495x.
MCG+7-34-146	gx	16h46m07s	+42°27.6'		Her	28"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SW; una stella brillante di 9ª grandezza si trova a 1' verso S, ma stranamente interferisce poco con l'osservazione — 495x.
MCG+7-35-5	gx	16h55m02s	+43°03.3'		Her	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20". Forma una coppia ravvicinata con **UGC 10610** situata a ridosso WNW — 495x.
MCG+7-35-18	gx	17h02m36s	+40°29.5'		Her	28"	m. buona / ottimo	debole, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile; situata sul lato N di un piccolo triangolo isoscele molto aperto (col vertice ottuso che punta a S) — 495x.
MCG+7-35-62	gx	17h17m20s	+40°52.3'		Her	28"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare estesa 1' scarso e orientata da E a W (*è sorta la luna poco dopo l'ultimo quarto*) — 495x.
MCG+7-36-6	gx	17h23m53s	+41°46.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina appena percettibile al bordo W — 450x.
MCG+7-36-9	gx	17h25m04s	+41°59.6'		Her	24"	buona / m. buono	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+7-36-10	gx	17h25m06s	+42°00.4'		Her	24"	buona / m. buono	piccola lama di luce molto debole, orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi; in visione distolta appare a tratti appena più brillante al centro — 450x.
MCG+7-36-12	gx	17h28m24s	+41°08.0'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a ridosso verso S — 495x.
MCG+7-36-17	gx	17h31m24s	+40°14.2'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma più che altro disturbata da una stellina brillante situata a 1' W, nonché dalla SAO 46775 di 9a grandezza situata un paio di primi a NE; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+7-36-24	gx	17h33m21s	+43°38.1'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 450x.
MCG+7-36-25	gx	17h33m21s	+44°06.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, ma occorre scalare a 340x; c'è una coppia di stelline a E.
MCG+7-37-1	gx	17h52m53s	+41°05.3'		Her	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale ben evidente; c'è una stellina subito a S e un'altra della stessa luminosità e distanza verso W — 495x.
MCG+7-37-2	gx	17h54m20s	+44°32.2'		Her	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; è quasi allineata ed equidistante con una coppia di stelline orientate all'incirca nello stesso modo — 450x.
MCG+7-37-9	gx	17h59m08s	+42°54.5'		Her	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG+7-37-11	gx	17h59m30s	+43°23.5'		Her	28"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10"; c'è una stellina subito a NW — 495x.
MCG+7-37-13	gx	18h00m04s	+44°31.6'		Her	28"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa 1' in direzione N-S; appare con un po' di difficoltà in visione distolta — 495x.
MCG+7-37-14	gx	18h00m07s	+44°29.6'		Her	28"	ottima / ottimo	debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×10"; la visione non sembra granché disturbata dalla SAO 47126 di 8ª grandezza situata a un paio di primi a SE — 495x.
MCG+7-37-19	gx	18h03m50s	+43°15.5'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW (ossia come le 2 stelline a W e NW) con dimensioni 40"×10" — 495x.
MCG+7-37-21	gx	18h04m50s	+43°57.2'		Her	24"	m. buona / buono	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E — 450x.
MCG+7-37-34	gx	18h17m27s	+40°59.4'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 30"-35"; appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti, anche perché c'è la SAO 47359 di 6a grandezza a 5' SW che altrimenti si farebbe fatica a tenere fuori campo — 450x.
MCG+7-38-4	gx	18h24m51s	+40°54.1'		Lyr	28"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con la successiva situata a ridosso S — questa è piccola, diffusa, di luminosità uniforme, a tratti poco allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W; la compagna è ancora più piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi. C'è una coppia di stelline a 1' verso S — 495x.
MCG+7-38-5	gx	18h24m51s	+40°53.8'		Lyr	28"	ottima / ottimo	v. **MCG+7-38-4**
MCG+7-39-23	gx	19h17m53s	+42°28.0'		Lyr	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E — 450x.
MCG+7-40-6	gx	19h26m27s	+44°39.7'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso SE — 450x.
MCG+7-46-3	gx	22h23m48s	+41°33.7'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale appena percettibile; c'è una coppia di stelline brillanti a poco più di 1' verso E — 450x.
MCG+7-46-16	gx	22h41m48s	+42°58.3'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
MCG+7-46-17	gx	22h43m49s	+42°47.4'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un piccolo nucleo molto tenue — 450x.
MCG+7-47-6	gx	23h06m14s	+41°36.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile verso il margine orientale; altre 2 stelline si trovano rispettivamente a 1' NNE e 1' SW — 450x.
MCG+7-48-13	gx	23h36m03s	+44°07.9'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W e una più evidente a 1' verso E — 450x.
MCG+7-48-15	gx	23h37m35s	+44°08.5'		And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
MCG+8-1-3	gx	23h52m11s	+47°23.7'		And	28"	m. buona / buono	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa grosso modo 45" (ossia poco meno di CGCG 549-3 situata 3' a E); in visione distolta appare come incuneata tra 2 deboli stelline quasi a ridosso NE e SW — 495x.
MCG+8-1-11	gx	23h57m24s	47°53.5'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a NE e una più debole alla stessa distanza verso S — 450x.
MCG+8-1-12	gx	23h57m28s	+47°52.2'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
MCG+8-1-14	gx	23h58m11s	+47°51.6'		And	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia stretta a ridosso S — 450x.
MCG+8-1-15	gx	23h58m37s	+47°56.2'		And	24"	m. buona / buono	appare elusivamente e solo a momenti quasi a ridosso S di una stellina appena percettibile; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 30" — 450x.
MCG+8-2-17	gx	00h54m03s	+47°11.0'		Cas	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione NE-SW; c'è una stellina molto debole a ridosso S e una più evidente poco più di 1' a S di quest'ultima — 450x.
MCG+8-3-17	gx	01h22m17s	+50°02.1'		And	28"	m. buona / m. buono	di aspetto simile a MCG+8-3-19 — osservata subito prima — ma poco più evidente ed estesa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MCG+8-3-19	gx	01h23m06s	+49°56.3'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30" — 495x.
MCG+8-3-20	gx	01h23m27s	+49°58.4'		And	28"	m. buona / m. buono	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; ci sono 3 stelline allineate a ridosso NE (la più occidentale è a ridosso della gx) — 495x.
MCG+8-3-26	gx	01h28m46s	+48°19.7'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10"; è situata tra due stelline: a 1' NW e una più brillante a SE.
MCG+8-4-14	gx	02h03m45s	+48°20.6'		Per	24"	m. buona / m. buono	presenta un piccolo nucleo quasi stellare circonfuso da un debolissimo alone che in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MCG+8-4-17	gx	02h04m32s	+45°46.4'		And	24"	discreta / buono	fa parte, assieme a MCG+8-4-18 e -19, di un quartetto serrato al quale si aggiunge UGC 1562 — poco più debole di MCG+8-4-19, osservata per prima e dalla quale dista 1' verso E; è poco diffusa e di Ø simile — 450x.
MCG+8-4-18	gx	02h04m30s	+45°46.6'		And	24"	discreta / buono	appare elusivamente a 450x a ridosso NW della prima elencata, ma è poco più di una stellina sfuocata.
MCG+8-4-19	gx	02h04m25s	+45°46.4'		And	24"	discreta / buono	fa parte, assieme alle due precedenti e a UGC 1562, di un quartetto serrato — è la più facile del gruppo, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso SW — 450x.
MCG+8-6-4	gx	02h48m03s	+47°32.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso NW — 495x.
MCG+8-6-17	gx	02h52m19s	+47°05.7'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG+8-10-5	gx	05h27m46s	+49°37.7'		Aur	16"	m. buona / ottimo	debolissima, piccola e diffusa, appare in visione distolta a 380x, forse rotonda con Ø di 20".
MCG+8-11-13	gx	05h58m11s	+46°50.7'		Aur	16"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", con bulge appena più evidente del disco, ma visibile solo a tratti a 380x; c'è una stellina a ridosso verso NE e un'altra più debole a 45" verso E.
MCG+8-12-8	gx	06h16m01s	+49°05.6'		Aur	28"	buona / mediocre	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso W e una appena percettibile a ridosso E; una coppia di stelline evidenti, accompagnata da una compagna più debole, si trova a 1' scarso verso N — 495x.
MCG+8-12-20	gx	06h21m52s	+50°34.5'		Aur	16"	ottima / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di 20"; c'è una stellina a 35"-40" verso S — 380x.
MCG+8-13-15	gx	06h50m47s	+48°37.3'		Aur	28"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 495x.
MCG+8-13-43	gx	07h01m53s	+47°40.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a S — 450x.
MCG+8-13-66	gx	07h08m26s	+48°59.8'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, si vede a tratti in visione distolta, ma solo a 450x appare a tratti orientata da NE a SW (ossia come la coppia di stelline brillanti a 1' NW) con dimensioni grosso modo di 20"×10".
MCG+8-13-76	gx	07h09m18s	+49°52.3'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole, orientata da NE a SW (ossia come le due stelline brillanti situate a NE sul prolungamento dell'asse della gx) ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+8-13-84	gx	07h09m54s	+47°54.8'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **UGC 3706** situata a ridosso SE — si separano a fatica anche a 450x, molto deboli e di luminosità uniforme; la MCG appare come un baffo di luce molto tenue, orientato da N a S ed esteso una 40-ina di secondi, mentre la UGC è grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG+8-13-87	gx	07h10m34s	+48°38.0'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a E (situata a ridosso del margine orientale dell'ammasso **AGC 569**) — 495x.
MCG+8-13-104	gx	07h12m43s	+48°57.5'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso N di una stellina, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni ~ grosso modo 30"×20" — 450x.
MCG+8-14-9	gx	07h22m35s	+48°41.1'		Lyn	28"	m. buona / discreto	piccola ed elusiva chiazza di forma indistinta ed estesa non più di 20"-25" che salta fuori solo a momenti a ridosso N di una stellina (fa parte di un piccolo triangolo rettangolo) — 495x.
MCG+8-14-48	gx	07h48m19s	+46°10.5'		Lyn	20"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, ma visibile abbastanza facilmente in visione distolta, praticamente in mezzo a 2 stelline brillanti — 360x.
MCG+8-15-8	gx	07h51m21s	+50°14.1'		Lyn	16"	ottima / ottimo	situata a ridosso E di UGC 4052 è di dimensioni simili e anch'essa con nucleo stellare evidente; le 2 gx si separano facilmente da a 380x.
MCG+8-15-21	gx	07h56m34s	+45°53.4'		Lyn	20"	m. buona / buono	piccola e debolissima, disturbata da una stellina a ridosso NW, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 360x.
MCG+8-15-31	gx	07h57m17s	+47°09.9'		Lyn	20"	buona / buono	appare elusivamente e solo a momenti, molto piccola, estesa sì e no 10"; appare a ridosso NW di una stellina appena percettibile; una poco più evidente si trova subito a NE — 360x.
MCG+8-15-40	gx	08h06m58s	+46°33.8'		Lyn	20"	buona / buono	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; è situato quasi nel mezzo di 2 deboli stelline orientate da NNE a SSW (poco più vicina alla prima delle 2 che è poco più evidente) — 360x.
MCG+8-15-42	gx	08h07m51s	+45°55.1'		Lyn	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 495x.
MCG+8-15-53	gx	08h14m17s	+46°00.6'		Lyn	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con una condensazione centrale visibile solo a momenti; c'è una stellina quasi a ridosso E (la più meridionale di un piccolo triangolo rettangolo) — 450x.
MCG+8-15-55	gx	08h14m53s	+45°47.5'		Lyn	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa, rotonda con Ø < 20" e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
MCG+8-16-6	gx	08h29m02s	+47°48.0'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione stellare appena percettibile; situata tra due stelline orientate da N a S; una debole stellina si trova a 1' verso E — 495x.
MCG+8-16-11	gx	08h32m44s	+49°57.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø grosso modo di 30"; c'è una stellina brillante subito a E — 495x.
MCG+8-16-13	gx	08h34m23s	+48°05.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di almeno 40" e con una condensazione stellare appena accennata; c'è una stellina appena percettibile a 1' NNW e una più evidente a un paio di primi verso N — 495x.
MCG+8-16-17	gx	08h36m46s	+47°22.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con **MAC 0836+4722** situata a ridosso NW — si separano a fatica in quanto i rispettivi aloni tendono a "impastarsi"; la MCG è poco più evidente e presenta un nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la MAC è di dimensioni simili, ma di aspetto uniforme; ci sono 2 stelline abbastanza brillanti a N e NW della coppia — 495x.
MCG+8-16-21	gx	08h37m13s	+47°11.5'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
MCG+8-16-26	gx	08h45m06s	+44°35.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 495x.
MCG+8-16-27	gx	08h45m06s	+44°36.4'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	più debole della precedente, con Ø simile e di luminosità uniforme — 495x.
MCG+8-16-31	gx	08h50m05s	+49°14.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a un paio di primi verso S (situata in una piccola zona di cielo quasi depleta) — 495x.
MCG+8-16-41	gx	08h56m17s	+48°37.0'		UMa	28"	m. buona / buono	debolissima chiazza diffusa che in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina subito a SE e una più debole a 1' SW — 495x.
MCG+8-17-6	gx	08h59m39s	+45°41.2'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, malgrado la vicinanza della SAO 42634 di magnitudo 6.6 situata 4' a NW e che si fatica a tenere fuori campo, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
MCG+8-17-10	gx	08h59m37s	+49°11.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare visibile però solo a momenti — 495x.
MCG+8-17-12	gx	09h00m37s	+45°40.4'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 495x.
MCG+8-17-13	gx	09h00m44s	+46°37.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione E-W, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 1' SW di una debole stellina — 495x.
MCG+8-17-15	gx	09h01m31s	+49°19.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una tripletta di stelline a E allineate in direzione NW-SE; una stellina appena percettibile si trova subito a S — 495x.
MCG+8-17-24	gx	09h05m53s	+47°09.8'		UMa	16"	m. buona / ottimo	di aspetto pressoché stellare a 270x, appare leggermente diffusa a 380x, ma con dimensione non superiore ai 10"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta osservando UGC 4765.
MCG+8-17-30	gx	09h06m56s	+46°12.2'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte del terzetto di UGC 4784 — debolissimo oggetto rotondo con nucleo stellare e di Ø non superiore a 15"; in visione diretta appare pressoché stellare; è situato 30" SE di una stellina — 380x.
MCG+8-17-32	gx	09h07m24s	+45°46.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debolissima, situata tra 2 stelline distanti 1' in direzione N-S; in visione distolta appare a tratti allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 495x.
MCG+8-17-33	gx	09h07m29s	+45°48.2'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 495x.
MCG+8-17-34	gx	09h07m56s	+49°35.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di piccole galassiette relativamente facili situate a ridosso l'una dell'altra in direzione NE-SW; sono entrambe rotonde con Ø di una 20-ina di secondi e presentano una tenue condensazione centrale (quella della 2ª è leggermente più marcata) — 495x.
MCG+8-17-35	gx	09h07m58s	+49°36.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	v. **MCG+8-17-34**
MCG+8-17-36	gx	09h08m06s	+49°54.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 495x.
MCG+8-17-39	gx	09h08m44s	+49°45.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	assieme alle 2 successive forma un trio di oggetti molto deboli — questa presenta un tenue nucleo stellare circonfuso da un alone molto diffuso orientato da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 495x.
MCG+8-17-40	gx	09h08m53s	+49°45.0'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è la più evidente del trio, poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e con tenue condensazione centrale; c'è una coppia serrata di stelline quasi a ridosso verso N — 495x.
MCG+8-17-42	gx	09h09m02s	+49°45.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	la più debole del trio, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MCG+8-17-54	gx	09h12m08s	+46°02.0'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 495x.
MCG+8-17-57	gx	09h12m19s	+46°05.4'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20" (situata a 4' NNE della precedente) — 495x.
MCG+8-17-61	gx	09h14m43s	+49°47.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a poco più di 1' verso N (fa parte di 3 stelline allineate da E a W) — 495x.
MCG+8-18-3	gx	09h32m44s	+48°47.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 495x.
MCG+8-18-13	gx	09h36m37s	+48°28.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 239-11** situata 1' a W — poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
MCG+8-18-16A	gx	09h38m46s	+48°33.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola lama di luce molto debole che in visione distolta sembra aggettare a SW di **CGCG 239-15** per una 30-ina di secondi in direzione NE-SW — 495x.
MCG+8-18-36	gx	09h49m27s	+46°59.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stella brillante a 1' verso S che disturba un po' l'osservazione — 495x.
MCG+8-18-45	gx	09h57m29s	+45°12.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso sì e no una 20-ina di secondi e orientato da N a S, ma appare solo a momenti in visione distolta — 495x.
MCG+8-19-10	gx	10h12m56s	+46°25.0'		UMa	28"	m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 30"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; situata in mezzo a due stelline abbastanza brillanti orientate grosso modo come la gx — 495x.
MCG+8-20-21	gx	10h46m56s	+46°42.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 495x.
MCG+8-20-23	gx	10h47m34s	+45°34.1'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta, ma è molto piccola, forse rotonda con Ø max di 20" — 270x.
MCG+8-20-30	gx	10h50m32s	+47°51.1'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso S — 495x.
MCG+8-20-58	gx	10h59m24s	+46°05.4'		UMa	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza di aspetto confuso, a tratti approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; appare a tratti a N di una stellina brillante (fa parte di una coppia larga con componenti separate da un paio di primi in direzione NE-SW); è situata 2' a S di NGC 3478 ed è meglio visibile scalando a 340x.
MCG+8-20-84	gx	11h05m37s	+46°10.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; situata al centro di un triangolo quasi equilatero formato da 3 stelline — 495x.
MCG+8-21-3	gx	11h12m50s	+45°03.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; non sembra gran che disturbata da una stella di 10ª grandezza a 2.5' NW — 495x.
MCG+8-21-17	gx	11h20m05s	+47°14.1'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; forma una coppia ravvicinata con **MCG+8-21-17A** situata a ridosso NW; quest'ultima, pure molto debole, è forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la difficoltà nell'osservare questa coppia risiede nel fatto che il campo stellare negli immediati dintorni è virtualmente depleto; un asterismo di 4 stelle brillanti quasi allineato da E a W si trova una decina di primi a NW — 495x.
MCG+8-21-17A	gx	11h20m02s	+47°14.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma una coppia serrata con la precedente — 495x.
MCG+8-21-19	gx	11h20m43s	+46°49.1'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi — 495x.
MCG+8-21-20	gx	11h20m52s	+44°35.8'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debolissima, a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; è osservabile in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+8-21-21	gx	11h20m53s	+46°49.2'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a SW — 495x.
MCG+8-21-24	gx	11h21m33s	+44°35.9'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MCG+8-21-33	gx	11h24m27s	+48°52.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	forma assieme alla successiva una coppia serrata di galassiette molto deboli in direzione E-W, ma si separano con molta fatica a 495x; la prima è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, mentre la compagna è più piccola e presenta un nucleo stellare.
MCG+8-21-34	gx	11h24m26s	+48°52.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	v. **MCG+8-21-33**
MCG+8-21-39	gx	11h28m54s	+48°31.8'		UMa	20"	buona / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta sembra grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 360x.
MCG+8-21-40	gx	11h29m06s	+47°41.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx debolissime che appaiono soltanto in visione distolta a 380x; la 1ª salta fuori più facilmente, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi o poco più; la 2ª è più piccola, estesa ~ 20" ed è situata a 45" E di una stellina — 380x.
MCG+8-21-41	gx	11h29m07s	+47°42.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	v. **MCG+8-21-40**
MCG+8-21-43	gx	11h30m33s	+49°10.1'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" c'è una stellina a poco più di 1' NW — 495x.
MCG+8-21-46	gx	11h32m09s	+49°00.6'		UMa	20"	buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia di gx molto deboli, diffuse, di luminosità uniforme e che a prima vista sembrano di aspetto simile; la 1ª è orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; la 2ª è poco più "stretta", di dimensioni 40"×15" ed è orientata in senso opposto — 360x.
MCG+8-21-47	gx	11h32m10s	+48°59.7'		UMa	20"	buona / buono	v. **MCG+08-21-46**
MCG+8-21-54	gx	11h33m44s	+48°56.0'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina al bordo SE — 450x.
MCG+8-21-59	gx	11h34m29s	+48°57.1'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' N — 450x.
MCG+8-21-60	gx	11h34m42s	+48°56.7'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo N che a ingrandimenti inferiori tende a confonderne un po' la forma — 450x.
MCG+8-21-64	gx	11h35m29s	+49°06.4'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG+8-21-65	gx	11h35m44s	+49°02.2'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione E-W; appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MCG+8-21-66	gx	11h35m46s	+49°09.1'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+8-21-78	gx	11h37m55s	+47°28.0'		UMa	24"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme alle due successive, di un terzetto serrato allineato in direzione NE-SW — debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 30"-35" — 450x.
MCG+8-21-79	gx	11h37m58s	+47°28.3'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto debole, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MCG+8-21-81	gx	11h38m02s	+47°29.0'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, appare solo elusivamente in visione distolta a NE della coppia precedente; non dovrebbe essere più estesa di 15" — 450x.
MCG+8-21-82	gx	11h38m16s	+47°26.2'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; forma una coppia ravvicinata con UGC 6606 situata a ridosso E — 450x.
MCG+8-21-97	gx	11h45m26s	+49°52.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole e poco diffusa, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 495x.
MCG+8-22-9	gx	11h49m05s	+48°45.0'		UMa	16"	m. buona / m. buono	abbastanza facile e relativamente compatta, con Ø di 20"-25" (situata 4' a NE della coppia NGC 3893-6) — 380x.
MCG+8-22-11	gx	11h49m35s	+47°49.9'		UMa	28"	ottima / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una debole stellina a 1' NE; poco disturbata dalla SAO 43901 di 9a grandezza situata 3.5' a SW — 495x.
MCG+8-22-20	gx	11h51m47s	+46°52.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta a un paio di primi W di CGCG 243-21 quando si osserva quest'ultima; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20" — 495x.
MCG+8-22-24	gx	11h53m01s	+45°27.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a NW e una appena percettibile a ridosso N — 495x.
MCG+8-22-27	gx	11h53m16s	+47°20.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e condensata, anche questa è rotonda con Ø < 30" — 495x.
MCG+8-22-34	gx	11h54m38s	+49°18.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	è una galassietta molto debole e minuta, forse rotonda con Ø max di 10"; c'è una stellina a ridosso NW e una abbastanza brillante subito a SE — 495x.
MCG+8-22-36	gx	11h54m58s	+48°44.9'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 495x.
MCG+8-22-38	gx	11h55m02s	+48°47.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MCG+8-22-64A	gx	12h04m47s	+48°34.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" — 495x.
MCG+8-22-66	gx	12h05m46s	+48°35.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o poco più; allineata ed equidistante con 2 stelline a S — 495x.
MCG+8-22-69	gx	12h06m45s	+48°44.8'		UMa	16"	buona / m. buono	molto debole e poco diffusa, rotonda, con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti e Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
MCG+8-22-72	gx	12h08m46s	+47°13.4'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MCG+8-22-78	gx	12h10m02s	+49°15.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, ma poco più evidente di UGC 7155 — dalla quale dista un paio di primi a SW — allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" scarsi — 495x.
MCG+8-22-80	gx	12h10m20s	+47°09.9'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a NW — 495x.
MCG+8-22-86	gx	12h16m02s	+46°44.0'		Cvn	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa ~ 1' in direzione NW-SE, appare a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
MCG+8-22-101	gx	12h18m39s	+48°51.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+8-22-102	gx	12h18m40s	+48°52.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo NW e una appena percettibile a ridosso S, ma quest'ultima è in realtà la la **PGC 2327525** — 450x.
MCG+8-23-2	gx	12h19m50s	+48°52.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
MCG+8-23-7	gx	12h20m41s	+46°15.3'	q 74	CVn	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S (riportata sull'Uranometria come **4288A**) — 495x.
MCG+8-23-9	gx	12h20m55s	+46°09.2'		CVn	28"	ottima / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette piccole e molto deboli, forse rotonde con Ø sì e no di 20"; sono purtroppo disturbate da una stellina brillante situata quasi a ridosso NE; la 1a è poco più evidente, mentre la 2a è di aspetto più uniforme — 495x.

MCG+8-23-10	gx	12h20m54s	+46°09.7'		CVn	28"	ottima / ottimo	v. **MCG+8-23-9**
MCG+8-23-11	gx	12h21m00s	+46°07.0'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MCG+8-23-21	gx	12h25m15s	+48°14.2'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina visibile solo a momenti al bordo orientale — 450x.
MCG+8-23-30	gx	12h25m36s	+45°05.0'		CVn	24"	m. buona / buono	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø < 20"; disturbata da una stella brillante situata 1' verso S — 450x.
MCG+8-23-32	gx	12h25m47s	+45°54.6'		CVn	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva galassietta che appare solo a tratti a 380x a ~ 1' SW di una stellina appena percettibile (un'altra stellina simile si trova a 1.5' ESE); non dovrebbe essere più estesa di un a 30-ina di secondi.
MCG+8-23-39	gx	12h28m14s	+44°27.2'		CVn	24"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con UGC 7593 situata a E: si separano abbastanza facilmente a 450x: appaiono 2 nuclei quasi stellari che in visione distolta sembrano immersi in un alone comune; a tratti un tenuissimo baffo aggetta verso S per 10" o 15"; il nucleo della UGC è più puntiforme (la coppia non era separabile nel 16" neppure a 380x).
MCG+8-23-48	gx	12h31m47s	+47°55.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo W — 450x.
MCG+8-23-50	gx	12h32m00s	+46°20.5'		CVn	24"	m. buona / buono	debolissima lama di luce estesa ~ 1' in direzione NNW-SSE; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; c'è un piccolissimo asterismo di 4 deboli stelline foggiato a "L" situato 3' o 4' verso E.
MCG+8-23-62	gx	12h35m31s	+47°52.3'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE — 450x.
MCG+8-23-63	gx	12h35m38s	+47°45.5'		CVn	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni anche questa di 30"×15" (o poco più); c'è una debole stellina subito a SE — 450x.
MCG+8-23-66	gx	12h36m30s	+48°30.1'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda di Ø 30"-35" e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
MCG+8-23-72	gx	12h40m34s	+46°36.7'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; una stella brillante situata 4' a ENE non si riesce a tenere fuori campo e disturba un po' l'osservazione — 450x.
MCG+8-23-75	gx	12h42m12s	+50°00.4'		Cvn	28"	m. buona / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo ed estesa una 30-ina di secondi; si osserva con difficoltà perché nel campo sono presenti soltanto stelline molto deboli — 495x.
MCG+8-23-78	gx	12h42m22s	+48°19.9'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio evidente scalando a 340x.
MCG+8-23-79	gx	12h42m39s	+48°32.1'		CVn	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e con condensazione stellare appena percettibile — 495x.
MCG+8-23-80	gx	12h43m02s	+48°34.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (ossia poco maggiore della precedente); c'è una stellina a 1.5' verso S — 495x.
MCG+8-23-83	gx	12h44m09s	+48°38.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 495x.
MCG+8-23-93	gx	12h48m51s	+49°18.1'		CVn	28"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza diffusa che in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø sì e no di una 30-ina di secondi — 495x.
MCG+8-24-1	gx	12h54m02s	+48°47.1'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, con condensazione centrale visibile solo a momenti, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+8-24-5	gx	12h54m41s	+49°22.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole, estesa una 30-ina di secondi o poco più in direzione NW-SE — 495x.
MCG+8-24-7	gx	12h55m35s	+48°28.4'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 495x.
MCG+8-24-10	gx	12h55m59s	+48°26.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
MCG+8-24-13	gx	12h57m34s	+49°08.9'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20" (o poco meno) — 495x.
MCG+8-24-16	gx	12h58m37s	+49°06.0'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' E e una debole a 1' verso S — 495x.
MCG+8-24-22	gx	13h00m39s	+48°34.1'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35"; allineata ed equidistante con due stelline a SE — 450x.
MCG+8-24-25	gx	13h02m11s	+50°17.7'		Cvn	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; è situata in una piccola zona depleta — 450x.
MCG+8-24-27	gx	13h02m54s	+47°29.2'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10" — 495x.
MCG+8-24-29	gx	13h03m11s	+48°47.2'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
MCG+8-24-38	gx	13h05m59s	+49°21.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina a 1' NW — 495x.
MCG+8-24-40	gx	13h06m20s	+49°18.4'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debolissima e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 495x.
MCG+8-24-41	gx	13h06m27s	+45°17.3'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e con nucleo quasi stellare, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; la visione è un po' disturbata dalla SAO 44465 di magnitudo 5.6 situata 6' a W — 450x.
MCG+8-24-42	gx	13h06m46s	+45°16.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' verso N. Una stellina debolissima appare a tratti subito a E, ma si tratta in realtà di **MCG+8-24-43** — 450x.
MCG+8-24-43	gx	13h06m50s	+45°16.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG+8-24-42**
MCG+8-24-47	gx	13h08m05s	+50°11.8'		Cvn	24"	buona / ottimo	elusiva lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+8-24-55	gx	13h09m28s	+47°31.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto diffuso, molto piccolo, con Ø di una 20-ina di secondi; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
MCG+8-24-57	gx	13h09m41s	+46°01.4'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
MCG+8-24-62	gx	13h10m57s	+49°51.6'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo e relativamente compatto, con Ø di 15"-20"; c'è una stellina molto debole a 1' NE e un'altra appena percettibile subito a E — 380x.
MCG+8-24-68	gx	13h11m18s	+47°32.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	è un piccolo oggetto rotondo, compatto, con Ø di 20", osservabile a 380x; una stellina appena percettibile appare a tratti 30"-40" verso S; è situata a 1.5' W di UGC 8272 — 380x.
MCG+8-24-71	gx	13h11m34s	+44°56.0'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile subito a E; (era osservabile, seppur al limite, anche nel 16" durante una nottata con condizioni di cielo analoghe). Forma una coppia serrata con **MCG+8-24-73**, debolissima e che appare solo a tratti ed è di aspetto quasi stellare anche a 495x.
MCG+8-24-73	gx	13h11m36s	+44°56.0'		CVn	24"	ottima / ottimo	v. **MCG+8-24-71**
MCG+8-24-74	gx	13h11m46s	+44°43.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N — 450x.
MCG+8-24-77	gx	13h11m53s	+45°04.5'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NNW — 495x.
MCG+8-24-78	gx	13h11m56s	+45°26.2'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 495x.
MCG+8-24-79	gx	13h11m58s	+44°48.5'		CVn	24"	m. buona / buono	debolissima e solo a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 15" o 20"; forma una coppia ravvicinata con UGC 8281 a ridosso NE — 450x.
MCG+8-24-85	gx	13h12m17s	+46°24.5'		CVn	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SSE — 450x.
MCG+8-24-94	gx	13h14m33s	+44°30.5'		CVn	16"	buona / discreto	molto debole e diffusa, in visione distolta appare chiaramente molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 380x.
MCG+8-24-96	gx	13h15m17s	+44°23.4'		CVn	16"	buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con CGCG 219-23 — molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø una 40-ina di secondi — 380x.
MCG+8-24-98	gx	13h17m12s	+46°01.1'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 495x.
MCG+8-24-99	gx	13h17m17s	+47°20.5'		CVn	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø < 30"; è situata tra una stellina a 1.5' N e un piccolo triangolo acuto di stelline alla stessa distanza verso S — 495x.
MCG+8-24-102	gx	13h18m26s	+47°13.4'		CVn	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MCG+8-24-103	gx	13h18m25s	+47°14.9'		CVn	28"	ottima / ottimo	situata 1.5' a N della precedente è molto debole, ma presenta una condensazione centrale evidente; in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni di 20"×15" — 495x.
MCG+8-24-107	gx	13h19m22s	+47°54.1'		CVn	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø < 30" — 495x.
MCG+8-24-108	gx	13h19m47s	+48°12.4'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione quasi stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' WSW — 495x.
MCG+8-25-3	gx	13h27m59s	+45°45.6'		CVn	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MCG+8-25-28	gx	13h36m45s	+44°36.0'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 8603 situata 2' a W; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+8-25-39	gx	13h43m00s	+49°03.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (o poco più); c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi scarsi a NNE — 495x.
MCG+8-25-42	gx	13h47m47s	+47°46.7'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso S e una brillante a 1.5' NE — 495x.
MCG+8-25-46	gx	13h50m34s	+40°50.7'		CVn	16"	buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 380x.
MCG+8-25-48	gx	13h51m42s	+46°22.0'		CVn	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MCG+8-26-12	gx	14h12m29s	+45°41.5'		Boo	16"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con UGC 9008, situata a ridosso verso W, con la quale tende a fondersi in un unico oggetto di forma un po' irregolare e allungata da E a W ed esteso ~ 1'; le due gx si riescono a sdoppiare, seppur con molta fatica, a 380x; appaiono a tratti due piccoli nuclei puntiformi; UGC è più evidente e più grande.
MCG+8-26-18	gx	14h18m54s	+45°57.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata in una piccola zona di cielo depleta — 450x.
MCG+8-26-21	gx	04h21m36s	+49°33.1'		Boo	16"	m. buona / buono	è un piccolo oggetto rotondo, poco diffuso, con Ø di 30"-35"; è situata al vertice ottuso di un triangolo isoscele formato con 2 stelline — quella a N più brillante — distanti 5'; a tratti appare qualcosa di puntiforme a 270x, ma non riesco a capire se trattasi del nucleo stellare o di una stellina a ridosso.
MCG+8-27-17	gx	14h39m49s	+47°09.8'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW (è la più meridionale di un triangolo isoscele di stelline il cui vertice più acuto punta a N) — 495x.
MCG+8-27-58	gx	15h03m53s	+48°34.5'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso N; una poco più evidente si trova subito a W — 495x.
MCG+8-27-65	gx	15h06m28s	+46°20.6'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa rotonda con Ø < 40" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso E — 495x.
MCG+8-28-20	gx	15h20m52s	+48°39.7'		Boo	28"	m. buona / discreto	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è un piccolo triangolo quasi equilatero di stelline brillanti 3' a NW; una debole stellina si trova subito a S della gx — 495x.
MCG+8-28-22	gx	15h21m53s	+48°37.7'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina 1.5' a W e una molto debole alla stessa distanza verso S — 495x.
MCG+8-28-23	gx	15h22m55s	+46°04.5'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 495x.
MCG+8-28-24	gx	17h10m52s	+55°46.8'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni di 20"×10"; c'è una stellina brillante a SW e una più debole a SE; una stellina appena percettibile appare a tratti a 1' verso N, ma questa in realtà risultata essere la **PGC 2514643** — 495x.
MCG+8-28-28	gx	15h25m11s	+47°39.5'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo E; c'è una stellina a 1' NE e una abbastanza brillante a 1.5' verso N — 495x.
MCG+8-28-29	gx	15h25m23s	+48°26.4'		Boo	28"	m. buona / discreto	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
MCG+8-28-31	gx	15h26m39s	+50°19.1'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø < 40" — 450x.
MCG+8-28-32	gx	15h26m42s	+46°26.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi e orientata da E a W; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N — 450x.
MCG+8-28-41	gx	15h36m19s	+49°34.4'		Boo	24"	buona / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
MCG+8-29-1	gx	15h41m46s	+48°32.9'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" (forma una coppia con **CGCG 250-3** situata un paio di primi a E) — 495x.
MCG+8-29-2	gx	15h41m45s	+45°34.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; appare in visione distolta quando si osserva UGC 9981 situata 1.5' a N — 450x.
MCG+8-29-34	gx	16h01m53s	+45°21.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti poco allungata da NE a SW, di dimensioni grosso modo 40"×30" e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina brillante a ridosso SE — 450x.
MCG+8-29-39	gx	16h02m53s	+47°13.5'		Her	24"	m. buona / discreto	è una sorta di "nodulo" che appare elusivamente a ridosso E di UGC 10156, di cui però non riesco a capirne la forma — 450x.
MCG+8-29-40	gx	16h03m10s	+49°25.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×10" — 450x.
MCG+8-29-42	gx	16h03m24s	+49°27.2'		Her	24"	m. buona / m. buono	anche questa è molto debole e di aspetto uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
MCG+8-29-43	gx	16h04m40s	+49°26.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **MCG+8-29-44** situata quasi a ridosso SW — è una elusiva lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione E-W; appare in visione distolta a ridosso S di una stellina — 450x.
MCG+8-29-44	gx	16h04m45s	+49°27.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; equidistante (anche se non proprio allineata) con 2 stelline a E — 450x.
MCG+8-29-50	gx	16h10m15s	+47°03.7'		Her	24"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MCG+8-29-51	gx	16h11m15s	+47°36.9'		Her	28"	m. buona / buono	debolissima, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' S; la gx è disturbata da una coppia di stelle brillanti di 8ª grandezza (SAO 45950-3 distanti 1' in direzione NNW-SSE) situate 3'-4' a S — 495x.
MCG+8-30-11	gx	16h25m30s	+49°14.8'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 495x.
MCG+8-30-20	gx	16h31m25s	+46°19.5'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a 1' scarso verso W — 495x.
MCG+8-30-27	gx	16h33m41s	+50°21.5'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+8-30-39	gx	16h37m31s	+49°28.3'		Her	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NNE — 495x.
MCG+8-30-43	gx	16h38m20s	+48°18.1'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa e poco più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina subito a NNW; 3 stelle brillanti in posizione arcuata si trovano 6' a E — 495x.
MCG+8-30-49	gx	16h45m11s	+47°03.5'		Her	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di 30"-35" e con nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina brillante 1.5' a N e una più debole alla stessa distanza verso S — 495x.
MCG+8-31-3A	gx	16h49m33s	+45°29.9'		Her	28"	m. buona / m. buono	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MCG+8-31-5	gx	16h49m48s	+46°43.1'		Her	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso SE — debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare molto tenue — 495x.
MCG+8-31-6	gx	16h49m50s	+46°42.8'		Her	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la precedente situata a ridosso NW — molto debole e piccola, diffusa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MCG+8-31-11	gx	16h51m03s	+47°13.3'		Her	28"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale; ci sono 2 deboli stelline a 1' W e 1' verso E (fa parte di una coppia serrata con una compagna a NW che però non ho visto) — 495x.
MCG+8-31-16	gx	16h58m24s	+47°08.2'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una coppia di stelline sbilanciate in luminosità al margine N — 495x.
MCG+8-31-20	gx	17h03m00s	+46°23.1'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' verso E — 495x.
MCG+8-31-29	gx	17h11m59s	+46°33.4'		Her	24"	m. buona / discreto	debolissima, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MCG+8-32-8	gx	17h30m15s	+47°25.7'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; molto disturbata dalla SAO 46762 di 7ª grandezza situata 1.5' a S — 495x.
MCG+8-32-11	gx	17h36m22s	+49°38.0'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile — 495x.
MCG+8-33-4	gx	17h57m44s	+50°51.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø < 20"; allineata ed equidistante con 2 stelline a S; c'è una stellina molto brillante a 1' SE — 450x.
MCG+8-33-7	gx	18h00m27s	+48°23.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, più che altro molto disturbata dalla SAO 47133 di 8a grandezza situata ad appena 1.5' NE e da un'altra stellina brillante alla stessa distanza verso S; in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+8-33-13	gx	18h03m24s	+45°41.9'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina evidente al bordo S e una coppia di deboli stelline a ridosso NNE — 495x.
MCG+8-33-15	gx	18h04m41s	+46°15.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; c'è una stellina quasi a ridosso verso S.
MCG+8-33-22	gx	18h08m48s	+48°50.8'		Her	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale abbastanza evidente; è situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline sbilanciate in luminosità uniforme: quella subito a E è brillante — 450x.
MCG+8-33-23	gx	18h09m42s	+49°56.8'		Her	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 450x.
MCG+8-33-27	gx	18h10m55s	+50°00.8'		Her	24"	ottima / ottimo	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline subito a N — 450x.
MCG+8-33-30	gx	18h11m05s	+49°54.5'		Her	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **UGC 11146** a ridosso W — relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e una condensazione centrale evidente abbastanza contrastata — 450x.
MCG+8-33-39	gx	18h20m33s	+48°00.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG+8-34-6	gx	18h34m47s	+48°26.7'		Dra	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; equidistante, ma non allineata, con una coppia di deboli stelline a SW — 495x.
MCG+8-34-10	gx	18h35m07s	+48°26.5'		Dra	28"	ottima / ottimo	poco più evidente di MCG+8-34-6, situata poco più di 3' a W, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
MCG+8-34-11	gx	18h35m49s	+50°18.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, solo a momenti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso S e una doppia molto stretta e sbilanciata a NW; meglio definita scalando a 340x.
MCG+8-34-26	gx	18h50m44s	+46°54.5'		Lyr	28"	ottima / ottimo	è una debolissima chiazza diffusa che solo a momenti appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×40"; c'è una stellina subito a SW (che è allineata con una coppia di luminosità simile situata poco più a N) — 495x.
MCG+8-34-31	gx	19h00m27s	+47°31.7'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; ci sono 3 stelline serrate e allineate in direzione NW-SE a ridosso S — 450x.
MCG+8-35-6	gx	19h13m29s	+45°17.6'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina subito a SE — 495x.
MCG+8-35-11	gx	19h26m37s	+50°08.3'		Cyg	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta quasi a ridosso NE di IC 4867, ma è disturbata dalle SAO 31658 e 31661 di magnitudo rispettivamente 8.5 e 6.9 situate a poco più di 1' NE; in visione distolta appare comunque rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
MCG+8-43-2	gx	23h47m32s	+49°33.7'		Cas	24"	ottima / ottimo	molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme; a prima vista sembra aggettare a E di una stellina abbastanza brillante; una stellina appena percettibile appare a tratti al bordo SE — 450x.
MCG+9-11-22	gx	06h40m01s	+53°23.7'		Lyn	24"	ottima / buono	debolissima, molto piccola e condensata, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso SE; un'altra appena più evidente si trova subito a SW (da un controllo effettuato risulta che in realtà sono riuscito a vedere soltanto il nucleo della gx).
MCG+9-12-16	gx	06h59m38s	+54°11.8'		Lyn	16"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta, ma di aspetto irregolare a 380x, estesa ~ 20"; è situata a tra 2 stelline distanti 1' e orientate da NW a SE.
MCG+9-12-17	gx	06h59m46s	+54°11.3'		Lyn	16"	ottima / m. buono	di dimensioni analoghe, ma debolissima e osservabile a 380x in visione distolta a ~ 40" S di una stellina.
MCG+9-12-68	gx	07h24m16s	+55°35.4'		Lyn	24"	ottima / buono	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta, appare in visione distolta, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
MCG+9-12-70	gx	07h24m33s	+55°35.9'		Lyn	24"	ottima / buono	molto piccola e debolissima, non capisco la forma, ma quando salta fuori non sembra più estesa di 12"-15" — 450x.
MCG+9-13-1	gx	07h27m14s	+52°56.9'		Lyn	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso S; si riescono a separare abbastanza facilmente a 450x; questa è piccola, relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a ridosso W; l'altra appare molto più diffusa, approssim. rotonda con Ø < 30"; una stellina brillante si trova 1' a S della coppia.
MCG+9-13-1A	gx	07h27m13s	+52°56.6'		Lyn	24"	ottima / buono	costituisce assieme alla precedente una coppia ravvicinata di deboli gx — 450x.
MCG+9-13-18	gx	07h35m22s	+54°51.0'		Lyn	16"	ottima / m. buono	nella posizione segnata appare solo una stellina brillante, circonfusa da una tenue lattescenza, che però potrebbe essere imputabile a un effetto di diffusione; ci sono 2 stelline appena percettibili a 380x: una a 45" verso W e l'altra a 1' SW.
MCG+9-13-29	gx	07h40m54s	+54°26.8'		Lyn	28"	m. buona / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta subito a W di una stellina — 495x.
MCG+9-13-31	gx	07h41m04s	+54°25.8'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale evidente, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
MCG+9-13-35	gx	07h42m47s	+54°00.3'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE e una più evidente a 1' NNW — 495x.
MCG+9-13-44	gx	07h45m34s	+52°58.3'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina subito a E — 495x.
MCG+9-13-45	gx	07h45m43s	+53°42.4'		Lyn	16"	ottimo/ buono	debolissima, appare solo in visione distolta a 380x, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10".
MCG+9-13-46	gx	07h45m44s	+51°01.1'		Lyn	28"	m. buona / buono	è un'elusiva lama di luce visibile solo a tratti in visione distolta, estesa sì e no una 30-ina di secondi e orientata da E a W; c'è una stellina subito a SE — 495x.
MCG+9-13-62	gx	07h49m27s	+52°02.5'		Lyn	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata verso il margine orientale dell'ammasso **AGC 595**) — 495x.
MCG+9-13-67	gx	07h50m03s	+56°46.2'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø di 35"-40" e piccolo nucleo quasi stellare visibile a 380x.
MCG+9-13-76	gx	07h52m28s	+55°38.2'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare evidente — 450x.
MCG+9-13-89	gx	07h54m51s	+55°36.0'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 340x, orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20".
MCG+9-13-103	gx	08h00m34s	+56°37.0'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale molto tenue — 495x.
MCG+9-13-111	gx	08h02m31s	+56°30.9'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	si separa a fatica dalla successiva, insieme alla quale forma una coppia serrata orientata da E a W — la 1ª è piccola, rotonda con Ø diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale visibile a tratti; la 2ª è più debole e non più estesa di 15" — 495x.
MCG+9-13-112	gx	08h02m34s	+56°30.9'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	v. **MCG+9-13-111**
MCG+9-14-11	gx	08h12m08s	+52°54.7'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a un paio di primi verso N — 495x.
MCG+9-14-24	gx	08h18m37s	+56°34.4'		Lyn	28"	buona / buono	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 495x.
MCG+9-14-33	gx	08h21m01s	+55°12.0'		Lyn	28"	buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo S — 495x.
MCG+9-15-13	gx	08h44m54s	+55°03.2'		UMa	16"	ottima / buono	fa parte del quintetto di CGCG 263-80 — molto debole e molto piccola, con Ø max di 25"-20"; si vede abbastanza bene in visione distolta a 380x.
MCG+9-15-76	gx	09h01m06s	+52°39.0'		UMa	16"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, di 20" max di Ø; salta fuori in visione distolta, a 380x, a 1.5 S di una stellina brillante.
MCG+9-16-41	gx	09h45m52s	+54°54.5'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto rotondo di max 25"-30" visibile a tratti in visione distolta a 380x; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NE che fa parte di un piccolo triangolo rettangolo facilmente visibile nel campo oculare.
MCG+9-16-50	gx	09h47m50s	+54°23.5'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 380x, probabilmente rotonda con Ø di 20"-25"; è la componente più debole di un quintetto.
MCG+9-17-24	gx	10h06m22s	+52°48.8'		UMa	16"	ottima / m. buono	fa parte di un terzetto, assieme alle due successive — molto debole, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di 25"-30"; c'è una stellina a 1.5 NE — 270x.
MCG+9-17-25	gx	10h06m35s	+52°56.5'		UMa	16"	ottima / m. buono	fa parte di un terzetto, assieme alla precedente e alla successiva — è la più evidente delle 3, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 270x.
MCG+9-17-26	gx	10h07m31s	+52°53.6'		UMa	16"	ottima / m. buono	fa parte di un terzetto, assieme alle due precedenti — è la più elusiva delle 3, diffusa, con Ø di almeno 40" — 270x.
MCG+9-17-62	gx	10h43m47s	+53°06.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **UGC 5615** situata a ridosso verso N e solo appena più brillante; è comunque di dimensioni simili e presenta nucleo stellare abbastanza evidente in visione distolta — 380x.
MCG+9-18-5	gx	10h38m12s	+53°48.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo esteso 20" o 25" e situato a ~ 1' S di una debole stellina; è molto difficile a 380x perché a questi ingrandimenti il campo è virtualmente depleto.
MCG+9-18-37	gx	10h50m14s	+51°56.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola relativamente compatta, grosso modo rotonda con Ø di 10"-12" — 495x.
MCG+9-18-56	gx	10h54m58s	+53°04.0'		UMa	16"	ottimo / ottimo	debolissima e di forma indistinta, molto piccola, grosso modo con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
MCG+9-18-57	gx	10h55m44s	+53°51.5'		UMa	28"	ottima / m. buono	è un debolissimo baffo di luce esteso < 20", orientato da NE a SW e situato a ridosso N di una stellina brillante che ne disturba un po' l'osservazione — 495x.
MCG+9-18-58	gx	10h55m59s	+53°50.3'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante un paio di primi a WNW — 495x.
MCG+9-18-81	gx	11h03m21s	+55°40.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto rotondo che appare con gran difficoltà in visione distolta a 380x in un campo depleto; forma un triangolo isoscele con 2 debolissime stelline situate 3' a ENE e 2.5' SE.
MCG+9-18-87	gx	11h07m08s	+55°11.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme; è di forma indistinta, ma a 380x non sembra più estesa d 30".
MCG+9-18-89	gx	11h08m00s	+55°52.8'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
MCG+9-18-92	gx	11h09m12s	+53°21.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' NW e una di luminosità simile a un paio di primi verso S — 495x.
MCG+9-18-101	gx	11h11m54s	+52°04.1'		UMa	24"	buona / m. buono	molto piccola, debolissima e diffusa, a tratti condensata, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15" (la visione è molto disturbata dalla SAO 27943 di 8ª grandezza situata a < 2' a S) — 450x.
MCG+9-19-1	gx	11h12m56s	+55°41.0'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, più che altro difficile da trovare a causa della mancanza di riferimenti nelle immediate vicinanze; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 495x.
MCG+9-19-12	gx	11h14m20s	+53°33.2'		UMa	28"	ottima / m. buono	è un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi e orientato da N a S; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W, mentre una stella brillante di 10ª grandezza si trova a 2.5' NW — 495x.
MCG+9-19-14	gx	11h14m58s	+54°57.7'		UMa	20"	ottima / ottimo	è un piccolo e debolissimo oggetto che a tratti in visione distolta sembra aggettare verso S da una stellina di 14-esima; sono riuscito a scovarla solo col 50 cm di Michele Bini a circa 300x (nel mio 40 non era visibile); è situata 3.8' SSE dal centro della Owl Nebula.
MCG+9-19-16	gx	11h15m24s	+54°26.7'		UMa	16"	m. buona / discreto	debolissima chiazza rotonda di ~ 30" di Ø e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
MCG+9-19-20	gx	11h16m02s	+53°49.4'		UMa	28"	ottima / m. buono	sarebbe una galassietta relativamente facile se non fosse situata in una piccola zona depleta; rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e con evidente condensazione centrale — 495x.
MCG+9-19-23	gx	11h16m44s	+54°42.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	forma un terzetto con le 2 successive, ma si localizza con un certa difficoltà a causa della mancanza di riferimenti — diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina a 1.5' verso N *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-24	gx	11h16m50s	+54°43.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	di aspetto più uniforme della precedente, rotonda di Ø simile; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso W *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-25	gx	11h16m47s	+54°45.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	è la più debole del terzetto, relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-27	gx	11h17m31s	+51°58.0'		UMa	16"	m. buona / discreto	debolissima, tuttavia in visione distolta appare, seppur a tratti, allungata da N a S con dimensioni 30"×15", ma è meglio spingere a 380x.
MCG+9-19-28	gx	11h17m34s	+50°44.7'		UMa	16"	m. buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta a 270x, estesa non più di 20"; la visione non migliora spingendo a 380x.
MCG+9-19-31	gx	11h17m53s	+54°38.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10" o poco più *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-33	gx	11h18m09s	+54°50.5'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-36	gx	11h18m32s	+53°48.8'		UMa	16"	m. buona / discreto	piccolo e debolissimo oggetto rotondo a tratti condensato e con Ø di max 30"; è meglio visibile a 380x.
MCG+9-19-37	gx	11h18m40s	+55°10.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda, con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme; a 380x il campo è molto povero, ma salta fuori un gruppetto abbastanza serrato di 5 stelline a S della gx e orientato da E a W.
MCG+9-19-39	gx	11h19m31s	+54°27.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×15" *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-52	gx	11h22m25s	+53°41.3'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1.5' NE *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-56	gx	11h23m02s	+53°41.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-58	gx	11h23m13s	+51°11.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale — 495x.
MCG+9-19-59	gx	11h23m16s	+53°47.3'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e con nucleo stellare percettibile a momenti, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×13", ossia con rapporto di 3:1 *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-64	gx	11h23m39s	+53°49.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	sorta di debolissimo rigonfiamento al bordo meridionale di NGC 3656 che tende a fondersi con la gx principale *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+9-19-67	gx	11h24m07s	+55°59.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso verso S e una più debole subito a NW — 495x.
MCG+9-19-69	gx	11h24m38s	+52°32.0'		UMa	16"	ottima / m. buono	è un elusiva lama di luce estesa per ~ 1' e orientata da NE a SW (mi sono dovuto aiutare col 13.8mm) — 270x.
MCG+9-19-71	gx	11h25m22s	+52°04.8'		UMa	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto rotondo molto piccolo ed esteso max 20" che appare solo a tratti in visione distolta a 380x.
MCG+9-19-72	gx	11h25m35s	+52°32.8'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima, quasi elusiva, situata a in una piccola zona depleta; è un oggetto rotondo, di 35" o 40" di Ø (mi sono dovuto aiutare col 13.8 mm per meglio identificare il campo stellare) — 270x.
MCG+9-19-77	gx	11h26m37s	+55°21.4'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente — 495x.
MCG+9-19-80	gx	11h27m34s	+51°54.8'		UMa	16"	ottimo / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta; a 380x appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1.5 SE (le 2 stelline brillanti in mezzo alle quali si trova la gx sono praticamente agli estremi del campo oculare).
MCG+9-19-85	gx	11h28m46s	+52°14.9'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 30" e leggermente condensata — 270x.
MCG+9-19-87	gx	11h29m16s	+51°31.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce appena più brillante all'interno (anzi, il bulge è il primo che appare) che in visione distolta appare estesa per oltre 1' in direzione N-S — 380x.
MCG+9-19-89	gx	11h29m23s	+55°19.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale stellare molto evidente; c'è una stellina a ridosso NE; una stellina percettibile solo a momenti appare al bordo SE, ma si tratta in realtà di PGC 3094719 — 495x.
MCG+9-19-90	gx	11h29m24s	+52°28.9'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N e una più debole alla stessa distanza verso NW — 495x.
MCG+9-19-98	gx	11h30m51s	+52°12.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole e poco diffusa, con piccolo bulge di aspetto quasi stellare, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' SE; meglio osservabile a 270x.
MCG+9-19-99	gx	11h30m50s	+54°23.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole, estesa 40"-45" che sembra aggettare a NE di una stellina abbastanza brillante; la SAO 28038 di 6ª grandezza situata a 6' SW si riesce comunque a tenere fuori campo — 495x.
MCG+9-19-107	gx	11h32m23s	+54°59.0'		UMa	16"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, estesa ~ 30" e con condensazione centrale visibile a tratti; appare in visione distolta a 1' SE di una stellina abbastanza brillante — 270x.
MCG+9-19-108	gx	11h32m19s	+55°55.3'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto difficile, quasi elusiva, salta fuori a momenti in visione distolta a 270x con dimensioni di max 30".
MCG+9-19-110	gx	11h32m23s	+55°58.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debolissima, piccola e molto diffusa, salta fuori solo a tratti in visione distolta a 380x; sembra comunque poco più evidente della precedente.
MCG+9-19-121	gx	11h34m38s	+54°59.5'		UMa	16"	ottimo/ scarso	è una gx elusiva, piccola e diffusa che appare solo a tratti in visione distolta — 188x.
MCG+9-19-133	gx	11h36m37s	+51°00.1'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20" (poco meno della distanza delle 2 stelline situate a S) — 380x.
MCG+9-19-137	gx	11h37m04s	+55°34.9'		UMa	16"	m. buona / discreto	è un debolissimo baffo molto diffuso che sembra protrudere per 20" o 30" a NW di una stellina brillante — 270x.
MCG+9-19-158	gx	11h42m27s	+54°47.5'		UMa	16"	m. buona / discreto	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta, estesa un 20-ina di secondi; è situata a quasi a ridosso SE di una stellina brillante — 270x.
MCG+9-19-160	gx	11h42m27s	+54°49.1'		UMa	16"	m. buona / discreto	molto debole, leggermente allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale — 270x.
MCG+9-19-170	gx	11h44m31s	+53°41.0'		UMa	16"	ottima / m. buono	è una debolissima galassietta immersa nei bagliori della SAO 28119 di 8.7 e situata a neppure 2' SE, molto piccola, con dimensioni non superiori a 15" o 20" — 380x.

MCG+9-19-173	gx	11h45m06s	+53°38.9'		UMa	16"	ottima / m. buono	anche questa è debolissima e diffusa, osservabile solo in visione distolta, approssim. rotonda con Ø di 30" — 380x.
MCG+9-19-181	gx	11h47m20s	+55°41.0'		UMa	16"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale evidente; appare senza difficoltà nonostante la presenza della SAO 28142 di 5ª grandezza situata 5' a SW — 270x.
MCG+9-19-183	gx	11h47m19s	+56°02.2'		UMa	16"	m. buona / buono	è un'elusiva macchiolina rotonda estesa 20" o 30" che appare solo a tratti in visione distolta a 380x.
MCG+9-19-190	gx	11h48m00s	+55°45.7'		UMa	16"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~ 40"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S — meglio osservabile a 188x in quanto il campo oculare è quasi depleto — 270x.
MCG+9-19-201	gx	11h49m12s	+55°42.0'		UMa	16"	m. buona / discreto	si separa con gran difficoltà da MCG+9-19-202 a 270x; le 2 gx sono molto piccole, estesa max 20"e sono allineate con una stellina situata a W; la 1ª presenta una condensazione centrale molto tenue visibile a momenti.
MCG+9-19-202	gx	11h49m15s	+55°42.0'		UMa	16"	m. buona / discreto	v. **MCG+9-19-201**
MCG+9-19-203	gx	11h49m25s	+52°17.4'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di 30" e nucleo stellare osservabile a 380x.
MCG+9-19-213	gx	11h50m32s	+55°03.4'		UMa	16"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 50"×20" — 270x.
MCG+9-20-41	gx	11h56m56s	+55°30.6'		UMa	16"	ottimo/ scarso	è un piccolo oggetto diffuso, molto debole di dimensioni massime di 30" — 188x.
MCG+9-20-58	gx	12h00m16s	+52°40.1'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto rotondo di una 30-ina di secondi di Ø; salta fuori in visione distolta quando si fissa la coppia di deboli stelline a SE con le quali la galassia è allineata — 380x.
MCG+9-20-64	gx	12h01m05s	+56°22.2'		UMa	16"	ottima / m. buono	è un elusivo oggetto rotondo di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme che appare a tratti in visione distolta a 380x.
MCG+9-20-66	gx	12h01m20s	+54°14.1'		UMa	16"	m. buona / discreto	è un debolissimo oggetto pressoché circolare, con Ø di 20"-25" che in visione distolta appare a ~ 1.5' N di una stellina brillante — 270x.
MCG+9-20-70	gx	12h03m19s	+54°51.5'		UMa	16"	ottima / m. buono	assieme a M+9-20-73 forma una coppia di debolissime gx rotonde, molto piccole e condensate con Ø di 15"-20"; la 2ª è poco più evidente; c'è una stellina appena percettibile, a 380x, a ~ 40" NW della 1ª.
MCG+9-20-72	gx	12h03m12s	+51°48.8'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto rotondo di ~ 20" di Ø che appare tuttavia senza difficoltà in visione distolta a 380x.
MCG+9-20-73	gx	12h03m26s	+54°52.1'		UMa	16"	ottima / m. buono	v. **MCG+9-20-70**
MCG+9-20-74	gx	12h03m28s	+51°42.9'		UMa	16"	ottima / m. buono	assieme a MCG+9-20-75 forma un'altra coppia di debolissime galassiette rotonde visibili con difficoltà a 380x e distanti ~ 1' in direzione NE-SW e con Ø di una 20-ina di secondi; il 1º è poco più evidente.
MCG+9-20-75	gx	12h03m32s	+51°43.6'		UMa	16"	ottima / m. buono	v. **MCG+9-20-74**
MCG+9-20-83	gx	12h04m53s	+54°13.9'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, a 380x appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30".
MCG+9-20-97	gx	12h07m09s	+53°40.3'		UMa	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 30" e con una stellina a ridosso verso SE — 380x.
MCG+9-20-114	gx	12h13m10s	+50°45.6'		UMa	16"	m. buona / buono	debolissima e condensata, a tratti appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 380x.
MCG+9-20-127	gx	12h15m11s	+54°38.0'		UMa	16"	buona / mediocre	oggetto molto piccolo e debole, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 188x.
MCG+9-20-155	gx	12h21m55s	+55°48.3'		UMa	16"	m. buona / discreto	assieme a MCG+9-20-157 forma una coppia di oggetti molto deboli di aspetto e dimensioni del tutto simili, relativamente compatti, rotondi, con Ø di ~ 20" e con nucleo stellare visibile a tratti in visione distolta; sono distanti 4' in direzione NE-SW — 270x.
MCG+9-20-157	gx	12h22m07s	+55°49.1'		UMa	16"	m. buona / discreto	v. **MCG+9-20-155**
MCG+9-20-180	gx	12h26m44s	+56°04.2'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce orientata da N a S ed estesa ~ 1'; meglio visibile a 270x.
MCG+9-21-3	gx	12h30m18s	+51°08.9'		CVn	28"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta, forse rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
MCG+9-21-6	gx	12h30m40s	+51°08.2'		CVn	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø < 30"; poco disturbata da una stellina brillante situata subito a NE — 495x.
MCG+9-21-26	gx	12h38m30s	+53°27.3'		UMa	28"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con 3 stelline a NE di luminosità assai diseguale: quella più vicina alla gx è abbastanza brillante, mentre quella più a NE è luminosa; in mezzo a queste ce n'è una di 15-esima — 495x.
MCG+9-21-27	gx	12h40m45s	+53°07.2'		UMa	24"	buona / ottimo	molto debole, appare in visione distolta tra una stellina brillante a W e una più debole a E, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+9-21-29	gx	12h42m31s	+53°12.3'		UMa	24"	buona / ottimo	chiazza diffusa molto debole e stemperata sul fondo cielo, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
MCG+9-21-32	gx	12h42m53s	+55°08.7'		UMa	24"	buona / ottimo	lama di luce molto debole e uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1' — 450x.
MCG+9-21-34	gx	12h43m48s	+54°53.7'		UMa	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **UGC 7905** situata a ridosso NNE — relativamente brillante e compatta, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MCG+9-21-36	gx	12h44m22s	+56°01.1'		UMa	28"	buona / buono	piccola e debolissima, appare elusivamente e solo a momenti a S di una debole stellina; non dovrebbe essere più estesa di 20" — 495x.
MCG+9-21-46	gx	12h46m42s	+50°43.5'		Cvn	24"	buona / ottimo	lama di luce debolissima, ma relativamente compatta, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+9-21-69	gx	12h56m42s	+53°39.3'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole e molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a SE — 495x.
MCG+9-21-70	gx	12h57m45s	+53°38.3'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 495x.
MCG+9-21-73	gx	12h58m48s	+50°32.5'		CVn	16"	m. buona / discreto	è un elusivo oggetto, molto piccolo, esteso non più di 20"; appare a tratti in visione distolta a 3' o 4' a N di una stellina brillante; meglio visibile a 270x.
MCG+9-21-79	gx	12h59m44s	+51°26.4'		CVn	16"	m. buona / discreto	debolissima, quasi elusiva, piccola, estesa anche questa per max 20" che appare solo a tratti in visione distolta a 380x.
MCG+9-22-33	gx	13h13m51s	+51°57.7'		CVn	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 495x.
MCG+9-22-34	gx	13h14m10s	+51°59.6'		CVn	28"	m. buona / buono	poco più debole della precedente, in visione distolta appare anch'essa orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" e di luminosità uniforme — 495x.
MCG+9-22-38	gx	13h16m00s	+52°53.5'		UMa	24"	buona / ottimo	appare elusivamente a 1' NW di una debole stellina; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe comunque essere più estesa di 15" o 20" — 450x.
MCG+9-22-40	gx	13h16m37s	+52°54.8'		UMa	24"	buona / ottimo	piccola e debolissima, poco diffusa, orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; situata a 1.5' SE di UGC 8347 — 450x.
MCG+9-22-47	gx	13h19m48s	+52°04.0'		CVn	16"	m. buona / discreto	assieme a MCG+9-22-48 forma una coppia di galassiette molto deboli distanti non più di 1' in direzione NE-SE; il 1º è più evidente, relativamente compatto, rotondo, con Ø di 20" e con nucleo stellare; il 2º è più diffuso, allungato da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
MCG+9-22-48	gx	13h19m47s	+52°04.3'		CVn	16"	m. buona / discreto	v. **MCG+9-22-47**
MCG+9-22-51	gx	13h20m12s	+51°45.9'		Cvn	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10", ma per capirne l'orientamento non bisogna scalare gli ingrandimenti; c'è una debole stellina a 1' NW — 450x.
MCG+9-22-55	gx	14h23m18s	+52°39.1'		UMa	28"	m. buona / buono	forma una coppia serrata con **UGC 8416** situata a ridosso NW e dalla quale si separa un po' a fatica a 495x — è piccola, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; sembra più che altro un'appendice della compagna.
MCG+9-22-58	gx	13h24m51s	+52°56.3'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 495x.
MCG+9-22-92	gx	13h41m18s	+52°06.1'		UMa	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+9-22-94	gx	13h41m19s	+55°40.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce, molto difficile, che appare a tratti in visione distolta, orientata da N a S per ~ 45" — 380x.
MCG+9-23-27	gx	14h02m26s	+51°12.3'		UMa	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, appare senza problemi in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti; c'è una stellina brillante a 1.5' SE e una più debole alla stessa distanza verso N — 450x.
MCG+9-23-48	gx	14h10m08s	+54°55.2'		UMa	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+9-23-54	gx	14h11m44s	+54°02.1'		UMa	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW e una doppia stretta alla stessa distanza verso NW — 450x.
MCG+9-24-3	gx	14h22m31s	+56°15.1'		UMa	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MCG+9-24-15	gx	14h33m05s	+56°17.5'		Dra	28"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
MCG+9-24-17	gx	14h34m10s	+54°04.7'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+9-24-18	gx	14h34m29s	+51°14.9'		Boo	28"	m. buona / m. buono	molto debole e situata in una piccola plaga senza riferimenti significativi, a parte una stellina brillante situata oltre 5' a E; in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile a un paio di primi NE — 495x.
MCG+9-24-19	gx	14h34m27s	+54°28.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a tratti in visione distolta a ~ 30" E di una debole stellina; forse rotonda con Ø max di 20" — 450x.
MCG+9-24-21	gx	14h34m49s	+55°08.4'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; situata in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti distanti 1.5' in direzione NE-SW — 495x.
MCG+9-24-22	gx	14h36m46s	+51°27.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 30" scarsi — 450x.
MCG+9-24-24	gx	14h37m35s	+51°35.0'		Boo	24"	ottima / ottimo	piccola , diffusa e poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata a ridosso NE di NGC 5707) — 450x.
MCG+9-25-29	gx	15h10m06s	+56°22.6'		Dra	16"	buona / mediocre	è una piccola macchiolina rotonda di luminosità uniforme e con Ø di 20", situata a ridosso di una stellina; quest'ultima fa parte di un trapezio regolare con le basi orientate in direzione NW-SE che salta fuori subito quando si cerca la galassia — 270x.
MCG+9-24-43	gx	14h50m03s	+52°24.4'		Boo	24"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare facilmente anche in visione diretta fra i bagliori della SAO 29303 di 7ª grandezza situata ad appena 1.5' verso E — 450x.
MCG+9-24-55	gx	14h54m35s	+55°03.2'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debolissimo, baffo di luce esteso una 40-ina di secondi in direzione NE-SW, appare abbastanza facilmente in visione distolta in mezzo a 2 stelline orientate nello stesso modo; la visione è comunque un po' disturbata dalla SAO 29332 di 9ª grandezza situata un paio di primi a SSW — 495x.
MCG+9-24-56	gx	14h54m35s	+55°06.2'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e condensata, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 495x.
MCG+9-24-51	gx	14h53m15s	+56°09.7'		Dra	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa almeno 1; c'è una stellina a ridosso SE: questa fa parte di un esagono schiacciato e orientato da N a S e comprende una componente brillante situata 2' a SW della galassia che disturba un po' l'osservazione; meglio non scendere sotto i 450x.
MCG+9-25-4	gx	14h59m53s	+54°37.1'		Boo	24"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 40"×20" — 450x.
MCG+9-25-6	gx	15h02m45s	+53°30.6'		Boo	24"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con MCG+9-25-7 — a prima vista si fondono in un unico oggetto orientato da NE a SW ed esteso 40"×20"; ma osservando attentamente e forzando a 580x si riescono a distinguere abbastanza chiaramente i due nuclei quasi stellari.
MCG+9-25-7	gx	15h02m46s	+53°30.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	v. **MCG+9-25-6**
MCG+9-25-8	gx	15h04m22s	+50°41.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a poco più di 1' verso S — 450x.
MCG+9-25-35	gx	15h12m52s	+51°23.9'		Boo	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva — relativamente facile poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 495x.
MCG+9-25-36	gx	15h12m51s	+51°23.5'		Boo	28"	m. buona / m. buono	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; salta fuori in visione distolta quando si fissa lo sguardo sulla gx precedente — 495x.
MCG+9-25-37	gx	15h14m00s	+55°32.4'		Dra	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG+9-25-48	gx	15h24m36s	+54°44.9'		Dra	16"	m. buona / discreto	molto piccola, debole e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è disturbata dalla luce di una stellina abbastanza brillante (che fa parte di un piccolo triangolo) situata a ridosso verso E — 380x.
MCG+9-26-6	gx	15h40m28s	+53°30.7'		Dra	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata 1' a SE — sono entrambe deboli, molto diffuse e con condensazione centrale di aspetto stellare e rotonde; la 1ª è più grande, con Ø < 40", mentre la 2ª non è più estesa di 20"; non sembrano disturbate da stella di 10ª grandezza situata un paio di primi a NE della coppia (questa fa parte di una catena di 4 stelle brillanti orientata da E a W) — 495x.
MCG+9-26-8	gx	15h40m34s	+53°30.1'		Dra	28"	m. buona / m. buono	v. **MCG+9-26-6**
MCG+9-26-10	gx	15h40m46s	+55°08.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+9-26-11	gx	15h40m51s	+55°01.2'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MCG+9-26-29	gx	15h55m34s	+53°02.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale molto tenue; c'è una brillante stella di 10ª grandezza (che in realtà è una doppia serrata) un paio di primi a W e una più debole a 1' verso E (la più debole di un piccolo triangolo molto aperto) — 495x.
MCG+9-26-30	gx	15h56m10s	+53°01.3'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×15"; c'è una stellina a 1' NE — 495x.
MCG+9-26-38	gx	15h58m49s	+52°45.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole, ma più che altro disturbata da una stella brillante di 9ª grandezza situata un paio di primi a N; allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 495x.
MCG+9-26-45	gx	16h01m23s	+53°52.0'		Dra	16"	buona / mediocre	debolissimo oggetto, molto piccolo, esteso 15" o 20" che appare solo in visione distolta a ~ 2.5' E di una stellina — 270x.
MCG+9-26-47	gx	16h01m28s	+53°56.8'		Dra	16"	buona / mediocre	più facile di MCG+9-26-45, si vede senza problemi in visione distolta, relativamente compatta con Ø di una 20-ina di secondi — 270x.
MCG+9-26-49	gx	16h03m30s	+52°15.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; disturbata dalla SAO 29778 di 8a grandezza situata ad appena 1' SW — 450x.
MCG+9-26-52	gx	16h05m38s	+55°37.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio evidente scalando a 340x.
MCG+9-26-55	gx	16h05m52s	+55°38.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, salta fuori in visione distolta quando si osserva MCG+9-26-55 dalla quale dista 2.5' a NE; è piccola, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MCG+9-26-62	gx	16h11m14s	+51°11.5'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"×15"; c'è una coppia di deboli stelline 1' a S (subito sotto il confine con Ercole) orientate da NE a SW; una debole stellina si trova 1' scarso a NE della gx — 495x.
MCG+9-26-65	gx	16h11m26s	+55°55.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
MCG+9-27-8	gx	16h16m53s	+50°57.1'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a NNE; a poco più di 1' NE ce n'è invece una abbastanza brillante — 495x.
MCG+9-27-11	gx	16h16m57s	+50°55.9'		Dra	28"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratto molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 495x.
MCG+9-27-14	gx	16h19m35s	+52°29.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata 1' a E — sono entrambe molto piccole, rotonde con Ø di ~ 20": la 1ª è più evidente, nonostante la maggior vicinanza a una stella brillante di 10ª grandezza situata 1' scarso a W — 495x.
MCG+9-27-15	gx	16h19m44s	+52°29.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	v. **MCG+9-27-14**
MCG+9-27-16	gx	16h19m46s	+52°33.2'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
MCG+9-27-17	gx	16h19m54s	+51°32.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia molto serrata e sbilanciata in luminosità a un paio di primi NW — 450x.
MCG+9-27-18	gx	16h20m51s	+53°32.4'		Dra	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso E — 495x.
MCG+9-27-20	gx	16h21m18s	+51°33.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MCG+9-27-22	gx	16h21m45s	+54°41.2'		Dra	24"	m. buona / m. buono	è un piccolo e debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 20-ina di secondi; appare come tale solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+9-27-23	gx	16h21m48s	+54°39.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MCG+9-27-26	gx	16h22m18s	+51°09.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, ma è meglio scalare a 340x.
MCG+9-27-30	gx	16h23m08s	+55°47.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-12".
MCG+9-27-65	gx	16h42m05s	+54°41.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 495x.
MCG+9-27-66	gx	16h42m28s	+52°48.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×15" — 495x.
MCG+9-27-81	gx	16h47m03s	+53°33.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG+9-27-82	gx	16h47m09s	+53°56.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" con bulge esteso ed evidente; c'è una stellina a 1' scarso NE — 495x.
MCG+9-27-85	gx	16h47m33s	+53°51.7'		Dra	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, ma con basso gradiente di luce, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' scarso NW — 495x.
MCG+9-27-86	gx	16h47m54s	+52°32.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
MCG+9-27-88	gx	16h48m23s	+53°59.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole e relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con tenue condensazione centrale — 495x.
MCG+9-27-89	gx	16h48m31s	+53°58.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
MCG+9-27-91	gx	16h49m08s	+53°23.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	assieme alle tre successive e a CGCG 276-45 fa parte di una stringa di 5 minuscole galassiette molto deboli orientata da N a S — questa è molto debole con Ø di 12"-15" — 450x.
MCG+9-27-92	gx	16h49m13s	+53°24.3'		Dra	24"	m. buona / discreto	più debole e diffusa della precedente, dalla quale dista 1' a NNE, e con Ø simile — 450x.
MCG+9-27-95	gx	16h49m15s	+53°26.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, con Ø di max 10"; è situata ad appena 1' NW dalla SAO 30113 di magnitudo 8.7 — 450x.
MCG+9-27-96	gx	16h49m11s	+53°26.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	di aspetto quasi stellare; se non è una stellina dovrebbe avere un Ø di pochi secondi — 450x.
MCG+9-27-103	gx	16h50m52s	+53°38.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto piccola, relativamente facile e condensata, rotonda con Ø max di 15"; più evidente di CGCG 276-52 situata 1.5' WNW — 450x.
MCG+9-28-44	gx	17h24m08s	+53°20.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S; una stellina più brillante si trova a 1.5' verso N — 495x.
MCG+9-29-12	gx	17h37m08s	+54°12.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme c'è una stellina a 1' SSW (forma una coppia ravvicinata con **CGCG 278-10**) — 495x.
MCG+9-29-27	gx	17h45m13s	+55°38.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale appena percettibile; situata tra due stelline orientate da N a S — 450x.
MCG+9-29-28	gx	17h45m30s	+55°33.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 450x.
MCG+9-29-33	gx	17h48m49s	+55°06.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente; allineata ed equidistante con una coppia di stelline a NW (quella più vicina alla gx è molto debole) — 495x.
MCG+9-29-34	gx	17h48m58s	+55°09.2'		Dra	28"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 45" — 495x.
MCG+9-29-37	gx	17h50m06s	+56°40.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con **MCG+9-29-40** situata a ridosso SW; le due gx si separano facilmente a 450x; sono entrambe rotonde: la 1a ha un Ø di 20"-25" e presenta un nucleo stellare; la compagna è molto piccola, con Ø circa la metà e di aspetto uniforme.
MCG+9-29-39	gx	17h49m49s	+56°38.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; ce una stellina a ridosso NE — 450x.
MCG+9-29-40	gx	17h50m04s	+56°40.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG+9-29-37**
MCG+9-29-43	gx	17h54m54s	+56°30.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 40"; situata tra due stelline: una a 1' W e l'altra più debole alla stessa distanza verso E — 450x.
MCG+9-29-44	gx	17h54m40s	+56°31.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
MCG+9-29-48	gx	18h03m43s	+55°45.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina appena percettibile al bordo W; situata tra due stelline orientate da N a S e distanti 3' — 450x.
MCG+9-30-3	gx	18h10m54s	+54°23.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole e molto disturbata dalla SAO 30784 di 6a grandezza situata 7' a SSW e che si fatica un poco a tenere fuori campo; appare a tratti allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20"; ci sono 3 stelline allineate da E a W subito a E della gx: quella centrale è tuttavia risultata essere la PGC 3087115 — 450x.
MCG+9-30-23	gx	18h35m59s	+51°27.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG+9-31-1	gx	18h45m11s	+51°49.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+9-31-3	gx	18h45m16s	+55°02.3'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo, di forma indistinta ed estesa per una 40-ina di secondi; salta fuori in visione distolta quasi a ridosso S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MCG+9-31-5	gx	18h46m26s	+54°17.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissimo lucore che aggetta verso N per una 30-ina di secondi dalla SAO 31164 di 10ª grandezza che tende a offuscarla quasi completamente; occorre infatti fare attenzione a isolarla dall'alone prodotto dalla stella stessa — 450x.
MCG+9-31-13	gx	18h59m39s	+55°55.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; a tratti allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15".
MCG+9-31-16	gx	19h04m16s	+51°09.3'		Dra	28"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' SE e una poco più brillante e più distante verso N — 495x.
MCG+9-31-18	gx	19h04m54s	+55°13.5'		Dra	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso S; poco disturbata dalla SAO 31369 di 9ª grandezza situata un paio di primi a NNW — 495x.
MCG+9-31-24	gx	19h10m17s	+55°11.0'		Cyg	28"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 495x.
MCG+9-31-29	gx	19h15m42s	+52°24.9'		Cyg	28"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con bulge molto tenue visibile solo a momenti; c'è una stellina subito a NW e una più debole alla stessa distanza verso NE — 495x.
MCG+9-32-3	gx	19h26m15s	+51°06.9'		Cyg	28"	ottima / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare molto tenue — 495x.
MCG+9-32-11	gx	19h43m34s	+53°10.5'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare molto evidente (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta); c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S — 450x.
MCG+9-32-13	gx	19h43m42s	+56°23.8'		Cyg	28"	buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N — 495x.
MCG+9-39-27	gx	18h36m51s	+51°26.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
MCG+10-11-57	gx	07h29m42s	+59°04.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi c'è una stellina abbastanza brillante subito a S e una debole a 1' SW — 495x.
MCG+10-11-59	gx	07h29m51s	+57°43.7'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MCG+10-11-86	gx	07h34m37s	+57°31.0'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con evidente condensazione centrale — 495x.
MCG+10-11-87	gx	07h34m50s	+57°54.7'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MCG+10-11-89	gx	07h34m55s	+57°58.0'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata 3.5' a N della precedente); c'è una stellina subito a NE — 495x.
MCG+10-11-92	gx	07h36m19s	+62°21.3'		Cam	16"	ottima / ottimo	è debolissima, ma appare senza grandi difficoltà in visione distolta a 380x; è grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG+10-11-93	gx	07h36m09s	+57°26.9'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è difficile da vedere, perché si trova in mezzo a 3 stelline (a N, S ed E) che le sembrano "appiccicate" (purtroppo non dispongo di un ingrandimento superiore) — 495x.
MCG+10-11-123	gx	07h41m44s	+57°13.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di 12"-15"; equidistante, ma non allineata con due stelline a W; una stellina appena percettibile si trova a ridosso W — 495x.
MCG+10-12-2	gx	07h52m38s	+61°56.8'		Cam	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
MCG+10-12-22	gx	07h56m50s	+60°16.5'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	è debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; si tratta comunque di un oggetto esteso non più di 15"-20".
MCG+10-12-36	gx	07h58m14s	+58°32.4'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	non è difficile da vedere a 380x; è un minuscolo oggetto rotondo di 10"-15" con nucleo stellare; c'è una stellina subito a SE.
MCG+10-12-37	gx	07h58m22s	+59°04.0'		Lyn	28"	m. buona / scarso	debolissima chiazza che appare tutto sommato senza difficoltà in visione distolta, ma nonostante il seeing è meglio spingere a 495x; solo a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20".
MCG+10-12-43	gx	07h59m34s	+59°10.8'		Lyn	28"	m. buona / scarso	molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 388x.
MCG+10-12-47	gx	07h59m52s	+58°37.0'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
MCG+10-12-59	gx	08h02m00s	+56°55.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva — piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MCG+10-12-60	gx	08h02m05s	+56°55.0'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la precedente — relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con evidente condensazione centrale — 495x.
MCG+10-12-73	st?	08h07m03s	+62°03.1'		Cam	24"	ottima / m. buono	nella posizione riportata dal Megastar si nota una bella doppia stretta dalle componenti brillanti; una 3ª stellina appena percettibile si trova a ridosso SE — 450x.
MCG+10-12-78	gx	08h09m11s	+57°41.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte del sestetto di NGC 2521 — debolissima chiazza di luce, piccola e di forma indistinta, estesa una 30-ina di secondi e situata a ~ 1.5' SE di una stellina — 380x.
MCG+10-12-86	gx	08h12m28s	+58°15.7'		Lyn	28"	buona / buono	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata, ma non equidistante, con due deboli stelline a E; una stellina abbastanza brillante si trova un paio di primi a WSW — 495x.
MCG+10-12-90	gx	08h11m53s	+57°57.1'		Lyn	28"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina brillante a 1' W e una più debole a 1.5' verso N — 495x.
MCG+10-12-92	gx	08h12m58s	+57°03.0'		Lyn	16"	ottima / m. buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 380x, ma dovrebbe essere molto piccola, di max 10"-15" di dimensioni.
MCG+10-12-99	gx	08h14m37s	+58°19.9'		Lyn	28"	buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 495x.
MCG+10-12-102	gx	08h14m48s	+58°15.0'		Lyn	28"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni di 30"×20"; situata tra 2 deboli stelline orientate nello stesso modo e che con una 3ª appena percettibile a S formano un piccolo triangolo equilatero (la gx si trova praticamente al confine N dell'ammasso **AGC 634**) — 495x.
MCG+10-12-112	gx	08h16m01s	+58°20.1'		Lyn	28"	buona / buono	molto debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; forma una coppia con **PGC 23168** che appare abbastanza facilmente a ridosso verso N — 495x.
MCG+10-12-113	gx	08h16m02s	+57°57.6'		Lyn	28"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (situata verso il margine SE dell'ammasso **AGC 634**) — 495x.
MCG+10-12-117	gx	08h16m59s	+61°35.3'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
MCG+10-12-126	gx	08h19m13s	+59°44.4'		UMa	28"	buona / buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MCG+10-12-135	gx	08h24m17s	+57°17.3'		Lyn	28"	buona / buono	molto debole, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" o poco più; c'è una stellina a 1' scarso SW — 495x.
MCG+10-14-5	gx	09h22m46s	+62°01.3'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
MCG+10-14-40	gx	09h48m30s	+57°21.5'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima, diffusa, estesa una 30-ina di secondi, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stellina meno di 1' verso S e un'altra a 1' SW.
MCG+10-15-32	gx	10h12m34s	+58°14.4'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 40" e nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
MCG+10-15-107	gx	10h34m12s	+57°04.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 495x.
MCG+10-15-123	gx	10h43m35s	+58°06.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme e Ø di 20"-25" — 380x.
MCG+10-16-1	gx	10h44m17s	+60°30.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta a ridosso SE di una debole stellina — 450x.
MCG+10-16-15	gx	10h16m51s	+58°21.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ridosso N *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+10-16-20	gx	10h54m10s	+56°49.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo NW — 495x.
MCG+10-16-24	gx	10h54m44s	+56°59.0'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è un baffo di luce molto tenue, orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi (situata a ridosso E di NGC 3445) — 495x.
MCG+10-16-30	gx	10h56m29s	+56°54.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 495x.
MCG+10-16-32	gx	10h56m31s	+59°32.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+10-16-51	gx	11h05m04s	+59°39.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi a NE *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+10-16-53	gx	11h05m20s	+59°39.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10"; è situata in mezzo a 2 stelline orientate da N a S e distanti un paio di primi *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MCG+10-16-86	gx	11h13m19s	+59°56.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	è molto debole, ma relativamente compatta, si vede facilmente in visione distolta a 380x, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale molto tenue visibile solo a tratti.
MCG+10-16-87	gx	11h13m30s	+59°54.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	appare in visione distolta come una stellina sfuocata un paio di primi scarsi a N di UGC 6249 — 380x.
MCG+10-16-122	gx	11h20m58s	+56°55.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" (forma una coppia ravvicinata con la successiva situata 1' a NNW) — 495x.
MCG+10-16-123	gx	11h20m54s	+56°56.6'		UMa	28"	ottima / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con evidente condensazione centrale (forma una coppia ravvicinata con la precedente situata 1' a SSE) — 495x.
MCG+10-17-1	gx	11h28m39s	+57°39.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	è un piccolo e debole baffo di luce non più grande di mezzo primo e dai bordi molto confusi; è appena più brillante verso l'interno — 270x.
MCG+10-17-2A	gx	11h28m27s	+58°34.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima, molto piccola e di aspetto quasi stellare a bassi ingrandimenti; appare solo a momenti in visione distolta a 1' NW della coppia NGC 3690 / IC 694 — 380x.
MCG+10-17-41	gx	01h42m03s	+58°42.0'		UMa	16"	ottima / m. buono	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di 20" di Ø e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
MCG+10-17-51	gx	11h43m39s	+60°14.5'		UMa	16"	ottima / m. buono	altro debolissimo oggetto che a tratti, in visione distolta, appare poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 380x.
MCG+10-17-90	gx	11h51m23s	+62°12.2'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una doppia serrata a 1.5' NW — 450x.
MCG+10-17-93	gx	11h51m58s	+61°55.8'		UMa	24"	m. buona / ottimo	è un baffo di luce molto debole che in visione distolta sembra aggettare a S di una stellina abbastanza brillante per una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+10-18-68	gx	12h34m34s	+58°57.1'		UMa	24"	buona / m. buono	debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+10-18-70	gx	12h34m55s	+58°54.7'		UMa	24"	buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con NGC 4547 situata a ridosso NW; è un piccolo oggetto rotondo con Ø di 10"-15" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG+10-18-71	gx	12h35m12s	+59°02.9'		UMa	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante un paio di primi a NW — 450x.
MCG+10-18-82	gx	12h46m07s	+59°36.9'		UMa	28"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MCG+10-19-14	gx	13h01m14s	+58°06.7'		UMa	28"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 30" — 495x.
MCG+10-19-19	gx	13h05m23s	+61°08.2'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, poco allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e di luminosità un po' irregolare; c'è una stellina a ridosso verso SW — 380x.
MCG+10-19-26	gx	13h06m14s	+60°13.1'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' W; la visione è un po' disturbata dalla SAO SAO 15986 di 8ª grandezza situata 6' a SE e che si fatica a tenere fuori campo — 450x.
MCG+10-19-32	gx	13h06m52s	+60°11.3'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto piccole e debole, purtroppo molto disturbata dalla SAO 15986 di 8ª grandezza situata un paio di primi a S; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MCG+10-19-43	gx	13h19m20s	+57°50.8'		UMa	28"	m. buona / buono	debolissima lama di luce estesa 45" in direzione NW-SE; c'è una coppia di deboli stelline a ridosso SE — 495x.
MCG+10-19-49	gx	13h10m54s	+56°37.2'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; due stelline appena percettibili appaiono quasi a ridosso N e SW, ma queste sono poi risultate essere rispettivamente **PGC 2542965** e **2MASS 13104891+5636416**; la seconda è appena più evidente — 450x.
MCG+10-19-57	gx	13h15m31s	+62°07.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **UGC 8335** situata a una 40-ina di secondi a SE; ha dimensioni di 20"-25" ed è diffusa; è situata a SW di una coppia di stelline distanti ~ una 40-ina di secondi — 380x.
MCG+10-19-63	gx	13h21m17s	+57°53.9'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+10-19-68	gx	13h25m11s	+57°35.9'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MCG+10-20-19	st?	13h44m36s	+61°24.9'		UMa	24"	m. buona / ottimo	nella posizione segnata si vede solo una stella che forma una doppia stretta e sbilanciata con una componente brillante a SE — 450x.
MCG+10-20-24	gx	13h45m11s	+61°27.4'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa, estesa una 30-ina di secondi, situata tra due deboli stelline orientate da WNW a ESE (fanno parte di un piccolo triangolo rettangolo) — 450x.
MCG+10-20-84	gx	14h13m50s	+57°46.2'		UMa	16"	mediocre / buono	è una piccola chiazza circolare molto tenue, con Ø di una 30-ina di secondi situata a ridosso SW di NGC 5526 — 188x.
MCG+10-21-6	gx	14h32m06s	+57°57.2'		Dra	24"	m. buona / buono	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; si trova in mezzo a 2 stelle: una debole a 1' W e l'altra brillante alla stessa distanza verso WNW — 450x.

MCG+10-21-16	gx	14h36m00s	+60°29.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 495x.
MCG+10-21-18	gx	14h36m23s	+60°28.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da E a W, dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; ci sono due stelline appena percettibili a W e a S; a ridosso N della prima appare a tratti la **MAC 1036+6028** debolissima e molto piccola — 495x.
MCG+10-21-28	gx	14h43m25s	+58°53.2'		Dra	16"	ottima / ottimo	debole oggetto di luminosità uniforme, piccolo, poco allungato ~ da N a S e di dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1.5' SE — 380x.
MCG+10-21-32	gx	14h48m50s	+57°46.2'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso E — 495x.
MCG+10-21-37	gx	14h52m50s	+60°20.6'		Dra	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a SE — 450x.
MCG+10-22-2	gx	15h10m51s	+61°08.9'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S, ma quest'ultima è poi risultata essere la **PGC 1845699** — 450x.
MCG+10-22-7	gx	15h13m33s	+58°55.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; una stellina brillante a 1' scarso NW disturba un po' l'osservazione — 495x.
MCG+10-22-15	gx	15h26m38s	+60°56.6'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG+10-22-16	gx	15h26m48s	+59°15.8'		Dra	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale poco contrastata; c'è una coppia serrata di stelline appena percettibili all'interno della gx (o forse trattasi di due noduli); una stellina molto debole si trova a 1' NE — 495x.
MCG+10-23-4	gx	15h52m02s	+56°42.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+10-23-5	gx	15h52m11s	+59°14.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e a tratti appena più brillante all'interno; una sorta di stellina appare elusivamente al bordo meridionale, ma solo a momenti si "stacca" dalla compagna: è MCG+10-23-5A — 450x.
MCG+10-23-5A	gx	15h52m12s	+59°14.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG+10-23-5**
MCG+10-23-9	gx	15h56m40s	+59°47.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce estesa sì e no una 40-ina di secondi e orientata da NE a SW; appare a momenti in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MCG+10-23-10	gx	15h56m40s	+59°55.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e solo a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+10-23-11	gx	15h57m10s	+59°58.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; meglio definita scalando a 340x.
MCG+10-23-12	gx	15h59m01s	+59°24.4'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da N a S, dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' NNW — 495x.
MCG+10-23-17	gx	16h01m54s	+58°53.5'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MCG+10-23-20	gx	16h06m57s	+62°32.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce estesa grosso modo 30", orientata da NE a SW e situata a ridosso di una stellina abbastanza brillante; appare a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+10-23-29	gx	16h10m44s	+57°27.7'		Dra	24"	ottima / m. buono	è situata a ridosso SE di NGC 6088 — molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MCG+10-23-31	gx	16h11m04s	+58°39.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; meglio definita scalando a 340x.
MCG+10-23-32	gx	16h10m55s	+60°37.1'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NE (la più debole e la più occidentale delle 4 componenti che formano un quadrato irregolare — 450x.
MCG+10-23-36	gx	16h11m31s	+57°23.0'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a N — 450x.
MCG+10-23-42	gx	16h13m03s	+61°51.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG+10-23-43	gx	16h13m19s	+62°06.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante subito a SE — 450x.
MCG+10-23-44	gx	16h13m38s	+61°13.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG+10-23-46	gx	16h14m01s	+62°10.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" e con nucleo stellare appena evidente — 450x.
MCG+10-23-47	gx	16h14m45s	+60°54.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a ridosso di un piccolo triangolo quasi rettangolo di stelline di luminosità simile — 450x.
MCG+10-23-52	gx	16h15m24s	+59°57.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione E-W; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; c'è una stellina a 1' verso S.
MCG+10-23-55	gx	16h17m13s	+59°47.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	è praticamente "annegata" nel bagliore della θ Dra di magnitudo 5.6; forzando a 580x si nota a tratti un tenuissimo baffo che si diparte ai lati di una stellina molto debole (non credo si tratti del nucleo della gx).
MCG+10-23-62	gx	16h18m35s	+60°19.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 17039 di 9ª grandezza situata 4' a E; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+10-24-16	gx	16h39m21s	+62°27.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da E a W; appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MCG+10-24-19	gx	16h40m07s	+58°40.0'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, poco diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10"; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a E; c'è un piccolo asterismo foggiato a "Y" un paio di primi verso W — 495x.
MCG+10-24-25	gx	16h41m04s	+60°47.8'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MCG+10-24-31	gx	16h41m16s	+60°49.8'		Dra	28"	ottima / buono	molto piccola, ma poco più evidente di MCG+10-24-25 osservata subito prima e dalla quale dista 2.5' a NE — 495x.
MCG+10-24-14	gx	16h39m12s	+58°24.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	piccola, disturbata e molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è un piccolo triangolo di stelline subito a NW.
MCG+10-24-15	gx	16h39m26s	+59°24.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW — 450x.
MCG+10-24-26	gx	16h41m14s	+59°05.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10" — 450x.
MCG+10-24-38	gx	16h42m27s	+61°05.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina evidente a 1' scarso NE — 450x.
MCG+10-24-53	gx	16h46m32s	+62°26.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa 1' scarso; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+10-24-62	gx	16h48m51s	+61°55.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole e molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NE — 450x.
MCG+10-24-63	gx	16h49m17s	+61°54.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è una piccola e debolissima chiazza disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata un paio di primi a N; forse rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG+10-24-71	gx	16h52m10s	+59°45.4'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MCG+10-24-72	gx	16h52m19s	+59°44.4'		Dra	28"	ottima / buono	molto piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta a 1.5' SE della precedente; c'è una stellina a 1' NE — 495x.
MCG+10-24-75	gx	16h54m56s	+58°52.3'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole, piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE — 495x.
MCG+10-24-76	gx	16h55m52s	+58°55.1'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è allineata con due stelline a SW e a NE — 495x.
MCG+10-24-78	gx	16h57m21s	+58°28.9'		Dra	28"	ottima / buono	piccola e molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso N — 495x.
MCG+10-24-89	gx	17h01m09s	+60°11.8'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta a un paio di primi verso N di una terna di deboli stelline; a tratti appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MCG+10-24-122	gx	17h16m33s	+57°52.1'		Dra	28"	ottima / buono	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta; è situata tra due stelline distanti 4' e orientate nella stessa direzione — 495x.
MCG+10-24-65	gx	16h49m33s	+61°43.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e relativamente compatta, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+10-24-67	gx	16h49m47s	+61°45.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo quasi stellare — 450x.
MCG+10-24-70	gx	16h50m55s	+60°40.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+10-25-5	gx	17h19m11s	+61°32.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MCG+10-25-11	gx	17h22m05s	+59°06.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
MCG+10-25-12	gx	17h22m20s	+59°04.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi; allineata e quasi equidistante con due stelline a SW — 450x.
MCG+10-25-28	gx	17h25m31s	+59°33.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a ESE (allineata quindi con l'asse della gx) — 495x.
MCG+10-25-34	gx	17h26m53s	+59°43.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è la SAO 30392 di magnitudo 9.6 a un paio di primi NW — 495x.
MCG+10-25-42	gx	17h27m22s	+59°38.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	poco più evidente di MCG+10-25-34 (situata a 6' NNW),, molto diffusa, rotonda e con Ø simile; presenta un tenue bulge e un nucleo stellare evidente. Un piccolo e debolissimo oggetto non più esteso di 15" appare a ridosso S: si tratta della compagna **MCG+10-25-43** — 495x.
MCG+10-25-43	gx	17h27m23s	+59°38.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare a tratti in visione distolta a ridosso S della gx precedente — 495x.
MCG+10-25-57	gx	17h31m07s	+59°58.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra una stellina abbastanza brillante a NW e una appena percettibile dalla parte opposta — 495x.
MCG+10-25-90	gx	17h46m52s	+59°12.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccolo nucleo visibile a momenti — 450x.
MCG+10-25-94	gx	17h47m31s	+59°54.8'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso SE — 495x.
MCG+10-25-107	gx	17h50m30s	+60°01.7'		Dra	28"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW e che in visione distolta appare estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N; situata tra due stelline brillanti distanti 3' in direzione E-W — 495x.
MCG+10-25-123	gx	17h48m43s	+62°43.7'		Dra	28"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con la successiva — sembrano orientate a perpendicolo; la prima è poco più evidente, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme; la seconda è più sottile, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×10" e ha una stellina appena percettibile a ridosso NE — 495x.
MCG+10-25-124	gx	17h48m43s	+63°44.2'		Dra	28"	m. buona / discreto	v. gx precedente.
MCG+10-26-2	gx	18h02m57s	+59°08.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, estesa 45" in direzione E-W; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
MCG+10-26-6	gx	18h03m52s	+61°53.6'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1.5' verso E — 495x.
MCG+10-26-9	gx	18h05m37s	+60°29.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso S e una a 1' NW, ma quest'ultima è il nucleo di **PGC 2603156** — 495x.
MCG+10-26-10	gx	18h05m58s	+59°40.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a W — 450x.
MCG+10-26-11	gx	18h05m52s	+59°41.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
MCG+10-26-12	gx	18h06m00s	+59°37.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 40" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG+10-26-21	gx	18h11m58s	+60°06.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola chiazza rotondeggiante con Ø di una 30-ina di secondi, molto debole e diffusa che pare aggettare a E di una stellina; la visione è un po' disturbata dalla SAO 17809 di 9a grandezza situata 3' a N — 450x.
MCG+10-26-27	gx	18h12m48s	+57°03.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	è un lucore molto debole che aggetta a S di una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi — 495x.
MCG+10-26-31	gx	18h14m56s	+61°18.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	piccolo e debolissimo oggetto circolare diffuso e di luminosità uniforme, con Ø di una 20-ina di secondi; è situato a ridosso NW di una stellina brillante che tende a offuscarla; meglio non scendere sotto i 450x.
MCG+10-26-35	gx	18h22m47s	+62°57.2'		Dra	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; 4 stelline molto deboli le fanno da contorno, situate a ridosso N, E, SE e S; quella a N è la più distante, mentre quella a SE è appena percettibile; un piccolo asterismo di stelline brillanti si trova 4' a E, la più meridionale delle quali è una doppia stretta — 495x.
MCG+10-26-40	gx	18h29m12s	+60°42.7'		Dra	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" (il campo è un po' disturbato da una brillante stella di 9ª grandezza situata 4' a NNE — 450x.
MCG+10-27-7	gx	19h02m38s	+62°27.1'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a momenti allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata tra 2 deboli stelline distanti 3' e orientate da E a W — 450x.
MCG+10-28-8	gx	19h38m31s	+62°40.1'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è un terzetto stellare molto serrato a poco più di 3' WSW che dà l'impressione di un piccolo oggetto diffuso — 450x.
MCG+11-4-3	gx	02h55m06s	+66°24.1'		Cas	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MCG+11-7-7	gx	05h12m02s	+68°36.5'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole, ma visibile senza difficoltà in visione distolta a 270x; è di luminosità uniforme, rotonda con un Ø di ~ 40".
MCG+11-8-4	gx	06h01m19s	+66°23.1'		Cam	16"	m. buona / ottimo	tenuissimo oggetto relativamente compatto e rotondo, con Ø di 25"-30" e con condensazione centrale percettibile a tratti; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
MCG+11-8-7	gx	06h02m01s	+66°25.0'		Cam	16"	m. buona / ottimo	più debole di MCG+11-8-4, dalla quale dista meno di 5' a ENE; è estesa non più di 20" e allineata con 2 stelline distanti 45" poste in direzione N-S; salta fuori a tratti in visione distolta a 380x.
MCG+11-8-42	gx	06h24m50s	+65°43.8'		Cam	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto relativamente compatto, di luminosità pressoché uniforme, esteso non più di 30" e visibile facilmente in visione distolta a 380x.
MCG+11-8-44	gx	06h25m23s	+64°45.7'		Cam	16"	ottima / buono	debolissimo baffo esteso una 30-ina di secondi, visibile a momenti a 380x; sembra dipartirsi verso E da una stellina.
MCG+11-9-6	gx	06h42m56s	+65°31.6'		Cam	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme, relativamente compatto con Ø di 20", situato a ridosso verso E di una stellina; si vede in visione distolta a 380x.
MCG+11-10-13	gx	07h40m44s	+65°33.6'		Cam	16"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MCG+11-10-14 situata una 30-ina di secondi a SE; sono 2 piccole gx estese ~ 20" e presentano nuclei puntiformi visibili a 380x; quella a NW è poco più evidente.
MCG+11-10-14	gx	07h40m52s	+65°33.2'		Cam	16"	m. buona / ottimo	v. **MCG+11-10-13**
MCG+11-10-34	gx	07h51m34s	+63°55.7'		Cam	24"	ottima / ottimo	è un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi, orientato da E a W e "soffocato" dalla luce della SAO 14343 di magnitudo 7.6 situata 1' scarso a NE — 450x.
MCG+11-10-62	gx	08h08m06s	+67°44.4'		Cam	24"	m. buona / ottimo	è un tenuissimo baffo esteso sì e no una 30-ina di secondi, orientato da N a S e che solo a momenti emerge dal bagliore della SAO 14435 di magnitudo 9.5 situata quasi a ridosso di NW; è un oggetto molto difficile anche spingendo a 580x.
MCG+11-10-68	gx	08h11m45s	+63°29.7'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' scarso NE; una brillante si trova un paio di primi a NW — 450x.
MCG+11-10-73	gx	08h19m18s	+64°29.7'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
MCG+11-11-3	gx	08h23m59s	+65°14.7'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima, appare solo in visione distolta a 270x, ma è di aspetto confuso, probabilmente di dimensioni < 1'; presenta una condensazione centrale visibile solo a tratti.
MCG+11-11-8	gx	08h29m03s	+63°17.8'		UMa	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta a 1.5' SW di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+11-11-10	gx	08h29m27s	+63°15.6'		UMa	24"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' E; una stellina molto debole è alla stessa distanza verso W; infine ce n'è una più evidente sempre a 1' di distanza verso SSE — 450x.
MCG+11-11-28	gx	08h46m01s	+64°07.3'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e un nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso NNE e una a 1' verso E (fanno parte di un piccolo triangolo isoscele aperto situato a E della gx) — 450x.
MCG+11-11-30	gx	08h51m57s	+64°13.9'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; una stellina abbastanza brillante al bordo occidentale disturba un po' l'osservazione — 450x.
MCG+11-11-39	gx	18h18m55s	+63°42.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG+11-13-11	gx	10h14m29s	+65°56.2'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima, estesa non più di 30"-40"; appare solo in visione distolta a 270x quando si fissa la stellina che c'è 1' NE.
MCG+11-13-15	gx	10h17m25s	+64°43.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza rotonda molto diffusa, appena più brillante all'interno e con Ø di 35"-40"; salta fuori in visione distolta a 380x "appoggiando" lo sguardo su una stellina situata a 1.5' a NW.
MCG+11-13-18	gx	10h19m07s	+63°58.2'		UMa	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debolissima, poco più di una stellina sfuocata; salta fuori in visione distolta quasi a ridosso W di CGCG 313-11 — 450x.
MCG+11-13-20	gx	10h19m53s	+63°57.1'		UMa	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare molto tenue — 450x.
MCG+11-13-35	gx	10h35m19s	+64°10.6'		UMa	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+11-13-35A	gx	10h35m28s	+64°09.3'		UMa	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile (situata 1.5' a SSE della precedente) — 450x.
MCG+11-13-38B	gx	10h48m34s	+66°22.4'		UMa	16"	m. buona / ottimo	appare come una sorta di "piedino" all'estremità NW di UGC 5904; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
MCG+11-14-3A	gx	11h07m13s	+65°05.9'		UMa	24"	m. buona / discreto	forma una coppia serrata e difficilmente separabile con la successiva — a 450x si notano 2 nuclei stellari molto ravvicinati immersi in un alone comune di aspetto un po' asimmetrico, nel senso che presenta una luminosità maggiore verso N (ossia in corrispondenza della componente B); la parte meridionale sembra invece più sfumata; una debole stellina si trova 1' scarso a SE della coppia — 450x.
MCG+11-14-3B	gx	11h07m13s	+65°06.1'		UMa	24"	m. buona / discreto	v. **MCG+11-14-3A**
MCG+11-14-15	gx	11h18m28s	+65°01.9'		UMa	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; forma una coppia ravvicinata con UGC 6316 situata 1' a W: quest'ultima è molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+11-14-24	gx	11h25m36s	+63°27.7'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, estesa sì e no 12"-15"; appare in visione distolta quasi a ridosso NE di NGC 3668 — 450x.
MCG+11-14-26	gx	11h27m38s	+63°18.8'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15", ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MCG+11-17-16	gx	14h05m51s	+65°43.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia con la successiva situata una 30-ina di secondi a SSE — è un elusivo baffo di luce esteso max 20" e orientato da NE a SW; è disturbato da una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso W; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+11-17-18	gx	14h05m53s	+65*°42.5'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
MCG+11-18-3	gx	14h38m18s	+64°10.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; situata tra una stellina evidente a S e una coppia di stelline appena percettibili a N — 450x.
MCG+11-18-15	gx	14h53m40s	+64°35.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" (c'è CGCG 318-8 un paio di primi a NNW) — 450x.
MCG+11-19-14	gx	15h46m42s	+68°18.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+11-20-6	gx	16h14m12s	+63°16.0'		Dra	16"	ottima / discreto	è un debolissimo oggetto molto diffuso, esteso forse 20" o 25" che salta fuori a tratti in visione distolta quando si fissa lo sguardo su NGC 6111, dalla quale dista sì e no 1' a W — 270x.
MCG+11-20-17	gx	16h31m01s	+64°45.3'		Dra	16"	ottima / discreto	debolissima e molto diffusa, estesa non più di 20" o 30"; appare solo a tratti in visione distolta a un paio di primi SE di una stellina brillante — 270x.
MCG+11-20-18	gx	16h32m09s	+66°04.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG+11-21-4	gx	16h54m42s	+66°29.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; fa parte di un terzetto assieme a CGCG 320-52 e -53.
MCG+11-21-5	gx	16h55m55s	+67°26.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è molto disturbata dalla SAO 17282 di 6ª grandezza situata un paio di primi a NNW — 450x.
MCG+11-21-8	gx	17h00m35s	+68°06.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso SW (fa parte di un piccolo asterismo di 4 stelline); la galassia è però meglio evidente scalando a 340x.
MCG+11-21-14	gx	17h36m23s	+68°04.2'		Dra	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG+11-22-5	gx	17h49m51s	+68°23.2'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+11-22-10	gx	17h53m58s	+64°08.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e solo a tratti leggermente condensata; c'è una debole stellina a 1' SW — 450x.
MCG+11-22-19	gx	18h00m27s	+65°29.2'		Dra	28"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi in direzione E-W; c'è un quintetto serrato di stelline a 1' verso S formato da una sola componente brillante, mentre le altre sono deboli (quella più a W è appena percettibile) — 495x.
MCG+11-22-20	gx	18h00m08s	+68°35.4'		Dra	24"	ottima / m. buono	debolissima e di forma indistinta, estesa una 30-ina di secondi; in visione distolta sembra aggettare a S di una debole stellina — 450x.
MCG+11-22-37	gx	18h15m26s	+67°05.4'		Dra	24"	ottima / m. buono	debolissimo lucore di forma grosso modo circolare con Ø di 20"-25" e di luminosità uniforme; appare in visione distolta subito a N di una stellina, ma la visione è un po' disturbata dalla SAO 10840 di magnitudo 7.7 situata 4' a SE — 450x.
MCG+11-22-47	gx	18h22m05s	+66°37.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è un nodulo di aspetto quasi stellare situato a ridosso E di NGC 6636 — 450x.
MCG+11-22-50	gx	18h24m21s	+64°06.4'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; ci sono 2 stelline molto deboli subito a NW e SW (formano un piccolo triangolo con una 3ª stellina più evidente a W) — 495x.
MCG+12-2-1	gx	00h54m04s	+73°05.1'		Cas	24"	buona / m. buono	piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile subito a NW.
MCG+12-3-2	gx	02h07m43s	+75°09.7'		Cas	16"	ottima / m. buono	debolissima! In visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; presenta un piccolo nucleo visibile a tratti a 380x.
MCG+12-5-9	gx	04h36m22s	+73°24.5'		Cam	24"	buona / m. buono	debole, piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG+12-5-10	gx	04h36m30s	+73°25.6'		Cam	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti subito a N — 450x.
MCG+12-6-5	gx	05h29m56s	+74°30.7'		Cam	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti subito a N — 450x.
MCG+12-7-7	gx	06h35m47s	+73°51.3'		Cam	24"	buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, grosso modo con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE; una più brillante si trova a 1' verso N — 450x.
MCG+12-7-12	gx	06h43m22s	+74°13.2'		Cam	24"	buona / m. buono	appare elusivamente in visione distolta, ma occorre non scendere sotto i 450x; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MCG+12-7-13	gx	06h45m17s	+74°17.8'		Cam	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG+12-7-34	gx	07h13m36s	+73°35.0'		Cam	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø < 30" e di luminosità uniforme; situata 1' scarso a NW di una stellina brillante; per scovarla non bisogna scendere sotto 450x.
MCG+12-8-8B	gx	07h44m42s	+73°49.5'		Cam	20"	m. buona / ottimo	si separa solo a momenti a ridosso N di **UGC 3972**, molto piccola e debolissima, estesa sì e no 10" — 360x.
MCG+12-8-47	gx	08h36m38s	+73°35.5'		Cam	20"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, situata tra una stellina brillante subito a N e una debole a S — 360x.
MCG+12-9-21	gx	08h51m08s	+71°50.4'		UMa	16"	ottima / m. buono	assieme a MCG+12-9-22 forma una coppia di debolissime galassiette separate da 1' scarso in direzione NE-SW; la 1ª è molto piccola, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; la 2a, ancora più evanescente, appare a tratti come una righetta estesa una 40-ina di secondi e orientata da E a W; sono osservabili con un minimo di agilità solo a 380x.
MCG+12-9-22	gx	08h51m15s	+71°51.1'		UMa	16"	ottima / m. buono	v. **MCG+12-9-21**
MCG+12-9-48A	gx	09h27m22s	+74°26.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza approssim. circolare, molto diffusa e con Ø di una 20-ina di secondi; una stellina percettibile solo a momenti appare a tratti a ridosso SW, ma questa è in realtà la MCG+12-9-48B — 450x.
MCG+12-9-48B	gx	09h27m21s	+74°26.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG+12-9-48A**
MCG+12-9-51	gx	09h31m03s	+74°05.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva e a MAC 0930+7425 forma un terzetto di galassiette piccole e molto difficili poste a triangolo equilatero — questa è debolissima, appare in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MCG+12-9-52	gx	09h31m10s	+74°26.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è la più evidente del terzetto, pur restando molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+12-10-36	gx	10h26m55s	+68°39.6'		UMa	24"	buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×15" — 450x.
MCG+12-10-58	gx	10h37m32s	+71°38.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 380x e a 1' verso S di una debolissima stellina.
MCG+12-11-7	gx	11h05m45s	+71°32.9'		UMa	24"	buona / m. buono	debole e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø < 40" e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' verso S — 450x [erronea la posizione riportata sul Megastar].
MCG+12-11-8	gx	11h06m55s	+71°38.5'		UMa	24"	buona / m. buono	è una piccola chiazza circolare molto debole con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo W — 450x [erronea la posizione riportata sul Megastar].
MCG+12-11-12	gx	11h13m05s	+72°59.3'		Dra	16"	m. buona / mediocre	piccolo oggetto esteso per max 30", molto debole, ma abbastanza facile da trovare — 270x.
MCG+12-11-16	gx	11h26m20s	+69°28.4'		UMa	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 450x.
MCG+12-12-2	gx	12h08m14s	+68°47.1'	q 25	Dra	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (riportata sull'Uranometria come **4128A** — 450x.
MCG+12-13-25	gx	13h53m30s	+69°17.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NW — 450x.
MCG+12-14-17	gx	15h07m59s	+69°37.6'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, a tratti poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso E e un'altra molto debole a 1' SW — 450x.
MCG+12-15-20	gx	15h48m40s	+69°26.5'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole e situata a ridosso NNE di una stellina brillante; in visione distolta appare come una tenue lama di luce di luminosità uniforme ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MCG+12-15-23	gx	15h48m55s	+71°14.4'		UMi	24"	ottima / m. buono	piccolo e debolissimo oggetto rotondo, esteso una decina di primi e situato a ridosso W di MCG+12-15-24; a 450x, in visione distolta, appare abbastanza facilmente separato dalla gx principale — 450x.
MCG+12-15-24	gx	15h49m00s	+71°14.3'		UMi	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina al margine meridionale — 450x.
MCG+12-15-48	gx	16h03m51s	+69°39.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa rotonda con Ø < 20" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' N e un'altra alla stessa distanza verso SW — 450x.
MCG+12-16-10	gx	16h47m29s	+68°50.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; disturbata dalla SAO 17230 di 9ª grandezza situata 1' a N — 450x.
MCG+12-16-19	gx	17h08m07s	+69°25.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG+12-16-29	gx	17h22m03s	+74°24.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, approssim. circolare con Ø < 20"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta rotondo W di una stellina — 450x.
MCG+12-16-30	gx	17h22m11s	+74°24.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	di aspetto e Ø simile alla precedente, dalla quale dista una 40-ina di secondi a SE, appare tra due stelline orientate da NW a SE e distanti 1.5' — 450x.
MCG+12-16-31	gx	17h22m23s	+74°22.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di 12"-15"; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 10853 situata una 40-ina di secondi a E; c'è una stellina appena percettibile subito a SW — 450x.
MCG+12-16-32B	gx	17h23m21s	+71°15.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con IC 1261 situata a ridosso E; le due gx si separano facilmente a 450x; la MCG è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; la IC è pure rotonda, di dimensioni analoghe, ma presenta una condensazione centrale quasi stellare; una debole stellina di aspetto diffuso (ho "scoperto" dopo che in realtà si trattava di una doppia stretta irrisolta) si trova subito a S della coppia — 450x.
MCG+12-16-34	gx	17h22m41s	+74°21.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni inferiori a 30"×15"; è situata a ridosso SE di UGC 10853 — 450x.
MCG+12-16-44	gx	17h32m07s	+71°27.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina al margine meridionale — 450x.
MCG+12-16-46	gx	17h32m33s	+71°24.2'		Dra	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1732+7123 situata a ridosso SSE — sono due macchioline molto piccole di aspetto a prima vista simili; in realtà la MAC è poco più evidente, mentre la MCG mostra a momenti una condensazione stellare — 450x.
MCG+12-17-3	gx	17h39m30s	+68°47.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, forse circolare con Ø < 40"; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
MCG+12-17-8	gx	17h45m05s	+70°47.7'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SW e una appena percettibile a 1' NE — 495x.
MCG+12-17-19	gx	18h14m20s	+69°39.9'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è situata a ridosso S di una stellina brillante che offusca un po' la visione — 450x.
MCG+12-19-1	gx	20h48m55s	+70°13.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso S; un'altra stellina percettibile solo a momenti situata a ridosso W è invece risultata essere la2MASS 20064562+7157055 — 450x.
MCG+12-22-12	gx	17h55m34s	+65°15.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SW e una appena percettibile a ridosso NW — 450x.
MCG+13-3-3	gx	03h18m55s	+80°47.4'		Cep	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma più che altro molto disturbata da 2 stelline brillanti in mezzo alle quali si trova e che assieme a una 3ª poco più debole forma un piccolo triangolo isoscele; a 450x e in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30.10 e di luminosità uniforme.
MCG+13-4-2	gx	04h00m10s	+79°25.2'		Cam	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
MCG+13-5-7	gx	05h58m48s	+79°49.6'		Cam	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W, dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una debole stellina a W — 450x.
MCG+13-5-30	gx	06h48m03s	+80°44.9'		Cam	24"	buona / ottimo	chiazza circolare, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' S e un'altra molto debole alla stessa distanza verso ENE; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG+13-5-32	gx	06h54m35s	+80°57.0'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole, appare a poco più di 1' SW di UGC 3549, di luminosità pressoché uniforme salvo una condensazione centrale molto tenue visibile solo a tratti (ma potrebbe anche trattarsi di una debolissima stellina a ridosso); poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
MCG+13-7-22	gx	09h19m53s	+75°06.1'		Cam	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente a 450x quasi nel mezzo di due stelle brillanti distanti una dozzina di primi in direzione NW-SE (purtroppo in mezzo a queste non c'è nessun valido riferimento); a tratti appare orientata da N a S ed estesa sì e no 30", anche se la forma non è chiara — 450x.
MCG+13-8-13	gx	10h22m35s	+79°49.2'		Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti foggiato a losanga subito a E — 450x.
MCG+13-8-17	gx	10h24m18s	+78°56.5'		Dra	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, allungata ~ da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare; anzi, a prima vista, osservando in visione diretta a 380x sembra in effetti poco più che una stellina.
MCG+13-8-18	gx	10h24m51s	+78°40.4'		Dra	16"	ottima / ottimo	è un piccolo oggetto rotondo abbastanza compatto con Ø di 20"-25", con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
MCG+13-8-23	gx	10h30m11s	+78°48.2'		Dra	20"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, solo a tratti condensata, diffusa, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a W — 360x.
MCG+13-8-36	gx	10h45m43s	+74°38.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
MCG+13-8-47	gx	10h52m04s	+79°08.8'		Dra	16"	ottima / ottimo	facilmente visibile in visione distolta a 0.5' SE di UGC 5946, rotonda, con Ø di 30" e con nucleo stellare evidente a 380x.
MCG+13-8-56	gx	11h14m44s	+79°43.6'		Cam	24"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore molto stemperato sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; disturbata da una stellina brillante a ridosso N; poco meglio evidente a 450x.
MCG+13-9-17	gx	12h10m37s	+74°57.9'		Dra	20"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 360x.
MCG+13-9-36	gx	12h51m38s	+78°44.3'		Cam	28"	buona / buono	elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW; salta fuori a tratti in visione distolta a poco più di 1' S di una stellina abbastanza brillante (il Megastar la riporta addirittura di magnitudo 18.8!) — 388x.
MCG+13-10-5	gx	13h32m45s	+76°52.6'		Cam	20"	buona / scarso	debolissimo lucore di forma indistinta, esteso sì e no 30"; appare solo a momenti in visione distolta sul lato NE di un piccolo triangolo rettangolo di stelline molto deboli — 360x.
MCG+13-10-11	gx	13h41m21s	+78°15.7'		UMi	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima chiazza forse circolare con Ø < 20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG+13-11-3	gx	14h33m47s	+80°13.9'		UMi	20"	buona / scarso	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 360x.
MCG+13-11-12	gx	15h11m49s	+75°18.7'		UMi	16"	ottima / buono	debolissima, quasi elusiva, visibile a tratti in visione distolta a 4' S della coppia NGC 5909 / 5912 — 270x.
MCG+13-12-3	gx	16h24m10s	+78°47.1'		UMi	16"	ottima / discreto	debole oggetto rotondo molto piccolo e debole, esteso 15" o 20" situato a ridosso verso W di una stellina brillante — 270x.
MCG+13-14-6	gx	19h40m34s	+76°47.8'		Dra	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 30"-35"; poco disturbata da una stellina brillante a ridosso NW — 450x.
MCG+14-2-4	gx	01h41m10s	+84°28.6'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+14-2-11	gx	03h14m20s	+86°52.0'		Cep	24"	ottima / m. buono	è una sorta di debolissimo alone attorno a una stellina abbastanza brillante (quella a ridosso N, appena più debole ne è di fatto priva); in visione distolta l'alone appare poco allungata da E a W e tratti asimmetrico, ossia spostato un poco verso S; tale effetto si apprezza meglio spingendo a 580x.
MCG+14-3-13	gx	05h57m30s	+85°50.2'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina al bordo orientale — 450x.

MCG+14-4-35	gx	07h48m02s	+85°33.1'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N — 450x.
MCG+14-6-1	gx	11h22m44s	+80°55.6'		Cam	28"	buona / buono	chiazza circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, con Ø < 40"; c'è una stellina al bordo SE; allineata ed equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti a NW — 388x.
MCG+14-6-21	gx	13h18m24s	+84°30.1'		Cam	24"	ottima / m. buono	è un debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x quando si fissa la stellina a ridosso SE di UGC 8394, dalla quale dista 40" verso NE.
MCG+14-6-25	gx	13h23m34s	+84°30.5'		Cam	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG+14-7-17	gx	15h19m38s	+82°11.8'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S — 450x.
MCG+14-7-20	gx	15h36m19s	+82°25.3'		UMi	16"	ottima / discreto	assieme a MCG+14-7-21 forma una coppia di debolissime galassiette separate da 1' scarso in direzione E-W e situate 3' a SW di IC 1143; la 2ª è più evidente, estesa una 20-ina di secondi e con condensazione centrale puntiforme; la 1ª appare in visione distolta a 270x.
MCG+14-7-21	gx	15h30m00s	+82°25.5'		UMi	16"	ottima / discreto	v. **MCG+14-7-20**
MCG+14-8-7	gx	16h28m45s	+82°53.3'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con UGC 10464 (v. voce corrispondente), ma è più evidente di quest'ultima, anch'essa di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE e dimensioni simili — 450x.
MCG+14-8-8	gx	16h30m24s	+81°34.4'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina a 1' NE e un'altra appena percettibile subito a S — 450x.
MCG+14-8-15	gx	16h51m45s	+81°35.5'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E (fa parte dell'ammasso AGC 2247) — 450x.
MCG+14-8-16	gx	16h52m13s	+81°37.2'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso NE (fa parte dell'ammasso AGC 2247) — 450x.
MCG+14-8-18	gx	16h53m17s	+81°38.8'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (fa parte dell'ammasso **AGC 2247**) — 450x.
MCG+14-8-25	gx	17h20m18s	+86°44.2'		UMi	24"	buona / ottimo	appare facilmente in visione distolta a E di UGC 10923; è molto piccola, diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare visibile a momenti — 450x.
MCG+15-1-3	gx	06h15m02s	+87°42.8'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; ci sono 2 deboli stelline orientate all'incirca nello stesso modo distanti come la dimensione della gx — 450x.
MCG+15-1-7	gx	08h05m50s	+88°09.6'		UMi	24"	ottima / m. buono	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; la visione è poco disturbata da una coppia di stelline brillanti situate a S e SW della gx; una 3a stellina appena percettibile si trova a 1' verso E — 450x.
MCG+15-1-10	gx	11h40m39s	+89°05.1'		UMi	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MCG+15-1-20	gx	17h55m18s	+87°43.7'		UMi	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; a tratti appare qualcosa a ridosso W che sembra a prima vista "allungarla", come una sorta di debolissimo baffo o forse una coppia serrata di stelline appena percettibili che non si riesce a risolvere — 450x.
MCG-1-1-1	gx	23h55m01s	−03°44.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-1-1-2	gx	23h55m14s	−03°44.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	gx facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-1-1-4	gx	23h55m42s	−03°45.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buon	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare evidente; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
MCG-1-1-5	gx	23h56m46s	−02°38.8'		Psc	16"	ottima / scarso	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a 1' NE — 270x.
MCG-1-1-6	gx	23h56m49s	−03°22.0'		Psc	16"	ottima / scarso	assieme a MCG-1-1-7 forma una coppia di galassiette molto deboli distanti un paio di primi in direzione N-S: la 1ª è molto diffusa, probabilmente rotonda di ~ 40" di Ø e con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti a 270x; c'è una stellina a 1.5' SW; la 2ª è appena più debole e a tratti appare allungata da N a S, con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; la stessa stellina è situata 1.5' NW.
MCG-1-1-7	gx	23h56m49s	−03°23.2'		Psc	16"	ottima / scarso	v. **MCG-1-1-6**
MCG-1-1-8	gx	23h57m28s	−02°54.5'		Psc	16"	ottima / scarso	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta fissando la stellina situata 1' a E; ogni tanto sembra di vedere qualcosa di puntiforme all'interno, ma non sono in grado di capire se è il nucleo o una stellina sovrapposta — 270x.
MCG-1-1-9	gx	23h57m41s	−03°52.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' verso SE — 450x.
MCG-1-1-10	gx	23h58m57s	−02°15.0'		Psc	16"	ottima / scarso	debolissima, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1.5' NE — 270x.
MCG-1-1-12	gx	23h59m11s	−04°11.5'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole, situata a ridosso verso S di una stellina che disturba un po'; è allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; a tratti appare qualcosa di puntiforme all'interno: o è il nucleo o una stellina che non riesco a risolvere — 380x.
MCG-1-1-13	gx	23h59m35s	−02°30.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per ~ 1'; poco meglio evidente a 450x.
MCG-1-1-14	gx	23h59m41s	−06°48.4'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di 40", diffusa e di luminosità uniforme — 270x.
MCG-1-1-15	gx	00h00m05s	−05°12.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-1-17	gx	00h00m11s	−05°09.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	più evidente di MCG-1-1-15, dalla quale dista 3.5' a SSW; presenta un basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25".
MCG-1-1-20	gx	00h00m22s	−02°36.8'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, a tratti allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 380x.
MCG-1-1-21	gx	00h00m48s	−05°34.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, forse rotonda, di una 30-ina di secondi di Ø e con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti a 380x.
MCG-1-1-22	gx	00h01m45s	−04°20.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata quasi a ridosso verso E — debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-1-23	gx	00h01m49s	−04°20.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con la precedente situata quasi a ridosso verso W — debolissima e solo a momenti appare orientata da NE a SW, estesa sì e no una 30-ina di secondi; in questo caso non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG-1-1-24	gx	00h02m35s	−03°42.6'		Psc	16"	ottima / buono	anche questa appare molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×30"; meglio contrastata a 270x.
MCG-1-1-25	gx	00h02m38s	−03°37.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-1-1-26	gx	00h02m49s	−03°36.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-1-1-27A	gx	00h04m22s	−08°02.6'		Cet	16"	m. buona / m. buono	è di dimensioni analoghe a quelle di MAC 0004-0802A, ma sembra poco più evidente, rotonda e con condensazione centrale facilmente visibile a 380x.
MCG-1-1-28	gx	00h05m05s	−07°05.6'		Cet	16"	m. buona / m. buono	abbastanza facile, ma di luminosità alquanto uniforme, molto allungata da ENE a WSW (ossia come le 2 stelline situate 4' NE e 2' NW) e di dimensioni 80"×30" — 380x.
MCG-1-1-30	gx	00h04m40s	−08°06.0'		Cet	16"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø > 1', presenta un bulge piccolo, abbastanza contrastato sul disco e nucleo stellare; più interessante a 380x.
MCG-1-1-35	gx	00h06m50s	−03°43.4'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di NE — 450x.
MCG-1-1-36	gx	00h08m36s	−05°13.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
MCG-1-1-37	gx	00h08m43s	−06°59.8'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debole, rotonda, poco diffusa, appena più brillante verso l'interno e con Ø di 45" — 270x.
MCG-1-1-38	gx	00h09m48s	−02°24.7'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, lama di luce di luminosità uniforme che in visione distolta sembra estendersi per oltre 1' in direzione NW-SE — 450x.
MCG-1-1-39	gx	00h09m00s	−02°22.9'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale — 450x.
MCG-1-1-40	gx	00h09m11s	−06°55.5'		Cet	16"	m. buona / m. buono	più debole di MCG-1-1-39 e più compatta, rotonda con Ø di 25"-30", meglio osservabile a 380x.
MCG-1-1-41	gx	00h09m56s	−07°52.3'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissima, solo a tratti appare orientata da N a S con dimensioni ~ 40"×20", ma bisogna spingere a 380x.
MCG-1-1-44	gx	00h10m24s	−07°05.1'		Cet	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, ma relativamente facile da vedere, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale osservabile a 380x.
MCG-1-1-45	gx	00h10m37s	−06°38.4'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 400x.
MCG-1-1-50	gx	00h13m04s	−05°43.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-1-1-51	gx	00h13m29s	−06°47.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale evidente — 380x.
MCG-1-1-52	gx	00h13m34s	−05°05.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
MCG-1-1-53	gx	00h13m48s	−04°28.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	in visione distolta appare come una debole lama di luce relativamente compatta, orientata da NW a SE ed estesa 1'; presenta un tenue rigonfiamento centrale poco contrastato — 450x.
MCG-1-1-54	gx	00h14m26s	−07°26.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è molto debole, ma salta fuori facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di ~ 20", molto diffusa e di luminosità uniforme.
MCG-1-1-56	gx	00h14m41s	−07°16.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG-1-1-57	gx	00h14m40s	−07°17.7'		Cet	16"	m. buona / m. buono	è un piccolo oggetto debole di dimensioni ~ 40"×30" orientato da NNE a SSW (stimato in base all'orientazione di NGC 50 situata 3' SSE) con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti a 380x.
MCG-1-1-59	gx	00h15m00s	−07°15.6'		Cet	16"	m. buona / m. buono	è debolissima, ma è molto piccola, per cui si nota abbastanza facilmente a 380x, molto allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso SW.
MCG-1-1-61	gx	00h15m17s	−07°32.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso di SW; la gx si trova al vertice occidentale di un triangolo equilatero formato con 2 stelle brillanti — 450x.
MCG-1-1-64	gx	00h16m51s	−05°16.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	abbastanza brillante, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×30" e con tenue bulge diffuso poco contrastato sul disco; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline 3' a NW — 380x.
MCG-1-1-65	gx	00h17m06s	−06°22.4'		Cet	16"	buona / mediocre	relativamente facile, rotonda con Ø di almeno 1', molto diffusa e gradatamente più brillante all'interno — 270x.
MCG-1-1-66	gx	00h17m06s	−04°36.6'		Psc	16"	ottima / buono	relativamente facile, con bulge evidente e nucleo stellare visibile a tratti a 380x, allungata da NW a SE e di dimensioni 50"×30" — 380x.
MCG-1-1-67	gx	00h17m10s	−03°42.8'		Psc	16"	ottima / buono	debole bozzolo rotondo di luminosità uniforme, molto diffuso e con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
MCG-1-1-69	gx	00h17m28s	−03°13.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa almeno 1' — 450x.
MCG-1-1-70	gx	00h17m36s	−04°37.6'		Psc	16"	ottima / buono	debolissima e molto diffusa e a bassissima luminanza superficiale, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forse è meglio visibile scalando a 270x.
MCG-1-1-72	gx	00h18m33s	−06°16.3'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, si nota abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso SW di una stellina; è poco allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale quasi stellare — 380x.
MCG-1-1-73	gx	00h18m36s	−06°18.1'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da NW a SE (ossia a perpendicolo con MCG-1-1-72) e di dimensioni 50"×25" — 380x.
MCG-1-1-77	gx	00h19m26s	−04°05.0'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente facile, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45, molto diffusa e di luminosità uniforme; è situata tra 2 stelle brillanti (soprattutto quella a S) — 450x.
MCG-1-2-1	gx	00h20m00s	−06°20.1'		Cet	24"	buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; forse un poco meglio contrastata a 280x.
MCG-1-2-2	gx	00h20m03s	−04°13.1'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-2-4	gx	00h20m23s	−02°39.2'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG-1-2-5	gx	00h20m42s	−04°26.0'		Psc	16"	ottima / buono	allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30", diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 380x.
MCG-1-2-6	gx	00h22m10s	−04°20.8'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme e poco diffusa, rotonda con Ø di 40" — 380x.
MCG-1-2-8	gx	00h23m50s	−03°03.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30" e un nucleo quasi stellare; un po' disturbata dalla SAO 128734 di 8ª grandezza situata 2.5' a W — 450x.
MCG-1-2-9	gx	00h24m28s	−03°22.4'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-1-2-10	gx	00h24m43s	−06°01.4'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ~ 1.5' verso NW — 380x.
MCG-1-2-11	gx	00h25m48s	−02°17.1'		Psc	16"	ottima / buono	è una debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa almeno un paio di primi; appare poco meglio contrastata spingendo a 380x.
MCG-1-2-12	gx	00h25m55s	−03°25.2'		Psc	24"	m. buona / buono	galassietta tutto sommato facile da vedere, diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare — 450x.
MCG-1-2-14	gx	00h26m17s	−04°29.5'		Psc	16"	ottima / buono	debole e molto allungata da NW a SE, con dimensioni 80"×20"; in visione distolta sembra dipartirsi verso NW da una stellina abbastanza brillante — 380x.
MCG-1-2-15	gx	00h26m44s	−03°35.8'		Cet	16"	m. buona / ottimo	abbastanza brillante, piccola e compatta, posta praticamente di taglio, orientata da NE a SW ed estesa 45"; si nota a tratti un piccolo bulge diffuso; il campo è depleto a 380x.
MCG-1-2-18	gx	00h27m15s	−07°47.2'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge assai poco contrastato; meglio visibile scalando a 340x.
MCG-1-2-19	gx	00h27m20s	−04°53.5'		Cet	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di 40" e condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 400x.
MCG-1-2-21	gx	00h28m28s	−07°23.4'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima e sottile baffo di luce che in visione distolta sembra aggettare verso NE per almeno 1' da una stella brillante — 450x.
MCG-1-2-23	gx	00h30m59s	−07°13.0'		Cet	24"	discreta / mediocre	molto debole, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso NE — 280x.
MCG-1-2-25	gx	00h31m14s	−07°50.5'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×30" — 380x.
MCG-1-2-26	gx	00h31m31s	−06°06.3'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debole chiazza circolare, diffusa, appena più brillante all'interno e con Ø di 40" — 380x.
MCG-1-2-28	gx	00h31m49s	−02°31.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, ma per capirne l'orientamento occorre non scendere sotto i 450x: appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30".
MCG-1-2-31	gx	00h34m02s	−03°10.0'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×20" — 380x.
MCG-1-2-33	gx	00h34m16s	−07°17.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima, ma tutto sommato relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina brillante a 1.5 WNW (la quale fa parte di un triangolo rettangolo situato subito a W col cateto minore orientato come la gx).
MCG-1-2-34	gx	00h34m41s	−07°54.2'		Cet	16"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 380x.
MCG-1-2-35	gx	00h34m52s	−07°38.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	lama di luce molto debole, estesa per 1' in direzione NE-SW e di luminosità uniforme; è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti, orientate nello stesso modo e distanti 2.5' — 450x.
MCG-1-2-37	gx	00h35m34s	−02°52.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale poco contrastata; ci sono due deboli stelline: una ridosso E e l'altra poco più distante verso S — 450x.
MCG-1-2-38	gx	00h35m36s	−04°44.0'		Cet	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 380x.
MCG-1-2-39	gx	00h36m09s	−07°32.2'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme e Ø > 30"; mi è apparsa stranamente più contrastata a 380x.
MCG-1-2-40	gx	00h36m09s	−03°31.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 40" e una condensazione stellare marcata — 450x.
MCG-1-2-41	gx	00h36m22s	−06°38.8'		Cet	16"	m. buona / m. buono	è un debolissimo ovale di luminosità uniforme, orientato da NW a SE con dimensioni 30"×20, osservabile in visione distolta a 380x; c'è una stellina a ~ 1' NE e un'altra a uguale distanza WNW (queste 2 stelline fanno parte di un piccolo asterismo di 4 componenti).
MCG-1-2-42	gx	00h36m27s	−06°19.0'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-2-44	gx	00h40m52s	−04°27.2'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina evidente a 1.5' verso W; oltre a tratti 2 stelle molto brillanti che si fatica a tenere fuori campo anche a 450x; quella a N, la più luminosa, è una doppia larga.
MCG-1-2-46	gx	00h42m48s	−03°49.7'		Cet	24"	buona / buono	rotonda, poco diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti e Ø > 30"; ho dovuto utilizzare il SP da 6.4 mm (422x) per riuscire a tenere fuori campo la SAO 128916 di 7ª grandezza.
MCG-1-2-47	gx	00h43m18s	−06°38.5'		Cet	24"	discreta / mediocre	relativamente facile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 280x.
MCG-1-2-48	gx	00h43m19s	−06°39.9'		Cet	24"	discreta / mediocre	debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a ~ 1' S di MCG-1-2-47, a tratti allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme — 280x.
MCG-1-2-49	gx	00h43m28s	−06°21.0'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare osservabile a 380x; c'è la SAO 128917 di 8ª grandezza a soli 2.5 WNW che disturba alquanto.
MCG-1-3-4	gx	00h43m53s	−04°09.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima, è visibile in visione distolta a 450x, ma solo a momenti appare molto allungata da NE a SW con dimensioni di 30"×10"; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' ENE.
MCG-1-3-5	gx	00h43m54s	−04°14.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-3-6	gx	00h44m20s	−06°59.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; situata a ridosso NE di un piccolo triangolo isoscele schiacciato di stelline abbastanza brillanti il cui vertice ottuso punta a S — 450x.
MCG-1-3-8	gx	00h45m19s	−03°41.6'		Cet	16"	buona / ottimo	è un'elusiva macchiolina che appare solo a tratti in visione distolta a 380x quando si fissa la debolissima coppia di stelline a S della gx.
MCG-1-3-10	gx	00h45m58s	−07°16.9'		Cet	16"	ottima / ottimo	è un bell'ovale di 70"×30", appena più brillante all'interno, diffuso e orientato da E a W; c'è una stellina a SE (la quale fa parte di un piccolo triangolo isoscele di stelline abbastanza brillanti e di uguale luminosità) — 380x.
MCG-1-3-11	gx	00h46m49s	−06°31.8'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con nucleo stellare evidente — 380x.
MCG-1-3-13	gx	00h47m24s	−06°48.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso W (quest'ultima è la più occidentale di 4 stelle abbastanza brillanti allineate da E a W: quella più a E è una doppia larga) — 450x.
MCG-1-3-16	gx	00h50m03s	−03°33.5'		Cet	24"	buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso N — 450x.
MCG-1-3-24	gx	02h52m03s	−04°50.1'		Cet	24"	ottima / buono	debolissima, in visione distolta solo a momenti appare orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SW; poco meglio evidente scalando a 340x.
MCG-1-3-25	gx	02h52m13s	−04°53.5'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-3-31	gx	00h54m32s	−04°36.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S ed estesa per ~ 1' — 450x.
MCG-1-3-32	gx	00h55m01s	−03°04.8'		Cet	24"	buona / buono	poco diffusa e con piccolo bulge quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-1-3-34	gx	00h55m28s	−03°26.5'		Cet	24"	m. buona / buono	forma una coppia con MCG-1-3-35 situata 1' a E — debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-3-35	gx	00h55m33s	−03°26.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia con MCG-1-3-34 situata 1' a W — piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; salta all'occhio abbastanza facilmente quando si osserva la precedente, ma è meglio restare a 450x.
MCG-1-3-38	gx	00h56m34s	−02°50.6'		Cet	16"	m. buona / ottimo	è più facile e più compatta di NGC 331, dalla quale dista 9' a SE; a 380x appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e appena più brillante all'interno.
MCG-1-3-40	gx	00h57m29s	−04°09.6'		Cet	24"	buona / discreto	relativamente facile, ma disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso W; poco diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-1-3-41	gx	00h57m35s	−05°00.2'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG-1-3-42	gx	00h57m42s	−04°56.9'		Cet	24"	m. buona / buono	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con bulge debolmente contrastato e nucleo stellare visibile a tratti — 450x.
MCG-1-3-44	gx	00h57m55s	−02°25.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	è una debolissima lama di luminosità uniforme, orientata da N a S per 45", molto disturbata dalla luce di una stellina brillante situata a ridosso verso NW — 380x.
MCG-1-3-46	gx	00h57m58s	−03°42.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, a prima vista circolare; in visione distolta appare invece orientata da NW a SE con dimensioni 60"×40", ma occorre scalare a 340x.
MCG-1-3-49	gx	00h58m11s	−08°13.0'		Cet	16"	ottima / buono	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un tenue alone grosso modo rotondo con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
MCG-1-3-52	gx	00h59m26s	−04°47.7'		Cet	24"	buona / buono	forma una coppia forse interagente con Arp 121 situata a ridosso SW — è diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante al bordo NE; la Arp appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" ed è anch'essa di luminosità pressoché uniforme — 450x.
MCG-1-3-54	gx	01h00m03s	−04°56.2'		Cet	24"	buona / buono	debole e di luminosità uniforme, diffusa approssim. rotonda con Ø > 30" — 450x.
MCG-1-3-56	gx	01h00m38s	−07°58.9'		Cet	16"	ottima / buono	debole bolla circolare di luminosità pressoché uniforme osservabile abbastanza facilmente anche in visione diretta a 380x; c'è una stellina a 1.5' verso SW.
MCG-1-3-59	gx	01h00m53s	−07°02.4'		Cet	16"	ottima / buono	fa parte del gruppo di NGC 345 — è una debolissima chiazza rotonda di ~ 40" di Ø che appare solo a tratti, ma è meglio scalare a 270x.
MCG-1-3-60	gx	01h01m03s	−04°05.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; forma un piccolo triangolo isoscele quasi rettangolo con due stelline abbastanza brillanti, una a W e l'altra a SW — 450x.
MCG-1-3-62	gx	01h01m14s	−04°26.3'		Cet	24"	buona / buono	molto debole e di aspetto un po' confuso in quanto disturbata, oltre che da una coppia di stelle brillanti, anche da una stellina situata al bordo N; non riesco onestamente a capire com'è fatta: forse rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
MCG-1-3-67	gx	01h01m48s	−04°51.5'		Cet	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; in visione distolta sembra aggettare a W di una stellina — 450x.
MCG-1-3-70	gx	01h01m59s	−06°23.2'		Cet	24"	buona / ottimo	è una debolissima lama di luce estesa per almeno 40" in direzione N-S; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MCG-1-3-74	gx	01h02m36s	−06°23.5'		Cet	16"	ottima / buono	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 35" o 40" di Ø — 380x.
MCG-1-3-75	gx	01h02m48s	−06°24.7'		Cet	16"	ottima / buono	è una debolissima lama di luce estesa per ~ 1' e orientata da NW a SE; appare in visione distolta a 380x.
MCG-1-3-76	gx	01h02m52s	−04°45.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, allungata da E a W, dimensioni 45"×30" e con nucleo marcato di aspetto quasi stellare; c'è una stellina a meno di 1' verso N (la SAO 129094, situata a soli 5' SSE, si riesce a tenere fuori campo a 380x).
MCG-1-3-79	gx	01h03m11s	−03°36.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-1-3-80	gx	01h03m18s	−04°13.0'		Cet	24"	buona / discreto	debolissima, osservabile in visione distolta a 1' NW di una stellina abbastanza brillante; scalando a 340x appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×10" (a 450x è di aspetto più confuso).
MCG-1-3-82	gx	01h03m26s	−04°52.8'		Cet	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e brillante, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; appare facilmente, ancorché sia immersa nei bagliori della 25 Ceti di 5ª grandezza situata 6.5' a NW (era visibile, molto debolmente, anche nel 16" in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
MCG-1-3-83	gx	01h03m56s	−02°15.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; è situata in una piccola zona depleta — 450x.
MCG-1-3-85	gx	01h05m05s	−06°12.3'	q 262	Cet	24"	buona / scarso	facile, molto diffusa, con gradiente di luce molto basso; non presenta discrepanze sul disco che è rotondo con Ø di 3'; poco meglio contrastata scalando a 210x (già precedentemente osservata, seppure molto debolmente, col 10" in condizioni di cielo analoghe; è riportata sull'Uranometria come **New 1**).
MCG-1-3-86	gx	01h05m02s	−06°44.2'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole e molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20 e con tenuissimo bulge diffuso osservabile a 380x.
MCG-1-3-87	gx	01h05m06s	−05°19.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-1-3-88	gx	01h05m08s	−06°16.3'		Cet	24"	buona / scarso	è un elusivo baffo di luce, esteso non più di 30" o 40", molto difficile da vedere e che in visione distolta pare aggettare a W di una stellina abbastanza brillante — 340x.
MCG-1-3-89	gx	01h05m19s	−05°25.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente facile da vedere, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x anche se diviene più problematico tenere fuori campo la SAO 199110-1, una doppia stretta con componenti di 7ª grandezza.
MCG-1-3-91	gx	01h06m20s	−06°11.8'		Cet	24"	buona / scarso	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso SE — 340x.
MCG-1-3-92	gx	01h07m15s	−03°08.2'		Cet	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-3-93	gx	01h07m20s	−03°09.5'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x quando si osserva la precedente, probabilmente rotonda con Ø pari a ~ la metà — 450x.
MCG-1-4-5	gx	01h09m42s	−02°15.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima e situata a ridosso N di una stellina abbastanza brillante; solo in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni ~ 60"×30", ma occorre scalare a 340x.
MCG-1-4-6	gx	01h10m37s	−03°13.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele molto acuminato (la componente più a S è la più brillante) — 450x.
MCG-1-4-7	gx	01h10m37s	−07°37.3'		Cet	16"	ottima / buono	relativamente facile a 380x, piccola e rotonda, con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 380x.
MCG-1-4-9	gx	01h11m12s	−07°32.8'		Cet	16"	ottima / buono	debolissima chiazza ovale orientata da E a W, di dimensioni ~ 45"×30" che aggetta verso W da una stellina brillante; è meglio visibile a 270x.
MCG-1-4-10	gx	01h11m23s	−06°49.7'		Cet	16"	ottima / buono	debolissima chiazza lattescente molto diffusa e di 40"-45" di Ø; a tratti sembra di intravedere una piccola condensazione centrale molto tenue — 270x.
MCG-1-4-11	gx	01h11m38s	−03°20.6'		Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, con alto gradiente, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
MCG-1-4-12	gx	01h12m01s	−05°44.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, ma più che altro disturbata da una stellina brillante situata 1' a NE; è molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG-1-4-14	gx	01h12m34s	−04°08.4'		Cet	16"	ottima / ottimo	forma una coppia assieme a MCG-1-4-15 — si vedono abbastanza facilmente a 380x malgrado il campo depleto; la 1ª è più brillante, rotonda, diffusa, con evidente condensazione centrale e Ø di 35"-40"; c'è una stellina a 1' verso S; la 2ª è più debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e dista 1' dalla precedente.
MCG-1-4-15	gx	01h12m35s	−04°08.4'		Cet	16"	ottima / ottimo	v. **MCG-1-4-14**
MCG-1-4-16	gx	01h14m25s	−07°28.7'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a 1' scarso verso N.
MCG-1-4-17	gx	01h14m27s	−07°52.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a momenti nei bagliori di 2 stelle molto brillanti distanti meno di 1' in direzione NNW-SSE: la 37 Ceti di 5ª grandezza e la SAO 129192 di 8a; queste stelle, forse per contrasto, appaiono rispettivamente bianco-verdastra (la più brillante) e violacea; la gx dovrebbe essere estesa una 30-ina di secondi, ma non riesco a capirne la forma — 450x.
MCG-1-4-18	gx	01h15m37s	−06°35.2'		Cet	16"	ottima / buono	assieme a MCG-1-4-19 forma una coppia di debolissime galassiette distanti 45" in direzione N-S; la 1ª è piccola e diffusa, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; la 2ª è solo un indistinto lucore situato tra 2 stelline distanti un paio di primi scarsi: una abbastanza brillante a W e un'altra debole a W — 380x.
MCG-1-4-19	gx	01h15m37s	−06°35.2'		Cet	16"	ottima / buono	v. **MCG-1-4-18**
MCG-1-4-21	gx	01h16m07s	−06°37.3'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
MCG-1-4-22	gx	01h16m07s	−06°43.4'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme — 380x.
MCG-1-4-24	gx	01h18m08s	−02°34.0'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-1-4-27	gx	01h21m39s	−07°21.3'		Cet	24"	buona / buono	poco più debole di MCG-1-4-29, dalla quale dista 4' verso SW, e con una condensazione centrale poco meno marcata; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-1-4-28	gx	01h21m45s	−03°32.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-1-4-29	gx	01h21m51s	−07°18.7'		Cet	24"	buona / buono	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-4-31	gx	01h23m02s	−06°38.1'		Cet	16"	ottima / m. buono	debolissima, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
MCG-1-4-32	gx	01h23m12s	−06°38.1'		Cet	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
MCG-1-4-33	gx	01h23m21s	−06°48.5'		Cet	16"	ottima / m. buono	è molto debole, ma tutto sommato più facile di MCG-1-4-31 e MCG-1-4-32, poco allungata da 30"×20" e di luminosità uniforme — 380x.
MCG-1-4-34	gx	01h23m22s	−07°08.6'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è meglio visibile a 450x, ma il campo tende a essere depleto.
MCG-1-4-37	gx	01h24m29s	−04°33.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
MCG-1-4-38	gx	01h25m03s	−04°38.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	assieme a MCG-1-4-39 forma una coppia di gx distanti ~ 1' in direzione NW-SE, di aspetto e luminosità simili, rotonde con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme; forse la 2ª è solo leggermente più estesa — 450x.
MCG-1-4-39	gx	01h25m04s	−04°39.0'		Cet	24"	ottima / ottimo	v. **MCG-1-4-38**
MCG-1-4-40	gx	01h25m04s	−04°42.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	facile, diffusa e con bulge evidente, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" — 450x.
MCG-1-4-42	gx	01h25m58s	−03°58.9'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, ma più che altro disturbata dalla SAO 129292 di magnitudo 6.5 che brilla ad appena 3.5' NNW; solo a tratti in visione distolta appare grosso modo orientata da E a W con dimensioni 80"×40"; è tuttavia meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-4-43	gx	01h25m58s	−03°58.9'		Cet	24"	buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, presenta un tenue bulge diffuso e un alone rotondo esteso una 40-ina di secondi; è purtroppo molto difficile riuscire a tenere fuori campo la SAO 129292 situata a 6' SW — 450x.
MCG-1-4-45	gx	01h26m20s	−07°28.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	assieme a MCG-1-4-46 forma una coppia di minuscole galassiette che nonostante il seeing si separano facilmente, meglio a 450x; la 1ª, estesa una 15-ina di secondi, è più diffusa e presenta un nucleo stellare; la 2ª è di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una decina di secondi.
MCG-1-4-46	gx	01h26m20s	−07°28.4'		Cet	24"	m. buona / mediocre	v. **MCG-1-4-45**
MCG-1-4-51	gx	01h27m24s	−06°08.5'		Cet	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
MCG-1-4-54	gx	01h28m25s	−02°35.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole lama di luce di aspetto uniforme orientata da NE a SW ed estesa per 1.5' — 450x.
MCG-1-4-55	gx	01h28m59s	−02°25.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa e orientata come MCG-1-4-54, ma appare solo in visione distolta scalando a 340x.
MCG-1-4-58	gx	01h29m58s	−04°42.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-1-5-6	gx	01h33m01s	−05°00.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno; in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; meglio comunque contrastata scalando a 340x.
MCG-1-5-9	gx	01h36m54s	−05°00.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-1-5-10	gx	01h37m38s	−05°03.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×40" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MCG-1-5-12	gx	01h38m00s	−07°34.0'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 340x.
MCG-1-5-14	gx	01h40m30s	−05°31.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso S — 450x.
MCG-1-5-15	gx	01h40m20s	−07°54.9'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, solo a momenti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-1-5-16	gx	01h40m25s	−07°54.2'		Cet	24"	buona / buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa per circa 1'; sia questa sia MCG-1-5-15 diventano difficili a 450x, perché il centro campo è virtualmente depleto.
MCG-1-5-17	gx	01h41m07s	−05°34.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, ma molto diffusa e con bassissimo gradiente di luce, allungata da ENE a WSW con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' NW — 450x.
MCG-1-5-18	gx	01h41m34s	−02°24.1'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-1-5-19	gx	01h41m45s	−04°12.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso W.
MCG-1-5-20	gx	01h41m53s	−04°52.6'		Cet	16"	m. buona / ottimo	assieme a MCG-1-5-21 forma una coppia di gx orientate tra loro in modo perpendicolare; la 1ª è più debole, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; la 2ª è di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
MCG-1-5-21	gx	01h41m53s	−04°52.6'		Cet	16"	m. buona / ottimo	v. **MCG-1-5-20**
MCG-1-5-24	gx	01h43m06s	−04°42.2'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-5-25	gx	01h43m43s	−04°00.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	facile, molto diffusa e con bulge abbastanza contrastato, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40" — 450x.
MCG-1-5-26	gx	01h43m36s	−07°49.0'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE — 340x.
MCG-1-5-28	gx	01h44m39s	−07°37.1'		Cet	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso con nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso NE — 340x.
MCG-1-5-29	gx	01h44m45s	−04°08.1'		Cet	24"	ottima / buono	facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 450x.
MCG-1-5-30	gx	01h45m06s	−04°18.6'		Cet	24"	ottima / buono	chiazza molto debole e spampanata, di aspetto un po' irregolare, grosso modo rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a 1' SW; meglio evidente scalando a 340x.
MCG-1-5-31	gx	01h45m25s	−03°49.6'		Cet	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; appare facilmente anche in visione diretta a 380x.
MCG-1-5-32	gx	01h45m40s	−04°40.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni che in visione distolta sono di ~ 60"×30" e con piccolo bulge abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' scarso verso E — 450x.
MCG-1-5-34	gx	01h46m39s	−03°46.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo e di aspetto confuso, rimane tale anche scalando a 340x pur rendendosi poco meglio contrastata; è equidistante, anche se non proprio allineata, con due stelline a S; tra queste due stelline, distante 1.5', appare elusivamente un oggetto diffuso molto piccolo, esteso sì e no 10"-12": quest'ultimo è poi risultato essere la PGC 94320.
MCG-1-5-35	gx	01h48m17s	−04°23.4'		Cet	24"	ottima / buono	debole e molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a 1' verso E — 450x.
MCG-1-5-36	gx	01h49m15s	−03°41.0'		Cet	16"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40"; c'è una stellina a ridosso SE — 380x.
MCG-1-5-38	gx	01h50m00s	−06°26.5'		Cet	24"	buona / buono	piccola, poco diffusa e solo a momenti leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.

MCG-1-5-39	gx	01h50m00s	−06°29.2'		Cet	24"	buona / buono	relativamente compatta, con tenue bulge diffuso, appena percettibile, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG-1-5-40	gx	01h50m41s	−03°56.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-1-5-41	gx	01h51m08s	−02°45.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" — 450x.
MCG-1-5-42	gx	01h51m11s	−03°29.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-5-44	gx	01h51m28s	−06°31.0'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' verso SE — 340x.
MCG-1-5-45	gx	01h51m50s	−05°29.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	assieme alla successiva e a MAC 0151-0530 forma un trio di galassie molto difficili, perché oltre a essere debolissime sono anche situate in un piccola zona di cielo depleta; occorre quindi scalare a 340x; la 1a in visione distolta appare molto allungata da E a W ed estesa 1' scarso; la 2a è invece molto piccola, poco diffusa e orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10".
MCG-1-5-46	gx	01h52m02s	−05°30.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG-1-5-45**
MCG-1-5-47	gx	01h52m49s	−03°26.8'		Cet	16"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce orientata da NNW a SSE, estesa un paio di primi e spessa al massimo una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 270x.
MCG-1-5-48	gx	01h54m11s	−02°38.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di forma indistinta, estesa sì e no una 20-ina di secondi; ogni tanto appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se trattasi del nucleo o di una stellina sovrapposta — 450x.
MCG-1-5-49	gx	01h54m21s	−02°37.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG-1-6-1	gx	01h56m13s	−02°41.5'		Cet	16"	ottima / ottimo	assieme a MCG-1-6-2 forma una coppia di deboli oggetti rotondi, relativamente compatti, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 20"; il 1° è più evidente; sono situate all'interno di un asterismo di 5 stelline che sembra una "casetta" — 380x.
MCG-1-6-2	gx	01h56m15s	−02°41.3'		Cet	16"	ottima / ottimo	v. **MCG-1-6-1**
MCG-1-6-5	gx	01h56m48s	−03°44.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	è una bella galassietta brillante e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30", con bulge rotondo, contrastato e piccolo nucleo stellare — 450x.
MCG-1-6-8	gx	01h58m23s	−07°10.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima, ma più che altro disturbata da alcune stelle brillanti presenti nel campo, fra cui la SAO 129594 di 10ª grandezza situata 3' a N; in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG-1-6-9	gx	01h58m37s	−02°46.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
MCG-1-6-10	gx	01h58m38s	−02°45.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30" (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
MCG-1-6-11	gx	01h50m34s	−07°42.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; non è particolarmente disturbata dalla SAO 129597 situata 6' a N — 400x.
MCG-1-6-12	gx	01h58m52s	−08°09.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	chiazza rotonda molto debole e diffusa, di luminosità uniforme e di almeno 1' di Ø; c'è una stellina subito a N — 400x.
MCG-1-6-13	gx	01h59m09s	−03°09.1'		Cet	16"	ottima / ottimo	assieme a MCG-1-6-14 forma una coppia di debolissime galassie che si riescono a separare da una stellina brillante che disturba solo a 380x; la 2ª è più facile e, pur essendo piccolissima, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; la 1ª è invece di aspetto più confuso, ma non è comunque più estesa di 20"-25".
MCG-1-6-14	gx	01h59m12s	−03°09.2'		Cet	16"	ottima / ottimo	v. **MCG-1-6-13**
MCG-1-6-18	gx	01h59m44s	−07°50.3'		Cet	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" (c'è una falcetta di Luna presso il tramonto) — 400x.
MCG-1-6-23	gx	02h00m15s	−06°05.5'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
MCG-1-6-24	gx	02h00m59s	−05°30.5'		Cet	16"	m. buono/ mediocre	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa almeno 1' — 270x.
MCG-1-6-27	gx	02h01m31s	−07°17.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 400x.
MCG-1-6-28	gx	02h02m01s	−02°50.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare; forma un piccolo triangolo equilatero con una stellina brillante 30" ENE e una molto debole a 30" SW — 450x.
MCG-1-6-29	gx	02h02m14s	−02°50.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 50"×20" e con nucleo marcato di aspetto stellare — 450x.
MCG-1-6-30	gx	02h01m59s	−08°14.7'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, salta fuori facilmente in visione distolta a 400x, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina a 1' verso WSW (c'è una falcetta di Luna presso il tramonto).
MCG-1-6-31	gx	02h02m13s	−06°04.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" — 450x.
MCG-1-6-32	gx	02h02m17s	−07°00.0'		Cet	24"	m. buona / buono	assieme a MCG-1-6-33 forma una coppia di deboli galassiette rotonde, relativamente facili, tuttavia meglio contrastate a 340x; sono entrambe rotonde con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale quasi stellare; la 1ª è un poco più evidente; sono situate tra 2 stelline deboli distanti poco più di 3' in direzione NW-SE — 450x.
MCG-1-6-33	gx	02h02m15s	−07°00.5'		Cet	24"	m. buona / buono	v. **MCG-1-6-32**
MCG-1-6-34	gx	02h02m26s	−04°11.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-6-35	gx	02h02m38s	−06°14.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima, solo a momenti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 45"×15" — 450x.
MCG-1-6-37	gx	02h03m49s	−08°07.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30" o poco più — 450x.
MCG-1-6-38	gx	02h04m20s	−04°55.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti poco più brillante all'interno, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina subito a N; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-6-40	gx	02h04m50s	−02°25.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di 40"-45" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
MCG-1-6-41	gx	02h05m05s	−06°30.5'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' — 400x.
MCG-1-6-42	gx	02h05m20s	−06°27.1'		Cet	24"	ottima / m. buono	situata 5' a NE di MCG-1-6-41, è una lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W per oltre 1' — 400x.
MCG-1-6-44	gx	02h06m19s	−02°21.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-1-6-48	gx	02h08m26s	−03°29.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; poco meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W.
MCG-1-6-47	gx	02h07m51s	−06°32.2'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale visibile a tratti — 400x.
MCG-1-6-52	gx	02h09m29s	−06°12.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 400x.
MCG-1-6-56	gx	02h10m02s	−07°37.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare poco contrastato — 450x.
MCG-1-6-57	gx	02h10m33s	−06°37.0'		Cet	24"	ottima / m. buono	assieme ad alcune delle voci seguenti costituisce un piccolo gruppo di gx molto deboli che, salvo una, sono disposte lungo un arco; questa è molto debole, poco diffusa e con Ø < 30" — 400x.
MCG-1-6-59	gx	02h10m42s	+06°34.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	assieme a MCG-1-6-62 forma una coppia ravvicinata distanti una 40-ina di secondi in direzione NE-SW — la 1ª è più debole, rotonda con Ø di 20"; la 2ª è forse la più evidente dell'arco; rotonda, poco diffusa e con Ø uguale alla precedente — 400x.
MCG-1-6-61	gx	02h10m53s	−06°34.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, estesa 15"-20"— 400x.
MCG-1-6-62	gx	02h10m43s	−06°34.8'		Cet	24"	ottima / m. buono	v. **MCG-1-6-59**
MCG-1-6-63	gx	02h10m53s	−02°48.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con tenue nucleo quasi stellare poco contrastato; disturbata in parte dalla SAO 129731 di 9ª grandezza situata ad appena 1' SW — 450x.
MCG-1-6-64	gx	02h10m53s	−06°33.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente facile e compatta, rotonda con Ø < 20" e una tenue condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante a una 40-ina di secondi NW; c'è da segnalare un errore di posizione sul Megastar, poiché la sigla è in realtà assegnata alla PGC 8359 situata un paio di primi a ENE; quest'ultima appare come un piccolo ed elusivo baffo orientato da E a W ed esteso una 20-ina di secondi; meglio evidente spingendo a 580x.
MCG-1-6-65	gx	02h11m03s	−06°32.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 400x, molto diffusa e Ø simile a MCG-1-6-64.
MCG-1-6-66	gx	02h11m47s	−05°54.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole e spampanata, di forma indistinta anche perché disturbata da una stellina abbastanza brillante situata a 1' NE; non sembra comunque più estesa di 40"-45"; meglio evidente scalando a 340x.
MCG-1-6-67	gx	02h11m44s	−06°29.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa oltre 1'; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-6-68	gx	02h11m47s	−05°54.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccolo nucleo quasi stellare poco contrastato; c'è una stellina brillante al bordo NW — 450x.
MCG-1-6-70	gx	02h13m16s	−07°39.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	fa parte di un terzetto assieme a MCG-1-6-74 ed MCG-1-6-75 — relativamente brillante, molto diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e marcata condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 400x.
MCG-1-6-71	gx	02h13m11s	−06°20.4'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø 30" -35" — 400x.
MCG-1-6-73	gx	02h13m22s	−02°20.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	brillante e relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-1-6-74	gx	02h13m24s	−07°43.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	fa parte di un terzetto assieme a MCG-1-6-70 ed MCG-1-6-75 — più debole e diffusa della seconda elencata, osservata per prima e dalla quale dista 2' a SSW; è di dimensioni simili, orientata da NE a SW e con tenue condensazione centrale visibile a tratti a 400x.
MCG-1-6-75	gx	02h13m28s	−07°41.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	fa parte di un terzetto assieme alla precedente e a MCG-1-6-70 — relativamente compatta, con nucleo stellare, poco allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×20" — 400x.
MCG-1-6-77	gx	02h14m25s	−07°22.2'		Cet	24"	m. buona / buono	è una bella lama di luce, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa un paio di primi — 400x.
MCG-1-6-78	gx	02h14m36s	−07°14.6'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima lama di luce che appare in visione distolta a un paio di primi SSE di una stellina — 400x.
MCG-1-6-79	gx	02h16m52s	−03°11.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-1-6-80	gx	02h17m19s	−05°28.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, un po' meglio contrastata scalando a 340x, in visione distolta appare chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30".
MCG-1-6-81	gx	02h17m16s	−06°04.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è la SAO 129800 di magnitudo 10.5 a 1.5' NE che disturba un po' l'osservazione — 450x.
MCG-1-6-82	gx	02h17m35s	−07°42.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge appena più contrastato e visibile a momenti; meglio evidente scalando a 340x.
MCG-1-6-83	gx	02h17m49s	−06°49.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	è una debolissima lama di luce che appare solo a momenti in visione distolta alternando gli occhi, ma non bisogna scendere sotto i 450x; è orientata da E a W ed estesa ~ 1'; c'è una stellina quasi a ridosso NE.
MCG-1-6-84	gx	02h18m12s	−06°49.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-1-6-85	gx	02h18m16s	−06°42.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-6-86	gx	02h18m19s	−06°47.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
MCG-1-6-87	gx	02h18m38s	−06°53.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	v. **IC 219**
MCG-1-7-4	gx	02h23m13s	−04°31.0'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
MCG-1-7-5	gx	02h23m38s	−07°15.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, disturbata da una coppia di stelline abbastanza brillanti situate a ridosso E e S; in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG-1-7-6	gx	02h23m54s	−07°21.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
MCG-1-7-10	gx	02h25m57s	−04°19.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG-1-7-13	gx	02h27m24s	−03°57.5'		Cet	24"	ottima / m. buono	debolissima, a tratti appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×20"; meglio tuttavia scalare a 340x.
MCG-1-7-15	gx	02h28m11s	−05°50.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-7-16	gx	02h29m32s	−03°12.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	insolitamente brillante per una MCG! È allungata da E a W, con bulge evidente, nucleo stellare e un alone molto diffuso, molto tenue di dimensioni 60"×45" — 380x (anche se l'alone si apprezza meglio a 270x).
MCG-1-7-18	gx	02h30m34s	−04°37.5'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e con piccola condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata al vertice N di un piccolo triangolo equilatero formato con due stelline a SE e SSW — 450x.
MCG-1-7-21	gx	02h30m24s	−04°29.4'		Cet	24"	m. buona / buono	è un debole ovale poco diffuso e di luminosità uniforme, orientato da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-1-7-22	gx	02h34m48s	−07°41.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	rotonda, di aspetto molto regolare, poco diffusa, con Ø di 45" e nucleo stellare percettibile a 400x.
MCG-1-7-28	gx	02h40m24s	−02°43.7'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole ed estesa, molto diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 90"×20"; c'è una debole stellina a ridosso N — 450x.
MCG-1-7-29	gx	02h40m33s	−02°43.2'		Cet	24"	ottima / m. buono	situata un paio di primi a E della precedente, è relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
MCG-1-7-37	gx	02h42m23s	−03°06.4'		Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta e brillante, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
MCG-1-7-39	gx	02h43m15s	−03°52.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-1-8-1	gx	02h43m43s	−06°39.2'		Cet	24"	buona / mediocre	è una chiazza elusiva di forma indistinta ed estesa sì e no una 40-ina di secondi; appare solo a tratti in visione distolta a 280x.
MCG-1-8-2	gx	02h44m45s	−08°09.8'		Cet	16"	buona / ottimo	è un'elusiva chiazza con Ø < 1' che appare solo a tratti in visione distolta a poco più di 1' SE di una stellina — 380x.
MCG-1-8-5	gx	02h46m05s	−03°20.1'		Eri	24"	m. buona / ottimo	assieme a MCG-1-8-6 forma una coppia di piccole galassiette molto diffuse e quasi a contatto in direzione N-S; la 1ª è molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; la 2ª è decisamente più facile, rotonda, con Ø > 20" e presenta un piccolo nucleo quasi stellare — 450x.
MCG-1-8-6	gx	02h46m05s	−03°20.1'		Eri	24"	m. buona / buono	v. **MCG-1-8-5**
MCG-1-8-8	gx	02h47m07s	−02°58.4'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è un piccolo triangolo molto allungato a E della gx (il vertice SE è in realtà doppio e una stellina appena percettibile salta fuori, solo a momenti, all'interno) — 450x.
MCG-1-8-9	gx	02h48m40s	−04°36.8'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
MCG-1-8-12	gx	02h49m38s	−06°12.8'		Eri	24"	buona / ottimo	chiazza diffusa e molto stemperata sul fondo cielo, meglio contrastata scalando a 340x, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; è situata tra due deboli stelline orientate da ENE a WSW.
MCG-1-8-13	gx	02h50m40s	−02°59.3'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' SW — 450x.
MCG-1-8-14	gx	02h50m44s	−06°44.8'		Eri	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-1-8-15	gx	02h54m54s	−06°22.4'		Eri	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di ~ 1'; a tratti appare una zona interna leggermente più brillante; meglio osservabile a 380x.
MCG-1-8-21	gx	02h58m17s	−04°49.1'		Eri	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 40"; disturbata dalla SAO 130219 di 9ª grandezza situata a poco più di 1' NNW — 450x.
MCG-1-8-23	gx	02h58m17s	−04°49.1'		Eri	24"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-1-8-25	gx	02h59m10s	−04°28.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", diffusa e con bulge rotondo abbastanza brillante — 450x.
MCG-1-8-26	gx	03h05m18s	−02°20.5'		Eri	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-8-27	gx	03h05m27s	−05°44.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina al bordo SE — 450x.
MCG-1-9-7	gx	03h08m57s	−05°06.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1' — 450x.
MCG-1-9-10	gx	03h09m31s	−04°54.7'		Eri	16"	ottima / buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni ~ 60"×40"; meglio tuttavia scalare a 270x.
MCG-1-9-15	gx	03h12m54s	−02°54.1'		Eri	16"	ottima / buono	presenta un piccolo bulge marcato circonfuso da un tenue alone orientato da WNW a ESE con dimensioni 60"×30"; disturbata dalla SAO 130354 di 7ª grandezza situata a soli 2.5' verso W [la MAC 0312-0254 che si troverebbe a ridosso N della SAO è in realtà una stella] — 380x.
MCG-1-9-17	gx	03h13m24s	−08°12.7'		Eri	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-1-9-21	gx	03h14m38s	−04°46.4'		Eri	16"	ottima / buono	è un diffuso lucore molto debole e stemperato sul fondo cielo, grosso modo rotondo con Ø forse > 1'; è meglio però scalare a 188x.
MCG-1-9-22	gx	03h15m52s	−03°37.8'		Cet	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda, con Ø di 45" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso verso E — 380x.
MCG-1-9-24	gx	03h16m00s	−05°30.0'		Eri	16"	ottima / buono	relativamente compatta, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 90"×30" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
MCG-1-9-27	gx	03h19m26s	−06°07.2'		Eri	24"	buona / buono	relativamente facile e compatta, con evidente bulge diffuso, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 400x.
MCG-1-9-31	gx	03h22m17s	−07°05.4'		Eri	16"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa e con piccolo nucleo abbastanza evidente; è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
MCG-1-9-34	gx	03h24m26s	−04°49.1'		Eri	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
MCG-1-9-39	gx	03h25m11s	−06°10.9'		Eri	24"	m. buona / mediocre	facile, diffusa, con tenue condensazione centrale e qualche discrepanza di luce all'interno; è allungata da NE a SW con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo S — 450x.
MCG-1-9-40	gx	03h28m04s	−04°49.1'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' NNE; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-9-43	gx	03h30m19s	−04°14.6'		Eri	16"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, salvo una piccola condensazione centrale molto tenue visibile solo a tratti, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" — 270x.
MCG-1-9-44	gx	03h30m45s	−04°51.0'		Eri	16"	m. buona / discreto	debole, allungata da NNE a SSW (ossia a perpendicolo con la congiungente delle 2 stelline a N) con dimensioni 40"×20"; presenta un tenue bulge diffuso e un nucleo stellare visibile a tratti a 270x.
MCG-1-9-45	gx	03h31m23s	−05°08.5'		Eri	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" (la zona interna sembra a tratti poco allungata da E a W) — 450x.
MCG-1-10-1	gx	03h32m37s	−04°45.0'		Eri	16"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 30" — 380x.
MCG-1-10-6	gx	03h34m12s	−04°48.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e con evidente condensazione centrale, anche se poco contrastata; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele molto allungato il cui vertice più acuto, occupato da una stella abbastanza brillante, punta a SE — 450x.
MCG-1-10-7	gx	03h35m31s	−04°19.0'		Eri	24"	discreta / buono	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; la visione è un po' disturbata dalla SAO 130593 di magnitudo 9.5 situata 4' a SE e da una coppia di stelline brillanti della stessa luminosità a NW con le quali la gx è allineata — 450x.
MCG-1-10-8	gx	03h35m55s	−02°52.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e condensata, rotonda con Ø > 30"; forma una coppia ravvicinata con MAC 0335-0252 situata a ridosso verso SE: quest'ultima è più piccola, palesemente più debole e di luminosità uniforme; c'è una stellina visibile a tratti a ridosso verso E — 450x.
MCG-1-10-12	gx	03h37m59s	−06°16.2'		Eri	24"	buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina al bordo NE — 400x.
MCG-1-10-14	gx	03h38m33s	−05°28.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a ridosso verso E; meglio definita a 340x.
MCG-1-10-15	gx	03h38m39s	−05°20.9'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-1-10-16	gx	03h39m03s	−03°37.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e con condensazione centrale poco contrastata sul disco, allungata da E a W con dimensioni 80"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-10-18	gx	03h40m37s	−02°37.5'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-1-10-19	gx	03h40m43s	−06°24.9'		Eri	16"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 380x.
MCG-1-10-23	gx	03h42m10s	−06°45.9'		Eri	16"	m. buona / m. buono	debole oggetto rotondo, poco diffuso, di ~ 30" di Ø e con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti a 380x.
MCG-1-10-27	gx	03h44m00s	−04°01.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e con bassissima luminanza superficiale, grosso modo rotonda con Ø di 1'; meglio contrastata scalando a 340x (ci sono 4 stelle brillanti a N sistemate in 2 coppie orientate nello stesso modo).
MCG-1-10-28	gx	03h45m36s	−07°28.3'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' W; un nodulo diffuso molto debole con Ø di una 10-ina di secondi appare a ridosso M, ma solo a momenti si "stacca" dalla galassia principale: si tratta di MAC 0345-0728 — 450x.
MCG-1-10-30	gx	03h45m41s	−07°30.7'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-1-10-31	gx	03h46m03s	−03°12.5'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, forse circolare con Ø 40" o 45" — 450x.
MCG-1-10-35	gx	03h46m36s	−04°27.2'		Eri	24"	buona / buono	è una lama di luce poco diffusa, di aspetto abbastanza uniforme salvo un piccolo nucleo appena percettibile; in visione distolta appare estesa almeno un paio di primi in direzione NNE-SSW (ossia quasi a perpendicolo con una coppia di stelline a SE e che sono orientate da NW a SE — 450x.
MCG-1-10-36	gx	03h46m58s	−03°27.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge appena accennato — 450x.
MCG-1-10-39	gx	03h49m05s	−03°03.6'		Eri	24"	discreta / buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1.5'; appare facilmente in visione distolta, ma preferibile non scendere sotto i 450x.
MCG-1-10-40	gx	03h50m04s	−04°17.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	rotonda, poco diffusa, con Ø < 30" e nucleo stellare; c'è una stellina brillante a ridosso verso E — 450x.
MCG-1-10-41	gx	03h50m43s	−02°51.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 1'; c'è una stellina quasi a ridosso NE; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-10-42	gx	03h50m55s	−07°03.6'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
MCG-1-10-44	gx	03h51m25s	−07°40.7'		Eri	24"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce, orientata ~ da N a S ed estesa 1.5'; è un po' disturbata dalla SAO 130776 di magnitudo 9.6 situata 3' a NNE — 450x.
MCG-1-10-46	gx	03h54m33s	−02°55.1'		Eri	16"	m. buona / discreto	debole, rotonda, relativamente compatta, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi; situata a soli 4.5' NE di 32 Eridani, una doppia stretta molto bella, con la componente più brillante giallo-oro e l'altra verde-azzurra; si riesce tuttavia a tenere fuori campo a 380x.
MCG-1-10-47	gx	03h55m05s	−06°13.3'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso W.
MCG-1-11-1	gx	04h02m43s	−04°27.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20", con tenue bulge diffuso e poco contrastato; situata all'interno di un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a rettangolo irregolare — 450x.
MCG-1-11-2	gx	04h06m15s	−08°38.2'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e relativamente estesa, allungata da E a W con dimensioni 90"×45"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-11-3	gx	04h09m25s	−04°09.4'		Eri	24"	ottima / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1' S; meglio evidente scalando a 340x.
MCG-1-11-4	gx	04h10m33s	−07°10.1'		Eri	24"	m. buona / mediocre	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, abbastanza ben definita a 450x, orientata da NE a SW ed estesa un paio di primi.
MCG-1-11-5	gx	04h10m55s	−07°16.8'		Eri	24"	m. buona / mediocre	rotonda, molto debole con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare evidente; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a 1' verso NW — 450x.
MCG-1-11-6	gx	04h11m45s	−03°48.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza grosso modo circolare, estesa una 40-ina di secondi e uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso W e una più debole a S; meglio comunque restare a 450x per via della SAO 131013 di 10ª grandezza situata 5' a NW.
MCG-1-11-8	gx	04h14m32s	−06°38.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; a tratti appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è il nucleo o una stellina sovrapposta; meglio evidente a scalando a 340x.
MCG-1-12-1	gx	04h20m57s	−04°44.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di aspetto uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' scarso; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MCG-1-12-3	gx	04h24m30s	−03°39.5'		Eri	24"	m. buona /m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina appena percettibile al bordo N; un'altra stellina molto debole è situata quasi a ridosso W, mentre una terza, poco più distante, si trova verso S — 450x.
MCG-1-12-4	gx	04h25m32s	−03°30.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-12-5	gx	04h25m51s	−08°33.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina al bordo SE e una molto debole a quello N — 450x.
MCG-1-12-6	gx	04h25m55s	−08°34.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-1-12-8	gx	04h27m05s	−06°09.9'		Eri	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e con tenuissimo nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-12-9	gx	04h27m11s	−06°07.6'		Eri	24"	m. buona / buono	anche a 450x rimane un oggetto pressoché puntiforme; in pratica ciò che si vede è il debole nucleo della gx situata a ridosso S di MCG-1-12-10.
MCG-1-12-10	gx	04h27m11s	−06°07.2'		Eri	24"	m. buona / buono	poco diffusa e con condensazione centrale evidente, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' verso NE; una stellina appena percettibile appare a tratti a ridosso verso S: da un controllo successivamente effettuato, questa è risultata essere il nucleo di MCG-1-12-9 — 450x.
MCG-1-12-12	gx	04h28m23s	−06°17.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; un nodulo molto piccolo ed elusivo si stacca a tratti verso E e di fatto si tratta di MAC 0428-0617; un altro oggetto elusivo appare solo a momenti quasi a ridosso verso N, ma dovrebbe essere una stellina — 450x.
MCG-1-12-15	gx	04h31m24s	−03°55.5'		Eri	16"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di almeno 1' e di luminosità uniforme; c'è una stellina a poco più di 1' verso NE — 270x.
MCG-1-12-24	gx	04h32m23s	−07°17.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola diffusa e solo a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NE e una appena percettibile alla stessa distanza verso SE — 450x.
MCG-1-12-26	gx	04h32m50s	−06°01.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	relativamente brillante, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo quasi stellare poco contrastato — 450x.
MCG-1-12-27	gx	04h32m47s	−07°18.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza oblunga orientata da NE a SW ed estesa forse 1'; appare solo a momenti, ma la visione non sembra migliorare scalando a 340x; a 450x il campo attorno alla gx è alquanto depleto.
MCG-1-12-37	gx	04h36m50s	−03°02.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SW (situata 9' NNE di NGC 1622 — vedi) — 450x.
MCG-1-12-41	gx	04h39m20s	−04°56.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E; la visione è disturbata da 3 stelle brillanti allineate da N a S (che sono, in sequenza crescente, le SAO 131387, -88 e -89 rispettivamente di 10a, 9ª e 8ª grandezza) — 450x.
MCG-1-13-7	gx	04h46m33s	−07°14.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-1-13-8	gx	04h48m23s	−03°22.0'		Ori	24"	buona / buono	relativamente brillante diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-1-13-11	gx	04h48m34s	−03°52.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e con tenue bulge debolmente contrastato, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso verso W; la gx è in parte disturbata da una stellina brillante situata 1' a NE (la quale fa parte di un piccolo triangolo isoscele schiacciato con componenti di uguale luminosità) — 450x.
MCG-1-13-16	gx	04h50m29s	−03°31.3'		Ori	24"	buona / buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge diffuso appena contrastato sul disco; è situata all'interno di un gruppo di una decina di stelle brillanti (e che sembra un piccolo ammasso aperto, soprattutto scalando gli ingrandimenti) — 450x.
MCG-1-13-22	gx	04h51m27s	−03°07.3'		Ori	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20" e di luminosità uniforme; disturbata dalla SAO 131544 di 9ª grandezza situata 1.5' a SSE — 450x.
MCG-1-13-25	gx	04h51m41s	−03°48.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW, ma non dà fastidio osservando a 450x.
MCG-1-13-29	gx	04h52m17s	−06°09.2'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 450x.
MCG-1-13-30	gx	04h52m25s	−03°34.0'		Ori	16"	ottima / scarso	facile, rotonda, diffusa, di una 40-ina di secondi di Ø e con condensazione centrale ben evidente; c'è una stellina brillante a ridosso verso N e un'altra più debole a eguale distanza verso W — 270x.
MCG-1-13-33	gx	04h53m17s	−03°00.6'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-1-13-37	gx	04h56m21s	−04°26.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	bella, rotonda con Ø di 1' scarso, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; è situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo: le 2 stelline più brillanti a W e NW formano il cateto minore — 450x.
MCG-1-13-49	gx	05h02m38s	−08°18.1'		Eri	24"	buona / buono	debolissimo lucore rotondo con Ø di ~ 1'; è osservabile in visione distolta, ma occorre scalare a 280x.
MCG-1-13-50	gx	05h03m17s	−02°56.2'		Ori	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 90"×20"; presenta un bulge evidente, uniforme di 30"×20"; c'è una stellina a ridosso W; meglio contrastata scalando a 340x, anche se diviene più infastidita dalla SAO 131726 di magnitudo 7.7 situata 3' scarsi a SSE.
MCG-1-13-51	gx	05h24m26s	−08°23.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x; situata a SW di un asterismo formato da 4 stelle brillanti di 9ª grandezza.
MCG-1-14-3	gx	05h11m42s	−03°05.5'		Ori	24"	m. buona / buono	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30", con bulge rotondo abbastanza contrastato e nucleo stellare evidente (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 450x.
MCG-1-14-4	gx	05h11m44s	−03°01.1'		Ori	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15"; c'è una debole stellina al bordo S — 450x.
MCG-1-14-5	gx	05h13m11s	−03°20.4'		Ori	24"	ottima / discreto	debole chiazza lattescente di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; si trova in mezzo a due stelline brillanti (quella a S è la più luminosa) — 450x.
MCG-1-14-6	gx	05h15m15s	−04°24.1'		Ori	24"	ottima / discreto	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso verso E — 450x.
MCG-1-14-7	gx	05h15m42s	−03°26.6'		Ori	24"	ottima / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra due stelle molto luminose (SAO 131918 e 131928 di 7ª grandezza) che si possono tenere fuori campo solo una alla volta a 450x.
MCG-1-14-9	gx	05h16m44s	−03°51.7'		Ori	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 450x.
MCG-1-14-12	gx	05h30m14s	−08°45.8'		Ori	24"	m. buona / buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso; situata all'interno di un triangolo quasi rettangolo di stelle brillanti che offuscano un po' la visione — 450x.
MCG-1-15-2	gx	05h32m53s	−07°46.6'		Ori	16"	ottima / buono	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare all'incirca orientata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 270x.
MCG-1-22-1	gx	08h19m34s	−07°02.4'		Hya	24"	m. buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE (posta a perpendicolo con MCG-1-22-2), con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' verso W (la quale fa parte di un piccolo triangolo rettangolo) — 340x.
MCG-1-22-2	gx	08h19m59s	−07°04.6'		Hya	24"	m. buona / scarso	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale quasi stellare, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è un piccolo triangolo di stelline a S — 340x.
MCG-1-22-4	gx	08h22m07s	−08°09.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
MCG-1-22-5	gx	08h22m39s	−08°14.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo W e una più evidente a 1' scarso NW — 450x.
MCG-1-22-6	gx	08h23m06s	−04°56.5'		Hya	24"	buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 570x a ridosso verso E di una stellina appena percettibile; non è più estesa di 15" o 20".
MCG-1-22-7	gx	08h23m01s	−04°56.1'		Hya	24"	buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 570x.
MCG-1-22-11	gx	02h29m51s	−15°39.8'		Hya	24"	buona / m. buono	molto debole e molto diffusa, con condensazione centrale appena percettibile, solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; allineata ed equidistante con 2 stelline a E — 450x.
MCG-1-22-13	gx	08h28m47s	−06°56.4'		Hya	16"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, nucleo quasi stellare e poco più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
MCG-1-22-14	gx	08h29m54s	−07°32.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, a tratti appena più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; situata a ridosso S di un piccolo triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta a E — 450x.
MCG-1-22-16	gx	08h31m03s	−04°11.8'		Hya	24"	buona / buono	poco allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×45", molto diffusa e con tenue bulge evidente poco più contrastato del disco — 280x.
MCG-1-22-17	gx	08h31m24s	−04°02.2'		Hya	24"	buona / buono	molto debole, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile (o forse un nodulo dei bracci) a ridosso SE — 280x.
MCG-1-22-18	gx	01h31m41s	−04°07.1'		Hya	24"	buona / buono	molto debole e appena più brillante all'interno, molto diffusa, orientata da NW a SE con dimensioni 80"×60" — 280x.
MCG-1-22-19	gx	08h32m35s	−05°39.3'		Hya	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" — 400x.
MCG-1-22-20	gx	08h33m46s	−04°39.2'		Hya	24"	buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; ci sono 2 stelline parallele all'asse della gx: una a E e l'altra a S — 400x.
MCG-1-22-21	gx	08h34m03s	−04°23.2'		Hya	24"	ottima / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di gx molto deboli, diffuse e di luminosità uniforme, distanti 1' in direzione N-S; la 1ª è più piccola e più debole, rotonda con Ø < 20" e presenta una coppia di deboli stelline a ridosso W; una stellina appena più evidente, allineata con la coppia precedente, si trova a 1' SE; la 2ª ha Ø di ~ 20" e appare per prima; la stessa stellina di cui sopra si trova a 1' NE; — 580x.

MCG-1-22-22	gx	08h34m03s	−04°24.1'		Hya	24"	ottima / ottimo	v. **MCG-1-22-21**
MCG-1-22-23	gx	08h34m41s	−04°16.3'		Hya	24"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
MCG-1-22-24	gx	08h34m52s	−04°24.2'		Hya	24"	buona / m. buono	piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina max di secondi e tenue nucleo stellare — 570x.
MCG-1-22-25	gx	08h35m03s	−05°10.5'		Hya	16"	ottima / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
MCG-1-22-26	gx	08h35m48s	−04°05.5'		Hya	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, estesa 30"-35" e con una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E — 280x.
MCG-1-22-28	gx	08h36m09s	−07°03.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e con evidente condensazione centrale, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra due stelline abbastanza brillanti distanti un paio di primi in direzione ESE-WNW; una stellina debole si trova invece subito a N e una appena percettibile a ridosso SE — 450x.
MCG-1-22-29	gx	08h37m38s	−06°43.1'		Hya	24"	m. buona / scarso	diffusa e con gradiente di luce molto basso, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW e un'altra più debole e poco più distante verso E — 340x.
MCG-1-22-31	gx	08h39m08s	−08°51.7'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con tenue e piccolo bulge diffuso poco contrastato — 450x.
MCG-1-22-32	gx	08h39m47s	−04°23.7'		Hya	24"	buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda, con tenue condensazione centrale poco evidente e Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso verso N — 400x.
MCG-1-22-34	gx	08h41m18s	−04°42.8'		Hya	24"	buona / m. buono	debole, molto diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NNE a SSW (l'asse maggiore si trova a perpendicolo con la congiungente delle 2 stelle brillanti situate rispettivamente a circa 6' S e 7' SW), con dimensioni 60"×40" — 400x.
MCG-1-23-1	gx	08h43m40s	−06°47.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza di forma indistinta situata a ridosso SW di una stellina; estesa forse una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline brillanti a SE: quella più vicina alla galassia disturba un po' la visione — 450x.
MCG-1-23-2	gx	08h49m00s	−07°49.8'		Hya	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; appare solo in visione distolta a 270x.
MCG-1-23-3	gx	08h49m25s	−05°40.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 40" e una piccola condensazione centrale abbastanza contrastata; c'è una doppia stretta dalle componenti brillanti a 1' SW; una debole stellina si trova invece a ridosso NW — 450x.
MCG-1-23-4	gx	08h50m42s	−05°00.5'		Hya	24"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare — 400x.
MCG-1-23-5	gx	08h51m36s	−07°15.7'		Hya	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di una 40-ina di secondi di Ø, molto diffuso e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso NW; è poco più evidente a 270x nonostante sia impossibile tener fuori campo la SAO 136345 di magnitudo 5.6 (al momento dell'osservazione era ancora molto bassa).
MCG-1-23-6	gx	08h53m42s	−07°09.4'		Hya	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-23-8	gx	08h54m05s	−07°11.0'		Hya	24"	m. buona / buono	poco diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stella brillante a 1' verso W — 450x.
MCG-1-23-9	gx	08h54m13s	−07°10.3'		Hya	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-1-23-10	gx	08h57m06s	−05°54.3'		Hya	24"	ottima / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; un nodulo appena percettibile si "stacca" verso E; c'è una doppia a 1' NE — 450x.
MCG-1-23-11	gx	08h57m06s	−08°43.4'		Hya	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta sembrano di 60"×15"; c'è una stellina evidente verso il bordo SW — 450x.
MCG-1-23-13	gx	08h58m12s	−06°11.9'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo settentrionale; poco meglio definita scalando a 340x.
MCG-1-23-16	gx	08h59m54s	−07°25.0'		Hya	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60.40; c'è una stellina brillante subito a NW — 450x.
MCG-1-23-17	gx	09h06m06s	−04°21.4'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" e appena più brillante all'interno; meglio contrastata a 200x.
MCG-1-23-19	gx	09h06m34s	−07°14.5'		Hya	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere; poco allungata da E a W (a perpendicolo con la coppia di stelline situate a 2.5' NE), di dimensioni 30"×20", con condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una stellina brillante a 1' SW; c'è una stella brillante a 1' SW — 380x.
MCG-1-23-21	gx	09h07m00s	−07°23.7'		Hya	16"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta, a 270x, appare allungata da E a W con dimensioni ~ 60"×40".
MCG-1-24-2	gx	09h14m52s	−07°30.1'		Hya	24"	ottima / buono	debole chiazza lattescente molto diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NW — 450x.
MCG-1-24-3	gx	09h15m39s	−06°27.2'		Hya	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da NNE a SSW — 450x.
MCG-1-24-4	gx	09h16m05s	−09°09.1'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina al bordo W; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-24-5	gx	09h16m07s	−06°33.8'		Hya	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra 2 stelline orientate da NNW a SSE e distanti 1.5' — 450x.
MCG-1-24-7	gx	09h17m39s	−07°54.5'		Hya	24"	m. buona / discreto	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE ed estesa 1' — 450x.
MCG-1-24-8	gx	09h19m06s	−06°42.2'		Hya	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×40" e con tenue condensazione centrale; c'è una doppia molto debole a poco più di 1' verso S — 450x.
MCG-1-24-9	gx	09h19m34s	−04°19.5'		Hya	24"	m. buona / ottimo	chiazza lattescente molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; disturbata dalla SAO 136757 di 9ª grandezza situata un paio di primi a S; nonostante questo risulta meglio visibile scalando a 340x.
MCG-1-24-10	gx	09h20m22s	−07°52.9'		Hya	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×30" — 380x.
MCG-1-24-11	gx	09h20m48s	−08°02.0'		Hya	24"	m. buona / scarso	costituisce, assieme a MCG-1-24-12 ed MCG-1-24-13, un terzetto di galassie orientato da N a S e relativamente facile da vedere — poco diffusa, molto allungata all'incirca da E a W, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare — 340x.
MCG-1-24-12	gx	09h20m46s	−08°03.4'		Hya	24"	m. buona / scarso	è di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina molto debole a ridosso verso N — 340x.
MCG-1-24-13	gx	09h20m47s	−08°06.1'		Hya	24"	m. buona / scarso	fa parte di un terzetto assieme alle due precedenti — poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-24-18	gx	09h29m58s	−06°38.2'		Hya	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa, a tratti poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-25-2	gx	09h32m47s	−05°43.5'		Hya	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo di aspetto stellare — 400x.
MCG-1-25-3	gx	09h35m20s	−08°48.6'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-25-4	gx	09h35m46s	−04°45.0'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
MCG-1-25-5	gx	09h35m57s	−07°43.6'		Sex	16"	m. buona / scarso	debole, in visione distolta appare allungata da ENE a WSW, di dimensioni 80"×30", con piccolo bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina quasi a ridosso verso SSE — 270x.
MCG-1-25-6	gx	09h36m12s	−08°26.1'		Sex	24"	m. buona / buono	relativamente brillante, poco diffusa e con bulge evidente, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SW — 450x.
MCG+1-25-7	gx	09h37m09s	−05°02.5'		Hya	24"	buona / discreto	forma una coppia serrata con MAC 0937-0502B situata a ridosso verso E; appaiono ancora "impastate" a 340x, mentre è possibile sdoppiarle, seppure con difficoltà, a 450x; sono entrambe rotonde e di luminosità uniforme, ma la MCG è poco più estesa, con Ø > 20".
MCG-1-25-15	gx	09h40m31s	−08°56.6'		Sex	16"	m. buona / scarso	chiazza diffusa molto debole, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 1' — 270x.
MCG-1-25-18	gx	09h41m40s	−09°01.3'		Sex	24"	m. buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-1-25-19	gx	09h41m49s	−04°18.5'		Sex	24"	m. buona / buono	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 400x; è rotonda con Ø max di 30"; disturbata dalla SAO 137054 arancione di 9ª grandezza.
MCG-1-25-22	gx	09h42m12s	−04°42.8'		Sex	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da NW a SE, dimensioni 80"×20" e con tenue bulge diffuso poco contrastato — 450x.
MCG-1-25-23	gx	09h42m15s	−04°44.0'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' NE — 450x.
MCG-1-25-24	gx	09h42m23s	−06°15.1'		Sex	24"	m. buona / scarso	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 80"×20" (in visione distolta sembra addirittura una edge-on); c'è una stellina quasi a ridosso di NW; disturbata da una stella brillante di decima situata un paio di primi a NNW (ossia sul prolungamento dell'asse della galassia) — 340x.
MCG-1-25-26	gx	09h42m49s	+06°44.4'		Sex	24"	m. buona / scarso	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme che in visione distolta pare estendersi per oltre 1' in direzione N-S — 450x.
MCG-1-25-27	gx	09h43m14s	−04°28.1'		Sex	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 400x.
MCG-1-25-30	gx	09h43m17s	−04°29.2'		Sex	24"	buona / m. buono	appare elusivamente a 1.5' SE della precedente, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 400x.
MCG-1-25-33	gx	09h43m29s	−05°21.9'		Sex	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, orientata da NW a SE (come le 2 stelline a S), di dimensioni 60"×45" e con condensazione centrale abbastanza evidente — 400x.
MCG-1-25-35	gx	09h45m26s	−05°41.2'		Sex	24"	ottima / buono	debolissima, appare in visione distolta tra due deboli stelline orientate da N a S, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; una stellina brillante si trova a 1' SE; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-25-40	gx	09h48m25s	−06°35.8'		Sex	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-1-25-41	gx	09h49m03s	−07°08.8'		Sex	16"	m. buona / scarso	assieme a MCG-1-25-42 forma una coppia di piccoli oggetti facili da vedere a 270x; il 1º è più diffuso e di aspetto più uniforme, poco allungato da NE a SW con dimensioni 30"×20"; il 2º è invece rotondo, con nucleo stellare e Ø di 30"; c'è una stellina a ~ 1' verso NE.
MCG-1-25-42	gx	09h49m03s	−07°09.4'		Sex	16"	m. buona / scarso	v. **MCG-1-25-41**
MCG-1-25-44	gx	09h49m22s	−05°11.4'		Sex	16"	ottima / discreto	molto debole, ma visibile senza problemi in visione distolta, rotonda con Ø di 40", diffusa e di luminosità uniforme — 270x.
MCG-1-25-45	gx	09h49m37s	−04°56.0'		Sex	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo brillante e molto marcato circonfuso da un alone tenue e stemperato sul fondo cielo, rotondo con Ø di una 40-ina di secondi; l'estensione dell'alone, tuttavia, si apprezza meglio scalando a 340x; c'è una stellina a 1' S.
MCG-1-25-48	gx	09h50m55s	−09°19.6'		Sex	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' verso N; meglio visibile a 270x.
MCG-1-25-49	gx	09h50m56s	−04°59.9'		Sex	24"	buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×40"; è situata tra 2 stelline: una brillante a E e una debole a W — 400x.
MCG-1-25-50	gx	09h51m27s	−05°06.2'		Sex	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" — 400x.
MCG-1-25-51	gx	09h51m29s	−05°01.5'		Sex	24"	buona / m. buono	debolissima, solo a tratti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 45"×30", ma è meglio scalare a 200x.
MCG-1-25-53	gx	09h52m13s	−09°30.6'		Sex	24"	m. buona / mediocre	molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale — 450x.
MCG-1-25-54	gx	09h52m37s	−07°37.2'		Sex	24"	m. buona / scarso	facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è situata tra 2 stelline distanti 3' e orientate da NNW a SSE — 340x.
MCG-1-25-59	gx	09h54m48s	−06°47.6'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 deboli stelline situate 1' a NW e SW; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-26-2	gx	09h56m48s	−07°10.7'		Sex	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, molto allungata da N a S con dm 90"×20" (praticamente una edge-on); presenta un tenue bulge diffuso appena più contrastati del disco; è meglio evidente scalando a 270x.
MCG-1-26-5	gx	10h00m07s	−06°24.8'		Sex	24"	mediocre / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-1-26-6	gx	10h00m27s	−07°54.2'		Sex	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa e con tenue condensazione centrale evidente, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso ESE (la più meridionale di un piccolo arco di 3 componenti) — 450x.
MCG-1-26-7	gx	10h00m31s	−07°53.1'		Sex	24"	m. buona / mediocre	poco più evidente e compatta di MCG-1-26-6 allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso di NE (la quale fa parte dello stesso piccolo arco di cui sopra) — 450x.
MCG-1-26-8	gx	10h01m34s	−06°40.6'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debolissima, di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina a 1' SE (ossia sul prolungamento dell'asse della gx) — 450x.
MCG-1-26-11	gx	10h01m38s	−08°14.9'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debolissima lama di luce orientata da E a W che in visione distolta pare estesa per ~ 1'; c'è una stellina brillante quasi a ridosso WNW — 450x.
MCG-1-26-13	gx	10h03m57s	−06°29.8'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-1-26-15	gx	10h04m31s	−06°40.3'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; si trova tra 2 stelline abbastanza brillanti distanti un paio di primi e orientate da E a W — 450x.
MCG-1-26-16	gx	10h04m50s	−06°43.5'		Sex	24"	m. buona / mediocre	relativamente brillante, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG-1-26-17	gx	10h05m12s	−06°38.0'		Sex	24"	m. buona / mediocre	relativamente compatta, con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG-1-26-19	gx	10h05m45s	−04°50.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina subito a S — 450x.
MCG-1-26-20	gx	10h05m48s	−04°54.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	più debole e diffusa della precedente e in parte disturbata da una stellina brillante situata a 1' SW; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-26-21	gx	10h05m42s	−07°58.9'		Sex	16"	ottima / ottimo	chiazza rotonda molto debole e diffusa, di luminosità uniforme e con Ø < 1'; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
MCG-1-26-26	gx	10h08m34s	−04°28.6'		Sex	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza circolare, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; si vede comunque senza problemi in visione distolta a 380x.
MCG-1-26-27	gx	10h10m14s	−04°59.7'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e con Ø di 35"-40"; c'è una stellina a 1' verso W e un'altra appena percettibile poco più vicina a N — 400x.
MCG-1-26-29	gx	10h10m54s	−06°54.7'		Sex	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e rotonda con Ø di 40"-45" e di luminosità uniforme — 270x.
MCG-1-26-31	gx	10h12m46s	−08°35.3'		Sex	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N; meglio contrastata scalando a 340x (a 450x si spampana troppo!).
MCG-1-26-33	gx	10h13m17s	−06°01.7'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debole lama di luce orientata da N a S con tenue nucleo stellare; a prima vista sembra aggettare per 1' scarso a S di una stellina brillante — 450x.
MCG-1-26-34	gx	10h13m22s	−08°07.2'		Sex	24"	m. buona / scarso	assieme a MCG-1-26-35 forma una coppia di galassiette a prima vista simili, entrambe rotonde con Ø di una 20-ina di secondi; la 1ª è poco più diffusa e con nucleo stellare; la 2ª è appena più evidente e con condensazione centrale più diffusa — 340x.
MCG-1-26-35	gx	10h13m22s	−08°07.2'		Sex	24"	m. buona / scarso	v. **MCG-1-26-34**
MCG-1-26-37	gx	10h14m36s	−06°37.8'		Sex	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con tenue nucleo stellare — 450x.
MCG-1-26-39	gx	10h18m28s	−06°18.7'		Sex	24"	mediocre / ottimo	molto diffusa e con tenue condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø < 1' — 450x.
MCG-1-26-40	gx	10h19m13s	−05°37.7'		Sex	16"	m. buona / buono	è più debole di IC 603, dalla quale dista 3.5' a NW; è rotonda, poco diffusa e con piccola condensazione centrale osservabile a tratti — 380x.
MCG-1-27-1	gx	10h20m19s	−07°53.6'		Sex	24"	m. buona / scarso	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E (situata praticamente al centro dell'ammasso AGC 979) — 340x.
MCG-1-27-2	gx	10h20m26s	−06°31.6'		Sex	24"	m. buona / scarso	debole e diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE (la quale fa parte di una "Y" di 4 stelline che sembra puntare verso la gx) — 340x.
MCG-1-27-3	gx	10h20m54s	−07°56.5'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima chiazza di forma indistinta ed estesa una 30-ina di secondi; forma un triangolo con 2 stelline: una a 1' NW e l'altra, più debole, a 1' NNE; la visione è disturbata dalla SAO 137506 di 10ª grandezza ad appena 2.5' SSW, nonché da un'altra stella, meno luminosa, più o meno alla stessa distanza verso ESE; è situata al limite sudorientale dell'ammasso AGC 979 — 340x.
MCG-1-27-4	gx	10h21m23s	−04°50.3'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un'evidente condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 450x.
MCG-1-27-5	gx	10h21m56s	−04°53.4'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-1-27-9	gx	10h29m38s	−03°50.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una doppia molto brillante a meno di 5' SSE che si fatica a tenere fuori campo a 450x.
MCG-1-27-10	gx	10h29m59s	−04°59.1'		Sex	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e con nucleo quasi stellare, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso SW — 450x.
MCG-1-27-11	gx	10h31m19s	−08°35.5'		Sex	16"	m. buona / scarso	debole ovale di 45"×30", orientato da N a S, con nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina a 1' verso ESE — 270x.
MCG-1-27-13	gx	10h32m12s	−09°14.3'		Sex	16"	m. buona / scarso	relativamente compatta, rotonda, di luminosità uniforme e Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
MCG-1-27-14	gx	10h32m17s	−05°02.3'		Sex	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso di SW — 450x.
MCG-1-27-15	gx	10h32m54s	−06°20.4'		Sex	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
MCG-1-27-16	gx	10h33m08s	−07°21.1'		Sex	16"	m. buona / scarso	assieme a MCG-1-27-17 forma una coppia di oggetti elusivi, molto piccoli e ravvicinati che formano un piccolo triangolo equilatero con una stellina situata 1' verso SE — 270x.
MCG-1-27-17	gx	10h33m09s	−07°21.1'		Sex	16"	m. buona / scarso	v. **MCG-1-27-16**
MCG-1-27-18	gx	10h33m14s	−07°27.9'		Sex	16"	m. buona / scarso	molto debole e diffusa, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; è allineata con 2 stelline situate a E — 270x.
MCG-1-27-19	gx	10h33m57s	−08°14.6'		Sex	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale — 380x.
MCG-1-27-20	gx	10h34m56s	−06°28.3'		Sex	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 60"×30" (o 50"×25"); c'è una stellina 1' a W —380x.
MCG-1-27-21	gx	10h35m17s	−07°14.8'		Sex	16"	ottima / ottimo	di aspetto molto simile a MCG-1-27-20, stesso orientamento e dimensioni analoghe; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline subito a W — 270x.
MCG-1-27-22	gx	10h35m31s	−06°11.1'		Sex	24"	m. buona / discreto	appare facilmente quando si osserva NGC 3292, dalla quale dista sì e no 1' verso W; poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di SW — 450x.
MCG-1-27-25	gx	10h36m03s	−06°57.7'		Sex	16"	m. buona / scarso	debolissima, a prima vista è di forma indistinta, mentre a tratti, in visione distolta appare poco allungata all'incirca da N a S per una 30-ina di secondi — 270x.
MCG-1-27-27	gx	10h36m35s	−07°06.7'		Sex	16"	m. buona / scarso	debolissima lama di luce estesa per ~ 45", di luminosità uniforme e che tuttavia appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
MCG-1-27-30	gx	10h39m43s	−08°41.2'		Sex	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a ridosso verso E — 450x.
MCG-1-27-31	gx	10h39m46s	−05°29.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso S e una appena percettibile al bordo E — 450x.
MCG-1-27-33	gx	10h41m53s	−08°12.5'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-1-28-4	gx	10h53m12s	−07°25.7'		Crt	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di 45" — 270x.
MCG-1-28-5	gx	10h54m20s	−04°20.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dm 60"×15" — 450x.
MCG-1-28-6	gx	10h55m23s	−07°39.2'		Crt	16"	ottima / ottimo	altra gx debolissima e diffusa, rotonda con Ø max di 30"; c'è la SAO 137887 di magnitudo 8.6 a soli 3' NNW che però non dà particolarmente fastidio, perché l'umidità è bassa — 270x.
MCG-1-28-17	gx	10h59m52s	−06°09.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare evidente — 450x.
MCG-1-28-20	gx	11h00m14s	−09°42.5'		Crt	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a momenti allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (o poco meno); c'è una stellina molto debole subito a N o NNW — 450x.
MCG-1-28-21	gx	11h00m54s	−06°41.9'		Crt	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo quasi stellare; c'è una debole stellina a 1.5' NE e una abbastanza brillante a un paio di primi SSW — 450x.
MCG-1-28-22	gx	11h02m37s	−07°30.6'		Crt	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 80"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NW e una molto debole alla stessa distanza verso NNW (praticamente sul prolungamento dell'asse della gx) — 450x.
MCG-1-28-24	gx	11h05m52s	−09°42.2'		Crt	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, disturbata da una terna di stelline brillanti situate a S, SE e NE; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 450x.
MCG-1-28-25	gx	11h06m46s	−05°54.7'		Leo	24"	m. buona / buono	relativamente compatta ed evidente, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare visibile a tratti a 400x.
MCG-1-29-3	gx	11h09m44s	−07°35.5'		Crt	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×25" e con piccolo nucleo poco contrastato; c'è una stellina a 1' verso SE — 450x.
MCG-1-29-6	gx	11h16m56s	−06°13.2'		Crt	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-29-10	gx	11h20m39s	−05°40.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; meglio definita scalando a 340x.
MCG-1-29-12	gx	11h21m48s	−05°45.5'		Leo	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e brillante, purtroppo molto disturbata dalla SAO 138156 di 8ª che non è possibile tenere fuori campo nemmeno a 570x; è rotonda con Ø di 40"-45" e nucleo stellare visibile a tratti.
MCG-1-29-13	gx	11h22m27s	−07°39.1'		Crt	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a poco più di 1' verso S — 450x.
MCG-1-29-14	gx	11h22m32s	−07°03.2'		Crt	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è allineata ed equidistante con una coppia di stelline sbilanciate in luminosità a SE — 450x.
MCG-1-29-15	gx	11h22m44s	−07°40.5'		Crt	24"	m. buona / mediocre	poco estesa, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 90"×60"; ci sono 2 stelline nei pressi: a poco più di 1' N e più o meno alla stessa distanza verso SE — 450x.
MCG-1-29-18	gx	11h25m02s	−05°04.1'		Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø > 30" — 400x.
MCG-1-29-19	gx	11h25m23s	−09°35.2'		Crt	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare — 450x.
MCG-1-29-20	gx	11h25m36s	−04°59.3'		Leo	24"	m. buona / buono	decisamente più debole di MCG-1-29-19, ma facilmente visibile anche in visione diretta, diffusa, rotonda con Ø simile e di luminosità uniforme — 400x.
MCG-1-29-25	gx	11h12m15s	−05°45.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-1-30-2	gx	11h34m20s	−06°23.4'		Leo	24"	buona / ottimo	è una debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NNE a SSW e che in visione distolta appare estesa 1.5'; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W, verso la parte meridionale della gx — 450x.
MCG-1-30-3	gx	11h34m17s	−09°34.5'		Crt	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 1', molto diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale quasi stellare (già osservata in altra data col 16") — 450x.
MCG-1-30-4	gx	11h34m16s	−09°35.3'		Crt	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi; appare solo a momenti in visione distolta quando si osserva MCG-1-30-3 situata a ridosso verso N — 450x.
MCG-1-30-6	gx	11h34m25s	−09°40.1'		Crt	24"	m. buona / m. buono	è un piccolo oggetto rotondo di 10"-15" di Ø, molto debole e situato quasi a ridosso verso NE di NGC 3722 — 450x.
MCG-1-30-8	gx	11h34m38s	−09°38.8'	q 282	Crt	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25". È erroneamente riportata sulla I edizione dell'Uranometria come **NGC 3730** (che è in realtà una duplicazione della 3732) — 450x.
MCG-1-30-11	gx	11h36m49s	−08°35.1'		Crt	24"	buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con tenue bulge diffuso e poco contrastato — 450x.
MCG-1-30-12	gx	11h36m50s	−09°34.0'		Crt	24"	m. buona / scarso	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 340x.
MCG-1-30-13	gx	11h37m45s	−07°16.1'		Crt	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a 1.5' verso N — 450x.
MCG-1-30-14	gx	11h38m03s	−06°14.0'		Vir	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-30-17	gx	11h39m06s	−09°19.8'		Crt	16"	discreta / ottimo	anche a 380x appare solo come una stellina molto debole e a tratti leggermente sfuocata, situata 1' a N di NGC 3771.
MCG-1-30-25	gx	11h42m28s	−07°46.4'		Crt	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45"; qualche lieve discrepanza di luce appare a momenti a 450x; c'è una stellina brillante a 1.5 S.
MCG-1-30-32	gx	11h46m36s	−03°51.6'		Vir	16"	ottima / ottimo	fa parte assieme alle due successive del **Wild's Triplet** — debole, diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 40" — 380x.
MCG-1-30-33	gx	11h46m44s	−03°50.8'		Vir	16"	ottima / ottimo	fa parte assieme alla precedente e alla successiva del **Wild's Triplet** — è la componente più brillante, grosso modo allungata da E a W con dimensioni 60"×30" e poco più brillante all'interno; altresì nota come Arp 248 — 380x.
MCG-1-30-34	gx	11h46m50s	−03°49.4'		Vir	16"	ottima / ottimo	fa parte del **Wild's Triplet** assieme alle due precedenti — è la componente più debole, appare facilmente solo in visione distolta a 380x, molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG-1-30-39	gx	11h51m15s	−06°06.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NW a SE e che in visione distolta sembra estendersi per oltre 1' — 450x.
MCG-1-30-41	gx	11h52m38s	−05°12.5'		Vir	24"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge quasi stellare — 400x.
MCG-1-30-43	gx	11h52m59s	−04°25.6'		Vir	16"	ottima / ottimo	è debolissima, ma a 270x si riesce a individuare abbastanza facilmente in visione distolta, allungata da E a W con dimensioni 60"×30", di luminosità uniforme e molto diffusa; è allineata con 2 deboli stelline a S distanti un paio di primi e poste a perpendicolo con l'asse maggiore della gx.
MCG-1-31-8	gx	12h12m03s	−04°52.6'		Vir	16"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, ma anche questa appare abbastanza facilmente in visione distolta; è orientata da NE a SW, con dimensioni grosso modo 60"×40" e appena più brillante all'interno; meglio contrastata a 380x.
MCG-1-31-10	gx	12h15m38s	−07°47.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale puntiforme visibile solo a momenti — 450x.
MCG-1-32-1	gx	12h19m51s	−06°51.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con bulge appena percettibile; c'è una stella al bordo SW — 450x.
MCG-1-32-3	gx	12h20m34s	−06°55.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a momenti in visione distolta come MCG-1-32-4, osservata per prima e dalla quale dista 4' a NW; è solo poco più piccola — 450x.
MCG-1-32-4	gx	12h20m47s	−06°58.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa ~ 1' tutto sommato appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma solo a 450x.
MCG-1-32-5	gx	12h21m35s	−05°38.4'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", con piccola e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' verso W; un nodulo diffuso e appena percettibile si "stacca" a SW della gx: si tratta di fatto di MAC 1221-0538 — 450x.
MCG-1-32-11	gx	12h27m12s	−07°42.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata in mezzo a 2 stelline: una abbastanza brillante a 1.5' SSW e l'altra più debole alla stessa distanza verso NNE — 450x.
MCG-1-32-14	gx	12h28m06s	−04°56.7'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; a tratti in visione distolta appare una sorta di tenuissimo baffo che aggetta verso W, probabilmente dovuto a una compagna che però non riesco a risolvere — 450x.
MCG-1-32-15	gx	12h28m15s	−04°57.5'		Vir	24"	buona / m. buono	situata 2.5' a ESE di MCG-1-32-14, è una gx relativamente compatta e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso NW — 450x.
MCG-1-32-16	gx	12h29m36s	−08°26.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-32-17	gx	12h30m01s	−05°58.4'		Vir	24"	m. buona / buono	fa parte di un terzetto assieme a MCG-1-32-18 ed MCG-1-32-20, purtroppo disturbato da una coppia di stelle molto brillanti situate a S e SE — poco diffusa e di luminosità uniforme, con nucleo stellare visibile a tratti, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; la SAO 138816 di mag. 7.3 si trova ad appena 2.5 verso S — 400x.
MCG-1-32-18	gx	12h30m18s	−05°57.7'		Vir	24"	m. buona / buono	fa parte di un terzetto assieme alla precedente e alla successiva — è di dimensione simile alla prima elencata, ma più diffusa e con una stellina a ridosso del nucleo verso SE; è quella forse meno disturbata dalle SAO 138816 e 138821, situate rispettivamente a 5.5' SW e 4' SSE, in quanto poco più lontana rispetto altre due componenti — 400x.
MCG-1-32-20	gx	12h30m27s	−06°00.4'		Vir	24"	m. buona / buono	assieme alle due precedenti fa parte di un terzetto di cui rappresenta la componente più debole; è comunque facile da vedere, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata dalla SAO 138821 di magnitudo 9.3 situata 1.5' a SSW — 400x.
MCG-1-32-24	gx	12h33m52s	−08°42.3'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-32-29	gx	12h36m22s	−03°55.3'		Vir	24"	mediocre / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a 1' NE.
MCG-1-32-30	gx	12h38m05s	−08°20.0'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20" — 450x.
MCG-1-32-35	gx	12h40m16s	−09°18.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" — 450x.
MCG-1-32-38	gx	12h42m18s	−05°46.9'		Vir	24"	m. buona / buono	assieme a MCG-1-32-39 forma una coppia di galassie abbastanza facili, con una evidente condensazione centrale e separate da ~ 1' in direzione N-S; la 1ª è molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la 2ª è invece allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina leggermente sfocata nel mezzo che a un controllo successivo è poi risultata essere la MAC 1242-0547 — 400x.
MCG-1-32-39	gx	12h42m19s	−05°46.5'		Vir	24"	m. buona / buono	v. **MCG-1-32-38**
MCG-1-33-1	gx	12h44m03s	−05°40.6'		Vir	24"	m. buona / buono	chiazza circolare con Ø di almeno 2.5', ben visibile, ma con bassissima luminanza superficiale; appare meglio contrastata scalando a 280x; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE.
MCG-1-33-3	gx	12h45m41s	−06°04.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni che in visione distolta arrivano a 2'×1'; meglio scalare a 340x (a 450x si stempera troppo).
MCG-1-33-9	gx	12h48m21s	−05°13.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto piccola, appare elusivamente, a 450x, a poco più di 1' W di una stellina brillante (la quale fa coppia con un'altra di luminosità simile e situata 1.5' a S della gx.
MCG-1-33-11	gx	12h48m43s	−05°15.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa e di forma indistinta, estesa 40" o 50"; appare a momenti in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
MCG-1-33-17	gx	12h49m33s	−09°44.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 80"×20"; occorre tuttavia scalare a 340x, perché a 450x il campo tende a essere depleto.
MCG-1-33-22	gx	12h50m35s	−09°31.3'		Her	16"	buona / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme orientata da NNW a SSE ed estesa un paio di primi; è relativamente compatta e pertanto visibile abbastanza facilmente in visione distolta — 270x.
MCG-1-33-27	gx	12h51m13s	−06°33.5'	q 284	Vir	16"	buona / buono	in visione distolta appare un debolissimo lucore quando si osserva nei pressi della stellina brillante situata 3' a N; è estesa per poco più di 1' e forse rotonda (difficile stabilirlo); erroneamente riportata sull'Uranometria come NGC 4731A — 270x.
MCG-1-33-28	gx	12h51m16s	−07°46.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 90"×45"; c'è una stellina a 1' NE; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-33-33	gx	12h52m36s	−06°17.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva chiazza che appare solo a momenti in visione distolta, estesa forse una 40-ina di secondi, ma non riesco a capirne la forma; poco meglio evidente scalando a 340x.
MCG-1-33-34	gx	12h52m35s	−09°46.6'		Vir	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina al bordo SE; è allineata con un paio di deboli stelline a SW — 450x.
MCG-1-33-42	gx	12h53m36s	−08°38.7'		Vir	16"	m. buona / discreto	piccolo oggetto rotondo con nucleo stellare e Ø di una 20-ina di secondi, situato a ridosso S di NGC 4773 dalla quale si separa con facilità a 270x (in visione distolta sembra avviluppata nell'alone della gx principale).
MCG-1-33-48	gx	12h55m14s	−08°47.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-1-33-52	gx	12h55m37s	−08°03.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 90"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-33-54	gx	12h56m10s	−08°09.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso — 450x.
MCG-1-33-59	gx	12h57m16s	−05°20.8'		Vir	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata all'incirca da E a W con dimensioni 70"×50"; situata in mezzo a 2 stelline brillanti orientate come la gx: quella a W si trova praticamente a ridosso della gx — 400x.
MCG-1-33-61	gx	12h58m49s	−06°46.8'		Vir	16"	ottima / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è disturbata dalla luce di una stella brillante situata 3' a NE; una debole stellina si trova invece quasi a ridosso — 270x.
MCG-1-33-62	gx	12h59m50s	−08°44.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20"; ci sono 3 stelle brillanti e quasi equidistanti una decina di primi a NE — 450x.
MCG-1-33-68	gx	13h00m37s	−06°28.6'		Vir	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
MCG-1-33-70	gx	13h01m33s	−04°46.5'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-1-33-76	gx	13h03m46s	−05°08.2'		Vir	24"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20"; debolmente screziata a 450x; la visione è un po' disturbata dalla SAO 139129 di 8ª grandezza situata un paio di primi a SSE — 450x.
MCG-1-33-82	gx	13h05m14s	−07°53.3'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissimo lucore di aspetto un po' confuso che solo a momenti appare orientato da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×40"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-34-1	gx	13h07m36s	−04°59.5'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e oltre tutto situata in una piccola zona depleta, molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi [presenza di Giove a 1º verso W] — 450x.
MCG-1-34-6	gx	13h09m17s	−05°25.2'		Vir	24"	m. buona / buono	chiazza diffusa molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" [presenza di Giove a 1.5° WNW] — 450x.
MCG-1-34-14	gx	13h18m41s	−08°26.7'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole, ma appare facilmente anche in visione diretta, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina al bordo N — 450x.
MCG-1-34-17	gx	13h30m34s	−06°05.5'		Vir	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; forma un piccolo triangolo equilatero con una stellina brillante subito a E e una debole a S — 450x.
MCG-1-35-2	gx	13h35m53s	−04°55.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S — 450x.

MCG-1-35-4	gx	13h36m12s	−04°58.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	più facile di MCG-1-35-2, dalla quale dista poco più di 5' a SE, relativamente compatta, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente; è situata in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti distanti un paio di primi e orientate nello stesso modo — 450x.
MCG-1-35-5	gx	13h36m22s	−08°29.1'		Vir	16"	m. buona / scarso	salta fuori in visione distolta quando si osserva NGC 5232,, dalla quale dista 3.5' a E; è una debolissima lama di luce estesa per ~ 1' in direzione N-S; sembra d'intravedere qualcosa verso l'estremità settentrionale: forse una stellina, ma purtroppo il seeing non mi permette di spingere gli ingrandimenti — 188x.
MCG-1-35-7	gx	13h37m00s	−08°12.6'		Vir	24"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con piccolo bulge rotondo abbastanza contrastato, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-1-35-8	gx	13h40m42s	−07°45.0'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-1-35-12	gx	13h48m51s	−07°38.9'		Vir	24"	buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stella brillante quasi a ridosso verso SE — 450x.
MCG-1-35-13	gx	13h48m59s	−07°11.7'		Her	16"	buona / ottimo	lama di luce molto debole visibile abbastanza facilmente in visione distolta, appena più brillante all'interno ed estesa per un paio di primi in direzione N-S — 270x.
MCG-1-35-20	gx	13h54m12s	−04°50.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è una chiazza circolare con Ø di 1', diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; meglio contrastata scalando a 340x; saltano all'occhio 2 coppie di stelline abbastanza brillanti orientate da NW a SE situate rispettivamente 3.5' a NW e 2.5' a SW della gx.
MCG-1-35-21	gx	13h55m35s	−05°58.4'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso WNW — 450x.
MCG-1-35-22	gx	13h55m45s	−06°00.2'		Vir	24"	buona / buono	più debole di MCG-1-35-21, dalla quale dista 3' a SE; è molto diffusa, anche questa di luminosità uniforme; in visione distolta appare chiaramente orientata da N a S con dimensioni 60.30, ma occorre scalare a 340x.
MCG-1-36-1	gx	13h58m07s	−04°05.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; poco meglio contrastata scalando a 340x; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline subito a S.
MCG-1-37-4	gx	14h23m04s	−04°43.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-1-37-6	gx	14h25m46s	−05°24.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina a 1.5' verso SE — 450x.
MCG-1-37-7	gx	14h29m20s	−05°01.4'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza rotonda estesa una 40-ina di secondi, meglio definita scalando a 340x, anche se così il campo è maggiormente disturbato dalla SAO 139963 di magnitudo 8.4 situata a 6' NNW.
MCG-1-37-11	gx	14h41m06s	−08°52.5'		Vir	24"	mediocre / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; stellina a ridosso verso E — 450x.
MCG-1-38-1	gx	14h43m36s	−05°10.5'		Vir	24"	buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e piccola condensazione centrale evidente; doppia stretta un paio di primi a NNE — 450x.
MCG-1-38-2	gx	14h48m37s	−04°44.2'		Lib	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole, di luminosità uniforme e assai stemperata sul fondo cielo, orientata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una coppia abbastanza serrata di stelline a ridosso verso N; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-38-3	gx	14h48m48s	−03°43.0'		Lib	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ma più contrastata sul fondo cielo di MCG-1-38-2, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 450x.
MCG-1-38-6	gx	14h53m07s	−07°01.2'		Lib	24"	mediocre / ottimo	debolissimo lucore di forma indistinta, forse rotondo con Ø > 30"; appare in visione distolta a W di una stellina — 450x.
MCG-1-38-7	gx	14h53m25s	−04°41.9'		Lib	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
MCG-1-38-8	gx	14h55m18s	−06°02.4'		Lib	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa e circolare, con Ø di una 40-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 1' SSE di una stellina brillante; alla stessa distanza verso E si vede un altro piccolo e debolissimo oggetto grosso modo rotondo con Ø < 20" e a tratti condensato; da un controllo effettuato successivamente è risultato essere la MAC 1455-0602 — 450x.
MCG-1-38-12	gx	14h58m30s	−06°49.2'		Lib	24"	buona / ottimo	debole e di aspetto un po' confuso, grosso modo orientata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline: quella più a S è la più debole — 450x.
MCG-1-38-20	gx	15h04m13s	−07°13.4'		Lib	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 450x.
MCG-1-39-3	gx	15h21m33s	−07°26.9'		Lib	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni che in visione distolta sono di 80"×20", con bulge diffuso molto tenue — 450x.
MCG-1-39-4	gx	15h22m56s	−07°19.9'		Lib	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con nucleo puntiforme molto tenue; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo N dalla quale la gx, in visione distolta, sembra aggettare — 450x.
MCG-1-39-5	gx	15h23m20s	−04°09.1'		Lib	16"	m. buona / ottimo	allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×40", diffusa e di luminosità pressoché uniforme; è situata sulla base minore di trapezio irregolare di stelline — 380x.
MCG-1-40-5	gx	15h39m24s	−06°50.6'		Lib	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25" — 450x.
MCG-1-40-7	gx	15h49m52s	−07°28.8'		Lib	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo puntiforme abbastanza evidente — 450x.
MCG-1-40-8	gx	15h50m44s	−07°33.6'		Lib	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo quasi stellare — 450x.
MCG-1-40-9	gx	15h50m50s	−07°40.0'		Lib	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-1-41-2	gx	15h57m02s	−06°09.3'		Lib	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; anche a 450x resta immersa in un campo con a alcune stelle brillante che interferiscono.
MCG-1-41-4	gx	16h08m24s	−05°39.7'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole e purtroppo molto disturbata da una stellina brillante a ridosso NW; in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-1-41-5	gx	16h09m26s	−04°29.3'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale (nel campo sono presenti alcune stelle brillanti) — 450x.
MCG-1-41-6	gx	16h09m37s	−04°37.2'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare a momenti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; è tuttavia preferibile non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MCG-1-41-7	gx	16h17m45s	−06°49.6'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW; meglio osservabile a 340x.
MCG-1-42-1	gx	16h28m45s	−09°08.8'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, approssim. rotonda con Ø < 1' e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso verso N di una debole stellina; c'è un piccolo trapezio di stelline esteso un paio di primi subito a S — 450x.
MCG-1-42-3	gx	16h38m09s	−04°49.4'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza oblunga e uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 90"×30"; appare con una certa difficoltà in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
MCG-1-43-1	gx	16h45m07s	−07°10.6'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debolissima, rotonda con Ø di 40" o 50"; è osservabile in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; ci sono 2 stelline molto deboli: una a ~ 1' verso S e l'altra quasi a ridosso a SE.
MCG-1-43-3	gx	17h00m48s	−05°10.5'		Oph	24"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N; un piccolo triangolo allungato di deboli stelline si trova subito a E della gx; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-1-51-1	gx	20h15m49s	−02°54.0'		Aql	24"	buona / buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 80"×20"; è visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 400x; la gx è orientata a 60° rispetto a 3 stelline allineate da NE a SW di luminosità decrescente a partire da quella a NE: quella centrale si trova quasi a ridosso a E della gx.
MCG-1-52-2	gx	20h26m26s	−05°04.1'		Aql	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 450x.
MCG-1-52-3	gx	20h26m40s	−05°04.5'		Aql	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma facilmente osservabile in visione distolta a 450x, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20".
MCG-1-52-4	gx	20h29m15s	−08°00.0'		Aql	24"	buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, presenta un contrasto molto basso anche per via della SAO 144488 di magnitudo 9.6 situata ad appena 1.5' verso S; è grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-52-4A	gx	20h30m03s	−08°44.8'		Cap	24"	buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW e un'altra della stessa luminosità a 1' verso N — 450x.
MCG-1-52-4B	gx	20h30m02s	−08°43.0'		Cap	24"	buona / m. buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, estesa 1' scarso in direzione NW-SE; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MCG-1-52-5	gx	20h30m20s	−07°53.5'		Aql	16"	buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente poco più brillante verso l'interno, probabilmente rotonda con Ø di 1'; situata tra 2 stelline abbastanza brillanti distanti ~ 2' in direzione NE-SW; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso E — 380x.
MCG-1-52-6	gx	20h30m24s	−03°46.5'		Aql	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con un nucleo molto brillante di aspetto quasi stellare — 450x.
MCG-1-52-7	gx	20h30m31s	−03°55.2'		Aql	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline subito a S — 450x.
MCG-1-52-8	gx	20h35m24s	−06°14.7'		Aql	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa 1.5; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma il campo disturbato da una losanga di 4 stelline brillanti — di cui quella più meridionale particolarmente luminosa.
MCG-1-52-11	gx	20h37m01s	−05°59.8'		Aql	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MCG-1-52-12	gx	20h37m50s	−06°05.4'		Aql	24"	buona / ottimo	più facile di MCG-1-52-11, dalla quale dista 13.5' a SE, relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare — 450x.
MCG-1-52-13	gx	20h38m21s	−04°06.9'		Aql	16"	ottima / ottimo	assieme a MCG-1-52-14 forma una coppia di chiazze rotonde molto deboli distanti ~ 1' in direzione E-W; la 1ª è di luminosità uniforme, debolissima e molto diffusa, con Ø di 30"-35"; la 2ª è poco più evidente, di dimensioni analoghe e con condensazione centrale visibile a 380x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S della 1a.
MCG-1-52-14	gx	20h38m24s	−04°07.0'		Aql	16"	ottima / ottimo	v. **MCG-1-52-13**
MCG-1-52-17	gx	20h42m27s	−07°18.5'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere anche in visione diretta, rotonda, Ø di 45" e con tenue condensazione centrale visibile a 380x.
MCG-1-52-18	gx	20h43m20s	−04°30.0'		Aqr	16"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme probabilmente rotonda con Ø di 30"; è situata subito a N di una stellina — 380x.
MCG-1-53-1	gx	20h43m46s	−03°12.4'		Aqr	16"	ottima / ottimo	elusiva, appare solo a tratti a 380x come una sorta di debolissimo pendaglio che si diparte verso N di MCG-1-53-2.
MCG-1-53-2	gx	20h43m46s	−03°12.8'		Aqr	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo di 20"-25" di Ø con condensazione centrale percettibile a 380x; c'è una stellina a una 20-ina di secondi verso ENE.
MCG-1-53-4	gx	20h45m14s	−05°29.0'		Aqr	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e leggermente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-1-53-6	gx	20h45m41s	−04°57.0'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza grosso modo rotonda con Ø max di 30", ma di aspetto un po' confuso a 380x.
MCG-1-53-7	gx	20h45m40s	−05°35.4'		Aqr	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso verso S di una stellina brillante; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-1-53-8	gx	20h46m21s	−02°48.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", molto diffusa e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente; è situata al vertice rettangolo di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline: una a 1' NW e l'altra a 1' SW — 340x.
MCG-1-53-9	gx	20h48m12s	−03°52.4'		Aqr	16"	m. buona / buono	sorta di debolissimo alone asimmetrico che aggetta verso SE da una stellina per una 40-ina di secondi; è molto diffusa e meglio contrastata a 270x.
MCG-1-53-11	gx	20h48m14s	−05°47.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 340x; appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo 60"×20" e di luminosità uniforme — 340x.
MCG-1-53-12	gx	20h49m52s	−07°01.3'		Aql	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, facilmente osservabile in visione distolta a 450x, orientata da N a S ed estesa ~ 1.5'; c'è una doppia brillante un paio di primi a NE.
MCG-1-53-13	gx	20h51m20s	−07°18.9'		Aql	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza molto diffusa, approssim. rotonda con Ø < 30" situata a ridosso NW di una stellina — 450x.
MCG-1-53-18	gx	20h56m23s	−03°54.5'		Aqr	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, di luminosità uniforme e Ø di 30-35"; c'è una stellina a ridosso SW — 380x.
MCG-1-53-19	gx	20h56m33s	−03°49.7'		Aqr	16"	ottima / ottimo	più facile di MCG-1-53-18, rotonda con dimensioni analoghe, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
MCG-1-53-20	gx	21h02m04s	−06°17.8'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo, poco diffuso, del Ø di una 40-ina di secondi e con tenue nucleo puntiforme visibile a 380x; c'è una stellina a ridosso verso SW.
MCG-1-53-22	gx	21h05m21s	−07°50.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
MCG-1-53-23	gx	21h05m23s	−07°45.0'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa per 1'; appare facilmente in visione distolta a 450x; si trova tra una stella brillante a N e una coppia di stelline meno luminose a S.
MCG-1-54-1	gx	21h08m27s	−05°49.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, con tenue bulge diffuso poco contrastato e nucleo stellare; è allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; situata tra 2 stelline: una a NE e l'altra appena percettibile dalla parte opposta — 450x.
MCG-1-54-3	gx	21h10m05s	−03°42.1'		Aqr	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; poco più evidente a 188x.
MCG-1-54-4	gx	21h11m25s	−04°19.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x; c'è un piccolo asterismo di 7 stelle abbastanza brillanti subito a W.
MCG-1-54-6	gx	21h14m50s	−07°27.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
MCG-1-54-7	gx	21h17m02s	−06°45.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da E a W per 1' e situata a ridosso N di una stellina che per quanto sia debole ne disturba un poco la visione — 450x.
MCG-1-54-8	gx	21h17m07s	−06°43.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø < 40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MCG-1-54-9	gx	21h17m11s	−06°38.9'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	piccola chiazza elusiva che appare solo a momenti in visione distolta a ridosso SW di una stellina abbastanza brillante; non sembra comunque più estesa di 30" — 450x.
MCG-1-54-10	gx	21h19m17s	−04°33.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare.
MCG-1-54-11	gx	21h19m43s	−07°33.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza forse rotonda ed estesa < 40"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quasi a ridosso SW di una stellina — 450x.
MCG-1-54-14	gx	21h23m40s	−05°26.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti, rotonda con Ø < 30"; situata tra 2 stelle brillanti (soprattutto quella più a N) orientate da NNW a SSE e distanti 1.5' — 450x.
MCG-1-54-15	gx	21h25m53s	−03°57.3'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta una condensazione stellare visibile solo a momenti, ma questa è meglio visibile scalando a 340x.
MCG-1-54-19	gx	21h30m14s	−08°04.0'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, ma più che altro disturbata da una stellina brillante a ridosso verso W; a 450x e in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20".
MCG-1-54-20	gx	21h31m00s	−03°59.0'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, a tratti di forma un po' irregolare se osservata a 450x; la gx è comunque approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, di luminosità pressoché uniforme e sembra presentare un tenue rinforzo di luce verso E; c'è una stellina quasi a ridosso SW.
MCG-1-55-1	gx	21h32m09s	−05°43.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-1-55-3	gx	21h42m05s	−04°56.6'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina molto debole a 1' NW e un'altra più brillante alla stessa distanza verso NE — 450x.
MCG-1-55-4	gx	21h42m50s	−06°49.8'		Aqr	24"	discreta / buono	debolissima chiazza circolare con Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x (assieme a MAC 2142-0652 sono i membri più evidenti dell'ammasso **AGC 2366**).
MCG-1-55-5	gx	21h43m53s	−08°07.5'		Aqr	24"	buona / mediocre	debole, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×20" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso NNE — 400x.
MCG-1-55-7	gx	21h44m44s	−07°03.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo equilatero con una stella brillante a NE e una debole a NW — 450x.
MCG-1-55-9	gx	21h45m42s	−07°03.6'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e spampanata, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-1-55-10	gx	21h47m35s	−06°27.3'		Aqr	24"	buona / mediocre	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x, allungata da E a W con dimensioni 20"×20"; ci sono 3 stelline allineate a E.
MCG-1-55-12	gx	21h48m04s	−02°44.9'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	è un baffo di luce molto debole e di luminosità uniforme, che in visione distolta sembra unire 2 stelline: una abbastanza brillante all'estremità W, che disturba un poco l'osservazione, e l'altra debole dalla parte opposta; la distanza tra queste stelline è di ~ 1' — 450x.
MCG-1-56-1	gx	22h03m48s	−02°22.8'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-1-56-2	gx	22h09m34s	−06°06.8'		Aqr	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme e Ø di ~ 1'; c'è una stellina quasi a ridosso NW; meglio osservabile a 270x.
MCG-1-56-3	gx	22h16m45s	−04°43.8'		Aqr	16"	m. buona / discreto	debole, ma facilmente visibile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; è rotonda con Ø di 45" — 270x.
MCG-1-56-4	gx	22h17m09s	−04°58.7'		Aqr	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza circolare di una 40-ina di secondi di Ø osservabile in visione distolta, ma scalando a 340x.
MCG-1-56-5	gx	22h81m47s	−03°29.8'		Aqr	16"	m. buona / discreto	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso NW — 270x.
MCG-1-57-1	gx	22h19m57s	−07°40.0'		Aqr	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
MCG-1-57-2	gx	22h20m04s	−03°27.2'		Aqr	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto esteso non più di 15"-20"; appare solo a tratti in visione distolta a 380x a ridosso verso S di una stellina abbastanza brillante; 2 stelline ravvicinate appena percettibili appaiono ogni tanto verso S; quella a W è più evidente.
MCG-1-57-4	gx	22h23m39s	−03°25.9'		Aqr	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da E a W, dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale quasi stellare; è situata tra 2 stelline distanti 1.5' e orientate da WNW a ESE — 270x.
MCG-1-57-8	gx	22h24m33s	−04°45.1'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20" e nucleo stellare visibile a tratti a 380x; è situata ridosso verso N di una stellina.
MCG-1-57-9	gx	22h26m16s	−04°20.5'		Aqr	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è poco più brillante all'interno, ma senza condensazione vera e propria — 450x.
MCG-1-57-11	gx	22h26m36s	−03°41.9'		Aqr	16"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×20"; ha un piccolo bulge di aspetto quasi stellare visibile a 380x.
MCG-1-57-12	gx	22h27m25s	−07°13.2'		Aqr	24"	discreta / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo e di forma indistinta e che in visione distolta appare estesa 40"-45"; meglio scalare a 340x, anche se la visione è disturbata da due stelle brillanti (SAO 146096 e 146098, entrambe di 10ª grandezza) situate rispettivamente 2.5' a SW e a N.
MCG-1-57-17	gx	22h38m13s	−07°02.1'		Aqr	16"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di ~ 1'; situata a metà strada del lato orientale di un triangolo di stelline abbastanza brillanti: il lato occidentale è formato da 3 stelline allineate — 380x.
MCG-1-57-21	gx	22h40m15s	−02°25.5'		Aqr	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; è meglio visibile a 188x; a 270x appare una stellina a SE (o SSE) e un'altra appena percettibile quasi a ridosso verso N.
MCG-1-57-23	gx	22h42m05s	−02°47.0'		Aqr	16"	ottima / ottimo	a 188x è un ovale diffuso di 45"×30" e orientato da NE a SW; a 380x si stempera quasi totalmente sul fondo cielo, ma salta fuori un nucleo relativamente brillante di aspetto stellare.
MCG-1-58-5	gx	22h55m44s	−06°27.2'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; si trova a ridosso verso E di un piccolo triangolo isoscele schiacciato di stelline brillanti (quella più a S è una doppia stretta); è un poco disturbata dalla SAO 146394 di 9ª grandezza situata a 3' SE — 450x.
MCG-1-58-6	gx	22h56m33s	−06°48.8'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 450x.
MCG-1-58-10	gx	22h58m08s	−03°47.3'		Aqr	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme, salvo un'elusiva condensazione centrale che però appare solo a tratti a 380x; pressoché allineata con 2 stelline situate a E: quella più occidentale è a ridosso della gx.
MCG-1-58-15	gx	23h03m44s	−07°13.5'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, con bassissimo gradiente, allungata ~ da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
MCG-1-58-18	gx	23h04m55s	−06°32.4'		Aqr	24"	buona / mediocre	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina molto debole a 1.5' SW; a tratti sembra di vedere un tenuissimo nucleo stellare; meglio contrastata a 280x.
MCG-1-58-20	gx	23h05m27s	−02°57.4'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 450x.
MCG-1-59-13	gx	23h17m43s	−03°30.3'		Aqr	16"	ottima / ottimo	fa parte assieme alle due successive di un terzetto — debolissima, osservabile in visione distolta a 270x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso W.
MCG-1-59-14	gx	23h18m02s	−03°41.8'		Aqr	16"	ottima / ottimo	fa parte assieme alla precedente e alla successiva di un terzetto — è un'altra debolissima macchiolina diffusa di dimensioni simili visibile a tratti in visione distolta, ma è preferibile scalare a 188x; di fatto la più debole del terzetto.
MCG-1-59-16	gx	23h18m17s	−03°37.6'		Aqr	16"	ottima / ottimo	fa parte assieme alle due precedenti di un terzetto e di cui costituisce il membro più evidente — è comunque molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 270x.
MCG-1-59-18	gx	23h18m43s	−03°00.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo di max 30" di Ø con tenue condensazione centrale visibile a 380x (a questo ingrandimento il campo è depleto).
MCG-1-59-20	gx	23h20m21s	−05°13.8'		Aqr	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda, di 25"-30" di Ø e con condensazione centrale piccola visibile a tratti a 380x.
MCG-1-59-22	gx	23h26m27s	−04°57.9'		Psc	16"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta; a 380x appare senza difficoltà come un oggetto rotondo di luminosità uniforme e con Ø di 20" o 25" situato a poco più di 1' SE di una stellina brillante — 380x.
MCG-1-59-24	gx	23h29m25s	−02°48.0'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza di luminosità uniforme che in visione distolta sembra di 80"×30", orientata da NE a SW, con qualche lieve irregolarità di luce riscontrabile a 380x; c'è una stellina a 1.5 verso SE.
MCG-1-59-26	gx	23h30m15s	−02°27.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SW (ma da un controllo effettuato successivamente questa è risultata essere la MAC 2330-0227) — 450x.
MCG-1-59-27	gx	23h30m32s	−02°27.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una debolissima stellina a ridosso verso S; una brillante si trova invece a 1' SW (già osservata, seppur molto debolmente, nel 16") — 450x.
MCG-1-60-5	gx	23h33m44s	−03°05.0'		Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, appare con relativa facilmente solo in visione distolta (in visione diretta salta fuori solo la stellina a ridosso NE), allungata da NE a SW con dimensioni 80"×40"; è comunque meglio definita scalando a 340x.
MCG-1-60-11	gx	23h36m30s	−04°54.5'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza rotondeggiante di luminosità uniforme e molto stemperata sul fondo cielo, estesa forse oltre 1'; relativamente facile da vedere in visione distolta a 270x.
MCG-1-60-12	gx	23h36m45s	−05°02.3'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	più evidente e più piccola di MCG-1-60-11, rotonda con Ø di 30"-35"; a 380x appare a tratti un nucleo stellare.
MCG-1-60-15	gx	23h37m52s	−03°29.5'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con condensazione centrale diffusa; situata a ridosso SE di una triangolo irregolare molto aperto di stelle di luminosità decrescente (da N a S) che aiuta a identificarla — 380x.
MCG-1-60-19	gx	23h41m10s	−06°36.3'		Aqr	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 450x.
MCG-1-60-22	gx	23h42m01s	−03°36.9'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, pur restando un oggetto debole, piccola, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
MCG-1-60-23	gx	23h42m00s	−04°13.0'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	è debolissima, ma in visione distolta si capisce bene che è orientata da ENE a WSW con dimensioni ~ 60"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
MCG-1-60-24	gx	23h42m56s	−03°39.1'		Aqr	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
MCG-1-60-25	gx	23h43m52s	−08°02.0'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×40" — 340x.
MCG-1-60-26	gx	23h44m11s	−06°10.2'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×40" e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
MCG-1-60-28	gx	23h45m51s	−06°46.8'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	oggetto rotondo molto debole e diffuso con Ø di ~ 30"; c'è una stellina brillante a quasi 2' verso W; meglio osservabile a 380x.
MCG-1-60-29	gx	23h45m53s	−07°08.4'		Aqr	24"	buona / buono	fa parte di un piccolo gruppo di gx difficilissime, la cui visione è aggravata dal fatto di essere situate in un campo ristretto con stelline di riferimento molto deboli; d'altra parte a 400x, necessari per osservarle, il campo è di appena 12' — questa appare debolissima e diffusa, orientata da N a S (come le 2 deboli stelline a NW e SW), con dimensioni 30"×15".
MCG-1-60-30	gx	23h46m04s	−07°09.5'		Aqr	24"	buona / buono	fa parte del piccolo gruppo di MCG-1-60-29 — è la più evidente delle 4 MCG, pur restando debolissima; è di luminosità uniforme e a tratti appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
MCG-1-60-31	gx	23h46m53s	−07°05.9'		Aqr	24"	buona / buono	fa parte del piccolo gruppo di MCG-1-60-29 — appena percettibile, molto diffusa, rotonda con Ø simile a quello della seconda elencata; una condensazione centrale molto tenue è visibile a tratti a 400x.
MCG-1-60-35	gx	23h47m30s	−07°10.8'		Aqr	24"	buona / buono	difficile come MCG-1-60-31; appare solo in visione distolta a 400x sul prolungamento di 2 stelline distanti 3' — 400x.
MCG-1-60-37	gx	23h47m33s	−07°48.4'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debolissima, solo a tratti appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; meglio osservabile a 380x.
MCG-1-60-40	gx	23h48m04s	−02°24.8'		Psc	16"	ottima / buono	è un elusiva chiazza rotonda di luminosità uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 270x.
MCG-1-60-41	gx	23h48m11s	−02°26.0'		Psc	16"	ottima / buono	presenta nucleo brillante, diffuso di aspetto un po' irregolare e un tenuissimo alone visibile solo in visione distolta, ma di aspetto indistinto — 380x.
MCG-1-60-42	gx	23h48m58s	−07°03.5'		Aqr	24"	buona / buono	è un'elusiva galassietta molto piccola e relativamente compatta che solo a tratti appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 400x.
MCG-1-60-43	gx	23h49m01s	−02°17.4'		Psc	16"	ottima / scarso	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35" — 270x.
MCG-1-60-44	gx	23h49m07s	−07°02.9'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	è un debolissimo ovale di 40"×20" orientato da N a S; forse poco più evidente a 380x; salta fuori facilmente in visione distolta (non ho visto la M-1-60-42 situata un paio di primi a W).
MCG-1-60-45	gx	23h53m04s	−03°48.1'		Aqr	24"	buona / buono	debole chiazza molto diffusa e con bassissimo gradiente di luce, rotonda con Ø > 1'; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-1-1	gx	23h55m33s	−09°39.3'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; osservando in visione distolta appare un piccolo oggetto diffuso esteso una 20-ina di secondi e 2' scarsi verso NE: da un controllo successivamente effettuato, questo è risultato essere la MAC 2355-0938.
MCG-2-1-4	gx	23h56m24s	−11°07.1'		Aqr	24"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x quando si osserva MCG-2-1-5 situata 1' a NE.
MCG-2-1-5	gx	23h56m26s	−11°05.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e con condensazione centrale evidente, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una coppia di stelle brillanti a 1' verso NW — 450x.
MCG-2-1-8	gx	23h59m32s	−09°54.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto condensato, di aspetto stellare in visione diretta, mentre appare diffuso in visione distolta; poco meglio evidente spingendo a 570x; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso N.
MCG-2-1-10	gx	00h03m07s	−12°24.2'		Cet	24"	buona / buono	elusiva, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare solo in visione distolta a 400x e a tratti sembra di vedere un nucleo stellare.
MCG-2-1-11	gx	00h03m22s	−09°59.0'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima, molto diffusa e con con condensazione centrale appena percettibile forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; quasi allineata ed equidistante con 2 stelline: una molto debole a ridosso verso NW e l'altra più brillante a poco più di 1' NW — 450x.
MCG-2-1-12	gx	00h03m22s	−10°46.2'		Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente facile e compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare osservabile a 380x; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W.
MCG-2-1-14	gx	00h04m01s	−11°10.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; un elusivo nodulo appare a momenti in visione distolta a ridosso di SW, ma solo a 450x: in realtà si tratta di MCG-2-1-15. Il sistema è allineato con 2 stelline a SSE: quella più vicina, situata a 1.5' di distanza, è abbastanza brillante, mentre l'altra è molto più debole; entrambe formano un piccolo triangolo rettangolo con una 3ª stellina decisamente più luminosa a un paio di primi ENE (la gx era già stata precedentemente osservata col 16" a 380x in condizioni di visibilità analoghe, anche se non ero ovviamente riuscito a intravvedere la compagna) — 450x.
MCG-2-1-15	gx	00h04m01s	−11°10.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	v. **MCG-2-1-14**
MCG-2-1-18	gx	00h04m34s	−09°03.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi, ma più vicina a quella verso W — 450x.
MCG-2-1-22	gx	00h05m56s	−13°58.7'		Cet	24"	buona / buono	elusiva, appare a tratti in visione distolta a 1' N di MCG-2-1-23; ciò che tuttavia salta dapprima all'occhio è il nucleo stellare (a meno che non si tratti di una debolissima stellina sovrapposta) — 400x.
MCG-2-1-23	gx	00h05m57s	−13°59.7'		Cet	24"	buona / buono	molto debole e molto allungata da NE a SW, di luminosità pressoché uniforme salvo un nucleo stellare visibile però solo a tratti a 400x.
MCG-2-1-26	gx	00h07m31s	−11°47.9'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, poco e molto diffuso con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE; c'è un piccolo arco di 3 stelline brillanti subito a N — 380x.
MCG-2-1-28	gx	00h08m34s	−10°57.0'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø < 1'; meglio osservabile a 270x.
MCG-2-1-34	gx	00h13m02s	−13°15.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina 1' verso W; una stella abbastanza brillante situata 3' a S disturba un po' l'osservazione — 450x.
MCG-2-1-36	gx	00h13m38s	−08°46.4'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante proprio al bordo occidentale. A prima vista, osservando a 270x, sembra un alone asimmetrico attorno a questa stellina; è meglio visibile a 380x.
MCG-2-1-37	gx	00h14m25s	−13°46.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di aspetto un po' confuso, molto stemperata sul fondo cielo ed estesa forse una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma in questo caso non conviene abbassare gli ingrandimenti — 450x.
MCG-2-1-41	gx	00h16m41s	−10°33.1'		Cet	24"	discreta / mediocre	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 400x.
MCG-2-1-42	gx	00h17m03s	−09°40.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-2-1-45	gx	00h17m27s	−09°32.0'		Cet	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo, molto debole e condensato, relativamente compatto e con Ø di una 15-ina di secondi di Ø; è situato a ridosso SW di una stellina (situata un paio di primi a WNW di IC 5) — 380x.
MCG-2-1-46	gx	00h17m27s	−09°34.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	lama di luce molto debole estesa una 40-ina di secondi e orientata da NE a SW; appare abbastanza netta in visione distolta a 450x.
MCG-2-1-50	gx	00h18m50s	−08°27.5'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40"; c'è una debolissima stellina a ~ 1' NW; meglio visibile a 270x (anche perché a 380x il campo è praticamente depleto).
MCG-2-1-51	gx	00h18m50s	−10°22.7'		Cet	16"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto relativamente compatto, appena condensato, rotondo con Ø di ~ 20"; forma una coppia ravvicinata con Arp 256 — 380x.
MCG-2-1-54	gx	00h19m21s	−10°56.6'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 270x in un campo molto povero (a parte la SAO 147212 di 9ª all'estremità W e un piccolo arco di 3 stelline a quella opposta); è molto diffusa e estesa una 30-ina di secondi.
MCG-2-1-55	gx	00h19m39s	−09°40.4'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme; solo a tratti appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 400x.
MCG-2-2-3	gx	00h20m35s	−13°21.1'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta, ma è meglio restare a 450x; c'è una stellina subito a E.
MCG-2-2-4	gx	00h21m36s	−14°16.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-2-2-7	gx	00h22m34s	−08°29.2'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, ma relativamente facile e compatta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15" e di luminosità pressoché uniforme, salvo una condensazione centrale molto tenue visibile a tratti — 570x.
MCG-2-2-8	gx	00h23m16s	−08°29.4'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta quando si fissa la stellina situata 1.5' NE; probabilmente rotonda con Ø max di 30" — 400x.
MCG-2-2-12	gx	00h24m36s	−11°29.8'		Cet	24"	buona / ottimo	piccola e debolissima, di aspetto confuso, ma non estesa più di 20"; a 400x appare a tratti appare un nucleo stellare.
MCG-2-2-13	gx	00h25m44s	−08°25.1'		Cet	16"	buona / m. buono	molto debole, rotonda, di max 30" di Ø e con condensazione centrale di aspetto quasi stellare visibile a tratti a 380x.
MCG-2-2-15	gx	00h27m47s	−11°30.9'		Cet	24"	buona / ottimo	più debole di MCG-2-2-16, osservata per prima, e di aspetto più uniforme, piccola forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
MCG-2-2-16	gx	00h22m20s	−13°16.1'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di 15"-20" e nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso NE e una stella brillante a meno di 1' verso S; meglio visibile a 570x.
MCG-2-2-18	gx	00h28m12s	−13°53.8'		Cet	24"	discreta / mediocre	debolissima, molto piccola e diffusa, estesa non più di 20"; appare in visione distolta a meno di 1' N di una stellina; altra stellina appena percettibile a poco più di 1' SW — 280x.
MCG-2-2-20	gx	00h28m18s	−09°29.6'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW (come le 3 stelle brillanti a S) con dimensioni 40"×20" — 400x.
MCG-2-2-22	gx	00h28m44s	−12°38.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	è una debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme e di forma indistinta; appare in visione distolta a 450x e non sembra più estesa di 30"; situata all'interno di un rettangolo irregolare di stelline abbastanza brillanti.
MCG-2-2-25	gx	00h29m00s	−08°19.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è molto debole, ma più che altro presenta una condensazione centrale marcata che tende un po' a offuscare la regione periferica; quest'ultima sembra un poco decentrata verso S; la galassia, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-2-28	gx	00h29m57s	−11°17.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima lama di luce, salta fuori a momenti in visione distolta, orientata da E a W ed estesa per 1' — 450x.
MCG-2-2-29	gx	00h29m55s	−11°06.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG-2-2-30	gx	00h30m07s	−11°06.8'		Cet	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30" — 270x.
MCG-2-2-34	gx	00h30m33s	−11°24.2'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima chiazza approssim. circolare, con Ø di una 40-ina di secondi; appare con difficoltà, perché c'è una stellina brillante a 1' SE che disturba l'osservazione — 450x.
MCG-2-2-35	gx	00h30m54s	−09°12.5'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, allungata da NW a SE, con dimensioni 40"×20" e tenue condensazione centrale appena percettibile — 400x.
MCG-2-2-36	gx	00h30m58s	−09°24.2'		Cet	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; 570x per tener fuori campo la SAO 128798, arancione di 8ª grandezza, situata a soli 4' W.
MCG-2-2-37	gx	00h31m37s	−10°53.3'		Cet	24"	discreta / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile a tratti, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 280x.
MCG-2-2-38	gx	00h31m13s	−10°28.9'		Cet	16"	ottima / ottimo	assieme a MCG-2-2-40 forma una coppia di gx di luminosità uniforme, diffuse e relativamente facili da vedere; la 1ª è orientata da N a S, con dimensioni 30"×30"; la 2ª è molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e solo leggermente più debole — 380x.

MCG-2-2-39	gx	00h31m37s	−11°50.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente in visione distolta subito a N di una stellina appena percettibile; non sembra più estesa di 30" o 40" — 450x.
MCG-2-2-40	gx	00h31m36s	−10°30.4'		Cet	16"	ottima / ottimo	v. **MCG-2-2-38**
MCG-2-2-41	gx	00h31m57s	−11°01.0'		Cet	24"	discreta / mediocre	debolissima, appare a tratti in visione distolta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e leggermente condensata — 280x.
MCG-2-2-42	gx	00h31m57s	−12°58.2'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima, osservabile a tratti in visione distolta, molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
MCG-2-2-43	gx	00h31m58s	−08°20.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
MCG-2-2-44	gx	00h32m23s	−11°56.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG-2-2-46	gx	00h32m33s	−12°03.7'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo, a tratti condensato e di una 20-ina di secondi; a prima vista sembra il classico "nodulo" che aggetta, in questo caso verso S, da una stellina abbastanza brillante — 380x.
MCG-2-2-47	gx	00h32m45s	−10°27.0'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG-2-2-48	gx	00h32m49s	−10°00.7'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con bassa luminanza superficiale, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è la SAO 147334 di 9ª a meno di 5' ENE; meglio contrastata a 270x.
MCG-2-2-49	gx	00h32m43s	−11°19.1'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta e si vede abbastanza facilmente a 380x, nonostante che, centrandola, il campo sia depleto; è molto allungata da NE a S W, con dimensioni 80"×20 e di luminosità uniforme.
MCG-2-2-51	gx	00h33m10s	−13°08.8'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — meglio visibile a 270x.
MCG-2-2-52	gx	00h33m24s	−14°00.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una coppia di stelle brillanti a 3' verso S.
MCG-2-2-57	gx	00h34m58s	−09°20.5'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di 45", diffusa e con condensazione centrale visibile a 380x.
MCG-2-2-58	gx	00h34m55s	−12°29.9'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza diffusa, di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di 45"; meglio osservabile a 270x.
MCG-2-2-59	gx	00h35m03s	−09°22.1'		Cet	16"	ottima / ottimo	situata a 5.5' SE di M-2-2-57, è debolissima e molto piccola; a tratti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" e mostra anch'essa una condensazione centrale molto tenue — 380x.
MCG-2-2-60	gx	00h35m35s	−12°17.2'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile, rotonda, diffusa, di ~ 30" di Ø e con condensazione centrale abbastanza evidente —380x.
MCG-2-2-64	gx	00h36m02s	−09°53.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-2-67	gx	00h36m24s	−11°45.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, abbastanza definita, orientata da N a S con dimensioni di 1' — 450x.
MCG-2-2-68	gx	00h36m13s	−12°15.5'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE, con dimensioni 40"×20" e tenue condensazione centrale osservabile a tratti — 380x.
MCG-2-2-70	gx	00h37m04s	−12°40.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta a 450x, approssim. rotonda con Ø di ~ 30".
MCG-2-2-72	gx	00h38m02s	−13°51.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di circa 1'; in questo caso tuttavia la visione non sembra migliorare gran che scalando a 340x.
MCG-2-2-73	gx	00h37m58s	−09°15.3'		Cet	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile da vedere, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a poco più di 1' verso S — 380x.
MCG-2-2-74	gx	00h38m38s	−11°02.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MCG-2-2-82	gx	00h40m55s	−13°46.5'		Cet	24"	buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso — 400x.
MCG-2-2-83	gx	00h41m13s	−13°32.7'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e molto stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø di 1'; poco meglio contrastata scalando a 280x.
MCG-2-2-84	gx	00h41m43s	−09°26.3'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima molto diffusa e di luminosità uniforme; solo a tratti appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 30"×20" — 400x.
MCG-2-2-86	gx	00h41m50s	−09°18.1'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1' 400x.
MCG-2-2-90	gx	00h41m53s	−10°50.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno — 450x.
MCG-2-2-91	gx	00h42m05s	−09°32.1'		Cet	24"	buona / ottimo	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta; forse rotonda, ma non sembrerebbe più estesa di 20" — 400x.
MCG-2-2-92	gx	00h42m15s	−11°28.3'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; presenta un piccolo bulge osservabile a 380x.
MCG-2-2-94	gx	00h42m48s	−11°10.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma in questo caso è meglio scalare a 340x; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG-2-2-97	gx	00h43m08s	−11°12.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG-2-3-2	gx	00h43m58s	−13°46.0'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, mar relativamente compatta, rotonda con Ø di 30" e tenue nucleo stellare; è situata tra 2 stelline distanti 1.5': una a NW e l'altra, più vicina e appena percettibile a 570x, a SE.
MCG-2-3-3	gx	00h44m00s	−11°18.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare; situata al vertice meridionale di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline appena percettibili — 450x.
MCG-2-3-5	gx	00h44m34s	−08°20.8'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, appare solo a tratti in visione distolta, allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 380x.
MCG-2-3-6	gx	00h45m09s	−09°37.9'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S — 570x.
MCG-2-3-7	gx	00h45m24s	−12°32.2'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme; visibile solo a 450x a meno di 1' N di una stellina appena percettibile; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15".
MCG-2-3-15	gx	00h47m46s	−09°50.1'		Cet	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso [c'è la UGCA 14 a 4' verso S] — 380x.
MCG-2-3-18	gx	00h47m48s	−09°22.7'		Cet	24"	buona / ottimo	relativamente facile, ma molto disturbata dalla SAO 128961 di 6ª grandezza situata ad appena 3' NE e che a mala pena si riesce a tenere fuori campo a 570x; è allungata da N a S, con dimensioni 60"×30", poco diffusa e di luminosità uniforme.
MCG-2-3-19	gx	00h48m36s	−12°43.0'		Cet	16"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda, poco diffusa, con Ø di ~ 30" e appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1' verso NW — 380x.
MCG-2-3-22	gx	00h49m08s	−12°28.5'		Cet	16"	ottima / buono	assieme a **MCG-2-3-23** forma una coppia di debolissimi oggetti di una 20-ina di secondi di Ø e distanti poco più di 1' in direzione N-S; il 1º è poco più evidente, ma bisogna comunque spingere a 380x.
MCG-2-3-23	gx	00h49m07s	−12°28.0'		Cet	16"	ottima / buono	v. **MCG-2-3-22**
MCG-2-3-25	gx	00h49m56s	−12°03.1'		Cet	16"	ottima / buono	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta a 380x.
MCG-2-3-26	gx	00h50m06s	−12°11.1'		Cet	16"	ottima / buono	è molto più facile di MCG-2-3-25 — pur restando debole — rotonda, leggermente condensata, poco diffusa e di 20"-25" di Ø; c'è una stellina a 1' verso SW — 380x.
MCG-2-3-29	gx	00h51m22s	−08°31.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e solo a momenti in visione distolta appare orientata all'incirca da E a W con dimensioni 40"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x (presenza di debole chiarore lunare); la gx è situata 5' a N di NGC 277 osservata col 16" in altra data.
MCG-2-3-36	gx	00h53m45s	−09°06.6'		Cet	16"	ottima / buono	debolissimo oggetto rotondo, condensato, diffuso e con Ø di un 30-ina di secondi — 380x.
MCG-2-3-38	gx	00h54m07s	−10°50.5'		Cet	16"	ottima / buono	è un elusiva macchiolina rotonda di 25"-30" di Ø che appare solo in visione distolta a 1' N di una debolissima stellina; meglio osservabile a 380x.
MCG-2-3-39	gx	00h54m47s	−10°58.3'		Cet	24"	buona / scarso	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 340x.
MCG-2-3-40	gx	00h54m57s	−11°03.1'		Cet	24"	buona / scarso	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 340x.
MCG-2-3-42	gx	00h55m33s	−13°27.6'		Cet	24"	buona / scarso	è debolissima, ma solo in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; occorre tuttavia scalare a 210x (anche se la forma si distingue meglio con l'ingrandimento maggiore), perché a 340x il campo attorno alla gx è virtualmente depleto (salvo una doppia sbilanciata a poco più di 3' verso NE.
MCG-2-3-44	gx	00h55m29s	−10°56.3'		Cet	24"	buona / scarso	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, condensazione centrale abbastanza evidente e un nucleo stellare visibile a momenti — 340x.
MCG-2-3-51	gx	00h58m08s	−10°07.2'		Cet	16"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di ~ 40" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso SW — 380x.
MCG-2-3-52	gx	00h58m24s	−08°24.6'		Cet	16"	ottima / buono	è stranamente brillante, poco allungata da E a W, di dimensioni 60"×45" e con piccolo bulge diffuso evidente — 380x.
MCG-2-3-53	gx	00h58m31s	−10°09.4'		Cet	16"	ottima / buono	elusiva, osservabile solo a tratti in visione distolta scalando a 270x, ma non riesco a capire com'è orientata.
MCG-2-3-55	gx	00h58m56s	−10°55.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con una stellina abbastanza brillante a ridosso di SW che disturba un poco l'osservazione; un'altra stellina, più debole, si trova subito a NW (presenza di debole chiarore lunare) — 450x.
MCG-2-3-56	gx	00h59m09s	−13°45.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata all'incirca da E a W ed estesa per 1'; meglio visibile tuttavia scalando a 340x (presenza di deboli chiarore lunare).
MCG-2-3-57	gx	00h59m17s	−13°41.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
MCG-2-3-58	gx	00h59m37s	−10°19.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e un tenue bulge poco contrastato *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
MCG-2-3-60	gx	00h59m59s	−13°59.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina brillante un paio di primi a E — 450x.
MCG-2-3-61	gx	01h00m04s	−11°05.0'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, con piccola condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso vero NE — 380x.
MCG-2-3-64	gx	01h00m48s	−09°11.3'	q 262	Cet	24"	buona / ottimo	è un debolissimo nodulo esteso una decina di primi, situato a ridosso E di NGC 341 e che si riesce a separare solo a momenti a 450x. E' riportata sulla I edizione dell'Uranometria come **NGC 341B**.
MCG-2-3-66	gx	01h01m19s	−09°50.7'		Cet	16"	ottima / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
MCG-2-3-67	gx	01h02m40s	−12°50.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a poco più di 1' verso E — 450x.
MCG-2-3-68	gx	01h03m24s	−10°51.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola chiazza poco diffusa e di luminosità uniforme,; a 450x sembra di aspetto un po' irregolare; grosso modo orientata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW (presenza di debole chiarore lunare).
MCG-2-3-69	gx	01h04m03s	−11°38.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; purtroppo anche a 450x si fatica a tenere fuori campo la SAO 147587 di 9ª grandezza situata 4' a SW.
MCG-2-3-70	gx	01h04m53s	−11°11.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' SE; poco meglio evidente a 340x (presenza di debole chiarore lunare).
MCG-2-3-72	gx	01h07m05s	−08°48.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre restare a 450x; è orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20".
MCG-2-3-73	gx	01h07m23s	−13°20.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
MCG-2-3-74	gx	01h07m33s	−13°16.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" e una nucleo stellare; c'è una stellina a 1' SE, ossia sul prolungamento dell'asse maggiore della gx (presenza di debole chiarore lunare) — 450x.
MCG-2-4-1	gx	01h08m43s	−11°48.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 450x.
MCG-2-4-3	gx	01h08m47s	−12°36.6'		Cet	16"	ottima / buono	debolissima e molto diffusa, non più estesa di una 30-ina di secondi; meglio visibile a 380x.
MCG-2-4-5	gx	01h10m21s	−09°34.2'		Cet	16"	ottima / buono	debolissima macchia rotonda molto diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi; anche questa è meglio evidente a 380x.
MCG-2-4-6	gx	01h10m32s	−13°58.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-4-7	gx	01h10m38s	−12°02.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto disturbata dalla SAO 147651 di 9ª grandezza situata un paio di primi a ENE; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 450x.
MCG-2-4-8	gx	01h10m40s	−13°38.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti — 450x.
MCG-2-4-9	gx	01h10m58s	−13°39.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	situata 4' a ESE di MCG-2-4-8, è molto debole, ma appare facilmente in visione distolta a 340x, forse rotonda con Ø di una30-ina di secondi.
MCG-2-4-10	gx	01h11m09s	−13°57.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa, rotonda con Ø < 40" e piccola condensazione centrale abbastanza evidente; è situata a poco più di 1' NE di una stella — 450x.
MCG-2-4-11	gx	01h11m38s	−14°02.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-4-12	gx	01h12m27s	−12°46.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e con condensazione centrale quasi stellare appena percettibile che però salta fuori scalando a 340x (a 450x sembra più uniforme), allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30".
MCG-2-4-19	gx	01h17m33s	−08°15.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-4-21	gx	01h17m46s	−12°17.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare visibile a tratti a 450x.
MCG-2-4-22	gx	01h19m21s	−11°52.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco più facile di MCG-2-4-21 e meno diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-4-23	gx	01h19m54s	−09°56.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente a 450x a 1.5' N di una stella brillante; è comunque disturbata dalla SAO 147742 di magnitudo 6.6 situata ad appena 4' NNE e che anche a 450x non si riesce a tener fuori campo; a 570x il campo è decisamente più stretto e a momenti si riesce a capire ch'è orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15".
MCG-2-4-24	gx	01h20m33s	−08°33.2'		Cet	24"	m. buona / mediocre	è una debole chiazza circolare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso NW e un'altra più debole a W — 340x.
MCG-2-4-25	gx	01h20m47s	−08°29.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	v. **MCG-2-4-26**
MCG-2-4-26	gx	01h20m48s	−08°29.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; una stellina appena percettibile appare solo a momenti a ridosso verso W; ma da un controllo successivamente effettuato, quest'ultima è risultata essere la MCG-2-4-25; purtroppo il seeing non buono non mi aveva permesso di capire se tale stellina era leggermente sfocata di per sé o se si trattava, per l'appunto, di un piccolo oggetto diffuso — 340x.
MCG-2-4-28	gx	01h21m00s	−12°34.2'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG-2-4-29	gx	01h20m58s	−13°51.0'		Cet	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, disturbata dalla SAO 147750 di magnitudo 6.7 situata a 5' SW che si fa fatica a tenere fuori campo; c'è una stellina molto debole a 1' verso SW — 450x.
MCG-2-4-31	gx	01h21m28s	−10°37.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG-2-4-32	gx	01h21m43s	−11°46.2'		Cet	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e con Ø di 45"; è situata tra 2 stelline orientate da NW a SE e distanti un paio di primi; meglio visibile a 270x.
MCG-2-4-39	gx	01h24m31s	−08°41.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 280x.
MCG-2-4-40	gx	01h24m48s	−08°49.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	assieme a MCG-2-4-42 forma una coppia di galassiette molto difficili distanti 2.5' in direzione NE-SW — la 1ª è debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' SW; la 2ª sembra più evidente, poco allungata da N a S con dm 30"×20" e nucleo stellare osservabile a 280x.
MCG-2-4-42	gx	01h24m53s	−08°49.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG-2-4-40**
MCG-2-4-44	gx	01h24m53s	−11°35.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a 1' scarso verso E.
MCG-2-4-45	gx	01h25m16s	−08°52.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, poco diffusa ed estesa ~ 20".
MCG-2-4-47	gx	01h25m48s	−12°30.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	piccola, molto debole, ma relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 340x.
MCG-2-4-49	gx	01h26m07s	−13°25.2'		Cet	24"	m. buona / buono	è di aspetto molto simile a MCG-2-4-52.
MCG-2-4-51	gx	01h26m15s	−13°31.0'		Cet	24"	m. buona / buono	di Ø simile a MCG-2-4-52, osservata per prima, ma più debole e di aspetto più uniforme — 450x.
MCG-2-4-52	gx	01h26m27s	−13°29.0'		Cet	24"	m. buona / buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e tenue condensazione centrale evidente — 450x.
MCG-2-4-54	gx	01h27m30s	−13°44.5'		Cet	24"	buona / buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; più interessante a 340x.
MCG-2-4-56	gx	01h28m01s	−09°28.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, probabilmente rotonda con Ø > 30" e molto diffusa — 400x.
MCG-2-4-61	gx	01h30m20s	−12°14.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, osservabile con relativa facilità in visione distolta; a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×30"; meglio contrastata scalando a 280x (a 400x appare rotondeggiante).
MCG-2-4-62	gx	01h30m25s	−11°58.7'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-4-64	gx	01h31m30s	−10°51.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso.
MCG-2-5-6	gx	01h32m59s	−10°27.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme — 400x.
MCG-2-5-8	gx	01h35m34s	−13°59.8'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-5-9	gx	01h35m44s	−09°59.3'		Cet	16"	m. buona / mediocre	piccoli oggetto molto debole e diffuso con Ø di 30"; si vede facilmente in visione distolta quando si osserva NGC 624 da cui dista un paio di primi verso NW — 270x.
MCG-2-5-11	gx	01h35m52s	−09°56.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10" — 340x.
MCG-2-5-12	gx	01h36m07s	−11°01.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 1' scarso; situata a ~ 1' SE di una stella; meglio contrastata a 280x.
MCG-2-5-13	gx	01h36m18s	−13°41.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso NW — 400x.
MCG-2-5-14	gx	01h36m38s	−13°52.9'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-2-5-15	gx	01h36m49s	−14°03.2'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso S — 450x.
MCG-2-5-16	gx	01h36m41s	−13°53.4'		Cet	24"	m. buona / buono	situata 1' scarso a SE di M-2-5-14, è una gx diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e una tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
MCG-2-5-17	gx	01h36m54s	−14°00.0'		Cet	24"	m. buona / buono	poco più evidente e maggiormente diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; stellina quasi a ridosso verso N — 400x.
MCG-2-5-18	gx	01h36m56s	−13°56.6'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissimo oggetto rotondo, diffuso e di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta a 3' N di MCG-2-5-17 — 400x.
MCG-2-5-19	gx	01h37m02s	−12°18.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole e diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MCG-2-5-20	gx	01h37m15s	−09°11.9'		Cet	16"	ottima / m. buono	fa parte assieme a MCG-2-5-22, alla coppia MCG-2-5-23/4 e a PGC 5996 di un quartetto di gx molto difficili — molto debole e diffusa, con Ø > 30" e di luminosità uniforme; situata quasi a ridosso E di una coppia di stelline distanti una 20-ina di secondi e orientate da NE a SW — 380x.
MCG-2-5-22	gx	01h37m23s	−09°10.1'		Cet	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda e diffusa con Ø di 25"-30"; è relativamente facile in visione distolta a 380x.
MCG-2-5-23	gx	01h37m22s	−09°16.2'		Cet	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia molto serrata con MCG-2-5-24 dalla quale si separa con difficoltà; occorre comunque spingere a 450x (anche se il seeing non è favorevole); questa è più debole e in visione distolta sembra a momenti orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; la successiva appare invece facilmente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme.
MCG-2-5-24	gx	01h37m23s	−09°16.2'		Cet	24"	m. buona / mediocre	v. **MCG-2-5-23**
MCG-2-5-26	gx	01h37m31s	−08°53.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa, con condensazione centrale appena accennata; a tratti appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30", ma occorre scalare a 280x.
MCG-2-5-27	gx	01h37m37s	−12°31.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale molto tenue visibile a tratti; situata tra 2 stelle brillanti che tendono a lambire il campo oculare — 280x.
MCG-2-5-32	gx	01h39m34s	−12°04.6'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 280x.
MCG-2-5-38	gx	01h43m12s	−13°38.2'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 280x.
MCG-2-5-39	gx	01h44m34s	−08°46.4'		Cet	24"	m. buona / mediocre	appare solo elusivamente in visione distolta a 340x, estesa forse una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a NE (quella più vicina alla gx è la più brillante).
MCG-2-5-40	gx	01h44m53s	−10°56.2'		Cet	24"	buona / buono	poco diffusa, rotonda, Ø di una 30-ina di secondi, con piccola e tenue condensazione centrale — 450x.
MCG-2-5-46	gx	01h48m39s	−13°24.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme.
MCG-2-5-48	gx	01h47m18s	−14°02.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	bolla circolare molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a 1' verso N. A 3.5' SE c'è una stellina brillante di 11-esima: una 30-ina di secondi NE di quest'ultima appare, a tratti, un debolissimo oggetto molto piccolo, diffuso e con Ø 10" o 15"; da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la PGC 929212 — 400x.
MCG-2-5-50	gx	01h48m26s	−12°22.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	è un debolissimo lucore indistinto, esteso forse per oltre 1', che appare in visione distolta subito a E di una stellina molto debole; poco meglio definito scalando a 210x.
MCG-2-5-50A	gx	01h48m32s	−12°23.2'		Cet	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile e compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MCG-2-5-51	gx	01h48m36s	−10°19.6'		Cet	16"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; appare solo a tratti a 270x.
MCG-2-5-55	gx	01h49m22s	−14°07.4'		Cet	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 450x.
MCG-2-5-56	gx	01h49m38s	−13°34.3'		Cet	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni visualmente simili a MCG-2-5-55; poco disturbata da una stellina brillante situata a 1.5' verso N — 450x.
MCG-2-5-57	gx	01h49m40s	−12°49.5'		Cet	24"	buona / buono	debolissima chiazza, molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; grosso modo circolare con Ø di 1'; è situata tra 2 stelline brillanti distanti 5' e orientate in direzione NE-SW.
MCG-2-5-62	gx	01h51m11s	−12°30.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 400x.
MCG-2-5-64	gx	01h51m26s	−08°24.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	assieme a MCG-2-5-65 forma una coppia di gx deboli, ma facilmente visibili a 340x, a prima vista di aspetto simile e separate da un paio di primi in direzione NE-SW; la 1ª è allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; la 2ª è invece orientata da E a W e in visione distolta appare di dimensioni 30"×15".
MCG-2-5-65	gx	01h51m34s	−08°23.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	v. **MCG-2-5-64**
MCG-2-5-70	gx	01h53m18s	−12°22.1'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 400x.
MCG-2-5-71	gx	01h54m18s	−09°42.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, in visione distolta appare allungata da E a W, di dimensioni 80"×40"; presenta un bulge esteso con all'interno un tenue nucleo stellare; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-5-72	gx	01h51m11s	−12°30.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30", poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stella brillante a 3' NNW — 400x.
MCG-2-5-74	gx	01h54m53s	−13°39.2'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40" — 400x.
MCG-2-5-76	gx	01h55m18s	−12°54.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 45; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
MCG-2-6-1	gx	01h56m17s	−14°09.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza di forma indistinta ed estesa una 30-ina di secondi; nonostante la vicinanza della SAO 148106 di magnitudo 8.6 situata 3' a N è meglio visibile a scalando a 340x.
MCG-2-6-2	gx	01h55m16s	−10°29.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-6-8	gx	01h57m46s	−08°33.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-6-13	gx	02h00m38s	−10°42.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; appare solo a momenti a 450x; coppia di stelline appena percettibili a 1' SE.
MCG-2-6-16	gx	02h00m55s	−08°50.4'		Cet	24"	ottima / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 280x; è molto diffusa e approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
MCG-2-6-20	gx	02h03m17s	−12°38.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina a 1.5' verso N (c'è una falcetta di Luna presso il tramonto) — 400x.
MCG-2-6-27	gx	02h06m21s	−08°52.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza osservabile solo in visione distolta, molto diffusa forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MCG-2-6-28	gx	02h08m01s	−10°21.3'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE; meglio contrastata a 280x.
MCG-2-6-29	gx	02h08m36s	−08°37.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso SE e una appena percettibile al bordo meridionale — 450x.
MCG-2-6-35	gx	02h10m15s	−09°42.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole e molto diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 2'×40" e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 200x.
MCG-2-6-39	gx	02h12m05s	−13°42.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-6-40	gx	02h13m14s	−14°00.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-2-6-41	gx	02h14m06s	−12°49.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' S — 450x.
MCG-2-6-42	gx	02h14m30s	−13°15.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø < 30" e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
MCG-2-6-44	gx	02h15m37s	−13°43.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1.5' NW — 450x.
MCG-2-6-45	gx	02h15m48s	−13°49.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e con piccola condensazione centrale evidente, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG-2-6-47	gx	02h16m20s	−11°00.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' scarso verso N; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-6-49	gx	02h17m27s	−11°42.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-6-50	gx	02h17m32s	−11°31.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa ~ 1' in direzione E-W; anche questa è meglio evidente scalando a 340x.
MCG-2-6-51	gx	02h17m35s	−09°11.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-2-6-52	gx	02h18m14s	−12°13.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	presenta una condensazione centrale piccola ed evidente e un alone circonfuso molto tenue, rotondo con Ø di 45"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo SW — 400x.
MCG-2-6-54	gx	02h18m24s	−12°11.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	tenuissimo lucore appena percettibile in visione distolta; solo a tratti poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo 45"×30", ma occorre scalare a 280x.
MCG-2-6-56	gx	02h18m45s	−11°29.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e con tenue bulge rotondo, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 400x.
MCG-2-7-2	gx	02h21m47s	−10°01.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante e compatta, con bulge diffuso, poco contrastato sul disco, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 400x.
MCG-2-7-4	gx	02h24m42s	−11°48.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a meno di 1' verso S — 400x.
MCG-2-7-6	gx	02h25m51s	−11°11.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante e abbastanza compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a ridosso NE e un'altra subito a SE — 570x.
MCG-2-7-7	gx	02h26m21s	−09°50.5'		Cet	24"	buona / mediocre	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina subito a S e un'altra percettibile solo a momenti al bordo N — 340x.
MCG-2-7-8	gx	02h26m57s	−09°16.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta a 400x; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso W.
MCG-2-7-10	gx	02h27m33s	−10°09.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina molto debole al bordo orientale — 450x.
MCG-2-7-11	gx	02h27m40s	−09°54.7'		Cet	24"	buona / ottimo	è una debolissima chiazza indistinta e molto stemperata sul fondo cielo; in visione distolta non sembra più estesa di 30" o 40"; appare poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-7-12	gx	02h28m32s	−11°17.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×20" e di luminosità uniforme — 570x (se non altro per tener fuori campo la SAO 148408 di 7ª grandezza situata 5' a SE).
MCG-2-7-17	gx	02h28m59s	−08°30.9'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-7-20	gx	02h29m03s	−11°01.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da NE a SW (come NGC 950 dalla quale dista un paio di primi W), con dimensioni 40"×20"; una tenue condensazione centrale appare solo a momenti — 400x.
MCG-2-7-22	gx	02h29m54s	−11°07.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20", poco diffusa e di luminosità uniforme — 400x.
MCG-2-7-23	gx	02h29m59s	−13°15.8'		Cet	24"	buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina molto debole subito a NE; disturbata dalla SAO 148422 di magnitudo 8.6 situata a 3' scarsi verso WNW — 450x.
MCG-2-7-24	gx	02h30m05s	−08°59.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	occorre forzare a 570x per capire cos'è: si vede un nucleo quasi stellare abbastanza brillante, poco più luminoso della stellina situata 1' a NE che a confronto sembra più puntiforme, circonfuso da un tenuissimo alone al limite della visibilità esteso meno di 30" e che appare solo in visione distolta.
MCG-2-7-25	gx	02h30m07s	−10°27.4'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-7-26	gx	02h30m25s	−10°44.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, estesa forse una 30-ina di secondi; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso SE di una stellina molto debole — 400x.
MCG-2-7-27	gx	02h31m35s	−13°25.5'		Cet	24"	buona / buono	elusiva, osservabile soltanto in visione distolta e solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20", ma bisogna spingere a 450x (a 340x rimane confusa).
MCG-2-7-29	gx	02h32m02s	−13°20.0'		Cet	24"	buona / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, estesa forse 1'; salta fuori in visione distolta a poco più di 1' a E di una stellina brillante, ma occorre scalare a 340x.
MCG-2-7-32	gx	02h33m16s	−11°44.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare con molta fatica in visione distolta a 200x (non si può spingere di più perché a ingrandimenti superiori il campo è virtualmente depleto!); a tratti appare allungata da E a W con dimensioni 90"×60".
MCG-2-7-33	gx	02h34m24s	−10°50.6'		Cet	16"	ottima / m. buono	molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme; è molto debole, ma facilmente osservabile a 270x.
MCG-2-7-34	gx	02h34m26s	−14°16.3'		Cet	24"	buona / mediocre	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 280x.
MCG-2-7-36	gx	02h34m54s	−13°39.5'		Cet	16"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ridosso verso S; meglio osservabile a 270x.
MCG-2-7-38	gx	02h35m36s	−12°16.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20", con bulge appena evidente, anche se poco contrastato sul disco e nucleo stellare visibile a tratti — 400x.
MCG-2-7-39	gx	02h35m42s	−10°32.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina al bordo W — 400x.
MCG-2-7-40	gx	02h35m43s	−13°40.9'		Cet	16"	buona / ottimo	forma una coppia assieme a MCG-2-7-41 situata 1.5' a N — allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" e condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
MCG-2-7-41	gx	02h35m45s	−13°39.3'		Cet	16"	buona / ottimo	forma una coppia assieme alla precedente situata 1.5' a S — poco più evidente di MCG-2-7-36, e con tenue condensazione centrale diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
MCG-2-7-42	gx	02h36m13s	−09°18.6'		Cet	24"	buona / mediocre	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente, orientata da N a S con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-7-43	gx	02h36m35s	−09°21.2'		Cet	24"	buona / mediocre	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-7-51	gx	02h40m10s	−12°30.0'		Cet	24"	m. buona / scarso	debole, relativamente compatta e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
MCG-2-7-55	gx	02h40m20s	−12°28.7'		Cet	24"	m. buona / scarso	debolissima, appare solo a momenti quasi a ridosso verso N di MCG-2-7-56; è di forma indistinta, ma comunque non più estesa di 15" o 20" — 340x.
MCG-2-7-56	gx	02h40m20s	−12°29.3'		Cet	24"	m. buona / scarso	poco più debole di MCG-2-7-51, situata 2.5' a WSW, rotonda con Ø simile, ma di aspetto più uniforme — 340x.
MCG-2-7-57	gx	02h40m25s	−12°51.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MCG-2-7-60	gx	02h41m03s	−12°46.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	assieme a MCG-2-7-61 forma una coppia di deboli galassiette poco diffuse e leggermente condensate; si separano facilmente a 450x; sono entrambe rotonde, ma la 1ª è leggermente più piccola, con Ø < 20", mentre quello della 2ª è attorno ai 20" — 450x.
MCG-2-7-61	gx	02h40m29s	−12°52.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	v. **MCG-2-7-60**
MCG-2-7-63	gx	02h40m47s	−13°23.4'		Cet	24"	buona / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme, molto disturbata da una stellina brillante al bordo SE, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG-2-7-65	gx	02h41m04s	−13°26.8'		Cet	24"	buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo stellare visibile a momenti, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-7-66	gx	02h41m18s	−09°56.0'		Cet	24"	buona / mediocre	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45".
MCG-2-7-67	gx	02h41m20s	−13°26.2'		Cet	24"	buona / mediocre	molto debole e molto allungata da E a W, di dimensioni 40"×10" e con bulge appena percettibile — 450x.
MCG-2-7-68	gx	02h41m26s	−13°07.7'		Cet	16"	buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline: una più brillante un paio di primi a SW e l'altra più debole a W; meglio visibile a 380x.
MCG-2-7-69	gx	02h41m39s	−12°21.5'		Cet	24"	buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 50"×25" e piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 400x.
MCG-2-7-70	gx	02h42m13s	−09°32.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N; meglio contrastata a 280x.
MCG-2-7-72	gx	02h42m33s	−09°28.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	più facile di 1018, dalla quale dista 7' a SSE, rotonda e con Ø simile; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline a W e NW — 400x.

MCG-2-7-76	gx	02h42m59s	−11°40.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	osservando in visione diretta appare una coppia di stelle distanti una 15-ina di secondi orientate da NW a SE e di luminosità simile; in visione distolta si nota, tuttavia, che la componente di SE presenta a tratti un tenuissimo baffo che protrude verso NE; meglio comunque non superare i 400x, perché a 570x di fatto sparisce.
MCG-2-8-2	gx	02h44m23s	−09°44.3'		Eri	24"	m. buona / scarso	piccola e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso S — 340x.
MCG-2-8-3	gx	02h44m25s	−09°44.2'		Eri	24"	m. buona / scarso	situata a ridosso E di MCG-2-8-2, è molto debole, appena più brillante verso l'interno, ma senza condensazione centrale vera e propria, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina al bordo SW — 340x.
MCG-2-8-4	gx	02h45m08s	−13°14.1'		Eri	24"	m. buona / scarso	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni che in visione distolta appaiono di 80"×20" — 340x.
MCG-2-8-7	gx	02h48m15s	−10°15.1'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 450x.
MCG-2-8-8	gx	02h48m16s	−08°55.8'		Eri	24"	m. buona / scarso	molto diffusa e appena più brillante all'interno, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso S — 340x.
MCG-2-8-9	gx	02h49m10s	−10°40.8'		Eri	24"	buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 280x.
MCG-2-8-10	gx	02h49m40s	−12°15.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30; c'è una stellina brillante a 1.5' NE — 450x.
MCG-2-8-12	gx	02h50m18s	−08°35.8'		Eri	24"	buona / mediocre	è un'elusiva lama di luce orientata da E a W ed estesa per almeno 1.5'; salta fuori in visione distolta a 280x.
MCG-2-8-13	gx	02h51m29s	−13°18.3'		Eri	24"	m. buona / scarso	chiazza di luce circolare molto debole, diffusa e di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un piccolo triangolo rettangolo isoscele a NE formata da una coppia di stelline brillanti e una debole; forse a causa del seeing la gx appare meglio contrastata a 210x.
MCG-2-8-14	gx	02h52m23s	−08°30.6'		Eri	24"	buona / mediocre	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 280x.
MCG-2-8-25	gx	02h55m36s	−09°59.6'		Eri	24"	m. buona / scarso	molto debole e diffusa, con tenue condensazione centrale poco contrastata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MCG-2-8-27	gx	02h55m41s	−10°29.4'		Eri	24"	m. buona / scarso	relativamente facile e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
MCG-2-8-31	gx	02h56m10s	−13°41.3'		Eri	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; poco disturbata dalla SAO 148672 di magnitudo 8.5 situata 3.5' a W — 450x.
MCG-2-8-37	gx	02h59m32s	−13°37.3'		Eri	24"	buona / buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi che aggetta a SE di una stellina brillante; occorre tuttavia tenere fuori campo la SAO 148706 di 7ª grandezza situata 7' a SE — 450x.
MCG-2-8-32	gx	02h56m46s	−11°05.0'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG-2-8-33	gx	02h57m49s	−10°10.0'		Eri	16"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 90"×30" e con tenue bulge diffuso appena più contrastato del disco — 270x.
MCG-2-8-38	gx	03h00m04s	−10°49.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte di un piccolo gruppo di una 15-ina di componenti) — debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-8-39	gx	03h00m31s	−11°24.9'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una coppia di stelle brillanti 1.5' SE; disturbata dalla SAO 148712 situata ad appena 4' SW — 400x.
MCG-2-8-40	gx	03h01m51s	−10°37.2'		Eri	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×40" e con piccolo bulge abbastanza marcato; appare tuttavia meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile a 1' SW.
MCG-2-8-52	gx	03h06m56s	−11°59.0'		Eri	24"	m. buona / scarso	molto debole, orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; in visione distolta sembra dipartirsi a NW da una stellina; una stellina appena percettibile si trova subito a NW della gx — 340x.
MCG-2-9-2	gx	03h08m19s	−13°54.1'		Eri	24"	m. buona / buono	relativamente brillante, compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 400x.
MCG-2-9-3	gx	03h09m09s	−10°17.5'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni che in visione distolta sono di 60"×30" — 400x.
MCG-2-9-5	gx	03h09m33s	−09°49.0'		Eri	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso NE — 450x.
MCG-2-9-6	gx	03h09m52s	−10°03.0'		Eri	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di aspetto ben regolare, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 400x.
MCG-2-9-8	gx	03h10m16s	−10°44.6'		Eri	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG-2-9-13	gx	03h11m34s	−10°36.5'		Eri	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
MCG-2-9-18	gx	03h14m28s	−08°56.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 450x.
MCG-2-9-19	gx	03h15m46s	−12°01.5'		Cet	16"	buona / ottimo	debolissima, solo a tratti appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti 3.5': quella a W è più brillante è poco meglio evidente a 380x.
MCG-2-9-20	gx	03h16m09s	−10°40.4'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 45"×30" — 400x.
MCG-2-9-21	gx	03h16m06s	−13°02.1'		Eri	24"	buona / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, estesa 1' e orientata da N a S; salta fuori a tratti in visione distolta, ma è preferibile scalare a 280x.
MCG-2-9-23	gx	03h17m42s	−13°26.2'		Eri	24"	buona / buono	debole bolla circolare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità uniforme — 400x.
MCG-2-9-24	gx	03h18m42s	−13°37.5'		Eri	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
MCG-2-9-27	gx	03h19m59s	−11°56.8'		Eri	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-9-28	gx	03h19m07s	−11°20.2'		Eri	24"	m. buona / buono	elusivo oggetto di forma indistinta, esteso sì e no una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; salta fuori in visione distolta a 280x (a 400x non sono riuscito a vederla).
MCG-2-9-29	gx	03h19m18s	−12°06.2'		Eri	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40"; meglio contrastata scalando a 280x (appariva, seppur elusivamente, anche nel 16").
MCG-2-9-34	gx	03h21m54s	−12°22.7'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; situata tra una coppia di stelle brillanti a S e la SAO 148919 di 9ª grandezza a N; quest'ultima si trova ad appena 3' NNE dalla gx — 450x.
MCG-2-9-37	gx	03h23m34s	−10°32.6'		Eri	24"	buona / buono	debolissima chiazza forse circolare estesa 30"-40"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG-2-9-38	gx	03h23m38s	−11°11.8'		Eri	16"	ottima / ottimo	è una debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per 1'; c'è una stellina molto debole all'estremità SW — 270x.
MCG-2-9-39	gx	03h24m26s	−11°40.1'		Eri	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" e nucleo stellare appena percettibile — 400x.
MCG-2-9-40	gx	03h25m05s	−12°18.5'		Eri	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa e con tenue bulge appena contrastato, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una coppia di stelline della stessa luminosità distanti 30" a 1.5' N; a 3' SSE si trova invece la SAO 148953 di 10ª grandezza — 450x.
MCG-2-9-41	gx	03h27m21s	−13°44.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG-2-9-43	gx	03h28m50s	−13°48.1'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-10-2	gx	03h33m49s	−10°15.0'		Eri	24"	buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE ed estesa per oltre 1' — 400x.
MCG-2-10-3	gx	03h38m51s	−09°44.2'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-10-4	gx	03h39m21s	−09°37.1'		Eri	24"	m. buona / buono	debole e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG-2-10-7	gx	03h42m00s	−09°36.5'		Eri	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, a tratti poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 2' SSW — 400x.
MCG-2-10-9	gx	03h42m56s	−12°55.0'		Eri	16"	m. buona / m. buono	è una debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa un paio di primi; c'è una stellina brillante a ~ 3' NE — 380x.
MCG-2-10-12	gx	03h48m13s	−12°27.2'		Eri	24"	m. buona / buono	chiazza circolare molto stemperata sul fondo cielo con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una doppia stretta, brillante e sbilanciata a 1' verso S — 450x.
MCG-2-10-13	gx	03h49m32s	−13°53.7'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; la visione è un poco disturbata dalla SAO 149192 di 9ª grandezza situata 3' a E — 450x.
MCG-2-10-14	gx	03h50m57s	−08°30.8'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG-2-10-17	gx	03h52m11s	−09°07.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	pare a prima vista di aspetto simile a NGC 1470 (già osservata col 16" in altra data), ma è in realtà poco più debole e diffusa, nonché più piccola, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" (quelle della NGC sono di 60"×15"); si trova al vertice orientale di un piccolo trapezio formato con 3 deboli stelline — 450x.
MCG-2-10-19	gx	03h53m37s	−09°27.4'		Eri	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, molto allungata da N a S con dimensioni che in visione distolta arrivano a 90"×30" — 450x.
MCG-2-10-20	gx	03h53m38s	−12°20.7'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-10-21	gx	03h54m14s	−08°44.5'		Cet	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ~ 1' di una stellina molto debole; è stranamente meglio visibile a 380x.
MCG-2-11-1	gx	03h55m31s	−09°35.0'		Eri	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con marcata condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile a 1' ENE — 450x.
MCG-2-11-3	gx	03h58m38s	−10°19.4'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a S — 450x.
MCG-2-11-4	gx	04h00m26s	−09°09.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole al bordo NE — 450x.
MCG-2-11-5	gx	04h00m57s	−10°16.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, rotonda con Ø < 40", diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
MCG-2-11-6	gx	04h01m33s	−10°26.3'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina al bordo SE e un'altra poco più brillante quasi a ridosso verso NW — 450x.
MCG-2-11-7	gx	04h02m03s	−09°27.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata scalando a 340x (è situata nello stesso campo della coppia NGC 1504/5).
MCG-2-11-10	gx	04h02m56s	−09°01.4'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø che non sembra superare i 40"; c'è una stellina subito a SW e un'altra poco più debole a 1.5' verso SE; poco meglio definita scalando a 340x.
MCG-2-11-14	gx	04h04m27s	−10°10.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; purtroppo la visione è compromessa dalla SAO 149352 di 7ª grandezza situata 3' a S — 450x.
MCG-2-11-15	gx	04h04m33s	−10°18.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso 40"-45"; appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x, se non altro per limitare i bagliori della SAO 149352 di 7ª grandezza situata 4' a NNW.
MCG-2-11-16	gx	04h07m12s	−10°13.8'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso W — 450x.
MCG-2-11-19	gx	04h08m36s	−10°11.3'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø 30" o poco più — 450x.
MCG-2-11-20	gx	04h08m26s	−13°59.1'		Cet	24"	buona / mediocre	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG-2-11-21	gx	04h09m55s	−10°16.1'		Eri	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, con tenue condensazione centrale poco contrastata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata in mezzo a 2 stelline distanti 3' in direzione NE-SW: quella a NE è debole, mentre l'altra è abbastanza brillante — 450x.
MCG-2-11-22	gx	04h10m47s	−08°59.6'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; allineata ed equidistante con 2 stelline a SE; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-11-23	gx	04h10m50s	−09°37.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, orientata da WNW a ESE con dimensioni 60"×30"; appare meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-11-25	gx	04h12m30s	−13°09.1'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-2-11-26	gx	04h14m01s	−13°23.4'		Eri	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso N; meglio visibile a 380x.
MCG-2-11-28	gx	04h15m46s	−13°29.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con piccolo bulge quasi stellare e Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N (quest'ultima è risultata poi essere la MAC 0415-1328) — 450x.
MCG-2-11-29	gx	04h16m28s	−11°16.8'		Eri	24"	m. buona / discreto	poco più debole di MCG-2-11-32.
MCG-2-11-30	gx	04h16m38s	−12°24.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, con tenue bulge diffuso, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante subito a E; appare meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-11-32	gx	04h17m02s	−11°20.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-11-33	gx	04h17m11s	−13°51.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-11-34	gx	04h17m41s	−12°27.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	poco più piccola di MCG-2-11-30 e di aspetto poco più uniforme, orientata nello stesso modo con dimensioni 40"×20"; anche questa pare meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-11-37	gx	04h18m46s	−14°12.1'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-2-11-38	gx	04h18m54s	−14°11.7'		Eri	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-2-11-39	gx	04h19m16s	−14°06.2'		Eri	24"	m. buona / buono	diffusa, con condensazione centrale piccola ed evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso SE e una brillante a 1.5' NE — 450x.
MCG-2-12-2	gx	04h20m51s	−09°45.8'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
MCG-2-12-3	gx	04h21m02s	−09°44.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40" — 450x.
MCG-2-12-4	gx	04h21m05s	−09°47.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	di aspetto simile a MCG-2-12-2, dalla quale dista 4' a ESE, ma poco più piccola e con nucleo stellare poco contrastato — 450x.
MCG-2-12-5	gx	04h22m01s	−10°10.3'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e con piccolo bulge appena evidente, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a E; a una 30-ina di secondi più a E di quest'ultima ce n'è invece una brillante — 450x.
MCG-2-12-6	gx	04h22m02s	−12°47.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una coppia di stelline a NE — 450x.
MCG-2-12-8	gx	04h22m26s	−10°10.4'		Eri	24"	m. buona / buono	debole e relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-2-12-15	gx	04h26m38s	−10°32.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata dalla SAO 149631 di 8ª grandezza situata 3' a W — 450x.
MCG-2-12-16	gx	04h26m55s	−11°59.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale quasi stellare appena percettibile; c'è un piccolo triangolo di stelline brillanti subito a E — 450x.
MCG-2-12-17	gx	04h27m01s	−12°03.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25" e con piccolo nucleo appena percettibile — 450x.
MCG-2-12-18	gx	04h27m29s	−10°49.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG-2-12-19	gx	04h27m36s	−09°24.2'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 1' scarso e di luminosità uniforme; situata a ridosso di un piccolo triangolo molto allungato: le 2 stelline più luminose, distanti ~ 1', sembrano lambire la galassia, mentre la 3ª, poco più a W, è invece appena percettibile — 450x.
MCG-2-12-20	gx	04h27m40s	−12°35.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una coppia di stelle brillanti a 3.5' SW che disturbano un po' l'osservazione — 450x.
MCG-2-12-21	gx	04h27m45s	−12°02.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e con piccolo bulge abbastanza contrastato, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
MCG-2-12-23	gx	04h28m16s	−12°09.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", con tenue bulge diffuso poco evidente — 450x.
MCG-2-12-24	gx	04h28m45s	−12°30.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di 1' e di luminosità uniforme, situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti 3'; poco meglio definita scalando a 340x.
MCG-2-12-26	gx	04h29m00s	−12°13.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 1' e nucleo stellare molto tenue; la SAO 149673 di magnitudo 9.5 non sembra disturbare gran che — 450x.
MCG-2-12-28	gx	04h29m08s	−12°34.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; appare con difficoltà in quanto situata in una piccola zona depleta — 450x.
MCG-2-12-29	gx	04h29m25s	−10°30.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, disturbata dalla SAO 149676 di 9ª grandezza situata un paio di primi a NNW: in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20"; poco più evidente a 450x ma meglio definita a 340x.
MCG-2-12-30	gx	04h29m47s	−12°30.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, rotonda con Ø di 1' scarso e tenue condensazione centrale — 450x.
MCG-2-12-33	gx	04h31m40s	−11°42.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, solo a momenti appare leggermente più brillante all'interno, approssim. circolare con Ø di ~ 45" — 450x.
MCG-2-12-35	gx	04h31m44s	−12°40.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole lama di luce orientata da E a W, estesa per ~ 1' e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelline a ridosso verso NW e un'altra stellina a NNE — 450x.
MCG-2-12-36	gx	04h32m10s	−12°41.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-12-37	gx	04h32m57s	−12°46.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso E — 450x.
MCG-2-12-38	gx	04h33m01s	−10°48.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 149725 di 6ª grandezza situata 5' a ENE e, in misura minore, dalla SAO 149724 di magnitudo 8.6 a 4' ESE; è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi diffusa e di luminosità uniforme; c'è una doppia stellina stretta e sbilanciata a 1' SSE — 450x.
MCG-2-12-39	gx	04h33m38s	−13°15.7'		Eri	16"	ottima / buono	debole, poco diffusa e poco più luminosa all'interno, rotonda con Ø di 1' — 380x.
MCG-2-12-41	gx	04h33m52s	−11°42.2'		Cet	16"	ottima / buono	in visione distolta appare piuttosto estesa e molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×30" e con piccola condensazione centrale abbastanza contrastata; è disturbata dalla SAO 149727 di 9ª grandezza situata ad appena 3' NW — 380x.
MCG-2-12-42	gx	04h35m03s	−14°13.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	dovrebbe presentare un nucleo stellare molto debole circonfuso da un tenuissimo alone molto diffuso e di forma indistinta; appare comunque solo in visione distolta a 340x.
MCG-2-12-43	gx	04h35m11s	−13°14.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-2-12-44	gx	04h35m37s	−11°42.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S (quest'ultima è la componente più debole di un piccolo quadrilatero irregolare situato a S della gx — 450x.
MCG-2-12-45	gx	04h36m22s	−10°22.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge evidente — 450x.
MCG-2-12-46	gx	04h36m25s	−09°30.8'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da N a S ed estesa 1' scarso; c'è una stellina a 1' S — 450x.
MCG-2-12-48	gx	04h37m50s	−12°26.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' verso NE (ossia sul prolungamento dell'asse maggiore della gx) — 450x.
MCG-2-12-50	gx	04h38m14s	−10°47.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità un po' irregolare, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-2-12-52	gx	04h39m33s	−09°03.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-12-53	gx	04h39m46s	−13°16.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di forma indistinta, estesa forse 1', appare solo a momenti in visione distolta ma occorre scalare a 340x.
MCG-2-12-54	gx	04h39m58s	−08°55.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-2-12-55	gx	04h40m12s	−13°13.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-12-56	gx	04h40m25s	−13°13.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e spampanata, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di 1' scarso; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-12-58	gx	04h42m59s	−12°46.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-13-1	gx	04h46m03s	−12°26.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-13-5	gx	04h46m56s	−14°51.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo NW — 450x.
MCG-2-13-6	gx	04h47m21s	−10°14.2'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con bulge di aspetto quasi stellare ben evidente — 450x.
MCG-2-13-7	gx	04h47m41s	−10°14.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina a ridosso verso NW — 450x.
MCG-2-13-8	gx	04h47m48s	−10°14.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione centrale quasi stellare — 450x.
MCG-2-13-9	gx	04h48m13s	−13°40.0'		Eri	16"	ottima / buono	rotonda, diffusa, con tenue condensazione centrale e Ø di 45"; c'è una coppia serrata di stelline quasi a ridosso verso NE — 380x.
MCG-2-13-10	gx	04h48m48s	−14°22.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e con nucleo stellare, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso N — 450x.
MCG-2-13-12	gx	04h49m43s	−10°42.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' e un piccolo bulge contrastato — 450x.
MCG-2-13-13	gx	04h49m54s	−10°45.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-2-13-14	gx	04h50m33s	−11°25.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40", ma è meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-13-16	gx	04h51m34s	−14°33.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata dalla SAO 149938 di 8ª grandezza situata un paio di primi a S — 450x.
MCG-2-13-19	gx	04h54m39s	−12°12.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
MCG-2-13-20	gx	04h54m46s	−10°16.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione stellare evidente — 450x.
MCG-2-13-21	gx	04h55m05s	−10°41.4'		Eri	16"	ottima / buono	è un debole fuso che in visione distolta appare molto allungato da NE a SW con dimensioni 90"×30" e appena più brillante all'interno; ci sono 2 stelline a ridosso della gx: una all'estremità SW e l'altra a N — 380x.
MCG-2-13-22	gx	04h55m07s	−12°05.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da N a S con dimensioni 60"×40" — 450x.
MCG-2-13-23	gx	04h55m15s	−12°09.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di oltre 1'; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-13-24	gx	04h56m37s	−10°13.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge abbastanza evidente; c'è una debole stellina a ridosso verso SW — 450x.
MCG-2-13-25	gx	04h56m46s	−10°35.6'		Eri	16"	ottima / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da NNE a SSW con dimensioni ~ 60"×30"; bisogna però scalare a 380x.
MCG-2-13-31	gx	04h59m41s	−11°16.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa almeno 1'; poco meglio evidente scalando a 340x.
MCG-2-13-32	gx	04h59m53s	−12°02.2'		Eri	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di 45"; a 450x appare a tratti debolmente screziata; c'è una debole stellina a poco più di 1' NNW e un'altra brillante alla stessa distanza dalla parte opposta.
MCG-2-13-33	gx	04h59m49s	−12°27.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma disturbata dalla 64 Eridani di 5ª grandezza situata 5.5' a SSE e che si fatica a tenere fuori campo; a 450x appare diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme.
MCG-2-13-34	gx	05h00m19s	−12°41.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	in visione distolta appare come una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa per ~ 1.5'; c'è una debole stellina al bordo occidentale — 450x.
MCG-2-13-35	gx	05h00m12s	−13°46.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e diffusa, di aspetto un po' irregolare, grosso modo rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' scarso verso E (la quale fa parte di un piccolo triangolo equilatero) — 450x.
MCG-2-13-36	gx	05h01m02s	−08°57.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 30"×15"; si trova quasi nel mezzo di 2 stelline situate a W e a SE — 450x.
MCG-2-13-37	gx	05h00m55s	−13°25.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccolo nucleo stellare; c'è una stellina a 1.5' SW; è purtroppo difficile tenere fuori campo una doppia molto brillante situata ad appena 6' verso SW — 450x.
MCG-2-13-38	gx	05h12m19s	−10°21.4'		Eri	16"	ottima / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 70"×30" — 380x.
MCG-2-13-39	gx	05h02m32s	−12°22.9'		Lep	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina evidente al bordo E e un'altra più debole e poco più distante a SE — 450x.
MCG-2-14-2	gx	05h10m04s	−14°55.8'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-14-3	gx	05h11m08s	−09°23.3'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con tenue bulge appena percettibile, molto allungata da E a W con dimensioni 90"×20"; si osserva abbastanza facilmente malgrado la presenza della SAO 131851 di 9ª grandezza situata 1' scarso a S — 450x.
MCG-2-14-6	gx	05h13m03s	−09°12.6'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce di luminosità uniforme orientata ~ da N a S ed estesa per almeno 1' — 450x.
MCG-2-14-7	gx	05h13m43s	−12°45.6'		Lep	24"	m. buona / buono	chiazza molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina subito a W; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-14-9	gx	05h16m21s	−10°33.7'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza molto diffusa e di aspetto indistinto a causa di alcune stelline sovrapposte: la più brillante si trova a ridosso S del nucleo stellare della gx; 3 deboli stelline poste ad arco si trovano a ridosso N: quella in mezzo è la più evidente; quella più a W è appena percettibile — 450x.
MCG-2-14-10	gx	05h16m21s	−13°28.2'		Lep	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×20" — 450x.
MCG-2-14-11	gx	05h16m46s	−12°21.0'		Lep	24"	m. buona / buono	poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
MCG-2-14-12	gx	05h18m38s	−14°09.0'		Lep	24"	m. buona / m. buono	baffo molto tenue esteso una 20-ina di secondi o poco più che aggetta a NE da una stellina brillante che disturba un po' l'osservazione; poco più in là, sempre verso NE, c'è invece una stellina molto debole — 450x.
MCG-2-14-15	gx	05h23m15s	−11°25.5'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20"; è orientata come le due stelline brillanti situate a S e a E (situata 11' a NE della coppia interagente NGC 1888-9 osservata col 16" in altra data) — 450x.
MCG-2-14-16	gx	05h24m55s	−12°41.3'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 90"×20" — 450x.
MCG-2-15-1	gx	05h31m40s	−10°23.6'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 90"×30" — 450x.
MCG-2-15-4	gx	05h33m50s	−13°21.3'		Lep	24"	m. buona / buono	rotonda con Ø < 30", diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
MCG-2-15-5	gx	05h33m50s	−13°20.0'		Lep	24"	m. buona / buono	situata a poco più di 1' N della precedente è anch'essa diffusa, di luminosità uniforme, ma più estesa, orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-2-15-6	gx	05h34m56s	−10°01.3'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per ~ 1' osservabile solamente in visione distolta; c'è una stellina subito a N — 450x.
MCG-2-15-9	gx	05h40m53s	−13°48.2'		Lep	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza diffusa, di forma indistinta situata all'interno di un piccolo triangolo equilatero di stelline di luminosità decrescente (quella a N è la più evidente, quella a SW la più debole); appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MCG-2-15-10	gx	05h41m08s	−12°59.3'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' E e un'altra più o meno alla stessa distanza verso SE; la visione è un po' disturbata dalla SAO 150690 di 10ª grandezza situata un paio di primi a SW — 450x.
MCG-2-15-12	gx	05h51m06s	−14°51.4'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile subito a S — 450x.
MCG-2-15-13	gx	05h52m12s	−14°06.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
MCG-2-21-1	gx	07h57m59s	−14°17.0'		Pup	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di aspetto un po' irregolare; all'interno risalta leggermente una zona poco più brillante, orientata da E a W con dimensioni 30"×15" circonfusa da un alone molto stemperato sul fondo cielo; c'è una stellina a ridosso E e un'altra più debole a W — 450x.
MCG-2-22-3	gx	08h21m33s	−13°21.0'		Pup	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e leggermente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso SW, mentre una brillante si trova a meno di 1' verso W — 450x.
MCG-2-22-5	gx	08h22m29s	−11°25.0'		Pup	24"	m. buona / scarso	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina brillante centrata sulla galassia, ma spostata verso E — 340x.
MCG-2-22-6	gx	08h23m20s	−15°01.0'		Pup	24"	m. buona / scarso	poco allungata da E a W, dimensioni 40"×30" e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SE; un'altra stellina poco più brillante si trova a NW — 340x.
MCG-2-22-7	gx	08h23m26s	−15°09.6'		Pup	24"	m. buona / scarso	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; salta fuori facilmente in visione distolta un paio di primi a N di una stellina abbastanza brillante — 340x.
MCG-2-22-8	gx	08h23m36s	−15°02.2'		Pup	24"	m. buona / scarso	relativamente brillante e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso; è situata tra 2 stelline di cui una quasi a ridosso verso N — 340x.
MCG-2-22-9	gx	08h24m16s	−14°30.1'		Pup	24"	ottima / ottimo	è un'elusiva lama di luce che appare solo ogni tanto spingendo a 580x; sembra quasi aggettare da una stellina situata quasi a ridosso verso SE; sono riuscito a intravederla solo grazie alle ottime condizioni di visibilità che mostravano stelle puntiformi anche molto basse sull'orizzonte.
MCG-2-22-11	gx	08h25m53s	−13°30.6'		Pup	24"	m. buona / scarso	diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso S — 340x.
MCG-2-22-13	gx	08h25m59s	−13°53.2'		Pup	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore diffuso, a tratti condensato, grosso modo rotondo con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una doppia stretta a ridosso NE; meglio definita a 450x.
MCG-2-22-17	gx	08h27m34s	−12°45.3'		Pup	16"	ottima / m. buono	debolissimo lucore rotondo di luminosità uniforme e Ø di ~ 1', con una stellina abbastanza brillante al bordo NE; appare più facilmente in visione distolta a 188x.
MCG-2-22-21	gx	08h34m06s	−12°26.8'		Hya	24"	m. buona / scarso	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 340x.
MCG-2-22-23	gx	08h38m01s	−09°49.1'		Hya	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una piccola stringa di 3 stelline quasi allineate a SE — 450x.
MCG-2-22-24	gx	08h38m46s	−14°40.9'		Hya	24"	m. buona / scarso	relativamente compatta, con nucleo stellare abbastanza evidente, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 340x.
MCG-2-22-25	gx	08h39m05s	−14°44.4'		Hya	24"	m. buona / scarso	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 340x.
MCG-2-22-26	gx	08h42m11s	−13°51.5'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-2-22-27	gx	08h43m04s	−11°28.3'		Hya	16"	ottima / m. buono	debolissimo chiarore rotondo di una 30-ina di secondi di Ø situato a ridosso NW di una stellina brillante — 380x.
MCG-2-23-5	gx	08h48m24s	−13°15.3'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso NW — 450x.
MCG-2-23-6	gx	08h51m45s	−14°54.2'		Hya	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG-2-23-7	gx	08h59m25s	−11°50.6'		Hya	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo e debolissimo oggetto rotondo appena condensato, di max 30" di Ø e situato tra 2 stelline distanti > 1' e orientate da N a S — 380x.
MCG-2-23-8	gx	08h42m11s	−13°51.5'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; situata tra una stellina brillante a NE e una debole a SW — 450x.
MCG-2-24-1	gx	09h11m20s	−15°02.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; c'è una stellina a NW che fa parte di un piccolo trapezio.
MCG-2-24-3	gx	09h12m07s	−15°25.9'		Hya	16"	m. buona / ottimo	debolissima e indistinta, di dimensioni non superiore a 30"; appare in visione distolta tra 2 stelline orientate da N a S, ma occorre spingere a 380x.
MCG-2-24-4	gx	09h15m36s	−13°37.8'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
MCG-2-24-5	gx	09h15m56s	−13°58.9'		Hya	24"	m. buona / m. buono	debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' verso W — 450x.
MCG-2-24-6	gx	09h17m41s	−14°29.9'		Hya	24"	ottima / buono	molto debole, appare solo in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso W.
MCG-2-24-7	gx	09h19m06s	−12°05.7'		Hya	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo e diffuso, solo a tratti condensato e con Ø di 20"; forma un piccolo triangolo con 2 stelline, una a W e l'altra a SW — 380x.
MCG-2-24-8	gx	09h18m31s	−12°59.5'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce orientato da NW a SE ed esteso una 40-ina di secondi; è molto disturbato da una stellina brillante situata a ridosso S — 450x.
MCG-2-24-9	gx	09h18m38s	−11°44.0'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
MCG-2-24-11	gx	09h19m49s	−12°14.8'		Hya	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza estesa non più di 30" che in visione distolta appare a tratti subito a N di una stellina; un'altra stellina, ma appena diffusa, salta fuori elusivamente a ridosso verso N: da un controllo successivamente effettuato, quest'ultima è risultata essere la MAC 0919-1214 — 450x.
MCG-2-24-12	gx	09h20m39s	−12°36.2'		Hya	24"	m. buona / scarso	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø non superiore a 30"; c'è una stellina a ridosso verso S; molto disturbata da una coppia di stelle brillanti di 10a: la SAO 155107 a 1' SE e la SAO 155112 a 4' NE — 340x.
MCG-2-24-13	gx	09h20m55s	−09°43.6'		Hya	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-2-24-17	gx	09h22m07s	−09°45.0'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a S — 450x.
MCG-2-24-27	gx	09h28m59s	−14°48.5'		Hya	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di 25"-30" di Ø; c'è una doppia stretta al margine SW — 380x.
MCG-2-24-28	gx	09h30m36s	−12°02.0'		Hya	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (o poco più) — 450x.
MCG-2-24-29	gx	09h30m58s	−12°41.8'		Hya	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 30"×10" e con nucleo di aspetto quasi stellare poco contrastato — 450x.

MCG-2-25-1	gx	09h31m34s	−13°02.6'		Hya	24"	m. buona / scarso	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella brillante ad appena 1' SSE — 340x.
MCG-2-25-2	gx	09h33m43s	−11°19.3'		Hya	24"	m. buona / scarso	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 80"×20"; è situata all'interno di un piccolo asterismo fatto ad aquilone: la stellina più a S di trova praticamente a ridosso della gx — 340x.
MCG-2-25-3	gx	09h34m07s	−15°18.3'		Hya	24"	ottima / buono	chiazza molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; è situata in mezzo a due stelline: una abbastanza brillante a NW e l'altra debole a SE; una 3ª stellina si trova al bordo S: queste ultime due fanno parte di un piccolo triangolo equilatero a S della gx — 450x.
MCG-2-25-5	gx	09h36m14s	−10°58.5'		Hya	24"	m. buona / buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina al bordo E — 450x.
MCG-2-25-7	gx	09h36m40s	−09°53.8'		Hya	24"	ottima / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; a tratti appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo 45"×15"; la visione è in parte disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a W.
MCG-2-25-8	gx	09h37m47s	−10°58.5'		Hya	24"	m. buona / buono	poco più evidente e con bulge diffuso leggermente più contrastato del disco, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
MCG-2-25-9	gx	09h37m54s	−11°40.2'		Hya	24"	ottima / buono	debolissima chiazza grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; è osservabile in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
MCG-2-25-10	gx	09h39m39s	−13°24.4'		Hya	24"	m. buona / scarso	piccola, relativamente compatta e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata a ridosso verso S di una coppia ravvicinata di stelline — 340x.
MCG-2-25-11	gx	09h39m46s	−11°20.7'		Hya	24"	m. buona / buono	è di aspetto un po' confuso, appena più brillante all'interno e con una stellina brillante al bordo orientale che infastidisce; grosso modo orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-2-25-13	gx	09h43m18s	−09°56.8'		Sex	16"	m. buona / scarso	debolissima e molto diffusa, appare poco più contrastata scalando a 188x; è molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline della stessa luminosità a W.
MCG-2-25-16	gx	09h46m16s	−12°06.0'		Hya	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40"-45"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S (la quale fa parte di un vistoso asterismo di 10 stelle grosso modo ellittico e orientato da NE a SW) — 450x.
MCG-2-25-17	gx	09h46m42s	−14°51.7'		Hya	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e solo a tratti poco più brillante all'interno, rotonda con Ø 45" — 450x.
MCG-2-25-19	gx	09h49m57s	−12°05.8'		Hya	24"	m. buona / scarso	debolissima, solo in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MCG-2-25-20	gx	09h50m14s	−12°03.4'		Hya	24"	m. buona / scarso	è una lama di luce molto debole, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa per almeno 1'; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso NW — 450x.
MCG-2-25-23	gx	09h51m22s	−12°37.4'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina evidente al bordo orientale — 450x.
MCG-2-25-24	gx	09h51m34s	−12°59.8'		Hya	24"	ottima / buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme situata a ridosso N di una stellina; in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30", ma è meglio scalare a 340x.
MCG-2-25-25	gx	09h51m40s	−13°42.7'		Hya	16"	m. buona / m. buono	debole chiazza diffusa e rotondeggiante, di luminosità uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a > 1' NNE; è situata appena all'esterno (verso N) di un triangolo di stelle brillanti — 380x.
MCG-2-26-1	gx	09h55m27s	−13°47.8'		Hya	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-2-26-2	gx	09h55m57s	−13°45.2'		Hya	16"	m. buona / m. buono	è un'elusiva macchiolina che appare in visione distolta, solo a tratti poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 270x.
MCG-2-26-3	gx	09h56m16s	−12°58.2'		Hya	16"	ottima / ottimo	assieme a **MCG-2-26-4** forma una coppia di gx molto deboli, poco diffuse e situate a ridosso di una stellina brillante; la 1ª è debolissima, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme; la 2ª è poco più evidente, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e si trova quasi a S della suddetta stella — 380x.
MCG-2-26-4	gx	09h56m18s	−12°58.3'		Hya	16"	ottima / ottimo	v. **MCG-2-26-3**
MCG-2-26-8	gx	09h57m34s	−13°51.0'		Hya	16"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori solo in visione distolta a 270x; appare rotonda con Ø di 25" o 30".
MCG-2-26-9	gx	09h57m48s	−13°35.5'		Hya	24"	m. buona / mediocre	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1.5' SW.
MCG-2-26-10	gx	09h59m30s	−12°27.3'		Hya	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza rotonda di ~ 40" di Ø, diffusa e di luminosità uniforme, salvo una nucleo stellare che però appare solo a tratti a 380x.
MCG-2-26-12	gx	10h00m35s	−14°56.8'		Hya	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~45"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-26-14	gx	10h01m02s	−15°21.8'		Hya	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza rotonda molto diffusa, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina a 1' verso SW; meglio visibile a 270x.
MCG-2-26-15	gx	10h01m31s	−15°10.6'		Hya	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia stretta con MCG-2-26-16, ma si sdoppiano abbastanza facilmente a 450x (a 340x tendono ancora a fondersi in un unico oggetto di aspetto un po' irregolare); la 1ª è più facile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e condensata; la 2ª appare meglio in visione distolta, come una debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa 1'.
MCG-2-26-16	gx	10h01m31s	−15°10.4'		Hya	24"	m. buona / mediocre	v. **MCG-2-26-15**
MCG-2-26-17	gx	10h01m34s	−13°31.6'		Hya	24"	m. buona / mediocre	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata all'incirca da E a W ed estesa 1'; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso NE e un'altra della stessa luminosità a poco più di 1' SE — 450x.
MCG-2-26-18	gx	10h01m36s	−13°40.0'		Hya	24"	mediocre / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un piccolo trapezio di deboli stelline a 3' W.
MCG-2-26-19	gx	10h02m00s	−15°14.0'		Hya	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (appariva elusivamente anche nel 16" a 380x in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
MCG-2-26-20	gx	10h02m01s	−15°16.9'		Hya	16"	ottima / ottimo	più debole di MCG-2-26-21 (osservata per prima) e molto più "spampanata"; è rotonda con Ø di 45" e con piccola condensazione centrale — 380x.
MCG-2-26-21	gx	10h02m16s	−15°17.9'		Hya	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme e di ~ 30" di Ø — 380x.
MCG-2-26-22	gx	10h02m23s	−10°49.1'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-2-26-24	gx	10h03m01s	−15°21.7'		Hya	24"	mediocre / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
MCG-2-26-25	gx	10h03m07s	−15°18.5'		Hya	24"	mediocre / ottimo	poco più facile di MCG-2-26-24, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensata — 450x.
MCG-2-26-26	gx	10h03m07s	−15°29.7'		Hya	24"	mediocre / ottimo	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, estesa per 1' scarso e orientata da E a W; appare in visione distolta a 1' S di MCG-2-26-25 — 450x.
MCG-2-26-27	gx	10h03m17s	−14°56.7'		Hya	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W, con dimensioni che in visione distolta appaiono di ~ 60"×30" e di luminosità uniforme; è meglio osservabile a 270x.
MCG-2-26-28	gx	10h03m37s	−15°06.8'		Hya	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; meglio visibile scalando a 270x.
MCG-2-26-31	gx	10h09m03s	−11°14.0'		Hya	16"	m. buona / m. buono	allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", poco diffusa e leggermente più brillante all'interno con nucleo stellare; c'è una coppia di stelline brillanti 3' a N — 380x.
MCG-2-26-38	gx	10h10m43s	−15°30.5'		Hya	16"	m. buona / scarso	è una debolissima galassietta poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20", situata a ridosso verso N di un triangolo rettangolo di stelline brillanti — 270x.
MCG-2-26-39	gx	10h11m08s	−13°46.9'		Hya	24"	mediocre / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-26-40	gx	10h14m41s	−09°56.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-26-41	gx	10h15m13s	−15°05.6'		Hya	16"	m. buona / scarso	debolissima chiazza rotonda molto diffusa, con Ø di 1' e di luminosità uniforme; si trova al vertice occidentale di un piccolo triangolo isoscele rettangolo formato con 2 stelline e i cui cateti misurano ~ 2.5' — 270x.
MCG-2-26-42	gx	10h18m23s	−13°06.2'		Hya	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, diffusa e con tenue condensazione centrale poco contrastata, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-2-27-2	gx	10h25m50s	−11°26.0'		Sex	16"	ottima / ottimo	assieme a MCG-2-27-3 forma una coppia di debolissime gx che nondimeno si sdoppiano facilmente a 380x; sono distanti ~ 1' in direzione N-S; sono entrambe rotonde con Ø di una 30-ina di secondi; la 2ª è poco più evidente e presenta una condensazione centrale molto tenue.
MCG-2-27-3	gx	10h25m49s	−11°25.5'		Sex	16"	ottima / ottimo	v. **MCG-2-27-2**
MCG-2-27-4	gx	10h27m34s	−10°43.2'		Sex	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
MCG-2-27-9	gx	10h35m27s	−14°07.8'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 90"×30", con bulge abbastanza evidente anche se poco contrastato; c'è una stellina a 1.5' verso E — 450x.
MCG-2-28-2	gx	10h43m35s	−10°09.4'		Sex	16"	ottima / ottimo	debolissima, quasi elusiva; a tratti, in visione distolta, mi sembra orientata da NW a SE (ossia come la congiungente delle 2 coppie di stelline situate 5' a E e 5' a N con le quali la gx forma un triangolo equilatero) con dimensioni vagamente di 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile un paio di primi a S — 270x.
MCG-2-28-6	gx	10h45m11s	−10°03.9'		Sex	16"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda, di ~ 1' di Ø e con tenue condensazione centrale diffusa osservabile a 270x; c'è una stellina a 1' verso SW — 270x.
MCG-2-28-7	gx	10h45m59s	−12°22.3'		Hya	24"	ottima / buono	debolissima chiazza diffusa, a prima vista di forma indistinta, a tratti grosso modo circolare con Ø < 1'; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-28-9	gx	10h50m00s	−14°45.0'		Hya	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva — sono due galassiette molto deboli, poco diffuse e di luminosità uniforme; la 1a è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' S che fa parte di un triangolo isoscele aperto; la 2a è un baffo di luce esteso una 40-ina di secondi, situato sul lato orientale del triangolo e orientato come questo — 450x.
MCG-2-28-10	gx	10h50m03s	−14°45.0'		Hya	24"	ottima / buono	v. **MCG-2-28-9**
MCG-2-28-14	gx	10h51m00s	−10°25.4'		Sex	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e con condensazione centrale molto tenue visibile solo a momenti, rotonda con Ø > 30" — 450x.
MCG-2-28-17	gx	10h53m10s	−10°31.5'		Crt	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-28-20	gx	10h54m18s	−11°16.9'		Crt	24"	m. buona / mediocre	debolissima, rotonda con Ø di 45"-50" e di luminosità uniforme; sembra stranamente meglio evidente a 450x.
MCG-2-28-21	gx	10h55m49s	−09°51.6'		Crt	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e con basso brillante di luce, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-28-22	gx	10h56m21s	−15°52.3'		Crt	16"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza rotonda di una 40-ina di secondi di Ø, molto diffusa e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 270x.
MCG-2-28-26	gx	10h58m41s	−15°31.6'		Crt	16"	m. buona / m. buono	di vede un piccolo nucleo circonfuso da un alone molto tenue di forma indistinta; forse rotonda con Ø di 30"-35" — 380x.
MCG-2-28-29	gx	10h59m16s	−09°47.7'		Crt	24"	m. buona / mediocre	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 60"×45".
MCG-2-28-30	gx	10h59m16s	−09°49.0'		Crt	24"	m. buona / mediocre	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare — 450x.
MCG-2-28-31	gx	10h59m38s	−15°31.6'		Crt	24"	buona / buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme che in visione distolta pare estendersi per ~ 1.5' in direzione E-W; c'è una stella abbastanza brillante a E e un'altra più debole a N — 340x.
MCG-2-28-32	gx	11h00m24s	−09°59.0'		Crt	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20" o poco superiori; la visione è disturbata dalla SAO 137936 di 7ª grandezza situata 2.5' a N — 450x.
MCG-2-28-33	gx	11h00m35s	−14°05.1'		Crt	24"	m. buona / m. buono	assieme a MCG-2-28-34 forma una coppia di debolissime macchioline che si separano a fatica a 400x (ho dovuto ripiegare su un oculare con campo più stretto per limitare l'abbagliamento prodotto dalla SAO 156382, una brillante stella arancione di 6ª grandezza situata 5.5' a W); sono a ridosso l'uno dell'altro e non sono più estesi di 15"; in visione distolta appaiono ovviamente più brillanti, ma tendono a fondersi in un'unica macchia.
MCG-2-28-34	gx	11h00m36s	−14°05.1'		Crt	24"	m. buona / m. buono	v. **MCG-2-28-33**
MCG-2-28-35	gx	11h00m45s	−14°03.3'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-2-28-36	gx	11h01m00s	−14°02.3'		Crt	24"	m. buona / m. buono	poco più evidente di MCG-2-28-35 , di Ø appena superiore e con piccola condensazione centrale abbastanza contrastata — 450x.
MCG-2-28-37	gx	11h00m44s	−14°11.2'		Crt	24"	m. buona / m. buono	di aspetto simile a MCG-2-28-36 , ma con condensazione centrale ancora più evidente, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-2-28-38	gx	11h01m16s	−13°33.6'		Crt	16"	m. buona / m. buono	è un tenuissimo alone di forma vagamente circolare di una 40-ina di secondi di Ø che circonda una stellina brillante — 270x.
MCG-2-28-42	gx	11h03m13s	−15°19.7'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione stellare visibile a tratti — 450x.
MCG-2-28-43	gx	11h04m28s	−09°47.4'		Crt	16"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; appare meglio contrastata a 270x.
MCG-2-28-44	gx	11h05m34s	−09°50.5'		Crt	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MCG-2-28-45	gx	11h05m39s	−09°55.5'		Crt	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, con piccolo nucleo evidente e contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo W — 450x.
MCG-2-28-46	gx	11h05m43s	−09°55.0'		Crt	16"	m. buona / m. buono	debolissimo e piccolo oggetto rotondo di max 15" di Ø che a 380x salta fuori in visione distolta a ~ 40" S di una stellina.
MCG-2-28-47	gx	11h05m35s	−15°32.3'		Crt	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; allineata con 2 stelline abbastanza brillanti a WSW; una stellina appena percettibile si trova a 1' NW — 450x.
MCG-2-28-48	gx	11h05m51s	−09°55.5'		Crt	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso poco contrastato; una sorta di elusiva protuberanza che appare a S della gx è la **MAC 1105-0955** — 450x.
MCG-2-29-1	gx	11h08m01s	−12°26.8'		Crt	16"	m. buona / m. buono	è un'elusiva e piccola lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; appare solo a tratti in visione distolta, ma è preferibile scalare a 270x.
MCG-2-29-3	gx	11h08m32s	−10°29.5'		Crt	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø forse > 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
MCG-2-29-5	gx	11h08m47s	−14°35.1'		Crt	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, presenta una sorta di barra centrale abbastanza brillante, orientata da NE a SW circonfusa da un disco che in visione distolta appare di dimensioni 40"×30"; c'è una stellina brillante a 1.5' SE — 450x.
MCG-2-29-8	gx	11h10m46s	−15°44.4'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; allineata ed equidistante con 2 stelline a SE: una si trova praticamente a ridosso della gx — 450x.
MCG-2-29-13	gx	11h14m08s	−14°42.3'		Crt	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
MCG-2-29-14	gx	11h15m17s	−13°44.0'		Crt	16"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 270x.
MCG-2-29-16	gx	11h17m17s	−14°31.4'		Crt	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con condensazione centrale evidente ma poco contrastata; c'è una stellina al bordo N; un'altra stellina poco più brillante si trova a 1' sempre verso N — 450x.
MCG-2-29-18	gx	11h19m21s	−09°51.7'		Crt	16"	m. buona / m. buono	è una chiazza elusiva che appare con gran difficoltà in visione distolta, estesa 30" o 40", ma bisogna spingere a 380x; c'è una stellina evidente quasi a ridosso verso SW.
MCG-2-29-27	gx	11h24m53s	−13°34.3'		Crt	24"	m. buona / mediocre	molto debole e stemperata sul fondo cielo, allungata da NW a SE con dimensioni 80"×40"; c'è una stellina a ridosso N; 3 stelline abbastanza brillanti allineate in direzione N-S si trovano a NE della gx; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-29-29	gx	11h25m37s	−11°08.4'		Crt	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante e compatta, con nucleo di aspetto stellare, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata all'interno, verso S, di un asterismo formato da 6 stelle, 5 delle quali brillanti — 450x.
MCG-2-29-31	gx	11h27m23s	−10°57.1'		Crt	16"	m. buona / ottimo	è una galassietta elusiva, estesa non più di 30"; appare solo a tratti in visione distolta, ma si riesce a "catturare" meglio scalando a 188x.
MCG-2-29-34	gx	11h28m43s	−14°07.2'		Crt	24"	buona / ottimo	debole, diffusa, con piccola condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina subito a E e un'altra poco più brillante a a oltre 1' verso NNE — 450x.
MCG-2-29-39	gx	11h30m45s	−15°17.3'		Crt	24"	m. buona / scarso	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 60"×50" — 340x.
MCG-2-30-1	gx	11h32m26s	−09°48.9'		Crt	24"	m. buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; è disturbata da un asterismo di stelle brillanti di forma triangolare — 340x.
MCG-2-30-3	gx	11h33m10s	−10°13.7'		Crt	24"	m. buona / buono	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa per 1' — 450x.
MCG-2-30-7	gx	11h35m45s	−15°42.3'		Crt	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-30-11	gx	11h38m20s	−13°03.0'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø 45"; non è purtroppo possibile scalare a 340x, perché il campo viene disturbato dalla SAO 156801 di magnitudo 5.5 — 450x.
MCG-2-30-16	gx	11h42m12s	−10°46.5'		Crt	24"	m. buona / scarso	debole, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — 340x.
MCG-2-30-18	gx	11h43m09s	−12°51.8'		Crt	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa 1' — 450x.
MCG-2-30-19	gx	11h43m15s	−11°35.5'		Crt	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e con bassissimo gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso NW — 450x.
MCG-2-30-21	gx	11h43m13s	−12°45.8'		Crt	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce molto disturbata dalla SAO 156848 di magnitudo 9.7 e situata 1' scarso a S; è orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-2-30-22	gx	11h43m20s	−11°40.2'		Crt	24"	buona / ottimo	debolissima e di aspetto un po' confuso, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare in visione distolta a 450x quasi a ridosso SE di una stellina.
MCG-2-30-24	gx	11h43m22s	−12°53.2'		Crt	24"	m. buona / m. buono	diffusa e relativamente facile, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG-2-30-28	gx	11h45m25s	−10°03.7'		Crt	24"	m. buona / scarso	debole e molto diffusa, appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 340x.
MCG-2-30-31	gx	11h48m19s	−11°38.9'		Crt	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-30-32	gx	11h50m13s	−12°56.9'		Crt	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" e solo a momenti appena più brillante all'interno — 450x.
MCG-2-30-34	gx	11h50m45s	−12°44.0'		Crt	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è la SAO 156929 di magnitudo 9.4 a 2.5' NW, ma non sembra dare particolare fastidio — 340x.
MCG-2-31-3	gx	11h57m10s	−14°16.6'		Crt	24"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 40-20; meglio a 340x, in quanto a 450x il campo oculare è praticamente depleto.
MCG-2-31-17	gx	12h06m51s	−11°05.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è una debole lama di luce orientata da NNE a SSW (come le 2 coppie di stelline brillanti situate una dozzina di primi a E) e di luminosità uniforme; in visione distolta sembra estesa almeno 1.5'; tuttavia appare meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-31-19	gx	12h07m38s	−14°58.1'		Crv	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa e con piccolo nucleo abbastanza contrastato, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-2-31-19A	gx	12h08m15s	−15°43.0'		Crv	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-2-31-22	gx	12h13m35s	−13°11.9'		Crv	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale abbastanza contrastata; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S — 450x.
MCG-2-32-5	gx	12h20m45s	−13°48.3'		Crv	24"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 450x.
MCG-2-32-6	gx	12h21m44s	−12°28.4'		Crv	24"	m. buona / m. buono	debole, compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG-2-32-17	gx	12h35m51s	−13°05.4'		Crv	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15" — 450x.
MCG-2-32-23	gx	12h41m24s	−12°36.9'		Crv	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×30" — 450x.
MCG-2-32-26	gx	12h42m49s	−12°23.4'		Crv	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-33-3	gx	12h45m41s	−10°43.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante e compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente — 450x.
MCG-2-33-4	gx	12h45m44s	−10°50.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale molto tenue, osservabile solo a momenti — 450x.
MCG-2-33-6	gx	12h46m15s	−13°21.7'		Crv	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa, orientata da E a W con dimensioni 60"×40" e di luminosità uniforme — 340x.
MCG-2-33-10A	gx	12h48m10s	−10°11.2'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole e con nucleo stellare, appare a momenti orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-33-12	gx	12h49m05s	−12°53.2'		Crv	24"	ottima / buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con una condensazione quasi stellare poco contrastata — 450x.
MCG-2-33-15	gx	12h49m24s	−10°07.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza molto diffusa, poco contrastata sul fondo cielo e di luminosità pressoché uniforme; solo scalando a 210x si riesce a capire che è leggermente allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 2'×1.5'.
MCG-2-33-17	gx	12h50m05s	−14°44.0'		Crv	16"	ottima / ottimo	in visione diretta è un oggetto compatto, rotondo con Ø max di 30"; in visione distolta appare un tenuissimo disco diffuso approssim. rotondo con Ø < a 1'; c'è una stellina brillante a ridosso S — 270x.
MCG-2-33-20	gx	12h50m29s	−10°51.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, di aspetto a tratti un po' irregolare, orientata da N a S con dimensioni 90"×45" (forse anche un po' di più) — 450x.
MCG-2-33-25	gx	12h50m53s	−09°51.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e con piccola condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra due stelline brillanti distanti un paio di primi in direzione NE-SW (quasi a ridosso a quella più a N).
MCG-2-33-33	gx	12h52m05s	−15°27.5'		Crv	16"	buona / ottimo	debole, ma facilmente visibile, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e di luminosità pressoché uniforme salvo un piccolo nucleo stellare che però appare solo a tratti a 380x (situata all'interno dell'ammasso **AGC 1631**).
MCG-2-33-36	gx	12h52m33s	−15°31.0'		Crv	16"	buona / ottimo	fa parte del terzetto di IC 829 dalla quale dista 1.5' verso E — debole, diffusa, di luminosità uniforme, perfettamente rotonda con Ø poco superiore a 30" (situata all'interno dell'ammasso **AGC 1631**) — 380x.
MCG-2-33-37	gx	12h52m25s	−15°31.0'		Crv	16"	buona / ottimo	fa parte del terzetto di IC 829 dal quale dista 30" verso W — in visione distolta sembra a tratti fondersi con IC 829; è piccola, debole, di luminosità uniforme e di Ø < a 30" (situata all'interno dell'ammasso **AGC 1631**) — 380x.
MCG-2-33-44	gx	12h53m48s	−11°18.8'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" — 450x.
MCG-2-33-45	gx	12h53m47s	−12°51.1'		Crv	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-33-48	gx	12h54m05s	−12°58.7'		Crv	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-33-54	gx	12h54m44s	−12°45.6'		Crv	24"	ottima / buono	relativamente facile, anche se presenta una vistosa stellina al bordo N; diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-33-55	gx	12h54m47s	−13°05.3'		Crv	24"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-2-33-57	gx	12h54m50s	−14°07.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e brillante, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare evidente; c'è una stellina luminosa a 1' verso N — 450x.
MCG-2-33-58	gx	12h54m51s	−11°53.5'		Crv	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa per 1.5' — 450x.
MCG-2-33-59	gx	12h54m56s	−10°04.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" e nucleo stellare marcato — 450x.
MCG-2-33-62	gx	12h55m51s	−11°33.7'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S (fa parte di tre stelline allineate in direzione E-W); meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-33-64	gx	12h56m04s	−11°36.0'		Vir	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-33-68	gx	12h57m06s	−12°16.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×30" — 450x.
MCG-2-33-71	gx	12h57m13s	−15°02.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso S — 450x.
MCG-2-33-73	gx	12h57m39s	−10°43.6'		Vir	16"	m. buona / discreto	è debolissima, ma appare comunque senza problemi in visione distolta, a tratti allungata da N a S per ~ 1' — 270x.
MCG-2-33-75	gx	12h58m28s	−10°34.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-33-76	gx	12h58m31s	−15°32.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	bella, relativamente brillante, molto allungata da E a W, di dimensioni 80"×20", con bulge evidente e nucleo stellare — 450x.
MCG-2-33-82	gx	13h00m05s	−15°22.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
MCG-2-33-88	gx	13h00m43s	−15°42.9'		Vir	24"	ottima / m. buono	è una debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, estesa ~ 1', ma di aspetto confuso; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele schiacciato formato da deboli stelline; meglio evidente scalando a 340x.
MCG-2-33-91	gx	13h01m06s	−14°19.6'		Vir	24"	ottima / buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15", molto diffusa alle estremità N e S e con tenue nucleo stellare; è situata tra due stelline: una a 1' NE e l'altra a ridosso SW — 450x.
MCG-2-33-93	gx	13h02m03s	−14°53.0'		Vir	16"	ottima / ottimo	poco più debole NGC 4924, dalla quale dista 6' a NNW, ma è comunque visibile senza difficoltà, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 270x.
MCG-2-33-97	gx	13h02m16s	−11°14.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, di aspetto un po' confuso a 450x, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; resta comunque meglio evidente mantenendo alti gli ingrandimenti; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline brillanti a NW e a ENE.
MCG-2-33-98	gx	13h02m20s	−15°46.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20"; la visione è più interessante a 450x.
MCG-2-33-99	gx	13h02m28s	−15°46.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima chiazza circolare con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' NE di una stellina abbastanza brillante, ma non bisogna scendere sotto i 450x (situata un paio di primi a SE della precedente).
MCG-2-33-100	gx	13h02m24s	−12°20.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 80"×40"; meglio definita scalando a 340x.
MCG-2-34-12	gx	13h16m49s	−13°36.4'		Vir	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina molto debole a ridosso SE — 450x.
MCG-2-34-15	gx	13h17m45s	−15°31.5'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debolissima chiazza circolare di 1' scarso di Ø, praticamente immersa nei bagliori della SAO 157838 di magnitudo 6.8 situata a poco più di 3' SW; meglio evidente a 450x.
MCG-2-34-16	gx	13h17m46s	−15°30.5'		Vir	24"	mediocre / ottimo	è debolissima, ma appare più facilmente di MCG-2-34-15, dalla quale dista 1' verso N, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG-2-34-18	gx	13h18m12s	−15°41.4'		Vir	24"	mediocre / ottimo	anche questa è debolissima e salta fuori in visione distolta a un paio di primi S di una debole stellina; solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-2-34-19	gx	13h18m27s	−15°46.1'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW (ossia ortogonalmente a MCG-2-34-18 che ho però osservato in altra data) con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-34-24	gx	13h19m17s	−15°09.4'		Vir	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
MCG-2-34-28	gx	13h19m34s	−14°46.3'		Vir	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto esteso una 20-ina di secondi con nucleo stellare — 270x.
MCG-2-34-29	gx	13h19m43s	−11°28.5'		Vir	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG-2-34-31	gx	13h19m58s	−12°29.3'		Vir	16"	m. buona / scarso	rotonda, molto diffusa, debole, di luminosità uniforme e Ø di ~ 1'; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta fissando la stellina brillante situatale a ridosso verso NNE — 188x.
MCG-2-34-32	gx	13h20m06s	−14°45.2'		Vir	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale di aspetto stellare, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 450x.
MCG-2-34-33	gx	13h20m17s	−14°48.7'		Vir	24"	mediocre / ottimo	molto debole e diffusa, con piccolo bulge appena percettibile, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
MCG-2-34-35	gx	13h20m43s	−14°05.5'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, situata a ridosso N della gx successiva da cui aggetta per una 20-ina di secondi — 450x.
MCG-2-34-36	gx	13h20m44s	−14°06.0'		Vir	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG-2-34-38	gx	13h21m47s	−14°06.0'		Vir	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
MCG-2-34-47	gx	13h25m58s	−12°09.5'		Vir	24"	m. buona / discreto	presenta un nucleo stellare molto marcato circonfuso da un alone molto tenue, rotondo con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-2-34-51	gx	13h26m45s	−11°12.7'		Vir	24"	m. buona / discreto	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" — 450x.
MCG-2-34-54	gx	13h27m56s	−13°25.4'		Vir	24"	mediocre / ottimo	molto debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 1'; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-35-10	gx	13h38m10s	−09°48.1'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di aspetto confuso, forse rotonda con Ø di 1.5'; c'è una coppia di stelline distanti una 30-ina di secondi subito a NW; meglio evidente a 340x.
MCG-2-35-11	gx	13h38m30s	−10°42.2'		Vir	24"	buona / ottimo	facile, poco diffusa, rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso NW (la quale fa parte di un piccolo triangolo rettangolo di stelline — 450x.
MCG-2-36-2	gx	14h01m42s	−11°36.3'		Vir	24"	buona / buono	abbastanza facile, poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø ~ 1'; — 450x.
MCG-2-36-8	gx	14h04m12s	−10°45.2'		Vir	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 1' e con tenue condensazione centrale quasi stellare — 450x.
MCG-2-36-11	gx	14h04m35s	−10°13.2'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 80"×30" — 450x.
MCG-2-36-12	gx	14h04m57s	−14°16.7'		Vir	24"	buona / buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15", poco diffusa e con piccolo bulge quasi stellare — 450x.
MCG-2-36-13	gx	14h05m00s	−14°51.4'		Vir	24"	buona / buono	debole e diffusa, con bassissimo gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; molto disturbata dalla SAO 158333 di 7ª grandezza situata 3' a E — 450x.
MCG-2-36-17	gx	14h12m08s	−10°04.7'		Vir	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
MCG-2-37-6	gx	14h32m53s	−12°58.5'		Lib	24"	m. buona / mediocre	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-37-9	gx	14h33m54s	−13°16.2'		Lib	24"	m. buona / mediocre	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" (la visione è un poco disturbata dalla SAO 158644 di magnitudo 9.5 situata a poco più di 3' ENE — 450x.
MCG-2-38-1	gx	14h44m01s	−12°57.1'		Lib	24"	buona / ottimo	molto debole e spampanata, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-38-15	gx	14h47m56s	−14°26.9'		Lib	24"	mediocre / ottimo	è una debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 80"×60"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-38-16	gx	14h49m30s	−10°10.4'		Lib	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; altresì nota come Arp 261 — 450x.
MCG-2-38-17	gx	14h49m33s	−10°09.8'		Lib	24"	mediocre / ottimo	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, ma non riesco a capirne l'orientamento; a prima vista e a ingrandimenti minori sembra solo un allungamento di MCG-2-38-16 — 450x.
MCG-2-38-22	gx	14h52m10s	−10°44.4'		Lib	24"	mediocre / ottimo	relativamente facile, gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina subito a N — 450x.
MCG-2-38-23	gx	14h57m43s	−13°44.1'		Lib	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 450x.
MCG-2-38-29	gx	15h01m28s	−14°18.8'		Lib	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e con nucleo stellare, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
MCG-2-38-30	gx	15h03m00s	−13°06.9'		Lib	24"	buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa e con piccolo bulge marcato, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
MCG-2-39-9	gx	15h14m11s	−14°20.9'		Lib	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 60"×40" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a ridosso N (al momento dell'osservazione era ancora molto bassa); è situata 8' a SE della brillante NGC 5878 osservata col 16" in altra data — 450x.
MCG-2-39-10	gx	15h14m25s	−14°39.3'		Lib	16"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme; salta fuori a tratti allungata all'incirca da NW a SE per 1' scarso; più verso SW c'è un'altra galassia debole ma facilmente visibile, abbastanza compatta, allungata da N a S, con dimensioni 40"×20" — 270x.
MCG-2-39-21	gx	15h21m36s	−12°05.6'		Lib	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ancorché disturbata dalla SAO 159195 di magnitudo 8.7 situata ad appena 1' verso W; poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25" e con tenue condensazione centrale che appare però leggermente decentrata verso N — 450x.
MCG-2-41-1	gx	16h17m16s	−11°43.9'		Sco	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme che in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da E a W con dimensioni 80"×40"; occorre tuttavia scalare a 340x.
MCG-2-50-2	knot	19h44m33s	−14°42.2'		Cyg	24"	m. buona / ottimo	assieme a MCG-2-50-3 sono 2 regioni H II situate in NGC 6822 — appaiono elusivamente, sono distanti meno di 1' in direzione NW-SE; appaiono solo a momenti, ma occorre non scendere sotto i 450x; sono molto diffusi, di aspetto simile e di dimensioni non superiori a 20"; ciascuno salta fuori in visione distolta quando si osserva l'altro.
MCG-2-50-3	knot	19h44m34s	−14°42.3'		Cyg	24"	m. buona / ottimo	v. **MCG-2-50-2**
MCG-2-51-4	gx	20h15m40s	−13°37.3'		Cap	16"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme; appare solo a tratti a 270x, allungata ~ da N a S con dimensioni grosso modo 60"×40".
MCG-2-51-8	gx	20h17m06s	−12°05.8'		Cap	16"	buona / ottimo	molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta a 270x, è allungata da N a SW, con dimensioni 60"×30" e bulge rotondo appena più evidente del disco.
MCG-2-51-9	gx	20h17m11s	−11°51.5'		Cap	16"	buona / ottimo	piccola galassietta elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 380x quando si fissa quella debolissima stellina a ~ 1' SW.
MCG-2-52-3	gx	20h21m48s	−10°29.4'		Cap	16"	buona / ottimo	debolissima lama di luce che tuttavia appare come tale solo a tratti a 380x (a 270x è ancora confusa), orientata da N a S ed estesa forse 1'.
MCG-2-52-4	gx	20h24m20s	−11°02.8'		Cap	16"	buona / ottimo	debolissimo oggetto di luminosità uniforme esteso max 30"; appare in visione distolta a 380x.
MCG-2-52-5	gx	20h24m42s	−11°57.8'		Cap	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; si fatica un poco a osservarla a 450x, mentre appare abbastanza facilmente a 340x.
MCG-2-52-6	gx	20h29m35s	−12°30.2'		Cap	24"	buona / discreto	relativamente facile, diffusa, allungata da WNW a ESE e appena più brillante verso l'interno; è situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti un paio di primi — 450x.
MCG-2-52-10A	gx	20h31m43s	−12°15.9'		Cap	24"	buona / discreto	debolissima chiazza diffusa e assai stemperata sul fondo cielo, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-2-52-11	gx	20h32m13s	−08°44.1'		Cap	24"	buona / discreto	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso SW — 450x.
MCG-2-52-14	gx	20h33m18s	−11°16.3'		Cap	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare solo in visione distolta a 270x, molto diffusa ed estesa ~ 40" (ma non riesco a capire com'è orientata); c'è una stellina a ridosso verso E (la NGC 6931 è una 60"×20", con nucleo evidente, allungata NW-SE; stellina quasi a ridosso SW, ossia a metà gx).
MCG-2-52-17	gx	20h35m16s	−09°37.4'		Cap	24"	buona / discreto	lama di luce molto debole, orientata da N a S, estesa per ~ 1' e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MCG-2-52-18	gx	20h35m38s	−09°25.5'		Cap	24"	buona / m. buono	relativamente brillante, con bulge diffuso ed evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
MCG-2-52-19	gx	20h41m48s	−13°50.8'		Aqr	16"	ottima / ottimo	facile, diffusa rotonda, con Ø < 1' e condensazione centrale marcata di aspetto quasi stellare — 380x.
MCG-2-52-20	gx	20h43m29s	−10°05.5'		Aqr	24"	buona / discreto	relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG-2-53-3	gx	20h46m52s	−12°50.8'		Aqr	24"	buona / discreto	appare elusivamente solo ogni tanto sul lato orientale di un piccolo asterismo di 4 deboli stelline fatto a trapezio irregolare; non sembra più estesa di 30" o 40" e comunque occorre scalare a 340x.

MCG-2-53-4	gx	20h47m42s	−09°57.2'		Aqr	24"	buona / discreto	è un'elusiva lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per circa 1' che appare solo a momenti in visione distolta a 450x; una doppia estremamente serrata e irrisolta situata a poco più di 1' SW dà l'impressione di un piccolo oggetto diffuso con una stellina quasi a ridosso verso SE.
MCG-2-53-8	gx	20h50m03s	−09°49.4'		Aqr	16"	ottima / ottimo	è una sorta di debolissimo alone esteso che solo a tratti sembra protrudere per non più di una 20-ina di secondi a S di una stellina; la stellina a 3.7' NNE di egual magnitudo ne è priva — 380x.
MCG-2-53-9	gx	20h51m44s	−09°18.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante subito a E — 450x.
MCG-2-53-12	gx	20h54m48s	−08°39.0'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso di NE — 450x.
MCG-2-53-13	gx	20h55m24s	−13°26.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta, anche se è un po' meglio contrastata scalando a 340x; presenta bassissima luminanza superficiale; orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una coppia di stelline a poco più di 1' SE allineate con una stella brillante; una 30-ina di secondi a SW di quest'ultima notasi, a 450x, un debolissimo oggetto rotondo molto piccolo, esteso non più di 10"; da un controllo successivamente effettuato sul Perseus è risultato essere la PGC 937578.
MCG-2-53-14	gx	20h56m23s	−14°18.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-2-53-15	gx	20h58m50s	−14°02.4'		Aqr	24"	buona / m. buono	molto diffusa e con nucleo stellare abbastanza evidente, rotonda con Ø 45" — 450x.
MCG-2-53-19	gx	21h01m37s	−13°57.7'		Aqr	24"	buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio evidente a 340x.
MCG-2-53-22	gx	21h02m37s	−13°47.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole, di luminosità pressoché uniforme, orientata da NNW a SSE ed estesa per oltre 1'; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso S — 450x.
MCG-2-53-23	gx	21h03m02s	−14°15.6'		Aqr	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, probabilmente rotonda con Ø max di 40"; occupa il vertice orientale di un triangolo equilatero con 2 stelline brillanti — 270x.
MCG-2-53-26	gx	21h05m56s	−14°20.6'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline brillante a NE orientate da N a S e distanti 1' — 450x.
MCG-2-53-27	gx	21h06m29s	−15°26.4'		Cap	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza circolare molto diffusa e con bassissimo contrasto, tant'è che non sono praticamente riuscito a vederla a 340x; a 450x appare grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
MCG-2-54-1	gx	21h08m06s	−12°55.0'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; disturbata dalla SAO 164164 di 8ª grandezza situata 3' a NE — 340x.
MCG-2-54-2	gx	21h11m43s	−14°03.9'		Aqr	16"	ottima / buono	debolissima e stemperata sul fondo cielo, si stacca a fatica a 380x; forse rotonda con Ø ~ 45".
MCG-2-54-3	gx	21h13m08s	−10°49.6'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme; a 450x sembra rotonda con Ø di un 40-ina di secondi; a 340x, tuttavia, il contrasto aumenta leggermente e la gx appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una debole stellina a ridosso verso W.
MCG-2-54-5	gx	21h20m23s	−13°10.3'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, ma relativamente compatta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×15" — 450x.
MCG-2-54-6	gx	21h22m48s	−11°26.6'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, è osservabile in visione distolta a 450x, ma solo a momenti si riesce a intuire che è orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; è situata a S di un piccolo triangolo rettangolo isoscele di stelline di luminosità simile.
MCG-2-54-7	gx	21h23m29s	−11°07.7'		Aqr	24"	discreta / buono	chiazza circolare molto debole e di luminosità uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 340x.
MCG-2-54-8	gx	21h25m57s	−09°01.9'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso E — 450x.
MCG-2-54-9	gx	21h27m06s	−09°31.9'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S con dimensioni simili a MCG-2-54-8; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W e una appena percettibile a 1' verso S — 450x.
MCG-2-55-1	gx	21h41m41s	−10°38.1'		Cap	16"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge appena più evidente; c'è una stellina brillante a ridosso NW: questa stellina fa parte di un piccolo triangolo rettangolo irregolare — 380x.
MCG-2-55-3	gx	21h48m15s	−13°15.1'		Cap	16"	m. buona / ottimo	è una gx elusiva che appare solo a tratti in visione distolta; è molto diffusa e di dimensioni max 30"-35"; è situata 1.5' a N di una stella (per localizzarla ho dovuto dapprima scalare a 188x) — 380x.
MCG-2-55-4	gx	21h21m18s	−12°17.1'		Cap	24"	discreta / buono	chiazza molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una doppia stretta e fortemente sbilanciata a poco più di 1' SSE — 450x.
MCG-2-55-8	gx	21h55m28s	−12°02.7'		Cap	16"	ottima / buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso — 380x.
MCG-2-56-1	gx	21h59m27s	−12°14.8'		Aqr	24"	buona / mediocre	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 35"-40"; c'è una stellina subito a SE — 400x.
MCG-2-56-2	gx	22h00m02s	−13°47.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' SE — 450x.
MCG-2-56-4	gx	22h00m28s	−13°49.6'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, disturbata dalla SAO 164809 di 8ª grandezza situata 5' a NNE e che si fatica a tenere fuori campo; a 450x appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG-2-56-6	gx	22h01m58s	−10°16.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; allineata ed equidistante, in direzione NNW-SSE, con 2 stelline sbilanciate in luminosità — 450x.
MCG-2-56-8	gx	22h02m06s	−09°20.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima e oltretutto si fatica anche a vedere perché è immersa nel bagliore della SAO 145823 di 9ª grandezza, situata 3' a N, che non si riesce a tenere fuori campo; solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni ~ 45"×15" — 450x.
MCG-2-56-10	gx	22h03m28s	−10°43.0'		Aqr	24"	buona / mediocre	debolissima e molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 400x.
MCG-2-56-11	gx	22h04m09s	−11°21.7'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole e molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
MCG-2-56-14	gx	22h07m26s	−10°42.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile e compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10" e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelline appena percettibili a E che con una poco più brillante verso W fanno un piccolo triangolo isoscele — 450x.
MCG-2-56-16	gx	22h07m47s	−10°44.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce, estesa 1' scarso, orientata da E a W, e che a 450x salta fuori in visione distolta a poco più di 1' ESE di una doppia stretta.
MCG-2-56-17	gx	22h08m48s	−11°51.0'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-2-56-18	gx	22h08m52s	−10°55.8'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, a prima vista rotonda, ma a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
MCG-2-56-19	gx	22h09m31s	−13°36.1'		Aqr	24"	ottima / ottimo	debole e molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è situata a ridosso di un piccolo triangolo irregolare di stelle brillanti: quella più a E è la SAO 164894 di 10ª grandezza — 450x.
MCG-2-56-20	gx	22h10m42s	−10°27.8'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e con nucleo stellare visibile a momenti, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MCG-2-56-23	gx	22h13m25s	−09°16.9'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, soltanto in visione distolta appare a momenti orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso SE — 450x.
MCG-2-56-25	gx	22h14m20s	−10°39.8'		Aqr	24"	ottima / ottimo	piccola, debolissima e molto diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata quasi a ridosso verso N di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MCG-2-56-26	gx	22h15m02s	−11°31.0'		Aqr	16"	ottima / buono	presenta un nucleo stellare, bulge rotondo di ~ 20" di Ø circonfuso da un tenuissimo alone esteso una 30-ina di secondi — 270x.
MCG-2-57-1	gx	22h24m00s	−11°08.5'		Aqr	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelle brillanti un paio di primi a N; il campo è disturbato dalla SAO 165940 di 9ª grandezza situata 3' a SSE (la SAO 165048, poco più brillante e situata 8' a E, si riesce invece a tenere fuori campo) — 450x.
MCG-2-57-2	gx	22h24m45s	−13°40.3'		Aqr	16"	buona / m. buono	assieme a MCG-2-57-3 forma una coppia di gx distanti un paio di primi scarsi in direzione NNE-SSW — la 1ª è una sorta di alone che aggetta verso E da una stellina abbastanza brillante estesa non più di 30"; la 2ª è debolissima, appare in visione distolta a 380x, ma non riesco a percepirne la forma.
MCG-2-57-3	gx	22h24m47s	−13°39.6'		Aqr	16"	buona / m. buono	v. **MCG-2-57-2**
MCG-2-57-4	gx	22h25m36s	−09°57.0'		Aqr	24"	buona / mediocre	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di ~ 45" — 400x.
MCG-2-57-6	gx	22h27m12s	−12°38.6'		Aqr	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, diffusa, allungata in direzione ~ N-S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile poco più a S — 380x.
MCG-2-57-8	gx	22h29m55s	−08°16.7'		Aqr	16"	ottima / buono	debolissimo ovale di ~ 40"×30" e di luminosità uniforme che si diparte verso N da una stellina: quest'ultima fa parte di un piccolo quadrilatero sghembo con componenti di luminosità simile — 380x.
MCG-2-57-9	gx	22h30m14s	−10°30.3'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline brillanti a E della gx e una debole allineata con queste a 1' scarso verso N — 450x.
MCG-2-57-14	gx	22h32m34s	−09°31.1'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MCG-2-57-15	gx	22h32m47s	−14°05.8'		Aqr	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, salta fuori in visione distolta, ma solo a momenti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 60"×20" — 450x.
MCG-2-57-18	gx	22h34m48s	−12°24.7'		Aqr	24"	ottima / ottimo	è una debole lama di luce orientata da NW a SE, estesa per 1' e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MCG-2-57-19	gx	22h35m20s	−12°49.0'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1.5' WSW — 450x.
MCG-2-57-20	gx	22h36m06s	−12°51.2'		Aqr	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MCG-2-57-22	gx	22h36m30s	−12°34.0'		Aqr	16"	ottima / buono	debole, ma relativamente facile, allungata da N a S con dimensioni 45"×30", poco più brillante verso l'interno, ma senza nucleo — 380x.
MCG-2-57-23	gx	22h36m46s	−12°32.7'		Aqr	16"	ottima / buono	più piccola e poco più debole della precedente, pure allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e nucleo puntiforme visibile a 380x; c'è una stellina a ridosso verso E.
MCG-2-57-24	gx	22h36m54s	−12°33.7'		Aqr	16"	ottima / buono	debolissimo oggetto non più esteso di una 20-ina di secondi; appare a tratti a 380x alternando gli occhi.
MCG-2-57-25	gx	22h37m15s	−09°52.5'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-2-57-27	gx	22h38m56s	−12°34.7'		Aqr	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, molto diffusa, estesa una 20-ina di secondi, situata a ridosso S di una stellina — 450x.
MCG-2-58-8	gx	22h54m14s	−11°11.0'		Aqr	16"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, a tratti in visione distolta appare grosso modo orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 270x.
MCG-2-58-9	gx	22h54m22s	−10°10.4'		Aqr	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 20" — 450x.
MCG-2-58-10	gx	22h56m18s	−09°19.8'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di aspetto confuso, forse rotonda con Ø di 1' scarso; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-58-11	gx	22h56m51s	−08°58.0'		Aqr	24"	ottima / ottimo	forma una coppia interagente con MCG-2-58-12 — è una lama di luce estesa per 1.5' e orientata da ENE a WSW, con tenue bulge diffuso e poco più contrastato; non sembra disturbata da 2 stelle brillanti: una un paio di primi a E e l'altra, ancora più luminosa a 2.5' NW (già precedentemente osservata col 16" a 380x in condizioni di visibilità analoghe, anche se non era stato possibile sdoppiarne le componenti).
MCG-2-58-12	gx	22h56m49s	−08°58.2'		Aqr	24"	ottima / ottimo	forma una coppia interagente con MCG-2-58-11 — appare soltanto come un indistinto nodulo all'estremità WSW della precedente; l'effetto sembra un poco più evidente spingendo a 570x.
MCG-2-58-18	gx	23h00m13s	−12°38.9'		Aqr	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline: una a 1' SE e l'altra un paio di primi a S — 450x.
MCG-2-58-22	gx	23h04m43s	−08°41.1'		Aqr	24"	buona / mediocre	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo brillante, quasi stellare — 400x.
MCG-2-58-23	gx	23h05m22s	−10°13.4'		Aqr	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 25"-30"; presenta una condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti a 380x.
MCG-2-58-24	gx	23h06m58s	−09°17.2'		Aqr	24"	discreta / buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N (la quale fa parte di un piccolo asterismo foggiato a "W" sghemba — 340x.
MCG-2-59-1	gx	23h08m07s	−10°32.6'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 450x.
MCG-2-59-4	gx	23h10m22s	−08°41.3'		Aqr	24"	discreta / buono	debole lama di luce di aspetto quasi uniforme, orientata da E a W ed estesa 1.5'; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-2-59-5	gx	23h10m21s	−08°41.6'		Aqr	24"	discreta / buono	è una sorta di piccola e debolissima protuberanza che appare a momenti a ridosso S della precedente verso la parte più occidentale della gx — 450x.
MCG-2-59-6	gx	23h13m57s	−11°33.3'		Aqr	24"	discreta / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare a tratti approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MCG-2-59-7	gx	23h14m17s	−09°50.2'		Aqr	24"	buona / mediocre	è una piccola ed elusiva lama di luce estesa non più di 45" e orientata da NW a SE; c'è una stellina percettibile solo a tratti a ~ 1' verso S; meglio evidente scalando a 280x.
MCG-2-59-8	gx	23h17m27s	−10°01.8'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	è un debolissimo oggetto rotondo, diffuso, esteso non più di 30"-35" che tuttavia si riesce a catturare abbastanza bene in visione distolta a 380x.
MCG-2-59-9	gx	23h18m38s	−10°24.5'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta a 380x, allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20".
MCG-2-59-13	gx	23h22m35s	−13°05.6'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 1' e condensazione centrale molto tenue visibile a 380x.
MCG-2-59-14	gx	23h23m38s	−08°17.7'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 340x.
MCG-2-59-17	gx	23h26m42s	−11°37.0'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima galassietta di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
MCG-2-59-20	gx	23h28m53s	−08°38.8'		Aqr	24"	buona / mediocre	debole, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 50"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1.5' NW — 400x.
MCG-2-59-21	gx	23h29m57s	−12°29.1'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	debole oggetto rotondo con Ø di ~ 30", poco diffuso e di luminosità pressoché uniforme; meglio osservabile a 270x.
MCG-2-60-1	gx	23h34m00s	−11°46.9'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	più debole e più piccola di MCG-2-60-2, ma visibile senza problemi a 380x in visione distolta; estesa una 20-ina di secondi con tenue condensazione centrale.
MCG-2-60-2	gx	23h34m24s	−11°39.4'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di 30"-35" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 4' verso E — 380x.
MCG-2-60-3	gx	23h36m15s	−11°28.0'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	è un oggetto rotondo molto debole e poco diffuso, con Ø di ~ 40" e appena più brillante verso l'interno; situata tra 2 deboli stelline distanti un paio di primi scarsi e orientate da NE a SW — 380x.
MCG-2-60-4	gx	23h37m06s	−09°35.9'		Aqr	24"	ottima / ottimo	debolissima e assai stemperata sul fondo cielo, solo in visione distolta appare a momenti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30"; non conviene comunque scalare a 340x.
MCG-2-60-7	gx	23h39m49s	−11°49.0'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, ma facilmente visibile in visione distolta a 380x; rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale puntiforme visibile a tratti.
MCG-2-60-9	gx	23h41m23s	−09°53.9'		Aqr	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un asterismo di 4 stelline brillanti foggiato a "y" situato a SW — 270x.
MCG-2-60-10	gx	23h40m52s	−13°21.5'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina brillante un paio di primi a W — 340x.
MCG-2-60-11	gx	23h41m02s	−08°13.3'		Aqr	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e più brillante verso l'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG-2-60-12	gx	23h41m53s	−08°38.9'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	è una debole lama di luce orientata ~ da N a S, estesa per 1' e con nucleo stellare visibile solo forzando a 380x.
MCG-2-60-13	gx	23h42m13s	−12°02.9'		Aqr	24"	ottima / ottimo	piccola, debolissima e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; è molto difficile da vedere in quanto situata in una zona depleta; ho dovuto scalare a 340x.
MCG-2-60-14	gx	23h44m08s	−09°13.2'		Aqr	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo e di forma indistinta, purtroppo anche disturbata da una stella brillante situata subito a E; dovrebbe essere estesa 1' scarso; meglio evidente a 340x.
MCG-2-60-15	gx	23h45m01s	−12°54.0'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SW — 450x.
MCG-2-60-16	gx	23h48m23s	−08°30.1'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, allungata da NNE a SSW con dimensioni 50"×30" — 400x.
MCG-2-60-17	gx	23h48m42s	−14°01.6'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline abbastanza brillanti orientate da N a S e distanti 1.5' — 450x.
MCG-2-60-18	gx	23h49m52s	−12°28.0'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al margine N — 400x.
MCG-2-60-19	gx	23h51m19s	−12°45.1'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
MCG-2-60-21	gx	23h53m27s	−11°48.6'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e di una 40-ina di secondi di Ø; meglio a 270x perché a 380x il campo oculare è quasi depleto.
MCG-3-1-2	gx	23h56m48s	−16°30.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	allungata da NW a SE, con dimensioni 45"×30" e poco più brillante all'interno; si trova al vertice occidentale di un piccolo triangolo isoscele ottusangolo formato con 2 stelline di luminosità diseguale distanti un paio di primi e orientate da N a S — 400x.
MCG-3-1-3	gx	23h56m59s	−16°45.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare grosso modo di dimensioni simili a MCG-3-1-2, ma sembra orientata da N a S (a 400x il campo è quasi depleto).
MCG-3-1-9	gx	23h58m40s	−17°33.5'		Cet	24"	ottima / mediocre	debole e molto diffusa, più che altro disturbata da una stellina abbastanza brillante a bordo N; in visione distolta appare rotonda con Ø < 40" — 340x.
MCG-3-1-11	gx	23h59m29s	−15°12.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG-3-1-14	gx	00h01m36s	−04°44.9'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina a 1.5' SW e un'altra molto più debole a poco più di 1' SE — 380x.
MCG-3-1-16	gx	00h03m45s	−14°41.6'		Cet	16"	ottima / ottimo	elusiva, appare a tratti in visione distolta a 380x; ogni tanto sembra addirittura di vedere qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è una stellina o il nucleo; è estesa non più di una 30-ina di secondi (l'unico riferimento per trovarla è un piccolo triangolo irregolare a 3' o 4' NW — vedi).
MCG-3-1-18	gx	00h04m46s	−16°01.9'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a 1.5' verso E e un'altra ancora più debole a 1' verso N — 380x.
MCG-3-1-19	gx	00h05m17s	−16°28.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; meglio evidente a 450x.
MCG-3-1-28	gx	00h19m14s	−14°23.8'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di forma indistinta; appare in visione distolta un paio di primi a S di una stellina; è estesa una 40-ina di secondi, ma è meglio scalare a 380x.
MCG-3-2-1	gx	00h21m56s	−15°59.0'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; meglio osservabile a 380x, ma il campo è quasi depleto (salvo un'unica coppia di stelline 7' a SE).
MCG-3-2-9	gx	00h22m53s	−14°32.0'		Cet	16"	m. buona / m. buono	rotonda, diffusa, di 40" di Ø, con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 1.5' verso W — 380x.
MCG-3-2-12	gx	00h25m18s	−14°33.4'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e poco più brillante all'interno; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
MCG-3-2-15	gx	00h29m08s	−15°51.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, di forma indistinta ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x (a 340x perde molto contrasto sul fondo cielo); c'è una stellina abbastanza brillante a 2.5' verso N.
MCG-3-2-18	gx	00h30m29s	−16°41.5'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, difficile da catturare a 380x; probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (a 270x non sono riuscito a vederla).
MCG-3-2-25	gx	00h37m31s	−17°56.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-3-2-27	gx	00h38m18s	−14°50.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante un paio di primi a SE — 450x.
MCG-3-2-33	gx	00h39m39s	−18°49.0'		Cet	24"	m. buona / scarso	molto piccola e debolissima, non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 15" o 20" — 340x.
MCG-3-2-37	gx	00h41m11s	−14°55.7'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 1'; scalando a 280x appare maggiormente contrastata e si nota, a tratti, una tenue condensazione centrale; c'è un piccolo asterismo irregolare di 7 stelline brillanti a 10' SW.
MCG-3-2-39	gx	00h41m41s	−16°51.1'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, relativamente compatta, di appena 10"-15" di Ø; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ~ 1' NW di MCG-3-2-40 — 380x.
MCG-3-2-40	gx	00h41m45s	−16°51.6'		Cet	16"	ottima / ottimo	debole lucore diffuso, molto stemperato sul fondo cielo, approssim. rotondo con Ø di 1'; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelle: a NNW e a W — 380x.
MCG-3-3-4	gx	00h50m01s	−14°40.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	diffusa, con condensazione centrale abbastanza evidente, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso E — 400x.
MCG-3-3-5	gx	00h50m40s	−15°16.7'		Cet	24"	buona / scarso	debolissima chiazza diffusa che in visione distolta sembra aggettare per ~ 1' a W da una stellina (quest'ultima è la più brillante di un piccolo triangolo isoscele molto allungato il cui vertice più acuto punta a SW) — 340x.
MCG-3-3-6	gx	00h52m00s	−16°24.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda, diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di 1' (pari a circa la distanza delle 2 stelline brillanti situate 3' SSE); appare facilmente in visione distolta a 400x.
MCG-3-3-9	gx	00h57m35s	−16°29.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-3-3-10	gx	00h58m20s	−15°23.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina molto debole al bordo NW; meglio contrastata a 340x.
MCG-3-3-12	gx	00h58m51s	−16°29.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente subito a S di NGC 333, ma solo a 450x; è comunque molto piccola, con dimensione non superiore a 10" o 15".
MCG-3-3-14	gx	00h58m56s	−16°52.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG-3-3-17	gx	01h00m16s	−15°18.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-3-18	gx	01h00m25s	−15°10.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	poco più debole di MCG-3-3-17, ma con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø simile — 450x.
MCG-3-3-21	gx	01h05m08s	−17°43.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
MCG-3-4-2	gx	01h07m40s	−17°14.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; a 450x il campo oculare è estremamente povero di stelle*(presenza di debole chiarore lunare)*.
MCG-3-4-9	gx	01h08m51s	−15°24.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una piccola e debolissima protuberanza appare ogni tanto, a 450x, a ridosso SW di IC 80 *(presenza di debole chiarore lunare)*.
MCG-3-4-12	gx	01h08m52s	−15°25.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
MCG-3-4-14	gx	01h10m09s	−16°51.1'		Cet	16"	ottima / buono	appare facilmente a 380x, piccola, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità pressoché uniforme.
MCG-3-4-18	gx	01h10m54s	−17°11.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con tenue nucleo stellare — 450x.
MCG-3-4-20	gx	01h11m05s	−18°08.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente quasi a ridosso N di NGC 417; più che altro sembra una stellina appena sfuocata; occorre tuttavia non scendere sotto i 450x.
MCG-3-4-22	gx	01h11m14s	−14°04.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, con condensazione centrale piccola e abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso WSW 450x.
MCG-3-4-23	gx	01h11m22s	−17°04.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø simile a MCG-3-4-22 (situata un paio di primi più a W e osservata per prima); a tratti appare appena più brillante all'interno — 450x.
MCG-3-4-24	gx	01h11m20s	−18°12.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccola, debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare a momenti in visione distolta a 450x a 1.5' W di una debole stellina.
MCG-3-4-25	gx	01h11m21s	−18°16.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di MCG-3-4-24, ma situata in una piccola zona quasi depleta a 450x; appare poco diffusa, rotonda con Ø < 30".
MCG-3-4-26	gx	01h11m34s	−17°04.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta a 450x subito a S di una stellina brillante.
MCG-3-4-32	gx	01h14m16s	−16°40.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale appena percettibile; appare meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-4-34	gx	01h15m03s	−14°26.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa oltre 1'; poco meglio contrastata scalando a 340x — 450x.
MCG-3-4-35	gx	01h16m12s	−15°54.6'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso S — 450x.
MCG-3-4-36	gx	01h16m12s	−15°54.2'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta quando si osserva la precedente; è una piccola lama di luce relativamente compatta, orientata da NE a SW ed estesa ed estesa < 30" — 450x.
MCG-3-4-38	gx	01h17m24s	−16°03.7'		Cet	24"	buona / scarso	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 340x.
MCG-3-4-39	gx	01h18m42s	−17°03.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e stemperata sul fondo cielo, meglio osservabile scalando a 280x, approssim. rotonda con Ø di ~ 45".
MCG-3-4-46	gx	01h19m25s	−15°42.0'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso SE; appare poco più contrastata a 380x.
MCG-3-4-48	gx	01h19m33s	−17°41.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e con nucleo stellare molto tenue, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-3-4-49	gx	01h19m49s	−16°15.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" o poco meno; c'è una stellina al bordo SW; si trova al vertice orientale di un piccolo triangolo isoscele rettangolo con 2 stelline brillanti — 450x.
MCG-3-4-57	gx	01h21m58s	−16°50.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso di SE che disturba l'osservazione — 340x.
MCG-3-4-58	gx	01h23m11s	−17°31.4'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta a SW di una debole stellina; non dovrebbe essere comunque più estesa di 15" o 20" — 340x.
MCG-3-4-61	gx	01h24m31s	−15°32.2'		Cet	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, rotonda con Ø di 45" e gradiente di luce medio; c'è una stellina a un paio di primi verso S; osservata a 380x per tener fuori campo la SAO 147793 di 6ª situata a meno di 8' SSE.
MCG-3-4-68	gx	01h27m02s	−17°21.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	piccola, debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø max di 20" — 340x.
MCG-3-4-71	gx	01h28m01s	−16°51.4'		Eri	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso E — 450x.
MCG-3-4-74	gx	01h28m53s	−15°46.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 340x.
MCG-3-4-78	gx	01h30m43s	−16°27.8'		Cet	24"	buona / buono	debole, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale evidente; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-5-2	gx	01h32m18s	−16°08.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso NW; la visione è un poco disturbata dalla SAO 147876 di 9ª grandezza situata a meno di 5' verso E e che non si riesce a tenere fuori campo — 340x.
MCG-3-5-6	gx	01h33m41s	−17°22.3'		Cet	24"	buona / buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG-3-5-7	gx	01h34m25s	−15°49.1'		Cet	24"	ottima / m. buono	rotonda con Ø di 45", diffusa e luminosità pressoché uniforme; stella brillante a 4' SE (la 49 Cet resta fortunatamente fuori campo) — 280x.
MCG-3-5-14	gx	01h41m36s	−16°08.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 280x, allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 60"×30".
MCG-3-5-17	gx	01h43m10s	−16°00.2'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso NW — 450x.
MCG-3-5-18	gx	01h43m47s	−15°57.5'		Eri	24"	m. buona / buono	è una debole chiazza circolare con Ø simile a MCG-3-5-17, poco diffusa e di luminosità uniforme; sarebbe di per sé abbastanza facile se non fosse immersa nell'intenso alone della τ Ceti di magnitudo 3.5, situata 5' scarsi a ENE, e che anche a 450x non si riesce a tenere fuori campo; la visione non migliora a 580x, perché la galassia si spampana troppo.
MCG-3-5-19	gx	01h46m29s	−15°07.2'		Eri	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
MCG-3-5-20	gx	01h46m55s	−14°27.1'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso W; a poco più di 4' NNE c'è qualcosa di piccolissimo e diffuso, allungato da N a S, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare appena percettibile: da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la MAC 0147-1423 — 400x.
MCG-3-6-2	gx	01h57m23s	−15°16.0'		Eri	24"	m. buona / buono	è una piccola e debolissima galassietta rotonda con Ø poco superiore a 20" e di luminosità uniforme — 450x.
MCG-3-6-3	gx	01h57m30s	−15°00.5'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; è situata ad appena 1.5' NW di una stellina brillante di 10ª grandezza che interferisce un poco con l'osservazione.
MCG-3-6-7	gx	02h05m55s	−16°40.6'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, solo a momenti appare orientata da N a S (ossia come la doppia stretta a NE) con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MCG-3-6-9	gx	02h09m32s	−16°47.2'		Eri	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e appena più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-3-6-20	gx	02h15m50s	−16°41.7'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 280x; forse rotonda con Ø < 1'.
MCG-2-24-8	gx	02h18m05s	−15°28.0'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
MCG-3-7-7	gx	02h23m15s	−15°09.0'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, solo a tratti appare una condensazione centrale molto tenue (falcetto di Luna) — 400x.
MCG-3-7-14	gx	02h26m25s	−15°13.6'		Cet	24"	buona / mediocre	diffusa, rotonda e leggermente condensata, con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW — 280x.
MCG-3-7-19	gx	02h27m21s	−15°25.3'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissima lama di luce orientata da NW a SE per ~ 1'; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 280x.
MCG-3-7-24	gx	02h29m51s	−15°39.8'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MCG-3-7-28	gx	02h31m41s	−15°27.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
MCG-3-7-32	gx	02h33m27s	−15°20.8'		Cet	24"	buona / buono	piccolo e debolissimo getto di luce che si diparte a S di una stella brillante per una 20-ina di secondi; occorre fare attenzione a coglierlo nei rari momenti in cui si "stacca" dall'alone stellare — 450x.
MCG-3-7-35	gx	02h34m01s	−15°21.9'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, poco meglio definita scalando a 340x, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MCG-3-7-38	gx	02h36m02s	−17°14.7'		Cet	24"	buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni poco superiori a 20"×10" — 340x.
MCG-3-7-39	gx	02h36m03s	−17°22.0'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-3-7-41	gx	02h37m17s	−15°49.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima chiazza indistinta, molto stemperata sul fondo cielo ed estesa una 40-ina di secondi; stranamente meglio visibile a 450x (a 340x tende ad "annegare" nel background).
MCG-3-7-42	gx	02h37m41s	−15°47.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" (già osservata, seppure elusivamente, nel 16") — 450x.
MCG-3-7-47	gx	02h38m57s	−14°19.3'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissima lama di luce che salta fuori a tratti a ~ 1' SE di IC 245; estesa grosso modo 45" ed è orientata da NE a SW — 280x.
MCG-3-7-50	gx	02h39m43s	−16°00.1'		Cet	24"	buona / mediocre	è una debole chiazza molto spampanata, appena più brillante all'interno, grosso modo circolare con Ø di 45" — 340x.
MCG-3-7-51	gx	02h40m37s	−15°46.1'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; forma un triangolo equilatero con 2 stelline situate rispettivamente un paio di primi a S e a WSW — 450x.
MCG-3-7-52	gx	02h40m46s	−15°08.5'		Cet	24"	buona / mediocre	è una debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 1' — 280x.
MCG-3-7-53	gx	02h40m46s	−17°07.2'		Cet	24"	buona / mediocre	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MCG-3-7-56	gx	02h41m25s	−17°57.2'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto piccola e debole, relativamente compatta e con nucleo stellare appena percettibile; appare a momenti orientata da NE a SW con dimensioni 15"×10" — 450x.
MCG-3-7-57	gx	02h41m35s	−16°40.8'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissima e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 280x.
MCG-3-7-61	gx	02h43m16s	−15°15.7'		Cet	24"	buona / buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue bulge di aspetto stellare — 450x.
MCG-3-8-5	gx	02h43m52s	−14°48.6'		Eri	16"	m. buona / mediocre	debole, ma compatta e abbastanza facile, pressoché circolare con Ø di 30" e di luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelle distanti un paio di primi e orientate da NE a SW: quella a NE è brillante — 270x.
MCG-3-8-6	gx	02h44m41s	−17°43.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	assieme a MCG-3-8-7 forma una coppia di debolissime galassie distanti 1' in direzione NE-SW; si separano meglio a 450x, in quanto meglio contrastate; la 1ª sembra di luminosità uniforme, ma solo in visione distolta appare a momenti molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 45"×15"; la 2ª è poco più evidente e solo a tratti condensata; in visione distolta appare orientata da NW a SE (ossia a perpendicolo con la precedente e con dimensioni 30"×15".
MCG-3-8-7	gx	02h44m42s	−17°42.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	v. **MCG-3-8-6**
MCG-3-8-17	gx	02h45m36s	−15°12.4'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MCG-3-8-18	gx	02h45m47s	−15°30.6'		Eri	16"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, appare in visione distolta subito a S di una stellina, ma non riesco a capire com'è fatta — 270x.
MCG-3-8-26	gx	02h47m22s	−14°45.5'		Eri	24"	buona / mediocre	debolissima, diffusa e leggermente condensata, estesa sì e no una 20-ina di secondi; è situata a NE di Arp 131 con la quale forma una coppia ravvicinata — 340x.
MCG-3-8-30	gx	02h49m35s	−14°28.0'		Eri	24"	m. buona / scarso	piccolo oggetto rotondo con Ø di una 20-ina di secondi, molto debole e di luminosità uniforme — 340x.
MCG-3-8-32	gx	02h51m06s	−14°43.4'		Eri	24"	buona / mediocre	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1.5' NW — 280x.
MCG-3-8-33	gx	02h51m11s	−14°41.0'		Eri	24"	buona / mediocre	debolissima e molto diffusa, di dimensioni simili alla precedente, ma orientata da NE a SW; c'è una stella brillante a 1' ENE — 280x.
MCG-3-8-34	gx	02h51m37s	−16°39.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x come un piccolo e debolissimo oggetto diffuso e a tratti condensato; non sembra più estesa di 20".
MCG-3-8-37	gx	02h52m22s	−14°33.3'		Eri	16"	m. buona / mediocre	debolissimo lucore assai diffuso e stemperato sul fondo cielo osservabile in visione distolta solo a 188x ed esteso una 40-ina di secondi; c'è una stellina 1' scarso verso W — 270x.
MCG-3-8-40	gx	02h53m07s	−17°47.5'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; a momenti sembra di intravvedere qualcosa di puntiforme all'interno, ma non riesco a capire se trattasi del nucleo o di una debolissima stellina sovrapposta — 450x.
MCG-3-8-46	gx	02h56m11s	−15°23.9'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 400x.
MCG-3-8-50	gx	02h57m11s	−16°39.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
MCG-3-8-51	gx	02h57m44s	−16°34.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole, ma relativamente facile, molto diffusa e con basso brillante, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 450x.

MCG-3-8-55	gx	02h59m32s	−15°16.3'		Eri	24"	buona / buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
MCG-3-8-57	gx	03h00m32s	−15°44.2'		Eri	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 270x.
MCG-3-8-58	gx	03h01m04s	−15°10.7'		Eri	24"	m. buona / scarso	debolissima chiazza circolare molto diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di 40"-50" — 340x.
MCG-3-8-69	gx	03h03m55s	−14°17.8'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, con tenue condensazione centrale diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N; variabile UW Eri a 4.5 NNW — 400x.
MCG-3-9-3	gx	03h09m39s	−15°51.9'		Eri	24"	buona / buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina a 2' scarsi SE; poco meglio definita scalando a 340x.
MCG-3-9-4	gx	03h11m45s	−16°55.6'		Eri	24"	buona / buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MCG-3-9-5	gx	13h12m38s	−16°41.4'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima chiazza probabilmente rotonda ed estesa non più di 30"; salta fuori in visione distolta a 1' NNE di una stellina — 450x.
MCG-3-9-6	gx	03h12m42s	−17°06.8'		Eri	24"	buona / buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
MCG-3-9-10	gx	03h13m32s	−15°15.5'		Eri	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 280x.
MCG-3-9-16	gx	03h18m10s	−16°16.5'		Eri	24"	buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MCG-3-9-20	gx	03h20m19s	−15°25.2'		Eri	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 400x.
MCG-3-9-25	gx	03h21m35s	−16°43.3'		Eri	24"	buona / buono	debole, ma facile da vedere, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
MCG-3-9-26	gx	03h21m43s	−16°44.7'		Eri	24"	buona / buono	molto debole, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' verso E — 450x.
MCG-3-9-27	gx	03h21m52s	−15°42.6'		Eri	24"	buona / buono	debolissima e molto spampanata, a tratti appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×40"; è situata tra due deboli stelline orientate da N a S e distanti ~ 3'; meglio evidente a 340x.
MCG-3-9-29	gx	03h22m18s	−17°10.8'		Eri	24"	buona / buono	debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con piccolo bulge rotondo appena percettibile; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MCG-3-9-30	gx	03h22m29s	−17°10.8'		Eri	24"	buona / buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG-3-9-31	gx	03h23m24s	−15°38.9'		Eri	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una coppia di stelline stretta e sbilanciata a 1' SW — 450x.
MCG-3-9-36	gx	03h25m07s	−15°05.0'		Eri	24"	buona / buono	molto debole e disturbata dalla SAO 148954 di 8ª grandezza situata 3' a NE; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a S — 450x.
MCG-3-9-32	gx	03h23m34s	−16°46.8'		Eri	24"	buona / buono	debole e molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 400x.
MCG-3-9-34	gx	03h24m05s	−16°18.6'		Eri	24"	m. buona / scarso	molto debole e stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso NE — 340x.
MCG-3-9-44	gx	03h27m43s	−17°00.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole e molto diffusa, solo leggermente più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante un paio di primi a NNW (la quale fa parte di un triangolo isoscele che punta a NW) — 450x.
MCG-3-10-9	gx	03h34m00s	−16°20.9'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-10-14	gx	03h37m38s	−15°42.7'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; è tuttavia preferibile scalare a 340x, perché nelle vicinanze della gx il campo è depleto (e non sono riuscito a vederla a 450x).
MCG-3-10-16	gx	03h37m51s	−14°52.9'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio evidente scalando a 340x.
MCG-3-10-24	gx	03h39m42s	−14°34.1'		Eri	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE ed estesa oltre 1' — 450x.
MCG-3-10-38	gx	03h42m31s	−16°00.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso SE — 450x.
MCG-3-10-41	gx	03h43m35s	−16°00.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso SW e un'altra poco più debole a SE; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-10-42	gx	03h44m01s	−14°21.5'		Eri	16"	ottima / ottimo	molto allungata da NE a SE con dimensioni 2'×40', poco diffusa e di luminosità uniforme; meglio osservabile a 270x (è sorta la Luna).
MCG-3-10-45	gx	03h46m38s	−16°33.0'		Eri	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta e appena più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" *(è sorta la Luna)* — 380x.
MCG-3-11-10	gx	04h05m56s	−15°09.0'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
MCG-3-11-14	gx	04h08m33s	−16°45.5'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, approssim. circolare con Ø di ~ 45"; meglio contrastata a 340x.
MCG-3-11-17	gx	04h11m07s	−14°52.2'		Cet	24"	buona / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-12-3	gx	04h21m37s	−15°59.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, approssim. rotonda con Ø di 45": c'è un piccolo triangolo molto allungato di stelline abbastanza brillanti a E — 450x.
MCG-3-12-8	gx	04h25m30s	−16°32.5'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40; è disturbata da una stellina abbastanza brillante proprio al bordo meridionale — 450x.
MCG-3-12-11	gx	04h30m52s	−16°18.4'		Eri	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, rotonda con Ø di 45", poco diffusa e di luminosità uniforme; ci sono 3 stelline allineate e quasi equidistanti subito a S — 380x.
MCG-3-13-3	gx	04h45m37s	−16°13.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	elusivo baffo di luce orientato da NE a SW ed esteso una 40-ina di secondi e che purtroppo si fatica molto a cogliere tra i bagliori di una stella brillante situata a ridosso W — 450x.
MCG-3-13-4	gx	04h45m54s	−17°16.8'		Eri	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, di aspetto non regolare a 450x, grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una debole stellina a ridosso verso W.
MCG-3-13-5	gx	04h46m08s	−17°03.8'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", con tenue bulge appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo meridionale — 450x.
MCG-3-13-6	gx	04h56m07s	−15°49.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso SE e una più debole alla stessa distanza verso NW — 450x.
MCG-3-13-8	gx	04h46m58s	−16°28.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
MCG-3-13-10	gx	04h47m34s	−17°20.8'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo E — 450x.
MCG-3-13-16	gx	04h50m14s	−17°16.0'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da E a W con dimensioni che in visione distolta arrivano a 80"×20"; presenta un tenue bulge diffuso e appena contrastato sul disco; molto sfumata alle estremità E e W; c'è una stellina brillante subito a S — 450x.
MCG-3-13-17	gx	04h51m21s	−17°30.2'	q 314	Eri	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale poco contrastata; altresì nota come ESO 552-14 (già osservata, seppure debolmente, col 16" a 270x) — 450x.
MCG-3-13-18	gx	04h51m27s	−14°57.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo ed estesa almeno 40"; è situata ~ 1' a E di una stellina; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-13-21	gx	04h53m37s	−17°55.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, estesa 10"-15"; si separa solo a momenti da ESO 552-19, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MCG-3-13-24	gx	04h54m43s	−17°27.2'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 30"-35"; osservando a 450x appare di luminosità a tratti irregolare e ciò è probabilmente dovuto al fatto che si tratta in realtà di una gx doppia: c'è infatti la MAC 0454-1727 a contatto verso SE che però non sono riuscito a separare.
MCG-3-13-26	gx	04h55m09s	−16°08.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	è una sorta di debolissima protuberanza, molto piccola che appare solo a momenti a N di MCG-3-13-27 — 450x.
MCG-3-13-27	gx	04h55m09s	−16°09.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 450x.
MCG-3-13-28	gx	04h55m31s	−15°06.0'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 45" verso S — 450x.
MCG-3-13-30	gx	04h55m37s	−15°05.8'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-3-13-31	gx	04h55m43s	−14°59.8'		Lep	24"	ottima / ottimo	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 340x, molto diffusa, rotonda con Ø simile a MCG-3-13-30.
MCG-3-13-42	gx	04h59m27s	−16°33.6'		Lep	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di almeno 1'; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-13-51	gx	05h01m32s	−16°10.0'		Lep	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20" — 450x.
MCG-3-13-52	gx	05h01m43s	−15°09.8'		Lep	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una debole stellina subito a NE — 450x.
MCG-3-13-58	gx	05h02m29s	−15°32.7'		Lep	24"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×30", ma occorre scalare a 340x (a 450x diviene confusa).
MCG-3-13-62	gx	05h04m38s	−15°46.1'		Lep	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MCG-3-13-63	gx	05h05m16s	−17°21.0'		Lep	24"	m. buona / m. buono	è una bolla circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina brillante a 1' NNE; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-13-67	gx	05h05m16s	−17°21.0'		Lep	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a NE — 450x.
MCG-3-14-1	gx	05h07m47s	−16°17.6'		Lep	16"	ottima / buono	debolissimo lucore molto diffuso e di forma indistinta; appare in visione distolta a 270x tra 2 stelline orientate da NE a SW e distanti 3': quella a SW è la più brillante.
MCG-3-14-4	gx	05h08m42s	−16°57.8'		Lep	24"	m. buona / buono	debole chiazza circolare di luminosità uniforme con Ø di 1'; c'è una stellina a 1' W; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-14-11	gx	05h15m43s	−16°06.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; qualche lieve screziatura sulla superficie appare a tratti a 450x.
MCG-3-14-17	gx	05h28m14s	−16°07.4'		Lep	16"	ottima / buono	è di aspetto simile a UA 104 rotonda con Ø di oltre 1.5', molto diffusa e di luminosità uniforme — 270x.
MCG-3-15-5	gx	05h36m14s	−16°40.2'		Lep	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa almeno 1'; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
MCG-3-15-6	gx	05h36m53s	−15°12.2'		Lep	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente; in visione distolta appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina subito a S — 450x.
MCG-3-15-8	gx	05h40m18s	−17°50.2'		Lep	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W; si trova grosso modo al centro di un piccolo gruppo di una dozzina di stelle che a ingrandimenti inferiori danno l'impressione di un ammasso aperto — 450x.
MCG-3-15-14	gx	05h47m13s	−16°39.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso E; il campo è però disturbato dalla SAO 150803 di 8ª grandezza situata 3.5' a W — 450x.
MCG-3-15-27	gx	05h54m45s	−15°08.0'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
MCG-3-16-4	gx	05h58m04s	−16°36.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue nucleo quasi stellare — 450x.
MCG-3-16-6	gx	06h00m20s	−16°10.0'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso S — 450x.
MCG-3-16-14	gx	06h05m51s	−15°39.3'		Lep	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di alone molto debole esteso ~ 1' che circonda una stellina brillante (questa ha una debole compagna a ridosso W); l'effetto è più evidente scalando a 340x.
MCG-3-16-18	gx	06h11m07s	−15°29.8'		Lep	16"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio visibile a 270x.
MCG-3-21-8	gx	08h13m06s	−16°06.6'		Pup	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; situata all'interno di un piccolo triangolo di stelle molto allungato — 450x.
MCG-3-22-2	gx	08h29m38s	−17°17.8'		Pup	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con piccolo nucleo quasi stellare; 3 stelline si trovano a ridosso della gx: una a NW, una più debole a N e una terza a E — 450x.
MCG-3-22-10	gx	08h37m34s	−06°55.9'		Hya	24"	m. buona / scarso	allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", con bulge diffuso e poco contrastato — 340x.
MCG-3-23-3	gx	08h45m50s	−17°31.9'		Pup	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' SE — 450x.
MCG-3-23-9	gx	08h50m20s	−16°34.8'		Hya	24"	m. buona / ottimo	è un tenue alone grosso modo circolare con Ø di 40"-50" che circonda una stellina brillante (evidentemente sovrapposta alla gx); facilmente visibile in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MCG-3-25-1	gx	09h31m23s	−16°34.5'		Hya	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ridosso N (fa parte di un trio orientato da N a S con componenti uguali) — 450x.
MCG-3-25-5	gx	09h33m50s	−16°59.4'		Hya	24"	ottima / buono	debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
MCG-3-25-9	gx	09h35m38s	−16°53.2'		Pup	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; meglio contrastata ed evidente scalando a 340x.
MCG-3-25-10	gx	09h35m39s	−17°23.2'		Hya	24"	m. buona / buono	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso di NE — 450x.
MCG-3-25-14	gx	09h39m06s	−17°49.7'		Hya	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
MCG-3-25-15	gx	09h42m29s	−16°58.6'		Hya	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-25-27	gx	09h53m14s	−15°58.7'		Hya	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a ridosso S e SE (la prima è poco luminosa); la SAO 155570 di 10ª grandezza si trova a poco più di 1' verso NE — 450x.
MCG-3-26-13	gx	10h02m49s	−15°49.2'		Hya	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MCG-3-26-21	gx	10h06m15s	−16°01.5'		Hya	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa per oltre 1' e orientata da NE a SW (era visibile, seppure abbastanza al limite, nel 16" in ottime condizioni di visibilità) — 450x.
MCG-3-26-30	gx	10h11m19s	−17°12.3'		Hya	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e brillante, con piccolo nucleo evidente, allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 450x.
MCG-3-27-10	gx	10h24m57s	−17°26.1'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e di luminosità a tratti irregolare, allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina brillante a 1.5' verso S e una appena percettibile a ridosso NE (quest'ultima, da un controllo successivamente effettuato, è risultato essere la MAC 1024-1725.
MCG-3-27-22	gx	10h38m46s	−16°47.0'		Hya	24"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30"; la visione è compromessa non tanto dalla φ Hydrae che bene o male si riesce a tenere fuori dal campo, quanto da una stellina brillante centrata sulla gx; una stellina appena percettibile si trova quasi a ridosso W — 450x.
MCG-3-27-24	gx	10h41m03s	−17°30.5'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e con basso gradiente di luce, orientata da NE a SW con dimensioni di 60"×45"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NE e un'altra di luminosità simile a poco più di 1' verso N; meglio evidente a 340x.
MCG-3-27-26	gx	10h42m19s	−17°38.9'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso; situata tra una stellina brillante a SE e una debole a NW orientate a perpendicolo con l'asse della gx — 450x.
MCG-3-28-1	gx	10h44m07s	−16°28.2'		Hya	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a W e l'altra più distante e poco più brillante a NW — 380x.
MCG-3-28-2	gx	10h46m02s	−17°41.3'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
MCG-3-28-3	gx	10h46m43s	−16°08.0'		Hya	16"	ottima / ottimo	poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 1' — 270x.
MCG-3-28-16	gx	10h52m16s	−17°07.8'		Crt	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NNE e un'altra debole subito a W — 450x.
MCG-3-28-17	gx	10h53m59s	−16°07.2'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline a W (la più brillante) e a NNW — 450x.
MCG-3-28-32	gx	11h03m16s	−16°45.5'		Crt	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole, orientata da N a S ed estesa 1'; disturbata da una stella brillante situata 1.5' a S — 450x.
MCG-3-30-2	gx	11h32m43s	−16°43.9'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di aspetto un po' confuso, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø < 40" — 450x.
MCG-3-30-4	gx	11h38m22s	−16°26.5'		Crt	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; è meglio evidente scalando a 340x.
MCG-3-30-7	gx	11h42m05s	−16°27.8'		Crt	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, con piccola condensazione centrale appena percettibile, allungata da E a W con dimensioni 60"×45"; c'è una coppia di stelle brillanti subito a S (più brillante quella più vicina alla gx) — 450x.
MCG-3-30-18	gx	11h54m20s	−18°57.0'		Crt	16"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 270x.
MCG-3-31-18	gx	12h03m49s	−15°48.1'		Crv	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NNE — 450x.
MCG-3-31-23	gx	12h08m11s	−15°48.2'		Crv	24"	m. buona / m. buono	allungata da N a S con dimensioni 60"×30", poco diffusa e con piccolo bulge brillante abbastanza contrastato (è più facile di MCG-2-31-19A dalla quale dista 5' a S) — 450x.
MCG-3-32-3	gx	12h20m00s	−17°23.5'		Crv	24"	m. buona / m. buono	facile e relativamente compatta, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
MCG-3-32-4	gx	12h20m13s	−17°06.8'		Crv	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a momenti in visione distolta allungata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; è meglio visibile mantenendo 450x; c'è una stellina brillante a un paio di primi NW.
MCG-3-33-15	gx	12h54m29s	−16°21.0'		Vir	16"	m. buona / discreto	è un'estesa chiazza lattescente che anche a soli 188x appare molto stemperata sul fondo cielo; approssim. rotonda con Ø di un paio di primi (è riportata sulla Uranometria come New 3) — 270x.
MCG-3-33-28	gx	13h02m26s	−17°40.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce relativamente facile da vedere, con tenue bulge diffuso abbastanza contrastato, orientata da NE a SW ed estesa un paio di primi — 450x.
MCG-3-34-3	gx	13h10m25s	−16°55.8'		Vir	24"	m. buona / discreto	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a ridosso E; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-34-4	gx	13h09m44s	−16°36.1'		Vir	24"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con tenue rigonfiamento centrale di luminosità appena superiore a quella del disco, molto allungata da E a W con dimensioni 80"×20" — 450x.
MCG-3-34-14	gx	13h12m35s	−17°32.5'		Vir	24"	buona / ottimo	relativamente compatta e appena più brillante all'interno (a prima vista pareva di luminosità uniforme), molto allungata da NW a SE con dimensioni 2'×30" — 450x.
MCG-3-34-19	gx	13h13m05s	−16°28.8'		Vir	16"	m. buona / scarso	molto debole, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, allungata da N a S e di luminosità non perfettamente uniforme — 188x.
MCG-3-34-20	gx	13h13m13s	−16°07.8'		Vir	16"	ottima / ottimo	debole lucore diffuso, di luminosità uniforme e che in visione distolta appare poco allungato da E a W con dimensioni 60"×45" — 270x.
MCG-3-34-25	gx	13h14m30s	−17°32.0'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima, ma facilmente osservabile in visione distolta a 450x, poco diffusa, orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NE.
MCG-3-34-33	gx	13h15m17s	−16°29.1'		Vir	16"	m. buona / scarso	molto debole, ma facilmente osservabile in visione distolta, rotonda, di luminosità uniforme e Ø di una 40-ina di secondi situata 6' SSW della 5044 — 188x.
MCG-3-34-38	gx	13h16m20s	−16°40.2'		Vir	16"	m. buona / scarso	è una lama di luce molto debole, orientata da NE a SW, estesa per ~ 1' e molto disturbata dalla luce di una stellina brillante situata meno di 1' a W — 188x.
MCG-3-34-40	gx	13h16m56s	−16°35.3'		Lib	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi (all'incirca come la distanza delle 2 stelline a W e SW); poco meglio contrastata a 450x.
MCG-3-34-56	gx	13h21m26s	−16°18.3'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante verso l'interno, allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso verso SW — 450x.
MCG-3-34-57	gx	13h21m37s	−16°17.1'		Vir	24"	mediocre / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di max 15" di Ø situato a ridosso SW di MCG-3-34-58 e dalla quale si separa abbastanza facilmente a 450x.
MCG-3-34-58	gx	13h21m38s	−16°16.7'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole al bordo SW e un'altra poco più evidente quasi a ridosso SE — 450x.
MCG-3-34-60	gx	13h21m46s	−16°25.2'		Vir	24"	mediocre / ottimo	molto debole e di aspetto un po' irregolare (forse per la presenza della compagna, MCG-3-34-59 che però non riesco a separare), poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" — 450x.
MCG-3-34-61	gx	13h21m51s	−17°20.2'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 60"×45" — 450x.
MCG-3-34-63	gx	13h22m19s	−16°42.5'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; forma una coppia con la successiva situata 1.5' a SE — 450x.
MCG-3-34-64	gx	13h22m24s	−16°43.7'		Vir	24"	m. buona / discreto	brillante, diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; forma una coppia con la precedente situata 1.5' a NW — 450x.
MCG-3-34-76	gx	13h26m08s	−16°31.2'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a ridosso verso W — 450x.
MCG-3-34-79	gx	13h28m00s	−16°21.3'		Vir	24"	buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue nucleo stellare — 450x.
MCG-3-34-82	gx	13h28m47s	−17°30.7'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 80"×40"; poco disturbata da una stella brillante al bordo meridionale — 450x.
MCG-3-35-3	gx	13h33m12s	−16°08.3'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole, appare in visione distolta quando si osserva MCG-3-35-4, dalla quale dista appena 1' verso SSW, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
MCG-3-35-4	gx	13h33m14s	−16°07.3'		Vir	24"	m. buona / mediocre	debole, molto diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 90"×45"; meglio contrastata scalando a 340x.
MCG-3-35-7	gx	13h36m41s	−15°59.2'		Vir	24"	buona / buono	debolissima, ma relativamente compatta, allungata grosso modo da N a S con dimensioni 30"×15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta sul lato meridionale di un piccolo triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta verso SW — 450x.
MCG-3-35-9	gx	13h26m45s	−16°56.9'		Vir	24"	buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW (fa parte di un piccolo triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta a SW) — 450x.
MCG-3-36-6	gx	14h06m18s	−16°38.5'		Vir	24"	buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra 2 stelline: una abbastanza brillante a 1' SW e l'altra più debole a poco più di 1' NE — 450x.
MCG-3-36-9	gx	14h09m19s	−17°52.7'		Vir	24"	m. buona / mediocre	poco più debole e più piccola di ESO 578-29, dalla quale dista un paio di primi a SW; è diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
MCG-3-38-25	gx	14h54m40s	−17°24.3'		Lib	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una coppia di stelline a NW: quella più brillante si trova a ridosso della gx; meglio evidente a 340x.
MCG-3-38-42	gx	15h00m09s	−16°21.9'		Lib	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e con tenue condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina subito a W e una percettibile solo a momenti a 1.5' verso NE — 450x.
MCG-3-41-2	gx	16h03m20s	−16°02.9'		Sco	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza diffusa, di luminosità uniforme e che solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 450x.
MCG-3-51-1	gx	20h01m03s	−17°03.1'		Sgr	24"	buona / discreto	molto debole e poco diffusa, appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; è molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20".
MCG-3-52-2	gx	20h22m11s	−16°47.6'		Cet	24"	buona / m. buono	debolissimo lucore esteso una 40-ina di secondi che appare solo a momenti nei bagliori di una brillante doppia dalle componenti molto strette; meglio comunque non scendere al di sotto dei 450x.
MCG-3-52-5	gx	20h25m29s	−15°51.2'		Cap	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso di NE facente parte di un piccolo asterismo a 4 componenti: quella più orientale è una doppia molto serrata — 450x.
MCG-3-52-14	gx	20h30m26s	−16°44.4'		Cap	24"	buona / discreto	piccolo e debolissimo oggetto diffuso, esteso una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma la gx è in parte disturbata da una brillante stella di magnitudo 10.5 situata 2' scarsi a NW.
MCG-3-52-20	gx	20h37m31s	−16°32.5'		Cap	16"	ottima / ottimo	piccola e relativamente compatta, con nucleo stellare ben evidente a 380x, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20".
MCG-3-53-1	gx	20h47m37s	−15°32.0'		Cap	24"	buona / discreto	debolissima chiazza diffusa e indistinta, appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; solo a momenti appare grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso; un piccolo triangolo serrato si trova a 3' NE.
MCG-3-53-7	gx	20h51m27s	−15°54.9'		Cap	16"	ottima / ottimo	debolissimo, di luminosità uniforme, si vede senza difficoltà in visione distolta a 270x; è allungata ~ da E a W con dimensioni 60"×30".
MCG-3-53-15	gx	20h59m48s	−16°38.3'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo SE — 450x.
MCG-3-53-16	gx	20h59m56s	−15°24.1'		Cap	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; è allineata con 2 stelline a NE — 450x.
MCG-3-53-19	gx	21h01m44s	−14°33.8'		Cap	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 45" — 270x.
MCG-3-53-23	gx	21h03m06s	−14°31.4'		Cap	16"	ottima / buono	minuscola righetta che appare a tratti in visione distolta a 380x quando si osserva la debole stellina situata subito a NW; è estesa max 30" e orientata da NE a SW.
MCG-3-53-24	gx	21h03m05s	−16°48.1'		Cap	16"	ottima / buono	piccolo oggetto diffuso di 20"-25" di Ø e con tenue condensazione centrale; è abbastanza evidente a 380x.
MCG-3-53-25	gx	21h03m09s	−14°31.4'		Cap	16"	ottima / buono	rotonda, poco diffusa, Ø 45" e con tenue condensazione centrale appena più evidente del disco; c'è una stellina a 1' SE — 380x.
MCG-3-53-26	gx	21h05m56s	−14°20.6'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline brillante a NE orientate da N a S e distanti 1' — 450x.
MCG-3-53-27	gx	21h06m29s	−15°26.4'		Cap	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza circolare molto diffusa e con bassissimo contrasto, tant'è che non sono praticamente riuscito a vederla a 340x; a 450x appare grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
MCG-3-55-6	gx	21h42m16s	−16°56.3'		Cap	24"	buona / discreto	debolissima chiazza diffusa e stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso N (questa stellina si trova, a sua volta, in mezzo a due stelle molto brillanti di 10ª grandezza che disturbano un poco l'osservazione) — 450x.
MCG-3-55-9	gx	21h54m04s	−16°09.4'		Cap	24"	buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con la successiva — molto debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a SE — 450x.
MCG-3-55-10	gx	21h54m09s	−16°10.2'		Cap	24"	buona / discreto	situata a ridosso E della precedente, appare come un tenuissimo baffo che si diparte verso N da una stellina brillante (la stessa situata presso la gx di prima) per poco più di 20" — 450x.
MCG-3-56-3	gx	22h00m45s	−14°53.0'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma un piccolo triangolo equilatero con due stelline a 1' N e NE — 340x.
MCG-3-56-6	gx	22h06m23s	−15°25.0'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa non più di 45"; appare con una certa difficoltà in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina a 1' verso W.
MCG-3-56-11	gx	22h13m06s	−16°38.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, più che altro disturbata dalla SAO 164930 di 10ª grandezza situata appena 1' a N; è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MCG-3-57-1	gx	22h20m13s	−15°56.9'		Aqr	16"	ottima / buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso E (sul prolungamento dell'asse della gx) — 270x.
MCG-3-57-8	gx	22h28m47s	−15°04.2'		Aqr	16"	ottima / buono	debolissima chiazza circolare di luminosità uniforme e Ø > 1'; si vede abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
MCG-3-57-12	gx	22h30m09s	−14°18.8'		Aqr	16"	ottima / buono	debolissima chiazza di 45"×30", orientata da N a S e di luminosità uniforme — 270x.
MCG-3-57-13	gx	22h30m28s	−15°00.8'		Aqr	24"	discreta / buono	v. **MCG-3-57-14**
MCG-3-57-14	gx	22h30m29s	−15°00.4'		Aqr	24"	discreta / buono	forma una coppia serrata con la precedente, ma si separano a fatica anche a 450x (a prima vista sembrano di fatto fuse in un unico oggetto orientato da N a S); la 2ª pare poco più estesa, ma comunque non più di 20".
MCG-3-57-19	gx	22h31m58s	−15°26.4'		Aqr	24"	buona / mediocre	relativamente facile, rotonda, diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale e Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
MCG-3-57-22	gx	22h34m04s	−14°19.6'		Aqr	16"	ottima / buono	debolissima, quasi elusiva, forse rotonda con Ø di ~ 40"; appare solo a momenti in visione distolta a 270x fissando la stellina situata 2' a S.
MCG-3-57-23	gx	22h35m09s	−14°52.7'		Aqr	24"	buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 400x.
MCG-3-57-24	gx	22h35m35s	−15°12.6'		Aqr	24"	buona / mediocre	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno — 400x.
MCG-3-58-6	gx	22h49m05s	−16°35.5'		Aqr	24"	buona / mediocre	piccola galassietta relativamente brillante, poco diffusa e condensata con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata dalla luce di una stellina brillante a ridosso verso NW; un'altra stellina, appena percettibile, si trova invece a ridosso SE — 400x.
MCG-3-58-8	gx	22h52m11s	−14°52.1'		Aqr	16"	ottima / buono	oggetto rotondo di 30" di Ø, poco diffuso e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ~ 45" verso W — 380x.
MCG-3-58-10	gx	22h54m02s	−15°16.5'		Aqr	24"	discreta / buono	debolissima chiazza molto diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 340x.
MCG-3-58-12	gx	22h54m57s	−16°08.0'		Aqr	16"	ottima / buono	debolissima e indistinta, si riesce a vedere in visione distolta a 270x, ma bisogna tener fuori campo la 77 Aqr di magnitudo 5.6; non dovrebbe comunque essere più estesa di 45".
MCG-3-58-13	gx	22h56m19s	−16°34.6'		Aqr	16"	ottima / buono	relativamente facile, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina un paio di primi a N — 380x.
MCG-3-58-16	gx	23h00m27s	−15°22.2'		Aqr	24"	buona / mediocre	debolissima e di luminosità uniforme, appare in visione distolta a 400x, ma non riesco a capire com'è fatta; non è comunque più estesa di 20"-25".
MCG-3-58-17	gx	23h00m33s	−14°50.0'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso NNE — 450x.
MCG-3-59-5	gx	23h21m49s	−16°43.1'		Aqr	24"	buona / mediocre	piccola, rotonda e relativamente compatta, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme. Nel campo ci sono 3 stelle brillanti: una di queste si trova proprio a 1' NNE della gx — 400x.
MCG-3-60-6	gx	23h37m13s	−16°37.5'		Aqr	24"	ottima / ottimo	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa per 1' e orientata da E a W — 450x.
MCG-3-60-11	gx	23h43m45s	−14°42.9'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	molto debole ed estesa, allungata da NW a SE con dimensioni ~ 2'×1' e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenuissimo bulge diffuso che appare tuttavia solo a tratti a 270x.
MCG-3-60-17	gx	23h48m02s	−18°35.9'		Aqr	24"	ottima / mediocre	relativamente facile, poco diffusa e più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 340x.
MCG-3-60-19	gx	23h53m45s	−14°42.9'		Aqr	24"	ottima / ottimo	è una piccola e debolissima lama di luce di luminosità uniforme che aggetta a NE di NGC 7759 per una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MCG-3-60-23	gx	23h54m21s	−17°18.3'		Aqr	24"	ottima / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MCG-4-1-24	gx	00h15m07s	−24°05.7'		Cet	24"	ottima / mediocre	debolissima, appare con difficoltà in visione distolta, in quanto ci sono poche stelline di riferimento, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 40"×20" — 340x.
MCG-4-2-3	gx	00h19m11s	−22°40.1'		Cet	24"	m. buona / scarso	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; si fatica un po' a vederla, perché sono molto poche le stelline di riferimento — 340x.
MCG-4-2-31	gx	00h38m49s	−24°13.4'		Cet	24"	m. buona / scarso	debolissima chiazza che in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø con di una 30-ina di secondi — 340x.
MCG-4-8-34	gx	03h09m51s	−24°28.7'		For	24"	discreta / mediocre	chiazza diffusa molto debole e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' SE — 340x.
MCG-4-8-43	gx	03h12m14s	−25°12.2'		For	24"	discreta / mediocre	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale — 340x.
MCG-4-8-45	gx	03h12m18s	−25°08.8'		For	24"	discreta / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 340x.
MCG-4-8-46	gx	03h12m17s	−25°17.0'		For	24"	discreta / mediocre	appare come una piccola chiazza molto debole estesa una 15-ina di secondi e situata 1.5' a NE di IC 1899 — 340x.
MCG-4-8-55	gx	03h16m21s	−25°51.3'		For	24"	discreta / mediocre	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale poco contrastata sul disco — 340x.
MCG-4-20-6	gx	08h18m40s	−25°23.1'		Pup	16"	ottima / discreto	piccolo oggetto rotondo con Ø di ~ 20", debole, ma osservabile senza difficoltà anche in visione diretta — 270x.
MCG-5-1-29	gx	00h05m03s	−27°42.9'		Scl	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MCG-5-2-20	gx	00h35m02s	−26°27.1'		Scl	24"	m. buona / scarso	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 340x.
MCG-5-8-14	gx	03h04m56s	−27°30.5'		For	24"	ottima / discreto	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso di NE e dalla quale si separa solo a momenti con difficoltà a 450x; il Megastar la riporta come ESO 417-14.
MCG-5-8-15	gx	04h04m57s	−27°30.3'		For	24"	ottima / discreto	forma una coppia serrata con la precedente; le 2 gx si separano solo a momenti a 450x e con difficoltà, in quanto la compagna è molto più debole e a 340x appare solo come una sorta di sfumatura a ridosso SW di MCG-5-8-15; quest'ultima si vede invece senza difficoltà: è rotonda poco diffusa e con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 1-2	gx	07h20m38s	−01°34.5'		Mon	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza ovale di 30"×15" orientata da NNE a SSW e molto disturbata dalla SAO 134537 di magnitudo 7.5 situata a 1' SSW; 3 deboli stelline allineate da N a S si trovano quasi a ridosso W: quella centrale è la più evidente, quella a S è percettibile solo a momenti, mentre quella più a N è in realtà una doppia molto serrata quasi irrisolta le cui componenti vanno e vengono — 580x.
CGCG 1-3	gx	07h20m41s	−01°42.2'		Mon	24"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 1-4	gx	07h23m08s	+02°46.0'		CMi	24"	buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E — 570x.
CGCG 1-6	gx	07h26m08s	+01°59.0'		CMi	24"	buona / m. buono	allungata da E a W con dimensioni 60"×30", diffusa e con tenue condensazione centrale appena più brillante del disco — 400x.
CGCG 2-4	gx	07h35m32s	+00°57.7'		CMi	24"	ottima / ottimo	debolissimo lucore appena percettibile e di forma indistinta situato a ridosso della componente SE di una coppia di stelline di 13-esima distanti una 40-ina di secondi; questa stellina presenta una sorta di "peduncolo" che è in realtà costituito da una coppia serrata di stelline molto deboli; la gx appare appena in visione distolta attorno a questa coppia, ma è preferibile spingere a 580x.
CGCG 2-6	gx	07h39m43s	−02°37.3'		Mon	24"	buona / m. buono	debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 570x, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra 2 stelline distanti 1' e orientate da NE a SW: la gx è un poco spostata verso quella di SW.
CGCG 2-8	gx	07h41m50s	−02°41.3'		Mon	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole orientata da NW a SE ed estesa 1', con nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina a ridosso NW a "metà" gx — 450x.
CGCG 2-12	gx	07h46m28s	+01°57.5'		CMi	24"	m. buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, appare a momenti allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a meno di 1' SE — 450x.
CGCG 2-16	gx	07h48m49s	−01°42.1'		Mon	24"	ottima / ottimo	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia serrata di stelline quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 2-18	gx	07h51m51s	+02°48.9'		CMi	16"	m. buona / ottimo	è facile a 380x, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno.
CGCG 2-19	gx	07h53m21s	−00°28.0'		Mon	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una doppia abbastanza stretta a un paio di primi NW — 450x.

CGCG 3-1	gx	07h57m36s	−01°33.1'		Mon	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 3-3	gx	08h00m57s	+02°17.6'		CMi	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' N — 450x.
CGCG 3-8	gx	08h05m44s	−03°33.0'		Mon	24"	buona / buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 400x.
CGCG 3-9	gx	08h06m10s	−03°16.9'		Mon	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina brillante proprio al bordo orientale — 400x.
CGCG 3-16	gx	08h12m27s	−01°25.7'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a meno di 1' S e un'altra poco più evidente alla stessa distanza verso E — 450x.
CGCG 3-20	gx	08h14m52s	+00°04.0'		Hya	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
CGCG 3-21	gx	08h16m36s	−02°59.2'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno; allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina subito a S e un'altra appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso SW — 450x.
CGCG 3-22	gx	08h16m38s	−00°24.2'		Hya	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, a tratti condensata, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 3-24	gx	08h17m07s	−00°51.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 3-26	gx	08h17m39s	+00°39.7'		Hya	24"	discreta / m. buono	debolissima e molto piccola, appare solo a momenti in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø < 20"; si trova subito a S di un piccolo asterismo di 4' stelline foggiato a "Y".
CGCG 3-27	gx	08h17m41s	−00°52.9'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 3-29	gx	08h17m59s	+02°12.1'		Hya	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue nucleo quasi stellare — 450x.
CGCG 4-4	gx	08h22m29s	−01°06.2'		Hya	24"	buona / buono	è difficilissima e appare solo a tratti in visione distolta come una lieve asimmetria nell'alone attorno a una stella brillante — 280x.
CGCG 4-8	gx	08h22m56s	−00°22.2'		Hya	24"	ottima / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 30"×15", con piccolo bulge visibile, ma poco contrastato; la gx è un po' disturbata da una stellina brillante a ridosso verso N — 450x.
CGCG 4-11	gx	08h23m58s	−00°18.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ~ 30" SW — 450x.
CGCG 4-12	gx	08h24m10s	−00°19.2'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø poco maggiore di 20" — 450x.
CGCG 4-13	gx	08h24m03s	−00°22.3'		Hya	24"	buona / discreto	molto allungata da NW a SE, dimensioni 30"×10" e con piccolo bulge abbastanza evidente — 450x.
CGCG 4-18	gx	08h24m48s	−02°51.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, allineata ed equidistante con due stelline a W — 450x.
CGCG 4-21	gx	08h25m10s	−02°34.1'		Hya	24"	ottima / m. buono	è una piccola chiazza molto debole e diffusa che aggetta a NE di una stellina; è approssim. circolare con Ø < 30" — 450x.
CGCG 4-23	gx	08h25m23s	+01°59.2'		Hya	24"	ottima / m. buono	piccola e debole, poco diffusa, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 4-24	gx	08h25m39s	+01°57.1'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, molto disturbata da una stellina brillante situata a 1' SSW e da un'altra più debole subito a N; in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 4-26	gx	08h26m54s	+00°01.6'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e con nucleo stellare visibile a momenti, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 4-27	gx	08h27m11s	−01°04.0'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto piccola debole, relativamente compatta e condensata, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 4-29	gx	08h27m32s	−01°37.5'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; appare senza in visione distolta a 450x; situata a ridosso E di tre stelline allineate ed equidistanti in direzione N-S.
CGCG 4-30	gx	08h27m32s	−01°33.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge quasi stellare; c'è un piccolo triangolo schiacciato di deboli stelline a SW — 450x.
CGCG 4-35	gx	08h28m18s	+00°17.3'		Hya	24"	buona / discreto	relativamente facile, ma molto disturbata dalla SAO 116796 di 7ª e di color ambra e che è situata ad appena 2.5' SSW; allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e nucleo stellare — 450x.
CGCG 4-36	gx	08h28m55s	+00°33.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una doppia stretta a 1' SW — 450x.
CGCG 4-38	gx	08h29m41s	−01°08.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 4-40	gx	08h30m14s	−02°52.8'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare abbastanza evidente a 450x; c'è una stellina subito a N e un'altra di luminosità simile a 1' verso E.
CGCG 4-47	gx	08h32m25s	−03°12.5'		Hya	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 0832-0312 situata a ridosso NE — piccola, relativamente facile e compatta, con condensazione centrale abbastanza evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso verso NW — 450x.
CGCG 4-48	gx	08h32m29s	−00°54.2'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è disturbata da un asterismo di 4 stelle brillanti situato subito a S: meglio spingere a 580x.
CGCG 4-51	gx	08h33m04s	−02°31.9'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 4-52	gx	08h33m20s	−03°30.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 4-53	gx	08h33m18s	−02°30.9'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 4-60	gx	08h34m32s	+00°11.5'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 4-61	gx	08h35m01s	−03°36.1'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 4-62	gx	08h35m06s	−03°05.8'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 4-63	gx	08h35m04s	−02°57.9'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 4-65	gx	08h35m22s	−02°35.2'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 4-70	gx	08h35m38s	−02°57.2'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
CGCG 4-71	gx	08h35m42s	−01°45.4'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
CGCG 4-72	gx	08h35m47s	−01°56.6'		Hya	24"	buona / discreto	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 45" verso NW — 450x.
CGCG 4-76	gx	08h35m55s	−02°57.3'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 20" e una condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 4-78	gx	08h36m03s	+01°19.8'		Hya	24"	ottima / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 4-86	gx	08h36m59s	+01°47.5'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; è un poco disturbata da una stellina brillante situata a meno di 1' verso NW — 450x.
CGCG 4-87	gx	08h37m14s	−03°21.7'		Hya	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso W — 450x.
CGCG 4-88	gx	08h37m41s	−03°12.4'		Hya	24"	buona / discreto	piccola e molto debole, approssim. rotonda con Ø di 15" o 20", disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 4-89	gx	08h37m45s	−00°51.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a E — 450x.
CGCG 4-93	gx	08h38m00s	−02°41.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 4-95	gx	08h38m14s	+00°21.1'		Hya	24"	ottima / m. buono	debolissima, appare solo a momenti subito a W di una stellina, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 3' verso S che disturba l'osservazione — 450x.
CGCG 4-98	gx	08h38m52s	+01°23.9'		Hya	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con PGC 1193897 situata a ridosso NW — piccola, poco diffusa e con condensazione stellare abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a W; c'è un asterismo molto allungato da NNE a SSW formato di 6 stelle brillanti (quella più meridionale è una doppia stretta) 5' o 6' a N della coppia — 450x.
CGCG 4-99	gx	08h39m06s	−02°22.0'		Hya	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' verso W — 450x.
CGCG 4-100	gx	08h39m05s	−02°16.8'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 4-103	gx	08h39m56s	−02°46.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto piccola, rotonda con Ø < 20", diffusa e con condensazione stellare; c'è una stellina a ridosso SE e una a ~ 30" verso S — 450x.
CGCG 4-105	gx	08h40m31s	+02°11.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo meridionale; gx e stellina si trovano sull'ipotenusa di un piccolo triangolo rettangolo formato da 3 stelline brillanti — 450x.
CGCG 4-107	gx	08h42m40s	−00°33.8'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 5-8	gx	08h48m19s	−03°01.2'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a 1' verso SE — 400x.
CGCG 5-9	gx	08h48m18s	−02°58.4'		Hya	24"	buona / discreto	debolissima e di aspetto indistinto, estesa comunque meno di 30"; appare in visione distolta a 1' SE di una stellina — 400x.
CGCG 5-15	gx	08h50m32s	−03°06.0'		Hya	24"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, piccola e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 570x.
CGCG 5-13	gx	08h49m46s	+01°00.6'		Hya	24"	m. buona / m. buono	è un piccolo e debolissimo lucore indistinto, esteso una 20-ina di secondi situato quasi mezzo (un poco spostato verso S) a 2 stelline orientate da E a W: più a ridosso di quella orientale — 450x.
CGCG 5-16	gx	08h50m43s	+01°21.0'		Hya	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
CGCG 5-21	gx	08h52m46s	−01°48.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza orientata da NE a SW e racchiusa tra due stelline che ne confondono un po' la forma e che sono orientate nello stesso modo; in visione distolta appare estesa 45"-50", ma è poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 5-22	gx	08h52m46s	−01°48.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; solo a momenti appare un tenuissimo nodulo al bordo W come se la gx tentasse di allungarsi in quella direzione; tuttavia, un controllo successivamente effettuato ha confermato la presenza dell'elusiva compagna che è risultata essere la **MAC 0853-0138** — 450x e 580x.
CGCG 5-23	gx	08h53m41s	+01°33.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 5-24	gx	08h54m08s	+00°29.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 5-28	gx	08h55m12s	−02°16.1'		Hya	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 5-29	gx	08h55m24s	+00°51.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; si trova tra 2 deboli stelline orientate da E a W e distanti 1.5' — 450x.
CGCG 5-32	gx	08h55m48s	+00°47.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 5-37	gx	08h56m18s	−01°38.1'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi e osservabile solo a 450x; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
CGCG 5-38	gx	08h56m19s	−00°26.5'		Hya	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; situata a ridosso verso N di un piccolo triangolo rettangolo di stelline deboli: quella più a E è appena percettibile — 450x.
CGCG 5-42	gx	08h57m47s	−00°12.0'		Hya	24"	buona / discreto	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante al centro; situata all'interno di un triangolo isoscele di deboli stelline: quella a S è una doppia larga — 450x.
CGCG 5-43	gx	08h58m28s	+00°01.4'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 5-44	gx	08h59m01s	−01°46.5'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NNW; forma un piccolo triangolo isoscele molto aperto con 2 stelline brillanti a E — 450x.
CGCG 5-45	gx	08h59m19s	+00°47.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 5-49	gx	09h02m20s	−01°04.7'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 5-50	gx	09h03m24s	−02°34.5'		Hya	24"	buona / ottimo	piccola, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
CGCG 5-51	gx	09h22m47s	−01°22.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' SE — 450x.
CGCG 6-8	gx	09h09m17s	−01°10.0'		Hya	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso E e una più debole più o meno alla stessa distanza verso SW — 450x.
CGCG 6-10	gx	09h09m29s	−01°10.6'		Hya	24"	m. buona / ottimo	di aspetto e dimensioni simili a CGCG 6-8, dalla quale dista 3' a ESE; è solo leggermente più debole e diffusa — 450x.
CGCG 6-11	gx	09h11m25s	−02°52.9'		Hya	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, appare tutto sommato abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme.
CGCG 6-12	gx	09h11m34s	−03°32.2'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 6-15	gx	09h12m49s	+01°58.7'		Hya	24"	m. buona / buono	debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso poco più di 20" secondi, poco disturbato da una stellina quasi a ridosso SW; appare solo a momenti, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 6-16	gx	09h13m04s	+02°02.3'		Hya	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 6-17	gx	09h13m16s	+01°52.0'		Hya	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 450x.
CGCG 6-19	gx	09h14m12s	−02°27.7'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 6-20	gx	09h14m20s	−02°47.0'		Hya	24"	m. buona / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta a ~ 1' S di una stellina; forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
CGCG 6-23	gx	09h16m14s	+00°42.0'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente anche in visione diretta, ma occorre tenere fuori campo la SAO 117553 di magnitudo 6.5 situata 7' a ENE; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 6-24	gx	09h16m42s	+00°12.3'		Hya	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 6-25	gx	09h16m50s	+00°34.3'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 6-29	gx	09h19m55s	+00°56.7'		Hya	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza marcata, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso SE — 450x.
CGCG 6-30	gx	09h20m00s	+00°55.8'		Hya	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole, diffusa, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a NW — 450x.
CGCG 6-32	gx	09h20m26s	−01°01.1'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 6-33	gx	09h20m37s	−00°40.8'		Hya	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra 2 stelline distanti 2.5' e orientate da N a S — 450x.
CGCG 6-35	gx	09h22m57s	+01°26.0'		Mon	24"	buona / m. buono	facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante al bordo NW — 570x.
CGCG 6-37	gx	09h23m19s	+01°35.0'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 6-39	gx	09h23m43s	+01°21.0'		Hya	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 400x.
CGCG 6-40	gx	09h23m48s	+02°06.8'		Hya	24"	buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di 45" (ossia poco inferiore a quello di NGC 2861 situata 3' NW: quest'ultima è pure rotonda, con Ø poco superiore a 1', gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo quasi stellare); meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 6-41	gx	09h24m05s	+02°07.3'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15".
CGCG 7-5	gx	09h34m39s	+00°41.3'		Hya	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa 45" in direzione NE-SW; c'è una stellina a ridosso SE che è quasi allineata con altre 2 stelline più brillanti a N distanti una 30-ina di secondi; meglio evidente spingendo a 580x.
CGCG 7-7	gx	09h36m26s	−00°34.2'		Hya	24"	buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 400x a meno di 1' N di una stellina (la quale fa parte di un pentagono fatto a casetta); approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 7-9	gx	09h36m35s	+01°07.0'		Hya	24"	buona / ottimo	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 400x.
CGCG 7-11	gx	09h36m39s	+01°15.0'		Hya	24"	buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di 15" o 20" di Ø; salta fuori in visione distolta a 570x osservando la stellina situata a 1' SW.
CGCG 7-12	gx	09h36m53s	−02°34.0'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo meridionale; la visione è però disturbata da una stellina brillante situata quasi a ridosso N della gx — 450x.
CGCG 7-23	gx	09h43m03s	−02°15.1'		Sex	24"	buona / discreto	piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata all'interno di un asterismo di 4 stelle brillanti (più una coppia serrata a NE) — 450x.
CGCG 7-34	gx	09h47m12s	+00°42.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 7-35	gx	09h47m14s	+00°39.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; una stellina brillante subito a N disturba un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 7-38	gx	09h48m18s	−03°44.0'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; è allineata ed equidistante con 2 stelline situate a SSE: quella più vicina alla gx è molto debole — 450x.
CGCG 7-45	gx	09h50m26s	+01°35.0'		Sex	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E — 380x.
CGCG 7-47	gx	09h51m35s	+01°06.7'		Sex	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
CGCG 7-48	gx	09h52m12s	+01°05.7'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e con piccola condensazione centrale relativamente marcata, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 400x.
CGCG 7-53	gx	09h52m44s	−00°03.5'		Sex	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a SW; meglio evidente a 580x.
CGCG 7-57	gx	09h54m06s	+00°39.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta quando si fissa la successiva dalla quale dista un paio di primi verso WNW; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 7-58	gx	09h54m14s	+00°38.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 8-3	gx	09h56m33s	+01°50.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S; quest'ultima ha una compagna appena percettibile a ridosso N, ma da un controllo successivo effettuato è risultata essere la PGC 1207472 — 450x.
CGCG 8-4	gx	09h57m19s	−02°24.9'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 8-5	gx	09h58m31s	−02°49.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 8-8	gx	09h59m26s	−00°15.2'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; a tratti appare una condensazione centrale molto tenue — 400x.
CGCG 8-10	gx	09h59m43s	−02°09.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 8-13	gx	10h00m10s	+02°09.3'		Sex	24"	buona / ottimo	piccola galassietta diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø max di 20"; è situata a ridosso W di una stellina brillante — 570x.
CGCG 8-14	gx	10h00m20s	+00°30.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 8-15	gx	10h00m24s	+00°42.3'		Sex	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 8-18	gx	10h00m41s	−02°57.4'		Sex	24"	ottima / buono	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a 1' NE — 450x.
CGCG 8-20	gx	10h00m48s	+01°14.2'		Sex	24"	ottima / buono	debolissima e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a S; la gx è quasi allineata ed equidistante con 2 stelline a SW — 450x.
CGCG 8-23	gx	10h01m12s	+00°19.7'		Sex	24"	buona / ottimo	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 8-27	gx	10h02m31s	+00°18.4'		Sex	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso di NE — 450x.
CGCG 8-30	gx	10h03m57s	+01°30.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina a 1.5' verso S e un'altra percettibile solo a momenti a ridosso SE — 450x.
CGCG 8-31	gx	10h04m24s	−02°25.5'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline: una a 2.5' SW e l'altra, più debole, a 2' NW — 400x.
CGCG 8-33	gx	10h04m39s	+01°53.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 8-34	gx	10h05m24s	+00°32.6'		Sex	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a 1' E — 380x.
CGCG 8-36	gx	10h05m47s	+02°14.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 8-40	gx	10h06m55s	−01°14.0'		Sex	24"	m. buona / discreto	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a NE — 400x.
CGCG 8-43	gx	10h07m51s	−03°29.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 8-44	gx	10h07m52s	+00°18.1'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 570x.
CGCG 8-46	gx	10h07m56s	+00°16.4'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 570x.
CGCG 8-48	gx	10h08m29s	+00°22.1'		Sex	24"	buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare — 570x.
CGCG 8-50	gx	10h08m48s	−00°16.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un tenue nucleo stellare — 450x.
CGCG 8-51	gx	10h09m51s	+01°13.4'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
CGCG 8-52	gx	10h09m56s	−02°50.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; disturbata da una stellina brillante situata quasi a ridosso N — 450x.
CGCG 8-55	gx	10h10m31s	−01°48.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 8-56	gx	10h10m41s	−02°26.0'		Sex	24"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a meno di 1' verso SW — 400x.
CGCG 8-57	gx	10h10m39s	−02°02.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 8-59	gx	10h11m07s	−00°02.5'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE; è osservabile in visione distolta a 450x (altresì nota come Hickson 43B).
CGCG 8-60	gx	10h11m05s	+01°13.4'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina a 1' verso S — 570x.
CGCG 8-61	gx	10h11m13s	−00°04.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (altresì nota come **Hickson 43C**) — 450x.
CGCG 8-62	gx	10h11m20s	−00°01.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a NE (altresì nota come Hickson 43A) — 450x.
CGCG 8-64	gx	10h11m44s	−02°43.9'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stella a NNE — 400x.
CGCG 8-65	gx	10h11m53s	−00°03.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 8-66	gx	10h12m02s	−02°08.7'		Sex	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, con una tenue condensazione centrale meglio visibile scalando a 340x; la gx è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; si trova al vertice rettangolo formato con 2 stelline: una a 1' verso N e l'altra poco più debole e distante a E — 450x.
CGCG 8-69	gx	10h12m46s	−02°38.1'		Sex	24"	m. buona / discreto	assieme a CGCG 8-70 e CGCG 8-71 forma un piccolo triangolo equilatero di galassiette che si osservano meglio a 340x — rotonda, poco diffusa, con condensazione centrale appena accennata e con Ø > 30".
CGCG 8-70	gx	10h12m48s	−02°41.4'		Sex	24"	m. buona / discreto	è la più brillante del terzetto formato dalla precedente e dalla successiva, allungata da N a S con dimensioni 45"×30", diffusa e poco più brillante all'interno — 450x.
CGCG 8-71	gx	10h13m00s	−02°39.6'		Sex	24"	m. buona / discreto	fa parte di un terzetto assieme alle due precedenti — diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e con basso gradiente di luce — 450x.
CGCG 8-72	gx	10h13m17s	−02°31.8'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
CGCG 8-73	gx	10h03m32s	−03°10.1'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø > 30"; è situata al margine NW di un piccolo asterismo di 6 stelline brillanti poste a doppio arco con la concavità rivolta a S — 450x.
CGCG 8-77	gx	10h13m47s	−00°54.8'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (fa parte dell'ammasso **AGC 957**) — 450x.
CGCG 8-80	gx	10h14m46s	−02°11.7'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata sul lato N di un piccolo asterismo foggiato a trapezio irregolare formato da stelline di 14-esima — 450x.
CGCG 8-81	gx	10h14m46s	−00°20.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 8-82	gx	10h14m50s	−01°23.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 8-84	gx	10h16m55s	−02°29.7'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; allineata ed equidistante con due stelline a E — 450x.
CGCG 8-86	gx	10h17m46s	−02°22.3'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una stellina percettibile solo a momenti appare a ridosso NW, ma da un controllo successivo è risultata in realtà essere la PGC 1094035 — 450x.
CGCG 8-91	gx	10h18m57s	+01°39.6'		Sex	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole e diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 9-1	gx	10h19m33s	−03°20.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; forma una coppia ravvicinata con MAC 1019-0319 situata una 40-ina di secondi a NW — 450x.
CGCG 9-5	gx	10h21m18s	−00°33.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 9-7	gx	10h21m40s	−03°27.2'		Sex	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante, piccola, compatta e condensata, rotonda con Ø max di 20" — 450x.
CGCG 9-9	gx	10h21m51s	+00°24.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a SW (quella centrale di 3 stelline allineate in direzione NW-SE) — 450x.
CGCG 9-11	gx	10h22m31s	+00°41.6'		Sex	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 9-12	gx	10h22m36s	−03°37.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 9-14	gx	10h23m04s	−03°37.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 9-15	gx	10h23m13s	−03°14.0'		Sex	24"	m. buona / discreto	fa parte di un terzetto assieme a CGCG 9-16 e CGCG 9-17 — piccola, relativamente brillante e compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 400x.
CGCG 9-16	gx	10h23m24s	−03°23.3'		Sex	24"	m buona / discreto	fa parte di un terzetto assieme alla precedente e alla successiva — molto debole, piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 400x.
CGCG 9-17	gx	10h23m29s	−02°10.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	fa parte di un terzetto assieme alle due precedenti — debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, anche se occorre tenere fuori campo la SAO 137537 di 7ª grandezza situata 8' a SE; è diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 9-18	gx	10h23m56s	−03°11.0'		Sex	24"	m. buona / discreto	la più facile del terzetto — allungata da NW a SE con dimensioni 90"×45", poco diffusa e di luminosità uniforme; quando l'aria si calma appare a tratti screziata a 400x.
CGCG 9-17	gx	10h23m29s	−02°10.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, anche se occorre tenere fuori campo la SAO 137537 di 7ª grandezza situata 8' a SE; è diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 9-19	gx	10h24m08s	+00°08.5'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena più evidente del disco — 450x.
CGCG 9-22	gx	10h24m39s	−02°19.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1' verso SW — 450x.
CGCG 9-28	gx	10h25m42s	+00°45.8'		Sex	24"	ottima / buono	poco più evidente ed estesa di CGCG 9-22, sempre rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 9-29	gx	10h25m45s	+01°26.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e a tratti leggermente condensata; è situata sul cateto maggiore di un piccolo triangolo rettangolo di stelline di luminosità decrescente a partire da quella al vertice occidentale che è la più brillante — 450x.
CGCG 9-31	gx	10h26m06s	−03°24.8'		Sex	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25" (ossia poco maggiori di CGCG 9-11) — 450x.
CGCG 9-34	gx	10h26m21s	+00°41.1'		Sex	24"	ottima / buono	di aspetto e dimensioni simili a CGCG 9-28 ; c'è una stella brillante a 1.5' verso ESE — 450x.
CGCG 9-36	gx	10h26m35s	−02°49.8'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
CGCG 9-40	gx	10h26m54s	−03°13.8'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a 1' WNW e una appena percettibile alla stessa distanza verso S — 450x.
CGCG 9-41	gx	10h26m54s	−00°32.5'		Sex	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x.
CGCG 9-42	gx	10h27m10s	−03°19.1'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale molto tenue; tra questa gx e la CGCG 9-45 situata 1.5' a SE c'è una stellina molto debole — 450x.
CGCG 9-44	gx	10h27m07s	+01°29.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la visione è un po' disturbata dalla SAO 118309 di 10ª grandezza situata poco più di 2' a NE — 450x.
CGCG 9-45	gx	10h27m15s	−03°20.2'		Sex	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; tra questa gx e la CGCG 9-42 situata 1.5' a NW c'è una stellina molto debole — 450x.
CGCG 9-47	gx	10h27m19s	−03°11.1'		Sex	24"	m. buona / buono	debole e poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 9-48	gx	10h27m25s	+01°14.5'		Sex	24"	m. buona / buono	fa parte del terzetto di UGC 5667, dalla quale dista 1.5' verso SW — molto piccola e debole, relativamente compatta e a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 9-51	gx	10h27m31s	−01°19.5'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 9-52	gx	10h28m28s	−03°14.6'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" (di aspetto simile a CGCG 9-47 osservata precedentemente); situata praticamente sul cateto maggiore orientale di un piccolo triangolo rettangolo di stelline abbastanza brillanti — 450x.
CGCG 9-53	gx	10h28m37s	−01°57.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
CGCG 9-55	gx	10h29m14s	−02°30.8'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a "y" subito a W — 450x.
CGCG 9-56	gx	10h29m14s	−02°01.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 450x.
CGCG 9-57	gx	10h29m25s	−03°44.8'		Sex	16"	m. buona / ottimo	è un'elusiva macchiolina estesa 15" o 20", a tratti condensata, che salta fuori in visione distolta a 380x.
CGCG 9-58	gx	10h29m30s	−03°45.7'		Sex	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' verso S e un'altra più debole a oltre 1' SE — 380x.
CGCG 9-61	gx	10h29m55s	−03°14.1'		Sex	24"	buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
CGCG 9-62	gx	10h30m11s	−03°09.8'		Sex	24"	buona / m. buono	molto diffusa e con evidente condensazione centrale, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45" — 400x.
CGCG 9-64	gx	10h30m15s	−02°20.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina subito a SW e una più evidente a poco più di 1.5' verso E — 450x.
CGCG 9-66	gx	10h30m28s	−03°11.7'		Sex	24"	buona / m. buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelline a ridosso verso E — 570x.
CGCG 9-67	gx	10h30m31s	−02°48.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo; meglio contrastata scalando a 340x, ma è difficile a prima vista stabilirne la forma; a momenti appare comunque grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
CGCG 9-68	gx	10h30m43s	−01°49.6'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina al bordo S; subito a W c'è una coppia di stelline brillanti — 450x.
CGCG 9-69	gx	10h30m47s	−02°45.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 9-70	gx	10h30m51s	−02°43.2'		Sex	24"	m. buona / buono	più facile di CGCG 9-69, dalla quale dista un paio di primi a NNE, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 9-73	gx	10h31m48s	−02°42.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 9-74	gx	10h32m05s	−02°26.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 9-76	gx	10h32m17s	−01°33.3'		Sex	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 9-78	gx	10h33m03s	−02°05.1'		Sex	24"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 9-79	gx	10h33m41s	−02°15.9'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; situata a ridosso E di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 9-81	gx	10h34m01s	−02°22.0'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 9-85	gx	10h36m34s	−01°15.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente, orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; si trova quasi nel mezzo di 2 stelle brillanti distanti un paio di primi in direzione N-S — 450x.
CGCG 9-88	gx	10h37m30s	−02°44.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.

CGCG 9-90	gx	10h38m09s	−02°38.4'		Sex	24"	buona / m. buono	più facile di UGC 5787, dalla quale dista 6' verso SW, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso SW — 570x.
CGCG 9-96	gx	10h40m51s	−02°17.9'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; ci sono 2 stelline brillanti a E (fanno parte di un piccolo asterismo di 4 componenti orientato da N a S e foggiato a "y") — 450x.
CGCG 9-98	gx	10h41m06s	−02°57.8'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 9-99	gx	10h41m13s	−02°48.2'		Sex	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; è situata a ridosso W di un piccolo triangolo irregolare di stelline abbastanza brillanti — 450x.
CGCG 10-2	gx	10h43m58s	+01°56.1'		Sex	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza estesa 30"-35" e di aspetto un po' confuso, solo a tratti vagamente circolare; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 10-6	gx	10h45m46s	+01°59.8'		Sex	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 10-10	gx	10h46m22s	−02°17.2'		Sex	24"	m. buona / buono	rotonda con Ø < 30", poco diffusa e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
CGCG 10-11	gx	10h46m28s	−02°43.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale appena accennata — 450x.
CGCG 10-13	gx	10h47m08s	−02°21.5'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 10-16	gx	10h47m54s	+00°48.7'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a meno di 1' NE — 450x.
CGCG 10-17	gx	10h48m05s	−01°55.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; è situata in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti distanti 6' e orientate come la galassia — 450x.
CGCG 10-23	gx	10h49m06s	+02°13.5'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (c'è un trio di stelle brillanti equidistanti e arcuato a S) — 450x.
CGCG 10-24	gx	10h49m11s	+00°22.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e a tratti condensata, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 10-25	gx	10h49m21s	−00°40.0'		Sex	16"	m. buona / ottimo	è poco più piccola di UGC 5922, dalla quale dista 5' a ESE, ma forse appena più evidente, perché possiede una piccola condensazione centrale, per quanto tenue; rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 10-26	gx	10h49m17s	+00°19.8'		Sex	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
CGCG 10-27	gx	10h49m41s	+00°21.8'		Sex	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di 45" diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare brillante — 450x.
CGCG 10-28	gx	10h49m50s	+01°12.3'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, con condensazione centrale appena percettibile, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" — 450x.
CGCG 10-30	gx	10h49m59s	+00°19.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 10-31	gx	10h49m59s	+00°21.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 10-33	gx	10h50m21s	−03°27.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; quasi allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti situate a N — 450x.
CGCG 10-36	gx	10h51m11s	−03°36.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge ben evidente — 450x.
CGCG 10-37	gx	10h51m25s	−03°43.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e poco diffusa — 380x.
CGCG 10-40	gx	10h52m10s	−02°24.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 40"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso NE — 380x.
CGCG 10-41	gx	10h52m49s	+00°02.1'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è meglio scalare poiché situata in una piccola zona depleta — 340x.
CGCG 10-45	gx	10h57m52s	+01°40.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 10-46	gx	10h58m10s	−00°46.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 10-51	gx	10h58m57s	+01°26.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con condensazione centrale puntiforme, a prima vista rotonda, ma a 450x appare effettivamente orientata da E a W con dimensioni 30"×20".
CGCG 10-52	gx	10h59m06s	+01°10.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; stellina abbastanza brillante a 1' NE — 450x.
CGCG 10-54	gx	10h59m11s	+01°48.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
CGCG 10-55	gx	10h59m18s	+01°09.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con evidente condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 40" verso S — 450x.
CGCG 10-58	gx	11h00m02s	+01°46.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	diffusa con nucleo stellare abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 10-60	gx	11h00m38s	−02°53.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole e diffusa, situata a ridosso W di una stellina abbastanza brillante che mi impedisce di capirne la forma; grosso modo rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 10-62	gx	11h01m26s	−02°12.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 10-63	gx	11h02m29s	−03°39.3'		Leo	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 10-64	gx	11h03m33s	−01°30.6'		Leo	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; immersa nella luce della SAO 137967 di 9ª grandezza situata ad appena 1.5' verso NNW — 450x.
CGCG 10-65	gx	11h03m35s	−01°23.5'		Leo	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø analogo a CGCG 10-64 ; c'è una stellina a poco più di 1' NW — 450x.
CGCG 10-66	gx	11h03m49s	−00°12.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e poco diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 10-68	gx	11h04m32s	−00°44.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, estesa 10"-15"; disturbata da una stella brillante situata 1' scarso a NNE — 450x.
CGCG 10-70	gx	11h04m41s	−01°32.5'		Leo	24"	ottima / ottimo	presenta un nucleo stellare marcato circonfuso da un alone molto tenue, rotondo con Ø <40" e stemperato sul fondo cielo — 450x.
CGCG 10-71	gx	11h05m09s	−00°47.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; è allineata e quasi equidistante con 2 stelline a SE: quella più vicina alla gx è più evidente — 450x.
CGCG 10-73	gx	11h05m43s	−01°30.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 10-76	gx	11h06m33s	+00°16.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; allineata ed equidistante con due stelline a SW: quella più vicina alla gx è debole — 450x.
CGCG 10-77	gx	11h06m46s	−02°31.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso E — 450x.
CGCG 10-78	gx	11h07m20s	−02°32.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	più facile e più piccola di CGCG 10-77, dalla quale dista 8.5' a ESE, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 11-2	gx	11h07m55s	+02°00.8'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 400x.
CGCG 11-3	gx	11h07m58s	+02°02.9'		Leo	24"	buona / m. buono	poco più evidente di CGCG 11-2 dalla quale dista un paio di primi verso N; approssim. rotonda con Ø < 30" e tenue nucleo stellare — 400x.
CGCG 11-4	gx	11h08m40s	+00°16.0'		Leo	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina al bordo NE — 450x.
CGCG 11-5	gx	11h08m41s	+00°23.5'		Leo	24"	ottima / ottimo	più facile di CGCG 11-4, dalla quale dista 7.5' verso N, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø inferiore a 30" — 450x.
CGCG 11-6	gx	11h08m38s	+01°52.5'		Leo	24"	m. buona / buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 11-7	gx	11h09m08s	+00°42.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 11-8	gx	11h09m20s	−00°51.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 11-11	gx	11h09m38s	−00°49.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; equidistante, anche se non allineata, con 2 stelline brillanti a S — 450x.
CGCG 11-12	gx	11h09m41s	−03°39.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 11-13	gx	11h09m46s	+00°48.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 11-17	gx	11h10m44s	+01°13.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; meglio evidente a spingendo a 580x.
CGCG 11-18	gx	11h10m55s	+01°05.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, situata a NW di un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a "y"; in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; poco meglio evidente a e contrastata scalando a 340x.
CGCG 11-19	gx	11h10m58s	−03°34.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da NE a SW ed estesa 1', a tratti appena più brillante al centro — 450x.
CGCG 11-22	gx	11h11m43s	−02°27.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	fa parte di un terzetto assieme alle 2 successive — debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30"; situata quasi a ridosso NE di una stellina brillante — 450x.
CGCG 11-23	gx	11h12m09s	−02°20.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	è forse la più facile del terzetto cui appartengono la precedente e la successiva — rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 11-24	gx	11h12m12s	−02°23.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	è la più difficile del terzetto cui appartengono le 2 precedenti — molto deboli e piccola, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 11-25	gx	11h12m33s	+01°27.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 11-26	gx	11h12m56s	+00°09.9'		Leo	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø <30" — 450x.
CGCG 11-27	gx	11h13m05s	+00°00.2'		Leo	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 11-28	gx	11h13m41s	−02°36.5'		Leo	16"	m. buona / m. buono	debolissima gx rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta a poco più di 1' a NW di una stellina — 270x.
CGCG 11-29	gx	11h13m58s	−00°44.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE e un'altra appena percettibile a 1' verso E; forma una coppia ravvicinata con PGC 1135989 situata quasi a ridosso NE (v. voce corrispondente) — 450x.
CGCG 11-30	gx	11h14m46s	−02°07.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 11-31	gx	11h14m50s	−02°50.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30" o poco più — 450x.
CGCG 11-33	gx	11h15m19s	−03°46.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 450x.
CGCG 11-34	gx	11h15m22s	+00°06.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1115+0006 situata 30" a SSE: sono due debolissimi oggetti forse rotondi con Ø di una 20-ina di secondi e di aspetto simile; si separano facilmente a 450x.
CGCG 11-36	gx	11h16m00s	−00°21.0'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N; una coppia di stelline ben evidenti si trova subito a NE — 450x.
CGCG 11-37	gx	11h16m07s	−03°41.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile al bordo meridionale — 450x.
CGCG 11-38	gx	11h16m09s	+00°34.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina a 1.5' verso E; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 11-43	gx	11h17m33s	−00°11.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 11-44	gx	11h17m37s	−03°10.2'		Leo	16"	m. buona / m. buono	poco più evidente, pur restando un oggetto molto debole; è allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
CGCG 11-45	gx	11h17m39s	−01°18.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 11-48	gx	11h18m35s	−02°06.7'		Leo	24"	buona / m. buono	piccola, rotonda e condensata, poco diffusa e con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N.
CGCG 11-49	gx	11h18m26s	+00°26.9'		Leo	24"	m. buona / buono	piccolo e debolissimo lucore molto diffuso che aggetta a N di una stellina; non sembra più esteso di 10" o 15", ma non riesco a capirne la forma; c'è una doppia serrata dalle componenti brillanti a un paio di primi SSE — 450x.
CGCG 11-50	gx	11h18m43s	−00°21.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 11-51	gx	11h18m49s	+00°37.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 11-54	gx	11h19m29s	+01°37.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto piccola, compatta e condensata rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 11-55	gx	11h19m35s	−02°29.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma non conviene scendere sotto i 450x; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' SW e una poco più debole più o meno alla stessa distanza a SE.
CGCG 11-57	gx	11h19m55s	−02°38.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, situata in una piccola zona depleta; in visione distolta appare chiaramente molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 11-58	gx	11h19m56s	−01°28.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	esile baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 11-60	gx	11h20m01s	−01°41.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina subito a NE — 450x.
CGCG 11-61	gx	11h20m07s	−03°46.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare 450x.
CGCG 11-62	gx	11h20m10s	−03°03.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 1' — 400x.
CGCG 11-63	gx	11h20m17s	−03°42.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di aspetto un po' confuso, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a poco più di 1' NE — 450x.
CGCG 11-64	gx	11h20m21s	−02°55.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 400x.
CGCG 11-65	gx	11h20m39s	−03°32.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 11-67	gx	11h20m42s	−03°16.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata ed evidente scalando a 340x.
CGCG 11-68	gx	11h20m48s	+00°54.8'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta quando si fissa la stellina quasi a ridosso verso N; non è più estesa di 20" — 400x.
CGCG 11-69	gx	11h20m51s	−03°38.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	in visione diretta salta fuori solo il nucleo stellare, relativamente brillante, mentre in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 11-72	gx	11h20m57s	−00°05.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; forma una coppia ravvicinata con PGC 1152334 situata 1' scarso a N.
CGCG 11-73	gx	11h20m55s	+00°10.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a 1' scarso W — 450x.
CGCG 11-74	gx	11h21m04s	−03°12.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
CGCG 11-75	gx	11h21m00s	+00°32.0'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole e piccola, a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme.
CGCG 11-76	gx	11h21m12s	−02°59.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di CGCG 11-64, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
CGCG 11-77	gx	11h21m27s	+01°31.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa, solo a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 11-78	gx	11h21m42s	+01°31.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, rotonda con Ø 20", debolmente screziata a 450x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
CGCG 11-80	gx	11h22m32s	−00°50.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; stellina appena percettibile a ridosso SE — 450x.
CGCG 11-82	gx	11h22m52s	−02°54.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 20"×10" e con condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 11-83	gx	11h22m55s	−02°56.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a E (la quale fa parte di 3 stelline brillanti quasi allineati in direzione NW-SE) — 450x.
CGCG 11-85	gx	11h23m35s	−01°33.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a E — 450x.
CGCG 11-87	gx	11h23m51s	+01°44.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 11-88	gx	11h24m09s	−01°09.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SSE — 450x.
CGCG 11-89	gx	11h24m09s	+00°42.0'		Leo	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 11-90	gx	11h24m19s	+00°38.6'		Leo	24"	ottima / ottimo	poco più evidente di CGCG 11-89, dalla quale dista 4' a SE, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 11-95	gx	11h26m06s	−01°50.0'		Leo	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a < 1' NE — 450x.
CGCG 11-96	gx	11h26m41s	−01°41.6'		Leo	24"	ottima / ottimo	debole, molto piccola e relativamente compatta, con nucleo stellare abbastanza marcata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 11-97	gx	11h26m56s	−01°19.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; situata al vertice meridionale di un piccolo triangolo quasi equilatero formato con 2 stelline brillanti (la più luminosa è quella a 3' ENE): queste disturbano un po' l'osservazione anche a 580x.
CGCG 11-100	gx	11h27m37s	+00°23.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 11-101	gx	11h27m54s	−01°13.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 11-103 situata 1' a NE — debole, relativamente diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 11-103	gx	11h27m58s	−01°12.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 11-101 situata 1' a SW; poco più debole di quest'ultima e più piccola, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 11-107	gx	11h29m10s	−01°42.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia assieme a CGCG 10-109 situata un paio di primi a E; sono due galassiette molto piccole, di aspetto simile, di luminosità uniforme, rotonde con Ø di una 15-ina di secondi; la 2ª è poco più evidente — 450x.
CGCG 11-109	gx	11h29m18s	−01°42.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia assieme alla precedente situata un paio di primi a W; sono due galassiette molto piccole, di aspetto simile, di luminosità uniforme, rotonde con Ø di una 15-ina di secondi; questa è poco più evidente a 450x.
CGCG 11-110	gx	11h29m27s	−01°44.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30; situata tra una stellina brillante a N e una molto debole alla stessa distanza verso S — 450x.
CGCG 11-112	gx	11h30m29s	+00°29.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' ENE — 450x.
CGCG 12-5	gx	11h32m09s	−00°56.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 12-7	gx	11h32m43s	−01°26.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; equidistante con una coppia di deboli stelline a NW — 450x.
CGCG 12-13	gx	11h32m43s	−02°12.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e condensata, rotonda con Ø di max 15"; è situata al vertice rettangolo di un piccolo triangolo formato con una stellina brillante a WNW e una più debole a NNE — 450x.
CGCG 12-14	gx	11h32m14s	−01°18.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata tra la SAO 138263 di 10ª grandezza a S e una stellina abbastanza brillante a N — 450x.
CGCG 12-15	gx	11h32m45s	−00°44.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N; poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 12-19	gx	11h33m25s	−02°22.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 450x, a tratti leggermente condensata, forse rotonda con Ø di una 30" — 400x.
CGCG 12-20	gx	11h33m35s	−02°16.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso S — 450x.
CGCG 12-22	gx	11h33m45s	−03°26.2'		Leo	24"	buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 12-25	gx	11h34m23s	−02°31.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 12-27	gx	11h34m39s	+00°07.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più debole e più piccola di CGCG 12-29, dalla quale dista 7' a SSW, ma con condensazione centrale più evidente — 570x.
CGCG 12-29	gx	11h34m47s	+00°14.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
CGCG 12-32	gx	11h35m18s	−02°46.5'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina molto debole a 1' NNW — 450x.
CGCG 12-35	gx	11h35m04s	−03°06.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; non sembra gran che disturbata da una stella di 10ª grandezza situata 3' scarsi a WSW — 450x.
CGCG 12-36	gx	11h36m19s	−02°50.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina al bordo S — 450x.
CGCG 12-37	gx	11h36m23s	−02°49.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, diffusa, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-15"; si trova al vertice ottuso di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline: una brillante a S e l'altra più debole a NE.
CGCG 12-41	gx	11h36m49s	−02°14.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE (la quale fa parte di un piccolo triangolo irregolare molto allungato da N a S).
CGCG 12-42	gx	11h37m11s	+02°07.6'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima, molto piccola e diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata a ridosso S di una stellina relativamente brillante che disturba; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 12-49	gx	11h39m35s	+02°02.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto piccola e rotonda con Ø max di 20"; salta fuori in visione distolta a 570x.
CGCG 12-51	gx	11h39m53s	−03°31.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 12-52	gx	11h39m53s	−00°52.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	forma un terzetto, assieme a CGCG 12-53 e CGCG 12-54, situate ai vertici di un triangolo equilatero coi lati di 4' scarsi — molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; disturbata da un stellina brillante quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 12-53	gx	11h40m06s	−00°54.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	forma un terzetto, assieme alla precedente e alla successiva, situate ai vertici di un triangolo equilatero coi lati di 4' scarsi — molto debole e diffusa, circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia molto serrata di stelline appena percettibili a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 12-54	gx	11h40m06s	−00°50.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	forma un terzetto, assieme alle due precedenti, situate ai vertici di un triangolo equilatero coi lati di 4' scarsi e di cui rappresenta la componente più facile; è relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale evidente 450x.
CGCG 12-57	gx	11h41m04s	+01°43.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto piccola, compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 12-60	gx	11h41m40s	−02°14.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a E, una brillante a 1' verso S e una appena percettibile a ridosso W — 450x.
CGCG 12-62	gx	11h42m31s	−02°15.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 12-63	gx	11h42m43s	−02°21.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	anche questa è piccola, ma molto debole e diffusa, grosso modo rotonda con Ø, pure con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1.5' N — 450x.
CGCG 12-64	gx	11h42m54s	+00°09.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola ed elusiva, appare solo a momenti in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø < 20".
CGCG 12-68	gx	11h44m04s	−02°33.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, a 450x appare in visione distolta subito a W di una stellina; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 12-73	gx	11h44m59s	−02°23.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 12-74	gx	11h45m07s	−01°40.2'		Vir	24"	m. buona / buono	fa parte di un terzetto assieme a CGCG 12-75 e CGCG 12-76 situato a SSE di IC 728 — piccola e relativamente compatta, con tenue condensazione centrale osservabile a 570x; è allungata da E a W con dimensioni 20"×15".
CGCG 12-75	gx	11h45m10s	−01°45.8'		Vir	24"	m. buona / buono	fa parte di un terzetto assieme alla precedente e alla successiva situato a SSE di IC 728 — poco diffusa, rotonda e condensata, con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
CGCG 12-76	gx	11h45m15s	−01°42.2'		Vir	24"	m. buona / buono	fa parte di un terzetto assieme alle due precedenti situato a SSE di IC 728 — relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare abbastanza marcato — 570x.
CGCG 12-78	gx	11h45m26s	+00°00.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, dimensioni inferiori a 30"×15" e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 12-81	gx	11h47m01s	−00°17.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 12-89	gx	11h48m53s	+01°03.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 12-90	gx	11h49m02s	−01°06.1'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole, di aspetto un po' confuso, estesa non più di 30"; si vede con relativa facilità in visione distolta a poco più di 1' a N di una debole stellina — 380x.
CGCG 12-91	gx	11h49m26s	−03°30.7'		Vir	24"	buona / m. buono	fa parte di un gruppo contenente una decina di componenti — questa, assieme a CGCG 12-93, è una delle più facili, piccola relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 12-93	gx	11h49m32s	−03°28.6'		Vir	24"	buona / m. buono	è una delle gx più facili di un gruppo contenente una decina di componenti; è di aspetto simile a CGCG 12-91, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 12-95	gx	11h49m35s	−03°29.3'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente facile, allungata da E a W con dimensioni 30"×20", poco diffusa e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 12-96	gx	11h49m36s	−01°27.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	anche questa è relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 12-97	gx	11h49m38s	−03°34.1'		Vir	24"	buona / m. buono	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa 1.5'; meglio osservabile a 340x.
CGCG 12-98	gx	11h49m40s	−03°31.8'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 12-99	gx	11h49m39s	−03°30.5'		Vir	24"	buona / m. buono	piccola, debole e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 12-100	gx	11h49m50s	−03°31.1'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 40"×10" (quasi una edge-on) e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 12-101	gx	11h49m55s	−03°39.8'		Vir	24"	buona / m. buono	diffusa, con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 12-102	gx	11h50m20s	−02°48.6'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da NW a SE con dm 45"×30" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 12-103	gx	11h50m34s	−02°54.5'		Vir	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, rotonda, di una 30-ina di secondi di Ø e con nucleo stellare osservabile a 380x.
CGCG 12-106	gx	11h51m31s	−00°04.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è minuscola e molto debole, a 340x sembra una stellina appena sfuocata; a 450x appare rotonda con Ø non superiore a 10" o 12".
CGCG 12-107	gx	11h51m31s	−00°03.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	poco più grande e appena più evidente, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 12-116	gx	11h55m05s	+01°43.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a triangolo a 3' NE — 450x.
CGCG 13-2	gx	11h55m31s	−01°12.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø < 30" e un nucleo stellare marcato; c'è una stellina poco più brillante del nucleo della gx a 1' W — 450x.
CGCG 13-8	gx	11h56m45s	−01°17.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi scarsi — 450x.
CGCG 13-20	gx	11h58m34s	−02°08.1'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente brillante, a prima vista appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare; in visione distolta, tuttavia, sembra allungarsi leggermente da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 13-21	gx	11h58m44s	−02°38.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, ma compatta, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 13-24	gx	12h01m14s	−03°40.7'		Vir	24"	buona / m. buono	piccola, debole e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø > 20" e nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso SW — 450x.
CGCG 13-29	gx	11h59m39s	−03°40.9'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente facile, ma disturbata da una stellina brillante al bordo NW; a 450x appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 13-32	gx	12h59m56s	−00°32.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
CGCG 13-34	gx	12h00m18s	+00°17.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 13-35	gx	12h00m24s	+00°29.4'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 450x.
CGCG 13-36	gx	12h01m05s	+00°06.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 13-40	gx	12h01m38s	+01°59.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola, debole e molto diffusa, approssim. circolare con Ø < 20"; presenta un nucleo stellare molto tenue, ma abbastanza evidente; c'è una stellina brillante a un paio di primi WNW — 450x.
CGCG 13-42	gx	12h02m05s	+01°31.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e una tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 13-49	gx	12h03m13s	+01°57.0'		Vir	16"	buona / discreto	piccola, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso verso SW — 188x.
CGCG 13-50	gx	12h03m29s	+01°13.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 13-52	gx	12h03m45s	+01°41.7'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con piccola condensazione centrale diffusa — 400x.
CGCG 13-56	gx	12h04m10s	+01°49.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta, ma è molto diffusa e di forma indistinta — 400x.
CGCG 13-58	gx	12h04m19s	+01°50.9'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo visibile a tratti a 400x.
CGCG 13-68	gx	12h04m56s	−03°12.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole e molto diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×15" e con piccola condensazione centrale evidente poco contrastata — 450x.
CGCG 13-70	gx	12h05m38s	+01°49.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, dimensioni 50"×25" e con nucleo stellare visibile a momenti — 450x.
CGCG 13-72	gx	12h05m41s	+01°34.5'		Vir	24"	discreta / buono	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 13-73	gx	12h05m41s	+01°35.6'		Vir	24"	discreta / buono	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW (situata 1' a N della precedente) — 450x.
CGCG 13-75	gx	12h06m09s	−02°56.9'		Vir	24"	buona / m. buono	rotonda, diffusa con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 13-76	gx	12h06m31s	+01°37.0'		Vir	24"	discreta / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-15" e condensata; c'è una debole stellina a un paio di primi verso S — 450x.
CGCG 13-79	gx	12h07m38s	+01°34.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola , relativamente compatta e brillante, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina luminosa a 1.5' N — 450x.
CGCG 13-80	gx	12h08m00s	+01°23.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di 15" o 20" di Ø che salta fuori in visione distolta a meno di 1' N di una stellina — 570x.
CGCG 13-83	gx	12h08m23s	+00°06.6'		Vir	24"	discreta / buono	molto debole e piccola, diffusa, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' E — 450x.
CGCG 13-84	gx	12h08m31s	+00°08.2'		Vir	24"	discreta / buono	debole, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso W — 450x.
CGCG 13-90	gx	12h10m16s	−01°59.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 13-92	gx	12h10m18s	−00°31.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
CGCG 13-102	gx	12h12m39s	−02°43.3'		Vir	24"	discreta / buono	assieme alla successiva forma una coppia di debolissime galassiette molto piccole e distanti un paio di primi in direzione E-W; sono entrambe rotonde con Ø di una 15-ina di secondi; la 2ª è poco più evidente; sono situate in una piccola plaga depleta, per cui si vedono con difficoltà; meglio scalare a 340x.
CGCG 13-103	gx	12h12m48s	−02°43.5'		Vir	24"	discreta / buono	v. **CGCG 13-102**
CGCG 13-109	gx	12h14m40s	−02°26.9'		Vir	24"	discreta / buono	debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 13-111	gx	12h14m51s	−03°29.4'		Vir	24"	discreta / buono	piccola, molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 13-112	gx	12h15m11s	−03°26.4'		Vir	24"	discreta / buono	molto debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 450x.
CGCG 13-114	gx	12h16m08s	−03°34.2'		Vir	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' NE — 380x.
CGCG 13-116	gx	12h16m04s	+01°10.8'		Vir	24"	discreta / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' NE — 450x.
CGCG 13-118	gx	12h16m44s	−03°25.8'		Vir	16"	buona / ottimo	è un'elusiva macchiolina che appare solo a tratti in visione distolta a 380x a ~ 1' W di una stellina molto debole; non è più estesa di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 13-119	gx	12h17m53s	−00°39.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 14-4	gx	12h19m39s	−00°45.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (occorre tassativamente tenere fuori campo la η Virginis situata 6' a NE!) — 450x.
CGCG 14-6	gx	12h19m45s	−00°45.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola e difficile da studiare, in quanto situata a ridosso E di una stellina che per quanto debole tende un po' a confonderne la forma; appare comunque facilmente in visione distolta a 450x a patto di tenere fuori campo la η Virginis situata 6' a NNE.
CGCG 14-8	gx	12h19m48s	−00°52.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 14-10	gx	12h20m21s	+00°22.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	è una debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso; appare in visione distolta a 450x subito a S di una debole stellina.
CGCG 14-21	gx	12h23m38s	−00°28.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S — 450x.
CGCG 14-22	gx	12h23m40s	+01°19.4'		Vir	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa, a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
CGCG 14-24	gx	12h23m49s	+01°22.5'		Vir	24"	discreta / buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata in una piccola zona di cielo depleta: meglio scalare a 340x.

CGCG 14-30	gx	12h25m37s	−02°54.0'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole e con nucleo stellare, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N e un'altra poco più distante a ENE — 450x.
CGCG 14-32	gx	12h25m41s	−02°57.1'		Vir	24"	buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 14-36	gx	12h26m11s	−02°21.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola e debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e appena più brillante al centro — 450x.
CGCG 14-40	gx	12h27m05s	−00°54.4'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 14-41	gx	12h27m08s	−01°21.3'		Vir	24"	discreta / buono	debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 14-42	gx	12h24m05s	+01°11.4'		Vir	24"	discreta / buono	assieme alla successiva forma una coppia di debolissime chiazze grosso modo circolari estese una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; la 1ª è poco più evidente, mentre la 2ª appare in visione distolta a poco più di 1' W di una stellina; meglio tuttavia scalare a 340x.
CGCG 14-43	gx	12h27m14s	−02°02.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stella doppia a 1' W — 450x.
CGCG 14-44	gx	12h24m12s	+01°12.8'		Vir	24"	discreta / buono	v. **CGCG 14-42**
CGCG 14-47	gx	12h28m51s	−02°03.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 14-51	gx	12h29m22s	+01°03.4'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità ben uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a poco più di 1' verso NE — 450x.
CGCG 14-53	gx	12h31m04s	−02°20.6'		Vir	24"	discreta / buono	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 14-54	gx	12h31m04s	+01°40.5'		Vir	24"	discreta / buono	debolissima chiazza diffusa e di forma indistinta, in visione distolta sembra estesa una 40-ina di secondi; è poco meglio contrastata scalando a 340x, ma non riesco comunque a capirne la forma.
CGCG 14-55	gx	12h31m07s	+00°27.8'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissima, molto diffusa e con condensazione centrale puntiforme; appare in visione distolta a 400x, ma non riesco a capire com'è fatta — 400x.
CGCG 14-64	gx	12h33m21s	+01°31.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, anche se è preferibile non scalare gli ingrandimenti; in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
CGCG 14-73	gx	12h35m42s	−00°12.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 20"×15" e con condensazione stellare evidente; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso E e un'altra subito a SE — 450x.
CGCG 14-74	gx	12h35m51s	−03°46.0'		Vir	24"	discreta / ottimo	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta a 450x; non dovrebbe essere più estesa di 20".
CGCG 14-75	gx	12h35m55s	−02°54.1'		Vir	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 40"; c'è una stellina a ridosso N e un'altra appena percettibile poco più distante verso S — 450x.
CGCG 14-76	gx	12h35m55s	−02°23.1'		Vir	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 14-78	gx	12h37m02s	+01°49.1'		Vir	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
CGCG 14-79	gx	12h37m40s	−03°35.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N; un paio di primi a NW c'è la SAO 138880 di 9ª grandezza — 450x.
CGCG 14-80	gx	12h37m48s	−01°20.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 14-85	gx	12h38m29s	+01°45.3'		Vir	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta una tenue ma evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 1' verso N.
CGCG 14-88	gx	12h38m46s	+00°19.3'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 14-93	gx	12h39m13s	+01°26.6'		Vir	24"	ottima / ottimo	assieme a CGCG 14-95 forma una coppia di debolissime galassiette rotonde, diffuse e di luminosità uniforme; la 1a è più piccola ed è anche la più difficile: in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a E; la 2a è pure rotonda con Ø di 30"-35"
CGCG 14-94	gx	12h39m22s	+00°27.6'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina al bordo E (la più orientale di 3 stelline allineate ed equidistanti) — 450x.
CGCG 14-95	gx	12h39m20s	+01°25.9'		Vir	24"	ottima / ottimo	v. **CGCG 14-93**
CGCG 14-96	gx	12h39m37s	+00°45.1'		Vir	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 14-98	gx	12h40m02s	−03°36.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 14-104	gx	12h41m23s	−03°03.4'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
CGCG 14-105	gx	12h41m59s	−03°35.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; ci sono 3 stelline allineate da E a W a S della gx — 450x.
CGCG 14-107	gx	12h42m13s	−00°06.0'		Vir	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW — 450x.
CGCG 14-108	gx	12h42m21s	+02°04.0'		Vir	24"	discreta / ottimo	è una piccola chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 450x.
CGCG 15-3	gx	12h43m03s	−01°16.9'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 40" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 15-4	gx	12h43m06s	−00°26.3'		Vir	24"	buona / m. buono	molto piccola, compatta e condensata, rotonda con Ø di 15" o 20" (situata a poco più di 13' NW di NGC 4653) — 450x.
CGCG 15-6	gx	12h43m10s	−01°26.5'		Vir	24"	buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 15-10	gx	12h44m28s	−03°00.3'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; quasi allineata ed equidistante con due stelline brillanti a W — 450x.
CGCG 15-11	gx	12h44m29s	−00°27.2'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e una condensazione centrale visibile a tratti a 340x.
CGCG 15-17	gx	12h45m52s	−01°40.8'		Vir	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 15-24	gx	12h48m32s	−03°28.1'		Vir	24"	discreta / ottimo	debolissima, estesa non più di 20", appare a tratti in visione distolta a una 40-ina di secondi SSW di una stellina molto debole; praticamente invisibile ad appena 340x.
CGCG 15-28	gx	12h51m56s	−02°04.6'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un triangolo isoscele di stelline abbastanza brillanti a N; un piccolo asterismo di forma triangolare formato da 5 stelline si trova a 7' E; una 6a stellina appena percettibile situata sul lato meridionale, è in realtà la **PGC 183374** — 450x.
CGCG 15-34	gx	12h54m19s	−03°42.9'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 15-36	gx	12h54m42s	+02°06.2'		Vir	24"	mediocre / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 15-46	gx	12h57m26s	−03°29.5'		Vir	24"	ottima / ottimo	relativamente brillante, diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline a S e SE — 450x.
CGCG 15-54	gx	13h00m54s	−01°20.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; situata quasi in mezzo a due stelline brillanti che ne disturbano un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 15-61	gx	13h05m58s	+01°47.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NW — 450x.
CGCG 15-62	gx	13h06m22s	−01°40.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso S; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 16-1	gx	13h07m06s	−01°10.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 16-2	gx	13h07m19s	+02°00.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 16-7	gx	13h08m50s	−00°49.1'		Vir	24"	buona / m. buono	fa parte assieme a CGCG 16-8 e CGCG 16-10 di un terzetto di gx allineate in direzione NE-SW — allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" diffusa e con condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 16-8	gx	13h08m55s	−00°48.1'		Vir	24"	buona / m. buono	più debole della precedente, dalla quale dista 1.5' a NE, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale puntiforme — 450x.
CGCG 16-9	gx	13h08m57s	−03°42.4'		Vir	24"	m. buona / buono	debole chiazza lattescente di aspetto uniforme, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30"; equidistante da due stelle brillanti di 11-esima situate a N e SE che disturbano un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 16-10	gx	13h19m08s	−00°45.9'		Vir	24"	buona / m. buono	fa parte del terzetto di CGCG 16-7 — rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 16-14	gx	13h10m24s	−01°00.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con condensazione centrale quasi stellare molto marcata; forma un piccolo triangolo rettangolo con una coppia di stelle situate 1.5' a SW e distanti 1' scarso: quella più a N è brillante — 450x.
CGCG 16-20	gx	13h12m04s	+01°38.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20", ma occorre prolungare alquanto l'osservazione — 450x.
CGCG 16-23	gx	13h13m51s	−03°36.3'		Vir	24"	m. buona / buono	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa 1'; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 16-24	gx	13h13m52s	+02°07.9'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 16-27	gx	13h14m35s	−03°38.7'		Vir	24"	m. buona / buono	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 16-31	gx	13h15m22s	+01°55.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 16-32	gx	13h15m31s	+02°04.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 16-33	gx	13h15m36s	+00°29.6'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza circolare, diffusa e di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi situata a ridosso NE di una stellina — 450x.
CGCG 16-35	gx	13h15m55s	−03°43.9'		Vir	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1315-0314 situata quasi a ridosso verso S — sono relativamente facili da vedere, ancorché situate in una piccola zona depleta; entrambe molto piccole e poco diffuse; CGCG 16-35 è poco più evidente e appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 15"×10"; la MAC è forse rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
CGCG 16-36	gx	13h15m57s	−03°39.3'		Vir	24"	m. buona / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 16-38	gx	13h16m50s	−03°03.8'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 16-40	gx	13h17m05s	+01°49.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 16-41	gx	13h17m12s	−02°12.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, solo a momenti appare condensata, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 16-44	gx	13h17m29s	−03°10.8'		Vir	24"	m. buona / buono	molto diffusa, sembra aggettare a W di una stellina abbastanza brillante; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
CGCG 16-52	gx	13h19m37s	−02°54.7'		Vir	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; situata a ridosso N di un piccolo asterismo romboidale di 7 stelline — 450x.
CGCG 16-56	gx	13h20m56s	+01°30.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 16-59	gx	13h21m47s	+00°12.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 16-60	gx	13h21m52s	+00°08.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, piccola e relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 30"×10" e con condensazione centrale molto tenue; è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti e distanti un paio di primi in direzione E-W — 450x.
CGCG 16-67	gx	13h25m05s	−00°54.2'		Vir	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 16-70	gx	13h26m38s	−03°15.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma conviene comunque non scendere sotto i 450x per limitare il sia pur debole abbagliamento di una stellina abbastanza brillante situata subito a SE; in visione distolta appare a momenti molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×20".
CGCG 16-73	gx	13h28m47s	−02°02.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
CGCG 16-78	gx	13h29m50s	−01°25.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 139565 arancione di magnitudo 9.6 situata un paio di primi a NNW; relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina a 1' scarso verso NW — 450x.
CGCG 17-12	gx	13h32m06s	+01°35.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, rotonda con Ø < 40" e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso di NE — 450x.
CGCG 17-14	gx	13h32m20s	+01°34.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	più debole e diffusa di CGCG 17-12, dalla quale dista 4' a SE, appena più brillante all'interno, ma questo si nota meglio scalando a 340x; in visione distolta appare rotonda con Ø di 1' scarso.
CGCG 17-17	gx	13h32m50s	−03°05.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è una debole lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per oltre 1' — 450x.
CGCG 17-18	gx	13h32m57s	−03°01.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NE; la gx è a prima vista rotonda con Ø < 20"; tuttavia, a un esame più attento mostra a tratti una sorta di debolissimo nodulo dalla parte occidentale; in effetti, da un controllo successivamente effettuato, questo è risultato essere la MAC 1332-0301 — 450x.
CGCG 17-26	gx	13h34m06s	+01°45.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 17-28	gx	13h34m44s	+01°42.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi, orientata in direzione NW-SE; c'è una debole stellina a ridosso NE che nondimeno disturba un poco l'osservazione — 450x.
CGCG 17-31	gx	13h36m05s	−01°35.5'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a NW; la gx è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti distanti 4' in direzione N-S — 450x.
CGCG 17-35	gx	13h36m48s	+01°09.3'		Vir	24"	m. buona / buono	forma una coppia abbastanza ravvicinata con la successiva situata un paio di primi a NNE — piccola, debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NE — 450x.
CGCG 17-36	gx	13h36m52s	+01°11.3'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 17-50	gx	13h35m39s	−00°55.2'		Vir	24"	ottima / buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e a tratti appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 17-54	gx	13h39m13s	−01°07.2'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; disturbata da una stellina brillante a 1.5' W — 450x.
CGCG 17-63	gx	13h42m15s	+01°51.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 17-67	gx	13h46m13s	−03°23.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; appare a momenti in visione distolta, ma è preferibile scalare a 340x.
CGCG 17-68	gx	13h46m20s	−03°25.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale appena percettibile; allineata ed equidistante con 2 stelline a NNE — 450x.
CGCG 17-73	gx	13h49m53s	+02°04.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti un paio di primi — 450x.
CGCG 17-74	gx	13h51m02s	−00°09.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina subito a N e un'altra appena più brillante a ridosso SE — 450x.
CGCG 17-77	gx	13h51m55s	+01°50.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 17-79	gx	13h52m04s	−02°07.6'		Vir	16"	m. buona / ottimo	situata 5' N di NGC 5327 è una galassietta estesa 40" con condensazione centrale evidente — 380x.
CGCG 17-80	gx	13h51m57s	+02°00.2'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 17-81	gx	13h52m04s	−02°07.6'		Vir	24"	buona / m. buono	in visione distolta appare solo come una debolissima stellina sfuocata.
CGCG 17-83	gx	13h52m28s	+01°56.7'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente compatta e condensata, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 17-86	gx	13h52m44s	+00°07.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' NE e una coppia abbastanza stretta alla stessa distanza verso NW — 450x.
CGCG 17-92	gx	13h53m31s	−01°03.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 17-93	gx	13h53m43s	+00°03.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' SE e una brillante a 2.5' verso NNW — 450x.
CGCG 18-10	gx	13h58m07s	−00°23.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale diffusa e poco contrastata — 450x.
CGCG 18-11	gx	13h58m18s	+01°08.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole e molto piccola, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una debole stellina a ridosso SW (non ho visto la minuscola galassietta a ridosso E neppure spingendo a 580x).
CGCG 18-18	gx	14h00m30s	−02°48.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 18-21	gx	14h00m43s	−00°30.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 450x.
CGCG 18-26	gx	14h01m25s	−00°37.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' NE e un'altra a 1.5' verso SE — 450x.
CGCG 18-29	gx	14h02m06s	−01°23.8'		Vir	24"	buona / m. buono	poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso N — 450x.
CGCG 18-31	gx	14h02m13s	−01°23.0'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a S di una stellina; a tratti appare molto allungata da NE a SW, ma per notarlo ho dovuto spingere a 570x.
CGCG 18-35	gx	14h03m21s	−00°33.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W; la gx non sembra disturbata dalla SAO 139702 di 8ª grandezza situata 5' scarsi a S — 450x.
CGCG 18-36	gx	14h03m28s	+00°44.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata all'interno di un triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta a NW — 450x.
CGCG 18-37	gx	14h03m36s	−02°07.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa 1'; c'è un minuscolo triangolo di deboli stelline molto acuminato a 2.5' NW — 450x.
CGCG 18-38	gx	14h03m44s	+00°48.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø simile alla precedente; situata all'interno di un triangolo irregolare di stelline brillanti molto allungato da NW a SE — 450x.
CGCG 18-39	gx	14h04m04s	+00°53.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 18-43	gx	14h05m11s	−03°22.2'		Vir	16"	buona / ottimo	pare di aspetto un po' irregolare, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e nucleo quasi stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 18-49	gx	14h06m51s	−01°32.4'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso W e un'altra poco più brillante a 1' NW — 450x.
CGCG 18-51	gx	14h06m56s	−01°35.7'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente compatta con tenue condensazione centrale, allungata da E a W con dimensioni 30"×15".
CGCG 18-57	gx	14h08m32s	−00°07.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 18-63	gx	14h09m56s	−01°14.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 18-65	gx	14h10m27s	−00°49.9'		Vir	24"	buona / m. buono	piccola, diffusa e con nucleo stellare evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso NW — 450x.
CGCG 18-66	gx	14h10m42s	+01°28.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 18-69	gx	14h11m10s	+01°28.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione E-W e con una evidente condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 18-71	gx	14h11m18s	+01°16.5'		Vir	24"	buona / m. buono	è una piccola e debolissima galassietta rotonda, con Ø < 20" che aggetta a W di una stellina; questa si trova un paio di primi a WSW di IC 986 — 450x.
CGCG 18-88	gx	14h14m13s	−00°53.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 18-93	gx	14h15m01s	−00°47.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, dimensioni 30"×15" e con piccolo nucleo quasi stellare evidente — 450x.
CGCG 18-96	gx	14h15m26s	−03°06.7'		Vir	24"	discreta / m. buono	chiazza molto debole, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e che in visione distolta aggetta a NW di una stellina brillante; malgrado questo appare meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso di SW.
CGCG 18-105	gx	14h17m12s	+01°44.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, più che altro disturbata da una stellina brillante a ridosso SE; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 20"×10".
CGCG 18-109	gx	14h17m34s	+01°48.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina quasi a ridosso W; una stellina brillante si trova a 1' scarso SW e disturba un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 19-6	gx	14h21m51s	+02°01.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **PGC 159774** situata a ridosso W (il Megastar riporta erroneamente questa gx lasciandola anonima); è molto piccola, con Ø di una 10-ina di secondi (come una stellina debolmente sfuocata), ed è più evidente della compagna — 450x.
CGCG 19-10	gx	14h23m09s	+01°40.3'		Vir	16"	buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ~ 1' verso S — 380x.
CGCG 19-23	gx	14h25m38s	+01°36.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza estesa una 30-ina di secondi e che in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø; poco meglio definita restando a 450x.
CGCG 19-29	gx	14h27m31s	−00°55.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 19-38	gx	14h28m23s	−03°36.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa e leggermente più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina brillante a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 19-40	gx	14h28m38s	−03°19.8'		Vir	24"	discreta / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 19-41	gx	14h28m38s	+00°33.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 19-42	gx	14h28m45s	+00°42.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso N.
CGCG 19-51	gx	14h30m42s	+01°52.9'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30" — 450x.
CGCG 19-63	gx	14h34m06s	+00°37.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' W — 450x.
CGCG 19-65	gx	14h35m20s	+00°28.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 19-66	gx	14h35m25s	+00°20.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø simile alla precedente, relativamente compatta e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 19-83	gx	14h42m23s	+00°54.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 19-84	gx	14h42m30s	+01°30.0'		Vir	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con due deboli stelline a NE e NW — 450x.
CGCG 20-7	gx	14h44m18s	+00°02.7'		Vir	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; forma una coppia serrata con **PGC 3098317** situata a ridosso SE, ma dalla quale si separa con difficoltà; molto piccola, estesa una 15-ina di secondi e con condensazione stellare *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 20-9	gx	14h44m34s	−03°13.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina brillante a ridosso NNE (la quale fa parte di un triangolo irregolare con componenti grosso modo uguali) — 450x.
CGCG 20-16	gx	14h47m20s	−00°57.5'		Lib	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 20-21	gx	14h49m57s	+00°33.5'		Vir	24"	buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di 20" o poco più, e appena più brillante all'interno *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 20-23	gx	14h50m43s	−01°42.9'		Lib	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 20-30	gx	14h53m35s	+00°00.6'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 45"×30"; una stellina appena percettibile appare a momenti a ridosso SE, ma si tratta in realtà di **PGC 160230** *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 20-34	gx	14h56m33s	−02°06.4'		Lib	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 20-35	gx	14h56m59s	−02°06.9'		Lib	24"	ottima / buono	relativamente compatta, orientata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente quasi stellare — 450x.
CGCG 20-39	gx	14h58m49s	+02°01.4'		Vir	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina a 1' verso NW — 450x.
CGCG 20-49	gx	15h02m13s	+02°01.8'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline brillanti un paio di primi a N più una terza a 3.5' NW — 450x.
CGCG 20-52	gx	15h03m45s	−03°18.2'		Lib	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di 1' 270x.
CGCG 20-56	gx	15h05m21s	−02°02.1'		Lib	24"	buona / buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è equidistante con 2 stelline a S e SSE con le quali forma un piccolo arco — 450x.
CGCG 21-2	gx	15h06m46s	+01°00.1'		Vir	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 21-12	gx	15h07m59s	+01°13.9'		Vir	16"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 380x.
CGCG 21-13	gx	05h08m06s	+01°39.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a poco più di 1' verso S — 450x.
CGCG 21-15	gx	15h08m09s	+01°36.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1.5' verso NNW.
CGCG 21-20	gx	15h09m40s	+01°23.2'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; è situata quasi a ridosso SW di una coppia serrata di deboli stelline — 450x.
CGCG 21-24	gx	15h09m55s	+01°24.2'		Vir	24"	ottima / buono	è un'elusiva lama di luce orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi o poco più; salta fuori a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 21-26	gx	15h10m12s	−02°14.9'		Lib	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; non bisogna comunque scendere sotto i 450x.
CGCG 21-29	gx	15h10m29s	−02°10.1'		Lib	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 21-31	gx	15h10m51s	+01°41.9'		Vir	24"	buona / ottimo	molto piccola e molto debole, ma facilmente osservabile in visione distolta a 450x, diffusa, probabilmente rotonda con Ø max di 15".
CGCG 21-35	gx	15h11m30s	+01°35.9'		Ser	24"	discreta / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 21-37	gx	15h11m32s	+01°45.8'		Ser	24"	discreta / m. buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø simile a CGCG 21-35 e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 21-40	gx	15h12m01s	−03°13.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo SE — 450x.
CGCG 21-43	gx	15h12m11s	+02°00.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 21-45	gx	15h12m18s	+02°01.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 20"; allineata ed equidistante con due stelline a NE (le quali fanno parte di un piccolo triangolo rettangolo) — 450x.
CGCG 21-46	gx	15h12m25s	+01°29.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	in visione distolta appare come una debolissima e piccola lama di luce orientata da N a S ed estesa sì e no 30" — 450x.
CGCG 21-47	gx	15h12m33s	+01°30.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 21-48	gx	15h12m39s	+01°55.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 21-49	gx	15h12m44s	+01°27.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 21-50	gx	15h13m01s	+02°01.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa, rotonda con Ø 20"-25" e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 21-58	gx	15h15m35s	+02°14.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 21-62	gx	15h16m25s	+00°42.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' scarso SW e una di luminosità simile a 1.5' verso E — 450x.
CGCG 21-64	gx	15h16m42s	+01°15.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 21-66	gx	15h17m12s	−03°11.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 21-71	gx	15h17m42s	+01°21.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e a tratti condensata, approssim. rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 21-77	gx	15h20m24s	−00°13.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	anche a 450x appare come una stellina sfuocata molto debole: probabilmente non è più estesa di 10".
CGCG 21-78	gx	15h20m41s	+01°50.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, poco diffusa con Ø < 20" e nucleo stellare abbastanza evidente; è allineata con due stelline a SE: quella vicina alla gx è più brillante e dista da lei meno di 1' — 450x.
CGCG 21-80	gx	15h21m38s	+00°28.0'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 21-81	gx	15h22m56s	−01°21.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø > 20".
CGCG 21-83	gx	15h22m57s	−01°22.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare in visione distolta a 1.5' S di CGCG 21-81, rotonda con Ø simile.
CGCG 21-87	gx	15h23m29s	−01°27.1'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15".
CGCG 21-88	gx	15h23m27s	−01°09.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale diffusa — 450x.
CGCG 21-92	gx	15h25m23s	−03°34.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 21-95	gx	15h26m20s	−03°32.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina appena percettibile a 1' S — 450x.
CGCG 21-97	gx	15h27m26s	−02°53.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 21-99	gx	15h27m35s	+00°17.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 21-104	gx	15h30m28s	−02°16.2'		Ser	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1530-0216 situata a ridosso di SE — è allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 22-1	gx	15h30m39s	−02°12.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 22-6	gx	15h31m44s	−01°22.7'		Ser	24"	discreta / m. buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' N di una debole stellina; è grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio visibile a 450x.
CGCG 22-8	gx	15h32m19s	−02°49.3'		Ser	24"	discreta / m. buono	altra gx debolissima e di luminosità uniforme; solo a tratti appare poco allungata da E a W con dimensioni grosso modo 40"×30"; è meglio tuttavia non scalare a 340x poiché il cielo non è particolarmente scuro.
CGCG 22-9	gx	15h32m53s	+00°28.1'		Ser	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 22-10	gx	15h32m58s	+00°26.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø < 40" e una condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 22-17	gx	15h37m43s	−01°45.2'		Ser	24"	discreta / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15".
CGCG 22-20	gx	15h38m35s	−01°32.9'		Ser	24"	discreta / m. buono	elusiva, appare solo a tratti con gran difficoltà in visione distolta alternando gli occhi; dovrebbe essere grosso modo circolare, ma non più estesa di 30".
CGCG 22-21	gx	15h38m45s	−03°22.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	presenta un piccolo nucleo rotondo abbastanza brillante circonfuso da un tenue alone di 30"×15" orientato da NW a SE; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW — 450x.
CGCG 22-22	gx	15h38m45s	−03°16.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 22-38	gx	15h48m08s	−02°08.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina quasi a ridosso NW e una più distante a 1' scarso verso N; occorre tuttavia tenere fuori campo la SAO 140770 di 8a grandezza (che ha una compagna più debole a W) situata 5.5' a ESE — 450x.
CGCG 22-39	gx	15h48m42s	+00°16.2'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 22-42	gx	14h58m49s	+02°01.4'		Ser	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina a 1' verso NW — 450x.
CGCG 22-43	gx	15h49m59s	+00°12.1'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 450x.
CGCG 22-45	gx	15h50m45s	+01°45.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa, forse circolare con Ø < 40"; appare in visione distolta ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
CGCG 22-47	gx	15h52m49s	−00°31.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 23-1	gx	15h55m31s	−00°49.6'		Ser	24"	buona / ottimo	debole e diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina evidente a poco più di 1' verso NE.
CGCG 23-2	gx	15h55m54s	+00°35.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia subito a SW e una appena percettibile alla stessa distanza verso SE; una 3a stellina si trova a 1' N; c'è un asterismo irregolare molto allungato da N a S di 8 stelline brillanti a E della gx. A poco più di 1' S, sul prolungamento della doppia di cui sopra, appare a momenti una debolissima macchiolina non più estesa di 10": si tratta in realtà di PGC 1169468 — 450x.
CGCG 23-3	gx	15h56m39s	+02°04.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
CGCG 23-4	gx	15h57m12s	−01°32.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; poco meglio definita scalando a 340x.
CGCG 23-5	gx	15h57m30s	+01°06.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 23-6	gx	16h00m33s	−00°10.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 23-7	gx	16h00m33s	+00°29.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 23-9	gx	16h01m48s	−00°48.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' N; c'è la SAO 140907 di 7a grandezza a 4.5' verso E che disturba un po' l'osservazione poiché non si riesce a tenere fuori campo — 450x.

CGCG 23-12	gx	16h06m18s	+02°10.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 23-14	gx	16h07m52s	+01°24.2'		Ser	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 23-15	gx	16h09m04s	+01°03.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 23-18	gx	16h10m09s	+00°45.9'		Ser	16"	m. buona / ottimo	fa parte assieme a MAC 1610+0047 di una coppia di debolissime galassiette situate 5' a NE di NGC 6070 ed entrambe molto piccole — appare in visione distolta quando si fissa la stellina a 1' SE (in realtà è doppia, ma non sono riuscito a vedere la compagna a N); l'altra è poco più evidente e più estesa: salta fuori facilmente in visione distolta osservando, anche in questo caso, la stellina a 1' SE — 380x.
CGCG 23-19	gx	16h10m14s	+01°03.3'		Ser	16"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme; a tratti sembra allungata da N a S, ma potrebbe trattarsi di un'illusione dovuta a una coppia di stelline molto deboli a NW e SW che sono orientate nello stesso modo — 380x.
CGCG 23-21	gx	16h10m41s	+02°06.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' W — 450x.
CGCG 23-24	gx	16h13m29s	−00°53.0'		Ser	24"	m. buona / mediocre	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; meglio definita scalando a 340x.
CGCG 23-25	gx	16h13m49s	+00°31.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×15"; c'è una stellina brillante a un paio di primi verso S — 450x.
CGCG 23-29	gx	16h15m31s	+01°33.0'		Ser	24"	m. buona / mediocre	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø < 20"; situata 1' a W di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 23-30	gx	16h16m34s	−00°35.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 24-1	gx	16h19m18s	+01°42.2'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 24-2	gx	16h19m47s	+01°57.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20".
CGCG 24-4	gx	16h20m21s	+01°13.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; poco disturbata dalla SAO 121510 di 9ª grandezza situata 2.5' a NW — 450x.
CGCG 24-5	gx	16h20m20s	+01°44.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10" (posta praticamente di taglio); ci sono 3 stelle brillanti e allineate a N: la più meridionale, la SAO 121516 di 9ª grandezza, non si riesce a tenere fuori campo — 450x.
CGCG 24-6	gx	16h20m44s	+00°31.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1620+0030 situata 45" a SSW — sono entrambe debolissime e di luminosità uniforme; la 1a appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 30"×15"; la 2a è poco più evidente, orientata da N a S e di dimensioni analoghe — 450x.
CGCG 24-7	gx	16h21m06s	+02°40.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
CGCG 24-11	gx	16h23m12s	+01°45.2'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 24-17	gx	16h34m29s	+02°01.5'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; situata quasi a ridosso N di un piccolo triangolo molto allungato di stelline brillanti — 450x.
CGCG 24-18	gx	16h35m41s	+00°19.9'		Oph	24"	buona / ottimo	poco diffusa, con condensazione centrale di aspetto quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SSW — 450x.
CGCG 24-22	gx	16h41m08s	+02°38.1'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x; poco disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a WSW — 450x.
CGCG 24-25	gx	16h41m54s	+01°43.8'		Oph	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima chiazza grosso modo circolare, molto diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 25-1	gx	16h43m06s	−00°39.3'		Oph	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1643-0038 situata a ridosso N — diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione stellare molto marcata (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 450x.
CGCG 25-2	gx	16h43m05s	+02°05.1'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 25-3	gx	16h43m38s	+00°52.5'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 450x.
CGCG 25-9	gx	16h51m42s	−02°36.9'		Oph	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa, a tratti condensata, poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con una stellina al bordo S; una stella brillante si trova a 1.5' N — 380x.
CGCG 26-1	gx	17h06m50s	+02°14.6'		Oph	24"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso NW — 450x.
CGCG 26-4	gx	17h21m45s	−00°47.7'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 26-7	gx	17h24m03s	+01°39.1'		Oph	24"	m. buona / m. buono	è un elusivo lucore di forma indistinta e molto stemperato sul fondo cielo; appare a fatica in visione distolta a ridosso S di una debole stellina; quest'ultima fa parte di un minuscolo triangolo la cui componente a N è più evidente — 450x.
CGCG 27-1	gx	17h32m59s	+01°42.8'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina subito a SE — 450x.
CGCG 27-2	gx	17h33m48s	−00°35.8'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso NW; la galassietta è situata tra una coppia stretta di stelline a N e una singola a S — 450x.
CGCG 27-3	gx	17h39m46s	+02°49.7'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 27-5	gx	17h43m20s	−01°41.0'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 3 stelline allineate da ENE a WSW e tra loro equidistanti a S della gx — 450x.
CGCG 28-4	gx	18h03m27s	−00°17.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza circolare, diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di 30" scarsi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 29-2	gx	07h10m40s	+06°13.2'		CMi	16"	m. buona / scarso	è una sorta di debolissimo baffo luminoso che a 270x sembra protrudere verso W dalla più meridionale di 3 stelline poste ad arco; non è comunque più estesa di 20".
CGCG 29-3	gx	07h10m50s	+07°52.6'		CMi	24"	ottima / discreto	piccola, debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare visibile a momenti; c'è un piccolo asterismo di stelle brillanti foggiato a "Y" allungata a ridosso W — 450x.
CGCG 29-6	gx	07h12m44s	+06°33.9'		CMi	24"	ottima / discreto	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 29-9	gx	07h13m57s	+07°45.5'		CMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline abbastanza brillanti a N e NW — 450x.
CGCG 29-14	gx	07h15m47s	+04°46.4'		CMi	24"	buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 570x.
CGCG 29-15	gx	07h16m52s	+07°46.4'		CMi	24"	ottima / discreto	molto debole e poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; allineata ed equidistante con 2 stelline a W; c'è altresì una stellina molto debole a ridosso di NE — 450x.
CGCG 29-22	gx	07h23m25s	+02°54.6'		CMi	24"	buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 20"; c'è una stellina brillante a ridosso verso SW e un'altra poco più distante a N — 570x.
CGCG 29-25	gx	07h24m48s	+07°12.0'		CMi	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante sovrapposta verso W; un'altra stellina si trova quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 29-27	gx	07h27m46	+06°27.9'		CMi	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza diffusa approssim. circolare con Ø di 30"-40"; meglio evidente restando a 450x; c'è una stellina a ridosso verso E.
CGCG 29-28	gx	07h29m07s	+06°00.5'		CMi	24"	ottima / discreto	piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
CGCG 29-29	gx	07h30m03s	+05°48.3'		CMi	24"	ottima / discreto	poco più evidente della precedente, pure rotonda, ma con Ø poco maggiore e una tenue condensazione centrale; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 30-3	gx	07h36m31s	+06°21.2'		CMi	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza diffusa di forma indistinta, estesa una 40-ina di secondi e situata a ridosso N di una stellina; meglio tuttavia restare a 450x; situata presso il margine occidentale di una ampia zona piuttosto vuota compresa tra 2 plaghe ove sono presenti numerose stelline brillanti.
CGCG 30-4	gx	07h36m40s	+04°10.3'		CMi	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione NE-SW e situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele schiacciato di deboli stelline; meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 30-5	gx	07h36m06s	+07°59.4'		CMi	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 30-7	gx	07h38m23s	+04°58.6'		CMi	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' scarso S; poco disturbata dalla SAO 115729 di 8ordf; grandezza situata un paio di primi a SW — 450x.
CGCG 30-8	gx	07h40m06s	+05°34.9'		CMi	24"	buona / ottimo	è una debolissima chiazza forse circolare ed estesa non più di 30"; appare solo in visione distolta, ma non conviene scendere sotto i 450x.
CGCG 30-9	gx	07h40m14s	+05°38.7'		CMi	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; forma un minuscolo triangolo molto schiacciato con due deboli stelline, a NNE e a N — 450x.
CGCG 30-11	gx	07h42m14s	+06°42.3'		CMi	24"	ottima / discreto	piccola e molto debole, relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 30-12	gx	07h43m09s	+03°57.0'		CMi	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 30-14	gx	07h45m31s	+07°55.8'		CMi	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 30-18	gx	07h47m46s	+06°48.0'		CMi	24"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e con piccolo bulge quasi stellare, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20", c'è una stellina abbastanza brillante al bordo SE (la quale ha una compagna molto debole a SE).
CGCG 30-19	gx	07h48m51s	+06°13.7'		CMi	24"	ottima / buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare abbastanza facilmente aggettare a S di una stellina (la componente SW di un piccolo asterismo foggiato a "Y") — 450x.
CGCG 30-20	gx	07h48m56s	+06°20.1'		CMi	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata a ridosso S di una piccolo triangolo di stelle: la componente a NW è appena percettibile — 450x.
CGCG 30-21	gx	07h51m45s	+04°30.4'		CMi	24"	buona / discreto	assieme a CGCG 30-22 forma una coppia di debolissime galassiette, molto piccole, osservabili tuttavia abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; la 1ª è un po' più piccola, rotonda, di Ø < 20" e con nucleo stellare percepibile a tratti; la 2ª è poco più evidente ed estesa, con Ø > 20"; 2 deboli stelline si trovano a poco più di 1' NE e NW.
CGCG 30-22	gx	07h51m49s	+04°26.9'		CMi	24"	buona / discreto	v. **CGCG 30-21**
CGCG 30-23	gx	07h52m46s	+06°29.8'		CMi	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 30-24	gx	07h52m59s	+05°29.9'		CMi	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata ~ 40" a S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 30-26	gx	07h53m20s	+06°31.0'		CMi	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma appare facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso S (non sono riuscito a vedere CGCC 30-27).
CGCG 30-28	gx	07h54m18s	+03°22.9'		CMi	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale molto tenue; è situata tra due deboli stelline a ridosso N e SW (quest'ultima è più evidente) — 450x.
CGCG 31-1	gx	07h56m14s	+07°27.2'		CMi	24"	ottima / buono	molto debole e piccola, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 31-5	gx	07h58m14s	+08°09.0'		CMi	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e diffusa, con nucleo stellare evidente; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 31-6	gx	07h58m29s	+07°52.0'		CMi	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 31-8	gx	07h58m26s	+08°08.7'		CMi	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole chiazza circolare con Ø < 30" e una tenue condensazione centrale molto diffusa; c'è una coppia serrata di stelline appena percettibili al bordo orientale.
CGCG 31-10	gx	07h58m36s	+08°15.0'		CMi	24"	ottima / discreto	debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile; è situata sul lato nord-orientale di un piccolo triangolo equilatero coi lati di 1' formato da deboli stelline — 450x.
CGCG 31-12	gx	07h58m58s	+03°13.1'		CMi	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata al vertice rettangolo di un piccolo triangolo formato con due stelline abbastanza brillanti a SE e SW — 450x.
CGCG 31-13	gx	07h59m28s	+07°46.3'		CMi	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 31-16	gx	08h00m01s	+08°00.3'		CMi	24"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; allineata ed equidistante con 2 stelline a NW; altre 3 deboli stelline di luminosità simile e leggermente arcuate si trovano a SW della gx — 450x.
CGCG 31-17	gx	08h00m05s	+06°42.2'		CMi	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un tenue alone grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; situato sul lato maggiore di un piccolo triangolo isoscele molto schiacciato formato da stelline brillanti — 450x.
CGCG 31-18	gx	08h00m28s	+07°49.0'		CMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso NW — 450x.
CGCG 31-19	gx	08h01m05s	+04°19.5'		CMi	24"	m. buona / discreto	debole e molto piccola, rotonda con Ø < 20" e condensazione centrale quasi stellare.
CGCG 31-20	gx	08h01m17s	+04°18.0'		CMi	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 31-21	gx	08h01m23s	+06°08.6'		CMi	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è un poco disturbata da una stella brillante un paio di primi a S — 450x.
CGCG 31-24	gx	08h01m38s	+06°37.4'		CMi	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a 1' NW — 450x.
CGCG 31-25	gx	08h01m46s	+04°17.3'		CMi	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, rotonda con Ø < 20; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S e un'altra poco più evidente subito a E.
CGCG 31-27	gx	08h02m12s	+04°20.1'		CMi	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, in visione distolta appare chiaramente orientata da N a S con dimensioni 30"×15".
CGCG 31-29	gx	08h03m07s	+03°25.0'		CMi	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 30"; disturbata da una stellina brillante a meno di 1' NNW — 450x.
CGCG 31-30	gx	08h03m20s	+03°03.1'		CMi	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, appena più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; si apprezza meglio scalando a 200x.
CGCG 31-31	gx	08h03m22s	+06°59.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NW — 450x.
CGCG 31-37	gx	08h04m13s	+07°22.6'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola; a 450x, in visione distolta, appare orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una doppia serrata dalle componenti molto deboli subito a SW.
CGCG 31-39	gx	08h04m56s	+05°03.8'		CMi	24"	ottima / discreto	molto debole e relativamente compatta, allungata da N a s di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale visibile solo a momenti; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 31-41	gx	08h05m46s	+07°35.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 31-45	gx	08h06m33s	+04°34.7'		CMi	24"	buona / ottimo	molto diffusa e con tenue condensazione centrale, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 31-50	gx	08h07m15s	+04°28.2'		CMi	24"	buona / discreto	relativamente compatta, rotonda con Ø poco superiore a 20" e condensazione centrale evidente; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 31-51	gx	08h07m25s	+06°51.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 31-52	gx	08h07m33s	+04°31.0'		CMi	24"	buona / discreto	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele schiacciato con 2 stelline a SW e SSW — 450x.
CGCG 31-55	gx	08h08m06s	+04°22.1'		CMi	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 45"×15" e con una condensazione centrale che sembra correre lungo l'asse della gx; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW e una debole alla stessa distanza verso NE — 450x.
CGCG 31-56	gx	08h08m16s	+05°13.0'		CMi	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola, poco diffusa e con nucleo stellare, poco allungata da E a W con dimensioni 25"×20".
CGCG 31-57	gx	08h08m33s	+02°37.0'		CMi	24"	buona / discreto	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale visibile a tratti; è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti distanti meno di 2' e orientate da N a S — 450x.
CGCG 31-58	gx	08h09m10s	+05°01.0'		CMi	24"	m. buona / m. buono	chiazza circolare molto debole, diffusa e con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 31-60	gx	08h09m52s	+05°16.7'		CMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 31-61	gx	08h10m20s	+07°56.2'		Cnc	24"	m. buona / mediocre	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 31-62	gx	08h10m44s	+07°28.4'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a ridosso verso S — 450x.
CGCG 31-63	gx	08h10m41s	+03°10.8'		CMi	24"	m. buona / discreto	molto debole, allungata da N a S, dimensioni 30"×15", con tenue e diffusa condensazione centrale; c'è una stellina subito a N — 450x.
CGCG 31-65	gx	08h11m05s	+06°17.9'		CMi	24"	buona / ottimo	è una piccola chiazza circolare con Ø di una 20-ina di secondi molto debole e di luminosità uniforme; nel campo sono presenti alcune stelle brillanti fra cui le SAO 68080 e 68101 di magnitudo rispettivamente 8.7 e 7.3 situate a NE della gx che ne disturbano l'osservazione — 450x.
CGCG 31-70	gx	08h12m04s	+05°28.5'		CMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra 1 stellina a 1' SW e una doppia alla stessa distanza verso NE — 450x.
CGCG 31-71	gx	08h14m03s	+03°23.0'		Hya	24"	m. buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a ~ 1' N di una coppia di stelline; è rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 31-72	gx	08h14m25s	+04°20.5'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo una condensazione centrale molto tenue osservabile solo a momenti; orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 31-75	gx	08h17m52s	+04°42.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; situata a ridosso E di una coppia di stelline; una terza stellina si trova subito a N — 450x.
CGCG 31-77	gx	08h18m13s	+04°46.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza diffusa, forse circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 31-78	gx	08h18m19s	+04°27.1'		Hya	24"	m. buona / buono	debole e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20", c'è una stellina a ~ 40" verso S — 450x.
CGCG 31-79	gx	08h19m02s	+03°38.0'		Hya	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 32-3	gx	08h20m33s	+04°34.3'		Hya	24"	buona / discreto	poco diffusa, con condensazione centrale evidente di aspetto quasi stellare, poco allungata da NW a SE con dimensioni 25"×20"; stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso SE e un'altra appena percettibile dalla parte opposta (a 10' verso W ci sono 3 deboli stelline allineate e molto serrate che a prima vista, se il seeing non è buono, potrebbero anche essere scambiate per un oggetto diffuso) — 450x.
CGCG 32-5	gx	08h21m44s	+04°32.8'		Hya	24"	buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
CGCG 32-7	gx	08h22m25s	+05°00.1'		Hya	24"	ottima / m. buono	debolissimo baffo di luce che emerge a fatica dai bagliori della SAO 116585 di 7ª grandezza situata a 1' scarso NE; è orientata da NE a SW ed estesa sì e no una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 32-9	gx	08h22m42s	+04°19.7'		Hya	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
CGCG 32-11	gx	08h22m56s	+04°07.3'		Hya	24"	buona / buono	debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina al bordo S — 400x.
CGCG 32-12	gx	08h22m59s	+04°16.6'		Hya	24"	buona / buono	piccola, relativamente compatta e condensata, con Ø di ~ 20"; c'è una stellina brillante a SW — 400x.
CGCG 32-13	gx	08h22m58s	+04°23.1'		Hya	24"	buona / buono	molto debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare — 400x.
CGCG 32-14	gx	08h23m21s	+07°40.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare in visione distolta, ma ma non bisogna scendere sotto i 450x forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; il campo è comunque disturbato dalla SAO 116702 di 8ª grandezza situata 3' a NE e da una doppia stretta dalle componenti brillanti che si trova 6' a SW (quest'ultima si riesce tuttavia a tenere fuori campo) — 450x.
CGCG 32-18	gx	08h23m57s	+04°09.1'		Hya	24"	buona / buono	approssim. rotonda con Ø di 35"-40", molto debole, diffusa e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 32-19	gx	08h24m26s	+04°14.9'		Hya	24"	buona / buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare evidente — 400x.
CGCG 32-20	gx	08h24m54s	+07°01.5'		Cnc	24"	ottima / m. buono	debolissima, diffusa, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si fissa la stellina (che è in realtà una doppia strettissima, anche se non l'ho vista come tale) situata 1' a W; sembra rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; un'altra stellina appena percettibile si trova subito a E (presenza di debole chiarore lunare) — 450x.
CGCG 32-21	gx	08h25m10s	+03°22.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x.
CGCG 32-22	gx	08h25m17s	+03°56.0'		Hya	24"	buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo, leggermente condensato e con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
CGCG 32-23	gx	08h25m16s	+06°46.4'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta, allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 32-24	gx	08h25m36s	+05°07.0'		Hya	24"	buona / ottimo	piccola, debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline subito a E — 450x.
CGCG 32-26	gx	08h26m13s	+04°35.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luminosità uniforme, esteso una 30-ina di secondi e che sembra aggettare a SE di una stellina brillante; la visione è comunque un po' disturbata dalla SAO 116758 di 8ordf; grandezza situata a poco più di 5' verso S e che si riesce a tenere fuori campo solo a 580x.
CGCG 32-27	gx	08h26m12s	+02°35.8'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 32-28	gx	08h26m19s	+02°55.5'		Hya	24"	buona / discreto	poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 32-31	gx	08h27m48s	+04°39.4'		Hya	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme; solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; occorre tuttavia restare a 450x per tenere fuori campo la SAO 116776 di magnitudo 8.6 situata 6' a WNW.
CGCG 32-32	gx	08h27m56s	+04°58.7'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo W — 450x.
CGCG 32-33	gx	08h28m20s	+02°26.7'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, purtroppo assai disturbata da una stellina brillante al bordo NE, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 32-38	gx	08h34m39s	+05°45.4'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 32-40	gx	08h37m15s	+04°41.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø <30"; c'è una stellina a ~ 40" verso SW — 450x.
CGCG 32-41	gx	08h38m03s	+07°53.4'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole e molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 45"×15"; sembra di luminosità piuttosto irregolare — 450x.
CGCG 32-43	gx	08h38m23s	+04°00.3'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata e quasi equidistante con 3 stelline a ESE — 450x.
CGCG 32-45	gx	08h38m44s	+07°48.5'		Cnc	24"	buona / buono	rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e con nucleo stellare; c'è una stellina brillante a 1' S — 450x.
CGCG 32-48	gx	08h39m08s	+04°34.0'		Hya	24"	buona / discreto	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; disturbata da 2 stelle brillanti: una a meno di 1' NE e l'altra ancora più luminosa a poco più di 1' verso NW — 450x.
CGCG 32-53	gx	08h43m25s	+08°04.8'		Cnc	24"	ottima / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 33-1	gx	08h43m51s	+02°42.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; è un poco disturbata dalla SAO 117070 di magnitudo 8.5 situata 3' a NE — 450x.
CGCG 33-3	gx	08h46m40s	+02°24.5'		Hya	24"	ottima / m. buono	debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile ridosso W — 450x.
CGCG 33-7	gx	08h47m19s	+02°45.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 33-8	gx	08h47m31s	+02°41.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole orientata da N a S per una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di NE — 450x.
CGCG 33-13	gx	08h51m11s	+05°04.3'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina brillante a 1' verso S e un'altra appena percettibile a una 40-ina di secondi SW — 450x.
CGCG 33-17	gx	08h53m52s	+05°14.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 33-18	gx	08h54m13s	+06°58.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina a 1' N; solo a momenti appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è il nucleo della gx o una stellina sovrapposta; un piccolo asterismo di 5 stelline brillanti si trova subito a NE — 450x.
CGCG 33-22	gx	08h55m32s	+07°35.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø > 20" e condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 33-23	gx	08h55m34s	+06°39.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 33-24	gx	05h55m42s	+04°59.7'		Hya	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e con condensazione centrale stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 33-27	gx	08h55m56s	+03°45.5'		Hya	24"	m. buona / buono	piccola, debolissima, ma relativamente compatta; solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 20"×10" — 450x.
CGCG 33-30	gx	08h57m53s	+07°45.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solamente in visione distolta quasi a ridosso NE di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 33-36	gx	08h59m39s	+07°49.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore diffuso a prima vista di forma indistinta, ma a tratti, alternando gli occhi, appare orientato da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 33-37	gx	08h59m49s	+05°03.7'		Hya	24"	buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina evidente a ridosso verso E — 570x.
CGCG 33-38	gx	09h00m11s	+07°43.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; disturbata da una stellina brillante situata un paio di primi a S; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso NNE — 450x.
CGCG 33-40	gx	09h00m18s	+07°45.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di CGCG 33-38, dalla quale dista 2.5' a NE, nel senso che presenta una condensazione centrale molto tenue; è comunque molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' ENE — 450x.
CGCG 33-42	gx	09h00m47s	+05°54.1'		Hya	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 33-43	gx	09h01m09s	+06°06.5'		Hya	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 33-45	gx	09h01m26s	+07°01.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
CGCG 33-47	gx	09h02m11s	+03°29.7'		Hya	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina una 40-ina di secondi a N.
CGCG 33-49	gx	09h02m15s	+03°10.3'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 33-50	gx	09h02m29s	+03°23.1'		Hya	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è un piccolo triangolo rettangolo isoscele di stelline brillanti a poco più di 1' verso E — 450x.
CGCG 33-52	gx	09h03m36s	+03°22.4'		Hya	24"	m. buona / buono	assieme a CGCG 33-53 forma una coppia di galassiette molto deboli situate all'interno di un piccolo asterismo di stelle brillanti; la 1ª è più debole, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; la 2ª è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e con piccola condensazione centrale — 400x.
CGCG 33-53	gx	09h03m40s	+03°22.2'		Hya	24"	m. buona / buono	v. **CGCG 33-52**
CGCG 33-57	gx	09h04m50s	+08°02.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un triangolo equilatero con 2 stelline a E (la più brillante) e NE; una stellina più debole si trova invece subito a W — 450x.
CGCG 33-58	gx	09h05m55s	+07°12.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è un po' disturbata dalla SAO 117421 di magnitudo 8.6 situata un paio di primi a ESE — 450x.
CGCG 33-60	gx	09h06m57s	+03°10.9'		Hya	24"	buona / discreto	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; salta fuori in visione distolta a ridosso verso N di una stellina brillante che infastidisce — 450x.
CGCG 34-1	gx	09h07m55s	+03°16.3'		Hya	24"	m. buona / buono	debolissima, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta.
CGCG 34-4	gx	09h08m51s	+03°26.9'		Hya	24"	buona / discreto	è una bolla circolare molto debole e di luminosità uniforme, stemperata sul fondo cielo e con Ø di una 40-ina di secondi; meglio definita scalando a 340x; c'è una doppia serrata ~ 1' verso S.
CGCG 34-7	gx	09h10m28s	+03°22.3'		Hya	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 34-13	gx	09h13m12s	+05°36.6'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a W; una stellina relativamente luminosa si trova a 15' verso S; a poco più di 3' NE c'è una bella doppia stretta dalle componenti brillanti; a E di questa si trova un asterismo foggiato a "casetta" formato da 5 stelline brillanti — 450x.
CGCG 34-14	gx	09h14m03s	+07°02.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S — 450x.
CGCG 34-15	gx	09h14m28s	+07°41.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 34-16	gx	09h14m37s	+08°07.0'		Cnc	24"	buona / ottimo	relativamente facile, ma disturbata da una stellina brillante a ridosso verso NE (che è la componente meno luminosa di un rombo orientato da NE a SW), molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 34-20	gx	09h16m25s	+07°05.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E; disturbata da una stella brillante situata 15' a NNE — 450x.
CGCG 34-22	gx	09h18m13s	+07°18.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola chiazza ovale molto debole e diffusa, che aggetta a W di una stellina brillante; a 450x non sembra più estesa di 20"×15".
CGCG 34-24	gx	09h18m58s	+05°53.3'		Hya	24"	buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 34-26	gx	09h19m04s	+05°53.2'		Hya	24"	buona / discreto	è debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, meglio a 450x, di luminosità uniforme e non più estesa di 15".
CGCG 34-27	gx	09h19m24s	+08°01.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 34-30	gx	09h20m03s	+05°44.1'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso W; una stellina brillante situata subito a E interferisce un po' con l'osservazione: meglio spingere a 580x.
CGCG 34-32	gx	09h21m05s	+06°11.8'		Hya	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; si trova al vertice rettangolo di un triangolo formato con due stelline brillanti situate rispettivamente 1' a S e 2' verso W — 450x.
CGCG 34-37	gx	09h22m21s	+04°03.7'		Hya	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 30" — 400x.
CGCG 34-41	gx	09h23m08s	+02°29.1'		Hya	24"	buona / ottimo	debolissima, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, solo a tratti appena più brillante all'interno — 400x.
CGCG 34-43	gx	09h24m01s	+05°12.6'		Hya	24"	m. buona / discreto	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; è poco meglio contrastata scalando a 340x, ma così diventa impossibile tenere fuori campo la SAO 117648 di 7ª grandezza situata 5' a W.
CGCG 34-49	gx	09h28m05s	+02°34.8'		Hya	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; solo a momenti appare un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 34-50	gx	09h28m12s	+03°24.5'		Hya	24"	m. buona / ottimo	facile e relativamente compatta, appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 570x.
CGCG 34-56	gx	09h31m01s	+06°33.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, ma più che altro molto disturbata da una stella brillante di 9ª grandezza situata a poco più di 1' SW; in visione distolta appare molto allungata da NW a SE, con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 35-2	gx	09h31m49s	+07°24.1'		Leo	24"	buona / m. buono	è un piccolo e debolissimo oggetto rotondo molto diffuso e di luminosità uniforme, forse rotondo con Ø < 20"; c'è una debole stellina a ridosso SW.
CGCG 35-3	gx	09h31m52s	+07°34.8'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; meglio evidente a 450x; c'è un asterismo disperso di 7 stelle brillanti a SE (ma si nota abbassando gli ingrandimenti).
CGCG 35-5	gx	09h34m00s	+02°28.6'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza circolare di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi (o poco più); c'è una doppia stretta dalle componenti brillanti a 5.5' NNE — 450x.
CGCG 35-7	gx	09h34m45s	+06°25.5'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 35-11	gx	09h35m53s	+04°01.0'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 35-21	gx	09h39m23s	+06°24.1'		Hya	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 35-22	gx	09h39m29s	+06°13.7'		Hya	24"	m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 35-23	gx	09h39m30s	+06°26.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina brillante situata a W (la visione è un po' disturbata dalla SAO 117827 situata 3' a N).
CGCG 35-25	gx	09h39m35s	+06°24.9'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, compatta, forse rotonda con dimensioni di una decina di secondi; appare facilmente in visione distolta quando si osserva la precedente, dalla quale dista 2' scarsi a SW — 450x.
CGCG 35-30	gx	09h41m58s	+03°07.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 35-36	gx	09h42m22s	+04°21.3'		Sex	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di CGCG 35-38, osservata subito prima e dalla quale dista 7' a NW, è diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare visibile a momenti — 450x.
CGCG 35-37	gx	09h42m31s	+07°05.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 35-38	gx	09h42m46s	+04°17.6'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a ridosso W di una stellina, ma è meglio spingere a 450x; è molto piccola, forse rotonda con Ø max di 15".
CGCG 35-39	gx	09h43m08s	+03°25.8'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 35-40	gx	09h43m37s	+07°27.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 35-41	gx	09h43m58s	+02°51.1'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; appare facilmente in visione distolta quando si fissa la stellina 1' a SE — 450x.
CGCG 35-43	gx	09h44m10s	+02°24.6'		Sex	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, solo a tratti leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata dalla SAO 117879 di 9ª situata 3' a E — 450x.

CGCG 35-44	gx	09h45m13s	+07°07.6'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 35-45	gx	09h45m17s	+07°24.3'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 35-55	gx	09h46m43s	+06°41.0'		Leo	24"	buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e condensata, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; allineata e quasi equidistante con 2 stelline a NNE; la SAO 117898, rossiccia di 6ª grandezza, si trova 8' a WNW, ma si riesce a tenere fuori campo a 450x.
CGCG 35-56	gx	09h47m00s	+02°33.7'		Sex	24"	buona / discreto	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; forse rotonda con Ø di una 0-ina di secondi.
CGCG 35-57	gx	09h47m35s	+06°48.9'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza di forma indistinta situata a ridosso SW della SAO 117912 di magnitudo 8.5; è estesa forse una 30-ina di secondi, ma ho dovuto spingere a 580x per scovarla: appare infatti solo a momenti fra i bagliori della stella.
CGCG 35-60	gx	09h48m16s	+03°54.3'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme; a 580x appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una doppia dalle componenti abbastanza brillanti a NW: queste sono distanti all'incirca come la dimensione della gx e orientate più o meno nello stesso modo.
CGCG 35-61	gx	09h48m41s	+03°22.5'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
CGCG 35-62	gx	09h49m00s	+02°27.7'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare molto allungata da E a W cono dimensioni 30"×10"; è situata 2.5' a SW di CGCG 35-94 osservata in altra data — 450x.
CGCG 35-63	gx	09h49m01s	+04°18.2'		Sex	24"	buona / discreto	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 35-64	gx	09h49m09s	+02°28.8'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 400x.
CGCG 35-65	gx	09h49m27s	+04°00.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" e condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 35-66	gx	09h50m35s	+04°46.4'		Sex	24"	buona / discreto	molto diffusa, con bulge esteso, poco contrastato sul disco, ma ben evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
CGCG 35-67	gx	09h51m12s	+04°05.8'		Sex	24"	buona / ottimo	debolissima e di forma indistinta, estesa 40" o 50"; a tratti sembra di vedere una condensazione centrale puntiforme; appare in visione distolta a 1' N di una stellina — 400x.
CGCG 35-68	gx	09h51m09s	+05°09.3'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 35-70	gx	09h51m28s	+07°15.8'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NE — 450x.
CGCG 35-71	gx	09h51m45s	+03°16.3'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 35-72	gx	09h52m01s	+04°09.0'		Sex	24"	buona / ottimo	allungata da E a W con dimensioni 45"×30", poco diffusa e appena più brillante all'interno — 400x.
CGCG 35-73	gx	09h52m08s	+04°15.2'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale puntiforme visibile a tratti — 400x.
CGCG 35-74	gx	09h52m31s	+04°50.8'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 35-75	gx	09h53m02s	+07°50.5'		Leo	24"	buona / mediocre	debolissima e a tratti condensata; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20".
CGCG 35-77	gx	09h53m30s	+07°03.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W; appare a tratti subito a NE di una coppia di deboli stelline distanti all'incirca come la dimensione della gx — 450x.
CGCG 35-82	gx	09h54m12s	+07°07.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 35-83	gx	09h54m11s	+02°17.2'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 60"×50"; meglio visibile a 280x.
CGCG 35-84	gx	09h54m37s	+06°37.3'		Leo	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 35-86	gx	09h55m10s	+06°33.0'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 35-90	gx	09h55m40s	+05°02.6'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stella brillante a 1' NE — 450x.
CGCG 36-3	gx	09h55m59s	+06°34.0'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra 2 stelline orientate da NW a SE (quella a SE è appena percettibile) — 450x.
CGCG 36-6	gx	09h56m59s	+03°48.8'		Sex	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra 2 stelline distanti 1.5' e orientate da NW a SE: la seconda è più brillante — 450x.
CGCG 36-7	gx	09h57m11s	+05°12.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 36-10	gx	09h57m30s	+08°07.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline a S — 450x.
CGCG 36-19	gx	10h00m57s	+03°08.5'		Sex	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina al bordo E — 450x.
CGCG 36-20	gx	10h01m03s	+04°37.9'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e con condensazione centrale puntiforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 400x.
CGCG 36-22	gx	10h01m36s	+03°36.8'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 36-24	gx	10h02m59s	+02°00.6'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso E — 450x.
CGCG 36-25	gx	10h03m46s	+03°40.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a SE — 450x.
CGCG 36-26	gx	10h03m57s	+02°25.0'		Sex	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×15" — 570x.
CGCG 36-27	gx	10h04m09s	+06°30.6'		Leo	24"	buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo, compatto e condensato con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 36-29	gx	10h04m41s	+04°49.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 36-32	gx	10h05m18s	+05°34.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 36-33	gx	10h05m19s	+02°29.7'		Sex	24"	ottima / buono	molto piccola, debole, ma relativamente compatta, a 450x appare chiaramente allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a N e una brillante a poco più di 1' NW — 450x.
CGCG 36-34	gx	10h05m30s	+05°40.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e appena più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 36-35	gx	10h05m35s	+03°03.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 36-37	gx	10h06m03s	+03°06.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una doppia stretta sbilanciata quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 36-39	gx	10h06m17s	+03°49.6'		Sex	24"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina molto debole sul prolungamento dell'asse della gx verso SSE; coppia di stelle brillanti a un paio di primi verso S — 570x.
CGCG 36-41	gx	10h07m21s	+04°04.7'		Sex	24"	m. buona / discreto	piccola e debole, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a meno di 1' verso NW — 450x.
CGCG 36-42	gx	10h08m10s	+02°27.8'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso S (presenza di chiarore lunare) — 450x.
CGCG 36-45	gx	10h09m46s	+05°10.4'		Sex	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, approssim. rotonda con Ø probabilmente > 30" — 380x.
CGCG 36-47	gx	10h10m35s	+06°10.0'		Sex	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 36-48	gx	10h10m37s	+05°09.0'		Sex	16"	ottima / ottimo	debolissima, probabilmente rotonda con Ø < 30"; presenta un nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 36-49	gx	10h10m40s	+07°34.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, situata in una piccola zona depleta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a 1' SE — 450x.
CGCG 36-51	gx	10h11m09s	+07°46.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	baffo molto tenue e di luminosità uniforme orientato da N a S e situato a ridosso E di una coppia di stelline diseguali distanti 1' scarso in direzione N-S — 450x.
CGCG 36-52	gx	10h11m20s	+05°53.8'		Sex	24"	m. buona / discreto	bolla circolare, diffusa e di luminosità uniforme con Ø > 30"; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
CGCG 36-54	gx	10h12m01s	+03°21.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 36-58	gx	10h12m41s	+04°49.3'		Sex	16"	ottima / ottimo	piccola ed elusiva galassietta di 15" o 20" di Ø, appare solo a tratti in visione distolta quasi a ridosso NW di una stellina — 380x.
CGCG 36-61	gx	10h12m58s	+06°10.6'		Sex	24"	buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 36-65	gx	10h12m09s	+06°04.4'		Sex	24"	buona / discreto	è una debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da NE a SW; appare tuttavia come tale solo in visione distolta a 450x.
CGCG 36-67	gx	10h14m18s	+06°30.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 36-71	gx	10h15m05s	+05°40.5'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
CGCG 36-72	gx	10h15m17s	+05°23.2'		Sex	24"	m. buona / discreto	piccola, debole e poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina evidente quasi a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 36-74	gx	10h15m53s	+06°57.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina brillante subito a NW; un piccolo oggetto diffuso molto debole, ma separato dalla gx si trova a ridosso SW; a prima vista dà l'impressione che la gx sia allungata in quella direzione (da un controllo successivamente effettuato è risultato infatti trattarsi di PGC 1310913) — 450x.
CGCG 36-76	gx	10h16m00s	+06°15.1'		Sex	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" e nucleo quasi stellare — 450x.
CGCG 36-77	gx	10h16m00s	+04°57.3'		Sex	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, di Ø max 15"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso S — 380x.
CGCG 36-78	gx	10h16m12s	+03°39.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 36-79	gx	10h16m16s	+06°15.0'		Sex	24"	m. buona / discreto	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 36-82	gx	10h16m54s	+03°46.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 36-84	gx	10h17m37s	+06°23.7'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa, molto disturbata dalla SAO 118202 di 8ª grandezza situata 2.5' a NE; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 36-86	gx	10h18m08s	+06°25.9'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 36-88	gx	10h18m18s	+03°21.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
CGCG 36-91	gx	10h19m18s	+04°45.8'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto piccola e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 37-1	gx	10h20m10s	+06°57.1'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a 1' N — 450x.
CGCG 37-2	gx	10h20m04s	+07°46.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-3	gx	10h20m25s	+07°40.6'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; disturbata dalla SAO 118236 di 9a grandezza situata ad appena 1.5' NW; una debole stellina si trova a 1' scarso W — 450x.
CGCG 37-6	gx	10h20m40s	+07°51.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø anche questa di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-7	gx	10h20m53s	+06°09.4'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE — 450x.
CGCG 37-8	gx	10h20m58s	+06°38.5'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, di dimensione simile a CGCG 37-1 osservata subito prima, ma poco più evidente — 450x.
CGCG 37-10	gx	10h21m13s	+08°06.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio contrastata a 340x.
CGCG 37-11	gx	10h21m29s	+05°56.5'		Sex	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 37-12	gx	10h21m36s	+06°01.6'		Sex	24"	m. buona / discreto	poco più evidente di CGCG 37-11, dalla quale dista 5' a NNE, e poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø simile — 450x.
CGCG 37-16	gx	10h22m31s	+04°35.0'		Sex	24"	m. buona / discreto	piccola e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e condensazione centrale diffusa; c'è una stellina molto debole a ~ 1' SW — 400x.
CGCG 37-17	gx	10h22m48s	+03°45.5'		Sex	24"	m. buona / discreto	debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 37-18	gx	10h22m51s	+04°45.9'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 37-22	gx	10h24m00s	+06°29.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 37-23	gx	10h24m03s	+06°29.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva la precedente — situata 1' a SW — ma è debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-24	gx	10h24m18s	+07°13.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa sì e no 12"-15", situata a ridosso SE di una stellina; una stellina brillante si trova 1.5' a SW — 450x.
CGCG 37-27	gx	10h24m45s	+06°24.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, appare facilmente in visione distolta a 1' S della successiva; diffusa, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 37-28	gx	10h24m44s	+06°26.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente facile e diffusa, rotonda con Ø < 30" e con piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 37-29	gx	10h24m53s	+03°50.8'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
CGCG 37-34	gx	10h26m00s	+05°29.0'		Sex	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-36	gx	10h26m28s	+04°15.8'		Sex	24"	m. buona / buono	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 37-38	gx	10h26m44s	+08°10.9'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; difficile da scovare in quanto situata in una piccola zona piuttosto depleta — 450x.
CGCG 37-39	gx	10h26m56s	+08°09.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e 3 deboli stelline quasi allineate e di luminosità decrescente a SW; assieme alla precedente forma una coppia di galassiette difficili da trovare, in quanto situate in una piccola zona di cielo con pochi riferimenti — 450x.
CGCG 37-41	gx	10h27m33s	+04°28.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	è debolissima, ma in visione distolta appare facilmente a 1' NE di una stellina brillante che disturba un poco; meglio restare a 450x; dovrebbe essere rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 37-47	gx	10h28m48s	+04°14.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-48	gx	10h29m10s	+05°08.4'		Sex	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, diffusa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-54	gx	10h30m21s	+07°13.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" o poco più — 450x.
CGCG 37-55	gx	10h30m20s	+08°03.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
CGCG 37-56	gx	10h30m29s	+07°11.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso W — 450x.
CGCG 37-67	gx	10h31m52s	+07°58.2'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 37-69	gx	10h31m57s	+03°04.9'		Sex	24"	ottima / buono	assieme a CGCG 37-72 e CGCG 37-73 forma un terzetto di 3 debolissime galassiette allineate ed equidistanti in direzione NE-SW; sono relativamente compatte, molto piccole e osservabili solo in visione distolta, meglio a 450x — questa è rotonda con Ø max di 15". la 2ª appare a momenti orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; la 3a, infine, è la più difficile, nonché la più piccola, con Ø di una decina di secondi.
CGCG 37-72	gx	10h32m33s	+03°08.9'		Sex	24"	ottima / buono	assieme alla precedente e alla successiva forma un terzetto di 3 debolissime galassiette allineate ed equidistanti in direzione NE-SW; sono relativamente compatte, molto piccole e osservabili solo in visione distolta, meglio a 450x — appare a momenti orientata da N a S con dimensioni 30"×15".
CGCG 37-73	gx	10h33m02s	+03°12.4'		Sex	24"	ottima / buono	assieme alle due precedenti forma un terzetto di 3 debolissime galassiette allineate ed equidistanti in direzione NE-SW; sono relativamente compatte, molto piccole e osservabili solo in visione distolta, meglio a 450x — è la più difficile delle 3, nonché la più piccola, con Ø di una decina di secondi.
CGCG 37-74	gx	10h33m21s	+02°37.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una coppia di stelline brillanti a SSE.
CGCG 37-76	gx?	10h33m28s	+07°08.0'		Leo	24"	ottima / buono	a 340x ha l'aspetto di una comune galassietta molto debole estesa una 20-ina di secondi, ma spingendo a 580x si nota una doppia dalle componenti molto tenui e serrate, orientate in direzione N-S; quella più a S è appena più evidente: il Megastar la riporta come *Multi-Galaxy-Sys*, il che deporrebbe a favore di un oggetto doppio.
CGCG 37-77	gx	10h33m34s	+04°15.8'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 37-78	gx	10h33m34s	+07°48.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 37-79	gx	10h34m11s	+07°55.7'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-80	gx	10h34m30s	+03°44.8'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata con 3 stelline a SE (quella più a S è brillante) — 450x.
CGCG 37-81	gx	10h34m37s	+06°40.2'		Leo	24"	m. buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette molto piccole, diffuse di luminosità uniforme, rotonde con Ø di una 15-ina di secondi e separate da 1.5' in direzione N-S; la prima è poco più evidente — 450x.
CGCG 37-82	gx	10h34m39s	+06°38.5'		Leo	24"	m. buona / buono	v. **CGCG 37-81**
CGCG 37-84	gx	10h34m57s	+04°49.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso ENE; non sembra gran che disturbata dalla SAO 118382 di 8ª grandezza situata poco più di 4' a E (presenza di chiarore lunare) — 450x.
CGCG 37-87	gx	10h35m42s	+05°37.0'		Sex	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE — 450x.
CGCG 37-88	gx	10h35m51s	+03°53.5'		Sex	24"	ottima / buono	poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 37-90	gx	10h36m40s	+05°33.2'		Sex	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e con condensazione centrale evidente, quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-92	gx	10h36m36s	+05°54.6'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale poco contrastata, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-94	gx	10h37m24s	+02°18.7'		Sex	24"	m. buona / buono	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW (che in realtà è poi risultata essere la **PGC 1223174**) — 450x.
CGCG 37-106	gx	10h40m00s	+03°06.7'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; è in realtà doppia, ma non sono riuscito a separarle neppure a 580x; è situata sul cateto orientale di un piccolo triangolo rettangolo isoscele formato da 3 stelline di 14-esima.
CGCG 37-107	gx	10h40m06s	+07°34.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a NE; una più debole si trova a 1' SE — 450x.
CGCG 37-114	gx	10h41m13s	+06°22.2'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 30"; forma una coppia ravvicinata con UGC 5818 situata a ridosso SE — 380x.
CGCG 37-117	gx	10h41m34s	+06°15.5'		Sex	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 37-122	gx	10h42m19s	+06°12.1'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 37-123	gx	10h42m27s	+02°45.7'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; è un poco disturbata dalla SAO 118439 di 8ª grandezza situata 4' a NW — 450x.
CGCG 38-1	gx	10h43m39s	+04°58.2'		Sex	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 450x.
CGCG 38-3	gx	10h44m02s	+04°39.8'		Sex	24"	ottima / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 38-4	gx	10h44m17s	+02°47.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, con tenue nucleo stellare, rotonda con Ø di 10"-15"; forma un minuscolo triangolo isoscele con 2 stelline, a E e SE — 450x.
CGCG 38-6	gx	10h44m22s	+02°47.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	situata poco più di 1' a E di CGCG 38-4, è una galassietta debolissima, ma a 450x, in visione distolta, appare abbastanza facilmente orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15".
CGCG 38-17	gx	10h48m27s	+04°49.5'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, rotonda con Ø > 20", diffusa e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina a una 40-ina di secondi NW — 450x.
CGCG 38-18	gx	10h48m27s	+06°58.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e oltre tutto molto disturbata da una coppia di stelle brillanti di 9a grandezza situate rispettivamente a 2.5' N e 3.5' E; si riesce a cogliere furtivamente spingendo a 580x, forse rotonda con Ø grosso modo di 30".
CGCG 38-19	gx	10h48m32s	+04°48.6'		Sex	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, ma relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N e un'altra a 1' scarso SW.
CGCG 38-26	gx	10h50m17s	+06°07.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; ci sono 3 stelline allineate ed equidistanti a N — 450x.
CGCG 38-27	gx	10h50m47s	+06°05.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 38-30	gx	10h50m55s	+06°52.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S, molto disturbato dalla SAO 118527 di 9ª grandezza situata ad appena 1' SW; c'è una stellina molto debole subito a W e una percettibile solo a momenti a ridosso N; la gx appare solo a momenti, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 38-33	gx	10h51m37s	+04°39.0'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima, piccola, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta quando si osserva la stellina a 1' verso E.
CGCG 38-34	gx	10h51m34s	+08°09.9'		Leo	24"	m. buona / buono	elusiva, appare a tratti in visione distolta, ma occorre scalare a 340x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 38-38	gx	10h52m06s	+03°22.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 38-39	gx	10h52m27s	+08°05.6'		Leo	24"	m. buona / buono	diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 38-41	gx	10h52m29s	+07°54.3'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 38-43	gx	10h53m18s	+02°37.6'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza diffusa estesa una 30-ina di secondi; appare in visione distolta a 1' S di una debole stellina — 450x.
CGCG 38-44	gx	10h54m04s	+06°43.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 38-48	gx	10h55m13s	+05°51.7'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata — 450x.
CGCG 38-50	gx	10h55m32s	+04°27.2'		Leo	24"	ottima / buono	molto piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e leggermente condensata; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline, una a N e l'altra a W.
CGCG 38-52	gx	10h55m36s	+04°22.6'		Leo	24"	ottima / buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina subito a NE — 450x.
CGCG 38-54	gx	10h56m09s	+06°10.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una condensazione stellare abbastanza evidente; non sembra disturbata dalla 56 Leonis, di colore arancio e magnitudo 5.7, situata ad appena un paio di primi a NW; una doppia stretta e sbilanciata si trova a 1' SE — 580x.
CGCG 38-56	gx	10h56m31s	+05°35.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 38-58	gx	10h56m46s	+05°39.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e disturbata dalla SAO 118582 di 9ª grandezza situata un paio di primi a SE; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 38-59	gx	10h56m46s	+06°51.2'		Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e appena condensata — 380x.
CGCG 38-64	gx	10h57m51s	+08°02.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso SE, mentre un'altra appena percettibile si trova a ridosso N — 450x.
CGCG 38-65	gx	10h57m55s	+04°33.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di CGCG 38-72 con dimensioni simili e orientata nello stesso modo; ma è più difficile da vedere poiché situata in una piccola zona di cielo depleta; presenta un nucleo puntiforme visibile solo a momenti.
CGCG 38-67	gx	10h58m13s	+02°38.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme; meglio evidente a 450x.
CGCG 38-68	gx	10h58m12s	+07°34.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 38-69	gx	10h58m16s	+04°35.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e leggermente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" (o poco meno) — 450x.
CGCG 38-71	gx	10h58m23s	+06°42.9'		Leo	28"	ottima / buono	molto diffusa, rotonda con Ø < 40" ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina al bordo E; una stellina abbastanza brillante si trova a 1' E, mentre una appena percettibile è a 1' verso S — 495x.
CGCG 38-72	gx	10h58m31s	+04°37.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, di luminosità uniforme, disturbata da una stellina brillante situata subito a E; in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10".
CGCG 38-73	gx	10h58m47s	+05°31.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa almeno 1' in direzione E-W; meglio evidente a 450x; c'è una stellina brillante a 1.5' WSW che disturba un po' l'osservazione.
CGCG 38-75	gx	10h59m07s	+05°00.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 38-78	gx	10h59m33s	+07°41.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a E — 450x.
CGCG 38-79	gx	10h59m44s	+03°59.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 38-81	gx	11h00m19s	+06°13.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 38-82	gx	10h00m20s	+07°35.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce di luminosità uniforme, orientata da NE a SW esteso per 30"-40"; appare in visione distolta a 1.5' S di una stellina; si fatica a osservarla, soprattutto a 450x, perché il campo nei dintorni è virtualmente depleto.
CGCG 38-83	gx	11h00m24s	+04°11.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con tenue bulge poco contrastato, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; è situata tra una stellina abbastanza brillante e una appena percettibile orientate nello stesso modo — 450x.
CGCG 38-84	gx	11h00m28s	+06°24.1'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi ina di secondi — 495x.
CGCG 38-86	gx	11h01m06s	+04°38.0'		Leo	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a 1.5' SE e una più brillante un paio di primi a N.
CGCG 38-87	gx	11h01m17s	+03°33.6'		Leo	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 40"-50" (situata 4' a S di NGC 3495) — 450x.
CGCG 38-89	gx	11h01m21s	+03°02.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 38-90	gx	11h02m02s	+03°34.8'		Leo	24"	m. buona / buono	chiazza diffusa molto debole e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole subito a S — 450x.
CGCG 38-91	gx	11h02m22s	+06°04.6'		Leo	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole a 1.5' NE e una appena più evidente 2' a SW — 495x.
CGCG 38-92	gx	11h02m31s	+02°37.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 39-95 situata 1' a SE — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; doppia stretta appena percettibile a 1' scarso W — 580x.
CGCG 38-94	gx	11h02m32s	+04°03.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 38-95	gx	11h02m34s	+02°36.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 39-92 situata 1' a NW; è poco più evidente della prima e più piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 580x.
CGCG 38-96	gx	11h02m44s	+05°22.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, molto diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso ENE — 450x.
CGCG 38-98	gx	11h03m07s	+03°28.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 38-99	gx	11h03m04s	+05°05.9'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, appare senza problemi in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; è assai stemperata sul fondo cielo, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 45"×30".
CGCG 38-102	gx	11h03m18s	+05°04.3'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, poco diffusa e a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" (situata a metà strada tra CGCG 38-99 a NW e una stellina abbastanza brillante a SE) — 450x.
CGCG 38-103	gx	11h03m21s	+06°50.5'		Leo	24"	m. buona / buono	assieme a CGCG 38-104 e CGCG 38-105 costituisce un terzetto di galassiette molto piccole e deboli che si osservano con difficoltà a causa della mancanza di stelline abbastanza brillanti di riferimento. L'ultima delle 3 è la più facile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la 1ª appare a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" mentre la 2ª è anch'essa rotonda con Ø di ~ 20" e ha una stellina subito a S — 450x.
CGCG 38-104	gx	11h03m21s	+06°55.3'		Leo	24"	m. buona / buono	v. **CGCG 38-103**
CGCG 38-105	gx	11h03m27s	+06°52.3'		Leo	24"	m. buona / buono	v. **CGCG 38-103**
CGCG 38-106	gx	11h03m35s	+03°20.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 38-107	gx	11h04m11s	+07°04.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con condensazione stellare abbastanza marcata — 450x.
CGCG 38-110	gx	11h04m30s	+02°40.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
CGCG 38-111	gx	11h04m31s	+03°43.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W e una più debole subito a N — 450x.
CGCG 38-113	gx	11h04m37s	+06°23.7'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, diffuse e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra una stellina a ~ 2' ESE e una coppia alla stessa distanza WNW — 495x.
CGCG 38-116	gx	11h04m59s	+04°17.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più debole di UGC 6142A, dalla quale dista 3.5' a E, ma di aspetto simile, rotonda con Ø poco maggiore e condensata — 450x.
CGCG 38-117	gx	11h05m07s	+04°35.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa 1' e orientata da E a W; c'è una stellina appena percettibile a 1' WNW — 450x.
CGCG 38-118	gx	11h05m05s	+07°56.6'		Leo	28"	ottima / buono	debolissima, a tratti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso E e un'altra a 2' NE — 495x.
CGCG 38-121	gx	11h05m57s	+02°40.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 38-122	gx	11h07m07s	+03°19.2'		Leo	24"	ottima / ottimo	assieme a CGCG 38-124 forma una coppia di galassiette deboli, ma relativamente facili da vedere, rotonde, poco diffuse e con Ø di una 20-ina di secondi; la 2ª è più evidente e presenta una tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 38-124	gx	11h06m10s	+03°19.2'		Leo	24"	ottima / ottimo	v. **CGCG 38-122**
CGCG 38-125	gx	11h06m11s	+04°20.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30", poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 38-135	gx	11h07m29s	+03°48.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; meglio non scendere sotto i 450x; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a un paio di primi SW.
CGCG 38-136	gx	11h07m37s	+05°15.6'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 39-2	gx	11h07m33s	+03°15.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 39-3	gx	11h07m49s	+02°21.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 39-4	gx	11h08m01s	+07°26.6'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" e appena più brillante all'interno — 495x.
CGCG 39-5	gx	11h07m59s	+07°29.0'		Leo	28"	ottima / buono	più debole della precedente, dalla quale dista 2.5' a N, di dimensioni simili, orientata da N a S e con nucleo stellare visibile a momenti — 495x.
CGCG 39-8	gx	11h08m24s	+03°29.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" (o poco più); disturbata dalla SAO 118679 di 7ª grandezza situata 3' a NW — 450x.
CGCG 39-9	gx	11h08m32s	+05°49.5'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e tenue condensazione stellare — 450x.
CGCG 39-13	gx	11h08m54s	+02°40.6'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la visione è disturbata da una stellina brillante situata quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 39-14	gx	11h08m55s	+06°18.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 39-15	gx	11h09m03s	+05°01.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa, molto difficile da osservare in quanto situata all'interno di un asterismo formato da 4 stelle molto brillanti; appare solo a momenti in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma; non pare comunque più estesa di 30" — 450x.
CGCG 39-16	gx	11h09m01s	+06°20.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	di aspetto e dimensioni simili a CGCG 39-14, dalla quale dista un paio di primi a NE, ma poco più evidente, ancorché situata a 1' WSW di una stella brillante che offusca un po' il campo — 450x.
CGCG 39-17	gx	11h09m05s	+04°46.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta quasi a ridosso SE di una debole stellina; forse rotonda con Ø di 20"-30".
CGCG 39-23	gx	11h09m48s	+03°24.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 39-27	gx	11h10m05s	+03°28.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 450x.
CGCG 39-31	gx	11h10m20s	+04°41.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" e nucleo stellare abbastanza marcato — 450x.
CGCG 39-32	gx	11h10m26s	+03°59.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale puntiforme visibile a momenti — 450x.
CGCG 39-33	gx	11h10m25s	+04°36.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 39-35	gx	11h10m23s	+05°00.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE — 450x.
CGCG 39-37	gx	11h10m35s	+03°16.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.

CGCG 39-38	gx	11h10m34s	+04°04.3'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 39-39	gx	11h10m39s	+03°45.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e con condensazione centrale evidente; appare come una stellina appena sfuocata a 340x, mentre a 450x è chiaramente diffusa, anche se non più estesa di 10"; è situata tra 2 deboli stelline di luminosità simile e distanti 3'.
CGCG 39-40	gx	11h10m37s	+04°11.5'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
CGCG 39-41	gx	11h10m45s	+04°30.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 1' e nucleo stellare — 450x.
CGCG 39-43	gx	11h10m53s	+05°05.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta, meglio a 450x, forse rotonda con Ø < 20".
CGCG 39-45	gx	11h11m03s	+04°52.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione stellare visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 39-46	gx	11h11m06s	+03°45.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
CGCG 39-48	gx	11h11m12s	+03°04.6'		Leo	24"	buona / ottimo	molto piccola e poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 39-49	gx	11h11m09s	+03°56.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione stellare appena percettibile; c'è una stellina brillante a poco più di 1' W — 450x.
CGCG 39-50	gx	11h11m18s	+03°11.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 39-52	gx	11h11m29s	+03°16.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 20"×15" e con condensazione centrale appena accennata — 450x.
CGCG 39-53	gx	11h11m31s	+03°18.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto simile alla CGCG 39-52, dalla quale dista 2' scarsi NNE, sia come orientamento, sia come dimensioni; solo poco più brillante e con condensazione centrale più evidente — 450x.
CGCG 39-54	gx	11h11m26s	+04°35.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, solo a tratti in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso S — 450x.
CGCG 39-55	gx	11h11m21s	+05°49.8'		Leo	16"	ottima / ottimo	è un piccolo oggetto rotondo di luminosità pressoché uniforme e con Ø di ~ 20", situato a neppure 1' SE di NGC 3567 e osservabile a 380x.
CGCG 39-58	gx	11h11m34s	+02°57.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e poco diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 39-59	gx	11h11m32s	+06°26.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 39-61	gx	11h11m41s	+04°40.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 39-63	gx	11h12m02s	+03°02.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 39-65	gx	11h12m07s	+03°08.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e condensata, molto piccola, allungata da N a S con dimensioni 20"×10".
CGCG 39-66	gx	11h12m22s	+03°45.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una debole stellina a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 39-68	gx	11h13m00s	+07°51.7'		Leo	28"	ottima / buono	lama di luce molto debole orientata da NW a SE ed estesa 45" — 495x.
CGCG 39-69	gx	11h13m08s	+05°04.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 39-70	gx	11h13m06s	+05°14.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, piccola, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella brillante a 1.5' verso W.
CGCG 39-72	gx	11h13m07s	+07°41.3'		Leo	28"	ottima / buono	molto piccola, debolissima e condensata, forse rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
CGCG 39-73	gx	11h13m12s	+05°11.9'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, rotonda con Ø di 1' scarso diffusa e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente scalando a 340x.
CGCG 39-74	gx	11h13m16s	+07°50.0'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
CGCG 39-76	gx	11h13m21s	+05°05.6'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, salta fuori abbastanza facilmente i visione distolta scalando a 340x; a tratti appare allungata da E a W con dimensioni 20"×10".
CGCG 39-77	gx	11h13m20s	+02°32.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	chiazza lattescente molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi, quasi delimitata da 2 stelline appena percettibili situate a N e SE — 450x.
CGCG 39-79	gx	11h13m41s	+07°45.8'		Leo	28"	ottima / buono	molto piccola e di aspetto più uniforme rispetto **CGCG 39-74**, osservata subito prima, anche questa con Ø non maggiore di 15" — 495x.
CGCG 39-80	gx	11h13m43s	+06°41.2'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x quando si osserva la doppia situata 3.5' a ENE; solo a momenti, però, appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" (8.5' a NW di IC 678).
CGCG 39-84	gx	11h14m20s	+04°01.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, si osserva in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; a tratti appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×10".
CGCG 39-85	gx	11h14m27s	+04°05.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (o poco meno) — 450x.
CGCG 39-86	gx	11h14m24s	+04°09.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 39-88	gx	11h14m43s	+04°01.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione stellare marcata (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 450x.
CGCG 39-89	gx	11h15m00s	+03°36.1'		Leo	24"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 39-90	gx	11h15m02s	+04°05.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 39-94	gx	11h16m26s	+04°20.2'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole lama di luce di luminosità uniforme orientata da E a W ed estesa 1' scarso [presenza di Giove a 13' SW di σ Leonis] — 450x.
CGCG 39-95	gx	11h16m22s	+04°43.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi [presenza di Giove a 13' SW di σ Leonis] — 450x..
CGCG 39-96	gx	11h16m41s	+07°57.8'		Leo	28"	ottima / buono	piccola e molto debole, in visione distolta è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 39-101	gx	11h17m20s	+02°26.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da N a S e che in visione distolta sembra estesa per almeno 1' — 450x.
CGCG 39-102	gx	11h17m31s	+03°01.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con nucleo stellare relativamente brillante che tende un po' a offuscare la periferia; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 39-104	gx	11h17m41s	+07°17.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile e compatta, orientata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue nucleo stellare — 450x.
CGCG 39-107	gx	11h17m59s	+07°07.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso NE — 450x.
CGCG 39-110	gx	11h18m12s	+03°48.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; meglio evidente a 450x.
CGCG 39-111	gx	11h18m16s	+03°52.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a ESE — 450x.
CGCG 39-113	gx	11h18m46s	+07°29.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø < 2' e di luminosità uniforme.
CGCG 39-115	gx	11h18m56s	+03°35.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 39-118	gx	11h19m21s	+07°24.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' scarso SSW — 450x.
CGCG 39-119	gx	11h19m26s	+03°12.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia abbastanza stretta a NW dalle componenti deboli e orientate da N a S — 450x.
CGCG 39-121	gx	11h19m44s	+07°35.5'		Leo	28"	ottima / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ridosso SW e una più evidente subito a NW — 495x.
CGCG 39-125	gx	11h20m18s	+04°19.2'		Leo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina un paio di primi a W — 380x.
CGCG 39-127	gx	11h20m29s	+04°07.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 39-129	gx	11h20m44s	+07°37.9'		Leo	28"	ottima / buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 39-132	gx	11h21m10s	+05°21.8'		Leo	24"	buona / buono	rotonda, diffusa, con piccola condensazione centrale evidente e Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
CGCG 39-133	gx	11h21m18s	+03°39.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, con tenue nucleo stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelline, a SSE e a ESE — 450x.
CGCG 39-137	gx	11h21m27s	+03°26.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 39-141	gx	11h21m10s	+05°21.8'		Leo	24"	buona / buono	rotonda, diffusa, con piccola condensazione centrale evidente e Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
CGCG 39-144	gx	11h21m38s	+04°37.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	poco più evidente di CGCG 39-150, osservata subito prima e dalla quale dista 8.5' a NE, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" [presenza di Giove a 13' SW di σ Leonis] — 450x.
CGCG 39-146	gx	11h21m47s	+04°07.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; coppia di stelline appena percettibili subito a W; la galassietta è difficile da osservare, perché situata in una piccola zona depleta — 450x.
CGCG 39-149	gx	11h22m09s	+03°24.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 39-150	gx	11h22m08s	+04°41.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi [presenza di Giove a 13' SW di σ Leonis] — 450x.
CGCG 39-151	gx	11h22m10s	+05°25.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 39-152	gx	11h22m27s	+04°17.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 39-156	gx	11h23m07s	+02°48.9'		Leo	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 39-160 situata 1' a SE — sono due piccoli e deboli oggetti circolari, poco diffusi e con Ø di una 20-ina di secondi; la 2a presenta una condensazione centrale poco più evidente — 450x.
CGCG 39-160	gx	11h23m10s	+02°48.2'		Leo	24"	m. buona / buono	v. **CGCG 39-156**
CGCG 39-162	gx	11h23m20s	+05°51.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" [presenza di Giove a 40' verso W] — 450x.
CGCG 39-163	gx	11h23m45s	+03°00.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è di aspetto simile a CGCG 39-164, osservata per prima, ma con nucleo meno evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 39-164	gx	11h23m55s	+03°06.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo stellare circonfuso da un piccolo alone molto tenue, diffuso, rotondo con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 39-167	gx	11h24m09s	+06°12.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile e compatta, piccola, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 39-173	gx	11h24m55s	+03°10.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 39-176	gx	11h25m25s	+04°54.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 39-179	gx	11h25m48s	+03°25.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; la visione è un po' disturbata dalla SAO 118847 di 6ª grandezza, che a 450x si riesce tuttavia a tenere fuori campo.
CGCG 39-180	gx	11h25m09s	+03°29.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 39-182	gx	11h26m26s	+02°56.0'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta quando si osserva la debole stellina situata 1' a SW; a tratti appare circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 39-184	gx	11h27m17s	+03°45.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione stellare appena percettibile; c'è una doppia stretta a 1' NW — 450x.
CGCG 39-186	gx	11h27m46s	+06°08.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 39-190	gx	11h28m11s	+08°00.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	è una debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa 1' scarso; appare in visione distolta subito a 1' NE di una coppia di stelline orientate nello stesso modo — 450x.
CGCG 39-193	gx	11h28m55s	+03°24.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 39-197	gx	11h30m23s	+04°41.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è un piccolo triangolo rettangolo allungato di stelline di luminosità simile subito a S — 450x.
CGCG 39-198	gx	11h30m38s	+03°45.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 39-200	gx	11h31m06s	+03°07.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante un paio di primi a W; a 450x si riesce a tenere fuori campo la SAO 118902 di 7ª grandezza situata 6' a SE.
CGCG 39-202	gx	11h31m16s	+04°39.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente e più grande di CGCG 39-197, anch'essa rotonda e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W — 450x.
CGCG 39-203	gx	11h31m30s	+06°04.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 40-2	gx	11h32m22s	+05°10.4'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; si fatica un po' a trovarla, perché è situata in una piccola zona depleta — 450x.
CGCG 40-7	gx	11h34m46s	+02°55.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 40-9	gx	11h36m31s	+02°45.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è allineata con 2 stelline brillanti a NE — 450x.
CGCG 40-10	gx	11h36m40s	+06°17.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a N orientate da NE a SW e con separazione pari all'incirca al Ø della gx.
CGCG 40-13	gx	11h37m07s	+02°50.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso SW; forma una coppia ravvicinata con UGC 6587, molto debole, spampanata e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da N a S, ma occorre scalare a 340x.
CGCG 40-18	gx	11h38m33s	+06°56.9'		Vir	24"	buona / discreto	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S, ma visibile solo a momenti a 450x.
CGCG 40-20	gx	11h38m55s	+03°34.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 40-21	gx	11h39m27s	+03°28.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 40-22	gx	11h39m31s	+07°45.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 40-24	gx	11h40m19s	+03°00.1'		Vir	24"	buona / buono	poco diffusa, con piccola condensazione centrale abbastanza evidente, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" (al momento dell'osservazione era ancora bassa) — 450x.
CGCG 40-26	gx	11h40m46s	+05°08.4'		Vir	24"	buona / discreto	debolissima e praticamente persa nei bagliori della SAO 118983 di 7ª grandezza situata 4' a W; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 40-27	gx	11h40m51s	+04°48.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso — 450x.
CGCG 40-31	gx	11h41m52s	+02°34.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 40-32	gx	11h42m04s	+07°39.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 40-36	gx	11h44m22s	+08°10.6'		Vir	24"	buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 40-43	gx	11h47m32s	+02°47.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" (o 20"×15"), ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 40-44	gx	11h47m55s	+04°01.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso SE — 450x.
CGCG 40-47	gx	11h49m52s	+06°40.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 40-53	gx	11h51m33s	+05°06.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S (è sorta la Luna all'ultimo quarto) — 450x.
CGCG 40-54	gx	11h51m40s	+06°42.5'		Vir	24"	buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata all'interno di un piccolo triangolo di stelline — 450x.
CGCG 40-56	gx	11h52m02s	+06°24.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 41-1	gx	11h54m51s	+02°57.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso di NE — 450x.
CGCG 41-2	gx	11h54m58s	+04°39.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 41-5	gx	11h55m13s	+04°35.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	poco più debole di CGCG 41-2, dalla quale dista poco più di 5' a SE, ma in visione distolta pare più compatta, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 41-7	gx	11h56m02s	+06°40.7'	q 192	Leo	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva galassietta di forma indistinta, diffusa ed estesa non più di 20"; appare solo a momenti in visione distolta a ridosso S di una stellina; è riportata sull'Uranometria come 3976A — 380x.
CGCG 41-10	gx	11h57m23s	+04°32.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø non superiore a 15"; è situata un poco all'esterno del lato occidentale di un piccolo triangolo isoscele il cui vertice NW è occupato da una stellina brillante — 450x.
CGCG 41-14	gx	11h59m17s	+06°11.3'		Vir	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 41-15	gx	11h59m33s	+06°50.9'		Vir	24"	buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 41-20	gx	12h00m58s	+06°48.4'		Vir	28"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 41-23	gx	12h01m44s	+05°49.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 41-24	gx	12h01m43s	+06°27.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e brillante, ma con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; 570x per tener fuori campo la SAO 119170 di magnitudo 7.5 situata 5' NW.
CGCG 41-25	gx	12h01m55s	+06°41.0'		Vir	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con tenue condensazione centrale poco contrastata — 495x.
CGCG 41-27	gx	12h02m55s	+05°36.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30" o poco più; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 41-28	gx	12h02m55s	+04°14.1'		Vir	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 41-30	gx	12h03m05s	+05°10.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; meglio tuttavia scalare a 340x, perché situata in un campo depleto.
CGCG 41-34	gx	12h04m04s	+06°54.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza che in visione distolta appare grosso circolare ed estesa una 40-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 41-43	gx	12h08m59s	+05°11.4'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"× 15" — 450x.
CGCG 41-44	gx	12h09m39s	+05°16.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo SE — 450x.
CGCG 41-45	gx	12h10m02s	+05°21.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 41-50	gx	12h14m02s	+06°43.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 41-53	gx	12h15m13s	+04°33.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"× 15"; c'è una debole stellina subito a S; molto disturbata da due stelle brillanti: la SAO 119287 di 9ª grandezza situata 1.5' a NE e la SAO 119285 di magnitudo 7.6 a un paio di primi S — 450x.
CGCG 41-57	gx	12h16m01s	+04°39.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 41-72	gx	12h18m07s	+05°41.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 42-7	gx	12h19m01s	+06°05.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare chiaramente allungata da E a W con dimensioni 30"×20".
CGCG 42-9	gx	12h19m12s	+06°22.9'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto debole poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele molto allungato in direzione N-S — 495x.
CGCG 42-10	gx	12h19m16s	+06°17.7'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 30" — 495x.
CGCG 42-11	gx	12h19m15s	+06°18.4'		Vir	28"	ottima / m. buono	piccola e poco più evidente della precedente, situata a 1' verso S, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 495x.
CGCG 42-18	gx	12h19m28s	+05°01.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge appena percettibile — 450x.
CGCG 42-25	gx	12h19m51s	+06°59.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di 30"-35" — 450x.
CGCG 42-36	gx	12h20m25s	+06°54.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e disturbata da una stellina brillante situata a 1' SW; è grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 42-49	gx	12h22m11s	+04°57.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso S; la visione è disturbata dalla SAO 119357 di magnitudo 7.6 situata 6' a S della gx — 450x.
CGCG 42-55	gx	12h22m42s	+03°08.6'		Vir	24"	discreta / buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale; allineata ed equidistante con 2 stelline a NNE (quella più vicina alla gx è appena percettibile) — 450x
CGCG 42-58	gx	12h22m41s	+07°57.0'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NW — 495x.
CGCG 42-60	gx	12h22m50s	+03°06.3'		Vir	24"	discreta / buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; è situata tra 2 stelline molto deboli distanti un paio di primi in direzione N-S — 450x.
CGCG 42-62	gx	12h22m57s	+02°44.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso SW; allineata ed equidistante con 3 stelle brillanti situate a NE — 450x.
CGCG 42-75	gx	12h24m03s	+05°10.8'		Vir	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 450x.
CGCG 42-78	gx	12h24m02s	+05°18.7'		Vir	24"	discreta / buono	debolissima e disturbata da una stellina brillante situata a poco più di 1' SW; in visione distolta appare a tratti molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 42-85	gx	12h24m41s	+03°18.2'		Vir	24"	buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina a 1' verso N — 340x.
CGCG 42-90	gx	12h25m06s	+05°19.8'		Vir	24"	m. buona / buono	piccola, debole, diffusa e leggermente condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 25"×15" — 450x.
CGCG 42-91	gx	12h25m08s	+04°28.4'		Vir	24"	discreta / buono	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa 1' scarso; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
CGCG 42-94	gx	12h25m32s	+03°26.3'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso SE — 340x.
CGCG 42-97	gx	12h25m52s	+05°48.5'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15".
CGCG 42-100	gx	12h25m59s	+04°28.4'		Vir	24"	discreta / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 42-101	gx	12h26m16s	+05°28.6'		Vir	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 42-103	gx	12h26m30s	+08°03.6'		Vir	28"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 495x.
CGCG 42-113	gx	12h27m32s	+07°57.8'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; la visione è disturbata dalla SAO 118407 di 8ª grandezza situata 3' verso N — 495x.
CGCG 42-125	gx	12h29m00s	+07°51.0'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30".
CGCG 42-140	gx	12h30m55s	+03°29.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ci sono due stelle doppie sbilanciate e molto brillanti a W e a NE quasi al limitare del campo: quella a W è molto serrata — 450x.
CGCG 42-147	gx	12h32m50s	+03°18.0'		Vir	24"	discreta / buono	debolissima chiazza diffusa, grosso modo circolare con Ø < 40"; c'è una stellina quasi a ridosso SE; è un poco disturbata da una stellina brillante situata un paio di primi a ENE — 450x.
CGCG 42-149	gx	12h33m11s	+07°50.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma appare facilmente a ridosso S di NGC 4518; è molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 42-153	gx	12h33m51s	+08°01.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 42-160	gx	12h34m32s	+06°00.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, più che altro disturbata da una coppia di stelle brillanti con le quali la gx è allineata ed equidistante (quella più a S è la SAO 119480 di magnitudo 9.7); forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 42-165	gx	12h35m05s	+05°52.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20" o poco più — 450x.
CGCG 42-166	gx	12h35m18s	+06°32.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare brillante — 450x.
CGCG 42-169	gx	12h35m31s	+06°20.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	chiazza rotondeggiante molto debole, estesa una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 42-173	gx	12h36m32s	+06°10.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con 40"×20" — 450x.
CGCG 42-174	gx	12h36m35s	+08°03.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 42-177	gx	12h36m49s	+04°06.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 40"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 42-190	gx	12h38m53s	+07°06.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	poco più debole di CGCG 42-195 osservata subito prima, ma appare facilmente in visione distolta un paio di primi a E di una stellina abbastanza brillante; è orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; poco meglio visibile spingendo a 580x.
CGCG 42-195	gx	12h39m39s	+07°08.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso ENE — 450x.
CGCG 42-204	gx	12h41m23s	+06°40.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una coppia di stelline brillanti a poco più di 1' NW — 450x.
CGCG 42-206	gx	12h42m07s	+05°30.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø < 20"; la visione è comunque un po' disturbata da una stellina brillante di 11-esima situata 2.5' a W — 450x.
CGCG 43-3	gx	12h42m56s	+03°40.6'		Vir	24"	ottima / ottimo	debole chiazza diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 43-4	gx	12h43m10s	+03°34.9'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 43-6	gx	12h43m15s	+04°05.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W e una appena percettibile poco più distante verso N — 450x.
CGCG 43-7	gx	12h43m19s	+03°33.0'		Vir	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 43-9	gx	12h43m36s	+07°26.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' scarso W — 450x.
CGCG 43-10	gx	12h43m56s	+03°37.0'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una coppia di deboli stelline a S — 450x.
CGCG 43-19	gx	12h45m43s	+06°19.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 450x a SE di un piccolo asterismo di 4 stelline poste ad arco (quella più settentrionale è una doppia abbastanza stretta); forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 43-20	gx	12h45m49s	+06°11.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 43-29	gx	12h48m00s	+04°26.1'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta a 340x, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
CGCG 43-36	gx	12h49m36s	+03°36.3'		Vir	24"	mediocre / ottimo	piccola e debole chiazza circolare con Ø < 30", solo a tratti condensata e molto diffusa.
CGCG 43-37	gx	12h49m38s	+02°45.4'		Vir	24"	mediocre / ottimo	piccola ed elusiva, appare solo a tratti in visione distolta un paio di primi scarsi a W di una debole stellina; non dovrebbe comunque essere più estesa di 15".
CGCG 43-39	gx	12h49m43s	+04°46.2'		Vir	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi in direzione NW-SE; salta fuori a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; è allineata con due stelline a SW: quella più vicina alla gx è la più debole.
CGCG 43-44	gx	12h51m09s	+04°34.9'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e con condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 43-48	gx	12h52m02s	+06°33.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e una tenue condensazione stellare — 450x.
CGCG 43-49	gx	12h52m23s	+07°05.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, purtroppo situata in una plaga depleta; in visione distolta appare rotonda con Ø < 30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 43-51	gx	12h52m50s	+07°08.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 43-55	gx	12h53m40s	+06°47.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; poco disturbata dalla SAO 119652 di 8ª grandezza situata 4' a SE — 450x.
CGCG 43-58	gx	12h54m14s	+05°21.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 43-59	gx	12h54m21s	+05°17.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco disturbata da una stellina brillante situata a 1' E — 450x.
CGCG 43-77	gx	12h56m57s	+04°03.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 43-78	gx	12h56m53s	+08°09.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi in direzione N-S, situato in una piccola zona depleta; meglio scalare a 340x; c'è una stellina a 1' verso S.
CGCG 43-85	gx	12h58m21s	+04°53.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 43-86	gx	12h58m32s	+08°13.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; un po' disturbata dalla SAO 119690 di 8ª grandezza situata 4' a E — 450x.
CGCG 43-97	gx	13h01m41s	+04°40.8'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 43-101	gx	13h01m58s	+03°06.1'		Vir	24"	ottima / buono	appare elusivamente in visione distolta a 450x, ma non riesco a capire com'è fatta; a tratti appare qualcosa di puntiforme, ma potrebbe trattarsi sia del nucleo sia di una stellina a ridosso — 450x.
CGCG 43-104	gx	13h02m00s	+06°17.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N — 450x.
CGCG 43-105	gx	13h02m11s	+03°06.4'		Vir	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 43-112	gx	13h02m52s	+07°40.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
CGCG 43-115	gx	13h03m10s	+07°32.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 43-119	gx	13h03m32s	+07°58.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un gruppo di galassiette piuttosto difficili da osservare se la trasparenza non è buona e il cui membro più evidente è CGCG 43-127 (v. più sotto) — questa è debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x a meno di 1' S di una stellina; non riesco a capirne la forma, ma non sembra più estesa di 15" o 20".
CGCG 43-120	gx	13h03m41s	+02°34.1'		Vir	24"	ottima / buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1.5' verso E — 450x.
CGCG 43-122	gx	13h03m38s	+07°54.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 43-127 — chiazza molto debole e diffusa, grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; poco disturbata da una stellina brillante a ridosso verso N — 450x.
CGCG 43-123	gx	13h03m41s	+07°30.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 43-127	gx	13h04m05s	+07°54.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è la più evidente di un gruppo di 8 galassiette abbastanza difficili — diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 43-128	gx	13h04m14s	+07°54.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	situata un paio di primi a E della precedente, è molto piccola e debole, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a 1' E — 450x.
CGCG 43-129	gx	13h04m28s	+07°55.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 43-127 — molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' N — 450x.
CGCG 43-130	gx	13h04m32s	+07°48.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 43-127 — debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x a S di una stellina; è rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 43-131	gx	13h04m33s	+07°59.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 43-127 — molto piccola e appare elusivamente a 450x; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 10" o 15".
CGCG 43-136	gx	13h04m40s	+07°57.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 43-127 — debolissima e diffusa, è visibile in visione distolta a 450x, ma solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20".
CGCG 43-138	gx	13h04m55s	+05°31.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare evidente, anche se poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W — 450x.
CGCG 44-7	gx	13h08m03s	+06°28.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 44-11	gx	13h09m03s	+06°57.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (era visibile, seppure al limite, anche nel 16" a 380x) — 570x,.
CGCG 44-29	gx	13h13m20s	+06°56.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 44-31	gx	13h13m32s	+06°53.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 44-32	gx	13h13m45s	+06°51.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 44-33	gx	13h13m44s	+06°59.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 44-35	gx	13h13m49s	+06°57.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, estesa sì e no una 20-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a 1' W di CGCG 44-36 — 450x.
CGCG 44-36	gx	13h13m54s	+06°57.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 44-44	gx	13h15m51s	+08°02.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×15"; c'è una stellina a 1' NE; la visione è disturbata dalla SAO 119838 di 7a grandezza che si fatica a tenere fuori campo — 450x.
CGCG 44-46	gx	13h16m17s	+07°02.8'	q 195	Vir	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenue nucleo stellare visibile a tratti; a 270x appare poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40", mentre a 380x è di aspetto più confuso. È riportata sulla Uranometria come ZWG 044-046.
CGCG 44-54	gx	13h17m15s	+06°24.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø max di 20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 45" verso NE.

CGCG 44-63	gx	13h18m36s	+08°00.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta subito a E di una stellina brillante; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 20" — 450x.
CGCG 44-67	gx	13h19m11s	+07°25.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" e nucleo stellare molto tenue — 570x.
CGCG 44-68	gx	13h19m30s	+07°28.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso SE.
CGCG 44-69	gx	13h19m37s	+03°02.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 44-74	gx	13h20m45s	+05°28.2'		Vir	24"	ottima / buono	debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 44-90	gx	13h30m16s	+07°29.2'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; nonostante sia molto disturbata dalla SAO 119970 di 8ª grandezza situata 3.5' a E e dalla SAO 119968 di 7a a 4.5' SSE appare meglio definita scalando a 340x.
CGCG 45-1	gx	13h30m43s	+07°31.8'		Vir	24"	buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 45-2	gx	13h31m09s	+07°36.1'		Vir	24"	buona / buono	piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 45-18	gx	13h33m21s	+06°19.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 45-22	gx	13h33m50s	+03°19.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso verso W.
CGCG 45-23	gx	13h33m54s	+03°17.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e brillante, rotonda con Ø di 45" e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 45-24	gx	13h34m05s	+03°20.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta a 450x; è allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; sempre in visione distolta appare ogni tanto una debolissima stellina appena sfuocata a ~ 1' verso S; da un controllo successivamente effettuato, questa è risultata essere la MAC 1334+0319.
CGCG 45-32	gx	13h35m40s	+03°17.6'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 45-35	gx	13h36m00s	+06°31.5'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso NE — 450x.
CGCG 45-37	gx	13h36m08s	+03°30.6'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; meglio contrastata ed evidente scalando a 340x.
CGCG 45-39	gx	13h36m21s	+03°19.8'		Vir	24"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa, con alto gradiente di luce e un nucleo quasi stellare evidente — 450x.
CGCG 45-44	gx	13h36m50s	+03°31.5'		Vir	24"	ottima / buono	debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 45-46	gx	13h36m57s	+03°29.6'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 45-52	gx	13h52m20s	+13°34.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo orientale — 450x.
CGCG 45-60	gx	13h38m44s	+04°27.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 40" (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
CGCG 45-62	gx	13h39m27s	+04°30.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e un po' disturbata dal chiarore lunare (primo quarto) tuttavia sembra abbastanza compatta e in visione distolta appare seppur a momenti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15".
CGCG 45-65	gx	13h40m00s	+04°40.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale — 450x.
CGCG 45-68	gx	13h40m27s	+04°46.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale piccola e contrastata — 450x.
CGCG 45-71	gx	13h41m23s	+05°02.4'		Vir	24"	buona / buono	debole, ma relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge diffuso.
CGCG 45-74	gx	13h41m48s	+07°37.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, poco più di una stellina sfuocata; è un po' disturbata da un piccolo triangolo di stelle brillanti situato subito a W — 450x.
CGCG 45-81	gx	13h43m45s	+03°53.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 45-83	gx	13h43m59s	+08°01.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata da una stellina brillante a ridosso E (questa stellina ha un debole compagno subito a N) — 450x.
CGCG 45-84	gx	13h44m05s	+03°54.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina a 1' WSW — 450x.
CGCG 45-94	gx	13h45m45s	+07°30.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; situata tra 2 stelline abbastanza brillanti orientate da WNW a ESE — 450x.
CGCG 45-97	gx	13h46m52s	+03°44.9'		Vir	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina un paio di primi a E e una più debole alla stessa distanza verso NE — 450x.
CGCG 45-99	gx	13h47m09s	+03°38.6'		Vir	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina brillante a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 45-100	gx	13h47m18s	+03°46.0'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NNE a SSW con dimensioni grosso modo di 60"×15" — 450x.
CGCG 45-102	gx	13h47m38s	+03°20.1'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, molto piccola, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 45-107	gx	13h48m05s	+07°23.5'		Boo	24"	buona / buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina a 45" verso SE — 400x.
CGCG 45-116	gx	13h50m47s	+02°18.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 45-122	gx	13h52m14s	+02°21.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, a 340x sembra una stellina sfuocata; a 450x appare poco più diffusa, grosso modo rotonda con Ø di 10"-15"; è situata un paio di primi a NNE di NGC 5329 (presenza della luna al primo quarto) — 340x.
CGCG 45-123	gx	13h52m12s	+02°24.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata 5' scarsi a N di NGC 5329 (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
CGCG 45-124	gx	13h52m23s	+02°20.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
CGCG 45-125	gx	13h52m20s	+07°47.9'		Boo	24"	buona / buono	piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 45-126	gx	13h52m33s	+07°51.5'		Boo	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a NW — 450x.
CGCG 45-130	gx	13h53m01s	+02°15.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce orientata all'incirca da N a S e che in visione distolta appare estesa 1' scarso; è situata 3' a ENE di NGC 5329 (presenza della luna al primo quarto) — 450x.
CGCG 46-2	gx	13h55m29s	+06°35.8'		Vir	24"	buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale marcata di aspetto quasi stellare — 450x.
CGCG 46-4	gx	13h55m43s	+05°46.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NE — 450x.
CGCG 46-5	gx	13h55m45s	+08°11.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 46-6	gx	13h55m57s	+08°11.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, ma poco più evidente di CGCG 46-5, dalla quale dista 3' verso E, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 46-12	gx	13h56m48s	+05°31.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 46-13	gx	13h56m56s	+05°09.1'		Vir	24"	m. buona / mediocre	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; solo a momenti appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20".
CGCG 46-17	gx	13h57m48s	+07°23.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso NNW; affinché non perda contrasto è opportuno riuscire a tenere fuori campo la SAO 120197 di 7ª grandezza situata 5' a NE — 450x.
CGCG 46-25	gx	13h58m20s	+07°13.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 46-28	gx	13h58m46s	+02°50.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina brillante a 1.5' N e una più debole un paio di primi a NW — 450x.
CGCG 46-30	gx	13h58m58s	+07°15.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE; meglio visibile a 450x per ridurre il disturbo della SAO 120205 di 9ª grandezza situata 2.5' a N.
CGCG 46-33	gx	14h00m18s	+05°02.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e una piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 46-38	gx	14h02m12s	+04°35.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 40" e con nucleo stellare percettibile solo a momenti; una stellina brillante situata 3.5' a S fa parte di un piccolo asterismo di 5 componenti foggiato a "y" irregolare — 450x.
CGCG 46-46	gx	14h04m23s	+04°37.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, estesa non più di 15", appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 46-47	gx	14h06m02s	+02°21.4'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, facilmente osservabile in visione distolta a 450x, allungata da NE a SW con dimensioni di ~ 30"×15".
CGCG 46-48	gx	14h06m10s	+02°19.9'		Vir	24"	buona / m. buono	debole e diffusa, un po' disturbata dalla luce di una stellina brillante situata subito a SE, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 450x.
CGCG 46-53	gx	14h07m33s	+07°10.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 46-54	gx	14h07m45s	+07°13.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di CGCG 46-53, di Ø simile e anch'essa di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a 1' NW; una stellina percettibile solo a momenti situata a 1' scarso SE è in realtà la PGC 1316184 — 450x.
CGCG 46-55	gx	14h07m55s	+07°02.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
CGCG 46-56	gx	14h08m11s	+05°48.7'		Vir	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20", con piccola ed evidente condensazione centrale; ci sono due stelline appena percettibili subito a W e SW; quest'ultima è in realtà una doppia serrata che a prima vista appare come un tenuissimo oggetto nebuloso — 450x.
CGCG 46-59	gx	14h08m28s	+05°39.5'		Vir	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 46-62	gx	14h09m54s	+04°34.5'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N — 450x.
CGCG 46-67	gx	14h13m46s	+08°13.1'		Boo	24"	buona / buono	forma una coppia molto serrata con MCG+2-36-57 situata a ridosso NE — sono 2 piccoli oggetti rotondi, di una 20-ina di secondi di Ø, relativamente compatti e condensati, che si sdoppiano con facilità solo a 570x; sono orientati come la coppia di stelline che si trova a E.
CGCG 46-68	gx	14h14m09s	+03°13.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 46-73	gx	14h14m54s	+04°54.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, ma solo a tratti si riesce a capire che è orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 46-74	gx	14h15m12s	+04°52.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è preferibile scalare a 340x; è grosso modo rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una coppia di deboli stelline a 1' verso W.
CGCG 46-76	gx	14h15m10s	+04°55.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina a 1' verso N e un'altra appena percettibile a 1' scarso verso NW — 450x.
CGCG 46-80	gx	14h17m32s	+04°33.7'		Vir	24"	discreta / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; è situata tra 2 stelle: una abbastanza brillante a 1' NW e un'altra poco più debole e distante a E — 450x.
CGCG 46-87	gx	14h18m02s	+06°48.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 47-14	gx	14h20m40s	+05°25.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un terzetto assieme a CGCG 47-15 e a PGC 51259 — debole, diffusa, allungata da E a W di dimensioni 40"×20"e con tenue bulge poco contrastato — 450x.
CGCG 47-15	gx	14h20m42s	+05°29.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 47-17	gx	14h20m51s	+04°19.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e un nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 47-19	gx	14h20m57s	+03°52.3'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è tuttavia difficile da vedere in quanto situata in una piccola zona di cielo depleta — 450x.
CGCG 47-25	gx	14h21m54s	+03°58.0'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, osservabile solo in visione distolta, molto diffusa ed estesa una 30-ina di secondi, anche se non riesco tuttavia a capire com'è fatta — 450x.
CGCG 47-35	gx	14h25m54s	+02°52.4'		Vir	24"	discreta / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 47-36	gx	14h25m54s	+04°38.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 47-37	gx	14h25m56s	+06°27.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; la visione è molto disturbata dalla SAO 120455 di di 9ª grandezza situata ad appena 1' verso N — 450x.
CGCG 47-39	gx	14h26m02s	+08°06.7'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N; è situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo dalle componenti sbilanciate — 450x.
CGCG 47-40	gx	14h26m32s	+02°45.1'		Vir	24"	m. buona / mediocre	debolissima, ma relativamente compatta e facilmente visibile in visione distolta a 450x, allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×20".
CGCG 47-43	gx	14h27m20s	+02°50.3'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 47-46	gx	14h27m22s	+03°34.6'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e con nucleo stellare; a prima vista è rotonda, ma scalando a 340x, in visione distolta appare leggermente allungata da E a W con dimensioni di 50"×40".
CGCG 47-49	gx	14h27m36s	+02°57.3'		Vir	24"	m. buona / mediocre	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 47-50	gx	14h27m36s	+08°07.5'		Boo	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, estesa una 40-ina di secondi; situata al vertice SW di un piccolo quadrato coi lati di 1' formato da stelline appena percettibili; la componente di NW è una doppia molto stretta che dà a prima vista l'impressione di un minuscolo oggetto diffuso — 450x.
CGCG 47-52	gx	14h27m47s	+04°54.7'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a N — 450x.
CGCG 47-53	gx	14h27m46s	+06°35.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata al vertice occidentale di un piccolo triangolo rettangolo isoscele formato con due deboli stelline a E e SE — 450x.
CGCG 47-56	gx	14h28m21s	+05°02.5'		Vir	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 47-59	gx	14h29m03s	+04°40.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo S; una stellina evidente si trova a 1' SE — 450x.
CGCG 47-60	gx	14h29m06s	+07°50.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE e una doppie ben visibile a 1' NW — 450x.
CGCG 47-64	gx	14h29m43s	+07°15.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un tenue nucleo stellare abbastanza evidente. Due piccoli oggetti diffusi appaiono abbastanza facilmente a 450x: quello più evidente, esteso forse una 15-ina di secondi, è situato a 1' scarso NE della gx e da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la **MAC 1429+0715**; l'altro, a 1' scarso SE, è invece debolissimo e salta fuori quasi a ridosso E di una debole stellina: si tratta di **PGC 1317214**.
CGCG 47-67	gx	14h29m55s	+07°15.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare marcato — 450x.
CGCG 47-85	gx	14h32m45s	+02°54.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	approssim. rotonda con Ø di ~ 45" e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo W; una stellina brillante a 1' verso E disturba un poco l'osservazione — 450x.
CGCG 47-86	gx	14h33m10s	+03°56.8'		Vir	24"	buona / m. buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 47-94	gx	14h33m48s	+03°57.4'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare facilmente in visione distolta a 450x.
CGCG 47-95	gx	14h33m51s	+03°40.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente.
CGCG 47-97	gx	14h33m58s	+03°44.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	assieme a CGCG 47-100 forma una coppia di gx aspetto simile, entrambe diffuse, rotonde e condensate, con Ø < 30"; la 2ª presenta una condensazione centrale poco più marcata — 450x.
CGCG 47-100	gx	14h34m04s	+03°44.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	v. **CGCG 47-97**
CGCG 47-105	gx	14h34m42s	+03°17.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 47-106	gx	14h34m47s	+03°20.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15", poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile; la **MAC 1434+0320** si "stacca" solo a momenti a ridosso SW, ma appare come una stellina appena percettibile — 450x.
CGCG 47-108	gx	14h34m49s	+08°09.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso E; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 47-116	gx	14h36m51s	+05°57.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; si trova sul lato NE di un piccolo asterismo triangolare delimitato da stelline brillanti — 450x.
CGCG 47-121	gx	14h37m51s	+05°00.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce estesa 40"-45" e orientata da E a W e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 47-126	gx	14h39m15s	+02°43.7'		Vir	24"	discreta / m. buono	relativamente brillante e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 47-129	gx	14h39m38s	+03°08.8'		Vir	24"	discreta / m. buono	debole, molto diffusa, orientata da NNE a SSW (come le 2 stelle brillanti a S), con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 47-136	gx	14h40m43s	+03°15.3'		Vir	24"	buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 47-138	gx	14h40m46s	+03°05.9'		Vir	24"	buona / buono	molto piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina subito a SW; allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a N — 450x.
CGCG 47-140	gx	14h40m53s	+03°25.6'		Vir	16"	m. buona / ottimo	fa parte del piccolo gruppo di NGC 5718 molto piccola, compatta, con nucleo puntiforme, di dimensioni 30"×15" e orientata da NE a SW — 270x.
CGCG 47-142	gx	14h41m08s	+06°02.6'		Vir	24"	ottima / buono	debolissima, solo a tratti appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 47-145	gx	14h41m59s	+03°23.4'		Vir	24"	ottima / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 47-146	gx	14h42m06s	+03°19.8'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, anche questa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 47-147	gx	14h42m26s	+03°13.9'		Vir	24"	ottima / buono	relativamente compatta e poco più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 48-5	gx	14h42m58s	+05°08.2'		Vir	24"	buona / ottimo	debole e poco più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso E — 450x.
CGCG 48-8	gx	14h43m26s	+04°22.7'		Vir	24"	buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue nucleo stellare facilmente visibile a 450x.
CGCG 48-15	gx	14h46m23s	+06°32.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e diffusa, appare elusivamente quasi a ridosso NE di una stellina, ma non ne capisco la forma anche perché è molto disturbata dalla SAO 120652 di magnitudo 8.6 situata a meno di 1' NW — 450x.
CGCG 48-18	gx	14h48m38s	+06°48.4'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 48-19	gx	14h48m46s	+08°06.0'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-22	gx	14h50m14s	+06°30.5'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-23	gx	14h50m55s	+04°56.9'		Vir	24"	buona / buono	piccola e debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 48-27	gx	14h51m06s	+04°50.5'		Vir	24"	buona / buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' W e una appena percettibile a ridosso S — 450x.
CGCG 48-28	gx	14h51m22s	+06°48.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	appare a prima vista come un oggetto allungato da NW a SE ed esteso 1' scarso; in realtà si nota che è come "spaccata" in due: il corpo principale, a NW, è grosso modo rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; la protuberanza a SE è molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, ma si tratta effettivamente di un'altra gx: la PGC 53047 — 450x.
CGCG 48-29	gx	14h51m30s	+06°06.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante subito a S e una più debole a W — 450x.
CGCG 48-30	gx	14h51m32s	+06°06.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 48-31	gx	14h51m39s	+02°42.8'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' verso SW — 450x.
CGCG 48-33	gx	14h51m53s	+03°21.8'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20" (o 45"×20"); c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E (fa parte di una losanga irregolare molto allungata e ricurva formata da 4 componenti) — 450x.
CGCG 48-35	gx	14h52m12s	+04°30.6'		Vir	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta a ridosso NE di una stellina brillante, rotonda con Ø di ~ 30" — 450x.
CGCG 48-39	gx	14h52m34s	+03°08.7'		Vir	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; stellina abbastanza brillante a 1' E e un'altra più debole alla stessa distanza verso SSW — 450x.
CGCG 48-40	gx	14h52m34s	+03°24.6'		Vir	24"	buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 48-41	gx	14h52m45s	+04°32.7'		Vir	24"	buona / buono	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×20 e tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 48-43	gx	14h52m38s	+06°15.6'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S — 450x.
CGCG 48-44	gx	14h52m43s	+03°13.5'		Vir	24"	ottima / buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con condensazione stellare; situata in mezzo a due stelline brillanti orientate in direzione NNW-SSE e distanti 2.5' — 450x.
CGCG 48-45	gx	14h52m44s	+06°54.1'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 48-46	gx	14h52m45s	+07°48.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 20"×10"; c'è una stellina subito a SW, ma la visione è disturbata dalla SAO 120708 di 7ª grandezza situata un paio di primi a SW — 450x.
CGCG 48-48	gx	14h52m48s	+07°56.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina visibile solo a momenti quasi a ridosso E — 450x.
CGCG 48-53	gx	14h53m19s	+07°50.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 48-54	gx	14h53m28s	+03°16.4'		Vir	24"	ottima / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 48-55	gx	14h53m22s	+08°12.3'		Boo	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 48-61	gx	14h54m08s	+03°12.8'		Vir	24"	buona / buono	è un tenuissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 48-65	gx	14h54m18s	+04°17.0'		Vir	24"	buona / ottimo	molto diffusa e con condensazione centrale molto brillante di aspetto stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-68	gx	14h54m31s	+03°16.9'		Vir	24"	buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante 1' a S — 450x.
CGCG 48-69	gx	14h55m03s	+02°42.5'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW e un'altra brillante subito a N: quest'ultima fa parte di un piccolo asterismo di 4 componenti foggiato a losanga irregolare — 450x.
CGCG 48-70	gx	14h55m21s	+05°17.9'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; poco disturbata da due stelle brillanti: la più luminosa si trova un paio di primi a E, l'altra a 3.5' verso N — 450x.
CGCG 48-72	gx	14h56m01s	+02°27.8'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo nucleo quasi stellare abbastanza marcato; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 48-73	gx	14h56m40s	+06°27.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MAC 1456+0627 situata a ridosso S, ma si separano a fatica; a prima vista appare come un unico oggetto allungato da N a S; tuttavia una condensazione stellare appena percettibile si trova spostata verso N e quindi appartiene alla CGCG; sono entrambe grosso modo rotonde con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-80	gx	14h58m08s	+03°25.4'		Vir	24"	ottima / buono	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta, ma è preferibile scalare a 340x, in quanto situata in una piccola zona depleta.
CGCG 48-83	gx	14h58m34s	+03°31.1'		Vir	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 48-84	gx	14h58m27s	+08°12.5'		Boo	24"	buona / ottimo	relativamente compatta e brillante, rotonda con Ø < 30" ed evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 48-85	gx	14h58m38s	+06°46.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-86	gx	14h58m41s	+07°59.1'		Boo	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a SE di un triangolo isoscele di stelline brillanti orientato da E a W (questo, assieme alla gx, completa un parallelogrammo regolare) — 450x.
CGCG 48-89	gx	15h00m28s	+06°27.3'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso E — 450x.
CGCG 48-95	gx	15h03m28s	+04°41.0'		Vir	24"	buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 48-96	gx	15h03m28s	+07°20.3'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; ci sono due stelline: una subito a N e l'altra alla stessa distanza verso SW — 450x.
CGCG 48-98	gx	15h04m12s	+07°27.4'		Vir	24"	buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco più brillante all'interno e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 48-99	gx	15h04m30s	+02°20.0'		Vir	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
CGCG 48-100	gx	15h04m42s	+06°20.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare elusivamente a 1' NW della successiva; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-102	gx	15h04m45s	+06°20.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 48-104	gx	15h04m55s	+05°54.5'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole e piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-105	gx	15h05m01s	+05°47.8'		Vir	24"	ottima / buono	debole e molto diffusa, allungata da NNE a SSW con dimensioni 80"×30" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 48-106	gx	15h05m01s	+05°51.8'		Vir	24"	ottima / buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme.
CGCG 48-110	gx	15h05m30s	+03°05.2'		Vir	24"	buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-111	gx	15h05m24s	+06°11.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e un tenue nucleo stellare — 450x.
CGCG 48-112	gx	15h05m41s	+05°05.7'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-113	gx	15h05m39s	+05°45.7'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 48-114	gx	15h05m46s	+05°49.0'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 48-115	gx	15h05m56s	+03°42.4'		Vir	24"	ottima / buono	fa parte di un terzetto assieme a CGCG 48-116 e CGCG 48-117 — relativamente facile, orientata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 48-116	gx	15h06m05s	+03°42.5'		Vir	24"	ottima / buono	fa parte di un terzetto assieme alla precedente e alla successiva — diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e basso gradiente di luce — 450x.
CGCG 48-117	gx	15h06m09s	+03°40.5'		Vir	24"	ottima / buono	fa parte di un terzetto assieme alle due precedenti — piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 48-118	gx	15h06m12s	+03°08.5'		Vir	24"	buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 48-119	gx	15h06m15s	+05°49.2'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale visibile a momenti, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso NW — 450x.
CGCG 49-1	gx	15h06m34s	+05°13.4'		Vir	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 49-3	gx	15h06m43s	+05°19.6'		Vir	24"	ottima / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o poco più e con condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 49-11	gx	15h08m07s	+02°25.9'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 49-13	gx	15h08m09s	+08°03.1'		Boo	24"	buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (c'è un asterismo di 4 stelline brillanti a SE) — 450x.
CGCG 49-18	gx	15h10m11s	+07°37.7'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 49-20	gx	15h10m18s	+07°43.3'		Boo	24"	buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 49-27	gx	15h11m05s	+06°41.5'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W — 450x.
CGCG 49-31	gx	15h11m32s	+05°12.3'		Ser	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e piccola condensazione centrale — 450x.
CGCG 49-32	gx	15h11m31s	+05°14.7'		Ser	24"	buona / ottimo	di aspetto a prima vista del tutto simile alla precedente; di fatto è un po' più piccola, sempre rotonda, ma con Ø < 30" — 450x.
CGCG 49-33	gx	15h11m31s	+07°15.1'		Ser	24"	buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale evidente; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti quasi a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 49-39	gx	15h11m57s	+05°33.7'		Ser	24"	ottima / buono	bolla circolare molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 49-40	gx	15h12m11s	+05°14.6'		Ser	24"	buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme; in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
CGCG 49-41	gx	15h12m23s	+07°43.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 49-42	gx	15h12m34s	+07°45.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 49-43	gx	15h12m53s	+04°30.8'		Ser	24"	ottima / ottimo	fa parte di un quartetto di galassiette orientato da WNW a ESE — relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale evidente; equidistante con due stelline a NE — 450x.
CGCG 49-44	gx	15h13m00s	+03°09.3'		Ser	24"	discreta / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare — 450x.
CGCG 49-45	gx	15h13m08s	+04°29.8'		Ser	24"	ottima / ottimo	fa parte del quartetto di CGCG 49-43 — di aspetto uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 49-46	gx	15h13m02s	+07°17.5'		Ser	24"	buona / m. buono	molto diffusa e con nucleo stellare, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 49-48	gx	15h13m12s	+04°17.0'		Ser	24"	discreta / m. buono	forma una coppia ravvicinata con IC 1105 situata a ridosso NE — è decisamente più debole della IC, molto diffusa, con tenue condensazione centrale e orientata nello stesso modo, anche se di dimensioni poco inferiori (30"×15") — 450x.
CGCG 49-49	gx	15h13m10s	+04°28.9'		Ser	24"	ottima / ottimo	fa parte del quartetto di CGCG 49-43 — rotonda con Ø < 30" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 49-50	gx	15h13m13s	+05°21.0'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
CGCG 49-51	gx	15h13m10s	+07°51.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 49-52	gx	15h13m21s	+02°30.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 49-54	gx	15h13m19s	+04°28.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	fa parte del quartetto di CGCG 49-43 — piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e tenue condensazione stellare — 450x.
CGCG 49-55	gx	15h13m14s	+04°45.0'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW; tre stelline di luminosità simile e poste ad arco si estende da NE a S della gx — 450x.
CGCG 49-57	gx	15h13m13s	+07°13.5'		Ser	24"	buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; situata tra 2 deboli stelline: una a NW e l'altra quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 49-58	gx	15h13m14s	+08°02.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' N; la visione è poco disturbata dalla SAO 120898 di 9ª grandezza situata 1.5' a W — 450x.
CGCG 49-59	gx	15h13m20s	+06°37.1'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30", quasi allineata ed equidistante con 2 stelline a ESE — 450x.
CGCG 49-62	gx	15h13m34s	+05°26.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 49-64	gx	15h13m36s	+08°05.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 49-65	gx	15h13m53s	+04°27.7'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 49-69	gx	15h14m20s	+08°17.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata a ridosso E di una stellina abbastanza brillante che interferisce un po' con l'osservazione — 450x.
CGCG 49-75	gx	15h15m11s	+05°34.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta, con evidente condensazione centrale, rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W.
CGCG 49-76	gx	15h15m25s	+04°40.9'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 49-77	gx	15h15m31s	+06°22.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 49-81	gx	15h16m15s	+06°47.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina molto debole a 1' scarso NE, che da un controllo successivamente effettuato è risultata essere PGC 93468 — 450x.
CGCG 49-82	gx	15h16m19s	+07°09.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' N (si trova a ridosso NE dell'ammasso AGC 2052) — 450x.
CGCG 49-89	gx	15h16m46s	+07°00.2'		Ser	16"	buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2052** — molto debole (va e viene), piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 49-93	gx	15h16m58s	+07°15.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 49-96	gx	15h17m05s	+06°53.2'		Ser	24"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2052** — debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 49-97	gx	15h17m13s	+07°01.7'		Ser	16"	buona / ottimo	fa parte dell'ammasso AGC 2052 — molto debole e molto piccola, compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a NE — 380x.
CGCG 49-98	gx	15h17m23s	+04°12.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con nucleo stellare abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 49-100	gx	15h17m21s	+07°20.8'		Ser	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 49-101	gx	15h17m24s	+07°53.5'		Ser	24"	ottima / ottimo	poco allungata da E a W, con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme — 570x.
CGCG 49-102	gx	15h17m30s	+07°51.7'		Ser	24"	ottima / ottimo	allungata da N a S, con dimensioni 30"×20" e nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina a 1' verso N; disturbata dalla SAO 120933 che brilla ad appena un paio di primi SE — 570x.

CGCG 49-104	gx	15h17m40s	+07°09.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, a tratti orientata da NW a SE, di dimensioni 20"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una coppia di deboli stelline a NE — 450x.
CGCG 49-106	gx	15h17m52s	+05°06.5'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, di luminosità pressoché uniforme poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 570x.
CGCG 49-108	gx	15h17m51s	+08°13.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 49-109	gx	15h17m58s	+07°14.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di 20" — 450x.
CGCG 49-110	gx	15h18m08s	+05°18.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale evidente — 570x.
CGCG 49-111	gx	15h08m09s	+08°14.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 49-112	gx	15h18m25s	+04°52.1'		Ser	24"	discreta / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 49-114	gx	15h18m26s	+05°13.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
CGCG 49-115	gx	15h18m43s	+05°53.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 49-117	gx	15h18m53s	+04°51.9'		Ser	24"	discreta / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 49-118	gx	15h18m51s	+06°26.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e debolmente condensata; c'è una stellina a ridosso SW e una più debole a ridosso SE — 450x.
CGCG 49-120	gx	15h19m01s	+04°31.2'		Ser	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo poco diffuso, con nucleo stellare e Ø di una 30-ina di secondi 380x.
CGCG 49-121	gx	15h18m57s	+05°11.5'		Ser	24"	ottima / ottimo	rotonda, piccola e condensata, con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW — 570x.
CGCG 49-124	gx	15h19m08s	+05°30.3'		Ser	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce di aspetto uniforme, orientato da E a W ed esteso una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 49-125	gx	15h19m03s	+08°08.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 49-128	gx	15h19m30s	+05°15.7'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 49-131	gx	15h19m54s	+08°05.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
CGCG 49-132	gx	15h20m01s	+05°25.5'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 49-134	gx	15h20m23s	+03°32.1'		Ser	24"	discreta / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 49-135	gx	15h20m30s	+03°25.8'		Ser	24"	discreta / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; facilmente osservabile in visione distolta a 450x.
CGCG 49-136	gx	15h20m34s	+07°54.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 49-139	gx	15h21m25s	+06°29.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 49-143	gx	15h21m41s	+03°43.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 49-147	gx	15h22m02s	+03°45.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi un nucleo stellare abbastanza brillante; c'è una stellina a un paio di primi verso N — 450x.
CGCG 49-148	gx	15h22m05s	+05°51.3'		Ser	24"	buona / m. buono	piccola, poco diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 49-149	gx	15h22m11s	+05°50.8'		Ser	24"	buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, molto piccola, orientata da E a W con dimensioni grosso modo 20"×10"; salta fuori abbastanza facilmente a ridosso verso E di una stellina — 450x.
CGCG 49-150	gx	15h22m22s	+05°23.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; stellina appena percettibile subito a S; situata a ridosso W di un asterismo oblungo di 6 stelle brillanti orientato da NNE a SSW — 450x.
CGCG 49-151	gx	15h22m50s	+08°04.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 49-154	gx	15h23m47s	+05°46.5'		Ser	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, dimensioni 30"×20" e con nucleo quasi stellare evidente; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 49-155	gx	15h24m17s	+04°51.3'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 49-157	gx	15h25m04s	+04°49.8'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 49-160	gx	15h25m26s	+07°05.1'		Ser	24"	buona / m. buono	molto debole, e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 49-168	gx	15h27m56s	+07°39.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 49-170	gx	15h28m45s	+07°21.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 49-171	gx	15h28m44s	+07°23.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; una debolissima stellina sfuocata quasi a ridosso verso N è risultata essere la 2MASS 15284478+0723570 — 450x.
CGCG 49-172	gx	15h28m45s	+07°28.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e stemperata sul fondo cielo, di aspetto un po' confuso, ma non più estesa di 20"; c'è una stellina al margine E — 450x.
CGCG 49-173	gx	15h28m54s	+07°35.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S — 450x.
CGCG 49-174	gx	15h28m55s	+07°44.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SW; disturbata da una losanga di stelline brillanti subito a E — 450x.
CGCG 49-175	gx	15h29m15s	+05°03.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	presenta un nucleo stellare abbastanza brillante circonfuso da un tenue alone grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 49-178	gx	15h29m30s	+03°28.0'		Ser	24"	m. buona / mediocre	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e appena più brillante allo interno; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW — 450x.
CGCG 49-182	gx	15h29m35s	+08°02.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso W (la quale fa parte di un piccolo triangolo equilatero: la componente più a S è una doppia stretta e sbilanciata) — 450x.
CGCG 49-183	gx	15h29m50s	+03°30.6'		Ser	24"	m. buona / mediocre	poco più evidente di CGCG 49-178, rotonda con Ø analogo e piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 49-184	gx	15h29m46s	+05°00.9'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata 1.5' a N; c'è una doppia a 1' verso W — 450x.
CGCG 50-11	gx	15h31m40s	+07°20.3'		Ser	24"	buona / m. buono	completa il terzetto di galassie NGC 5941, -42 e -44 e a prima vista sembra addirittura il membro più brillante del quartetto — rotonda, poco diffusa, con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; altresì nota come **Hickson 76B** — 450x.
CGCG 50-14	gx	15h32m09s	+04°44.8'		Ser	24"	m. buona / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 50-15	gx	15h32m00s	+07°27.0'		Ser	24"	buona / m. buono	debolissima, appare solo in visione distolta, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 50-19	gx	15h32m34s	+04°46.5'		Ser	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia ravvicinata con MAC 1532+0446 situata una 30-ina di secondi a SW — debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso verso NW (ossia sul prolungamento dell'asse); la MAC è un piccolo oggetto elusivo che appare a momenti in visione distolta, ma non è più esteso di 10" o 15" (situate 3' a NW di UGC 9887) — 450x.
CGCG 50-22	gx	15h32m45s	+08°15.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione stellare abbastanza evidente; equidistante, ma non perfettamente allineata, con 2 stelline a SSE (una terza stellina più a S completa un piccolo arco di 3 componenti) — 450x.
CGCG 50-25	gx	15h33m48s	+05°17.5'		Ser	24"	buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 9894 situata a poco più di 1' SSE — diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi una condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a ridosso NNE — 450x.
CGCG 50-27	gx	15h34m11s	+07°05.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 50-28	gx	15h34m46s	+06°17.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e a tratti condensata, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 50-32	gx	15h35m17s	+05°06.0'		Ser	24"	buona / m. buono	debolissimo lucore, a tratti rotondeggiante con Ø di una 40-ina di secondi che appare in visione distolta a 1' NE di una stellina; meglio tuttavia scalare a 340x.
CGCG 50-33	gx	15h35m17s	+07°07.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 50-34	gx	15h35m29s	+06°17.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NE (presenta una compagna molto piccola a ridosso SE, ma non l'ho vista) — 450x.
CGCG 50-36	gx	15h35m46s	+07°56.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' N — 450x.
CGCG 50-37	gx	15h35m52s	+06°03.5'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata dalla SAO 121080 di 8ª grandezza situata 4.5' a W e che non si può a tenere fuori campo; un'altra stellina brillante si trova a 1.5' E della galassia — 450x.
CGCG 50-39	gx	15h36m16s	+05°55.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 50-50	gx	15h38m11s	+04°46.9'		Ser	24"	buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, appare in visione distolta a ridosso N di una stellina — 450x.
CGCG 50-52	gx	15h38m39s	+02°43.5'		Ser	24"	ottima / ottimo	è un debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 40-ina di secondi; è difficile da studiare perché c'è una stellina proprio nel centro che confonde un po'; meglio comunque forzare a 580x.
CGCG 50-55	gx	15h38m46s	+06°54.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a 1' N — 450x.
CGCG 50-58	gx	15h39m05s	+05°34.3'		Ser	24"	buona / m. buono	debole e piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE — 450x.
CGCG 50-59	gx	15h39m03s	+05°50.5'		Ser	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø < 30" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 50-60	gx	15h39m02s	+07°43.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme; in visione distolta appare chiaramente rotonda con Ø di max 15" — 450x.
CGCG 50-62	gx	15h39m14s	+05°49.6'		Ser	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-15", appare in visione distolta a 1' NW di una stellina brillante — 450x.
CGCG 50-67	gx	15h40m39s	+07°26.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 50-72	gx	15h41m49s	+07°52.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, a tratti grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi
CGCG 50-75	gx	15h42m22s	+02°28.0'		Ser	24"	buona / m. buono	piccola e debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 50-83	gx	15h43m34s	+04°52.3'		Ser	24"	m. buona / mediocre	diffusa, approssim. rotonda con Ø < 40" e nucleo stellare abbastanza marcato; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 50-87	gx	15h44m04s	+04°46.1'		Ser	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 50-88	gx	15h44m00s	+08°17.3'		Ser	24"	ottima / buono	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 50-89	gx	15h44m20s	+08°18.0'		Ser	24"	ottima / buono	debolissimo baffo esteso non più di 30" e orientato da N a S; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 50-91	gx	15h45m00s	+02°28.1'		Ser	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, con tenue condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E e un'altra debole a meno di 1' SW — 450x.
CGCG 50-92	gx	15h45m20s	+05°10.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; si fatica un po' a capirne la forma in quanto disturbata da una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 50-93	gx	15h45m46s	+02°24.6'		Ser	24"	m. buona / mediocre	debolissima e di luminosità uniforme, appare in visione distolta a 450x, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; è praticamente in mezzo a 2 stelline: una debole a 1' E e l'altra appena percettibile alla stessa distanza verso W — 450x.
CGCG 50-94	gx	15h45m44s	+07°08.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 50-95	gx	15h46m01s	+02°42.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra due stelline distanti un paio di primi in direzione NNE-SSW — 450x.
CGCG 50-96	gx	15h46m02s	+05°08.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 50-99	gx	15h46m09s	+04°37.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" 30"×15"; c'è una debole stellina a 1.5 SE e una appena percettibile a ridosso E — 450x.
CGCG 50-104	gx	15h47m16s	+05°55.3'		Ser	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 50-111	gx	15h50m06s	+07°11.1'		Ser	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' WSW — 450x.
CGCG 50-113	gx	15h50m25s	+06°46.3'		Ser	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' SE e un'altra appena percettibile quasi a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 50-116	gx	15h52m06s	+04°31.0'		Ser	24"	m. buona / mediocre	debolissima, molto piccola e condensata, a bassi ingrandimenti potrebbe essere scambiata per una stellina! A 450x appare effettivamente diffusa, ma il Ø non è comunque superiore a 10".
CGCG 50-117	gx	15h52m26s	+02°27.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, solo a tratti condensata, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 51-5	gx	15h55m35s	+06°27.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 51-6	gx	15h55m53s	+04°50.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e condensata, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso W — 450x.
CGCG 51-9	gx	15h57m52s	+04°15.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SSW — 450x.
CGCG 51-12	gx	15h58m22s	+02°57.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ridosso S; due stelline brillanti si trovano a N e NE con le quali la galassietta forma un piccolo triangolo equilatero — 450x.
CGCG 51-14	gx	15h58m54s	+08°09.9'		Ser	24"	ottima / buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 51-16	gx	15h59m47s	+02°42.8'		Ser	24"	buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 51-17	gx	15h59m50s	+02°40.0'		Ser	24"	buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 51-21	gx	16h02m12s	+07°05.2'		Ser	24"	ottima / ottimo	allungata da N a S con dimensioni 60"×30", appena più brillante all'interno; situata 1' NE di una stellina brillante — 400x.
CGCG 51-28	gx	16h04m09s	+02°37.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
CGCG 51-33	gx	16h04m49s	+02°30.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; ci sono 3 stelline allineate abbastanza brillanti e della stessa luminosità a SW — 450x.
CGCG 51-37	gx	16h05m24s	+07°04.7'		Ser	28"	ottima / m. buono	debolissima chiazza di forma indistinta, appare a tratti in visione distolta, ma non sembra più estesa di 20"-25"; situata in mezzo a due stelle brillanti distanti 8' in direzione NE-SW (quella a NE è in realtà una tripletta serrata) — 495x.
CGCG 51-41	gx	16h06m29s	+04°16.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra due stelline brillanti che disturbano un po' la visione — 450x.
CGCG 51-42	gx	16h06m40s	+03°09.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 51-43	gx	16h06m41s	+06°34.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina a 1' SE; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 51-46	gx	16h07m25s	+03°35.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 51-53	gx	16h08m28s	+07°27.4'		Ser	24"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola, anche in visione distolta è poco più di una stellina sfuocata a 340x; a 450x in visione distolta appare rotonda con Ø di 10"-12".
CGCG 51-57	gx	16h10m04s	+06°35.2'		Ser	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-12"; ci sono 2 deboli stelline a ridosso NE e SE — 450x.
CGCG 51-58	gx	16h10m31s	+04°23.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N — 450x.
CGCG 51-59	gx	16h10m35s	+04°45.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 51-61	gx	16h12m21s	+04°36.4'		Her	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia ravvicinata con MAC 1612+0436 situata a ridosso verso S; si sdoppiano facilmente a 450x; sono entrambe molto piccole, con Ø di una 20-ina di secondi; la CGCG è appena più evidente; c'è una stellina subito a N, perfettamente allineata con la coppia.
CGCG 51-63	gx	16h12m39s	+06°05.7'		Her	24"	ottima / buono	molto piccola, molto debole e relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso W (fa parte di una coppia con componenti della stessa luminosità distanti poco più di 1' in direzione ~ N-S) — 450x.
CGCG 51-64	gx	16h12m46s	+04°35.9'		Her	24"	m. buona / mediocre	debolissima e molto piccola, relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 51-65	gx	16h12m51s	+06°03.7'		Her	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø max di 15"; c'è una stellina subito a E (fa parte di una coppia di uguale luminosità orientata da NW a SE) — 450x.
CGCG 51-66	gx	16h13m00s	+04°20.7'		Her	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 51-68	gx	16h13m23s	+07°02.3'		Her	24"	ottima / buono	molto piccola e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi
CGCG 51-70	gx	16h14m12s	+06°09.0'		Ser	24"	buona / ottimo	forma una coppia assieme a CGCG 51-72 situata 1.5' a ENE — le due piccole galassie sono molto deboli e di aspetto simile; la 1ª appare orientata da E a W con dimensioni 20"×15", mentre la 2ª è poco più piccola e ha dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
CGCG 51-71	gx	16h14m17s	+03°59.6'		Her	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MAC 1614+0400 situata a 45" NE — piccola, poco diffusa, con condensazione centrale visibile a tratti, rotonda con Ø di max 20"; c'è una stellina al bordo NE; la MAC è pure rotonda, di Ø simile, ma più debole e di luminosità uniforme; ho spinto a 570x per tener fuori campo la SAO 121440 di 8ª grandezza situata a meno di 4' NW della coppia.
CGCG 51-72	gx	16h14m17s	+06°09.5'		Ser	24"	buona / ottimo	v. **CGCG 51-70**
CGCG 51-73	gx	16h14m31s	+03°13.1'		Her	24"	buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo facile da vedere, relativamente compatto e condensato, non più esteso di 15" e situato a ridosso S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 52-3	gx	16h19m48s	+03°07.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 52-4	gx	16h19m48s	+05°09.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 52-6	gx	16h20m29s	+07°21.0'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina molto debole a 1' verso N; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 52-7	gx	16h21m05s	+04°12.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 52-10	gx	16h23m21s	+06°39.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	chiazzetta molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 30"-35"; si trova a ridosso W di un piccolo triangolo molto aperto di deboli stelline — 450x.
CGCG 52-11	gx	16h23m32s	+07°51.1'		Her	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 52-13	gx	16h24m54s	+06°04.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza lattescente, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a ridosso S — 450x.
CGCG 52-15	gx	16h26m04s	+02°54.4"		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a ridosso del nucleo verso W; un'altra stellina di luminosità simile si trova all'esterno verso E — 450x.
CGCG 52-16	gx	16h26m58s	+03°14.5'		Oph	24"	buona / ottimo	relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina subito a N — 450x.
CGCG 52-17	gx	16h26m52s	+05°51.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo E — 450x.
CGCG 52-18	gx	16h27m03s	+03°10.7'		Oph	24"	buona / ottimo	poco diffusa, piccola, rotonda con Ø max di 20" (poco inferiore a quello della precedente) e condensazione centrale visibile a tratti (a meno che non si tratti di una stellina verso il bordo W) — 450x.
CGCG 52-19	gx	16h27m02s	+07°33.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; equidistante ma non allineata con 2 stelline brillanti a NW — 450x.
CGCG 52-20	gx	16h27m18s	+03°04.3'		Oph	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 52-23	gx	16h28m22s	+08°31.8'		Her	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 52-25	gx	16h29m08s	+08°05.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 52-26	gx	16h29m09s	+08°08.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 52-30	gx	16h29m38s	+08°27.0'		Her	24"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 52-34	gx	16h30m29s	+07°58.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una evidente condensazione centrale; c'è una stellina subito a SW e un'altra più debole quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 52-35	gx	16h30m47s	+03°30.5'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 52-36	gx	16h30m41s	+06°02.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi e orientato da N a S; ci sono due stelline a ridosso della gx: una a NW e l'altra al bordo E — 450x.
CGCG 52-37	gx	16h30m56s	+04°05.0'		Her	24"	buona / ottimo	facile da vedere, ma con basso gradiente di luce, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 52-38	gx	16h31m04s	+05°09.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 52-39	gx	16h31m33s	+05°05.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; è di aspetto un po' confuso ma non sembra comunque più estesa di 20".
CGCG 52-41	gx	16h32m19s	+03°51.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile; situata a W di un triangolo isoscele e rettangolo formato da tre stelle brillanti — 450x.
CGCG 52-45	gx	16h34m46s	+07°27.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 52-46	gx	16h34m40s	+08°39.9'		Her	24"	buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W, purtroppo disturbato dalla SAO 162810 di 6a grandezza situata 3' a W; ci sono due stelline a ridosso della gx, una a N e l'altra a W (quest'ultima è appena percettibile) — 450x.
CGCG 52-48	gx	16h35m18s	+08°22.4'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 52-51	gx	16h37m42s	+07°15.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo N (il campo è disturbato da due stelle brillanti di cui una, la SAO 121740 di magnitudo 8.6, situata un paio di primi a NW) — 450x.
CGCG 52-52	gx	16h37m55s	+06°16.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, situata all'interno di un piccolo triangolo irregolare molto schiacciato; in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 52-56	gx	16h38m12s	+06°10.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; l'orientamento si apprezza tuttavia meglio scalando a 340x.
CGCG 53-1	gx	16h43m06s	+08°30.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE (fa parte di una coppia di stelline orientate da E a W, distanti 1' e della stessa luminosità) — 450x.
CGCG 53-2	gx	16h44m09s	+07°26.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione quasi stellare; c'è una stellina a ridosso W e un'altra di luminosità simile subito a NW — 450x.
CGCG 53-3	gx	16h44m40s	+08°08.2'		Her	24"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 53-5	gx	16h45m52s	+05°20.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina brillante a 1' verso NNW — 450x.
CGCG 53-7	gx	16h46m37s	+06°33.3'		Her	24"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 53-12	gx	16h49m33s	+06°01.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge abbastanza evidente — 450x.
CGCG 53-21	gx	16h56m26s	+05°56.3'		Oph	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 53-22	gx	16h57m04s	+05°22.3'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso N — 450x.
CGCG 53-23	gx	07h01m09s	+06°51.5'		Oph	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 53-24	gx	17h01m22s	+05°17.0'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a S — 450x.
CGCG 53-31	gx	17h06m10s	+07°46.8'		Oph	24"	buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione molto evidente.
CGCG 54-1	gx	17h06m41s	+04°54.2'		Oph	24"	buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina al bordo NW — 450x.
CGCG 54-8	gx	17h14m50s	+08°23.8'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare elusivamente a ridosso S di una stellina; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 54-9	gx	17h14m55s	+06°12.7'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia a 1' N — 450x.
CGCG 54-10	gx	17h15m01s	+08°26.2'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 54-11	gx	17h15m09s	+08°27.4'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 54-13	gx	17h15m12s	+08°25.6'		Oph	24"	m. buona / ottimo	è ancora più debole di CGCG 54-10 — osservata subito prima — molto diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a SE — 450x.
CGCG 54-17	gx	17h16m42s	+08°11.5'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 54-18	gx	17h17m13s	+07°44.5'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa, forse circolare con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a ridosso S di una stellina; un'altra stellina più debole si trova a 1' SW — 450x.
CGCG 54-19	gx	17h17m25s	+07°41.7'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 54-20	gx	17h17m33s	+07°39.7'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 54-24	gx	17h22m20s	+06°38.3'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stella brillante a poco più di 1' verso N — 450x.
CGCG 54-25	gx	17h22m24s	+06°40.2'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' NW e una brillante a 1.5' SW — 450x.
CGCG 54-26	gx	17h22m32s	+08°21.4'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 54-27	gx	17h26m53s	+07°07.7'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo e di forma indistinta, estesa oltre 30"; situata a ridosso S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 55-2	gx	17h30m41s	+06°23.5'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 55-3	gx	17h31m55s	+06°29.0'		Oph	24"	m. buona / ottimo	forma un piccolo quartetto arcuato e ravvicinato assieme alle 3 successive, tutte rotonde diffuse e di aspetto a prima vista simile — questa è la più piccola con Ø < 20" — 450x.
CGCG 55-4	gx	17h31m54s	+06°30.1'		Oph	24"	m. buona / ottimo	è la più evidente del quartetto, con Ø di una 20-ina di secondi; solo a momenti appare un cenno di condensazione centrale — 450x.
CGCG 55-5	gx	17h31m57s	+06°28.2'		Oph	24"	m. buona / ottimo	di aspetto simile alla precedente, ma di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 55-6	gx	17h31m59s	+06°32.0'		Oph	24"	m. buona / ottimo	è la più debole del quartetto, con Ø di una 20-ina di secondi e una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 55-10	gx	17h35m19s	+06°10.1'		Oph	24"	buona / ottimo	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una debole stellina subito a N — 450x.
CGCG 55-11	gx	17h35m50s	+06°58.4'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole e assai diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale visibile solo a momenti; disturbata da una stellina brillante a ridosso W — 450x.
CGCG 55-19	gx	17h50m04s	+07°17.1'		Oph	24"	buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' S — 450x.
CGCG 55-20	gx	17h50m33s	+05°40.3'		Oph	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso E — 450x.
CGCG 56-1	gx	17h55m33s	+06°11.6'		Oph	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale visibile solo a momenti; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE — 450x.
CGCG 56-8	gx	18h04m16s	+07°02.5'		Oph	24"	buona / m. buono	debolissima, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; appare in visione distolta subito a NE di una stellina, ma la visione è un po' disturbata da una stella di 9ª grandezza situata 3' scarsi a W — 450x.
CGCG 56-9	gx	18h04m22s	+07°16.8'		Oph	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa e con condensazione centrale evidente, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante al bordo SE dalla quale la gx sembra aggettare. Un asterismo relativamente compatto, orientato da NW a SE formato da 6 stelline brillanti ha la forma di un piccolo ramaiolo e si trova a 12' verso W dalla gx — 450x.
CGCG 56-10	gx	18h12m55s	+06°42.5'		Oph	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza forse circolare, con Ø < 30" e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scendere sotto i 450x.
CGCG 57-4	gx	07h12m37s	+12°32.7'		CMi	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e con marcata condensazione centrale quasi stellare, orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 57-10	gx	07h25m11s	+09°12.3'		CMi	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E e una appena percettibile al bordo orientale — 450x.
CGCG 57-16	gx	07h30m52s	+13°03.3'		Gem	24"	ottima / discreto	fa parte di un terzetto assieme alla successiva e a UGC 3892 — poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S — 450x.
CGCG 57-17	gx	07h31m01s	+13°05.7'		Gem	24"	ottima / discreto	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; a tratti appare come un "foruncolo" verso N, ma non capisco se è una stellina o se fa parte della gx; c'è invece una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x.
CGCG 57-19	gx	07h31m34s	+13°08.5'		Gem	24"	ottima / discreto	relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline: una a 1' verso W e l'altra più debole subito a N — 450x.
CGCG 58-4	gx	07h35m29s	+11°43.1'		CMi	24"	ottima / m. buono	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno; una stellina appena percettibile a ridosso E dà a prima vista l'impressione di un leggero allungamento della gx — 450x.
CGCG 58-5	gx	07h35m34s	+12°18.2'		Gem	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso S, una poco più debole alla stessa distanza verso NE e una 3a ancora più debole a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 58-9	gx	07h35m43s	+11°42.6'		CMi	24"	ottima / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20", con tenue bulge evidente, ma poco contrastato; c'è una doppia stretta e molto sbilanciata a ridosso NW (la componente più vicina alla gx è di fatto appena percettibile) e un'altra più distante subito a S; una stellina brillante e un po' fastidiosa si trova a 1' verso W — 450x.
CGCG 58-10	gx	07h36m47s	+09°55.2'		CMi	16"	m. buona / ottimo	pur essendo debolissima appare più facilmente di UGC 3938, dalla quale dista 5' verso W, forse perché più compatta e più piccola; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina visibile a tratti a ~ 40" verso W — 380x.
CGCG 58-16	gx	07h37m29s	+09°01.6'		Gem	24"	ottima / discreto	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 58-17	gx	07h37m57s	+10°11.7'		CMi	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
CGCG 58-18	gx	07h39m01s	+13°37.5'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare solo in visione distolta a 450x e a ridosso W di una debole stellina, grosso modo rotonda con Ø di 20"-25"; una stellina appena percettibile si trova a 1' scarso verso NW.
CGCG 58-19	gx	07h39m06s	+09°06.9'		CMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW.
CGCG 58-23	gx	07h40m25s	+14°49.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione centrale evidente; è situata sulla base minore di un piccolo triangolo isoscele formato da 3 stelline di luminosità simile e il cui vertice più acuto punta a SE) — 450x.
CGCG 58-26	gx	07h42m04s	+12°09.9'		CMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 58-27	gx	07h42m26s	+11°14.8'		CMi	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a SW, una più debole alla stessa distanza verso NE, nonché una doppia molto stretta subito a E che a prima vista, e a ingrandimenti inferiori, dà l'impressione di un piccolo oggetto diffuso — 450x.
CGCG 58-28	gx	07h42m39s	+11°15.7'		CMi	24"	ottima / discreto	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 58-33	gx	07h46m09s	+10°39.6'		CMi	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 58-34	gx	07h46m38s	+09°13.2'		CMi	24"	m. buona / mediocre	allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25", con piccolo bulge quasi stellare, diffusa alle estremità NE e SW; c'è una coppia di deboli stelline a 1' scarso SW — 450x.
CGCG 58-35	gx	07h47m34s	+10°15.5'		CMi	24"	ottima / buono	debolissimo baffo di luce di luminosità uniforme esteso una 40-ina di secondi e orientato da NW a SE; c'è una stellina a ridosso di NE e un'altra poco più brillante a 1' scarso verso S; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.

CGCG 58-38	gx	07h50m32s	+10°18.8'		CMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N; allineata con una coppia ravvicinata di stelline brillanti a NE — 450x.
CGCG 58-40	gx	07h50m56s	+09°33.7'		CMi	24"	ottima / buono	debolissima chiazza diffusa di forma indistinta, ma non più estesa di 20" situata a ridosso S di una coppia di stelline — 450x.
CGCG 58-41	gx	07h50m54s	+09°35.4'		CMi	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso NE e una appena percettibile alla stessa distanza verso NW — 450x.
CGCG 58-42	gx	07h51m20s	+10°09.7'		CMi	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 58-43	gx	07h51m18s	+10°50.0'		CMi	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 58-44	gx	07h51m23s	+10°58.2'		CMi	24"	m. buona / mediocre	debolissima e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 58-45	gx	07h51m23s	+10°30.7'		CMi	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelline di luminosità uguale: una subito a NE e l'altra a 1' verso E — 450x.
CGCG 58-46	gx	07h51m26s	+10°46.4'		CMi	24"	m. buona / mediocre	anche questa è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 58-48	gx	07h51m39s	+09°38.7'		CMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 58-49	gx	07h51m38s	+09°46.9'		CMi	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante subito a NE — 450x.
CGCG 58-50	gx	07h51m42s	+09°53.7'		CMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; situata a ridosso S di una coppia di stelline sbilanciate in luminosità — 450x.
CGCG 58-51	gx	07h51m41s	+11°10.1'		CMi	24"	ottima / discreto	è una piccola chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; è situata tra 2 stelle brillanti (SAO 97314 e 97322) di 7ª grandezza che ne offuscano un po' la visione — 450x.
CGCG 58-53	gx	07h52m07s	+11°08.4'		CMi	24"	ottima / discreto	molto debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 97322 di 7ª grandezza situata ad appena 1' verso N; in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 58-55	gx	07h52m51s	+08°59.3'		CMi	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 58-57	gx	07h53m13s	+12°53.9'		CMi	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima chiazza rotondeggiante, estesa una 20-ina di secondi e solo a tratti condensata — 450x.
CGCG 58-58	gx	07h53m10s	+08°57.3'		CMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a N — 450x.
CGCG 58-59	gx	07h53m11s	+09°24.0'		CMi	24"	ottima / discreto	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso SW — 450x.
CGCG 58-61	gx	07h53m18s	+08°55.3'		CMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma poco più evidente di CGCG 58-58, osservata subito prima e dalla quale dista 2.5' a SE, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N e un'altra poco più evidente subito a NW — 450x.
CGCG 58-64	gx	07h53m44s	+13°20.2'		Gem	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una doppia stretta dalle componenti deboli subito a N — 450x.
CGCG 58-65	gx	07h54m04s	+13°57.3'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N — 450x.
CGCG 58-66	gx	07h54m17s	+14°16.4'		Gem	24"	m. buona / mediocre	fa parte di un quintetto assieme alle 4 successive — debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile subito a NE; disturbata dalla SAO 97353 di magnitudo 7.6 situata a 1' SE — 450x.
CGCG 58-68	gx	07h54m41s	+14°24.4'		Gem	24"	m. buona / mediocre	fa parte di un quintetto assieme alle precedente e alle 3 successive — piccola e molto debole, con condensazione centrale appena accennata, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 58-69	gx	07h54m57s	+14°27.3'		Gem	24"	m. buona / mediocre	assieme alle 2 precedenti e alle 2 successive fa parte di un quintetto di cui rappresenta il membro più evidente; è comunque debole, poco diffusa e con nucleo stellare, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE e un'altra decisamente più brillante e poco più lontana nella stessa direzione — 450x.
CGCG 58-70	gx	07h55m10s	+14°22.2'		Gem	24"	m. buona / mediocre	fa parte di un quintetto assieme alle 3 precedenti e alla successiva — debolissimo oggetto esteso non più di 10" o 15" che appare in visione distolta a ridosso NW di una stellina — 450x.
CGCG 58-71	gx	07h55m16s	+14°26.1'		Gem	24"	m. buona / mediocre	fa parte di un quintetto assieme alle 4 precedenti — molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina evidente quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 59-1	gx	07h56m00s	+14°11.7'		Cnc	24"	buona / ottimo	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N — 450x.
CGCG 59-2	gx	07h56m00s	+12°58.9'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW; è situata in mezzo a 2 stelline brillanti orientate da NE a SW — 450x.
CGCG 59-5	gx	07h57m08s	+10°35.8'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa, allungata da N a s di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 59-6	gx	07h57m16s	+11°02.8'		Cnc	24"	ottima / discreto	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 59-7	gx	07h57m20s	+11°12.3'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una debole stellina a 1' S (o SW) — 450x.
CGCG 59-8	gx	07h58m04s	+10°18.8'		Cnc	24"	ottima / discreto	debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con un tenue bulge poco contrastato — 450x.
CGCG 59-9	gx	07h58m36s	+12°09.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; la visione non sembra molto disturbata dalla SAO 97466 di 8ª grandezza situata 3' a SE — 450x.
CGCG 59-13	gx	08h00m37s	+13°41.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 59-15	gx	08h01m17s	+09°15.9'		CMi	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una doppia abbastanza stretta e sbilanciata a 1' NE — 450x.
CGCG 59-17	gx	08h01m39s	+10°44.0'		Cnc	24"	ottima / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; una stella brillante di 10ª situata 1.5' a SSE non sembra dare fastidio (presenza di chiarore lunare) — 450x.
CGCG 59-19	gx	08h01m54s	+09°37.5'		CMi	24"	ottima / discreto	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; non sembra gran che disturbata dalla SAO 116246 di magnitudo 7.8 situata ad appena 3' W — 450x.
CGCG 59-20	gx	08h01m55s	+11°43.2'		Cnc	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una doppia stretta a ridosso di NE (presenza di chiarore lunare) — 450x.
CGCG 59-21	gx	08h01m58s	+09°40.7'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 59-22	gx	08h02m09s	+09°16.3'		CMi	24"	ottima / buono	baffo di luce molto debole e diffuso, esteso una 30-ina di secondi, orientato da NW a SE e situato a ridosso S di una stellina brillante; una stellina appena percettibile si trova al bordo NW — 450x.
CGCG 59-26	gx	08h02m25s	+09°35.8'		Cnc	24"	ottima / discreto	è abbastanza facile da vedere, nonostante si trovi quasi a ridosso NW della SAO 116262 di 8ª grandezza; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e con nucleo stellare evidente 450x.
CGCG 59-27	gx	08h02m38s	+09°30.0'		Cnc	24"	ottima / discreto	piccola, molto debole e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' verso SW (presenza di chiarore lunare) — 450x.
CGCG 59-32	gx	08h30m56s	+08°42.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, compatta e leggermente condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 59-33	gx	08h03m59s	+08°32.2'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina visibile solo a momenti al bordo NE, mentre un'altra appena percettibile si trova a ridosso N (presenza di chiarore lunare) — 450x.
CGCG 59-34	gx	04h08m00s	+10°00.6'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE (presenza di chiarore lunare) — 450x.
CGCG 59-36	gx	08h04m06s	+09°48.9'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi*(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 59-40	gx	08h04m56s	+10°50.9'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a E e una doppia serrata a ridosso W, la cui componente a N si vede però solo a momenti a 450x (presenza di chiarore lunare).
CGCG 59-42	gx	08h05m41s	+10°42.4'		Cnc	24"	ottima / discreto	debolissima e di aspetto confuso, estesa una 20-ina di secondi; si trova all'interno di un piccolo asterismo foggiato a "Y" la cui componente più meridionale è brillante: ciò disturba evidentemente la visione (presenza di chiarore lunare) — 450x.
CGCG 59-45	gx	08h06m14s	+11°47.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma più che altro disturbata da una coppia di stelle brillanti situate 1' a NW e SW; in visione distolta appare circolare con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 59-49	gx	08h09m04s	+11°21.2'		Cnc	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 59-50	gx	08h11m25s	+08°53.7'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi *(presenza di chiarore lunare)*.
CGCG 59-51	gx	08h11m27s	+08°56.5'		Cnc	24"	ottima / discreto	debolissima e molto piccola, osservabile in visione distolta, ma solo a momenti appare orientata da E a W (all'incirca come le 2 stelline a SW) con dimensioni grosso modo di 20"×10" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 59-52	gx	08h12m11s	+11°15.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
CGCG 59-56	gx	08h17m03s	+11°35.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare rotonda con Ø grosso modo di 20" — 450x.
CGCG 59-57	gx	08h17m14s	+12°59.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, a tratti in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 60-3	gx	08h22m56s	+13°37.3'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, probabilmente rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
CGCG 60-4	gx	08h23m29s	+09°24.0'		Cnc	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 60-5	gx	08h23m50s	+11°33.0'		Cnc	24"	buona / ottimo	poco diffusa, rotonda e di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 60-6	gx	08h23m51s	+09°50.8'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 60-7	gx	08h24m04s	+09°41.9'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima, appare a tratti in visione distolta, ma è di aspetto confuso; ad ogni modo non è più estesa di 20" — 450x.
CGCG 60-8	gx	08h24m02s	+11°29.9'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, molto piccola, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 60-9	gx	08h24m11s	+12°07.0'		Cnc	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 60-10	gx	08h25m01s	+13°32.2'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è un ampio asterismo di 6 stelle brillanti fatto a uncino nello stesso campo a E della gx — 450x.
CGCG 60-13	gx	08h26m20s	+14°14.1'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso verso SW di una stellina; è rotonda con Ø > 30" — 450x.
CGCG 60-14	gx	08h26m23s	+08°25.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 60-16	gx	08h28m11s	+10°32.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' scarso — 450x.
CGCG 60-17	gx	08h28m12s	+08°38.8'		Cnc	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 60-18	gx	08h28m33s	+08°44.1'		Cnc	24"	ottima / m. buono	poco più evidente, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a NW — 450x.
CGCG 60-19	gx	08h31m07s	+09°29.7'		Cnc	24"	buona / buono	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; emerge facilmente a 450x dall'alone di una stella brillante situata a ridosso verso N.
CGCG 60-23	gx	08h33m37s	+13°03.3'		Cnc	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 60-24	gx	08h33m40s	+09°57.8'		Cnc	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale a tratti stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW (la più settentrionale di 3 stelline allineate in direzione NE-SW di luminosità simile) — 450x.
CGCG 60-26	gx	08h35m40s	+12°33.6'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 60-27	gx	08h36m28s	+10°38.7'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole chiazza circolare leggermente condensata con Ø di una 30-ina di secondi e una stellina al bordo W; una stellina brillante si trova a 1' scarso verso SW — 450x.
CGCG 60-30	gx	08h37m39s	+12°02.0'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una coppia di stelle a N orientate da NW a SE — 450x.
CGCG 60-31	gx	08h37m53s	+12°46.8'		Cnc	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 60-32	gx	08h40m04s	+11°00.6'		Cnc	24"	buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa e con nucleo stellare, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; disturbata dalla SAO 98017 situata 2.5 a N — 450x.
CGCG 60-36	gx	08h42m48s	+14°15.9'		Cnc	24"	ottima / buono	situata un paio di primi a SW di NGC 2648, è una lama di luce molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W estesa per ~ 1' — 450x.
CGCG 61-2	gx	08h44m30s	+11°11.0'		Cnc	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 61-9	gx	08h46m01s	+12°47.2'		Cnc	24"	buona / buono	di aspetto simile a UGC 4582, dalla quale dista 1.5' verso W, poco più "cicciotta" e con condensazione centrale appena più evidente — 340x.
CGCG 61-11	gx	08h46m47s	+13°42.4'		Cnc	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 61-14	gx	08h48m46s	+10°05.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a E — 450x.
CGCG 61-16	gx	08h50m12s	+12°21.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 61-17	gx	08h52m57s	+09°19.0'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20"; c'è un asterismo di 4 stelle brillanti foggiato a "Y" a S della gx — 450x.
CGCG 61-21	gx	08h55m25s	+12°03.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 61-23	gx	08h55m53s	+13°33.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	baffo di luce molto tenue, di luminosità uniforme, esteso una 40-ina di secondi e orientato da NW a SE; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 61-24	gx	08h56m25s	+12°24.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	è una piccola chiazza molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi a W (dalla quale a prima vista sembra aggettare); questa stellina fa parte di un piccolo asterismo di 4 componenti fatto a "y" o "λ"; il campo è comunque disturbato dalla SAO 98240 di 8ª grandezza situata un paio di primi a NE della gx — 450x.
CGCG 61-27	gx	08h56m31s	+11°01.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; un nodulo appena percettibile a mo' di minuscolo "pendaglio" si trova a ridosso N: da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la MAC 0856+1101 — 450x.
CGCG 61-31	gx	08h58m06s	+12°59.5'		Cnc	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; ci sono 4 stelline quasi allineate (una tripletta e una più distante) a una decina di primi verso E — 450x.
CGCG 61-32	gx	08h58m43s	+12°40.6'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole e spampanata, forse circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE e un'altra più debole a 45" NE; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 61-33	gx	08h58m57s	+10°51.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 61-36	gx	08h59m53s	+13°10.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena percettibile; equidistante, ma non allineata, con 2 stelline a S e SSE. Un piccolo oggetto diffuso molto debole esteso 10"-12", e che a prima vista pare una stellina sfocata, si trova a ridosso SW della gx; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x: da un controllo successivamente effettuato è risultata essere la PGC 1424727.
CGCG 61-41	gx	09h01m25s	+10°12.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 61-43	gx	09h01m45s	+12°59.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a momenti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 61-44	gx	09h02m04s	+11°38.0'		Cnc	24"	ottima / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a NE; meglio evidente a 340x.
CGCG 61-47	gx	09h12m41s	+13°06.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole e relativamente compatta, con tenue bulge diffuso e poco contrastato, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 61-48	gx	09h03m11s	+13°37.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a CGCG 61-51, -54, e -55 un quartetto posto ai vertici di un trapezio sghembo — diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina brillante a 1' NW — 450x.
CGCG 61-49	gx	09h03m13s	+09°37.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 61-50	gx	09h03m11s	+10°09.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è disturbata da un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti: una di queste si trova subito a NE della gx.
CGCG 61-51	gx	09h03m20s	+13°41.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a CGCG 61-48, -54, e -55 un quartetto posto ai vertici di un trapezio sghembo — molto debole e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 61-54	gx	09h03m23s	+13°30.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme a CGCG 61-48, -51, e -55 un quartetto posto ai vertici di un trapezio sghembo — debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
CGCG 61-55	gx	09h03m40s	+13°40.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme alla precedente di un quartetto posto ai vertici di un trapezio sghembo — debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 61-56	gx	09h04m32s	+13°09.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e molto debole, appena più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso SW — 450x.
CGCG 61-57	gx	09h04m37s	+13°33.2'		Cnc	24"	buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15", con bulge diffuso e contrastato — 450x.
CGCG 61-58	gx	09h04m50s	+13°33.7'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto diffusa, con condensazione centrale brillante quasi stellare, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 62-1	gx	09h08m43s	+13°14.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20", ma è meglio scalare a 340x.
CGCG 62-4	gx	09h12m20s	+13°40.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 62-7	gx	09h12m30s	+13°48.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 8' a NNE della precedente) — 450x.
CGCG 62-12	gx	09h16m22s	+10°13.9'		Cnc	24"	buona / buono	debole, piccola, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; è allineata con 2 stelline abbastanza brillanti a NNE — 450x.
CGCG 62-13	gx	09h16m30s	+13°06.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N — 450x.
CGCG 62-14	gx	09h16m47s	+09°53.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' S e un'altra di luminosità simile poco più distante verso W; in mezzo ce n'è una debole — 450x.
CGCG 62-15	gx	09h16m48s	+11°27.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	è un baffo di luce molto tenue che aggetta a NE di una stellina per una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 62-16	gx	09h17m51s	+09°41.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccolina, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 62-17	gx	09h18m07s	+09°46.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 62-18	gx	09h18m06s	+13°28.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 1.5' NNW — 450x.
CGCG 62-22	gx	09h20m51s	+13°11.5'		Cnc	24"	buona / m. buono	diffusa, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SSE — 450x.
CGCG 62-23	gx	10h20m56s	+10°42.0'		Cnc	24"	buona / m. buono	molto debole e poco contrastata sul fondo cielo, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 62-24	gx	09h20m00s	+11°03.6'		Cnc	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima chiazza forse circolare situata a ridosso N di una stellina abbastanza brillante; non sembra più estesa di 15"-20"; poco meglio evidente a spingendo a 580x.
CGCG 62-25	gx	09h12m38s	+13°58.0'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo S — 450x.
CGCG 62-26	gx	09h22m35s	+08°45.2'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 62-27	gx	09h23m48s	+12°59.5'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima galassietta di dimensioni grosso modo 30"×15" e orientata da E a W; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' SE — 450x.
CGCG 62-29	gx	09h24m57s	+11°32.5'		Leo	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa e appena più brillante, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
CGCG 62-30	gx	09h25m15s	+10°53.2'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 62-36	gx	09h27m34s	+12°16.2'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 62-38	gx	09h28m41s	+12°37.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale appena percettibile; è situata sul lato NE di un triangolo isoscele i cui vertici sono occupati da stelle brillanti che tendono a offuscare il campo: quelle che delimitano la base minore sono due doppie abbastanza larghe — 450x.
CGCG 62-39	gx	09h29m01s	+12°30.2'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø < 30"; la visione è tuttavia disturbata dalla SAO 98595 di 7ª grandezza situata 5' a NNW e che si fatica a tenere fuori campo — 450x.
CGCG 62-40	gx	09h29m29s	+11°38.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 62-41	gx	09h30m04s	+08°47.0'		Leo	24"	m. buona / buono	debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 62-42	gx	09h30m04s	+11°47.8'		Leo	24"	m. buona / buono	appare elusivamente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; sembra una stellina leggermente sfuocata, con dimensione non superiore a 10".
CGCG 63-2	gx	09h32m16s	+12°05.6'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' NNW — 450x.
CGCG 63-3	gx	09h32m25s	+10°45.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; è disturbata dalla SAO 98629 di 8ª grandezza situata 1.5' a NW — 450x.
CGCG 63-6	gx	09h32m52s	+12°17.2'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza di forma indistinta, molto diffusa e non più estesa di 30"; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 63-14	gx	09h34m55s	+11°40.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 63-15	gx	09h35m22s	+13°33.0'		Leo	24"	buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
CGCG 63-16	gx	09h36m26s	+11°19.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 63-17	gx	09h36m50s	+11°45.0'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; è situata al vertice N di un piccolo triangolo equilatero formato con due stelline a SE e SW — 450x.
CGCG 63-21	gx	09h37m37s	+12°37.7'		Leo	24"	buona / m. buono	relativamente facile, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 63-25	gx	09h38m29s	+13°32.7'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta a 450x, grosso modo rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 63-27	gx	09h38m53s	+09°45.0'		Leo	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è un asterismo di 4 stelle brillanti, di cui 3 allineate da NW a SE molto luminose, a una decina di primi verso S — 450x.
CGCG 63-31	gx	09h40m30s	+11°29.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; un tenuissimo nodulo di una decina di secondi di Ø appare a tratti in visione distolta a ridosso N della gx: da un controllo successivamente effettuato questo è risultato poi essere la MAC 0940+1130 — 450x.
CGCG 63-32	gx	09h40m31s	+13°32.5'		Leo	24"	buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 63-34	gx	09h40m43s	+13°19.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10" — 450x.
CGCG 63-41	gx	09h41m35s	+13°22.8'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare, a tratti grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 63-42	gx	09h41m31s	+10°38.5'		Leo	24"	buona / ottimo	debole e piccola, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 63-43	gx	09h41m36s	+11°28.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 63-44	gx	09h41m47s	+11°28.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø > 30" e tenue nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
CGCG 63-45	gx	09h41m53s	+13°29.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 63-49	gx	09h42m54s	+12°23.2'		Leo	24"	buona / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare; assomiglia a IC 555, ma è meno diffusa e leggermente più piccola — 450x.
CGCG 63-50	gx	09h43m02s	+14°09.0'		Leo	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale, anche se poco contrastata; c'è una stellina a una 40-ina di secondi E e una brillante a un paio di primi SSE; una stellina appena percettibile appare solo a momenti a ridosso NE, ma questa, da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la 2MASS 09430389+1409120 di 15-esima — 450x.
CGCG 63-52	gx	09h43m30s	+09°25.2'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 63-56	gx	09h44m25s	+11°13.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole chiazza circolare con Ø di 45", diffusa e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 63-60	gx	09h45m29s	+09°36.2'		Leo	24"	buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e con nucleo stellare, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 63-61	gx	09h46m23s	+09°09.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 63-62	gx	09h46m38s	+16°39.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con nucleo stellare, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 63-63	gx	09h46m46s	+13°31.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 63-65	gx	09h46m45s	+09°15.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di CGCG 63-61 — situata 8' a SW — meno diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 63-66	gx	09h46m49s	+09°44.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 63-67	gx	09h47m04s	+12°33.5'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 63-69	gx	09h47m23s	+08°34.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata a ridosso E di un piccolo triangolo di stelle brillanti fra cui la SAO 11798 di magnitudo 7.5 — 450x.
CGCG 63-70	gx	09h47m45s	+09°08.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 63-71	gx	09h47m51s	+08°49.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 63-72	gx	09h48m41s	+09°00.5'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, molto debole diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 63-74	gx	09h49m37s	+09°11.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da E a W, dimensioni 45"×15", con tenue bulge diffuso e poco contrastato sul disco — 450x.
CGCG 63-79	gx	09h49m51s	+10°25.9'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta e facilmente visibile in visione distolta a 450x, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile subito a W.
CGCG 63-83	gx	09h50m18s	+13°22.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 63-87	gx	09h51m40s	+14°02.3'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e situata in una piccola zona depleta; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
CGCG 63-88	gx	09h51m42s	+12°26.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi nucleo quasi stellare — 450x.
CGCG 63-90	gx	09h52m08s	+12°37.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata sul lato occidentale di un vistoso asterismo di 4 stelle brillanti foggiato a losanga — 450x.
CGCG 63-92	gx	09h52m36s	+09°52.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione stellare evidente; una debole stellina sfuocata appare facilmente in visione distolta a 1' verso W: si tratta di PGC 3091262 — 450x.
CGCG 63-93	gx	09h52m42s	+14°12.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 63-94	gx	09h53m15s	+11°14.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 63-95	gx	09h53m37s	+12°07.8'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; ho dovuto scalare a 340x, perché la gx è situata in una piccola zona depleta e si fatica a scorgerla.
CGCG 63-96	gx	09h53m38s	+09°32.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a ridosso SE — 450x.
CGCG 63-97	gx	09h53m41s	+11°12.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 63-100	gx	09h53m51s	+13°36.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 63-101	gx	09h54m02s	+10°36.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' W e una più debole alla stessa distanza verso NW; un piccolo oggetto diffuso orientato da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" appare facilmente in visione distolta a !' verso E: da un controllo successivamente effettuato, quest'ultimo è risultato essere la MAC 0954+1036 — 450x.
CGCG 63-106	gx	09h55m57s	+13°33.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; allineata e quasi equidistante con una coppia di stelline a NW — 450x.
CGCG 64-3	gx	09h56m05s	+13°24.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	è un debolissimo baffo esteso una 30-ina di secondi in direzione E-W; meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 64-5	gx	09h56m32s	+09°49.3'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 64-6	gx	09h56m35s	+10°05.6'		Leo	24"	buona / discreto	diffusa e con piccola condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 64-7	gx	09h56m35s	+11°09.8'		Leo	24"	buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 64-9	gx	09h57m47s	+10°01.6'		Leo	24"	buona / discreto	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 64-12	gx	09h58m08s	+10°00.3'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole e piccola, poco disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata 1.5' a N; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 64-13	gx	09h58m36s	+13°15.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 64-17	gx	09h59m15s	+12°59.3'		Leo	24"	buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 15" — 450x.
CGCG 64-18	gx	09h59m29s	+11°12.0'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio definita scalando a 340x.
CGCG 64-19	gx	09h59m42s	+09°57.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza circolare con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa, appare a tratti in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
CGCG 64-20	gx	09h59m38s	+10°20.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza approssim. circolare estesa sì e no 30"; c'è una stellina che appare solo a momenti a ridosso S; tutto sommato è meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 64-21	gx	09h59m43s	+11°39.6'		Leo	24"	buona / mediocre	approssim. rotonda con Ø di 1', molto diffusa e con piccola condensazione centrale evidente a 280x (vento forte!).
CGCG 64-24	gx	09h59m47s	+11°29.3'		Leo	24"	buona / mediocre	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a "y" allungata subito a W (vento forte!) — 280x.
CGCG 64-26	gx	10h00m07s	+13°33.0'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, situata a meno di 1' W di una stellina brillante; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 64-27	gx	10h00m26s	+12°52.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø 30"; meglio evidente restando a 450x.
CGCG 64-28	gx	09h59m29s	+11°12.0'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio definita scalando a 340x.
CGCG 64-30	gx	10h00m57s	+11°10.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione stellare visibile a momenti; situata tra 2 stelline orientate da N a S (ma poco spostata verso quella meridionale) — 450x.
CGCG 64-31	gx	10h01m03s	+11°27.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 64-32	gx	10h01m28s	+14°00.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 64-36	gx	10h02m07s	+11°29.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante al bordo settentrionale — 450x.
CGCG 64-39	gx	10h02m17s	+13°35.2'		Leo	24"	ottima / buono	piccola e molto debole, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" o poco più; è disturbata da una coppia di stelline sbilanciate in luminosità situate a ridosso S (quella più a W è abbastanza brillante) — 450x.
CGCG 64-40	gx	10h02m26s	+13°56.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 64-41	gx	10h02m49s	+13°09.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 64-43	gx	10h02m49s	+12°09.6'		Leo	24"	ottima / buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; una stellina percettibile solo a momenti appare subito a E — 450x.
CGCG 64-45	gx	10h03m12s	+12°07.6'		Leo	24"	ottima / buono	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' N — 450x.
CGCG 64-46	gx	10h03m25s	+12°05.9'		Leo	24"	ottima / buono	di dimensione simile alla precedente, ma di aspetto più uniforme; una stellina si trova quasi nel mezzo tra le due gx — 450x.
CGCG 64-47	gx	10h03m58s	+14°13.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' WSW — 450x.
CGCG 64-50	gx	10h04m49s	+11°54.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena evidente; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 64-51	gx	10h04m57s	+10°18.2'		Leo	24"	ottima / buono	piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a un paio di primi SE — 450x.

CGCG 64-52	gx	10h05m17s	+13°59.1'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 64-53	gx	10h05m23s	+11°43.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 64-54	gx	10h05m44s	+10°16.6'		Leo	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e con nucleo stellare evidente, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 64-55	gx	10h05m51s	+12°57.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; forma un piccolo triangolo equilatero con due stelline a W e NW; la visione è però un po' disturbata dalla SAO 98942 di 9ª grandezza situata 3' a W — 450x.
CGCG 64-58	gx	10h06m18s	+13°58.5'		Leo	24"	buona / discreto	debole e molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
CGCG 64-59	gx	10h06m19s	+14°05.1'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 64-60	gx	10h06m29s	+12°52.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissimo lucore molto spampanato, esteso almeno 40"-50", ma di forma indistinta; per di più ci si mette anche la SAO 98949 di magnitudo 7.6 situata 5.5 a SSE a disturbare il campo; la gx appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 64-63	gx	10h06m52s	+14°04.7'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta sembra a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 64-64	gx	10h07m02s	+13°59.0'		Leo	24"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-15".
CGCG 64-65	gx	10h07m06s	+13°55.7'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15"; forma un piccolo triangolo rettangolo con una coppia di stelline separate da 1' scarso e orientate da E a W — 450x.
CGCG 64-70	gx	10h07m54s	+13°23.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra due stelline distanti un paio di primi in direzione NW-SE — 450x.
CGCG 64-73	gx	10h09m20s	+10°46.6'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 64-74	gx	10h08m35s	+12°33.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale molto tenue — 450x.
CGCG 64-76	gx	10h08m45s	+12°41.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 64-80	gx	10h09m18s	+12°36.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 64-82	gx	10h09m39s	+14°13.2'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø grosso modo di una 30-ina di secondi; situata sul lato W di un quadrangolo di stelline brillanti — 450x.
CGCG 64-83	gx	10h10m00s	+11°55.0'		Leo	24"	buona / discreto	debole e molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina molto debole a 1' SE e un'altra appena più evidente a 2' SSE — 450x.
CGCG 64-85	gx	10h11m00s	+09°50.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' NW — 450x.
CGCG 64-86	gx	10h11m07s	+09°45.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di max 15"; c'è una stellina a 1' scarso NW — 450x.
CGCG 64-87	gx	10h11m38s	+08°36.7'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 64-88	gx	10h12m29s	+12°22.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15" e con bulge brillante di aspetto quasi stellare — 450x.
CGCG 64-89	gx	10h12m29s	+11°27.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima e diffusa, in visione distolta grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso NW — 450x.
CGCG 64-91	gx	10h13m12s	+12°39.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni poco superiori a 30"×20" — 450x.
CGCG 64-92	gx	10h14m08s	+10°08.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	lucore molto tenue approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; situata purtroppo a ridosso S di una stellina brillante che tende a offuscarla — 450x.
CGCG 64-93	gx	10h14m35s	+11°52.0'		Leo	24"	buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 3 deboli stelline allineate ed equidistanti a SE e orientate da NE a SW; una 4ª stellina, allineata con le altre, è un po' più distante verso NE — 450x.
CGCG 64-94	gx	10h14m47s	+12°35.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, situata subito a NE di una stellina brillante (un'altra stellina più debole si trova a 1' W della galassia); è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 64-95	gx	10h14m51s	+13°20.3'		Leo	24"	ottima / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata sul lato W di un piccolo triangolo rettangolo formato da 3 stelline — 450x.
CGCG 64-98	gx	10h16m35s	+12°39.1'		Leo	24"	buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge abbastanza evidente — 450x.
CGCG 64-100	gx	10h16m58s	+08°39.3'		Leo	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 64-103	gx	10h18m23s	+13°16.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 20" o 30".
CGCG 64-105	gx	10h18m38s	+13°13.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 64-106	gx	10h18m56s	+13°09.4'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo con due stelline a NW e NNW — 450x.
CGCG 65-6	gx	10h21m34s	+11°57.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' S — 450x.
CGCG 65-9	gx	10h21m47s	+12°55.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 65-13	gx	10h23m16s	+13°05.5'		Leo	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 65-16	gx	10h23m23s	+13°05.6'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, appare in visione distolta a 1.5' E dalla precedente, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 65-18	gx	10h23m38s	+13°57.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; due stelle molto luminose sono presenti nel campo: una 3' a W e la SAO 99095 di 8ª grandezza a 4' SW — 450x.
CGCG 65-19	gx	10h23m43s	+12°42.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 65-23	gx	10h24m07s	+13°37.0'		Leo	24"	m. buona / buono	poco più debole di UGC 5627, dalla quale dista 2.5' verso N, allungata da N a S con dimensioni 45"×30", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1' SE (presenza di un falcetto di luna prossimo al tramonto) — 450x.
CGCG 65-24	gx	10h24m22s	+13°40.5'		Leo	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale evidente (presenza di un falcetto di luna prossimo al tramonto) — 450x.
CGCG 65-26	gx	10h24m53s	+09°35.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 65-27	gx	10h25m09s	+13°36.1'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e condensata, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (presenza di un falcetto di luna prossimo al tramonto) — 450x.
CGCG 65-28	gx	10h25m20s	+13°31.3'		Leo	24"	m. buona / buono	poco più estesa di CGCG 65-27, dalla quale dista 5.5' verso SSE; è molto diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme (presenza di un falcetto di luna prossimo al tramonto) — 450x.
CGCG 65-31	gx	10h25m53s	+13°42.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 65-32	gx	10h26m23s	+10°55.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte dell'ammasso **AGC 1016**) — 450x.
CGCG 65-35	gx	10h26m36s	+12°02.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	chiazza oblunga molto debole e di luminosità uniforme orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20", che in visione distolta sembra aggettare una stellina al bordo SW — 450x.
CGCG 65-37	gx	10h27m11s	+10°01.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 65-42	gx	10h27m33s	+09°54.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata sul cateto maggiore di un piccolo triangolo rettangolo molto allungato da NW a SE; questo cateto è costituito da due stelline brillanti) — 450x.
CGCG 65-44	gx	10h28m59s	+12°27.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' SW; coppia di stelline abbastanza brillanti a 1' NNE — 450x.
CGCG 65-48	gx	10h31m31s	+12°29.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a 1.5' verso N e una più brillante e poco più distante a SW — 450x.
CGCG 65-49	gx	10h32m17s	+12°03.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 65-50	gx	10h32m39s	+12°10.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole e molto diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina subito a SE — 450x.
CGCG 65-51	gx	10h32m55s	+12°02.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, piccola e compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 65-52	gx	10h33m10s	+11°53.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e situata in una piccola zona depleta: meglio scalare a 340x; a tratti appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 65-53	gx	10h33m14s	+11°50.6'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso E — 450x.
CGCG 65-54	gx	10h33m27s	+11°50.0'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 65-60	gx	10h35m15s	+11°55.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a SW e una di luminosità simile a 1' verso E — 450x.
CGCG 65-62	gx	10h36m19s	+13°26.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è allineata con due stelline a SSW e una brillante a NE — 450x.
CGCG 65-65	gx	10h36m35s	+13°18.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30-20; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE, ma che di fatto risulta essere PGC 1427906; quest'ultima è allineata ed equidistante con due stelline a W — 450x.
CGCG 65-69	gx	10h37m05s	+12°46.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è una chiazza di luminosità uniforme, molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 65-70	gx	10h37m21s	+13°16.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 65-72	gx	10h37m23s	+12°09.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 65-73	gx	10h24m52s	+10°45.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a a 1.5' NE; 3 stelle brillanti equidistanti poste ad arco si estendono da ENE a S della gx — 450x.
CGCG 65-74	gx	10h38m08s	+10°22.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
CGCG 65-75	gx	10h38m38s	+11°13.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, situata a ridosso N di una stellina, mentre un'altra della stessa luminosità si trova subito a NNE (a prima vista, la gx sembra di fatto come "intrappolata" tra queste due stelline); in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 65-77	gx	10h39m23s	+12°59.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare solo in visione distolta a 450x, a tratti grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 65-78	gx	10h39m45s	+11°38.8'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 65-85	gx	10h41m18s	+13°55.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 66-1	gx	10h43m29s	+12°05.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, a 450x appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso W.
CGCG 66-2	gx	10h43m39s	+12°03.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più debole della precedente, dalla quale dista 2.5' a SE, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso SW — 450x.
CGCG 66-9	gx	10h45m51s	+09°43.3'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 66-10	gx	10h56m11s	+13°17.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 66-17	gx	10h47m54s	+10°53.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; l'orientamento si apprezza meglio scalando a 280x.
CGCG 66-19	gx	10h48m08s	+09°42.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 66-23	gx	10h48m34s	+12°59.0'		Leo	24"	ottima / buono	diffusa, allungata da E a W, dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 66-25	gx	10h48m57s	+12°11.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 66-26	gx	10h48m54s	+14°07.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
CGCG 66-28	gx	10h48m59s	+13°01.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 66-29	gx	10h49m17s	+12°25.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, ma in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline a NE; una coppia di stelline brillanti si trova 1.5' a NW — 450x.
CGCG 66-31	gx	10h49m26s	+12°19.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; allineata ed equidistante con due stelline a ESE (quella più vicina alla gx è molto debole) — 450x.
CGCG 66-34	gx	10h50m21s	+08°44.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; appare facilmente in visione distolta quando si osserva la successiva situata un paio di primi a ENE — 450x.
CGCG 66-35	gx	10h50m30s	+08°45.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 30" — 450x.
CGCG 66-36	gx	10h50m30s	+12°30.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è allineata con una coppia di stelline brillanti a NE — 450x.
CGCG 66-37	gx	10h50m56s	+08°45.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare poco contrastato — 450x.
CGCG 66-46	gx	10h52m01s	+08°47.0'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo S — 450x.
CGCG 66-47	gx	10h51m59s	+08°56.7'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 66-49	gx	10h52m10s	+12°47.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 66-51	gx	10h52m29s	+10°29.3'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; disturbata da una stellina brillante a ridosso N — 450x.
CGCG 66-57	gx	10h53m21s	+12°05.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 66-59	gx	10h54m28s	+09°57.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 66-62	gx	10h54m54s	+10°02.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso E; trapezio irregolare di stelle brillanti a NE — 450x.
CGCG 66-63	gx	10h55m32s	+08°50.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 66-66	gx	10h56m33s	+09°56.0'		Leo	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda, poco diffusa con Ø di una 30-ina di secondi e tenue nucleo stellare — 380x.
CGCG 66-68	gx	10h57m11s	+08°27.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto spampanata, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi situata a ridosso N di una stellina abbastanza brillante che interferisce con l'osservazione — 450x.
CGCG 66-70	gx	10h57m32s	+08°17.9'		Leo	16"	ottima / ottimo	molto e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata a 270x.
CGCG 66-71	gx	10h57m36s	+08°20.4'		Leo	16"	ottima / ottimo	debolissima oggetto rotondo di una 20-ina di secondi che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
CGCG 66-78	gx	10h59m35s	+08°55.6'		Leo	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 495x.
CGCG 66-81	gx	11h00m10s	+10°22.3'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 66-85	gx	11h00m23s	+10°19.4'		Leo	28"	ottima / buono	poco più evidente, diffusa, rotonda con Ø < 30" e appena più brillante all'interno — 495x.
CGCG 66-88	gx	11h00m37s	+11°24.9'		Leo	28"	ottima / buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge evidente quasi stellare — 495x.
CGCG 66-94	gx	11h01m02s	+11°02.8'		Leo	24"	ottima / buono	molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (a 450x ci sono pochissime stelle di riferimento).
CGCG 66-95	gx	11h01m09s	+12°20.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima, ma relativamente compatta, allungata da E a W di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare visibile a tratti.
CGCG 66-96	gx	11h01m11s	+12°28.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, rotonda con Ø di 45", diffusa e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 66-98	gx	11h01m25s	+10°13.8'		Leo	28"	ottima / buono	relativamente facile, anche se con scarsi riferimenti stellari, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 40"×10" e con evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina a 1' SE — 495x.
CGCG 66-100	gx	11h01m46s	+10°19.8'		Leo	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale — 495x.
CGCG 66-101	gx	11h01m56s	+10°17.5'		Leo	28"	ottima / buono	molto debole, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme. Forma una coppia ravvicinata con **MAC 1101+1017** situata a ridosso NE — 495x.
CGCG 66-103	gx	11h02m21s	+10°14.6'		Leo	28"	ottima / buono	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' SE — 495x.
CGCG 66-104	gx	11h02m21s	+08°29.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e appena più brillante all'interno; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso S (la quale fa coppia con un'altra più debole 30" più a SE) — 450x.
CGCG 66-107	gx	11h04m04s	+13°51.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante a ridosso N che offusca un po' la visione — 450x.
CGCG 66-110	gx	11h05m58s	+08°21.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo di aspetto stellare poco contrastato; c'è una doppia stretta a 1.5' verso E — 450x.
CGCG 66-111	gx	11h06m27s	+11°24.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta subito a SW di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 66-114	gx	11h06m51s	+14°12.2'		Leo	28"	ottima / buono	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo quasi stellare evidente — 495x.
CGCG 66-117	gx	11h07m42s	+13°01.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" e nucleo stellare poco contrastato — 450x.
CGCG 66-118	gx	11h07m55s	+13°06.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e nucleo stellare evidente (ma non si tratterà di una stellina sovrapposta?) — 450x.
CGCG 67-6	gx	11h08m01s	+14°06.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; è situata tra 2 deboli stelline a 1.5' verso E e W — 450x.
CGCG 67-7	gx	11h08m09s	+13°02.6'		Leo	24"	m. buona / buono	allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20", poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 67-9	gx	11h08m20s	+10°02.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 67-10	gx	11h08m18s	+13°13.5'		Leo	24"	m. buona / buono	poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 67-11	gx	11h08m22s	+13°51.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debole e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 67-14	gx	11h09m23s	+10°50.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 67-18	gx	11h09m52s	+09°31.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente a 450x.
CGCG 67-22	gx	11h10m25s	+10°07.6'		Leo	28"	ottima / buono	debolissima chiazza approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, situata tra 2 stelline orientate da NNW a SSE — 495x.
CGCG 67-23	gx	11h10m34s	+12°27.2'		Leo	28"	ottima / buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10"; allineata con 2 stelline a SE (la più debole è proprio a ridosso della gx — 495x.
CGCG 67-24	gx	11h10m43s	+10°05.6'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, debole e condensata, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' SE — 495x.
CGCG 67-26	gx	11h10m51s	+10°05.3'		Leo	28"	ottima / buono	situata un paio di primi a E della precedente, è molto piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' W — 495x.
CGCG 67-27	gx	11h10m46s	+11°36.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"×20"; è situata tra due stelline orientate nello stesso modo: una abbastanza brillante a NNW e l'altra debole dalla parte opposta — 450x.
CGCG 68-23	gx	11h40m41s	+12°34.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 68-36	gx	11h42m17s	+14°04.0'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 68-38	gx	11h42m42s	+08°52.4'		Vir	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme con Ø di una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
CGCG 68-42	gx	11h43m23s	+10°48.1'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x a 1.5' NE di una stellina; a tratti sembra molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 30"×10".
CGCG 68-44	gx	11h43m29s	+10°20.7'		Leo	16"	buona / ottimo	lucore molto debole, piccolo, rotondo, diffuso con Ø max di 30" — 270x.
CGCG 68-52	gx	11h44m37s	+10°47.3'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e di dimensioni analoghe a CGCG 68-42 (situata 18' più a W); appare in visione distolta quando si osserva IC 727, dalla quale dista un paio di primi verso E, ma solo a momenti si vede orientata da E a W ed estesa una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 68-56	gx	11h45m30s	+09°43.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare evidente; c'è una stellina a meno di 1' verso N — 400x.
CGCG 68-62	gx	11h46m12s	+10°35.7'		Leo	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
CGCG 68-68	gx	11h48m20s	+12°43.0'		Leo	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; fa parte assieme a CGCG 68-73 del sistema Hickson 59 — 450x.
CGCG 68-73	gx	11h48m32s	+12°42.3'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×15" (situata un paio di primi a SE di IC 736) — 450x.
CGCG 68-76	gx	11h50m42s	+10°31.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 68-77	gx	11h51m10s	+10°38.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	di aspetto a prima vista simile alla precedente, ma è in realtà più compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni anche questa di 30"×10" — 450x.
CGCG 68-81	gx	11h52m36s	+13°11.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"20" — 450x.
CGCG 69-10	gx	11h59m34s	+13°53.2'		Com	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 69-11	gx	11h59m36s	+13°46.7'		Com	24"	buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso S; appare più facilmente di CGCG 69-10 dalla quale dista 6.5' a S — 450x.
CGCG 69-29	gx	12h01m27s	+14°02.1'		Com	16"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø 25" o 30" e leggermente condensata — 380x.
CGCG 69-30	gx	12h05m25s	+12°20.2'		Vir	28"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø < 30", con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 2.5' verso S e una a un paio di primi NNW — 495x.
CGCG 69-33	gx	12h03m28s	+08°22.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 69-34	gx	12h03m36s	+08°23.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina a ridosso N; una coppia di stelline abbastanza brillanti si trova a 1' verso N — 450x.
CGCG 69-48	gx	12h05m36s	+08°59.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø < 30"; appare abbastanza facilmente a 400x, un paio di primi a W di UGC 7085.
CGCG 69-52	gx	12h06m57s	+10°17.0'		Vir	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' SW — 495x.
CGCG 69-57	gx	12h08m03s	+11°14.3'		Vir	28"	ottima / m. buono	piccola, debole, poco diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare evidente — 495x.
CGCG 69-59	gx	12h08m20s	+13°41.0'		Com	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 69-72	gx	12h10m57s	+09°13.2'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni < 30"×15"; c'è una stellina subito a S (la più settentrionale di 3 stelline quasi allineate in direzione N-S) — 495x.
CGCG 69-93	gx	12h14m07s	+13°35.2'		Com	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 69-94	gx	12h14m07s	+14°09.4'		Com	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 69-98	gx	12h14m46s	+13°19.6'		Com	24"	buona / ottimo	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 69-113	gx	12h15m53s	+13°12.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 69-118	gx	12h16m21s	+10°48.2'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 69-120	gx	12h16m34s	+13°01.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 69-136	gx	12h18m07s	+10°53.8'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compattata, con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti a 400x; a 570x si riesce a capire abbastanza facilmente che è orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20".
CGCG 70-15	gx	12h20m10s	+08°38.7'		Vir	24"	buona / ottimo	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni simili a UGC 7383; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 70-16	gx	12h20m19s	+08°32.1'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 70-41	gx	12h23m45s	+09°20.3'		Vir	16"	ottima / ottimo	debolissima, solo a tratti in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; ci sono 2 stelline distanti 1.5' a N e NW — 380x.
CGCG 70-43	gx	12h23m58s	+09°15.2'		Vir	16"	ottima / ottimo	anche questa è debolissima, anche se poco più evidente di CGCG 70-51, precedentemente osservata, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 70-46	gx	12h24m08s	+09°23.0'		Vir	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e leggermente condensata — 380x.
CGCG 70-47	gx	12h24m20s	+09°29.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 119374 di 9ª grandezza situata a 1' NW; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
CGCG 70-51	gx	12h24m18s	+09°20.1'		Vir	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 70-56	gx	12h24m49s	+08°48.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø 30"-35"; c'è una coppia di stelline appena percettibili a 1' S; una stellina abbastanza brillante su trova a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 70-64	gx	12h25m43s	+09°01.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; allineata ed equidistante con due stelline appena percettibili a NE — 450x.
CGCG 70-66	gx	12h25m51s	+08°55.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
CGCG 70-79	gx	12h26m44s	+09°02.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale appena percettibili; equidistante da due stelline, a NW e una debole a S — 450x.
CGCG 70-87	gx	12h26m59s	+08°57.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con nucleo brillante; questo è di fatto il primo che appare, perché la gx è situata a 1' SW della SAO 119402 di 9ª grandezza che tende a cancellarne l'alone; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 450x.
CGCG 70-131	gx	12h30m16s	+08°31.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo N e una appena più debole a ridosso SW — 450x.
CGCG 70-166	gx	12h33m25s	+13°14.0'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, piccola rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 70-179	gx	12h34m43s	+09°00.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N; un'altra più brillante si trova 1.5' a NNE; una terza molto luminosa è situata un paio di primi a W — 450x.
CGCG 70-196	gx	12h37m41s	+08°33.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"×30"; la gx è orientata a perpendicolo con le due stelline brillanti a NNE; meglio contrastata scalando a 340x (presenza di chiarore lunare).
CGCG 70-217	gx	12h41m39s	+12°14.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x anche se si trova tra due stelline abbastanza brillanti (soprattutto quella situata 3' scarsi a N).
CGCG 70-221	gx	12h41m55s	+09°35.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 71-2	gx	12h42m46s	+09°30.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 450x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 71-5	gx	12h42m58s	+10°40.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 1.5' NW di una stellina brillante; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 71-18	gx	12h43m51s	+11°28.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, visibile in visione distolta, ma solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x; si trova a ridosso NE di un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti.
CGCG 71-25	gx	12h44m46s	+09°45.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE (la più meridionale di un piccolo trapezio) — 450x.
CGCG 71-29	gx	12h45m16s	+10°11.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; una stellina appena percettibile sembra lambirne l'alone a NW — 450x.
CGCG 71-33	gx	12h46m05s	+08°28.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a meno di 1' W — 450x.
CGCG 71-42	gx	12h47m44s	+09°53.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
CGCG 71-48	gx	12h48m36s	+10°52.5'		Vir	24"	discreta / ottimo	molto debole, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelle brillanti a WNW con le quali forma un piccolo triangolo isoscele molto allungato — 450x.
CGCG 71-58	gx	12h51m29s	+13°46.9'		Com	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 71-66	gx	12h53m07s	+09°55.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 570x.
CGCG 71-74	gx	12h56m09s	+12°29.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 71-80	gx	12h57m41s	+08°39.9'		Vir	24"	ottima / m. buono	presenta un nucleo stellare brillante e un tenue alone che si stempera rapidamente sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' W e un'altra appena percettibile alla stessa distanza verso SE — 450x.
CGCG 71-81	gx	12h57m58s	+09°14.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30", molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso a N e NW — 450x.
CGCG 71-82	gx	12h58m19s	+13°23.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una coppia di deboli stelline a 1' N — 450x.
CGCG 71-84	gx	12h58m26s	+09°37.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa per ~ 1'; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 71-89	gx	12h58m55s	+09°18.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una tripletta serrata a 1' SW (la componente più a E è appena percettibile) — 450x.
CGCG 71-90	gx	12h56m53s	+13°09.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, grosso modo circolare con Ø di 40"-45"; appare senza problemi in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
CGCG 71-91	gx	12h59m14s	+08°58.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 71-93	gx	13h00m07s	+08°41.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di ~ 30" — 450x.
CGCG 71-96	gx	13h00m33s	+10°07.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 71-98	gx	13h01m05s	+09°45.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 71-106	gx	13h04m53s	+13°14.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a NW — 450x.
CGCG 72-3	gx	13h07m03s	+13°04.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e con nucleo stellare appena percettibile, orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 72-7	gx	13h09m15s	+08°31.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 72-8	gx	13h09m49s	+11°09.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 72-13	gx	13h11m05s	+08°48.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; disturbata dalla SAO 119802 di magnitudo 8.6 situata un paio di primi a W — 450x.
CGCG 72-14	gx	13h11m19s	+10°04.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 72-15	gx	13h11m32s	+08°44.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 72-16	gx	13h11m37s	+10°07.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 72-18	gx	13h11m49s	+10°36.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 72-21	gx	13h12m24s	+08°39.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 72-23	gx	13h12m33s	+11°43.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia sbilanciata a 3' W — 450x.
CGCG 72-36	gx	13h15m22s	+12°54.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	baffo di luce molto tenue orientato da E a W ed esteso una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' NW. Forma una coppia ravvicinata con **MAC 1315+1253** situata 1' scarso a SSE (v. voce corrispondente) — 450x.
CGCG 72-39	gx	13h15m56s	+13°20.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza circolare con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 72-40	gx	13h16m03s	+13°24.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 72-41	gx	13h16m21s	+13°30.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e una condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 72-53	gx	13h21m19s	+12°12.8'		Vir	24"	buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 72-54	gx	13h21m29s	+12°20.3'		Vir	24"	buona / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 450x.
CGCG 72-60	gx	13h23m37s	+13°58.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare chiaramente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o poco più — 450x.
CGCG 72-67	gx	13h24m24s	+13°56.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina evidente a ridosso W; poco disturbata da una stella decisamente più brillante situata 1' a W — 450x.

CGCG 72-79	gx	13h28m42s	+11°36.5'		Vir	24"	buona / buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione stellare poco contrastata; stellina molto debole quasi a ridosso SE; un'altra stellina più brillante si trova subito a N: a prima vista sembra una doppia stretta e sbilanciata, ma osservando attentamente si nota che la compagna è in realtà diffusa; di fatto si tratta di MAC 1328+1137 — 450x.
CGCG 72-86	gx	13h29m15s	+11°12.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione stellare molto tenue — 450x.
CGCG 72-88	gx	13h29m23s	+11°39.5'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, situata a ridosso SW di una stellina brillante che disturba; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 72-105	gx	13h30m19s	+11°30.7'		Vir	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (altresì denominata **CGCG 73-1**) — 450x.
CGCG 73-9	gx	13h34m24s	+09°49.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare molto evidente; c'è una coppia di stelline un paio di primi verso E — 450x.
CGCG 73-12	gx	13h31m48s	+14°07.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 73-14 situata 1' a ENE — molto debole e più piccola della compagna, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
CGCG 73-14	gx	13h31m51s	+14°08.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 73-12 situata 1' a WSW — debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 73-16	gx	13h32m05s	+13°09.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; è situata sul vertice N di un piccolo trapezio regolare orientato all'incirca da N a S formato con 3 stelline: una di queste si trova a 1' SW — 450x.
CGCG 73-17	gx	13h32m14s	+10°24.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 73-19	gx	13h32m30s	+12°49.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 73-23	gx	13h33m05s	+14°12.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' E; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline brillanti, una a 2' SE e l'altra a 2.5' verso S — 450x.
CGCG 73-24	gx	13h33m22s	+09°31.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo luminoso esteso max 30" e orientato da N a S; appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 73-29	gx	13h34m14s	+09°38.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelle brillanti situate 1' a NE e 2' a N; quella a NE, la più luminosa, è la SAO 120009 di 10a grandezza — 450x.
CGCG 73-30	gx	13h34m16s	+10°39.0'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 73-34	gx	13h34m35s	+08°41.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 73-35	gx	13h34m36s	+08°43.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e condensata, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 73-36	gx	13h34m38s	+08°47.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	chiazza rotondeggiante, molto debole e stemperata sul fondo cielo estesa una 40-ina di secondi; c'è una coppia di deboli stelline a un paio di primi N e una 3ª stellina più o meno alla stessa distanza verso E; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 73-46	gx	13h35m49s	+13°25.0'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 73-47	gx	13h35m56s	+13°20.6'		Vir	24"	ottima / buono	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10".
CGCG 73-53	gx	13h37m25s	+09°01.4'		Boo	24"	buona / buono	presenta un nucleo stellare abbastanza brillante circonfuso da un tenue alone circolare con Ø di una 30-ina di secondi e molto stemperato sul fondo cielo — 450x.
CGCG 73-59	gx	13h39m18s	+12°43.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una doppia stretta a 1' W — 450x.
CGCG 73-71	gx	13h46m10s	+09°17.5'		Boo	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 73-72	gx	13h46m50s	+11°37.3'		Boo	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata 1' scarso a E — molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; occorre tenere fuori campo la SAO 100704 di 8ª grandezza situata 4' a E — 450x.
CGCG 73-73	gx	13h46m54s	+11°37.1'		Boo	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con la precedente situata 1' scarso a W — molto debole e piccola, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; occorre tenere fuori campo la SAO 100704 di 8ª grandezza situata 3.5' a E — 450x.
CGCG 73-74	gx	13h47m04s	+11°06.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 73-75	gx	13h47m37s	+09°46.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e relativamente compatta rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 450x.
CGCG 73-77	gx	13h48m06s	+12°04.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; situata subito a E dell'ipotenusa di un piccolo triangolo rettangolo formato da 3 stelline — 450x.
CGCG 73-79	gx	13h49m24s	+08°30.5'		Boo	24"	ottima / buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 450x.
CGCG 73-83	gx	13h51m01s	+13°46.4'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una doppia stretta sbilanciata e brillante un paio di primi a SE — 450x.
CGCG 73-86	gx	13h51m33s	+14°06.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina molto debole a 1' W — 450x.
CGCG 73-90	gx	13h52m11s	+14°00.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a N — 450x.
CGCG 73-91	gx	13h52m20s	+13°34.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 74-12	gx	13h57m01s	+10°52.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; poco meglio definita scalando a 340x.
CGCG 74-13	gx	13h56m55s	+14°08.5'		Boo	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 74-14	gx	13h57m14s	+11°59.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 380x.
CGCG 74-16	gx	13h57m19s	+11°58.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma osservabile senza problemi in visione distolta a 380x, rotonda, diffusa con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 74-19	gx	13h57m59s	+10°42.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø < 30" — 450x.
CGCG 74-20	gx	13h58m22s	+08°15.3'		Boo	24"	buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione stellare — 450x.
CGCG 74-21	gx	13h58m36s	+11°57.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 74-22	gx	13h58m36s	+13°29.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina brillante a 1' NE — 450x.
CGCG 74-24	gx	13h58m42s	+13°27.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 74-25	gx	13h59m20s	+10°08.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 74-26	gx	13h59m11s	+13°29.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-12"; situata 1' scarso a E di una stellina abbastanza brillante; meglio evidente a 450x.
CGCG 74-28	gx	13h59m43s	+12°44.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso SW — 450x.
CGCG 74-29	gx	13h59m55s	+12°03.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 74-30	gx	14h00m24s	+12°06.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 74-33	gx	14h00m20s	+12°57.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, un poco disturbata da una stellina brillante a ridosso di NW, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 74-35	gx	14h00m31s	+08°39.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' E di una stellina abbastanza brillante, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 74-36	gx	14h00m31s	+08°54.0'		Boo	24"	buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 74-38	gx	14h01m09s	+08°35.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con piccolo bulge evidente quasi stellare — 450x.
CGCG 74-39	gx	14h01m18s	+10°07.1'		Boo	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
CGCG 74-43	gx	14h01m44s	+09°52.1'		Boo	16"	m. buona / discreto	abbastanza facile, piccola, compatta approssim. circolare, Ø max 20"30", situata una 40-ina di secondi S di una stellina brillante — 270x.
CGCG 74-45	gx	14h01m52s	+08°47.2'		Boo	24"	buona / buono	relativamente facile, rotonda con Ø > 30", poco diffusa e appena più brillante all'interno; c'è una stella brillante un paio di primi a SE — 400x.
CGCG 74-54	gx	14h02m26s	+10°24.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 74-58	gx	14h02m42s	+09°20.8'		Boo	16"	buona / discreto	facile da vedere, piccola, abbastanza compatta, estesa max 20"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi a nord — 270x.
CGCG 74-61	gx	14h02m54s	+08°53.5'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 74-62	gx	14h02m55s	+09°21.0'		Boo	16"	buona / discreto	molto debole e diffusa, osservabile in visione distolta ed estesa ~ 30" — 270x.
CGCG 74-64	gx	14h03m04s	+08°56.9'		Boo	24"	ottima / buono	rotonda con Ø < 40", poco diffusa e appena più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 74-66	gx	14h03m13s	+08°53.7'		Boo	24"	ottima / buono	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25" e con nucleo stellare appena percettibile a 340x (a 450x sembra di aspetto più uniforme); c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
CGCG 74-69	gx	14h03m31s	+09°13.2'		Boo	24"	ottima / buono	relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' scarso verso E — 450x.
CGCG 74-76	gx	14h04m12s	+12°42.4'		Boo	24"	buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata dalla SAO 100833 di 7ª situata a poco più di 4' NNW e che a mala pena si riesce a tenere fuori campo a 400x.
CGCG 74-77	gx	14h04m09s	+13°04.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1.5' SE — 450x.
CGCG 74-78	gx	14h04m21s	+12°01.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale — 450x.
CGCG 74-80	gx	14h04m37s	+10°58.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare visibile però solo a momenti, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 450x.
CGCG 74-81	gx	14h04m38s	+11°38.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø < 30" e poco più brillante all'interno — 450x.
CGCG 74-82	gx	14h04m47s	+08°20.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 74-86	gx	14h04m49s	+11°23.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo molto brillante, quasi stellare (simile a un nucleo cometario) circonfuso da un tenue alone rotondo molto stemperato con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 74-88	gx	14h04m55s	+12°42.3'		Boo	24"	buona / buono	molto piccola, brillante e condensata, di aspetto quasi stellare a 200x; a 570x appare a tratti poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15".
CGCG 74-96	gx	14h05m36s	+08°55.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 74-97	gx	14h05m34s	+11°50.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; occorre tuttavia scalare a 340x, perché a 450x il campo è virtualmente depleto e si fatica ad arrivare sul bersaglio.
CGCG 74-101	gx	14h06m01s	+12°47.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 74-103	gx	14h06m06s	+11°47.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 74-107	gx	14h07m00s	+10°27.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 74-109	gx	14h07m00s	+13°00.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 74-111 situata 1' più a E — appaiono facilmente in visione distolta a 450x: la 1ª è poco allungata da N a S, di dimensioni 20"×15" e con condensazione centrale appena percettibile; la 2ª è rotonda, poco diffusa e di luminosità uniforme.
CGCG 74-111	gx	14h07m05s	+13°00.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	v. **CGCG 74-109**
CGCG 74-112	gx	14h07m08s	+12°35.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15", molto stemperata alle estremità del fuso e con nucleo stellare; è situata a ridosso NE di un piccolo asterismo di 4 stelle fatto a "Y": la componente centrale è la più luminosa — 450x.
CGCG 74-113	gx	14h07m18s	+12°53.2'		Boo	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 74-117	gx	14h08m34s	+09°02.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 74-122	gx	14h09m22s	+08°54.4'		Boo	24"	buona / buono	debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
CGCG 74-124	gx	14h09m47s	+11°35.1'		Boo	24"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
CGCG 74-125	gx	14h09m50s	+10°57.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina al margine SW e un'altra della stessa luminosità a 1' W (sono messe a perpendicolo con la gx) — 450x.
CGCG 74-126	gx	14h10m04s	+10°09.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline brillanti a SE — 450x.
CGCG 74-128	gx	14h10m44s	+08°59.8'		Boo	24"	buona / buono	relativamente compatta, poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 400x.
CGCG 74-129	gx	14h10m41s	+13°33.5'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale abbastanza brillante evidente; c'è una stellina a 1' E — 450x.
CGCG 74-131	gx	14h11m34s	+08°21.4'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 74-132	gx	14h11m36s	+08°48.6'		Boo	24"	buona / buono	poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20", diffusa e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 74-135	gx	14h12m21s	+08°30.5'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", con tenue bulge diffuso e poco contrastato; c'è una stellina a 1' W — 450x.
CGCG 74-136	gx	14h12m30s	+08°38.9'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole e relativamente compatta, leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 74-140	gx	14h12m58s	+09°56.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso S; una doppia stretta con componenti un poco sbilanciate si trova a 1.5' NW; il campo è un po' disturbato dalla SAO 100914 di 8ª grandezza situata 4.5 a SSW la quale possiede una compagna di 12-esima subito a S — 450x.
CGCG 74-141	gx	14h13m05s	+08°37.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; situata 1' a NW di NGC 5511 — 450x.
CGCG 74-143	gx	14h13m20s	+08°51.0'		Boo	24"	buona / buono	presenta una condensazione centrale evidente e un tenue alone rotondo molto diffuso, esteso 45"-50" e che a 400x appare a tratti screziato.
CGCG 74-144	gx	14h13m12s	+13°00.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima, rotonda con Ø di 1' scarso; è osservabile solo in visione distolta a 270x.
CGCG 74-145	gx	14h13m27s	+08°58.9'		Boo	24"	buona / buono	è una lama di luce molto tenue e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE ed estesa 1' scarso — 400x.
CGCG 74-147	gx	14h14m00s	+09°46.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 74-148	gx	14h14m16s	+10°35.0'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 74-152	gx	14h15m46s	+10°26.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 74-159	gx	14h17m40s	+12°57.5'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 75-30	gx	14h26m18s	+12°21.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 75-34	gx	14h26m58s	+12°53.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa e appena più luminosa all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 75-35	gx	14h27m15s	+11°20.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" — 380x.
CGCG 75-37	gx	14h27m35s	+11°19.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina sul prolungamento dell'asse verso SSE — 380x.
CGCG 75-40	gx	14h27m49s	+12°56.0'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, salta fuori facilmente in visione distolta in una piccola zona depleta, allungata da E a W con dimensioni 15"×10"; poco meglio evidente spingendo a 580x.
CGCG 75-41	gx	14h28m01s	+11°41.4'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 75-43	gx	14h28m21s	+11°21.6'		Boo	16"	buona / m. buono	debolissima, appare a tratti a ridosso verso W di una stellina brillante di 10a grandezza — 270x.
CGCG 75-44	gx	14h28m22s	+11°25.1'		Boo	16"	ottima / ottimo	poco diffusa e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso N e un'altra poco più distante a NE — 380x.
CGCG 75-47	gx	14h28m39s	+10°12.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, situata in una piccola zona depleta; in visione distolta appare rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
CGCG 75-48	gx	14h28m41s	+11°22.1'		Boo	16"	buona / m. buono	debole, di luminosità uniforme, approssim. circolare, diffusa con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
CGCG 75-49	gx	14h28m38s	+13°28.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 75-56	gx	14h29m51s	+13°48.0'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 75-61	gx	14h31m52s	+08°56.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 75-62	gx	14h31m56s	+08°38.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N — 450x.
CGCG 75-63	gx	14h32m21s	+09°56.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 75-73	gx	14h34m11s	+12°41.5'		Boo	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; la gx è più debole della successiva (osservata per prima) e dalla quale dista 1' verso S — 450x.
CGCG 75-74	gx	14h34m12s	+12°42.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a 1.5' W — 450x.
CGCG 75-76	gx	14h34m31s	+09°46.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; è disturbata dalla SAO 101084 di 9ª grandezza situata 4' a NW — 450x.
CGCG 75-77	gx	14h34m42s	+09°49.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	di aspetto e dimensione simile alla precedente, dalla quale dista 4' a NE, nonché anche questa disturbata dalla SAO 101087 di 8ª grandezza situata 5' a NE — 450x.
CGCG 75-81	gx	14h35m24s	+09°27.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N — 450x.
CGCG 75-86	gx	14h36m27s	+08°44.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luce orientata da N a S estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta a SSW di una debole stellina, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 75-87	gx	14h36m29s	+09°56.3'		Boo	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 75-88	gx	14h36m30s	+11°23.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella brillante a 1.5' verso S e una debole a 1' N — 450x.
CGCG 75-89	gx	14h36m42s	+09°55.7'		Boo	24"	buona / buono	poco più evidente di CGCG 75-87, dalla quale dista 3' verso E, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 400x.
CGCG 75-94	gx	14h37m20s	+09°59.4'		Boo	24"	buona / buono	meno diffusa e più piccola di UGC 9411, dalla quale dista 1.5' verso E, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 400x.
CGCG 75-98	gx	14h38m15s	+11°33.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 75-102	gx	14h38m58s	+09°23.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; poco meglio visibile spingendo a 580x.
CGCG 75-104	gx	14h39m27s	+11°55.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; sembra a tratti "sfrangiata" nella parte esterna, come se presentasse elusive strutture irrisolte; la visione tuttavia non cambia spingendo a 580x.
CGCG 75-106	gx	14h40m23s	+09°28.6'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima, probabilmente rotonda con Ø di ~ 20"; appare in visione distolta a 400x quando si posa lo sguardo sulla doppia strettissima situata un paio di primi a SW.
CGCG 75-108	gx	14h40m46s	+08°27.1'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile però solo a momenti; allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' N e una doppia sbilanciata abbastanza larga a 1' SE — 450x.
CGCG 75-110	gx	14h41m20s	+10°47.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 40" e una piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 75-112	gx	14h41m55s	+09°23.0'		Boo	24"	buona / ottimo	relativamente compatta, piccola e condensata, rotonda con Ø simile a CGCG 75-106 — 400x.
CGCG 75-117	gx	14h42m13s	+08°40.7'		Boo	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 75-118	gx	14h42m17s	+08°59.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 75-119	gx	14h42m21s	+08°59.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente ed estesa di CGCG 75-118, dalla quale dista sì e no 1' verso E, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 76-3	gx	14h42m46s	+08°43.6'		Boo	24"	buona / ottimo	rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 76-4	gx	14h42m49s	+08°47.7'		Boo	24"	buona / ottimo	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-5	gx	14h42m51s	+08°45.6'		Boo	24"	buona / ottimo	diffusa, anche questa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, ma con condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 76-9	gx	14h43m41s	+11°13.2'		Boo	16"	buona / m. buono	debolissimo oggetto visibile con una certa difficoltà; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 270x.
CGCG 76-10	gx	14h43m50s	+11°36.6'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-11	gx	14h43m54s	+09°30.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-12	gx	14h44m06s	+09°16.8'		Boo	24"	buona / ottimo	debole e molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-14	gx	14h44m34s	+08°56.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; disturbata da una stella brillante situata 1' a W — 450x.
CGCG 76-16	gx	14h45m10s	+09°16.5'		Boo	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-21	gx	14h45m58s	+10°48.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 15" o 20".
CGCG 76-23	gx	14h46m12s	+10°23.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 76-24	gx	14h46m20s	+10°31.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e disturbata da una stellina brillante subito a W; in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; forma una coppia ravvicinata con MAC 1446+1031, situata a ridosso N, che appare elusivamente come un baffo orientato da E a W esteso sì e no 20"; tuttavia, anche a 580x le due gx si separano con gran difficoltà e solo a momenti.
CGCG 76-25	gx	14h46m28s	+11°30.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta, rotonda, di 20"-25" di Ø e con tenue nucleo stellare osservabile a 380x.
CGCG 76-27	gx	14h26m47s	+13°35.3'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a SE — 450x.
CGCG 76-32	gx	14h46m46s	+11°34.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 76-33	gx	14h46m54s	+11°37.6'		Boo	16"	ottima / ottimo	di aspetto e dimensioni del tutto simili a CGCG 76-32; sono entrambe facilmente osservabile anche in visione diretta a 380x.
CGCG 76-34	gx	14h46m50s	+13°50.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-35	gx	14h47m03s	+09°39.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta al vertice più occidentale di un piccolo triangolo equilatero formato con 2 stelline, a E e a S — 450x.
CGCG 76-37	gx	14h47m07s	+11°00.0'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
CGCG 76-40	gx	14h47m11s	+11°35.1'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, condensata, forse rotonda con Ø di max 15" o 20" — 380x.
CGCG 76-41	gx	14h47m07s	+12°26.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 76-42	gx	14h47m14s	+13°24.0'		Boo	24"	ottima / buono	piccola e relativamente compatta, approssim. circolare con Ø di una 20-ina e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 76-43	gx	14h47m08s	+13°39.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione stellare — 450x.
CGCG 76-49	gx	14h47m36s	+10°24.1'		Boo	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-50	gx	14h47m43s	+09°32.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e compatta, con tenue condensazione centrale quasi stellare, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 76-53	gx	14h47m54s	+13°39.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 76-57	gx	14h48m18s	+13°58.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 76-58	gx	14h48m30s	+10°16.4'		Boo	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 76-65	gx	14h49m08s	+10°58.8'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 76-66	gx	14h49m11s	+11°06.9'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20", ma è meglio scalare a 340x.
CGCG 76-68	gx	14h49m35s	+11°14.9'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti al margine SW — 450x.
CGCG 76-69	gx	14h49m34s	+13°48.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø < 20"; quasi equidistante con una coppia di stelline situate a N e NNE — 450x.
CGCG 76-71	gx	14h50m33s	+09°37.7'		Boo	24"	m. buona / buono	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-73	gx	14h50m41s	+09°30.5'		Boo	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 20"-25" e una condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 76-77	gx	14h51m24s	+09°35.5'		Boo	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x.
CGCG 76-78	gx	14h51m34s	+10°44.1'		Boo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 76-79	gx	14h51m42s	+08°34.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 76-80	gx	14h52m16s	+12°17.3'		Boo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-84	gx	14h52m56s	+12°44.5'		Boo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 76-91	gx	14h54m06s	+12°29.6'		Boo	24"	ottima / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×10" — 450x.
CGCG 76-92	gx	14h54m31s	+10°18.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	assieme a CGCG 76-93 forma una coppia di galassiette molto deboli, di luminosità uniforme e di aspetto simile, approssim. circolari con Ø < 30"; sono separate da meno di 1' in direzione NW-SE; anche variando gli ingrandimenti appaiono sempre della stessa luminosità — 450x.
CGCG 76-93	gx	14h54m32s	+10°18.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 76-92**
CGCG 76-94	gx	14h54m58s	+11°41.9'		Boo	24"	ottima / m. buono	poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente; allineata con due stelline a NW — 450x.
CGCG 76-95	gx	14h55m03s	+09°36.6'		Boo	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole, orientata da N a S ed estesa 1' scarso — 450x.
CGCG 76-97	gx	14h55m29s	+08°48.5'		Boo	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 76-98	gx	14h55m42s	+09°35.2'		Boo	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un piccolo asterismo triangolare di stelline brillanti a 4.5' SW (il vertice di SE è occupato da una doppia stretta) — 450x.
CGCG 76-100	gx	14h55m56s	+11°52.5'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta a 380x quando si fissa lo sguardo su NGC 5782 (situata 1' scarso a SSW); è piccola, estesa max 30".
CGCG 76-105	gx	14h57m00s	+09°44.6'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 76-106	gx	14h57m12s	+11°50.4'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare relativamente compatta e molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10" — 450x.
CGCG 76-107	gx	14h57m18s	+11°40.1'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, di aspetto a prima vista un po' confuso; a tratti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina evidente al bordo S — 450x.
CGCG 76-108	gx	14h57m14s	+14°17.0'		Boo	24"	buona / ottimo	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 76-109	gx	14h57m23s	+14°17.4'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' E — 450x.
CGCG 76-111	gx	14h57m31s	+08°23.5'		Boo	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; situata tra due stelline di luminosità diseguale e orientate nello stesso modo (quella a NW è più brillante) — 450x.
CGCG 76-112	gx	14h57m38s	+09°08.8'		Boo	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
CGCG 76-117	gx	14h58m04s	+11°33.7'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina percettibile solo a momenti al margine S; situata tra 2 stelline distanti 4' e orientate da NNW a SSE — 450x.
CGCG 76-118	gx	14h58m43s	+11°37.8'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; è situata al vertice occidentale di un piccolo triangolo equilatero formato con due stelline a NE e SE — 450x.
CGCG 76-119	gx	14h58m56s	+11°39.0'		Boo	24"	buona / ottimo	piccola e debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 76-121	gx	14h59m38s	+13°13.3'		Boo	24"	ottima / buono	assieme a CGCG 76-122 forma una coppia di gx distanti meno di 1' in direzione N-S, sono di aspetto simile, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi; la 1ª presenta una tenue condensazione centrale, mentre la 2ª è più uniforme — 450x.
CGCG 76-122	gx	14h59m37s	+13°13.7'		Boo	24"	ottima / buono	v. **CGCG 76-121**
CGCG 76-125	gx	15h00m18s	+11°20.6'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e di aspetto un po' confuso, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 76-132	gx	15h01m35s	+08°56.8'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 76-133	gx	15h01m39s	+10°25.2'		Boo	24"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale quasi stellare poco contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante a ~ 30" SW — 450x.
CGCG 76-136	gx	15h02m16s	+11°55.1'		Boo	24"	ottima / m. buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una doppia stretta a un paio di primi ESE — 450x.
CGCG 76-137	gx	15h02m24s	+11°12.4'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x anche se così diventa impossibile tenere fuori campo la SAO 101338 di 8ª grandezza situata 5.5' a SW.
CGCG 76-140	gx	15h03m28s	+10°36.0'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 570x.
CGCG 76-142	gx	15h04m33s	+11°29.3'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 20"-25"; meglio comunque non scalare a causa di una stellina brillante situata a 1' SW — 450x.
CGCG 76-143	gx	15h04m37s	+10°24.0'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a 1.5' NNE — 450x.
CGCG 76-145	gx	15h05m14s	+08°47.8'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e situata in una piccola plaga depleta, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e appena più brillante all'interno; due stelline appena percettibili si trovano a 1' N e NE — 450x.
CGCG 76-148	gx	15h06m02s	+08°47.5'		Boo	24"	buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; due elusive stelline percettibili solo a momenti si trovano a ridosso S ed E, ma sono talmente deboli che tendono a "impastarsi" con la gx — 450x.
CGCG 76-149	gx	15h05m56s	+12°44.1'		Boo	24"	ottima / buono	assieme a CGCG 76-150 forma una coppia di gx di aspetto simile, distanti 1' in direzione N-S, orientate tra loro a perpendicolo di dimensioni 30"×15" ed entrambe con condensazione centrale: quella della 1ª è di aspetto stellare — 450x.
CGCG 76-150	gx	15h05m55s	+12°44.7'		Boo	24"	ottima / buono	v. **CGCG 76-149**
CGCG 76-152	gx	15h06m23s	+09°03.0'		Boo	24"	buona / ottimo	è una piccola chiazza circolare con Ø < 30" molto debole, diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 77-6	gx	15h06m42s	+12°40.6'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; è allineata ed equidistante con 2 stelline situate a SE — 400x.
CGCG 77-7	gx	15h06m46s	+12°51.0'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole, si vede facilmente in visione distolta, ma solo a momenti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 77-9	gx	15h07m01s	+09°03.6'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima, forse rotonda con Ø < 30"; appare tutto sommato abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre tenere fuori campo la SAO 120847 di 7ª grandezza situata 7.5' a SE — 450x.
CGCG 77-11	gx	15h07m10s	+09°38.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 77-12	gx	15h07m17s	+10°36.2'		Boo	24"	buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di deboli stelline a S; è disturbata dalla SAO 101377 di 7ª grandezza situata 4.5' a S — 450x.
CGCG 77-16	gx	15h07m58s	+13°52.6'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 77-17	gx	15h08m12s	+10°16.7'		Boo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; situata all'interno di un triangolo molto allungato di stelle molto brillanti che disturbano un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 77-18	gx	15h08m31s	+10°11.8'		Boo	24"	ottima / m. buono	molto debole e molto disturbata da una coppia di stelle molto brillanti (SAO 101394 e SAO 101399 di 7ª grandezza) situate 5' più a S; in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 77-20	gx	15h08m55s	+10°48.2'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 77-24	gx	15h09m57s	+09°23.2'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata all'incirca da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 77-25	gx	15h09m53s	+13°15.4'		Boo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina visibile solo a momenti quasi a ridosso NE — 450x.
CGCG 77-26	gx	15h10m05s	+09°43.9'		Boo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.

CGCG 77-27	gx	15h10m33s	+08°35.5'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso N (fa parte di un asterismo irregolare di 5 stelline orientato da N a S) — 450x.
CGCG 77-28	gx	15h10m35s	+13°27.5'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a W (che è la meno brillante di un piccolo triangolo isoscele molto aperto) — 450x.
CGCG 77-32	gx	15h11m13s	+10°27.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con UGC 9755 situata subito a S e si distinguono facilmente anche a 340x; sono entrambe di luminosità pressoché uniforme; la CGCG è molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10", la UGC è poco più diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 77-33	gx	15h11m25s	+09°13.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 77-36	gx	15h11m34s	+09°28.4'		Ser	24"	ottima / buono	più facile della successiva, osservata per prima e dalla quale dista 8' verso S, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 77-37	gx	15h11m33s	+09°36.7'		Ser	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x; è situata tra 2 deboli stelline orientate da N a S e distanti un paio di primi.
CGCG 77-41	gx	15h12m14s	+10°55.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a E — 450x.
CGCG 77-42	gx	15h12m21s	+09°21.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima e stemperata sul fondo cielo, a tratti appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1.5' WSW — 450x.
CGCG 77-44	gx	15h12m32s	+12°49.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a 1' scarso SW e una appena percettibile subito a N — 450x.
CGCG 77-45	gx	15h13m21s	+09°18.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 77-46	gx	15h14m15s	+12°05.2'		Ser	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con tenue nucleo stellare — 450x.
CGCG 77-47	gx	15h14m12s	+13°53.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 1' NE di una stellina molto debole, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 77-49	gx	15h14m36s	+08°20.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 40"×20" e con nucleo quasi stellare evidente; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 77-50	gx	15h15m02s	+12°02.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 77-55	gx	15h16m11s	+12°44.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 77-56	gx	15h16m32s	+12°45.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 77-59	gx	15h17m01s	+13°06.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso E che a prima vista sembra allungarne la forma — 450x.
CGCG 77-60	gx	15h17m13s	+11°53.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 77-61	gx	15h17m22s	+13°10.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	nella posizione indicata si trova una stellina abbastanza brillante circonfusa da un piccolo alone estremamente tenue; solo forzando a 580x si nota che l'alone tende ad aggettare leggermente verso SE.
CGCG 77-63	gx	15h17m57s	+12°57.8'		Ser	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' verso S — 400x.
CGCG 77-64	gx	15h18m00s	+13°31.6'		Ser	24"	buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×30" — 450x.
CGCG 77-67	gx	15h18m23s	+12°11.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 77-68	gx	15h18m26s	+12°56.3'		Ser	24"	ottima / ottimo	assieme a CGCG 77-69 forma una coppia di gx di dimensioni simili, ossia 45"×30", ma di aspetto diverso: la 1ª è orientata da NE a SW e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenue nucleo visibile a tratti; la 2ª è più brillante, orientata a perpendicolo e con evidente condensazione centrale — 400x.
CGCG 77-69	gx	15h18m26s	+12°56.3'		Ser	24"	ottima / ottimo	v. **CGCG 77-68**
CGCG 77-70	gx	15h19m07s	+09°46.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 450x, solo a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è un piccolo rettangolo di deboli stelline a 1.5' SW.
CGCG 77-74	gx	15h19m33s	+09°47.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, poco allungata da N a S, dimensioni 50"×40" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 77-75	gx	15h20m07s	+11°52.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con MAC 1520+1152 situata a ridosso NE; si separano con difficoltà a 450x, anche perché la MAC è debolissima e molto piccola; la principale è molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15".
CGCG 77-78	gx	15h20m32s	+11°59.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' SE e una percettibile solo a momenti a ridosso NW — 450x.
CGCG 77-80	gx	15h20m53s	+08°23.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue bulge appena percettibile; situata tra 2 stelline distanti 1' in direzione NNE-SSW: quella a NNE è più brillante — 450x.
CGCG 77-83	gx	15h21m37s	+11°15.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, a tratti pare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina a 1' SE e una brillante a un paio di primi verso W — 450x.
CGCG 77-87	gx	15h21m54s	+13°14.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
CGCG 77-88	gx	15h22m08s	+13°55.7'		Ser	24"	buona / m. buono	molto diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline: 1' a SW e e un paio di primi a S — 450x.
CGCG 77-92	gx	15h22m48s	+08°43.1'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso AGC 2063 — appare solo a momenti, rotonda con Ø di ~ 30" e nucleo stellare; meglio osservabile a 270x.
CGCG 77-93	gx	15h22m53s	+08°44.7'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2063** — piccola e debolissima, estesa max 20" di Ø, situata a ridosso NE di una debole stellina — 380x.
CGCG 77-97	gx	15h23m05s	+08°36.5'		Ser	16"	ottima / ottimo	è la più evidente dell'ammasso AGC 2063 — diffusa, rotonda con Ø di 45" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina percettibile a tratti a ridosso NW — 380x.
CGCG 77-98	gx	15h23m00s	+08°45.3'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2063** — poco più evidente di CGCG 77-93, e di dimensione simile; c'è una stellina a 1' SW e un'altra più debole 1' a E — 380x.
CGCG 77-99	gx	15h23m09s	+08°31.0'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2063** — assieme a CGCG 77-100 forma una coppia di oggetti molto piccoli, di 15"-20" di Ø dotati di nucleo stellare — 380x.
CGCG 77-100	gx	15h23m07s	+08°31.7'		Ser	16"	ottima / ottimo	v. **CGCG 77-99**
CGCG 77-101	gx	15h23m05s	+11°14.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 77-102	gx	15h23m12s	+08°33.0'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2063** — debolissima, appare solo a tratti in visione distolta a poco più di 1' N di una stellina; è estesa una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 77-103	gx	15h23m15s	+08°34.4'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2063** — appena più evidente di CGCG 77-104, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è estesa anche questa ~ 20".
CGCG 77-104	gx	15h23m11s	+08°38.1'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2063** — debolissima e molto piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 380x.
CGCG 77-105	gx	15h23m14s	+08°38.7'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2063** — è appena più evidente, con dimensione e luminosità simili; la stella stellina si trova stavolta a 40" NW — 380x.
CGCG 77-106	gx	15h23m16s	+08°44.9'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2063** — debolissima, probabilmente rotonda con Ø max 20"; appare solo a tratti in visione distolta quasi a ridosso NE di una stellina [non sono riuscito a vedere CGCG 77-108 situata 2' SE] — 380x.
CGCG 77-107	gx	15h23m20s	+08°37.1'		Ser	16"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2063** — debolissima, a tratti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni ~ 30"×20"; meglio osservabile a 270x.
CGCG 77-110	gx	15h23m35s	+09°20.8'		Ser	24"	ottima / ottimo	poco allungata da NE a SW, con dimensioni 40"×30" e nucleo stellare — 400x.
CGCG 77-111	gx	15h23m27s	+13°34.8'		Ser	24"	ottima / buono	appare più sottile e poco meglio definita di di CGCG 77-118 (osservata per prima e situata 10' più a E), anche se di dimensioni e orientamento analoghi — 450x.
CGCG 77-116	gx	15h23m44s	+09°22.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, di luminosità uniforme, a tratti allungata da NW a SE (ossia grosso modo a perpendicolo con la precedente) e con dimensioni 20"×10" — 400x.
CGCG 77-118	gx	15h24m08s	+13°25.6'		Ser	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1.5' SSE — 450x.
CGCG 77-119	gx	15h24m30s	+08°22.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 77-120	gx	15h24m51s	+08°25.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	poco più evidente e uniforme della precedente, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 77-123	gx	15h25m09s	+12°53.0'		Ser	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 20"-25" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1.5' verso S; un piccolo asterismo di 6 stelline (quella più settentrionale è brillante) a 4' NW — 450x.
CGCG 77-124	gx	15h25m23s	+09°43.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; situata fra tre stelle brillanti poste ad arco a W e una coppia altrettanto brillante a E; queste si riescono a tenere solo parzialmente fuori campo a 450x.
CGCG 77-125	gx	15h25m21s	+13°43.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 77-128	gx	15h26m17s	+08°34.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 77-129	gx	15h26m22s	+09°23.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 77-130	gx	15h26m29s	+08°35.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e tenue nucleo stellare — 450x.
CGCG 77-133	gx	15h28m21s	+13°40.6'		Ser	24"	ottima / buono	piccola e debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 77-134	gx	15h28m51s	+13°26.1'		Ser	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina subito a N e una brillante a 1.5' verso NW — 450x.
CGCG 77-135	gx	15h29m22s	+09°05.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 78-8	gx	15h33m37s	+08°25.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; forse rotonda con Ø di 12"-15".
CGCG 78-12	gx	15h34m34s	+08°21.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 78-15	gx	15h34m42s	+10°18.0'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una decina di secondi; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 78-24	gx	15h35m56s	+08°44.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 78-25	gx	15h36m05s	+09°44.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è un asterismo di 7 stelline brillanti aperto a ventaglio subito a SE della gx — 450x.
CGCG 78-31	gx	15h37m28s	+13°10.1'		Ser	24"	ottima / buono	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, con una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 78-43	gx	15h39m51s	+14°11.2'		Ser	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 78-47	gx	15h40m53s	+09°45.0'		Ser	16"	buona / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 380x.
CGCG 78-49	gx	15h41m50s	+10°03.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' W — 450x.
CGCG 78-59	gx	15h44m45s	+08°59.8'		Ser	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a W, a tratti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni di 20"×10" o poco più — 450x.
CGCG 78-60	gx	15h44m42s	+11°29.5'		Ser	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata dalla SAO 101711 di 7ª grandezza a 4' SSW e un po' meno dalla SAO 101715 di 9ª situata 5' a ESE — 450x.
CGCG 78-61	gx	15h45m39s	+09°03.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE e una abbastanza brillante a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 78-62	gx	15h45m46s	+09°04.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa 45" e orientata da E a W; appare facilmente in visione distolta a 450x.
CGCG 78-64	gx	15h46m09s	+08°47.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 78-67	gx	15h46m32s	+12°08.6'		Ser	24"	ottima / buono	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 78-68	gx	15h46m54s	+11°47.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
CGCG 78-71	gx	15h47m21s	+10°47.1'		Ser	24"	m. buona / discreto	debolissimo oggetto molto piccolo, forse rotondo che nondimeno appare facilmente in visione distolta a 450x; non è più esteso di 15".
CGCG 78-79	gx	15h48m56s	+08°50.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina al bordo N — 450x.
CGCG 78-80	gx	15h49m29s	+11°56.1'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 78-84	gx	15h51m04s	+09°44.0'		Ser	24"	ottima / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti grosso modo rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una coppia fortemente sbilanciata di stelline subito a SE; un'altra stellina si trova a 1' verso N — 450x.
CGCG 78-86	gx	15h51m16s	+11°48.4'		Ser	24"	ottima / buono	debolissima macchiolina forse rotonda con Ø, estesa sì e no 15" e situata subito a E di una coppia di deboli stelline; altre 2 stelline appena percettibili si trovano a S e SE — 450x.
CGCG 78-90	gx	15h51m45s	+12°44.5'		Ser	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa di luminosità uniforme allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; situata tra 2 stelline orientate nella stessa direzione e distanti 2.5' — 450x.
CGCG 79-3	gx	15h54m48s	+10°52.3'		Ser	24"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, estesa sì e no una 10-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 79-4	gx	15h55m04s	+10°57.8'		Ser	24"	ottima / buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; è situata tra due stelline brillanti (ossia sul lato orientale di una losanga di orientata anche lei da N a S) — 450x.
CGCG 79-6	gx	15h55m15s	+10°31.3'		Ser	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
CGCG 79-8	gx	15h55m47s	+11°37.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 79-9	gx	15h55m53s	+11°58.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 79-11	gx	15h56m26s	+09°03.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con tenue condensazione stellare, a 450x appare orientata da E a W con dimensioni 20"×15".
CGCG 79-12	gx	15h56m44s	+14°00.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a 1' verso N; meglio evidente restando a 450x.
CGCG 79-13	gx	15h56m54s	+14°07.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 79-16	gx	15h58m48s	+14°12.2'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' SSW — 450x.
CGCG 79-18	gx	15h59m30s	+09°49.0'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 79-19	gx	16h00m55s	+12°40.9'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso NE e un'altra più debole circa alla stessa distanza verso NW — 450x.
CGCG 79-22	gx	16h01m36s	+12°21.6'		Ser	24"	ottima / buono	relativamente compatta e facile, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20" — 340x.
CGCG 79-27	gx	16h02m35s	+13°56.5'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensata — 450x.
CGCG 79-28	gx	16h02m49s	+12°39.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con bulge evidente anche se poco contrastato — 450x.
CGCG 79-29	gx	16h03m32s	+13°56.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole e poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 79-31	gx	16h04m15s	+11°12.2'		Ser	24"	buona / ottimo	ancora più debole di CGCG 79-34, osservata subito prima e situata 4' più a E; molto piccola, salta fuori in visione distolta subito a WNW di una stellina relativamente brillante che disturba un po'; forse rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
CGCG 79-34	gx	16h04m31s	+11°12.9'		Ser	24"	buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 79-37	gx	16h04m34s	+12°10.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e un nucleo stellare visibile a momenti; c'è una debole stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 79-38	gx	16h04m34s	+12°14.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo quasi stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 79-39	gx	16h04m50s	+08°28.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e condensata, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 79-40	gx	16h04m48s	+14°07.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con tenue nucleo quasi stellare — 450x.
CGCG 79-44	gx	16h05m19s	+14°21.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MAC 1605+1421** situata a ridosso N — anche a 580x le 2 gx si separano a fatica; la CGCG è leggermente condensata, orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15"; la MAC è prima vista più nebulosa ma a tratti presenta anch'essa una condensazione centrale molto tenue: più che altro appare come una sorta di rigonfiamento della compagna.
CGCG 79-45	gx	16h05m38s	+10°02.1'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo W; la visione è disturbata da 2 stelle brillanti di 7ª e di 9ª grandezza situate rispettivamente a 7' SSE e 5' S della gx — 450x.
CGCG 79-48	gx	16h07m08s	+14°16.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 79-52	gx	16h07m29s	+13°50.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 79-56	gx	16h08m05s	+13°54.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme — 450x
CGCG 79-57	gx	16h08m33s	+09°36.4'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
CGCG 79-58	gx	16h08m40s	+12°00.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 79-60	gx	16h08m48s	+12°57.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, ma bisogna tenere fuori campo una coppia di stelle molto brillanti (SAO 101965 e 101967 di magnitudo rispettivamente 7.5 e 8.5) situate 7' a ESE; è piccola, forse rotonda con Ø grosso modo di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 79-61	gx	16h09m11s	+11°59.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
CGCG 79-62	gx	16h09m08s	+12°05.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 79-64	gx	16h09m36s	+08°57.4'		Ser	24"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 79-65	gx	16h09m46s	+13°26.9'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante un paio di primi a WSW e una appena percettibile a ridosso sempre verso WSW — 450x.
CGCG 79-72	gx	16h10m55s	+11°57.6'		Her	24"	ottima / ottimo	debolissima, molto piccola e diffusa, salta fuori in visione distolta a 1' scarso SW di una stellina, ma occorre spingere a 570x.
CGCG 79-73	gx	16h10m56s	+13°45.1'		Her	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso SE — 380x.
CGCG 79-77	gx	16h12m50s	+11°09.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e gradatamente più brillante verso l'interno, diffusa, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 79-81	gx	16h13m44s	+13°05.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a S — 450x.
CGCG 79-82	gx	16h14m04s	+14°08.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 79-85	gx	16h14m25s	+10°30.9'		Ser	24"	m. buona / discreto	debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×13" (lo spessore è ~ 1/3 della lunghezza) — 450x.
CGCG 79-88	gx	16h17m39s	+10°21.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, più che altro disturbata dalla SAO 102066 di magnitudo 7.7 che si fatica a tenere fuori campo; a 450x appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso W e una appena percettibile a ridosso NE.
CGCG 79-89	gx	16h17m35s	+13°29.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella brillante a SW e una più debole alla stessa distanza verso SE — 450x.
CGCG 79-91	gx	16h17m58s	+13°58.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 80-2	gx	16h18m13s	+12°43.0'		Her	24"	ottima / ottimo	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 80-3	gx	16h19m12s	+14°09.1'		Her	16"	discreta / ottimo	piccolo oggetto con nucleo stellare e di max 10"-15" di Ø; appare senza difficoltà a poco più di 1' NNE di NGC 6113 — 380x.
CGCG 80-6	gx	16h19m59s	+10°29.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 80-7	gx	16h20m50s	+14°44.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; situata tra una stellina brillante a SE e una doppia larga a NW — 450x.
CGCG 80-8	gx	16h21m09s	+13°08.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è un piccolo oggetto molto debole, compatto e leggermente diffuso a ridosso verso S che a 340x rimane di aspetto quasi stellare (ho successivamente effettuato un controllo e in effetti è risultata essere la piccola 2MASS 16210889 +1307423) — 450x.
CGCG 80-9	gx	16h21m26s	+14°31.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e facile da vedere, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale evidente; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 80-11	gx	16h21m31s	+14°44.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1.5' NE — 450x.
CGCG 80-12	gx	16h12m48s	+09°56.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; quasi allineata ed equidistante con 3 stelline a E — 450x.
CGCG 80-13	gx	16h22m02s	+09°53.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 80-17	gx	16h22m58s	+14°36.2'		Her	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; è situata a ridosso E di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 80-19	gx	16h23m42s	+09°44.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	chiazza circolare molto diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 80-21	gx	16h23m45s	+09°47.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto a prima vista simile CGCG 80-19, dalla quale dista 2.5 a NNE, ma poco meno estesa — 450x.
CGCG 80-22	gx	16h24m03s	+13°43.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; una sorta di debolissimo "pendaglio" molto piccolo appare a tratti a ridosso S: si tratta in effetti di MAC 1624+1343 — 450x.
CGCG 80-23	gx	16h24m12s	+09°12.9'		Her	24"	ottima / ottimo	debolissimo lucore molto stemperato sul fondo cielo, di forma indistinta, ma non più esteso di 30"; c'è una stellina subito a S; la visione non sembra migliorare scalando a 340x.
CGCG 80-24	gx	16h24m49s	+09°34.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
CGCG 80-33	gx	16h27m00s	+09°03.0'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
CGCG 80-35	gx	16h27m14s	+14°20.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 80-36	gx	16h27m21s	+14°05.7'		Her	24"	buona / ottimo	è un piccolo debolissimo e indistinto lucore in quanto ci sono tre stelline ravvicinate e appena percettibili a ridosso N che ne confondono la forma; non sembra tuttavia più estesa di 20" — 450x.
CGCG 80-37	gx	16h27m42s	+13°26.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 80-39	gx	16h28m49s	+10°25.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da N a S; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S; meglio evidente a 450x.
CGCG 80-43	gx	16h31m36s	+13°38.2'		Her	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 80-45	gx	16h32m05s	+13°38.8'		Her	24"	buona / ottimo	debole e molto diffusa, in visione distolta appare poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale molto tenue; a tratti sembra di aspetto un po' irregolare, forse per la presenza di qualche stellina irrisolta ai margini; una debole stellina si trova invece subito a N della gx — 450x.
CGCG 80-46	gx	16h32m58s	+11°43.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' SW che tuttavia, a 580x, appare chiaramente diffusa: da un controllo successivamente effettuato è risultata trattarsi di PGC 3091184.
CGCG 80-47	gx	16h35m01s	+13°06.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 80-49	gx	16h36m16s	+10°50.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 450x.
CGCG 80-50	gx	16h37m35s	+11°44.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline, a E e SSE — 450x.
CGCG 80-51	gx	16h39m26s	+11°12.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; è situata sul cateto maggiore di un triangolo rettangolo molto acuminato e col vertice più acuto che punta a NW — 450x.
CGCG 80-55	gx	16h41m21s	+08°54.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale appena percettibile; è situata subito a S di una stellina brillante; una stellina debole si trova a WNW e grosso modo alla stessa distanza — 450x.
CGCG 81-1	gx	16h43m14s	+09°54.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 81-5	gx	16h48m15s	+13°54.2'		Her	24"	buona / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, meglio contrastata scalando a 340x, approssim. circolare con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a poco più di 1' verso W.
CGCG 81-14	gx	17h03m22s	+12°14.8'		Oph	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; c'è una debole stellina subito a E — 450x.
CGCG 81-16	gx	17h04m25s	+09°11.7'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata a ridosso W di una coppia sbilanciata di stelline — 450x.
CGCG 81-18	gx	17h04m58s	+09°55.9'		Oph	24"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NW e un'altra abbastanza brillante subito a NE — 450x.
CGCG 81-20	gx	17h05m44s	+11°37.0'		Her	24"	buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; è disturbata da una stellina brillante situata 1.5'a WNW; c'è una stellina invece a 1' NE; la gx appare in visione distolta, ma è meglio restare a 450x (ultima gx osservata: albeggia).
CGCG 82-3	gx	17h06m30s	+14°08.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" (o poco più); c'è una stellina brillante a 1.5' E; altresì denominata CGCG 81-23 — 450x.
CGCG 82-5	gx	17h07m36s	+11°26.4'		Oph	24"	m. buona / discreto	molto debole, salta fuori in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S.
CGCG 82-7	gx	17h08m16s	+11°51.0'		Oph	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 82-11	gx	17h08m55s	+11°28.0'		Oph	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di aspetto a tratti un poco irregolare, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; una condensazione centrale appare solo a momenti a 450x.
CGCG 82-12	gx	17h09m08s	+09°24.0'		Oph	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 82-13	gx	17h09m15s	+09°13.7'		Oph	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 82-15	gx	17h13m12s	+13°03.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
CGCG 82-17	gx	17h19m31s	+11°16.7'		Oph	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina subito a NW (la quale fa parte di un piccolo asterismo di 4 componenti) — 450x.
CGCG 82-26	gx	17h23m58s	+12°35.5'		Oph	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 82-31	gx	17h26m41s	+13°54.6'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 83-2	gx	17h35m28s	+09°25.6'		Oph	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 83-4	gx	17h36m26s	+10°01.2'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con tenue nucleo quasi stellare; ci sono molte stelline brillanti nei dintorni tra cui la SAO 102954 di magnitudo 8.6 situata un paio di primi a S — 450x.
CGCG 83-7	gx	17h37m25s	+12°59.6'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; situata tra 2 stelline orientate in direzione ESE-WNW e distanti un paio di primi — 450x.
CGCG 83-10	gx	17h37m46s	+12°56.3'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale molto tenue; c'è una debole stellina quasi a ridosso S e una molto debole a 1' scarso NNE — 450x.
CGCG 83-11	gx	17h38m08s	+13°53.2'		Oph	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 83-12	gx	17h38m18s	+13°48.5'		Oph	24"	m. buona / ottimo	più piccola della precedente e ancora più debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 83-14	gx	17h38m30s	+11°22.2'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; situata in mezzo a due stelline (quella a NW è una doppia serrata); le due SAO 102984 e 102990 si trovano ai bordi del campo se si scala a 340x.
CGCG 83-15	gx	17h38m30s	+11°46.5'		Oph	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 83-16	gx	17h38m33s	+12°44.6'		Oph	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto piccola e debole; nonostante sia immersa nel bagliore della SAO 102987 di magnitudo 6.5 appare chiaramente condensata, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 83-17	gx	17h38m56s	+12°59.0'		Oph	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata tra una stellina brillante a N e un minuscolo triangolo allungato di stelline appena percettibili a ridosso S — 450x.
CGCG 83-19	gx	17h44m53s	+14°12.0'		Oph	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 83-22	gx	17h47m48s	+14°41.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; situata tra una stellina a 1' N e una appena percettibile dalla parte opposta — 450x.
CGCG 83-24	gx	17h48m29s	+12°31.7'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N — 450x.
CGCG 83-25	gx	17h49m06s	+16°19.9'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SE — 450x.
CGCG 83-26	gx	17h49m44s	+13°22.7'		Oph	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, rotonda con Ø < 20"; situata tra due stelline orientate da N a S; una doppia brillante si trova a 1' verso N — 450x.
CGCG 83-28	gx	17h50m29s	+14°23.6'		Her	16"	discreta / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; si vede più facilmente di UGC 11001 dalla quale dista 7.5' NNE — 270x.
CGCG 83-31	gx	17h53m51s	+14°02.9'		Oph	24"	buona / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e a tratti appena più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 83-32	gx	17h54m13s	+14°52.0'		Her	24"	ottima / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" (a 340x il campo è molto ricco di stelle anche brillanti).
CGCG 84-6	gx	17h57m28s	+14°12.0'		Oph	24"	buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso E e una più brillante a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 84-12	gx	18h02m09s	+12°52.0'		Oph	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a ridosso S (la più brillante di una coppia) — 450x.
CGCG 84-15	gx	18h05m01s	+09°28.8'		Oph	24"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' N — 450x.
CGCG 84-28	gx	18h14m21s	+10°06.5'		Oph	24"	buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una evidente condensazione centrale; c'è una coppia stretta di deboli stelline a ridosso SW: quella più vicina alla galassia è appena percettibile — 450x.
CGCG 84-29	gx	18h14m25s	+10°00.3'		Oph	24"	buona / m. buono	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con bulge abbastanza contrastato; c'è una stellina al margine SW e una appena percettibile subito a NE — 450x.
CGCG 84-30	gx	18h15m58s	+13°47.1'		Oph	24"	ottima / scarso	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso N e una un poco più brillante e più distante a NNE — 340x.
CGCG 85-3	gx	06h48m52s	+18°46.6'		Gem	24"	m. buona / buono	debolissimo alone esteso 30" o 35" che circonda una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 85-11	gx	06h52m13s	+15°14.2'		Gem	16"	m. buona / scarso	molto debole e piccola, forse rotonda con Ø di ~ 20"; forma un piccolo triangolo con 2 stelline situate a ridosso verso W e distanti 40" in direzione N-S — 270x.
CGCG 85-19	gx	06h58m44s	+18°39.1'		Gem	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza forse circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E (situata ai margini alla Via Lattea) — 450x.
CGCG 85-23	gx	07h02m59s	+18°32.3'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
CGCG 85-24	gx	07h03m04s	+18°29.2'		Gem	24"	ottima / discreto	più piccola della precedente, dalla quale dista 3' a SSE; è rotonda con Ø analogo; situata quasi nel mezzo di una coppia di stelline abbastanza brillanti distanti 1' e orientate da NE a SW — 450x.
CGCG 85-25	gx	07h03m15s	+17°51.8'		Gem	24"	ottima / discreto	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un tenue alone molto piccolo, rotondo con Ø < 20"; un debolissimo "aggetto" verso E è in realtà dovuto a una coppia di debolissime stelline ravvicinate — 450x.
CGCG 85-26	gx	07h03m35s	+18°57.4'		Gem	24"	ottima / discreto	relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue nucleo stellare poco contrastato; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 85-29	gx	07h04m29s	+18°35.3'		Gem	24"	ottima / discreto	relativamente brillante, poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 85-33	gx	07h06m25s	+20°47.8'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e con condensazione stellare abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
CGCG 85-36	gx	07h07m25s	+18°30.2'		Gem	24"	m. buona / buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 85-37	gx	07h07m47s	+18°45.9'		Gem	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di una 30-ina di secondi di Ø; appare a tratti in visione distolta a 270x.

CGCG 86-10	gx	07h15m23s	+16°19.2'		Gem	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente in quanto oltre a essere debolissima è anche "soffocata" da una coppia di stelline brillanti distanti 30" situate a ridosso N e W; spingendo a 580x appare a tratti un po' spostata verso la stella a NE, ma è molto piccola estesa sì e no 10" o 15".
CGCG 86-16	gx	07h21m39s	+20°16.2'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 450x.
CGCG 86-17	gx	07h22m05s	+17°25.3'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da E a W, di dimensioni 30"×10" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; una coppia di stelline si trovano rispettivamente a NW e a N della gx — 450x.
CGCG 86-22	gx	07h22m54s	+20°27.7'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 86-28	gx	07h27m23s	+19°38.0'		Gem	16"	ottima / ottimo	assieme a CGCG 86-29 forma una coppia di debolissime galassiette diffuse, rotonde e di luminosità uniforme, di aspetto simile, salvo il fatto che la 1ª è leggermente più estesa: 30" contro i 25" circa della 2a; c'è una stellina subito a E della coppia — 380x.
CGCG 86-29	gx	07h27m24s	+19°37.5'		Gem	16"	ottima / ottimo	v. **CGCG 86-28**
CGCG 86-30	gx	07h27m23s	+20°06.8'		Gem	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø poco superiore a 30" e nucleo quasi stellare appena percettibile; c'è una coppia di stelline subito a W — 450x.
CGCG 86-32	gx	07h28m25s	+18°24.3'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 86-33	gx	07h28m37s	+17°08.9'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø max di 15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E — 450x.
CGCG 86-35	gx	07h29m28s	+20°03.3'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
CGCG 86-36	gx	07h30m48s	+18°20.1'		Gem	16"	ottima / ottimo	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta, ma occorre scalare a 188x; è estesa una 30-ina di secondi e c'è una stellina a ridosso verso E; ce n'è un'altra appena percettibile a SE, ma bisogna spingere a 380x.
CGCG 86-38	gx	07h31m05s	+14°57.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso N; c'è una stella brillante a 1' SSW — 450x.
CGCG 86-39	gx	07h31m12s	+18°14.6'		Gem	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di 35"-40" ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
CGCG 87-5	gx	07h32m06s	+18°19.5'		Gem	16"	ottima / m. buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di 20"-30"; appare più facilmente la PGC 213399 situata un paio di primi a SW, poco diffusa e con Ø di una 15-ina di secondi (situata 2.5' a ESE di NGC 2407) — 380x.
CGCG 87-6	gx	07h32m44s	+16°53.8'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a SE — 450x.
CGCG 87-10	gx	07h33m57s	+14°59.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina al bordo SE dalla quale la gx sembra a prima vista aggettare — 450x.
CGCG 87-11	gx	07h34m07s	+18°41.8'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; è situata a ridosso NW di un piccolo asterismo di 5 stelline foggiato a "clessidra"; una debolissima stellina sfuocata appare elusivamente in visione distolta a ridosso verso W: da un controllo successivamente effettuato questa è risultata essere la MAC 0734+1841 — 450x.
CGCG 87-16	gx	07h36m28s	+17°16.7'		Gem	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 87-18	gx	07h87m21s	−19°38.2'		Gem	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale abbastanza marcata — 450x.
CGCG 87-21	gx	07h38m27s	+16°51.3'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta quasi a ridosso SE; una stellina brillante si trova a 1' verso W — 450x.
CGCG 87-22	gx	07h38m42s	+16°42.5'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata in mezzo a due deboli stelline orientate da N a S — 450x.
CGCG 87-25	gx	07h39m29s	+18°10.8'		Gem	24"	m. buona / m. buono	chiazza circolare molto debole e diffusa, con Ø < 30" e di luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 deboli stelline a SW e SE — 340x.
CGCG 87-26	gx	07h39m59s	+17°14.2'		Gem	24"	ottima / discreto	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di max 15"; allineata ed equidistante con due stelline a E (quella più esterna è decisamente luminosa); un'altra stellina abbastanza brillante si trova, sempre allineata, verso W — 450x.
CGCG 87-27	gx	07h40m29s	+20°42.0'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina brillante a ridosso N; una debole stellina si trova invece sul prolungamento dell'asse verso E — 450x.
CGCG 87-28	gx	07h41m25s	+18°43.7'		Gem	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW, dimensioni 30"×20" e con piccolo bulge evidente quasi stellare — 450x.
CGCG 87-31	gx	07h42m00s	+18°44.0'		Gem	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 87-35	gx	07h46m19s	+18°22.1'		Gem	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' N — 450x.
CGCG 87-36	gx	07h47m02s	+16°30.3'		Gem	24"	ottima / buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 87-39	gx	07h48m07s	+18°34.5'		Gem	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 20" o poco più; c'è una doppia stretta a 1' NW e un'altra sbilanciata 2' a W — 450x.
CGCG 87-40	gx	07h48m12s	+18°33.2'		Gem	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; ci sono 3 stelline allineate subito a E — 450x.
CGCG 87-41	gx	07h48m52s	+17°21.4'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (non ho visto la MAC 0748+1721 situata 1' più a E) — 450x.
CGCG 87-45	gx	07h52m41s	+18°22.5'		Gem	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è un asterismo di 5 stelline abbastanza brillanti subito a NW — 450x.
CGCG 87-47	gx	07h55m22s	+15°05.6'		Gem	24"	ottima / discreto	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 30" NE e un'altra più debole a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 88-1	gx	07h55m27s	+17°03.6'		Gem	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa, orientata da NW a SE, dimensioni 20"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una coppia di deboli stelline a SE con le quali la gx è allineata — 450x.
CGCG 88-3	gx	07h56m14s	+17°01.2'		Cnc	24"	buona / ottimo	è debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma solo a momenti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S; una doppia stretta si trova subito a E; a 1' WSW c'è invece una stellina brillante (situata 9' scarsi a NW di CGCG 88-4) — 450x.
CGCG 88-4	gx	07h56m40s	+16°55.2'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE.
CGCG 88-6	gx	07h56m54s	+15°50.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 45"×15"; è molto disturbata da due stelle brillanti e in modo particolare dalla SAO 97399 di 5ª grandezza situata ad appena 3' SSE — 450x.
CGCG 88-8	gx	07h57m47s	+16°01.8'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto piccola e debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a SE — 450x.
CGCG 88-9	gx	07h58m01s	+14°42.2'		Cnc	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele molto schiacciato con 2 deboli stelline a E e a SW — 450x.
CGCG 88-12	gx	07h59m31s	+17°29.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 88-13	gx	07h59m28s	+18°18.5'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole, piccola diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SW e una appena percettibile subito a NE — 450x.
CGCG 88-16	gx	08h00m37s	+15°41.0'		Cnc	24"	ottima / discreto	relativamente brillante, compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; non sembra disturbata dalla SAO 97465 di 9ª grandezza situata a 1.5' NE — 450x.
CGCG 88-17	gx	08h00m41s	+16°20.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, osservabile solo in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø < 20"; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti di forma triangolare un paio di primi a NE.
CGCG 88-25	gx	08h03m46s	+15°14.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 88-26	gx	08h04m00s	+15°15.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con due stelline a E — 450x.
CGCG 88-27	gx	08h03m59s	+19°21.8'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 88-32	gx	08h06m52s	+18°44.3'		Cnc	24"	buona / buono	facile, relativamente compatta, con bulge ben evidente, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 88-34	gx	08h07m07s	+18°45.3'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è in parte disturbata dal una stellina brillante situata ~ 1' a SW — 450x.
CGCG 88-35	gx	08h07m17s	+14°57.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e disturbata dalla luce di una stellina brillante situata una 30-ina di secondi a NW; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo di aspetto quasi stellare — 450x.
CGCG 88-37	gx	08h07m41s	+14°56.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo molto debole, relativamente compatto e di luminosità uniforme, con Ø di una 15-ina di secondi; forma un piccolo quadrato quasi perfetto con 3 stelline — 450x.
CGCG 88-39	gx	08h07m53s	+18°54.7'		Cnc	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 30" SW — 450x.
CGCG 88-42	gx	08h08m38s	+19°26.9'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, forse rotonda con Ø < 15"; situata tra 2 stelline orientate da N a S — 450x.
CGCG 88-43	gx	08h08m41s	+18°05.2'		Cnc	24"	buona / buono	relativamente facile, ma molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina brillante < 1' verso SE — 450x.
CGCG 88-47	gx	08h09m18s	+19°30.0'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso S e una brillante subito a N — 450x.
CGCG 88-48	gx	08h10m04s	+17°16.1'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso verso NE e un'altra più evidente a poco più di 1' E — 450x.
CGCG 88-50	gx	08h12m44s	+16°53.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele con due stelline: una subito a SE e l'altra a poco più di 1' SW — 450x.
CGCG 88-51	gx	08h13m45s	+17°02.0'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 88-54	gx	08h15m08s	+17°53.5'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 88-55	gx	08h15m51s	+17°01.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	è un baffo di luce molto tenue che aggetta per una 20-ina di secondi a E e a W di una stellina brillante — 450x.
CGCG 88-58	gx	08h18m05s	+19°59.1'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; è situata all'interno, e verso il cateto minore, di un triangolo rettangolo formato con 3 stelline di luminosità diseguale: una di queste si trova subito a N — 450x.
CGCG 88-60	gx	08h19m39s	+19°55.9'		Cnc	24"	ottima / molto buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 89-9	gx	08h22m23s	+15°31.1'		Cnc	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza brillante — 450x.
CGCG 89-13	gx	08h23m40s	+18°18.0'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina a poco più di 1' NW (si fatica a tenere fuori campo la SAO 97781 di 6a grandezza situata 4.5' a NW) — 450x.
CGCG 89-14	gx	08h23m48s	+17°59.4'		Cnc	24"	ottima / m. buono	piccola chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; appare senza problemi in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, perché nel campo sono presenti alcune stelline brillanti che tendono a offuscare un po' la visione — 450x.
CGCG 89-16	gx	08h24m14s	+17°19.9'		Cnc	24"	ottima / molto buono	piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 89-24	gx	08h25m51s	+18°10.0'		Cnc	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 89-25	gx	08h26m18s	+17°14.7'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole, rotonda, poco diffusa e di luminosità uniforme, con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 89-26	gx	08h26m17s	+17°21.7'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø simile a CGCG 89-25 e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 89-32	gx	08h28m53s	+17°33.1'		Cnc	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 89-37	gx	08h30m31s	+18°12.2'		Cnc	24"	m. buona / buono	è formata da 2 debolissimi noduli estesi 10"-12" separati da una 20-ina di secondi in direzione N-S; quello a S è appena più evidente; un piccolo quadrilatero irregolare di deboli stelline si trova subito a W — 450x.
CGCG 89-38	gx	08h30m54s	+20°14.9'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' NNE — 450x.
CGCG 89-41	gx	08h32m14s	+19°37.4'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso N; è situata all'interno di un asterismo irregolare di 5 stelle brillanti — 450x.
CGCG 89-42	gx	08h32m40s	+19°30.7'		Cnc	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima chiazza circolare di luminosità uniforme con Ø di 20"-25"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; è situata tra due stelline brillanti distanti 6' in direzione NW-SE.
CGCG 89-44	gx	08h33m05s	+16°59.4'		Cnc	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 89-46	gx	08h33m18s	+19°20.8'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 89-47	gx	08h33m41s	+19°24.4'		Cnc	24"	m. buona / buono	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' WSW — 450x.
CGCG 89-49	gx	08h34m19s	+15°17.4'		Cnc	24"	ottima / m. buono	piccolo lucore diffuso ed estremamente tenue, forse circolare con Ø di una 20-ina di secondi; è situato tra una debole stellina subito a N e una abbastanza brillante a S (quest'ultima di un piccolo triangolo isoscele molto aperto) — 450x.
CGCG 89-54	gx	08h38m10s	+18°41.5'		Cnc	24"	ottima / molto buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S — 450x.
CGCG 89-56	gx	08h38m24s	+19°35.8'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a N (fa parte delle galassiette del **Praesepe**) – 450x.
CGCG 89-58	gx	08h38m24s	+17°37.9'		Cnc	24"	buona / buono	è una bella galassietta poco diffusa e di aspetto molto regolare, rotonda con Ø < 30" e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata tra 2 stelline distanti 1.5 e orientate da E a W — 450x.
CGCG 89-62	gx	09h39m14s	+19°29.9'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima macchiolina di luminosità uniforme estesa per max 30". Fa parte delle galassiette del **Praesepe** — 380x.
CGCG 90-4	gx	08h46m10s	+19°21.2'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 90-8	gx	08h47m09s	+16°20.7'		Cnc	24"	ottima / m. buono	piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia stretta a 45" WSW — 450x.
CGCG 90-9	gx	08h47m27s	+19°32.2'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 90-13	gx	08h48m18s	+16°57.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 15' N; a 3' verso S c'è invece un piccolo triangolo rettangolo coi cateti orientati secondo le direzioni cardinali — 450x.
CGCG 90-23	gx	08h50m35s	+19°22.1'		Cnc	16"	ottima / m. buono	in visione diretta appare solo un debole oggetto circolare di una 20-ina di secondi di Ø; in visione distolta, a 380x, si allunga tantissimo! È orientata da NW a SW con dimensioni ~ 60"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso S.
CGCG 90-24	gx	08h50m42s	+17°05.6'		Cnc	24"	m. buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, solo a tratti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×20"; la visione è purtroppo disturbata dalla SAO 98159 di 8ª grandezza situata 4' a SSW — 450x.
CGCG 90-27	gx	08h52m14s	+19°03.3'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' SW e un'altra percettibile solo a momenti a ridosso N — 450x.
CGCG 90-29	gx	08h52m51s	+19°01.1'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 90-33	gx	08h54m09s	+17°25.8'		Cnc	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e leggermente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NW — 450x.
CGCG 90-37	gx	08h55m27s	+20°03.3'		Cnc	24"	buona / ottimo	piccola, debolissima e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 90-39	gx	08h55m52s	+18°09.4'		Cnc	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 90-45	gx	08h57m54s	+17°05.5'		Cnc	16"	buona / m. buono	debolissima e diffusa, appare solo a tratti, ma non riesco a capire com'è fatta; non è comunque più estesa di 30" — 270x.
CGCG 90-47	gx	08h59m58s	+17°49.1'		Cnc	24"	buona / ottimo	è in realtà costituita da due piccoli noduli ravvicinati con Ø di 10"-12" e orientati da E a W; quello orientale è poco più evidente — 450x.
CGCG 90-49	gx	09h00m15s	+17°24.5'		Cnc	24"	ottima / discreto	chiazza molto debole e spampanata, più che altro disturbata da una stellina brillante a ridosso S, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 90-55	gx	09h02m14s	+14°30.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 90-58	gx	09h02m26s	+14°27.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile subito a NW — 450x.
CGCG 90-59	gx	09h02m44s	+17°42.6'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso N e una di luminosità simile poco più distante a S — 450x.
CGCG 90-61	gx	09h04m20s	+17°25.5'		Cnc	16"	ottima / m. buono	debolissima, di luminosità uniforme; solo in visione distolta appare allungata ~ da N a S con dimensioni 45"×30", ma è meglio scalare a 270x.
CGCG 90-66	gx	09h04m45s	+18°48.7'		Cnc	24"	m. buona / discreto	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale stellare abbastanza pronunciata; è situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo isoscele di 3 stelline.
CGCG 90-76	gx	09h06m58s	+18°58.0'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare evidente; situata tra due stelline brillanti orientate da ENE a WSW e distanti un paio di primi — 450x.
CGCG 91-6	gx	09h09m13s	+19°24.5'		Cnc	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35"; è situata tra due stelline abbastanza brillanti; una appena percettibile si trova subito a E, ma quest'ultima è in realtà risultata essere la minuscola **PGC 1591014** — 450x.
CGCG 91-9	gx	09h09m35s	+18°36.9'		Cnc	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata subito a N di un piccolo triangolo quasi rettangolo di stelline brillanti; una di queste si trova a 1' SE della galassia; un'altra stellina appena percettibile si trova a ~ 1' verso E; meglio osservabile a 380x.
CGCG 91-10	gx	09h09m37s	+19°28.1'		Cnc	24"	ottima / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW — 450x.
CGCG 91-13	gx	09h10m23s	+19°27.3'		Cnc	24"	ottima / buono	piccola e molto debole, relativamente compatta e a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 91-18	gx	09h11m13s	+19°24.0'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 91-20	gx	09h11m43s	+17°45.7'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 450x.
CGCG 91-21	gx	09h11m49s	+17°08.7'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 91-22	gx	09h11m55s	+20°00.3'		Cnc	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25" — 450x.
CGCG 91-26	gx	09h13m43s	+16°51.8'		Leo	24"	buona / ottimo	poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e piccolo bulge appena più contrastato del disco — 400x.
CGCG 91-27	gx	09h13m53s	+18°56.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 91-30	gx	09h14m46s	+18°55.4'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare visibile a momenti.
CGCG 91-35	gx	09h15m15s	+17°46.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata sul lato occidentale di una piccola losanga formata da 4 stelline — 450x.
CGCG 91-36	gx	09h15m43s	+15°13.2'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 91-40	gx	09h16m07s	+17°44.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare abbastanza marcata (in visione diretta sembra addirittura una stellina a prima vista); c'è una stellina brillante quasi a ridosso NE — 450x.
CGCG 91-43	gx	09h16m34s	+17°55.1'		Cnc	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è un piccolo triangolo isoscele a SW — 450x.
CGCG 91-45	gx	09h16m45s	+19°50.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una debole stellina a 1' SW e una coppia poco più distante verso NW — 450x.
CGCG 91-48	gx	09h16m54s	+17°04.6'		Cnc	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 91-49	gx	09h16m53s	+17°27.5'		Cnc	16"	ottima / m. buono	altra gx molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 91-52	gx	09h17m08s	+17°24.6'		Cnc	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto molto piccolo, rotondo con Ø di una 20-ina di secondi situato quasi a ridosso verso E di una stellina brillante — 380x.
CGCG 91-53	gx	09h17m08s	+19°52.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 340x.
CGCG 91-55	gx	09h17m12s	+20°09.2'		Cnc	16"	buona / m. buono	debolissima, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" — 380x.
CGCG 91-56	gx	09h17m34s	+18°57.0'		Cnc	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, con tenue condensazione centrale, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 91-57	gx	09h17m33s	+19°03.1'		Cnc	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 91-58	gx	09h17m32s	+19°51.3'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' W — 450x.
CGCG 91-59	gx	09h17m38s	+16°26.4'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e con piccolo bulge brillante, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 91-64	gx	09h18m19s	+20°15.3'		Cnc	24"	ottima / buono	debolissima, appare in visione distolta, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
CGCG 91-65	gx	09h18m26s	+16°18.3'		Cnc	24"	m. buona / discreto	piccola e compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e nucleo stellare brillante (ma non si tratterà effettivamente di una stellina sovrapposta?) — 450x.
CGCG 91-66	gx	09h18m42s	+16°29.0'		Cnc	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
CGCG 91-67	gx	09h18m51s	+20°10.0'		Cnc	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø 30" e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 91-72	gx	09h20m12s	+16°31.9'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 91-73	gx	09h20m33s	+17°42.1'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e con piccola condensazione centrale appena percettibile, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a 1' verso NW; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 91-74	gx	09h20m36s	+18°06.6'		Cnc	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×20" e con nucleo stellare osservabile a 380x.
CGCG 91-76	gx	09h17m33s	+19°03.1'		Cnc	24"	buona / ottimo	facile, alla prima occhiata appare addirittura prima di UGC 4962, dalla quale dista un paio di primi verso NE, poco diffusa e con bulge evidente; è allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 91-77	gx	09h20m59s	+18°44.6'		Cnc	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è un piccolo triangolo molto irregolare di stelle brillanti 3.5' a W — 450x.
CGCG 91-78	gx	09h21m19s	+18°12.8'		Cnc	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 91-79	gx	09h21m23s	+16°46.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 91-80	gx	09h21m23s	+18°13.4'		Cnc	24"	buona / m. buono	è più evidente di CGCG 91-78, situata 1' a SW, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 91-82	gx	09h22m03s	+17°12.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stella brillante a un paio di primi verso E — 450x.
CGCG 91-83	gx	09h22m08s	+18°20.0'		Leo	24"	buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 91-84	gx	09h22m16s	+17°25.1'		Leo	24"	buona / buono	piccola e debole, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina brillante a 1' WNW — 450x.
CGCG 91-85	gx	09h23m19s	+16°37.0'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissimo baffo di luminosità uniforme esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare in visione distolta ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 91-86	gx	08h23m50s	+17°09.4'		Leo	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (è situata sul lato N di un triangolo isoscele formato da 3 stelline brillanti e col vertice più acuto che punta a W) — 450x.
CGCG 91-87	gx	09h24m33s	+18°00.3'		Leo	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue bulge piccolo ed evidente — 450x.
CGCG 91-88	gx	09h24m39s	+17°39.8'		Leo	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (forse meno): disturbata dalla luce della SAO 98554 di 7ª grandezza situata a 3' N e che non si riesce a tener fuori campo neppure a 450x.
CGCG 91-90	gx	09h24m51s	+17°56.3'		Leo	24"	buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare orientata come la precedente e di dimensioni simili — 450x.
CGCG 91-91	gx	09h24m56s	+19°08.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 91-95	gx	09h26m19s	+19°49.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 450x.
CGCG 91-96	gx	09h26m52s	+17°42.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, solo in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 40"×20" (nonostante la debolezza è nondimeno la componente più brillante dell'ammasso **AGC 797**, nel quale si trova verso il margine NE) — 450x.
CGCG 91-99	gx	09h30m23s	+19°28.1'		Leo	24"	buona / m. buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" c'è una stellina un paio di primi a S — 450x.
CGCG 91-100	gx	09h30m29s	+16°21.7'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso S — 450x.
CGCG 92-1	gx	09h33m22s	+15°25.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, piccola e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 92-2	gx	09h33m32s	+14°35.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NW — 450x.
CGCG 92-3	gx	09h34m04s	+17°50.0'		Leo	24"	buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda di una 30-ina di secondi (o poco più); c'è una coppia di stelline a N e NE — 450x.
CGCG 92-4	gx	07h11m40s	+07°20.7'		CMi	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S (situata 11' a NW di UGC 3738) — 450x.
CGCG 92-5	gx	09h34m41s	+19°33.0'		Leo	24"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; situata a 1' SW di una coppia di stelline molto sbilanciate in luminosità (quella a W è più brillante) — 450x.
CGCG 92-7	gx	07h12m51s	+07°15.2'		CMi	24"	ottima / m. buono	è debolissima, ma si vede abbastanza facilmente a 450x anche in visione diretta, segno che è relativamente compatta; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15" (situata 9' a E di UGC 3738).
CGCG 92-9	gx	09h36m14s	+17°29.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SSW — 450x.
CGCG 92-12	gx	09h37m31s	+19°35.3'		Leo	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45" — 380x.
CGCG 92-13	gx	09h37m33s	+17°06.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 92-14	gx	09h37m37s	+19°42.8'		Leo	16"	buona / m. buono	debolissima, ma visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, molto allungata da N a S con dimensioni ~ 45"×15".
CGCG 92-18	gx	09h38m27s	+17°25.4'		Leo	24"	buona / buono	tenue chiazza diffusa di luminosità uniforme che si diparte a N di una stellina; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 92-21	gx	09h39m31s	+19°07.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 450x.
CGCG 92-23	gx	09h39m52s	+15°59.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, visibile in visione distolta, ma solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; meglio tuttavia scalare a 340x.
CGCG 92-25	gx	09h39m55s	+16°47.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 0940+1647 situata a E — si separano abbastanza facilmente a 450x: sono entrambe di luminosità uniforme, rotonde e con Ø rispettivamente di 30" e 20".
CGCG 92-30	gx	09h41m50s	+14°58.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 92-33	gx	09h42m45s	+14°39.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; è situata in mezzo a due stelline: una brillante a ESE e l'altra debole a WNW — 450x.
CGCG 92-35	gx	09h43m55s	+14°48.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma quando salta fuori in visione distolta appare abbastanza chiaramente molto allungata da NW a SE ed estesa una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 92-36	gx	09h44m05s	+18°07.3'		Leo	24"	buona / buono	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare — 450x.
CGCG 92-37	gx	09h44m36s	+15°03.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 92-38	gx	09h44m47s	+14°53.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare elusivamente a ridosso N di PGC 27915; anche spingendo a 580x non riesco a capirne la forma, ma non dovrebbe comunque essere più estesa di 15".
CGCG 92-40	gx	09h45m01s	+17°48.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo di deboli stelline: la più evidente è quella subito a S della gx — 450x.
CGCG 92-42	gx	09h45m40s	+16°10.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta a 450x; è di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W e un'altra della stessa luminosità a poco più di 1' NE.
CGCG 92-43	gx	09h45m45s	+17°48.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta; in visione distolta appare rotonda con Ø di 10"-15"; poco più evidente di CGCG 92-40 (osservata subito prima) — 450x.
CGCG 92-45	gx	09h46m04s	+16°29.1'		Leo	24"	buona / buono	piccolo oggetto rotondo e relativamente compatto, con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 400x.
CGCG 92-46	gx	09h46m04s	+19°26.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza circolare con Ø di una 30-ina di secondi; situata quasi a ridosso NE di una coppia di stelline; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
CGCG 92-47	gx	09h46m28s	+19°23.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a E — 450x.
CGCG 92-49	gx	09h46m31s	+15°53.2'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 92-51	gx	09h47m20s	+14°43.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una molto debole a ridosso NE — 450x.
CGCG 92-58	gx	09h51m30s	+17°15.6'		Leo	24"	buona / buono	debolissima chiazza orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
CGCG 92-59	gx	09h51m54s	+14°56.0'		Leo	24"	m. buona / buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a ridosso S di una stellina abbastanza brillante; meglio evidente a 450x (a 340x la stellina tende un po' a offuscarla).
CGCG 92-61	gx	09h52m04s	+19°39.1'		Leo	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 92-62	gx	09h52m13s	+17°35.6'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 92-65	gx	09h52m59s	+19°37.9'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 92-66	gx	09h53m06s	+19°21.7'		Leo	24"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare in visione distolta subito a E di una stellina abbastanza brillante, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 92-72	gx	09h55m09s	+14°17.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia di gx molto deboli e di aspetto simile assieme a CGCG 92-73 situata 1.5' a ESE – è allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 92-73	gx	09h55m14s	+14°18.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia di gx molto deboli e di aspetto simile assieme alla precedente situata 1.5' a WSW – è orientata a perpendicolo con la precedente, anche questa con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 93-7	gx	09h57m48s	+15°07.5'		Leo	24"	buona / ottimo	diffusa con bulge molto brillante, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45" — 450x.
CGCG 93-8	gx	09h57m53s	+14°55.6'		Leo	24"	buona / ottimo	poco diffusa rotonda con Ø < 20" ed evidente condensazione centrale — 450x.
CGCG 93-9	gx	09h57m58s	+15°28.1'		Leo	24"	buona / discreto	debolissima chiazza di forma indistinta, estesa forse una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
CGCG 93-13	gx	09h58m53s	+15°22.8'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 93-15	gx	09h59m04s	+15°39.9'		Leo	24"	buona / discreto	relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e un nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 93-18	gx	09h59m23s	+15°54.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo poco diffuso e con Ø < 30"; appare facilmente in visione distolta a 450x.
CGCG 93-19	gx	10h00m43s	+15°17.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 93-24	gx	10h01m33s	+15°07.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 93-28	gx	10h02m16s	+19°12.9'		Leo	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto molto piccolo e diffuso, rotondo con Ø max di 20" — 380x.
CGCG 93-30	gx	10h02m41s	+14°37.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio evidente scalando a 340x, nonostante la presenza di due stelle brillanti a W e SW che disturbano un po' la visione.
CGCG 93-31	gx	10h02m53s	+16°27.0'		Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 93-33	gx	10h03m46s	+16°26.3'		Leo	24"	m. buona / buono	allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta sono di 60"×40"; presenta un piccolo bulge contrastato e un nucleo stellare visibile a tratti — 450x.
CGCG 93-35	gx	10h04m00s	+14°25.4'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a W — 450x.
CGCG 93-38	gx	10h05m23s	+19°16.3'		Leo	16"	ottima / m. buono	elusiva galassietta molto diffusa e di dimensioni 15"-20"; appare solo a tratti in visione distolta a 380x a 1' S di UGC 5436.
CGCG 93-41	gx	10h05m34s	+15°17.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola, debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 93-42	gx	10h05m47s	+14°20.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45" — 450x.
CGCG 93-44	gx	10h06m39s	+15°56.3'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 93-45	gx	10h06m48s	+14°18.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola gx relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 93-48	gx	10h07m10s	+18°57.0'		Leo	24"	m. buona / buono	debole e molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata con due stelline brillanti a SW — 450x.
CGCG 93-51	gx	10h07m32s	+14°36.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina appena sfuocata a 1' NE che da un controllo successivamente effettuato è risultata poi essere la PGC 2817416 — 450x.

CGCG 93-52	gx	10h07m31s	+14°58.1'	Leo	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo NE — 450x.
CGCG 93-53	gx	10h07m39s	+17°06.1'	Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e con nucleo stellare, forse rotonda con Ø di 12" o 15" — 450x.
CGCG 93-54	gx	10h08m04s	+14°48.3'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 93-57	gx	10h08m20s	+16°53.9'	Leo	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 93-58	gx	10h08m27s	+14°33.1'	Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 93-59	gx	10h08m40s	+16°47.2'	Leo	24"	m. buona / buono	poco più debole di CGCG 93-57, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 93-63	gx	10h10m08s	+17°41.5'	Leo	24"	m. buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette molto piccole separate da 1.5' in direzione NNE-SSW; appaiono reciprocamente in visione distolta quando si osserva l'altra delle due; la 1a è più difficile, forse rotonda con Ø di 12"-15"; la 2a è orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
CGCG 93-64	gx	10h10m12s	+17°42.9'	Leo	24"	m. buona / buono	v. **CGCG 93-63**
CGCG 93-65	gx	10h10m31s	+18°54.6'	Leo	24"	m. buona / ottimo	è molto piccola ed emerge con gran fatica dal bagliore della SAO 98981 di 9ª grandezza situata a ridosso SE; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 15" — 450x.
CGCG 93-66	gx	10h10m38s	+16°41.1'	Leo	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 93-74	gx	10h13m48s	+18°07.6'	Leo	24"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 93-75	gx	10h14m01s	+14°30.0'	Leo	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 380x.
CGCG 93-77	gx	10h14m11s	+14°22.8'	Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale puntiforme visibile a tratti a 380x.
CGCG 93-79	gx	10h14m56s	+16°52.8'	Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25" — 450x.
CGCG 93-83	gx	10h16m15s	+18°35.4'	Leo	24"	m. buona / buono	debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi; a prima vista sembra aggettare da una stellina; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
CGCG 93-86	gx	10h17m11s	+15°39.4'	Leo	24"	m. buona / buono	piccola e debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 93-94	gx	10h19m31s	+19°24.3'	Leo	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno; rotonda con Ø di 30" o poco più; molto disturbata dalla 40 Leonis di 4a grandezza che bisogna assolutamente tenere fuori campo — 450x.
CGCG 94-1	gx	10h19m10s	+16°06.7'	Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione E-W — 450x.
CGCG 94-2	gx	10h19m05s	+19°20.7'	Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare abbastanza facilmente orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 94-5	gx	10h20m56s	+20°09.3'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo; appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x, a tratti rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 94-6	gx	10h21m09s	+16°18.0'	Leo	24"	buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 40" e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da NE a SW — 450x.
CGCG 94-7	gx	10h21m21s	+16°06.9'	Leo	24"	buona / ottimo	più debole di CGCG 94-6, più uniforme in luminosità e di Ø simile; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 450x.
CGCG 94-9	gx	10h21m44s	+14°54.6'	Leo	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la visione è purtroppo molto disturbata dalla 42 Leonis di 6ª grandezza situata ad appena 4' NNE e che non si riesce a tenere fuori campo — 450x.
CGCG 94-10	gx	10h21m41s	+15°45.1'	Leo	24"	ottima / buono	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW — 450x.
CGCG 94-12	gx	10h21m50s	+15°42.9'	Leo	24"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W — 450x.
CGCG 94-13	gx	10h22m13s	+16°49.1'	Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25" — 450x.
CGCG 94-14	gx	10h22m07s	+17°50.3'	Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; altresì denominata Hickson 46A — 450x.
CGCG 94-15	gx	10h22m17s	+14°54.5'	Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; un piccolo e debolissimo oggetto diffuso appare quasi a ridosso NNW: da un controllo successivamente effettuato, quest'ultimo è risultato essere la PGC 1470443 — 450x.
CGCG 94-16	gx	10h22m21s	+14°27.7'	Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola, debole e diffusa, "soffocata" dalla luce di una stellina brillante di 10a grandezza situata al bordo NE; forse rotonda con Ø di 15"-20" — 450x.
CGCG 94-17	gx	10h22m24s	+15°44.7'	Leo	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE; forma una coppia ravvicinata con **MAC 1022+1545;** c'è un piccolo triangolo isoscele di stelline subito a N — 450x.
CGCG 94-19	gx	10h22m41s	+15°56.4'	Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 94-20	gx	10h22m38s	+19°23.8'	Leo	24"	m. buona / buono	relativamente facile, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge abbastanza contrastato sul disco; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 94-21	gx	10h22m48s	+14°55.9'	Leo	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 94-22	gx	10h22m46s	+19°47.3'	Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1022+1947 subito a E; rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione centrale molto evidente; la MAC è invece debolissima e di aspetto più uniforme, forse anch'essa rotonda con Ø simile — 450x.
CGCG 94-23	gx	10h22m57s	+18°20.7'	Leo	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 94-24	gx	10h23m00s	+18°51.5'	Leo	16"	buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, condensato, di max 30" di Ø che appare in visione distolta a 270x; a 380x si vede a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30".
CGCG 94-25	gx	10h23m10s	+17°57.7'	Leo	16"	ottima / m. buono	oggetto rotondo, molto debole e relativamente compatto, con Ø max di 20"; a 380x il campo oculare è quasi depleto.
CGCG 94-29	gx	10h24m09s	+17°03.5'	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione stellare — 450x.
CGCG 94-31	gx	10h24m21s	+15°45.2'	Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è disturbata da due stelline brillanti situate rispettivamente un paio di primi a N e a ENE — 450x.
CGCG 94-36	gx	10h24m41s	+15°43.9'	Leo	24"	m. buona / buono	più debole della precedente, dalla quale dista 5' verso ESE, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con due stelline brillanti a NW; una stellina appena percettibile si trova a 1' W — 450x.
CGCG 94-37	gx	10h24m46s	+14°58.6'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N; forma una coppia ravvicinata con **2MASS 10244497+1459073** situata 30" a NNW; quest'ultima è ancora più piccola e debole, ma visibile abbastanza facilmente spingendo a 580x: appare a tratti condensata con Ø di 10"-12" *(presenza di debole chiarore lunare)*.
CGCG 94-40	gx	10h25m05s	+17°13.9'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 94-42	gx	10h25m18s	+17°08.4'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" (situata 3' a SE di NGC 3229) — 450x.
CGCG 94-43	gx	10h25m06s	+17°16.2'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 94-44	gx	10h25m18s	+20°00.8'	Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; meglio osservabile in visione distolta a 270x.
CGCG 94-46	gx	10h25m37s	+17°04.8'	Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e condensata, con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 94-47	gx	10h25m41s	+15°11.3'	Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina subito a W (in realtà è una coppia, ma la componente più a S appare solo a momenti); una stellina più evidente si trova 1' a S della galassietta — 450x.
CGCG 94-55	gx	10h26m48s	+16°51.0'	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 94-56	gx	10h26m55s	+16°07.4'	Leo	24"	m. buona / ottimo	rotonda, diffusa con Ø di 45" e condensazione centrale marcata; situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti 4' — 400x.
CGCG 94-57	gx	10h27m52s	+16°09.1'	Leo	24"	m. buona / ottimo	è molto debole, ma salta fuori facilmente in visione distolta a 400x, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
CGCG 94-58	gx	10h27m04s	+16°01.1'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e appena più brillante all'interno — 400x.
CGCG 94-59	gx	10h27m05s	+16°04.3'	Leo	24"	m. buona / buono	piccolo oggetto rotondo, molto debole e condensato, esteso max 20"; appare facilmente in visione distolta a 400x.
CGCG 94-60	gx	10h27m03s	+18°07.7'	Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S ed estesa una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 450x.
CGCG 94-61	gx	10h27m07s	+18°41.6'	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 40" — 450x.
CGCG 94-62	gx	10h27m15s	+16°03.0'	Leo	24"	m. buona / ottimo	allungata da NW a SE, dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale marcata di aspetto stellare — 400x.
CGCG 94-64	gx	10h27m14s	+18°05.0'	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; una doppia serrata con entrambe le componenti brillanti di 8ª grandezza (denominate SAO 99129 e -30) si trova 1.5' a SW e disturba un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 94-65	gx	10h27m33s	+16°57.1'	Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e debole, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a un paio di primi scarsi SE — 450x.
CGCG 94-66	gx	10h27m49s	+17°33.3'	Leo	24"	ottima / m. buono	(questa galassia e la successiva CGCG 94-69 è uno dei due membri più cospicui dell'ammasso **AGC 1018**) molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE che in realtà è risultata essere la **PGC 1535640** — 450x.
CGCG 94-67	gx	10h27m52s	+16°09.1'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole chiazza circolare molto diffusa e di luminosità uniforme con Ø di 45"; è situata un paio di primi a W di una stellina brillante — 450x.
CGCG 94-69	gx	10h28m06s	+17°28.0'	Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (questa gx e la precedente CGCG 94-66 è uno dei 2 membri più cospicui dell'ammasso **AGC 1018**) — 450x.
CGCG 94-70	gx	10h28m12s	+18°36.4'	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata ~ da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' SSE; disturbata dalla SAO 99140 di 8ª grandezza situata 3' a W — 450x.
CGCG 94-71	gx	10h28m40s	+14°20.1'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; disturbata dalla SAO 99150 di 6ª grandezza situata un paio di primi a E — 450x *(presenza di debole chiarore lunare)*.
CGCG 94-73	gx	10h29m03s	+19°44.8'	Leo	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 40" — 380x.
CGCG 94-75	gx	10h29m49s	+16°10.9'	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 94-77	gx	10h30m21s	+15°11.5'	Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con piccola condensazione centrale poco contrastata; si trova a ridosso di 3 stelline abbastanza brillanti allineate in direzione NE-SW — 450x.
CGCG 94-79	gx	10h21m23s	+19°45.3'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
CGCG 94-81	gx	10h31m28s	+19°42.4'	Leo	24"	m. buona / ottimo	più facile di CGCG 94-79, dalla quale dista 3' a SSE, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
CGCG 94-83	gx	10h31m39s	+19°27.1'	Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare a 380x a meno di 1' S di una stellina brillante.
CGCG 94-84	gx	10h32m00s	+14°34.9'	Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NNE (che ha una tenue compagna verso E) — 450x.
CGCG 94-85	gx	10h32m34s	+19°46.2'	Leo	24"	ottima / m. buono	diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 94-89	gx	10h34m09s	+19°42.3'	Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' e di luminosità uniforme — 270x.
CGCG 94-90	gx	10h34m13s	+14°57.5'	Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
CGCG 94-92	gx	10h37m57s	+15°28.6'	Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 94-95	gx	10h36m10s	+16°12.9'	Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di 40"-45"; tutto sommato è preferibile non scalare per ridurre il fastidio di una doppia serrata situata 1' a NE — 450x.
CGCG 94-97	gx	10h37m20s	+17°01.8'	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 94-98	gx	10h37m25s	+18°04.0'	Leo	16"	discreta / ottimo	è osservabile a 380x, piccola, debole, abbastanza compatta, con Ø ~ 20" e condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stella brillante a 1' verso S che interferisce.
CGCG 94-100	gx	10h39m26s	+17°49.8'	Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 94-103	gx	10h41m43s	+18°20.4'	Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti, or da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
CGCG 94-104	gx	10h41m59s	+18°20.5'	Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 94-105	gx	10h42m06s	+18°15.0'	Leo	24"	ottima / m. buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", con tenue bulge diffuso e poco contrastato; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 94-108	gx	10h42m21s	+16°17.2'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco disturbata da una stella brillante di 9ª grandezza situata 3' a W — 450x.
CGCG 94-111	gx	10h42m36s	+15°44.9'	Leo	24"	m. buona / buono	diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 94-112	gx	10h42m40s	+16°17.5'	Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di CGCG 94-108 osservata subito prima e dalla quale dista 4.5' verso E, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e debolmente condensata; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' SW — 450x.
CGCG 95-7	gx	10h44m23s	+18°29.3'	Leo	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di 45", di aspetto ben regolare, diffusa e appena più brillante all'interno — 380x.
CGCG 95-13	gx	10h45m22s	+16°19.8'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; la visione è un po' disturbata dalla SAO 99276 di 8ª grandezza situata 3.5' a W — 450x.
CGCG 95-14	gx	10h45m30s	+17°37.2'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un piccolo nucleo poco contrastato; meglio evidente a 340x.
CGCG 95-23	gx	10h48m08s	+14°41.6'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 95-30	gx	10h49m14s	+15°48.3'	Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 95-32	gx	10h49m42s	+17°31.0'	Leo	16"	buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di 25"-30" — 380x.
CGCG 95-34	gx	10h49m44s	+16°16.6'	Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un tenue nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NE; forma una coppia ravvicinata con **MAC 1049+1616** situata a ridosso NW — 450x.
CGCG 95-35	gx	10h50m07s	+16°17.9'	Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso S — 450x
CGCG 95-39	gx	10h50m33s	+15°54.7'	Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 95-40	gx	10h50m50s	+16°25.7'	Leo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 95-44	gx	10h51m25s	+19°00.8'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 400x.
CGCG 95-47	gx	10h51m45s	+15°57.9'	Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a ridosso SW e una molto debole al bordo meridionale — 450x.
CGCG 95-48	gx	10h51m45s	+17°45.4'	Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 95-49	gx	10h51m49s	+16°00.0'	Leo	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva chiazza di forma indistinta; in visione distolta appare estesa 30"-35"; la **MAC 1051+1559**, situata a ridosso E, appare per prima — 450x.
CGCG 95-50	gx	10h51m51s	+17°50.3'	Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di CGCG 95-48, osservata subito prima, rotonda con Ø poco maggiore (35"), diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso SW, mentre una stellina brillante si trova a 1' verso N — 450x.
CGCG 95-52	gx	10h52m21s	+17°56.1'	Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 95-57	gx	10h53m13s	+16°14.1'	Leo	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo brillante, compatto, esteso 15"-20" circonfuso da un alone estremamente tenue, grosso modo rotondo con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 95-59	gx	10h53m30s	+18°55.8'	Leo	16"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo stellare marcato circonfuso da un piccolo alone rotondo esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' verso N — 380x.
CGCG 95-61	gx	10h54m28s	+17°45.5'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, con nucleo stellare marcato, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 570x.
CGCG 95-63	gx	10h54m43s	+16°04.7'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni poco più di 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 95-66	gx	10h54m53s	+14°25.4'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 95-67	gx	10h54m59s	+14°16.3'	Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 95-69	gx	10h55m47s	+14°51.9'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele col vertice più acuto che punta a NNW — 450x.
CGCG 95-70	gx	10h55m44s	+17°00.3'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 95-73	gx	10h56m35s	+16°47.5'	Leo	24"	m. buona / buono	relativamente facile e compatta, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 95-74	gx	10h57m00s	+18°13.5'	Leo	24"	m. buona / buono	debole chiazza di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 95-86	gx	11h00m04s	+17°25.5'	Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 450x.
CGCG 95-88	gx	11h00m27s	+14°52.0'	Leo	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; forma un triangolo rettangolo con 2 stelline brillanti situate 2' NNW e 2.5' WNW (situata 3' a E di NGC 3485 già rosservata col 24" in altra data) — 495x.
CGCG 95-91	gx	11h01m13s	+16°43.5'	Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø inferiore a 40" e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 95-98	gx	11h03m00s	+17°19.8'	Leo	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 95-102	gx	11h03m37s	+17°18.9'	Leo	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 95-103	gx	11h03m39s	+19°19.7'	Leo	24"	m. buona / buono	allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 95-104	gx	11h04m32s	+17°07.7'	Leo	24"	m. buona / buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 95-106	gx	11h05m00s	+14°53.7'	Leo	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE — 495x.
CGCG 95-107	gx	11h05m32s	+17°38.4'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; meglio visibile a 450x per ridurre l'abbagliamento di una stella brillante di 9ª grandezza situata 2.5' a NW; una stellina si trova invece a 1' SE.
CGCG 96-7	gx	11h11m03s	+19°11.5'	Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 96-9	gx	11h12m29s	+19°49.1'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 96-16	gx	11h15m33s	+17°29.7'	Leo	16"	discreta / ottimo	osservabile a tratti in visione distolta a meno di 1' SE di una stellina brillante; è poco più debole di NGC 3602, da cui dista 6' NW, e presenta un nucleo stellare — 380x.
CGCG 96-24	gx	11h17m58s	+17°26.5'	Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 96-30	gx	11h20m50s	+19°22.5'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1.5' verso S — 400x.
CGCG 96-33	gx	11h21m38s	+16°01.9'	Leo	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a prima vista rotonda con Ø, ma osservando più attentamente si nota che è poco allungata da N a S con dimensioni ~ 40"×30"; c'è una stellina un paio di primi a NNW — 495x.
CGCG 96-40	gx	11h25m18s	+17°48.5'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina a 1' N — 450x.
CGCG 96-43	gx	11h25m53s	+18°35.9'	Leo	24"	m. buona / ottimo	facile, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" e un nucleo stellare evidente; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
CGCG 96-48	gx	11h27m19s	+19°46.5'	Leo	24"	m. buona / ottimo	è un'elusiva galassietta, non più estesa di 15" o 20"; salta fuori a tratti in visione distolta — 450x.
CGCG 96-52	gx	11h28m27s	+19°11.1'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso NW — 450x.
CGCG 96-55	gx	11h29m13s	+19°46.3'	Leo	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 97-12	gx	11h34m21s	+15°39.6'	Leo	24"	buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e appena più brillante all'interno — 400x.
CGCG 97-14	gx	11h35m00s	+15°41.1'	Leo	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata da una stellina brillante a 1' NW — 400x.
CGCG 97-19	gx	11h36m17s	+15°28.2'	Leo	24"	buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e a tratti poco più brillante all'interno — 400x.
CGCG 97-21	gx	11h36m28s	+19°48.7'	Leo	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo di 30" di Ø, relativamente facile, poco diffuso e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 97-23	gx	11h36m51s	+20°00.3'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø > 30" — 570x.
CGCG 97-27	gx	11h36m54s	+19°59.8'	Leo	24"	m. buona / ottimo	si trova a 45" SE di CGCG 97-23, debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni appena maggiori di UGC 6583 situata 1.5' a S; il rapporto tra gli assi è grosso modo lo stesso; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso S, più o meno a metà strada tra la gx e UGC 6583 — 570x.
CGCG 97-35	gx	11h38m36s	+17°49.4'	Leo	24"	m. buona / ottimo	è una piccola e debole chiazza diffusa, approssim. circolare, di luminosità uniforme, con Ø di una 20-ina di secondi e che a prima vista sembra aggettare a NW di una stellina brillante che disturba l'osservazione — 450x.
CGCG 97-39	gx	11h39m14s	+17°03.0'	Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 97-42	gx	11h39m49s	+16°58.8'	Leo	24"	buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 450x, allineata ed equidistante con 2 stelline a SSW (quella più meridionale è più brillante); a tratti allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15".
CGCG 97-45	gx	11h39m56s	+16°57.3'	Leo	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 97-46	gx	11h39m54s	+17°52.9'	Leo	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 495x.
CGCG 97-50	gx	11h40m16s	+17°27.4'	Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare evidente — 570x.
CGCG 97-62	gx	11h42m15s	+19°58.6'	Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un gruppo situato subito a E di NGC 3816 — piccola e relativamente compatta allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso SW — 400x.
CGCG 97-63	gx	11h42m16s	+20°02.9'	Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 97-62 — debolissima e molto piccola, appare in visione distolta all'incirca a metà strada tra la precedente e la successiva, ma non sembra più estesa di 12" o 15" — 400x.
CGCG 97-64	gx	11h42m15s	+20°05.9'	Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 97-62 — molto debole leggermente condensata, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 400x.
CGCG 97-68	gx	11h42m24s	+20°07.1'	Leo	24"	m. buona / ottimo	è la più facile del gruppo di CGCG 97-62: allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare — 400x.
CGCG 97-71	gx	11h42m42s	+15°21.4'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e solo a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 97-72	gx	11h42m45s	+20°01.9'	Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 97-62 — molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 400x.
CGCG 97-73	gx	11h42m56s	+19°58.0'	Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 97-62 — debolissima e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 97-74	gx	11h42m59s	+20°05.2'	Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 97-62 — molto debole, a tratti leggermente condensata, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 400x.
CGCG 97-79	gx	11h43m13s	+20°00.3'	Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 97-62 — è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 400x come un baffo orientato da E a W ed esteso una 20-ina di secondi; c'è una stellina evidente a 1' verso N.
CGCG 97-83	gx	11h43m31s	+19°37.4'	Leo	16"	m. buona / ottimo	oggetto rotondo molto debole con Ø di una 30-ina di secondi, appena condensato che appare abbastanza facilmente a 380x.
CGCG 97-90	gx	11h43m57s	+19°57.2'	Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto molto piccolo, di 15"-20" di Ø che appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x quando si osserva NGC 3842.
CGCG 97-92	gx	11h43m58s	+20°11.1'	Leo	24"	m. buona / buono	debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 97-93	gx	11h44m00s	+19°46.7'	Leo	16"	m. buona / ottimo	molto piccola con nucleo stellare, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 97-98	gx	11h44m09s	+16°22.3'	Leo	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 97-99	gx	11h44m08s	+19°44.3'	Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima galassietta rotonda di luminosità uniforme, diffusa e di ~ 20" di Ø — 380x.
CGCG 97-101	gx	11h44m19s	+19°50.7'	Leo	16"	buona / buono	fa parte, assieme a CGCG 97-105 e CGCG 97-110, di un terzetto serrato situato a metà strada tra NGC 3837 ed NGC 3860 — è debole, ma relativamente facile da vedere, di luminosità uniforme e poco allungata da NW a SE con dimensioni ~ 40"×30" — 270x.
CGCG 97-105	gx	11h44m21s	+19°49.5'	Leo	16"	buona / buono	fa parte assieme alla precedente di un terzetto serrato — molto debole e piccola, di luminosità uniforme, situata a ridosso verso S di una stellina di 14ª grandezza — 270x.
CGCG 97-109	gx	11h44m28s	+19°44.1'	Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola con Ø max di una 15-ina di secondi e nucleo stellare visibile a 380x.
CGCG 97-110	gx	11h44m25s	+19°49.7'	Leo	16"	buona / buono	fa parte, assieme a CGCG 97-101 e CGCG 97-105, di un terzetto serrato situato a metà strada tra NGC 3837 ed NGC 3860 — molto debole, di luminosità uniforme appena più evidente della prima elencata, ma molto stemperata sul fondo cielo, estesa per 30 o 40 secondi al massimo — 270x.
CGCG 97-111	gx	11h44m25s	+20°06.5'	Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 97-112	gx	11h44m30s	+20°04.6'	Leo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale evidente (fa parte dell'ammasso **AGC 1367**) — 450x.
CGCG 97-113	gx	11h44m47s	+19°46.0'	Leo	16"	m. buona / ottimo	assieme a CGCG 97-114 forma una coppia di minuscoli e debolissimi oggetti visibili solo a tratti a 380x; hanno Ø di 10" o 15" e condensazione stellare; il 2º è appena più evidente (a bassi ingrandimenti potrebbero essere scambiati per 2 stelline).
CGCG 97-114	gx	11h44m48s	+19°46.4'	Leo	16"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 97-113**
CGCG 97-115	gx	11h44m47s	+19°52.6'	Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, estesa una 20-ina di secondi, appare solo a tratti in visione distolta, ma è preferibile scalare a 270x.
CGCG 97-131	gx	11h45m15s	+19°50.7'	Leo	16"	m. buona / ottimo	debole, piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 380x.
CGCG 97-152	gx	11h47m39s	+19°56.3'	Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; a prima vista sembra di luminosità uniforme, ma a tratti, osservando a 450x, appaiono tenue irregolarità di luce all'interno.
CGCG 97-155	gx	11h48m03s	+20°00.4'	Leo	24"	m. buona / buono	rotonda con Ø > 30", diffusa e con evidente condensazione centrale — 450x.
CGCG 97-157	gx	11h49m20s	+15°24.5'	Leo	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 97-162	gx	11h50m51s	+20°03.0'	Leo	16"	buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, piccola, con Ø massimo di una 30-ina di secondi — 270x.
CGCG 98-15	gx	11h58m47s	+15°43.0'	Com	24"	buona / m. buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 98-22	gx	12h01m38s	+14°29.0'	Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 98-23	gx	12h01m44s	+17°53.9'	Com	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
CGCG 98-33	gx	12h03m21s	+16°30.6'	Vir	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MCG+3-31-26 situata a ridosso SW; sono 2 galassiette molto piccole e relativamente compatte con Ø di una 20-ina di secondi; i dischi si sovrappongono a mo' di un "8", ma i nuclei stellari si riescono a separare a 400x.
CGCG 98-34	gx	12h03m24s	+20°01.4'	Com	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola; si riesce a vedere con una certa facilità solo a 380x, anche per separarla angolarmente da una stellina brillante situata a neppure 1' ESE che infastidisce; a tratti, in visione distolta, appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15".
CGCG 98-36	gx	12h03m31s	+17°09.0'	Com	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 450x.
CGCG 98-37	gx	12h03m36s	+16°03.3'	Com	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina subito a N e una più brillante un paio di primi a NW — 495x.
CGCG 98-43	gx	12h04m14s	+14°30.0'	Com	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 98-47	gx	12h04m49s	+14°29.7'	Com	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e una piccola condensazione centrale molto evidente — 450x.
CGCG 98-48	gx	12h04m51s	+19°14.8'	Com	16"	ottima / ottimo	debole, ma facilmente visibile in visione distolta a 380x, rotonda con Ø di 25"-30" e appena più brillante all'interno.
CGCG 98-52	gx	12h05m33s	+14°29.4'	Com	24"	m. buona / m. buono	debolissima, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×15" — 450x.
CGCG 98-59	gx	12h07m10s	+16°59.7'	Leo	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, di luminosità uniforme, con Ø di 45" — 380x.
CGCG 98-60	gx	12h07m12s	+16°58.1'	Leo	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva galassietta che appare solo a tratti in visione distolta a meno di 2' S di CGCG 98-59, ma non riesco a capire com'è orientata — 380x.
CGCG 98-61	gx	12h07m18s	+16°50.5'	Com	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso SE — 570x.
CGCG 98-70	gx	12h09m33s	+17°00.8'	Com	16"	buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda, Ø 40" e con condensazione centrale visibile a tratti — 270x.
CGCG 98-71	gx	12h09m36s	+17°48.7'	Com	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 45" — 450x.
CGCG 98-73	gx	12h09m39s	+17°51.4'	Com	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina percettibile a momenti al bordo E — 450x.
CGCG 98-75	gx	12h10m06s	+20°12.9'	Com	24"	ottima / buono	piccola chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 98-78	gx	12h10m40s	+17°52.7'	Com	24"	ottima / m. buono	forma una coppia con CGCG 98-81 situata 1.5' a NE — piccola, poco diffusa e con condensazione stellare abbastanza marcata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 98-81	gx	12h10m42s	+17°53.2'	Com	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 98-85	gx	12h11m15s	+17°53.3'	Com	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda con Ø di max 30"; presenta una piccola e tenue condensazione centrale visibile a 380x.
CGCG 98-87	gx	12h11m22s	+19°05.3'	Com	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 1' W — 450x.
CGCG 98-89	gx	12h11m38s	+16°28.7'	Com	16"	buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda, Ø 40" e con condensazione centrale visibile a tratti — 270x.
CGCG 98-93	gx	12h11m58s	+20°01.6'	Com	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø analogo a quello di CGCG 98-75 osservata subito prima — 450x.
CGCG 98-97	gx	12h12m25s	+15°23.8'	Com	28"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da N a S, dimensioni < 30"×10" e con evidente condensazione centrale — 495x.
CGCG 98-101	gx	12h13m07s	+16°05.1'	Com	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale — 400x.
CGCG 98-102	gx	12h03m09s	+16°17.8'	Com	24"	m. buona / m. buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge abbastanza contrastato sul disco — 400x.
CGCG 98-122	gx	12h16m17s	+18°24.8'	Com	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto piccola, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a momenti orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 98-123	gx	12h16m22s	+15°15.7'	Com	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1.5' NW e una molto debole alla stessa distanza verso NE — 495x.
CGCG 98-124	gx	12h16m29s	+14°29.8'	Com	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø e gradatamente più brillante verso l'interno; è di aspetto simile a IC 3080 facente parte dello stesso gruppo — 400x.
CGCG 98-127	gx	12h16m42s	+18°22.7'	Com	24"	ottima / m. buono	anche questa, come CGCG 98-122 dalla quale dista 6' a ESE, è molto piccola e relativamente compatta, ma decisamente più facile da vedere, rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
CGCG 98-132	gx	12h17m27s	+17°39.0'	Com	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
CGCG 99-18	gx	12h20m14s	+17°20.8'	Com	24"	ottima / m. buono	relativamente facile e compatta, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata a 4.5' NE della SAO 100047 di magnitudine 8.5 — 450x.
CGCG 99-20	gx	12h20m47s	+17°01.0'	Com	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente brillante, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; poco disturbata dalla SAO 100055 di 8a grandezza situata 2.5' a SE — 450x.
CGCG 99-22	gx	12h21m11s	+17°38.3'	Com	16"	buona / buono	molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, allungata ~ da E a W con dimensioni 40"×25" — 270x.
CGCG 99-53	gx	12h26m50s	+16°16.3'	Com	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e compatta, rotonda con Ø max di 15" — 450x.
CGCG 99-59	gx	12h27m39s	+18°26.1'	Com	16"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, piccola, rotonda con Ø max di 30"; appare solo in visione distolta scalando a 188x.
CGCG 99-61	gx	12h28m09s	+20°10.8'	Com	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso E — 450x.
CGCG 99-64	gx	12h28m36s	+19°28.2'	Com	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e una piccola condensazione centrale evidente; c'è una doppia stretta e molto sbilanciata a un paio di primi SE — 450x.
CGCG 99-79	gx	12h32m04s	+20°09.5'	Com	24"	ottima / m. buono	molto piccola e condensata, a 340x sembra ancora di aspetto stellare con una luminosità confrontabile con la stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 99-84	gx	12h32m36s	+18°01.4'	Com	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a poco più di 1' SSE — 450x.
CGCG 99-100	gx	12h34m53s	+14°16.8'	Com	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 99-108	gx	12h40m20s	+15°56.1'	Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 100-22	gx	13h02m43s	+15°30.4'	Com	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, allungata da N a s di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; è situata in mezzo a 2 stelle brillanti distanti 7' e orientate da NW a SE — 450x.
CGCG 100-25	gx	13h03m41s	+14°55.1'	Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 100-26	gx	13h03m56s	+14°54.5'	Com	24"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo lucore diffuso e di luminosità uniforme, forse rotondo con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a NE; a ridosso S appare quasi elusivamente una sorta di stellina sfuocata, estesa sì e no 10" che da un controllo successivo è risultata essere MAC 1303+1454 — 450x.

CGCG 101-3	gx	13h07m34s	+16°22.4'		Com	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 101-22	gx	13h19m28s	+14°34.7'		Com	24"	m. buona / buono	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta, non più estesa di 10" o 15" — 450x.
CGCG 101-24	gx	13h19m52s	+14°23.4'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente facile, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 101-26	gx	13h20m07s	+14°32.6'		Com	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e molto piccola, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 101-29	gx	13h21m26s	+14°43.7'		Com	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, a 450x appare grosso modo rotonda con Ø > 20".
CGCG 101-42	gx	13h25m10s	+17°03.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	è un debole lucore assai stemperato sul fondo cielo e di forma indistinta; solo a tratti, a 380x, appare poco allungata da NW a SE con dimensioni ~ 45"×30"; è situata poco più di 1' a S della più occidentale di una coppia di stelline brillanti e orientate da WNW a ESE.
CGCG 101-47	gx	13h26m33s	+14°25.2'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 101-51	gx	13h27m14s	+19°48.2'		Com	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto molto piccolo che appare solo a tratti in visione distolta a 270x (purtroppo il campo a questo ingrandimento, è quasi depleto).
CGCG 101-56	gx	13h29m29s	+16°26.8'		Com	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente brillante, compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline a E e a S — 450x.
CGCG 101-59	gx	13h29m44s	+17°00.3'		Com	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo W — 450x.
CGCG 102-11	gx	13h32m57s	+16°38.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e leggermente condensata; ci sono 2 stelline a ridosso: una a SE e un'altra brillante a SW; quest'ultima tende probabilmente a cancellare parte dell'alone della gx — 570x.
CGCG 102-20	gx	13h34m19s	+17°50.9'		Com	16"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata ~ da NE a SW per 40" — 270x.
CGCG 102-23	gx	13h36m54s	+17°24.0'		Boo	16"	m. buona / ottimo	assieme a CGCG 102-24 forma una coppia di piccoli e deboli oggetti abbastanza facili a 270x e distanti ~ 1' in direzione N-S, con condensazione centrale evidente e a prima vista di aspetto simile; a 380x, tuttavia, la 1ª presenta un alone molto stemperato ed esteso una 40-ina di secondi, mentre la 2ª è più piccola e compatta.
CGCG 102-24	gx	13h36m54s	+17°24.0'		Boo	16"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 102-23**
CGCG 102-25	gx	13h36m53s	+15°58.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; poco disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a E — 450x.
CGCG 102-27	gx	13h36m54s	+16°57.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; situata tra due stelline brillanti orientate da NE a SW — 450x.
CGCG 102-34	gx	13h41m33s	+17°28.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina appena percettibile subito a S — 450x.
CGCG 102-36	gx	13h42m24s	+14°44.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 102-37	gx	13h43m04s	+16°42.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NNE a SSW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 102-40	gx	13h43m35s	+18°03.4'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, di 45" di Ø e con condensazione centrale di aspetto stellare che però si apprezza meglio scalando a 270x.
CGCG 102-42	gx	13h43m46s	+18°01.4'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 25"-30"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
CGCG 102-46	gx	13h44m18s	+14°29.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline situate 1.5' a E e 2' a SE — 450x.
CGCG 102-56	gx	13h46m49s	+14°24.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina brillante a 1.5' WNW — 450x.
CGCG 102-58	gx	13h46m52s	+17°42.0'		Boo	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, rotonda, di luminosità uniforme, abbastanza compatta e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 102-59	gx	13h47m45s	+16°58.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con piccolo bulge poco contrastato; c'è una stellina al bordo meridionale e una più debole a 1' verso E — 450x.
CGCG 102-61	gx	13h48m14s	+15°25.6'		Boo	24"	ottima / buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N che da un controllo successivamente effettuato è risultata in realtà essere il nucleo stellare della **MAC 1348+1525** — 450x.
CGCG 102-63	gx	13h49m05s	+17°14.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo, a tratti appare grosso modo circolare con Ø di 30"-35"; meglio comunque scalare a 340x.
CGCG 102-66	gx	13h50m33s	+16°06.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 102-72	gx	13h52m15s	+17°17.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 102-75	gx	13h53m05s	+15°50.7'		Boo	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 102-76	gx	13h53m09s	+14°39.4'		Boo	24"	ottima / buono	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; un piccolo oggetto diffuso molto debole situato a ridosso N della gx sembra a 1ª vista deformarla: da un controllo effettuato successivamente, questo è risultato essere la MAC 1353+1439; la visione è comunque un po' disturbata dalla SAO 100750 di 8ª grandezza situata a poco più di 2' NNE e che anche a 450x non si riesce a tenere fuori campo.
CGCG 102-77	gx	13h53m10s	+17°19.9'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' S — 450x.
CGCG 103-8	gx	13h55m34s	+14°45.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 103-16	gx	13h56m19s	+18°17.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x come una sorta di baffo esteso ~ 30" di luminosità uniforme che si diparte verso NE da una stellina brillante.
CGCG 103-18	gx	13h56m52s	+15°42.1'		Boo	24"	ottima / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a poco più di 1' verso S — 450x.
CGCG 103-20	gx	13h57m04s	+14°41.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto piccola, compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 103-30	gx	13h58m13s	+17°31.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 103-32	gx	13h58m29s	+17°23.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, poco più brillante all'interno con nucleo di aspetto quasi stellare osservabile a 380x; è rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a ridosso verso E (e un'altra a 1.5' S) — 380x.
CGCG 103-34	gx	13h58m55s	+15°38.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e una piccola condensazione centrale abbastanza contrastata; c'è una stellina a ridosso E e una abbastanza brillante a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 103-37	gx	13h59m20s	+14°58.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 103-38	gx	13h59m23s	+15°11.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; occorre tuttavia scalare a 340x, perché il campo locale è quasi depleto: l'unico riferimento è una debole stellina situata 2.5' a N.
CGCG 103-39	gx	14h00m02s	+15°55.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 103-44	gx	14h01m16s	+15°46.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE e una più brillante a 1' SSW — 450x.
CGCG 103-48	gx	14h02m35s	+14°32.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (a perpendicolo con IC 970 situata 1' a N); c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso N — 450x.
CGCG 103-55	gx	14h03m46s	+14°52.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
CGCG 103-60	gx	14h04m27s	+16°18.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 103-65	gx	14h04m50s	+16°16.9'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, pressoché circolare con Ø di una 30-ina di secondi o poco più — 450x.
CGCG 103-66	gx	14h05m04s	+16°34.9'		Boo	24"	buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale evidente; c'è una stellina a 1' SSW — 570x.
CGCG 103-68	gx	14h06m12s	+14°42.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 103-70	gx	14h06m22s	+16°29.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' scarsi verso SW; non sembra gran che disturbata dalla SAO 100850 di 9ª grandezza situata 3' scarsi a SW — 450x.
CGCG 103-71	gx	14h06m47s	+15°02.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 103-73	gx	14h07m22s	+15°04.6'		Boo	24"	m. buona / ottimo	abbastanza facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 103-74	gx	14h07m17s	+15°10.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, disturbata da una stellina a ridosso verso N (o NW, non si riesce bene a capire), forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
CGCG 103-77	gx	14h07m37s	+16°01.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, poco diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20"; meglio evidente a 450x.
CGCG 103-78	gx	14h08m14s	+16°10.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; anche questa è meglio evidente a 450x.
CGCG 103-80	gx	14h08m28s	+15°55.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e tenue condensazione stellare — 450x.
CGCG 103-86	gx	14h09m04s	+17°46.0'		Boo	16"	discreta / ottimo	molto debole e condensata, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 103-92	gx	14h09m55s	+15°10.6'		Boo	24"	buona / buono	allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge diffuso appena più contrastato del disco — 400x.
CGCG 103-93	gx	14h09m51s	+17°35.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 103-97	gx	14h10m04s	+17°33.1'		Boo	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva galassietta che salta fuori solo in visione distolta; a tratti appare orientata da NW a SW con dimensioni ~ 30"×20", ma occorre spingere a 380x.
CGCG 103-101	gx	14h10m24s	+16°06.8'		Boo	24"	buona / buono	allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW e un'altra di egual magnitudo a 1.5' verso E — 400x.
CGCG 103-102	gx	14h10m24s	+16°11.0'		Boo	24"	buona / buono	debolissima, appare a 400x alternando gli occhi; non ho notato un miglioramento scalando a 280x; in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20".
CGCG 103-122	gx	14h13m53s	+15°30.6'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da E a W, estesa meno di 1' e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 103-124	gx	14h14m27s	+15°36.7'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto piccola e compatta, allungata da NW a SE, con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 103-128	gx	14h15m14s	+15°52.7'		Boo	24"	ottima / ottimo	relativamente facile e compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 103-130	gx	14h15m19s	+16°53.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' scarso NW e un'altra più debole a poco più di 1' NE — 450x.
CGCG 104-39	gx	14h30m51s	+14°30.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 104-40	gx	14h31m01s	+14°25.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 104-42	gx	14h32m46s	+14°35.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 104-65	gx	14h40m28s	+14°49.6'		Boo	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' E — 450x.
CGCG 104-67	gx	14h40m55s	+14°20.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; stellina appena percettibile quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 105-10	gx	14h44m14s	+15°35.0'		Boo	24"	buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 105-14	gx	14h44m27s	+15°28.8'		Boo	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 30" — 450x.
CGCG 105-15	gx	14h45m13s	+17°45.6'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 105-16	gx	14h45m08s	+19°25.9'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere a 380x, rotonda, di 30" di Ø, diffusa e con piccola condensazione centrale.
CGCG 105-18	gx	14h45m17s	+17°23.9'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 105-31	gx	14h48m23s	+18°21.2'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di ~ 1' e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
CGCG 105-32	gx	14h48m43s	+18°17.4'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissima e condensata; a tratti appare poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20", ma è meglio scalare a 270x.
CGCG 105-34	gx	14h49m05s	+16°44.1'		Boo	24"	ottima / buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE — 450x.
CGCG 105-36	gx	14h49m15s	+16°39.0'		Boo	24"	ottima / buono	appare come una debole stellina sfuocata, estesa una decina di secondi e condensata — 450x.
CGCG 105-37	gx	14h49m24s	+16°43.9'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 105-38	gx	14h49m36s	+16°39.8'		Boo	24"	ottima / buono	relativamente facile e compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE; situata tra 2 stelline distanti 1.5' e orientate da NE a SW — 450x.
CGCG 105-41	gx	14h50m02s	+17°02.8'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con 20"-25" max di Ø — 380x.
CGCG 105-45	gx	14h51m17s	+15°26.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 105-46	gx	14h51m13s	+16°41.8'		Boo	24"	buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' verso W e un'altra poco più debole subito a SE — 450x.
CGCG 105-50	gx	14h52m23s	+17°07.3'		Boo	16"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 105-52	gx	14h52m32s	+17°03.8'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto piccola e compatta, condensata e con Ø di 15" o 20"; si trova al vertice SE di un piccolo triangolo rettangolo formato con 2 stelline distanti 1' — 380x.
CGCG 105-53	gx	14h52m43s	+16°54.2'		Boo	24"	ottima / buono	poco diffusa, e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NNE a SSW (come la coppia di stelline 2.5' a NW) con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 105-55	gx	14h52m56s	+16°42.9'		Boo	16"	ottima / ottimo	assieme a CGCG 105-56 forma una coppia di debolissimi oggetti rotondi di ~ 30" di Ø distanti circa 1.5' in direzione N-S e appena percettibili a 270x; il 1º appare un attimo prima.
CGCG 105-56	gx	14h52m55s	+16°42.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	v. **CGCG 105-55**
CGCG 105-68	gx	14h54m48s	+18°33.9'		Boo	16"	buona / mediocre	debolissima galassietta che solo a tratti, in visione distolta, si riesce a percepire come orientata da NW a SE, con dimensioni ~ 40"×30" — 270x.
CGCG 105-74	gx	14h55m20s	+16°30.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 105-75	gx	14h55m18s	+16°32.9'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' S; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 105-77	gx	14h55m57s	+18°02.8'		Boo	16"	buona / mediocre	galassietta piccola ed elusiva, non più estesa di 30"; appare solo a tratti in visione distolta a 270x.
CGCG 105-79	gx	14h56m51s	+14°23.6'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, appare a tratti in visione distolta, grosso modo rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
CGCG 105-91	gx	15h00m55s	+16°56.8'		Boo	24"	ottima / buono	piccola, compatta e relativamente brillante, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 105-92	gx	15h01m18s	+16°46.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole e molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 105-93	gx	15h01m36s	+16°43.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 105-97	gx	15h02m45s	+16°49.6'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 105-99	gx	15h02m53s	+16°55.2'		Boo	24"	ottima / buono	è una sorta di debole alone molto diffuso che aggetta a NE di una stella brillante (per confronto quella presente 5' a NW di luminosità simile ne è priva); a tratti appare un debolissimo nucleo a ridosso della stella — 450x.
CGCG 105-103	gx	15h04m32s	+17°18.9'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S; meglio visibile a 270x.
CGCG 105-104	gx	15h04m30s	+17°40.2'		Boo	24"	buona / ottimo	fa parte di un trio assieme alla successiva e a MCG+3-38-83 — piccola, molto debole, ma relativamente compatta, a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 450x.
CGCG 105-105	gx	15h04m29s	+17°41.5'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 105-107	gx	15h04m47s	+16°20.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	assieme alle due successive forma un trio di galassiette situate ai vertici di un triangolo rettangolo isoscele coi cateti orientati secondo le direzioni cardinali — questa è debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 105-109	gx	15h04m57s	+16°18.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø < 15"; c'è una stellina brillante a 1.5' NE — 450x.
CGCG 105-110	gx	15h04m57s	+16°20.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 105-112	gx	15h05m24s	+16°24.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø < 15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 105-113	gx	15h05m25s	+16°25.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 106-9	gx	15h08m10s	+20°10.9'		Boo	16"	discreta / ottimo	debolissima e molto diffusa, appare tuttavia abbastanza facilmente in visione distolta quando si fissa la stellina situata un paio di primi a W: è allungata da E a W con dimensioni grosso modo 45"×30" — 270x.
CGCG 106-10	gx	15h08m22s	+19°11.5'		Boo	16"	m. buona / ottimo	fa parte del terzetto di IC 1096-7 — debolissima, appena condensata, diffusa ed estesa max 20"; salta fuori in visione distolta a 380x.
CGCG 106-20	gx	15h12m25s	+18°38.8'		Ser	16"	m. buona / buono	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, estesa una 40-ina di secondi; è situata a W di una coppia di deboli stelline orientate da NW a SE e distanti meno di 30" — 270x.
CGCG 106-24	gx	15h16m12s	+17°10.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NNW e un'altra molto debole alla stessa distanza verso NNE — 450x.
CGCG 106-26	gx	15h16m40s	+19°05.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E e una più debole subito a SW — 450x.
CGCG 106-31	gx	15h18m12s	+14°36.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, estesa non più di 12" o 15"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S — 450x.
CGCG 106-32	gx	15h21m13s	+15°18.8'		Ser	24"	buona / m. buono	molto diffusa, presenta un nucleo quasi stellare molto brillante circonfuso da un alone molto tenue che in visione distolta appare chiaramente orientato da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 106-33	gx	15h21m29s	+15°08.2'		Ser	24"	buona / m. buono	presenta un nucleo stellare molto marcato immerso in un tenue alone orientato anche questo da N a S, ma con dimensioni grosso modo 40"×20" — 450x.
CGCG 106-36	gx	15h22m57s	+15°00.0'		Ser	24"	buona / m. buono	a prima vista appare grosso modo rotonda, mentre in visione distolta sembra piuttosto allungata da E a W, dimensioni ~ 30"×15" e con nucleo stellare visibile a tratti (quasi si trattasse di una sorta di "barra" immersa in un alone circolare) — 450x.
CGCG 106-38	gx	15h25m05s	+19°50.1'		Ser	16"	m. buona / buono	debolissima macchiolina rotonda, diffusa e con Ø di ~ 30"; è abbastanza facile in visione distolta a 270x; c'è una stellina a 1' NE e un'altra più debole alla stessa distanza verso SW.
CGCG 106-44	gx	15h26m53s	+15°17.9'		Ser	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 106-45	gx	15h26m47s	+16°33.5'		Ser	24"	ottima / buono	piccola, debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E — 450x.
CGCG 106-46	gx	15h28m18s	+15°23.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S — 450x.
CGCG 107-2	gx	15h32m17s	+18°40.5'		Ser	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 107-10	gx	15h35m53s	+14°31.0'		Ser	24"	m. buona / m. buono	è un piccolo lucore diffuso abbastanza facile e di aspetto uniforme, rotondo con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso E, la quale fa parte di una piccola losanga irregolare di 5 componenti; una stellina più debole sta all'interno dell'asterismo e subito a SW della gx — 450x.
CGCG 107-13	gx	15h36m36s	+17°20.3'		Ser	16"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, estesa forse una 40-ina di secondi, osservabile in visione distolta a 270x.
CGCG 107-16	gx	15h37m55s	+16°18.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø < 40" e una condensazione centrale visibile solo a momenti; c'è una stellina molto debole a 1' NE — 450x.
CGCG 107-17	gx	15h38m58s	+16°27.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni inferiori a 30"×20" — 450x.
CGCG 107-20	gx	15h39m33s	+17°25.9'		Ser	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a 1.5' verso S e un'altra ancora più debole a 2.5' SW — 270x.
CGCG 107-26	gx	15h41m55s	+16°50.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, a tratti appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 107-40	gx	15h49m03s	+17°56.4'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 107-41	gx	15h49m16s	+17°49.0'		Ser	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa 1' scarso; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 450x.
CGCG 107-42	gx	15h49m23s	+18°33.5'		Ser	16"	m. buona / m. buono	è un oggetto elusivo, molto piccolo, di 15"-20" max di Ø, che appare solo a tratti in visione distolta a 380x a ridosso W di una stellina brillante; è situata sul prolungamento tra quest'ultima e una stellina un paio di primi a E.
CGCG 107-48	gx	15h51m12s	+18°33.8'		Ser	24"	ottima / m. buono	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni poco maggiori di 30"×20" e con piccola condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina subito a N — 450x.
CGCG 107-50	gx	15h52m22s	+16°27.8'		Ser	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 107-53	gx	15h54m06s	+18°38.9'		Ser	16"	m. buona / m. buono	è debolissima, ma a tratti appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; a 380x si stempera eccessivamente, ma ne diviene più evidente la stellina situata ~ 2' NW.
CGCG 107-55	gx	15h54m10s	+19°06.4'		Ser	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SE e una percettibile solo a momenti a ridosso NW — 450x.
CGCG 108-8	gx	15h54m49s	+18°55.0'		Ser	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 108-12	gx	15h56m24s	+16°31.4'		Ser	16"	buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, poco diffusa, di Ø 30"-35" e con evidente nucleo stellare — 380x.
CGCG 108-13	gx	15h56m34s	+20°03.1'		Ser	16"	ottima / m. buono	rotonda, diffusa, di 30"-35" di Ø, con condensazione centrale piccola ma poco contrastata sul disco — 380x.
CGCG 108-19	gx	15h57m43s	+06°13.1'		Ser	24"	m. buona / discreto	piccola, rotonda, diffusa, con Ø poco superiore a 20" e condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina brillante al bordo W — 450x.
CGCG 108-22	gx	15h58m02s	+14°57.9'		Ser	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 108-23	gx	15h58m03s	+16°20.9'		Ser	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a E (la quale fa parte di un minuscolo asterismo di 4 stelline) — 450x.
CGCG 108-30	gx	15h58m48s	+14°58.1'		Ser	24"	m. buona / discreto	assieme a CGCG 108-31 e CGCG 108-33 fa parte di un terzetto molto allungato osservato a 450x — piccola, debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale evidente.
CGCG 108-31	gx	15h58m54s	+14°58.9'		Ser	24"	m. buona / discreto	assieme alla precedente e alla successiva fa parte di un terzetto molto allungato osservato a 450x — debole, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" e di luminosità pressoché uniforme.
CGCG 108-33	gx	15h59m05s	+14°55.7'		Ser	24"	m. buona / discreto	assieme alle due precedenti fa parte di un terzetto molto allungato osservato a 450x — debole, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme.
CGCG 108-34	gx	15h59m16s	+15°10.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø una 30-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 108-38	gx	16h00m18s	+15°45.4'		Ser	24"	ottima / buono	relativamente compatta, con condensazione centrale evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 340x.
CGCG 108-43	gx	16h00m43s	+16°43.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 108-45	gx	16h00m52s	+15°09.0'		Ser	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 108-49	gx	16h00m52s	+17°32.7'		Her	24"	ottima / m. buono	debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; ci sono due stelline a W e NW — 450x.
CGCG 108-53	gx	16h01m07s	+19°26.9'		Her	16"	ottima / m. buono	debole oggetto rotondo appena più brillante all'interno con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 108-57	gx	16h01m17s	+17°46.0'		Her	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a ENE; molto disturbata dalla 5 Herculis arancione di 5ª grandezza situata ad appena 3' verso N — 450x.
CGCG 108-58	gx	16h01m23s	+16°13.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 108-59	gx	16h01m21s	+16°40.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi scarsi — 450x.
CGCG 108-61	gx	16h01m30s	+16°45.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 108-62	gx	16h01m28s	+17°14.4'		Her	24"	ottima / m. buono	piccola e debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 108-64	gx	16h01m37s	+16°25.9'		Her	16"	buona / ottimo	è un debole oggetto di luminosità uniforme, allungato da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 108-66	gx	16h02m02s	+16°26.1'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; forma una coppia con MAC 1601+1627, situata un paio di primi NW: quest'ultima è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appaiono entrambe in visione distolta a 380x fissando la stellina che si trova nel mezzo.
CGCG 108-68	gx	16h02m04s	+17°04.5'		Her	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 40" e con condensazione stellare; c'è una coppia di stelline a 1' NW — 450x.
CGCG 108-70	gx	16h02m09s	+15°53.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce di luminosità uniforme, orientata da E a W estesa 45" — 450x.
CGCG 108-71	gx	16h02m13s	+15°56.2'		Her	16"	buona / ottimo	è forse la componente più debole di un terzetto cui appartiene UGC 10143, dalla quale dista 2.5' a SSW, e comunque la più difficile da vedere a 380x; è rotonda con Ø di 25"-30".
CGCG 108-72	gx	16h02m13s	+16°25.6'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 108-74	gx	16h02m22s	+16°09.5'		Her	24"	ottima / buono	fa parte dell'ammasso AGC 2147 — è un tenue baffo di luce orientato da N a S, esteso una 40-ina di secondi e con evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina subito a NE e una più brillante alla stessa distanza verso NW — 450x.
CGCG 108-76	gx	16h02m18s	+16°22.0'		Her	16"	buona / ottimo	poco più debole di UGC 10144, dalla quale dista poco più di 1' NNW, ma facilmente visibile a 380x; è rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme.
CGCG 108-79	gx	16h02m50s	+16°34.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 108-80	gx	16h02m47s	+19°47.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; poco disturbata dalla SAO 101893 di 9ª grandezza situata 1.5' a E — 450x.
CGCG 108-81	gx	16h02m59s	+15°50.6'		Her	24"	m. buona / discreto	poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20", diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 108-82	gx	16h03m15s	+16°24.2'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, poco allungata ~ da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 108-83	gx	16h03m33s	+16°19.4'		Her	16"	buona / ottimo	di dimensioni analoghe a CGCG 108-82 (ossia 45"×30"), ma poco più evidente; a 380x sembra persino di vedere, a tratti, una condensazione centrale molto tenue.
CGCG 108-87	gx	16h03m44s	+16°19.7'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare solo in visione distolta a 380x come una macchiolina rotonda di una 20-ina di secondi di Ø.
CGCG 108-88	gx	16h03m48s	+17°14.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma osservabile senza problemi in visione distolta a 450x, molto diffusa e solo a tratti leggermente condensata, rotonda con Ø > 30" — 450x.
CGCG 108-89	gx	16h03m54s	+14°38.1'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma osservabile senza problemi in visione distolta a 450x, molto diffusa e solo a tratti leggermente condensata, rotonda con Ø > 30" — 450x.
CGCG 108-91	gx	16h03m58s	+16°00.0'		Her	24"	m. buona / discreto	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 108-92	gx	16h03m57s	+16°21.7'		Her	24"	ottima / buono	rotonda con Ø < 30", poco diffusa e condensata — 340x.
CGCG 108-93	gx	16h04m03s	+17°17.0'		Her	16"	buona / mediocre	debole e diffusa, estesa una 30-ina di secondi, con nucleo stellare visibile a tratti — 270x.
CGCG 108-100	gx	16h04m36s	+16°54.2'		Her	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 108-102	gx	16h04m41s	+16°25.8'		Her	24"	ottima / buono	rotonda con Ø < 30", poco diffusa e con tenue condensazione centrale — 340x.
CGCG 108-103	gx	16h04m44s	+16°31.3'		Her	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 340x.
CGCG 108-105	gx	16h04m52s	+15°43.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra 2 stelline e distanti 1.5': una subito a N e l'altra più brillante a 1' S — 450x.
CGCG 108-106	gx	16h04m50s	+16°35.1'		Her	24"	ottima / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso E — 340x.
CGCG 108-107	gx	16h04m48s	+16°53.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 108-108	gx	16h04m45s	+17°26.9'		Her	16"	ottima / m. buono	molto piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, relativamente compatta e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 108-114	gx	16h05m21s	+15°44.2'		Her	24"	ottima / ottimo	è un baffo molto tenue e di luminosità uniforme, esteso una 30-ina di secondi che aggetta a S di una stellina brillante — 450x.
CGCG 108-115	gx	16h05m24s	+14°38.9'		Ser	16"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; è rotonda con Ø di ~ 40".
CGCG 108-117	gx	16h05m23s	+16°11.9'		Her	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1' SW (situata verso il margine meridionale dell'ammasso **AGC 2152**) — 450x.
CGCG 108-124	gx	16h05m29s	+19°56.5'		Her	16"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile a 380x, rotonda, diffusa con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno.
CGCG 108-125	gx	16h05m36s	+16°31.6'		Her	24"	ottima / buono	allungata da E a W con dimensioni 30"×20", poco diffusa e con condensazione centrale evidente — 340x.
CGCG 108-127	gx	16h05m37s	+18°16.4'		Her	16"	m. buona / discreto	fa parte dell'ammasso **AGC 2151** — molto debole, ma visibile senza troppe difficoltà in quanto piccola e compatta, grosso modo rotonda, con Ø di una 20-ina di secondi e con tenue condensazione centrale — 270x.
CGCG 108-129	gx	16h05m40s	+18°03.3'		Her	16"	ottima / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2151** — molto debole, diffusa con nucleo stellare abbastanza evidente a 380x.
CGCG 108-131	gx	16h05m47s	+15°47.5'		Her	16"	ottima / m. buono	fa parte del gruppo di UGC 10201 — molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e leggermente più brillante all'interno — 380x.
CGCG 108-135	gx	16h05m46s	+18°01.0'		Her	16"	ottima / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2151** — è un elusivo oggetto rotondo di max 20" di Ø che salta fuori solo a tratti in visione distolta a 380x; è situata a tra 2 deboli stelline orientate da NE a SW e distanti ~ 4'.
CGCG 108-139	gx	16h06m00s	+18°11.8'		Her	16"	ottima / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2151** — elusiva chiazza lattescente, a tratti allungata da E a W con dimensioni grosso modo 60"×30", ma molto stemperata sul fondo cielo; appare poco più contrastata a 380x.
CGCG 108-140	gx	16h06m02s	+18°40.1'		Her	16"	m. buona / buono	assieme a CGCG 108-141 forma una coppia di debolissimi oggetti rotondi di luminosità uniforme, con Ø max di 25"-30" e separati da 4' in direzione NNW-SSE (per confronto le 3 stelline leggermente arcuate situate a E sono poste in direzione E-W); la 2ª è più evidente — 380x.
CGCG 108-141	gx	16h06m07s	+18°36.4'		Her	16"	m. buona / buono	v. **CGCG 108-140**
CGCG 108-142	gx	16h06m19s	+16°25.8'		Her	16"	buona / ottimo	piccolo oggetto molto debole di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline situate 1' S e SW — 380x.
CGCG 108-149	gx	16h06m35s	+17°53.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	situata verso il bordo orientale dell'ammasso **AGC 2151** — molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 108-153	gx	16h06m50s	+14°47.9'		Ser	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; situata tra due stelline distanti 1' in direzione N-S — 450x.
CGCG 108-155	gx	16h07m03s	−15°35.6'		Ser	16"	m. buona / m. buono	fa parte del gruppo di UGC 10201 — molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×50" e con piccola condensazione centrale appena percettibile — 380x.
CGCG 108-163	gx	16h10m51s	+17°03.5'		Her	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni di 40"×30"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso NNE — 380x.
CGCG 108-164	gx	16h10m50s	+17°58.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' E e una appena percettibile alla stessa distanza verso SE — 450x.
CGCG 109-4	gx	16h19m37s	+15°16.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø < 30" e una piccola condensazione centrale evidente; è situata all'interno di un ampio asterismo romboidale formato da 4 stelle brillanti — 450x.
CGCG 109-11	gx	16h24m15s	+20°11.0'		Her	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; meglio osservabile a 270x.
CGCG 109-13	gx	16h24m37s	+19°30.4'		Her	16"	ottima / buono	è praticamente soffocata dalla SAO 102144 di 9ª situata a ridosso NE; solo a tratti in visione distolta e spingendo a 380x appare nell'alone della stella un elusivo aggetto all'incirca verso N che è come se ne intaccasse la rotondità — 380x.
CGCG 109-15	gx	16h25m38s	+16°27.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 109-34	gx	16h35m21s	+17°45.9'		Her	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 109-38	gx	16h40m03s	+15°53.0'		Her	24"	buona / ottimo	relativamente compatta e brillante, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso SE e un'altra a 1' NE — 450x.
CGCG 110-11	gx	16h49m44s	+17°51.8'		Her	16"	ottima / ottimo	debolissima, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' S; la gx è meglio contrastata a 270x.
CGCG 110-15	gx	16h52m51s	+17°26.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N e una molto debole quasi a ridosso SE; un oggetto debolissimo, poco più che una stellina sfuocata, appare in visione distolta quasi a ridosso E: da un controllo successivo è risultata essere **PGC 3090398** — 450x.
CGCG 111-12	gx	17h12m23s	+16°34.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" (o poco meno); c'è una stellina abbastanza brillante subito a N; meglio evidente scalando a 340x nonostante la presenza della SAO 102647 di magnitudo 8.5 situata 4' scarsi a S.
CGCG 111-14	gx	17h13m35s	+16°03.0'		Her	24"	buona / ottimo	relativamente facile, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso NE — 450x.
CGCG 111-16	gx	17h15m34s	+16°19.5'		Her	24"	buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 111-22	gx	17h20m17s	+19°19.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 111-24	gx	17h21m08s	+16°03.5'		Her	24"	buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza circolare diffusa con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso SE e una più distante a 1' NW — 450x.
CGCG 111-26	gx	17h22m00s	+18°34.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola, debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina subito a N — 450x.
CGCG 112-10	gx	17h35m34s	+20°47.8'		Her	16"	buona / buono	debolissima macchiolina estesa sì e no 20" e che appare solo in visione distolta a 1' S di una stellina brillante che disturba; a tratti sembra di vedere una nucleo stellare — 380x.
CGCG 112-13	gx	17h36m44s	+17°11.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 450x.
CGCG 112-16	gx	17h37m26s	+19°33.6'		Her	16"	buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso SW osservabile a 380x.

CGCG 112-19	gx	17h39m53s	+16°52.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 112-20	gx	17h39m49s	+19°47.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e più brillante al centro, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile subito a NE; un piccolo triangolo molto aperto di stelline si trova a NW della gx — 450x.
CGCG 112-21	gx	17h40m52s	+18°49.9'		Her	16"	ottima / m. buono	appare solo elusivamente; è infatti molto diffusa e stemperata sul fondo cielo e la sua luce si disperde quasi totalmente a ridosso di un paio di stelline in mezzo alle quali si trova la gx; è più facile scalando a 188x.
CGCG 112-23	gx	17h41m46s	+20°07.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata al centro di un triangolo isoscele molto allungato di stelline brillanti il cui vertice più acuto punta a NE; una stellina appena percettibile si trova subito a E della gx — 450x.
CGCG 112-27	gx	17h42m39s	+19°29.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SW e una coppia di deboli stelline dalla parte opposta — 450x.
CGCG 112-42	gx	17h47m53s	+17°39.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; un piccolo triangolo irregolare a 1' N — 450x.
CGCG 112-44	gx	17h48m13s	+17°06.0'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 40" e condensazione centrale visibile a tratti — 450x.
CGCG 112-45	gx	17h48m12s	+17°37.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi ed evidente condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 112-48	gx	17h48m53s	+17°57.2'		Her	16"	ottima / m. buono	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta a ridosso verso S di una stellina brillante; forse rotonda con Ø di appena 15" o 20" — 380x.
CGCG 112-50	gx	17h49m16s	+17°57.3'		Her	16"	ottima / m. buono	piccola lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, relativamente compatta estesa per ~ 30" e spessa sì e no 10" — 380x.
CGCG 112-59	gx	17h50m56s	+17°08.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata tra una doppia stretta sbilanciata a 1' SE e una debole stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 112-62	gx	17h51m15s	+15°49.2'		Her	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; allineata con due stelline a SW di cui una ridosso della galassia — 450x.
CGCG 113-1	gx	17h54m26s	+15°37.2'		Her	24"	buona / m. buono	debolissima, molto piccola e diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è situata a ridosso SE di una stellina che per quanto abbastanza debole disturba un po' la visione — 450x.
CGCG 113-11	gx	17h58m16s	+15°15.3'		Her	24"	buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina a ridosso N; una coppia di stelline più brillanti si trova a 1' verso N — 450x.
CGCG 113-12	gx	17h59m37s	+17°33.0'		Her	24"	buona / m. buono	debole, anche questa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 113-24	gx	18h09m26s	+19°07.0'		Her	16"	buona / ottimo	piccolo e debole oggetto pressoché circolare con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ~ 1' NNE e un'altra appena percettibile a eguale distanza verso S — 380x.
CGCG 113-29	gx	18h12m43s	+18°38.5'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e molto piccola, ma relativamente compatta, forse rotonda con Ø max di 20" — 270x.
CGCG 113-32	gx	18h14m18s	+15°30.3'		Her	24"	ottima / scarso	molto diffusa e con piccolo bulge abbastanza contrastato; in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una doppia stretta a ridosso verso E — 340x.
CGCG 114-5	gx	18h24m27s	+20°54.1'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma non riesco a capire com'è orientata; a tratti pare E-W, ma forse è rotonda; c'è una debole stellina a 1' verso N — 380x.
CGCG 114-6	gx	18h25m16s	+20°54.8'		Her	16"	buona / ottimo	piccola e debolissima, ma abbastanza facilmente osservabile in visione distolta a 380x; è orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele col vertice più acuto che punta a S.
CGCG 114-13	gx	18h34m28s	+18°58.5'		Her	16"	buona / ottimo	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a ridosso NW di una stellina; estesa non più di 30"; è poco più evidente scalando a 270x.
CGCG 114-17	gx	18h36m40s	+19°43.7'		Her	16"	buona / ottimo	salta fuori facilmente in visione distolta a 380x, rotonda con Ø di ~ 40" e di luminosità uniforme; forma un arco con 5 stelline.
CGCG 114-19	gx	18h36m50s	+19°51.0'		Her	16"	buona / ottimo	assai debole e molto piccola, compatta, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; è orientata da N a S con dimensioni 20"×10" (ultima gx osservata: albeggia).
CGCG 114-25	gx	18h38m26s	+17°11.8'		Her	16"	buona / ottimo	piccolo e debole oggetto rotondo di 25"-30" max di Ø e con condensazione centrale evidente a 380x; il campo è ricco di stelline.
CGCG 115-8	gx	06h42m14s	+26°03.0'		Gem	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; quasi allineata ed equidistante con 3 stelline a W; una stellina appena percettibile si trova a ridosso NE (situata ai margini alla Via Lattea) — 340x.
CGCG 115-9	gx	06h43m18s	+21°00.3'		Gem	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N e una doppia stretta a 1' S; il campo è molto ricco di stelline brillanti — 450x.
CGCG 115-10	gx	06h43m51s	+25°50.3'		Gem	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata a ridosso S di una doppia serrata (situata ai margini alla Via Lattea) — 450x.
CGCG 115-11	gx	06h44m17s	+25°56.1'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare come "incastrata" tra una stellina abbastanza brillante a W e una molto debole a E — 450x.
CGCG 115-14	gx	06h47m35s	+26°44.3'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina quasi a ridosso S; a 1' sempre verso S ce n'è un'altra più brillante — 450x.
CGCG 115-15	gx	06h48m17s	+25°31.6'		Gem	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 115-16	gx	06h49m48s	+25°41.3'		Gem	24"	ottima / discreto	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, estesa una 20-ina di secondi, situata a ridosso E di una stella brillante che ne maschera la forma — 450x.
CGCG 115-17	gx	06h49m56s	+25°42.3'		Gem	24"	ottima / discreto	debole baffo di luce di aspetto uniforme esteso una 40-ina di secondi che di diparte verso E da una stellina — 450x.
CGCG 115-19	gx	06h50m04s	+25°40.3'		Gem	24"	ottima / discreto	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 115-20	gx	06h50m04s	+26°22.9'		Gem	24"	ottima / discreto	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; una stellina appena percettibile e debolmente sfuocata appare solo a momenti a ridosso SE: da un controllo successivamente effettuato è risultata essere la 2MASS 06500464+2622498 — 450x.
CGCG 116-1	gx	06h53m03s	+23°08.1'		Gem	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e tenue nucleo stellare; situata all'interno — presso il bordo W — di un piccolo asterismo di forma vagamente triangolare costituito da 8 stelline (fra cui una doppia stretta) — 380x.
CGCG 116-8	gx	06h58m59s	+25°01.5'		Gem	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione stellare molto tenue; c'è una stellina a ridosso W e una a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 116-15	gx	07h04m18s	+23°54.1'		Gem	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø 40", molto diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 116-17	gx	07h06m14s	+23°35.1'		Gem	24"	m. buona / buono	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso N — 450x.
CGCG 116-18	gx	07h06m36s	+23°45.6'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni 20"×15"; la visione è disturbata da un piccolo triangolo isoscele molto aperto di stelline brillanti situato subito a NE che tendono a offuscare il campo circostante; una doppia serrata si trova a 1' scarso verso W — 450x.
CGCG 116-22	gx	07h07m27s	+23°06.6'		Gem	24"	m. buona / buono	debolissimo baffo di luce esteso 30"-35" con 2 stelline a ridosso rispettivamente a NW e SW (quest'ultima è più brillante); appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x; una stella luminosa situata 1' a N disturba molto l'osservazione.
CGCG 116-24	gx	07h08m03s	+22°12.0'		Gem	24"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, non più estesa di 15"; c'è una stellina a ridosso N (nel campo sono presenti alcune stelle molto brillanti) — 450x.
CGCG 116-25	gx	07h09m09s	+26°05.8'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso NW; una doppia dalle componenti brillanti situata 3.5' a SW disturba un po' la visione — 450x.
CGCG 116-29	gx	07h12m20s	+26°04.2'		Gem	24"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 116-38	gx	07h15m20s	+26°05.3'		Gem	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SW; 3 stelline molto deboli quasi allineate si trovano dalla parte opposta — 450x.
CGCG 116-40	gx	07h15m36s	+26°09.7'		Gem	24"	ottima / ottimo	debole, ma più facile di CGCG 116-38, dalla quale dista 6' scarsi a NE, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (o poco meno) e condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 116-43	gx	07h16m40s	+24°29.7'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata con due stelline a E (quella più occidentale è quasi a ridosso della gx) — 450x.
CGCG 116-47	gx	07h17m45s	+24°30.8'		Gem	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante al bordo NW; un'altra stella ancora più luminosa si trova poco più distante a NNE — 450x.
CGCG 116-48	gx	07h17m51s	+25°52.9'		Gem	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra due stelline abbastanza brillanti distanti 1.5' e orientate da ENE a WSW — 450x.
CGCG 116-51	gx	07h18m11s	+26°33.0'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; più che dalla Luna in falce avanzata è disturbata da una stella luminosa situata 1' a W; un'altra stellina brillante si trova quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 117-6	gx	07h18m25s	+25°56.3'		Gem	24"	ottima / discreto	debolissima e molto diffusa, estesa una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a NW; una debole stellina si trova a ridosso S — 450x.
CGCG 117-11	gx	07h20m37s	+24°57.3'		Gem	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SW; disturbata dalla SAO 79299 di 9ª grandezza situata ad appena 1.5' a N — 450x.
CGCG 117-12	gx	07h20m46s	+26°31.7'		Gem	24"	ottima / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 117-13	gx	07h20m50s	+23°22.1'		Gem	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a NW; una stellina brillante si trova invece a SE — 450x.
CGCG 117-14	gx	07h20m54s	+23°19.0'		Gem	24"	ottima / ottimo	abbastanza brillante, poco diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 117-16	gx	07h21m24s	+22°31.9'		Gem	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 117-17	gx	07h21m27s	+23°11.3'		Gem	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta un piccolo nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N; un'altra più brillante e poco più distante, sempre verso N — 450x.
CGCG 117-18	gx	07h21m34s	+23°32.9'		Gem	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa con Ø di 45" e nucleo stellare; ci sono 2 stelline brillanti disposte simmetricamente 1' NE e 1' NW — 380x.
CGCG 117-19	gx	07h22m18s	+22°02.7'		Gem	24"	ottima / discreto	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e una piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una doppia stretta a poco più di 1' SSE — 450x.
CGCG 117-21	gx	07h22m41s	+26°26.1'		Gem	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 117-23	gx	07h22m49s	+26°31.7'		Gem	24"	ottima / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; il campo è molto ricco di stelle, di cui alcune brillanti vicine alla gx — 450x.
CGCG 117-30	gx	07h23m11s	+23°39.7'		Gem	24"	ottima / discreto	debolissima chiazza lattiginosa di forma indistinta con due stelline abbastanza brillanti a ridosso W e S; è estesa una 30-ina di secondi; nonostante le diverse stelline luminose presenti nel campo è meglio definita scalando a 340x.
CGCG 117-32	gx	07h23m35s	+21°51.4'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 117-33	gx	07h23m40s	+22°38.7'		Gem	24"	ottima / discreto	è una piccola e debolissima chiazza circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso W — 450x.
CGCG 117-37	gx	07h25m47s	+25°42.7'		Gem	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline ravvicinate a ridosso verso E [in realtà ce ne sarebbe una terza, ma non l'ho vista] — 450x.
CGCG 117-40	gx	07h27m05s	+24°02.8'		Gem	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 117-41	gx	07h27m58s	+26°25.2'		Gem	24"	ottima / discreto	debolissima e piccola chiazza forse circolare con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta tra due stelline orientate da NNE a SSW e distanti 1.5' — 450x.
CGCG 117-42	gx	07h28m03s	+24°23.6'		Gem	24"	m. buona / ottimo	lucore molto debole diffuso e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientato da NW a SE con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è una stellina brillante al bordo N, una più debole a ridosso E e una 3a appena percettibile subito a W; meglio contrastata scalando a 340x — 450x.
CGCG 117-45	gx	07h29m09s	+26°24.1'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 117-46	gx	07h30m14s	+24°29.5'		Gem	24"	ottima / ottimo	è una debolissima chiazza rotondeggiante con Ø di una 30-ina di secondi e luminosità uniforme; forma una coppia ravvicinata con NGC 2398 situata una 40-ina di secondi a ESE — 450x.
CGCG 117-49	gx	07h31m49s	+25°37.0'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia subito a W e una doppia stretta a 1' NE — 450x.
CGCG 117-52	gx	07h33m09s	+24°04.2'		Gem	24"	ottima / discreto	debolissimo baffo di luce osservabile in visione distolta e che a prima vista sembra dipartirsi a SW di una stellina abbastanza brillante che tende a offuscarlo; a 450x pare esteso una 40-ina di secondi.
CGCG 117-56	gx	07h34m55s	+24°27.2'		Gem	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (o poco meno) — 450x.
CGCG 117-57	gx	07h35m52s	+24°28.8'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una doppia stretta dalle componenti brillanti a 1' verso S — 450x.
CGCG 117-59	gx	07h37m43s	+21°38.1'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina quasi a ridosso E — 450x.
CGCG 117-60	gx	07h37m46s	+21°38.3'		Gem	24"	ottima / discreto	situata a ridosso NE della precedente è debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
CGCG 117-61	gx	07h40m24s	+21°40.8'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' scarso WSW — 450x.
CGCG 117-63	gx	07h40m27s	+25°07.9'		Gem	24"	ottima / discreto	piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 117-66	gx	07h41m59s	+23°10.6'		Gem	24"	ottima / discreto	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N; una stellina brillante si trova invece a 1' scarso verso NW — 450x.
CGCG 117-67	gx	07h42m52s	+22°06.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E e un'altra appena percettibile a ridosso di NW — 450x.
CGCG 117-69	gx	07h43m48s	+25°52.0'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; si trova al vertice rettangolo di un minuscolo triangolo isoscele formato con una stellina appena percettibile a NW e un'altra poco più evidente a NE — 450x.
CGCG 118-3	gx	07h45m26s	+23°59.4'		Gem	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, grosso modo rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 118-4	gx	07h46m13s	+21°59.7'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (non ho visto la MAC 0745+2159 situata 3.5' a W) — 450x.
CGCG 118-5	gx	07h46m16s	+24°05.9'		Gem	24"	m. buona / buono	anche questa è debolissima, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; appare a SW di un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a "Y" (la componente più meridionale è brillante), ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 118-6	gx	07h47m05s	+22°17.6'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e condensata, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" (molte stelline presenti attorno alla gx) — 450x.
CGCG 118-7	gx	07h47m41s	+22°46.9'		Gem	24"	ottima / buono	piccola, debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 118-8	gx	07h48m05s	+22°54.0'		Gem	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 118-10	gx	07h48m53s	+21°44.8'		Gem	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 118-11	gx	07h49m19s	+21°50.1'		Gem	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso W — 380x.
CGCG 118-13	gx	07h50m38s	+22°59.5'		Gem	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo NW e una a ridosso W; una doppia stretta si trova a ridosso SE; la visione è tuttavia un po' disturbata dalla SAO 79738 di magnitudo 8.7 situata 2' scarsi a N — 450x.
CGCG 118-14	gx	07h50m41s	+23°29.6'		Gem	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' W — 450x.
CGCG 118-18	gx	07h53m45s	+24°15.2'		Gem	24"	m. buona / buono	debolissima chiazza che aggetta a S di una stellina brillante per una 30-ina di secondi (questa stellina fa parte di un asterismo di 7 componenti foggiato a guisa di "L" coi vettori uguali) — 450x.
CGCG 118-19	gx	07h53m45s	+21°03.0'		Gem	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio osservabile a 270x.
CGCG 118-20	gx	07h54m21s	+25°51.5'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e molto debole, in visione distolta appare rotonda con Ø di 12"-15" (allineata ed equidistante con MAC 0754+2554 a NW e CGCG 118-21 a SE) — 450x.
CGCG 118-21	gx	07h54m31s	+25°49.0'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (allineata ed equidistante con CGCG 118-20 e MAC 0754+2554 a NW) — 450x.
CGCG 118-22	gx	07h55m28s	+23°44.8'		Gem	24"	m. buona / buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta come confinata tra due stelline brillanti orientate da E a W e distanti una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 118-28	gx	07h57m22s	+25°52.0'		Gem	24"	m. buona / discreto	appare come una debole stellina appena sfuocata; non è comunque più estesa di 10" — 450x.
CGCG 118-36	gx	07h59m53s	+23°23.4'		Gem	24"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 118-37	gx	07h59m54s	+24°00.7'		Gem	24"	ottima / buono	piccola, debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 118-38	gx	08h00m04s	+23°26.3'		Gem	24"	ottima / buono	piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' scarso verso SW — 450x.
CGCG 118-39	gx	08h00m04s	+25°39.9'		Gem	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 118-40	gx	08h00m29s	+21°08.2'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, ma appare facilmente in visione distolta a 450x, grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 2 stelline rispettivamente a 1' N e 1' W.
CGCG 118-43	gx	08h01m13s	+25°33.4'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 118-44	gx	08h01m15s	+26°20.0'		Gem	24"	m. buona / m. buono	assieme alle due successive forma un terzetto allineato in direzione NNW-SSE — piccola e molto debole, relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 118-46	gx	08h01m21s	+26°16.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, approssim. circolare con Ø di 12" o 15" — 450x.
CGCG 118-47	gx	08h01m27s	+26°14.3'		Gem	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 118-53	gx	08h03m09s	+24°39.4'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 118-54	gx	08h03m16s	+24°40.6'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	situata un paio di primi a NE della precedente, è rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e appena più evidente — 450x.
CGCG 118-56	gx	08h03m28s	+25°06.1'		Cnc	24"	ottima / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 118-60	gx	08h06m12s	+20°59.8'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø < 20"; poco visibile a 340x; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
CGCG 118-62	gx	08h07m10s	+24°23.3'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 118-69	gx	08h10m11s	+24°52.4'		Cnc	24"	ottima / buono	debolissimo lucore diffuso e di forma indistinta situato a ridosso NW di una stellina abbastanza brillante; in visione distolta non sembra più estesa di 20"; poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 119-3	gx	08h10m02s	+22°51.7'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 119-10	gx	08h12m16s	+26°12.1'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 119-12	gx	08h13m17s	+22°38.9'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 119-13	gx	08h13m26s	+25°07.6'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 450x.
CGCG 119-17	gx	08h15m04s	+25°30.5'		Cnc	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a 1' NNE — 450x.
CGCG 119-18	gx	08h15m29s	+26°09.0'		Cnc	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 119-27	gx	08h16m57s	+20°30.7'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso N; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
CGCG 119-28	gx	08h17m25s	+21°09.8'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' E — 450x.
CGCG 119-30	gx	08h17m28s	+21°10.9'		Cnc	24"	m. buona / buono	situata 1' a NNE della precedente, è molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a SSE — 450x.
CGCG 119-35	gx	08h17m57s	+22°26.1'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 450x.
CGCG 119-43	gx	08h18m49s	+21°13.1'		Cnc	16"	ottima / m. buono	debolissima, di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso N osservabile a 380x.
CGCG 119-44	gx	08h18m50s	+22°06.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare a tratti in visione distolta quasi a ridosso N di una stellina; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 119-47	gx	08h19m05s	+21°47.5'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, a tratti leggermente condensata, approssim. rotonda con Ø > 30"; situata a ridosso W di un piccolo arco di 3 stelline di cui le 2 più a N si trovano al bordo della gx — 380x.
CGCG 119-53	gx	08h19m20s	+21°03.5'		Cnc	16"	ottima / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto di luminosità uniforme e Ø max di 25"-30"; c'è una stellina a ~ 45" verso SW — 380x.
CGCG 119-56	gx	08h19m41s	+22°02.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a NW — 450x.
CGCG 119-61	gx	08h20m11s	+21°04.1'		Cnc	16"	ottima / ottimo	è un piccolo ed elusivo oggetto rotondo di max 20" di Ø che appare in visione distolta a 380x.
CGCG 119-66	gx	08h20m49s	+22°39.5'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 119-69	gx	08h21m26s	+21°07.8'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W; la gx si trova al vertice più acuto di un piccolo triangolo isoscele formato con due stelline brillanti a SSW e SSE — 450x.
CGCG 119-72	gx	08h22m16s	+21°05.5'		Cnc	24"	ottima / molto buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE; un mini triangolo rettangolo di 3 stelline si trova a 1' SW — 450x.
CGCG 119-77	gx	08h22m53s	+21°04.7'		Cnc	24"	ottima / molto buono	relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 119-82	gx	08h23m55s	+20°58.7'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo molto diffuso e con Ø di 25"-30" — 380x.
CGCG 119-98	gx	08h26m37s	+22°25.3'		Cnc	24"	ottima / molto buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata tra due stelline, una a 1' NE e l'altra appena percettibile alla stessa distanza verso SW — 450x.
CGCG 119-101	gx	08h27m01s	+21°42.4'		Cnc	24"	buona / buono	facile, piccola, relativamente compatta e gradatamente più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15". È situata 4' N di UGC 4014 (una gx già osservata col 16" a 380x in una notte favolosa!) — 450x.
CGCG 119-104	gx	08h27m08s	+22°50.5'		Cnc	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo di 25"-30" di Ø e di luminosità uniforme; salta fuori in visione distolta quando si osserva UGC 4416 dalla quale dista 3' SW — 380x.
CGCG 119-119	gx	08h30m49s	+24°36.9'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, con tenue bulge abbastanza evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia serrata di stelline quasi a ridosso verso SW; la gx è situata al vertice rettangolo di un triangolo isoscele formato con 2 stelline brillanti — 450x.
CGCG 119-126	gx	08h35m25s	+23°31.5'		Cnc	16"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
CGCG 119-130	gx	08h36m07s	+25°06.7'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 120-1	gx	08h36m06s	+25°36.6'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø < 20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con una coppia di stelline a N — 450x.
CGCG 120-9	gx	08h37m58s	+25°10.4'		Cnc	24"	ottima / molto buono	poco più debole di CGCG 120-14 — osservata per prima — diffusa e di aspetto più uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 120-10	gx	08h38m05s	+25°19.7'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti poco allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×15"; c'è una stellina a ridosso SE; forma una coppia ravvicinata con MAC 0838+2519 situata 1' scarso più a W — 450x.
CGCG 120-11	gx	08h38m07s	+24°53.1'		Cnc	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 120-12	gx	08h38m07s	+25°16.3'		Cnc	24"	ottima / molto buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso W e una più debole alla stessa distanza NE — 450x.
CGCG 120-14	gx	08h38m10s	+25°05.9'		Cnc	24"	ottima / molto buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a NW — 450x.
CGCG 120-17	gx	08h39m11s	+26°13.2'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e una tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 120-21	gx	08h41m10s	+20°53.8'		Cnc	24"	ottima / molto buono	è un tenuissimo lucore di forma indistinta che appare a momenti in mezzo a due stelline abbastanza brillante orientate da NE a SW e distanti una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 120-22	gx	08h41m28s	+25°14.1'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 120-27	gx	08h45m02s	+22°36.2'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una debole stellina a 1' W — 450x.
CGCG 120-29	gx	08h45m32s	+23°36.4'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
CGCG 120-32	gx	08h46m32s	+20°50.8'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto piccola e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø max di 15"; è situata a ridosso SE di una coppia di stelline distanti poco più delle dimensioni della gx e orientate da NE a SW — 450x.
CGCG 120-35	gx	08h47m47s	+23°53.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di 15"; c'è una stellina visibile solo a momenti subito a W — 450x.
CGCG 120-37	gx	08h48m25s	+23°43.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 120-38	gx	08h48m25s	+23°50.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 120-40	gx	08h50m08s	+21°41.2'		Cnc	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è praticamente allineata ed equidistante con 2 stelline situate a E — 450x.
CGCG 120-49	gx	08h54m21s	+23°09.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena evidente — 450x.
CGCG 120-50	gx	08h54m41s	+20°35.0'		Cnc	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina al bordo NE — 450x.
CGCG 120-54	gx	08h57m22s	+22°56.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' N — 450x.
CGCG 120-57	gx	09h01m11s	+20°36.6'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 20"×15" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 121-2	gx	09h02m27s	+22°39.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 121-6	gx	09h03m28s	+25°38.4'		Cnc	24"	ottima / buono	relativamente facile e compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con una stellina al bordo N (quest'ultima fa parte di un piccolo triangolo irregolare con componenti di uguale luminosità) — 450x.
CGCG 121-7	gx	09h03m25s	+20°40.1'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 340x.
CGCG 121-8	gx	09h03m52s	+20°33.2'		Cnc	24"	ottima / buono	debolissima, appare in visione distolta, forse rotonda con Ø < 30"; c'è una doppia appena percettibile a poco più di 1' verso N — 450x.
CGCG 121-11	gx	09h04m05s	+22°03.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 121-21	gx	09h07m17s	+22°57.1'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e compatta, purtroppo immersa nell'intenso bagliore della SAO 80642, una doppia serrata con componenti di 6ª e 7ª grandezza situata 3' a NE; la gx è rotonda con Ø max di 15" — 450x.
CGCG 121-23	gx	09h08m12s	+22°00.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	è doppia, formata da due oggetti ravvicinati, poco diffusi, rotondi con Ø di una 15-ina di secondi e che in visione distolta paiono immersi in una chiazza lattiginosa molto tenue; quello a S è appena più evidente — 450x.
CGCG 121-25	gx	09h09m22s	+24°14.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 121-27	gx	09h08m34s	+25°13.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 121-28	gx	09h09m33s	+20°24.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
CGCG 121-29	gx	09h09m33s	+20°28.8'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 121-33	gx	09h10m30s	+20°33.7'		Cnc	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MAC 0910+2033** situata a ridosso N; a 340x tendono a prima vista a fondersi insieme in un unico oggetto orientato da N a S, mentre a 450x si riescono a separare abbastanza facilmente; le due galassiette sono molto piccole, estese < 20"; la MAC è stranamente più evidente.
CGCG 121-36	gx	09h13m16s	+23°05.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1.5' WNW — 450x.
CGCG 121-37	gx	09h13m23s	+22°51.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 121-39	gx	09h13m42s	+20°34.2'		Cnc	16"	buona / m. buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø di ~ 30" e leggermente condensata; c'è un piccolo triangolo rettangolo isoscele a 2.5' E e coi cateti lunghi 1' — 380x.
CGCG 121-40	gx	09h14m18s	+22°16.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 121-50	gx	09h17m23s	+24°53.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 121-53	gx	09h18m16s	+20°22.1'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 30" o 35"; c'è una stellina a 1' SSE — 450x.
CGCG 121-54	gx	09h18m27s	+20°24.4'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10" e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W— 450x.
CGCG 121-59	gx	09h20m46s	+22°04.6'		Leo	24"	m. buona / buono	molto diffusa e con piccolo bulge evidente, approssim. rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina brillante al bordo meridionale — 450x.
CGCG 121-61	gx	09h21m08s	+21°38.5'		Cnc	24"	buona / buono	debolissima, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 121-62	gx	09h21m17s	+24°31.1'		Cnc	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 121-67	gx	09h23m21s	+25°01.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; situata in mezzo a due stelline abbastanza brillanti orientate da ENE a WSW — 450x.
CGCG 121-71	gx	09h23m29s	+25°46.1'		Leo	24"	buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 121-72	gx	09h23m31s	+22°18.5'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 121-74	gx	09h23m42s	+22°20.4'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, appare in visione distolta molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 121-75	gx	09h23m43s	+22°54.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	presenta un bulge molto brillante circonfuso da un alone ovale tenue e diffuso, orientato da N a S di dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 121-77	gx	09h23m49s	+24°48.9'		Leo	16"	buona / m. buono	fa parte assieme a CGCG 121-79 del terzetto di UGC 4994 — debolissima, ma relativamente compatta, molto piccola, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni max di 30"×15" — 380x.
CGCG 121-79	gx	09h24m02s	+22°20.1'		Leo	24"	m. buona / buono	fa parte assieme alla precedente del terzetto di UGC 4994 — allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20", poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 121-81	gx	09h24m13s	+24°40.5'		Leo	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta una condensazione centrale abbastanza evidente a 380x; c'è una stellina a 1' verso NW.
CGCG 121-85	gx	09h24m41s	+23°32.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina al bordo SW — 450x.
CGCG 121-86	gx	09h25m28s	+23°36.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 121-87	gx	09h25m40s	+22°19.4'		Leo	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 121-89 situata a ridosso verso N; è molto debole e ancora più piccola di quest'ultima — 570x.
CGCG 121-89	gx	09h25m41s	+22°19.8'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
CGCG 121-91	gx	09h26m22s	+22°07.8'		Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata tra 2 deboli stelline orientate da E a W e distanti 1.5' — 450x.
CGCG 121-92	gx	09h26m28s	+22°05.2'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø poco inferiore a quello di CGCG 121-94 — 450x.
CGCG 121-94	gx	09h26m37s	+22°05.3'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, debole e rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e tenue condensazione centrale osservabile a 450x.
CGCG 121-99	gx	09h27m25s	+23°01.8'		Leo	16"	m. buona / ottimo	salta fuori abbastanza facilmente anche in visione diretta a 380x; è rotonda con Ø max di una 20-ina di secondi.
CGCG 121-100	gx	09h27m46s	+23°56.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 450x.
CGCG 122-2	gx	09h29m23s	+25°05.1'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, poco allungata da E a W, di dimensioni 50"×40" e con piccolo nucleo visibile solo a momenti; c'è una stellina brillante a 1.5' E e una più debole alla stessa distanza verso NE — 450x.
CGCG 122-3	gx	09h29m31s	+25°33.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 122-5	gx	09h29m44s	+21°26.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di 30"-35" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stella brillante a 1' E (fa parte di una coppia larga di uguale luminosità orientata da E a W) — 450x.
CGCG 122-6	gx	09h29m40s	+22°57.7'	q 143	Leo	16"	ottima / ottimo	si riesce a osservare con un certo agio solo in visione distolta a 380x; è piccola, relativamente compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; è situata a ridosso verso NW di un piccolo pentagono di stelline facili esteso 4'. E' erroneamente riportata sull'Uranometria come NGC 288.
CGCG 122-7	gx	09h29m47s	+21°26.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	diffusa, di aspetto e dimensioni simili a CGCG 122-5, situata 1' a SW, ma con condensazione centrale più evidente — 450x.
CGCG 122-13	gx	09h31m15s	+25°15.2'		Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme; sembra a prima vista di forma rettangolare, con dimensioni 30"×20" e orientata da N a S — 450x.
CGCG 122-15	gx	09h33m16s	+23°08.1'		Leo	16"	buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 30"; c'è un piccolo triangolo di stelle un paio di primi a W — 380x.

CGCG 122-19	gx	09h34m27s	+24°13.5'		Leo	16"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, a tratti appare allungata da NE a SW con dimensioni max di 30"×15" e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE; una stellina brillante si torva invece a 1' verso S — 380x.
CGCG 122-20	gx	09h35m00s	+25°55.1'		Leo	24"	buona / buono	molto piccola, poco diffusa e molto debole, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 20"×15" — 450x.
CGCG 122-26	gx	09h36m01s	+25°41.9'		Leo	24"	buona / buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 122-28	gx	09h36m19s	+23°44.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 122-30	gx	09h36m57s	+21°27.9'		Leo	24"	buona / m. buono	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo E; una coppia serrata di stelline quasi a ridosso verso N (e che non riesco a vedere individualmente) dà l'impressione di un piccolo oggetto diffuso appena percettibile — 450x.
CGCG 122-33	gx	09h37m21s	+25°53.9'		Leo	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
CGCG 122-37	gx	09h37m42s	+21°17.5'		Leo	24"	buona / buono	chiazza circolare molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 122-40	gx	09h38m32s	+23°53.9'		Leo	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile subito a E e una più evidente a 1' verso S — 450x.
CGCG 122-44	gx	09h39m57s	+24°57.3'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; poco disturbata da una stella brillante situata 2.5' a SW — 450x.
CGCG 122-46	gx	09h40m44s	+21°14.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NW e un'altra appena percettibile dalla parte opposta — 450x.
CGCG 122-47	gx	09h40m58s	+25°28.2'		Leo	24"	buona / m. buono	lama di luce molto debole, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 122-48	gx	09h41m01s	+26°06.5'		Leo	24"	buona / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di di 12"-15" — 450x.
CGCG 122-50	gx	09h41m05s	+21°13.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" (o poco meno) e con condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 122-51	gx	09h41m12s	+26°05.4'		Leo	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 122-52	gx	09h41m20s	+21°16.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile; in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 122-53	gx	09h41m30s	+26°07.2'		Leo	24"	buona / buono	molto debole e diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' N — 450x.
CGCG 122-55	gx	09h42m05s	+23°41.1'		Leo	24"	buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 122-56	gx	09h42m04s	+26°02.6'		Leo	24"	buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE — 450x.
CGCG 122-58	gx	09h42m48s	+26°04.8'		Leo	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 122-59	gx	09h42m59s	+25°59.1'		Leo	24"	buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 122-60	gx	09h43m05s	+22°46.6'		Leo	24"	buona / buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale molto tenue; situata a 1' WNW di una stellina abbastanza brillante (la più settentrionale di un piccolo asterismo molto allungato da N a S formato da 6 stelline principali) — 450x.
CGCG 122-62	gx	09h43m23s	+22°49.2'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 122-64	gx	09h43m41s	+22°47.7'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 122-65	gx	09h44m32s	+24°30.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 122-67	gx	09h44m54s	+22°53.1'		Leo	24"	buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 122-70	gx	09h45m41s	+23°40.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; è situata a circa 6' SSW di Epsilon Leonis di 3ª grandezza che si riesce a malapena a tenere fuori campo — 450x.
CGCG 122-72	gx	09h46m00s	+21°37.3'		Leo	24"	buona / buono	appena più evidente della successiva (osservata per prima), piccola, rotonda con Ø < 20" e a tratti condensata; situata tra 2 stelline orientate da NNE a SSW (quella più a S è abbastanza brillante) — 450x.
CGCG 122-73	gx	09h46m07s	+21°33.9'		Leo	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 122-75	gx	09h46m30s	+25°32.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 122-76	gx	09h46m36s	+21°45.0'		Leo	24"	buona / buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 122-77	gx	09h46m48s	+25°55.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 122-80	gx	09h46m49s	+26°01.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta a 1' SE di una debole stellina, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti, forse rotonda con Ø di ~ 20" — 450x.
CGCG 122-81	gx	09h47m00s	+24°42.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 122-85	gx	09h47m40s	+21°38.3'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di 15"-20" — 450x.
CGCG 122-86	gx	09h47m44s	+21°40.1'		Leo	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a ridosso S (fa parte di una coppia orientata come la gx) — 450x.
CGCG 122-88	gx	09h48m04s	+20°18.1'		Leo	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S — 450x.
CGCG 122-89	gx	09h48m03s	+21°37.9'		Leo	24"	buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 122-90	gx	09h48m09s	+20°18.6'		Leo	24"	buona / m. buono	poco più evidente di CGCG 122-88, dalla quale dista 1' a ENE, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 122-92	gx	09h48m46s	+25°29.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; una stellina appena percettibile quasi a ridosso NW è risultata essere **MAC 0948+2529** — 450x.
CGCG 122-93	gx	09h48m54s	+24°52.5'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 122-98	gx	09h51m33s	+23°48.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 123-1	gx	09h52m55s	+23°03.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 123-2	gx	09h53m31s	+24°14.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; situata al vertice occidentale di un piccolo parallelogramma formato con 3 stelline — 450x.
CGCG 123-5	gx	09h56m15s	+20°29.7'		Leo	16"	ottima / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 123-6	gx	09h56m23s	+20°28.6'		Leo	16"	ottima / m. buono	rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare più evidente di quello di UGC 5339 situata a ridosso NNW — 380x.
CGCG 123-9	gx	09h57m30s	+23°36.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1.5' verso E; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 123-10	gx	09h57m35s	+25°31.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 123-21	gx	10h11m03s	+23°07.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione stellare molto tenue — 450x.
CGCG 123-23	gx	10h12m38s	+22°17.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 123-24	gx	10h12m53s	+22°43.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 123-29	gx	10h15m16s	+21°03.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, allungata da E a W con dimensioni inferiori a 30"×15".
CGCG 123-30	gx	10h15m15s	+21°06.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e poco condensata, rotonda con Ø di 10" o 15"; c'è una stellina a 1' verso SW — 450x.
CGCG 123-31	gx	10h15m50s	+20°39.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 123-33	gx	10h16m33s	+22°05.5'		Leo	24"	m. buona / buono	molto facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 123-35	gx	10h17m40s	+22°48.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 123-39	gx	10h18m29s	+22°52.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	poco più evidente di CGCG 123-35, con orientamento e dimensioni simili, ma con gradiente di luce maggiore — 450x.
CGCG 124-1	gx	10h19m01s	+21°17.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 124-5	gx	10h20m59s	+25°31.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 124-10	gx	10h21m54s	+23°40.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' E; un oggetto molto debole, piccolo e condensato, estesa sì e no una 10-ina di secondi si trova un paio di primi a N ed è risultato essere la **PGC 1691546** — 450x.
CGCG 124-18	gx	10h22m41s	+20°51.5'		Leo	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo NW; a una 30-ina di secondi sempre a NW ce n'è un'altra abbastanza luminosa — 450x.
CGCG 124-27	gx	10h29m05s	+22°12.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (o poco più) — 450x.
CGCG 124-31	gx	10h29m42s	+22°21.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; è situata all'interno di un pentagramma di stelline; la componente più a N è in realtà una coppia — 450x.
CGCG 124-33	gx	10h31m19s	+25°51.2'		Leo	16"	ottima / ottimo	molto piccola, compatta, allungata da NNE a SSW (come le 2 stelle 4' a W), di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare marcato — 380x.
CGCG 124-41	gx	10h35m42s	+26°07.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 124-44	gx	10h36m21s	+21°01.4'		Leo	16"	ottima / ottimo	piccola e relativamente compatta, debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso verso E; una brillante si trova invece 1.5' a N — 380x.
CGCG 124-54	gx	10h41m50s	+21°18.7'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è di aspetto a prima vista simile a UGC 5822, dalla quale dista 3.5' verso N, salvo una condensazione centrale molto tenue quasi stellare visibile a tratti e più facilmente a 270x.
CGCG 124-62	gx	10h44m14s	+22°43.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 124-63	gx	10h44m30s	+21°43.0'		Leo	16"	m. buona / m. buono	facile e relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare brillante — 380x.
CGCG 125-4	gx	10h45m32s	+24°09.0'		LMi	24"	ottima / m. buono	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; situata quasi in mezzo a due stelline brillanti orientate da NE a SW e distanti ~ 5' — 450x.
CGCG 125-5	gx	10h45m52s	+25°57.1'		LMi	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare evidente a 380x.
CGCG 125-15	gx	10h54m29s	+21°09.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile solo a momenti, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 125-19	gx	10h58m28s	+24°22.4'		Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi: c'è una stellina a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 125-22	gx	11h01m51s	+22°20.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 125-30	gx	11h07m36s	+22°51.1'		Leo	16"	ottima / ottimo	debole, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30", di luminosità uniforme e poco diffusa — 380x.
CGCG 126-3	gx	11h12m31s	+23°16.6'		Leo	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare evidente; c'è una stellina al bordo NE — 450x.
CGCG 126-4	gx	11h12m42s	+23°18.5'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 126-5	gx	11h12m41s	+25°29.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 126-9	gx	11h13m31s	+23°18.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 126-20	gx	11h17m58s	+22°30.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 126-23	gx	11h18m15s	+22°25.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 126-29	gx	11h18m59s	+22°53.2'		Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 126-37	gx	11h21m28s	+24°24.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 126-41	gx	11h22m13s	+24°19.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	fa parte del gruppo denominato **Hickson 51** — piccola, relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø < 20"; nota altresì come **Hickson 51E** — 450x.
CGCG 126-49	gx	11h25m30s	+22°42.8'		Leo	16"	ottima / ottimo	è più facile di CGCG 126-50 (osservata per prima), relativamente compatta, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare visibile a 380x; c'è una debole stellina a 1' verso E.
CGCG 126-50	gx	11h25m33s	+22°19.1'		Leo	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo di luminosità pressoché uniforme, diffuso con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 126-51	gx	11h25m45s	+24°08.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
CGCG 126-58	gx	11h28m34s	+21°00.6'		Leo	24"	m. buona / buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di 45" e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 126-63	gx	11h28m59s	+20°44.7'	q 147	Leo	16"	velato / m. buono	assieme a CGCG 126-64 forma una coppia di piccoli oggetti molto deboli separati da ~ 1' in direzione NW-SE e situati a 3 o 4 primi a SSE di NGC 3697; il 1° è di luminosità pressoché uniforme, mentre il 2° presenta un evidente nucleo stellare (sono riportate sull'Uranometria rispettivamente come **NGC 3697B** e **3697C** — 270x.
CGCG 126-64	gx	11h28m58s	+20°45.9'		Leo	16"	velato / m. buono	v. CGCG 126-63
CGCG 126-65	gx	11h28m58s	+22°05.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è ancora più debole di UGC 6945, dalla quale dista 11' ESE, probabilmente rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
CGCG 126-75	gx	11h31m04s	+20°14.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 570x.
CGCG 126-81	gx	11h31m49s	+20°24.2'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è un elusivo oggetto rotondo, diffuso, di max 30" di Ø; appare solo a tratti, ma è meglio scalare a 270x.
CGCG 126-109	gx	11h36m15s	+22°26.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare visibile però solo a tratti, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 127-10	gx	11h37m58s	+20°46.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 127-13	gx	11h38m23s	+20°31.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di una 20-ina di secondi che salta fuori in visione distolta a 380x quando si osserva UGC 6609, dalla quale dista 1.5' verso W.
CGCG 127-18	gx	11h39m45s	+22°41.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 127-41	gx	11h43m45s	+25°27.5'		Leo	24"	m. buona / buono	debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
CGCG 127-43	gx	11h44m35s	+25°25.3'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma un triangolo rettangolo molto allungato con 2 stelline: una a 1' NW e l'altra a 3' NE — 450x.
CGCG 127-47	gx	11h45m24s	+20°19.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, con alto gradiente, diffusa, rotonda con Ø < 1'; ha un nucleo quasi stellare visibile a 380x.
CGCG 127-48	gx	11h45m28s	+20°48.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 40" e una piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 127-49	gx	11h45m49s	+20°37.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW (lo si deduce facilmente dall'orientamento delle due stelline abbastanza brillanti situate a N) con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 127-68	gx	11h50m53s	+21°10.2'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, estesa ~ 40"; c'è una stellina leggermente sfocata a 1.5' verso SSE che è di fatto la CGCG 127-71 — 270x.
CGCG 127-71	gx	11h50m56s	+21°08.7'		Leo	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto abbastanza compatto, di 20" di Ø e con nucleo stellare; altresì nota come **Markarian 1461** — 380x.
CGCG 127-74	gx	11h51m15s	+21°00.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa e con basso gradiente, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; altresì nota come **Markarian 1463** — 400x.
CGCG 127-82	gx	11h52m00s	+21°06.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline brillanti a 1' verso S — 400x.
CGCG 127-83	gx	11h52m20s	+21°06.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
CGCG 127-84	gx	11h52m24s	+23°37.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	minuscolo oggetto rotondo con condensazione stellare, con Ø di una 10-ina di secondi situato a ridosso SW di una stellina (anzi, a prima vista sembra una doppia stretta) — 380x.
CGCG 127-94	gx	11h53m17s	+23°27.9'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, allungata da E a W con dimensioni 30"×20", poco diffusa e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 127-101	gx	11h53m57s	+25°41.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 45"× 30" e nucleo quasi stellare; situata a W di una coppia di stelle brillanti distanti 3' in direzione N-S — 450x.
CGCG 127-133	gx	12h00m44s	+24°51.4'		Com	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1'; meglio contrastata a 270x.
CGCG 127-135	gx	12h01m45s	+20°19.8'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø max di 30" — 380x.
CGCG 127-137	gx	12h01m57s	+20°24.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima macchiolina rotonda di 25"-30" di Ø, diffusa e di luminosità uniforme che a 380x sembra aggettare verso S da una stellina abbastanza brillante.
CGCG 127-141	gx	12h02m26s	+23°49.1'		Com	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale ben pronunciata — 450x.
CGCG 128-3	gx	12h03m27s	+22°12.6'		Com	16"	ottima / ottimo	è una chiazza rotonda molto debole, di luminosità uniforme e con Ø di 35"-40"; è preferibile scalare a 270x, perché a 380x il campo è virtualmente depleto.
CGCG 128-15	gx	12h04m56s	+21°14.4'		Leo	16"	buona / ottimo	debolissima, di dimensioni simili a NGC 4084, dalla quale dista 5' scarsi a WNW, ma molto stemperata sul fondo cielo; osservabile solo in visione distolta a 270x.
CGCG 128-16	gx	12h05m09s	+22°00.5'		Com	24"	ottima / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N — 450x.
CGCG 128-32	gx	12h08m00s	+25°33.1'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 128-35	gx	12h08m05s	+25°35.4'		Com	16"	m. buona / ottimo	situata 2.5' a NNE di CGCG 128-32, è poco più evidente, più grande e presenta una nucleo stellare — 380x.
CGCG 128-40	gx	12h08m55s	+25°11.5'		Com	16"	buona / buono	piccolo oggetto rotondo abbastanza facile, diffuso, con Ø di una 30-ina di secondi35" e con nucleo stellare visibile a tratti — 380x.
CGCG 128-41	gx	12h09m18s	+24°58.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	è forse la più facile del terzetto cui appartengono UGC 7124-43, rotonda, poco diffusa, Ø di 30" e con nucleo stellare abbastanza marcato; c'è una stellina a 1' NE — 380x.
CGCG 128-48	gx	12h10m34s	+25°25.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 128-49	gx	12h10m35s	+25°55.7'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di aspetto un po" irregolare a 380x; è allungata da NNW a SSE (stimato in base alla congiungente delle 2 stelline situate a W e a S) con dimensioni 60"×40".
CGCG 128-55	gx	12h13m55s	+21°45.3'		Com	16"	buona / buono	piccolo e debole oggetto rotondo con Ø di 25"30" con nucleo puntiforme visibile solo a tratti — 270x.
CGCG 128-56	gx	12h14m05s	+24°04.0'		Com	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 128-58	gx	12h14m26s	+24°11.0'		Com	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 128-64	gx	12h15m37s	+21°54.5'		Com	16"	ottima / m. buono	poco più evidente di UGC 7270, dalla quale dista 4.6 N, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con bulge appena più contrastato sul disco — 380x.
CGCG 129-4	gx	12h29m49s	+22°22.3'		Com	24"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 131-3	gx	13h21m52s	+22°45.8'		Com	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda, con alto gradiente di luce e Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 131-4	gx	13h22m26s	+21°25.5'		Com	16"	ottima / ottimo	facile, rotonda con Ø di ~ 30", relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 131-32	gx	13h44m25s	+20°22.4'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø max di 30' e nucleo stellare appena percettibile a 380x; a tratti appare una stellina a ridosso verso NE.
CGCG 131-34	gx	13h45m12s	+23°04.3'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole e compatta, relativamente facile a 380x, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; è situata a ridosso S di una stellina.
CGCG 131-36	gx	13h45m15s	+23°19.0'		Boo	16"	m. buona / ottimo	è debolissima, ma a tratti, in visione distolta, appare orientata da E a W, di dimensioni ~ 40"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 380x.
CGCG 132-1	gx	13h45m41s	+22°03.2'		Boo	16"	ottima / m. buono	piccolo oggetto rotondo molto debole, di 20"-25" di Ø e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 132-3	gx	13h46m03s	+22°07.1'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con condensazione centrale quasi stellare e Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 132-28	gx	13h52m24s	+21°35.1'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, con Ø di una 20-ina di secondi; a 380x appare a tratti un tenue nucleo stellare.
CGCG 132-71	gx	14h02m06s	+26°03.7'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 133-6	gx	14h11m49s	+21°22.6'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da N a S con dimensioni 45"×30", poco diffusa e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a poco più di 1' verso SE — 380x.
CGCG 133-14	gx	14h13m54s	+20°59.0'		Boo	16"	discreta / ottimo	è un alone circolare molto debole, di una 40-ina di secondi di Ø che circonda una stellina abbastanza brillante; tende ad "accendersi" un poco in visione distolta; forse leggermente asimmetrico verso S o SE (ma è difficile stabilirlo); — 270x.
CGCG 133-16	gx	14h14m11s	+21°01.3'		Boo	16"	discreta / ottimo	debolissima chiazza diffusa, estesa una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a 270x.
CGCG 133-24	gx	14h17m23s	+25°03.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15", con piccolo bulge diffuso e brillante; un nucleo stellare appare solo a momenti; c'è una stellina brillante a 1.5' verso E — 450x.
CGCG 133-60	gx	14h27m51s	+25°50.3'		Boo	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 45"×30" — 270x.
CGCG 133-73	gx	14h29m27s	+21°50.3'		Boo	16"	discreta / ottimo	è una debolissima chiazza di luce, forse rotonda ed estesa non più di 30", ma appare solo a tratti in visione distolta a 270x.
CGCG 133-77	gx	14h30m11s	+23°01.6'		Boo	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda, diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale abbastanza marcata — 380x.
CGCG 133-79	gx	14h30m34s	+25°30.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa; a 380x appare poco più evidente della contigua UGC 9340 — osservata in altra data — rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e piccola condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso W.
CGCG 134-16	gx	14h42m18s	+25°30.5'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø > 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso S; meglio visibile a 270x.
CGCG 134-23	gx	14h43m42s	+23°01.1'		Boo	16"	discreta / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25" — 270x.
CGCG 134-33	gx	14h47m20s	+23°57.0'		Boo	16"	discreta / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 134-51	gx	14h54m32s	+24°01.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	più evidente di UGC 9594, dalla quale dista 5' verso SW, con Ø di 25"-30" e una condensazione centrale abbastanza evidente a 380x.
CGCG 134-53	gx	14h54m41s	+25°42.6'		Boo	16"	ottima / ottimo	è una gx elusiva che appare solo in visione distolta; salta fuori dapprima un tenuissimo nucleo di aspetto stellare; a tratti appare orientata grosso modo da E a W per ~ 45", ma è meglio scalare a 270x.
CGCG 134-57	gx	14h56m16s	+20°31.3'		Boo	16"	discreta / ottimo	piccola, rotonda, diffusa, di 30" di Ø e con tenue nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 134-60	gx	14h58m30s	+23°57.3'		Boo	16"	discreta / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi o 45" — 270x.
CGCG 134-61	gx	14h59m18s	+24°00.0'		Boo	16"	discreta / ottimo	forma una coppia abbastanza ravvicinata con la PGC PGC 2800995 situata a 1' NNW: due debolissime chiazze di aspetto a prima vista simile e di luminosità uniforme; la 1ª appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20", mentre la 2a, poco più evidente, è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; sono distanti ~ 1' in direzione N-S; c'è una stellina quasi a ridosso E della coppia — 380x.
CGCG 134-67	gx	15h02m03s	+21°19.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi; meglio visibile a 270x.
CGCG 135-13	gx	15h06m33s	+21°42.2'		Boo	16"	discreta / ottimo	debole, diffusa, con condensazione centrale abbastanza evidente, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina 1' SE; una doppia stretta si trova a 3' NW — 270x.
CGCG 135-15	gx	15h06m50s	+20°30.0'		Boo	16"	discreta / ottimo	molto debole, rotonda, relativamente compatta, di 20"-25" di Ø e con condensazione centrale quasi stellare; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
CGCG 135-17	gx	15h07m00s	+25°45.2'		Boo	16"	m. buona / buono	molto debole, rotonda, diffusa, con Ø poco maggiore di 30" e nucleo stellare osservabile a tratti a 380x.
CGCG 135-18	gx	15h07m12s	+20°28.8'		Boo	16"	discreta / ottimo	rotonda, molto diffusa con Ø > 30" e di luminosità pressoché uniforme; meglio osservabile scalando a 270x.
CGCG 135-32	gx	15h14m22s	+22°17.6'		Ser	24"	buona / buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE (la più occidentale di 3 stelline allineate in direzione E-W: quella più a E è brillante) — 450x.
CGCG 135-34	gx	15h14m27s	+20°47.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" e un nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 135-35	gx	15h14m33s	+25°46.3'		Boo	24"	buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" (o poco più); allineata ed equidistante con una stellina e una doppia stretta a NW — 450x.
CGCG 135-36	gx	15h14m57s	+25°53.7'		Boo	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 135-38	gx	15h15m31s	+25°27.3'		Ser	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso E — 270x.
CGCG 135-39	gx	15h16m19s	+24°52.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 135-46	gx	15h19m25s	+25°47.0'		Ser	16"	m. buona / buono	fa parte di un terzetto assieme a CGCG 135-47 e CGCG 135-48 — molto debole, rotonda, di ~ 30" di Ø e con condensazione centrale di aspetto quasi stellare; forma un piccolo triangolo isoscele ottusangolo con 2 stelline situate 1.5' a N e 2.5' NE — 270x.
CGCG 135-47	gx	15h20m11s	+25°43.3'		CrB	24"	buona / buono	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno; una stellina molto debole situata 1' a SE è in realtà la **PGC 1746863** — 450x.
CGCG 135-48	gx	15h20m35s	+25°44.2'		CrB	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 135-49	gx	15h20m42s	+25°40.8'		CrB	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 135-50	gx	15h21m30s	+21°11.4'		Ser	16"	buona / discreto	molto debole, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30", ma di aspetto un po' irregolare a 380x; presenta una condensazione centrale di aspetto stellare visibile a tratti, ma decentrata verso S (si tratta in effetti di una coppia di galassie interagenti, tuttavia non separabili); c'è una stellina a 1' verso NE.
CGCG 135-51	gx	15h21m41s	+25°50.5'		CrB	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina visibile solo a momenti al bordo NW — 450x.
CGCG 135-55	gx	15h24m25s	+20°45.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø < 30", poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a 1' SE; un piccolo e tenuissimo baffo esteso una 15-ina di secondi salta fuori in visione distolta a ridosso NE: quest'ultimo è poi risultato essere la MAC 1524+2045 — 450x.
CGCG 136-2	gx	15h29m04s	+25°27.4'		Ser	16"	buona / discreto	è debolissima e di luminosità uniforme, ma a tratti, osservando a 380x, appare abbastanza chiaramente orientata da N a S con dimensioni 30"×20".
CGCG 136-3	gx	15h29m18s	+20°44.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' NW e una appena percettibile subito a N — 450x.
CGCG 136-6	gx	15h31m37s	+25°14.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione stellare; forma una coppia ravvicinata con MAC 1531+2514 situata a ridosso W; quest'ultima è molto debole, ma in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni di 20"×10" — 450x.
CGCG 136-9	gx	15h32m47s	+23°11.1'		Ser	24"	buona / buono	piccole e debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a E — 450x.
CGCG 136-12	gx	15h33m40s	+24°24.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; situata tra 2 stelline orientate da NW a SE e distanti 2.5'; una stellina appena percettibile si trova a ridosso SE — 450x.
CGCG 136-13	gx	15h33m49s	+21°08.2'		Ser	16"	m. buona / buono	allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con marcato nucleo stellare — 380x.
CGCG 136-14	gx	15h33m42s	+26°08.4'		CrB	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 136-15	gx	15h33m45s	+21°00.6'		Ser	16"	m. buona / buono	relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 380x.
CGCG 136-16	gx	15h34m04s	+22°56.0'		Ser	16"	buona / discreto	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" con una stellina al bordo orientale — 380x.
CGCG 136-25	gx	15h35m49s	+25°11.0'		Ser	24"	buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 136-29	gx	15h36m32s	+25°08.3'		Ser	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 136-31	gx	15h37m04s	+25°33.9'		Ser	16"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, ma bisogna scalare a 270x.
CGCG 136-33	gx	15h37m26s	+21°44.7'		Ser	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø < 40 e una tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 136-34	gx	15h37m45s	+22°25.5'		Ser	16"	buona / discreto	è di aspetto simile a UGC 9927, ma poco più diffusa e con gradiente di luce leggermente più alto, allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 136-35	gx	15h38m04s	+26°15.7'		Crb	24"	m. buona / ottimo	poco più deboli di CGCG 136-36 — osservata subito prima e dalla quale dista 1' verso S — anch'essa rotonda e con Ø simile — 450x.
CGCG 136-36	gx	15h38m04s	+26°16.9'		Crb	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
CGCG 136-37	gx	15h38m35s	+26°13.3'		Crb	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE — 450x.
CGCG 136-38	gx	15h38m50s	+21°43.9'		Ser	24"	buona / buono	situata all'estremità occidentale dell'ammasso **AGC 2107** — molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' scarso verso E — 450x.
CGCG 136-41	gx	15h39m23s	+21°44.3'		Ser	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2107** — allungata da N a S, di dimensioni 40"×20", molto diffusa alle estremità del fuso e con tenue condensazione centrale; c'è una debole stellina al bordo W (o SW) — 450x.
CGCG 136-45	gx	15h39m40s	+25°44.4'		CrB	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 136-47	gx	15h39m57s	+21°49.6'		Ser	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2107** — piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 136-48	gx	15h39m56s	+21°52.0'		Ser	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2107** — molto piccola e debole, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a ridosso W; una stellina abbastanza brillante si trova a 1' SSW — 450x.
CGCG 136-50	gx	15h40m09s	+21°30.9'		Ser	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di 35"-40"; si trova a poco più di 1' N di una stellina brillante ed è quindi meglio osservabile a 380x.
CGCG 136-52	gx	15h40m37s	+20°33.7'		Ser	16"	buona / mediocre	debolissima, appare a tratti in visione distolta a 270x subito a E di una coppia di stelline di 14-esima orientate ~ NE-SW e distanti un paio di primi.
CGCG 136-62	gx	15h42m46s	+24°59.2'		Ser	16"	m. buona / buono	allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", diffusa e con piccolo bulge poco contrastato sul disco — 380x.
CGCG 136-64	gx	15h43m35s	+22°44.7'		Ser	16"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1' NNE — 380x.
CGCG 136-81	gx	15h48m16s	+21°01.5'		Ser	16"	m. buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare abbastanza marcato — 380x.
CGCG 136-85	gx	15h48m38s	+25°24.2'		Ser	16"	m. buona / buono	debole, rotonda, diffusa, con Ø > 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso S e un'altra brillante quasi a ridosso E (quest'ultima fa parte di un piccolo triangolo isoscele il cui angolo più acuto punta a NW) — 380x.
CGCG 136-88	gx	15h49m28s	+21°02.0'		Ser	16"	m. buona / buono	debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno; c'è una coppia di stelline ravvicinate a 45" verso NW — 270x.
CGCG 136-91	gx	15h50m00s	+24°48.1'		Ser	16"	ottima / m. buono	a 270x sembra abbastanza compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale appena percettibile; a 380x si sfuma leggermente e appare più facilmente una stellina molto debole una 40-ina di secondi verso N.
CGCG 136-92	gx	15h50m06s	+25°03.3'		Ser	24"	ottima / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 136-105	gx	15h52m18s	+23°20.6'		Ser	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, ma è meglio scalare a 340x; c'è una stellina quasi a ridosso SSE.
CGCG 136-112	gx	15h53m08s	+21°04.4'		Ser	16"	m. buona / buono	debole ovale di dimensioni 40"×30", orientato da N a S, diffuso e con piccola condensazione centrale; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso SE — 380x.
CGCG 136-114	gx	15h54m03s	+23°07.9'		Ser	16"	m. buona / buono	relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare osservabile a 380x.
CGCG 137-4	gx	15h56m34s	+21°17.3'		Ser	16"	ottima / m. buono	relativamente brillante, piccola, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco diffusa; presenta una nucleo stellare; c'è una stella arancione luminosa a 3' verso SW — 380x.
CGCG 137-14	gx	16h01m29s	+22°25.6'		Ser	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda, di una 40-ina di secondi di Ø e con piccola condensazione centrale ben evidente — 380x.
CGCG 137-16	gx	16h01m40s	+20°26.3'		Her	24"	ottima / m. buono	è un elusivo baffo di luce esteso < 30" e orientato da NW a SE; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 137-33	gx	16h05m12s	+24°57.6'		Ser	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 137-35	gx	16h05m37s	+22°11.2'		Ser	16"	m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø > 30"; meglio scalare a 270x.
CGCG 137-37	gx	16h06m00s	+21°21.6'		Her	16"	m. buona / buono	è una piccola e debolissima macchiolina rotonda condensata di 20"-25" di Ø; c'è una stella brillante un paio di primi a ESE — 380x.
CGCG 137-46	gx	16h09m16s	+25°42.7'		CrB	16"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; ci sono 2 stelline appena percettibili quasi a ridosso N e W — 380x.
CGCG 137-66	gx	16h14m58s	+21°56.3'		Her	16"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 380x.
CGCG 137-67	gx	16h15m25s	+26°06.6'		Her	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW e un'altra appena percettibile alla stessa distanza verso NE — 380x.
CGCG 137-71	gx	16h17m57s	+22°56.8'		Her	16"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×30"; poco più contrastata a 270x.
CGCG 137-76	gx	16h18m38s	+21°58.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a 1' NW — 450x.

CGCG 137-79	gx	16h19m22s	+22°08.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 138-11	gx	16h27m20s	+21°39.0'		Her	16"	ottima / buono	è un debolissimo oggetto rotondo e di luminosità uniforme, con Ø di 15"-20" e situato quasi a ridosso NE di una stellina — 380x.
CGCG 138-12	gx	16h27m19s	+22°02.0'		Her	16"	ottima / buono	elusiva, estesa max 20", appare solo a tratti in visione distolta a 380x.
CGCG 138-13	gx	16h27m20s	+22°04.3'		Her	16"	ottima / buono	debolissima chiazza grosso modo rotonda e di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi e meglio osservabile a 270x.
CGCG 138-14	gx	16h27m25s	+21°36.7'		Her	16"	ottima / buono	chiazza rotonda di 30" di Ø, molto debole e di luminosità uniforme che sembra aggettare verso S da una stella brillante — 380x.
CGCG 138-15	gx	16h28m05s	+21°39.3'		Her	16"	ottima / buono	elusivo oggetto rotondo di ~ 15" di Ø, a tratti condensato, se osservato a 380x, ma disturbato dalla SAO 84392 di 8ª situata a soli 2.5' W — 10' ENE di CGCG 138-14.
CGCG 138-17	gx	16h28m47s	+21°29.6'		Her	16"	ottima / m. buono	piccola, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 138-33	gx	16h31m37s	+22°19.1'		Her	16"	m. buona / ottimo	molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W — 380x.
CGCG 138-50	gx	16h39m31s	+21°19.0'		Her	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina brillante a 1' NE — 380x.
CGCG 138-52	gx	16h40m14s	+23°01.3'		Her	16"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio visibile a 270x.
CGCG 139-24	gx	16h57m29s	+22°36.0'		Her	16"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 139-32	gx	17h04m01s	+25°03.2'		Her	16"	buona / buono	molto debole, ma sembra relativamente compatta a 270x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N.
CGCG 139-33	gx	17h05m00s	+23°10.1'		Her	16"	buona / buono	è una debolissima macchiolina diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W — 270x (a 380x tende a sparire).
CGCG 140-7	gx	17h18m44s	+21°31.5'		Her	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; 380x per stemperare la luminosità di 2 stelline abbastanza brillanti a N e NW con le quali la gx forma un piccolo triangolo equilatero.
CGCG 140-14	gx	17h23m14s	+23°40.5'		Her	16"	buona / buono	debolissima e diffusa, sembra aggettare verso E da una stellina, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è poco più contrastata a 270x; da segnalare che 1' verso E c'è una debolissima doppia serrata che in visione distolta dà l'impressione di un'altra gx!.
CGCG 140-26	gx	17h27m26s	+21°06.4'		Her	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo con Ø max 20"; appare senza difficoltà, ma bisogna spingere a 380x.
CGCG 140-37	gx	17h29m25s	+24°52.9'		Her	16"	buona / buono	debole, rotonda, poco diffusa con Ø < 30" e condensazione centrale evidente; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
CGCG 140-40	gx	17h30m35s	+23°37.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente facile, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 140-48	gx	17h35m33s	+25°20.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline a W distanti grosso modo come la dimensione della gx (ultimo oggetto osservato: albeggia) — 450x.
CGCG 140-54	gx	17h36m55s	+21°06.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata tra due stelline: una brillante a W e l'altra più debole a E — 450x.
CGCG 140-55	gx	17h37m20s	+26°14.7'		Her	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" *(ultima gx osservata: albeggia)* — 380x.
CGCG 140-56	gx	17h38m08s	+22°42.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da E a W, anche questa di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso W, mentre una brillante si trova a 1' verso N — 450x.
CGCG 141-15	gx	17h50m46s	+23°08.3'		Her	24"	buona / ottimo	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" (ultima gx osservata nelle notte: albeggia) — 450x.
CGCG 141-37	gx	17h58m07s	+21°16.3'		Her	16"	buona / ottimo	debole chiazza di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, facilmente osservabile in visione distolta a 380x; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso SW; disturbata dalla SAO 85591 di 8ª situata ad appena 3' N.
CGCG 141-42	gx	18h01m08s	+22°33.1'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e piccola condensazione centrale poco contrastata sul disco — 380x.
CGCG 141-43	gx	18h01m08s	+24°44.6'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 45" verso N — 380x.
CGCG 141-44	gx	18h01m34s	+26°15.2'		Her	16"	buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x; è situata tra 2 stelline distanti meno di 1': una a SW e l'altra a N; quest'ultima è più brillante.
CGCG 142-2	gx	18h05m21s	+23°07.9'		Her	24"	buona / buono	è un piccolo e debolissimo oggetto rotondo, condensato con Ø di max 20" — 400x.
CGCG 142-5	gx	18h06m09s	+23°28.0'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; è meglio definita a 270x, ma a 380x appare una stellina appena percettibile a ridosso verso N o NW.
CGCG 142-19	gx	18h12m14s	+21°53.1'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale visibile a tratti; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline, 1' a E e 1.5' a SE — 380x.
CGCG 142-27	gx	18h12m51s	+25°30.7'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima e piccola, orientata da E a W, dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare (a bassi ingrandimenti potrebbe invero essere scambiata per una stellina) — 380x.
CGCG 142-42	gx	18h23m53s	+21°03.1'		Her	16"	buona / m. buono	debolissima, si vede solo a tratti in visione distolta a 380x, molto piccola, con dimensioni max di 20"-25"; c'è una stellina subito a SW, ma nel mezzo ne appare un'altra appena percettibile.
CGCG 142-43	gx	18h24m49s	+23°04.0'		Her	16"	buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e appena più brillante all'interno; situata tra 2 stelline brillanti orientate da NNW a SE e distanti un paio di primi — 380x.
CGCG 142-45	gx	18h26m10s	+23°19.0'		Her	16"	buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; si trova in mezzo a 2 stelline: una al margine NE e l'altra, più debole, a quello opposto — 380x.
CGCG 142-51	gx	18h29m49s	+23°00.7'		Her	16"	buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo relativamente compatto, con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme; è facilmente visibile in visione distolta a 380x; c'è una stellina quasi a una 40-ina di secondi verso NE e un'altra più debole dalla parte opposta.
CGCG 145-1	gx	06h25m42s	+30°39.4'		Aur	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa, approssim. circolare con Ø di 45"; una sorta di "barra" di barra centrale con nucleo stellare appena percettibile appare abbastanza facilmente, anche se poco contrastata — 450x.
CGCG 145-2	gx	06h39m36s	+30°18.5'		Aur	24"	m. buona / mediocre	è un alone molto tenue di forma indistinta, esteso sì e no 30" che aggetta a NE dalla SAO 59337 di 8ª grandezza che interferisce pesantemente con l'osservazione — 450x.
CGCG 145-3	gx	06h41m23s	+32°55.6'		Gem	24"	m. buona / mediocre	molto piccola e debole, relativamente compatta rotonda con Ø < 20"; è situata tra due stelline; una abbastanza brillante a E l'altra molto debole a W — 450x.
CGCG 145-4	gx	06h41m31s	+32°49.9'		Gem	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una coppia di stelline subito a E e orientate nella stessa direzione — 450x.
CGCG 145-6	gx	06h45m35s	+29°13.4'		Gem	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di forma un po' irregolare a causa di 2 stelline molto deboli ai bordi E e W; grosso modo rotonda con Ø di 30"-35"; una 3ª stellina si trova poco più distante verso S; queste 3 stelline insieme formano un piccolo triangolo equilatero — 450x.
CGCG 145-8	gx	06h47m32s	+32°20.0'		Gem	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; il campo è ricco di stelline brillanti: una si trova quasi a ridosso SE; una molto debole è situata più o meno alla stessa distanza verso SW; altre 3 stelle poste ad arco si trovano a NW — 450x.
CGCG 145-9	gx	06h47m32s	+29°22.2'		Gem	24"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate nello stesso modo — 450x.
CGCG 145-13	gx	06h49m55s	+29°31.3'		Gem	24"	m. buona / mediocre	è un chiarore molto diffuso e di luminosità uniforme; scalando a 340x appare grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole al bordo N; un'altra simile poco più distante a NE; una 3ª facile a 1' E; disturbata dalla SAO 78782 di 9ª grandezza situata un paio di primi a NE (non sono riuscito a vedere UGC 3551 che si trova 2' più a W).
CGCG 145-18	gx	06h52m15s	+30°50.5'		Gem	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 146-3	gx	06h51m54s	+32°34.4'		Gem	24"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una stellina appena percettibile si trova a ridosso NW; un'altra è poco più distante verso NE — 450x.
CGCG 146-4	gx	06h52m03s	+27°27.6'		Gem	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo, diffuso con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
CGCG 146-6	gx	06h52m47s	+31°17.3'		Gem	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile e compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W; una doppia abbastanza stretta si trova a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 146-7	gx	06h52m57s	+27°38.0'		Gem	24"	ottima / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 146-15	gx	06h58m44s	+28°23.0'		Gem	24"	m. buona / mediocre	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; 3 stelline appena percettibili si trovano a ridosso N, E e S; altre 2 simili e poco più lontane sono situate rispettivamente a 1' NE ed E — 450x.
CGCG 146-16	gx	06h58m47s	+29°00.6'		Gem	24"	m. buona / mediocre	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N — 450x.
CGCG 146-18	gx	07h02m02s	+27°49.7'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 146-22	gx	07h07m07s	+29°14.4'		Gem	16"	m. buona / m. buono	è un debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 20-ina di secondi visibile abbastanza facilmente in visione distolta, a 380x, a poco più 1' E di UGC 3649.
CGCG 146-23	gx	07h06m01s	+28°17.8'		Gem	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso NW — 380x.
CGCG 146-32	gx	07h10m09s	+28°17.6'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, con evidente condensazione centrale e nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso NE — 450x.
CGCG 146-33	gx	07h11m16s	+31°10.2'		Gem	16"	m. buona / m. buono	costituisce, assieme a CGCG 146-34 e CGCG 146-36, un terzetto di gx molto difficili — è una chiazza elusiva che anche in visione distolta appare solo a tratti con gran difficoltà; è estesa almeno 45", ma bisogna scalare a 188x.
CGCG 146-34	gx	07h11m20s	+31°08.7'		Gem	16"	m. buona / m. buono	costituisce, assieme alla precedente e alla successiva, un terzetto di gx estremamente deboli — difficilissima, appare solo a tratti tra 2 stelline distanti una 40-ina di secondi e orientate da NW a SE; estesa sì e no 20" — 380x.
CGCG 146-36	gx	07h11m28s	+31°11.4'		Gem	16"	m. buona / m. buono	costituisce, assieme alle due precedenti, un terzetto di gx molto difficili — anche quest'ultima è debolissima e appare in visione distolta quando si cerca la CGCG 146-33 dalla quale dista ~ 3' verso ENE; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
CGCG 146-38	gx	07h12m25s	+28°34.8'		Gem	24"	m. buona / buono	fa coppia ravvicinata con la successiva situata 1' a NE — piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 146-39	gx	07h12m29s	+28°35.7'		Gem	24"	m. buona / buono	poco più evidente della precedente, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e pure di luminosità uniforme; formano entrambe un piccolo rettangolo con 2 stelline situate subito a NW — 450x.
CGCG 146-40	gx	07h13m00s	+27°46.5'		Gem	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; la visione è disturbata da un piccolo triangolo rettangolo molto acuminato di stelle brillanti situato a ridosso della gx — 450x.
CGCG 146-42	gx	07h16m24s	+27°37.1'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 146-50	gx	07h18m59s	+30°32.4'		Gem	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø > 30"; situata a ridosso verso E di un piccolo triangolo isoscele di stelline abbastanza brillanti il cui vertice più acuto punta a NE — 380x.
CGCG 147-9	gx	07h21m05s	+29°20.3'		Gem	16"	m. buona / m. buono	è debolissima, ma appare abbastanza chiaramente orientata da NE a SW con dimensioni ~ 45"×30"; c'è una stellina a 1' verso W — 270x.
CGCG 147-10	gx	07h21m05s	+30°45.1'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 147-12	gx	07h21m40s	+32°16.3'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 147-21	gx	07h25m42s	+31°29.3'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 147-24	gx	07h26m55s	+30°08.8'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 147-30	gx	07h31m21s	+31°44.0'		Gem	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e con condensazione centrale molto tenue, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso NE e un'altra più debole alla stessa distanza verso SE — 450x.
CGCG 147-31	gx	07h31m50s	+30°32.1'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NE (fa parte di un piccolo asterismo di 5 componenti foggiato a "W" o "M" — 450x.
CGCG 147-33	gx	07h32m18s	+27°00.9'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 147-44	gx	07h37m31s	+28°50.3'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; equidistante, ma non allineata, con 2 stelline brillanti a ESE e SE; una stellina più debole si trova a 1' SW — 450x.
CGCG 147-46	gx	07h37m47s	+28°38.6'		Gem	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo orientale — 380x.
CGCG 147-48	gx	07h38m32s	+29°11.1'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
CGCG 147-50	gx	07h39m06s	+29°09.6'		Gem	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella brillante un paio di secondi a NW; una coppia di deboli stelline si trova 1.5' a N — 450x.
CGCG 147-51	gx	07h39m52s	+29°44.3'		Gem	24"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una debole stellina a 1' verso S, mentre una percettibile solo a momenti si trova quasi a ridosso NE.
CGCG 147-52	gx	07h40m01s	+32°11.6'		Gem	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, a tratti condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una debole stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 147-54	gx	07h40m16s	+32°15.5'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 147-57	gx	07h41m16s	+29°08.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole e molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 147-63	gx	07h44m26s	+29°16.1'		Gem	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, diffuso ed esteso max 20" o 25'.
CGCG 148-7	gx	07h45m20s	+26°58.0'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi c'è una stellina brillante a 1.5' W e una più debole alla stessa distanza verso S — 450x.
CGCG 148-9	gx	07h45m43s	+32°06.2'		Gem	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa e di forma indistinta, estesa sì e no una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline molto deboli a ridosso W — 450x.
CGCG 148-10	gx	07h45m58s	+29°42.9'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 450x.
CGCG 148-16	gx	07h47m05s	+27°56.8'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W — 450x.
CGCG 148-19	gx	07h47m21s	+29°24.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia stretta e sbilanciata a 2.5' verso E; un piccolo trapezio di 4 stelline brillanti si trova 5' a W — 450x.
CGCG 148-21	gx	07h47m29s	+31°12.9'		Gem	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 148-23	gx	07h47m58s	+28°10.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S; una doppia si trova a 1' NW — 450x.
CGCG 148-26	gx	07h48m03s	+28°01.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce orientato da NE a SW ed esteso una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 148-28	gx	07h48m18s	+28°02.2'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare molto brillante; c'è una stellina appena percettibile al bordo SE; situata tra 2 stelline abbastanza brillanti distanti 1.5' in direzione NW-SE — 450x.
CGCG 148-31	gx	07h48m53s	+28°54.1'		Gem	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, anche se un po' disturbata da una coppia di stelline brillanti situate un paio di primi NW; è rotonda, diffusa, di ~ 40" di Ø e con condensazione centrale abbastanza evidente — 380x.
CGCG 148-32	gx	07h48m54s	+27°34.3'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø < 20"; situata tra una stellina brillante a NNW e una più debole a SSE — 450x.
CGCG 148-34	gx	07h49m06s	+28°37.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; disturbata da una stella brillante di 7ª grandezza situata a 3' SSW — 450x.
CGCG 148-35	gx	07h49m15s	+28°36.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, orientata da NE a SW con dimensioni di 20"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE — 450x.
CGCG 148-39	gx	07h49m44s	+27°51.2'		Gem	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
CGCG 148-41	gx	07h50m00s	+30°40.8'		Her	16"	buona / ottimo	è un piccolo oggetto di dimensioni 20"×10", abbastanza compatto e con tenuissimo nucleo stellare osservabile abbastanza facilmente a 380x.
CGCG 148-42	gx	07h50m03s	+27°39.1'		Gem	24"	m. buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia di debolissimi baffi di luce orientati rispettivamente da E a W, e da NW a SE, estesi una 30-ina di secondi e di aspetto simile; il 1° ha una stellina abbastanza brillante subito a W e una percettibile solo a momenti a ridosso S; il 2° ne ha invece una brillante a SW — 450x.
CGCG 148-43	gx	07h50m10s	+27°37.5'		Gem	24"	m. buona / buono	v. CGCG 148-42
CGCG 148-45	gx	07h50m17s	+27°51.4'		Gem	24"	ottima / buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 148-46	gx	07h50m25s	+30°13.5'		Gem	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo W — 380x.
CGCG 148-48	gx	07h51m36s	+27°22.8'		Gem	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 148-49	gx	07h51m43s	+30°26.9'		Gem	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; si trova tra due stelline brillanti orientate da E a W (poco più vicina a quella W); c'è la SAO 60390 di 8ª grandezza a 5.5' NNW — 450x.
CGCG 148-50	gx	07h51m42s	+27°36.5'		Gem	24"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare grosso modo circolare con di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 148-53	gx	07h52m08s	+27°29.0'		Gem	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 148-54	gx	07h53m18s	+27°27.6'		Gem	24"	ottima / buono	debole, piccola, poco diffusa con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 148-57	gx	07h54m04s	+26°57.0'		Gem	24"	ottima / buono	debole e molto piccola, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 20"×15" e con condensazione centrale molto tenue — 450x.
CGCG 148-63	gx	07h55m25s	+26°59.2'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, forse rotonda con Ø grosso modo di 20"; c'è una stellina a ridosso NW.
CGCG 148-65	gx	07h55m58s	+26°53.2'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 148-66	gx	07h56m09s	+26°52.5'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 148-68	gx	07h56m11s	+30°12.8'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso S e una appena percettibile alla stessa distanza verso N — 450x.
CGCG 148-69	gx	07h56m17s	+26°53.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 148-73	gx	07h57m15s	+27°29.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 148-74	gx	07h58m05s	+26°34.2'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
CGCG 148-75	gx	07h58m30s	+31°02.5'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa sì e no una 15-ina di secondi, poco disturbata dalla SAO 60488 di 9ª grandezza situata 3' a SW — 450x.
CGCG 148-79	gx	07h59m28s	+26°53.4'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso NE — 450x.
CGCG 148-81	gx	07h59m39s	+26°33.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1'; è disturbata da una stellina brillante situata un paio di primi a S — 450x.
CGCG 148-82	gx	07h59m54s	+26°47.3'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 148-83	gx	07h59m59s	+27°45.7'		Gem	24"	m. buona / discreto	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo E (meglio non scalare gli ingrandimenti) — 450x.
CGCG 148-85	gx	08h00m14s	+26°41.9'		Gem	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con IC 486 situata 1' a E — 450x.
CGCG 148-94	gx	08h01m18s	+27°12.7'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (allineata ed equidistante con CGCG 148-96 e MAC 0801+ 2721 a NNE) — 450x.
CGCG 148-95	gx	08h01m19s	+29°10.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 148-96	gx	08h01m28s	+27°16.6'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (allineata ed equidistante con CGCG 148-94 a SSW e MAC 0801+2721 a NNE) — 450x.
CGCG 148-97	gx	08h02m04s	+27°13.5'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una doppia stretta e sbilanciata a 1' N — 450x.
CGCG 148-99	gx	08h22m24s	+31°11.5'		Gem	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata tra una stella brillante a WSW e una più debole a ENE — 450x.
CGCG 148-101	gx	08h02m39s	+30°15.3'		Gem	24"	m. buona / ottimo	fa parte assieme a CGCG 148-107 e CGCG 148-111 di un trio di galassiette molto deboli o debolissime, disperso e orientato da E a W su una distanza lineare di ~ 40'; questa è la più difficile, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
CGCG 148-103	gx	08h03m03s	+27°44.6'		Gem	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (si fatica un po' a tenere fuori campo la χ Gem di 5ª grandezza situata 7' scarsi a NE) — 450x.
CGCG 148-104	gx	08h03m15s	+30°47.8'		Gem	16"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
CGCG 148-107	gx	08h04m16s	+30°11.0'		Gem	24"	m. buona / ottimo	fa parte del trio di CGCG 148-101 — molto debole e poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 148-109	gx	08h05m04s	+29°43.3'		Gem	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW (che fa parte di una coppia orientata da N a S) — 450x.
CGCG 148-111	gx	08h05m48s	+30°13.9'		Gem	24"	m. buona / ottimo	fa parte del trio di CGCG 148-101 — è di aspetto e dimensioni simili a CGCG 148-107, ma orientata da N a S — 450x.
CGCG 148-113	gx	08h06m30s	+26°54.0'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 148-115	gx	08h08m04s	+29°57.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra 2 stelline: una debole a 1.5' S e l'altra più evidente a un paio di primi verso N — 450x.
CGCG 148-116	gx	08h08m47s	+28°04.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	anche questa è piccola e debolissima, appare a momenti in visione distolta a ridosso NW di una stellina molto debole; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 148-117	gx	08h09m20s	+28°00.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	un'altra galassietta piccola, debolissima e molto piccola, una sorta di chiazza appena percettibile che sembra aggettare a N di una debole stellina — 450x.
CGCG 149-11	gx	08h18m08s	+26°38.1'		Cnc	16"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza rotonda con Ø di ~ 45"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 270x.
CGCG 149-13	gx	08h18m38s	+51°45.9'		Cnc	24"	m. buona / buono	chiazza molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; forma un triangolo isoscele con due stelline brillanti a NE e NNE — 450x.
CGCG 149-19	gx	08h23m20s	+29°27.6'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; situata a ridosso di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 149-20	gx	08h23m30s	+27°08.2'		Cnc	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; meglio scalare a 340x.
CGCG 149-27	gx	08h28m24s	+30°27.9'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	molto debole, estesa non più di 20"-25", osservabile quasi a ridosso a W di una stellina — 380x.
CGCG 149-34	gx	08h28m56s	+27°44.8'		Cnc	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina al bordo N (la più occidentale di 3 stelline quasi allineate ed equidistanti) — 450x.
CGCG 149-37	gx	08h29m30s	+31°40.5'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 149-42	gx	08h31m49s	+28°32.2'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso N — 450x.
CGCG 149-43	gx	08h32m20s	+30°31.4'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un piccolo gruppo abbastanza serrato di 4 deboli stelline a 1.5' SSE — 450x.
CGCG 149-46	gx	08h32m40s	+30°21.3'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella brillante un paio di primi a N; una stellina appena percettibile appare a tratti a ridosso N della galassietta, ma questa è risultata essere la **MAC 0832+3021A** che il Megastar riporta addirittura di 16.5! — 450x.
CGCG 149-49	gx	08h33m36s	+29°30.0'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, estesa non più di 20"-25", appare solo a tratti in visione distolta a 380x alternando gli occhi.
CGCG 149-50	gx	08h33m42s	+27°42.7'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E (la quale fa parte di un piccolo arco di 3 stelline abbastanza brillanti) — 450x.
CGCG 149-57	gx	08h35m48s	+28°45.2'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una minuscola tripletta di deboli stelline subito a E — 450x.
CGCG 149-59	gx	08h36m15s	+28°03.6'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 45"; c'è una stellina al bordo orientale — 380x.
CGCG 150-3	gx	08h36m01s	+30°16.0'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	piccola e poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare evidente — 380x.
CGCG 150-5	gx	08h36m47s	+27°19.9'		Cnc	24"	m. buona / buono	è un'elusiva macchiolina molto diffusa, estesa sì e no 20" che appare a momenti a ridosso SE di una stellina (dalla quale sembra a prima vista aggettare) — 450x.
CGCG 150-11	gx	08h38m23s	+28°38.9'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza a 1' scarso SW.
CGCG 150-17	gx	08h42m06s	+30°49.2'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a E — 450x.
CGCG 150-18	gx	08h42m36s	+27°16.2'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 150-20	gx	08h43m07s	+26°48.3'		Cnc	24"	ottima / molto buono	anche questa è molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 150-23	gx	08h45m33s	+26°19.4'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 150-24	gx	08h46m15s	+27°20.8'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; una stellina appena percettibile appare solo a momenti al bordo S — 450x.
CGCG 150-30	gx	08h47m07s	+27°52.4'		Cnc	24"	m. buona / buono	piccola, debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 150-45	gx	08h55m02s	+26°40.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 150-48	gx	08h56m29s	+29°40.0'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' verso N; una doppia serrata si trova a W — 450x.
CGCG 150-54	gx	08h58m58s	+28°54.1'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	debole, molto piccola e relativamente compatta, allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×15" scarsi; c'è una doppia stretta a 2.5' WNW — 450x.
CGCG 151-12	gx	09h08m05s	+27°15.0'		Cnc	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 151-37	gx	09h15m28s	+31°48.4'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	piccolo e debole lucore diffuso e di luminosità uniforme, grosso modo rotondo con Ø di una 30-ina di secondi che a prima vista, in visione distolta, sembra aggettare verso W da una stellina brillante; a 380x è chiaramente separata, mentre appare facilmente una stellina al bordo S; c'è un'altra stellina poco percettibile situata quasi a ridosso verso NE.
CGCG 151-46	gx	09h17m04s	+26°45.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, "soffocata" da una stella brillante situata quasi a ridosso WNW, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 151-52	gx	09h17m55s	+27°44.1'		Cnc	24"	ottima / buono	relativamente brillante, ma con basso gradiente di luce, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; a 450x appare una tenue discrepanza di luce all'interno — 450x.
CGCG 151-58	gx	09h19m25s	+26°54.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 151-61	gx	09h19m58s	+26°44.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da ENE a WSW (ossia come la coppia di deboli stelline 2' più a N) con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso WSW; un'altra stellina debolmente sfuocata appare a 1' scarso SE, ma questa è in realtà **MAC 0920+2644** — 450x.
CGCG 151-62	gx	09h19m57s	+26°47.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza di forma a prima vista indistinta, e che solo a momenti appare orientata da N a S; situata tra due deboli stelline a ridosso E e SW — 450x
CGCG 151-66	gx	09h20m51s	+26°39.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, disturbata da una stellina brillante un paio di primi a WNW — 450x.
CGCG 151-73	gx	09h23m11s	+26°48.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina subito a N; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 151-90	gx	09h28m06s	+26°23.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco più estesa di CGCG 152-12, osservata subito prima, diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 152-12	gx	09h28m14s	+26°24.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione stellare visibile a tratti — 450x.
CGCG 152-15	gx	09h29m13s	+26°26.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, con Ø e aspetto simile a CGCG 151-90 situata 15' a WSW— 450x.
CGCG 152-21	gx	09h30m27s	+27°46.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W — 450x.
CGCG 152-27	gx	09h33m12s	+27°35.8'		Leo	16"	buona / ottimo	debolissima, ma in visione distolta appare abbastanza facilmente poco allungata all'incirca da N a S con dimensioni 40"×30"; è meglio visibile scalando a 270x.
CGCG 152-29	gx	09h34m02s	+27°22.6'		Leo	24"	buona / buono	molto debole e molto disturbata dalla SAO 80906 situata 1.5' a S; in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×20" — 450x.
CGCG 152-30	gx	09h34m41s	+32°04.1'		Leo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, con condensazione centrale appena percettibile, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso E e un'altra debolissima 1' a N — 380x.
CGCG 152-51	gx	09h41m51s	+27°38.8'		Leo	24"	buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con bulge evidente; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo S — 450x.
CGCG 152-60	gx	09h43m40s	+26°20.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NW che ne confonde un po' la forma — 450x.
CGCG 152-68	gx	09h46m35s	+30°39.2'		Leo	16"	ottima / ottimo	debole diffusa, rotonda con Ø di 35"-40" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1.5' verso SSE — 380x.
CGCG 152-70	gx	09h50m04s	+31°44.7'		Leo	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare visibile a 380x; c'è una stellina a ~ 40" ESE.
CGCG 152-76	gx	09h51m08s	+26°17.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, diffusa, e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una stellina appena percettibile situata a ridosso SW è risultata essere la **2MASS 09510713+2616534** — 450x.
CGCG 153-26	gx	10h10m03s	+32°04.2'		LMi	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e piccolo bulge abbastanza contrastato osservabile a 380x; c'è una stellina brillante a > 1' NNW.
CGCG 153-31	gx	10h12m50s	+30°35.0'		LMi	16"	buona / ottimo	molto debole, piccola, approssim. rotonda con Ø < 30" e a tratti condensata; meglio spingere a 380x, anche se a quest'ingrandimento il campo è virtualmente depleto.
CGCG 154-13	gx	10h25m48s	+26°34.2'		Leo	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare evidente — 380x.
CGCG 154-15	gx	10h26m11s	+32°05.9'		LMi	16"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza evidente a 380x.
CGCG 154-25	gx	10h32m28s	+27°10.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di 15"-20", situata a meno di 1' verso S di una stellina abbastanza brillante — 570x.
CGCG 154-39	gx	10h42m24s	+28°01.5'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 154-45	gx	10h44m54s	+27°28.1'		LMi	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 450x.
CGCG 155-5	gx	10h45m24s	+29°13.1'		LMi	16"	ottima / ottimo	piccola, compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 155-6	gx	10h45m50s	+27°37.2'		LMi	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza marcato — 450x.
CGCG 155-13	gx	10h47m53s	+26°15.0'		LMi	16"	buona / ottimo	si vede abbastanza facilmente a 380x, ma è molto piccola e compatta, con dimensioni non superiori a 15" o 20".
CGCG 155-17	gx	10h48m47s	+26°46.2'		LMi	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 155-23	gx	10h54m23s	+26°44.2'		LMi	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 155-32	gx	10h53m14s	+26°53.2'		LMi	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 155-40	gx	10h57m17s	+28°32.5'		LMi	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio contrastata a 270x; c'è una coppia di deboli stelline a 2.5 verso S.
CGCG 155-47	gx	11h03m01s	+31°58.3'		LMi	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; a tratti, osservando a 380x, si "stacca" verso SE una piccolissima macchiolina appena percettibile; da un controllo effettuato successivamente è risultata essere la MAC 1103+3158.
CGCG 155-56	gx	11h04m58s	+30°01.6'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda con Ø di 45", diffusa e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 155-57	gx	11h05m02s	+29°57.1'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; si vede a tratti, ma è meglio scalare a 270x.
CGCG 155-60	gx	11h05m25s	+26°21.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione quasi stellare; c'è una stellina a 1.5' verso N, un'altra alla stessa distanza SE, una 3ª molto debole a 1' NE e una 4ª appena più evidente a 2' SW — 450x.
CGCG 155-76	gx	11h09m08s	+26°37.6'		Leo	16"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, luminosità uniforme, allungata da N a S, dimensioni 30"×20" — 270x.
CGCG 155-80	gx	11h28m19s	+26°45.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 155-91	gx	11h11m24s	+28°43.8'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debolissima, con Ø di 25"-30", appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, ma l'unico riferimento sono le 2 stelline situate rispettivamente 3.5' a N e 3' a NE.
CGCG 156-2	gx	11h10m38s	+28°43.9'		UMa	16"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, facilmente visibile in visione distolta e con Ø di ~ 20"; presenta una condensazione centrale visibile a tratti a 380x.

CGCG 156-4	gx	11h10m39s	+31°39.3'		UMa	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio definita a 380x.
CGCG 156-12	gx	11h11m23s	+28°15.7'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo oggetto relativamente compatto esteso non più di 20" — 380x.
CGCG 156-17	gx	11h11m47s	+28°16.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale quasi stellare visibile a 380x; c'è una stellina a ~ 1' verso N.
CGCG 156-27	gx	11h13m27s	+30°36.4'		UMa	16"	buona / ottimo	debolissima, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; stellina appena percettibile a NE visibile a 380x; la gx è però meglio definita a 270x, perché il campo attorno è quasi depleto.
CGCG 156-30	gx	11h14m16s	+28°09.8'		Leo	16"	buona / ottimo	debolissimo lucore approssim. rotondo con Ø di 1' scarso e condensazione centrale appena percettibile; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 188x.
CGCG 156-31	gx	11h14m17s	+28°33.5'		UMa	16"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, piccola, rotonda, molto diffusa, di luminosità uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E e un'altra poco più debole a ~ 1' ESE — 380x.
CGCG 156-32	gx	11h14m19s	+31°26.3'		UMa	16"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 380x.
CGCG 156-34	gx	11h14m57s	+31°30.5'		UMa	16"	buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e leggermente condensata, rotonda con Ø max di 30" — 380x.
CGCG 156-35	gx	11h15m10s	+29°31.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
CGCG 156-37	gx	11h15m18s	+27°24.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 156-38	gx	11h16m03s	+28°47.4'		UMa	16"	buona / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme; a tratti in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 40"×20" — 380x.
CGCG 156-39	gx	11h16m11s	+29°26.6'		UMa	16"	m. buona / ottimo	assieme a CGCG 156-41 forma una coppia di oggetti molto deboli di max 25"-30" di Ø; il 2° è poco più evidente e più compatto (si fa fatica a usare 380x, perché il campo è praticamente depleto); è altresì poco più grande di UGC 6292 dalla quale dista 5' NW.
CGCG 156-40	gx	11h16m17s	+29°13.6'		UMa	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto di 25"-30" di Ø con nucleo stellare; la gx si vede senza problemi in visione distolta a 380x.
CGCG 156-41	gx	11h16m14s	+29°23.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	più evidente e poco più grande di UGC 6292 — dalla quale dista 5' a NW — con Ø di ~ 40" e una condensazione centrale stellare osservabile a 380x.
CGCG 156-42	gx	11h16m23s	+29°15.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	poco più grande di CGCG 156-40, dalla quale dista un paio di primi NW, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi; presenta una tenue e piccola condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
CGCG 156-45	gx	11h16m34s	+28°46.1'		UMa	16"	buona / ottimo	debolissimo e piccolo oggetto rotondo esteso non più di 20"; appare in visione distolta a ~ 45" N di una stellina appena percettibile — 380x.
CGCG 156-47	gx	11h16m50s	+26°32.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina brillante subito a NW — 450x.
CGCG 156-54	gx	11h18m10s	+30°24.4'		UMa	16"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con UGC 6314 situata a meno di 1' SSE — debolissima e molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×30" e nucleo stellare evidente; meglio definita a 270x.
CGCG 156-57	gx	11h18m18s	+28°13.5'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30 e a tratti appena più brillante verso l'interno — 270x.
CGCG 156-59	gx	11h18m40s	+28°31.9'		UMa	16"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, con piccola condensazione centrale appena percettibile, approssim. rotonda ed estesa 35"-40"; visibile a 270x, perché a 380x il campo è praticamente depleto.
CGCG 156-68	gx	11h22m53s	+27°35.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e con tenue condensazione centrale; è situata tra due stelline: una debole a N e l'altra percettibile soltanto a momenti a S — 450x.
CGCG 156-73	gx	11h24m29s	+27°38.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 156-79	gx	11h28m03s	+27°23.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale visibile a momenti — 450x.
CGCG 156-81	gx	11h28m27s	+27°27.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e relativamente facile da vedere, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 156-83	gx	11h28m39s	+27°23.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 45" — 450x.
CGCG 156-85	gx	11h29m24s	+28°32.6'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda, di luminosità pressoché uniforme, salvo una condensazione centrale molto tenue visibile però solo a momenti a 270x.
CGCG 156-86	gx	11h29m41s	+28°15.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto probabilmente rotondo, di una 30-ina di secondi di Ø e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 156-87	gx	11h30m30s	+26°13.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' N, una più debole a 1' scarso S e una terza appena percettibile subito a E — 450x.
CGCG 156-89	gx	11h31m09s	+26°13.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina debole a 1' scarso W e una più evidente a un paio di primi verso E — 450x.
CGCG 156-99	gx	11h32m30s	+28°06.7'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, estesa max 20"; appare in visione distolta a 380x tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da N a S; .
CGCG 157-1	gx	11h36m30s	+26°51.6'		Leo	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; ci sono 2 stelline brillanti quasi a ridosso della gx: una a NW e l'altra, un poco più debole, a SW — 450x.
CGCG 157-12	gx	11h40m39s	+28°51.8'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a 1' SSE; salta fuori in visione distolta a 270x.
CGCG 157-22	gx	11h43m01s	+27°23.8'		Leo	24"	buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×45" e tenue condensazione centrale evidente, anche se poco contrastata — 450x.
CGCG 157-26	gx	11h44m01s	+30°02.5'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare abbastanza chiaramente allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 157-27	gx	11h44m06s	+29°52.4'		UMa	16"	buona / m. buono	piccolo oggetto rotondo molto e condensato, rotondo con Ø di una 20-ina di secondi; c'è la SAO 62677 di 8ª a 2' NE — 380x.
CGCG 157-28	gx	11h45m04s	+26°49.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø < 30", diffusa e con condensazione centrale evidente; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline: una brillante a 1' NW e l'altra più debole e poco più lontana verso NNW — 400x.
CGCG 157-31	gx	11h45m37s	+31°17.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto diffusa, approssim. rotonda, di 30" di Ø e con nucleo stellare; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso SE; altra stellina a poco più d 1' verso N — 380x.
CGCG 157-71	gx	11h58m55s	+28°23.9'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda, diffusa, con Ø di ~ 40" e con condensazione centrale evidente a 270x.
CGCG 157-75	gx	11h59m40s	+26°32.8'		Com	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 157-81	gx	12h00m13s	+31°49.8'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
CGCG 158-10	gx	12h04m45s	+31°09.5'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è molto debole, ma salta fuori facilmente in visione distolta a 380x, piuttosto diffusa ed estesa max 30".
CGCG 158-14	gx	12h05m16s	+30°51.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale appena percettibile a 380x; stella brillante a 2.5' SW.
CGCG 158-18	gx	12h06m06s	+28°15.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	assieme a CGCG 158-19 forma una coppia di oggetti di dimensioni simili, ravvicinati e poste a perpendicolo; la 1ª è allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", con piccolo bulge abbastanza marcato di aspetto quasi stellare; la 2ª è poco più evidente, ma con condensazione centrale un po' meno marcata, allungata da N a S e anch'essa di dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 158-19	gx	12h06m07s	+28°15.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	v. **CGCG 158-18**
CGCG 158-23	gx	12h06m31s	+28°08.3'		Com	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo con Ø di una 30-ina di secondi, diffuso e poco più brillante all'interno; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso N — 380x.
CGCG 158-26	gx	12h07m17s	+32°04.5'		Com	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con una piccola e tenue condensazione centrale — 380x.
CGCG 158-38	gx	12h10m56s	+31°39.5'		Com	16"	m. buona / m. buono	debolissima e con piccola condensazione centrale visibile a tratti; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a meno di 1' verso W (fa parte di un piccolo triangolo rettangolo coi cateti di 2.5' e 5') — 380x.
CGCG 158-42	gx	12h12m24s	+28°49.0'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW di dimensioni 40"×20" con una stellina a una 30-ina di secondi verso SE; questa stellina fa parte di un asterismo molto allungato di 6 componenti abbastanza brillanti, orientato da NW a SE ed esteso 6' o 7' — 380x.
CGCG 158-54	gx	12h15m55s	+26°39.7'		Com	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (o poco più) — 450x.
CGCG 158-67	gx	12h19m42s	+28°43.5'		Com	16"	ottima / ottimo	fa parte, assieme a CGCG 158-68 e CGCG 158-69 del quartetto di UGC 7374 — è la meno debole del gruppo, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 270x.
CGCG 158-68	gx	12h19m41s	+28°47.1'		Com	16"	ottima / ottimo	fa parte, del quartetto di UGC 7374 — molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 270x.
CGCG 158-69	gx	12h19m41s	+28°49.5'		Com	16"	ottima / ottimo	fa parte del quartetto di UGC 7374 — anche questa è molto debole, piccola, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e diffusa — 270x.
CGCG 159-29	gx	12h36m46s	+32°06.9'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima, a tratti in visione distolta appare poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale visibile solo a tratti; è meglio osservarla a 270x (a 380x è confusa).
CGCG 159-36	gx	12h37m42s	+32°05.2'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, con condensazione centrale visibile a tratti a 270x, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (a 380x il campo è depleto e non riesco a vedere la gx).
CGCG 159-42	gx	12h39m12s	+27°44.6'		Com	24"	ottima / m. buono	molto piccola e di aspetto quasi stellare a 340x, forse a causa del nucleo puntiforme e marcato; a 450x è di Ø non superiore a 15".
CGCG 159-43	gx	12h39m19s	+27°46.3'		Com	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina al bordo meridionale — 450x.
CGCG 159-47	gx	12h39m18s	+31°59.4'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma facilmente visibile a 380x, allungata da N a S con dimensioni 30"×15", abbastanza compatta e di luminosità uniforme.
CGCG 159-54	gx	12h41m14s	+26°44.2'		Com	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 159-61	gx	12h43m14s	+31°05.1'		Com	16"	ottima / ottimo	rotonda, di 45" di Ø, poco più brillante all'interno e con nucleo stellare visibile a 380x.
CGCG 159-66	gx	12h44m41s	+26°25.1'		Com	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso W (in realtà è una doppia fortemente sbilanciata) e un'altra coppia più debole e meno sbilanciata alla stessa distanza verso N — 450x.
CGCG 159-75	gx	12h47m28s	+27°27.5'		Com	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 159-79	gx	12h48m24s	+26°51.5'		Com	16"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta, allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×15 — 380x.
CGCG 159-83	gx	12h49m42s	+26°53.5'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e poco più brillante all'interno — 380x.
CGCG 159-89	gx	12h50m54s	+27°50.5'		Com	16"	buona / buono	relativamente facile e compatta, rotonda, con Ø di ~ 30" e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 159-90	gx	12h51m04s	+27°22.2'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 159-104	gx	12h53m16s	+27°05.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, diffusa, con Ø di 45" e con evidente condensazione centrale più marcata a 270x.
CGCG 159-107	gx	12h53m49s	+29°35.3'		Com	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di 30" di Ø, diffuso e di luminosità uniforme, osservabile in visione distolta a 380x; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE.
CGCG 160-15	gx	12h55m25s	+27°47.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi 40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a ridosso verso NE — 380x.
CGCG 160-18	gx	12h55m28s	+27°39.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	è un debole baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 40-ina di secondi; appare abbastanza facilmente a 380x; c'è una stellina a 1' scarso SE, mentre una stellina brillante si trova a poco più di 1' verso N.
CGCG 160-23	gx	12h56m20s	+27°45.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	piccola, compatta, con Ø di ~ 20" e con condensazione centrale evidente — 380x.
CGCG 160-27	gx	12h56m30s	+27°56.4'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda, con Ø max 30"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a ~ 1.5' SW di una stellina — 380x.
CGCG 160-30	gx	12h56m44s	+30°43.1'		Com	16"	ottima / ottimo	molto piccola, debole e diffusa, rotonda, di 20" di Ø e con nucleo stellare; è situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate all'incirca da N a S: quella a N è abbastanza brillante — 380x.
CGCG 160-33	gx	12h56m51s	+26°53.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 160-34	gx	12h56m51s	+28°55.8'		Com	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 380x.
CGCG 160-36	gx	12h56m58s	+30°43.0'		Com	16"	ottima / ottimo	rotonda, poco diffusa, di 30" di Ø e con condensazione centrale quasi stellare — 380x.
CGCG 160-37	gx	12h57m09s	+27°28.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	rotonda, con condensazione centrale evidente di aspetto quasi stellare, poco diffusa e con Ø di ~ 30" — 380x.
CGCG 160-40	gx	12h57m26s	+27°32.7'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile da vedere; piccola, compatta, rotonda, con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 160-48	gx	12h57m48s	+27°53.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
CGCG 160-57	gx	12h58m15s	+28°07.5'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto piccola, di dimensioni di max 15" e con nucleo stellare; a bassi ingrandimenti potrebbe, a prima vista, essere scambiata per una stellina appena sfuocata — 380x.
CGCG 160-59	gx	12h58m13s	+28°56.8'		Com	16"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 160-62	gx	12h58m18s	+29°07.7'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30" (o 40"×30", difficile stabilirlo), con tenue e piccola condensazione centrale visibile a 380x.
CGCG 160-65	gx	12h58m30s	+28°00.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	è di aspetto simile a NGC 4850 — da cui dista poco più di 3' NE — come luminosità e dimensioni; è solo appena più evidente — 380x.
CGCG 160-73	gx	12h59m05s	+27°38.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda, molto diffusa, con condensazione centrale visibile a tratti e con Ø di ~ 30" — 380x.
CGCG 160-74	gx	12h59m14s	+27°24.1'		Com	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, condensato con Ø di una 20-ina di secondi; meglio tuttavia scalare a 270x.
CGCG 160-79	gx	12h59m67s	+27°42.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente e nucleo stellare abbastanza brillante — 380x.
CGCG 160-80	gx	12h59m45s	+32°02.6'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è un ovale molto debole di 45"×30", diffuso e orientato da E a W; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE; bisogna osservare a 380x per tener fuori campo una stella brillante di 7m.6 situata 4.5' a NE.
CGCG 160-84	gx	13h00m29s	+26°40.5'		Com	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con un nucleo quasi stellare abbastanza brillante — 450x.
CGCG 160-89	gx	13h00m44s	+28°20.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	salta fuori facilmente in visione distolta a 380x, molto piccola e condensata, rotonda con Ø di 15" o 20".
CGCG 160-91	gx	13h00m52s	+28°21.9'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; presenta una condensazione centrale di aspetto stellare visibile a 380x.
CGCG 160-92	gx	13h01m09s	+27°49.1'		Com	24"	ottima / ottimo	forma una coppia con CGCG 160-93 a 1' verso S — sono di aspetto simile, diffusi rotondi con Ø di una 20-ina di secondi; il 1° appare a tratti condensato, mentre il 2° è più uniforme — 450x.
CGCG 160-93	gx	13h01m11s	+27°48.1'		Com	24"	ottima / ottimo	v. **CGCG 160-92**
CGCG 160-100	gx	13h01m50s	+27°53.6'		Com	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e un nucleo stellare — 450x.
CGCG 160-107	gx	13h02m04s	+29°15.2'		Com	16"	buona / ottimo	oggetto abbastanza facile, compatto, posto quasi di taglio, orientato da NNW a SSE per una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 160-115	gx	13h02m53s	+27°52.0'		Com	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N — 450x.
CGCG 160-126	gx	13h04m28s	+26°40.3'		Com	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 160-136	gx	13h06m00s	+29°16.7'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 25"-30" — 380x.
CGCG 160-154	gx	13h10m21s	+31°26.6'		CVn	16"	m. buona / ottimo	rotonda, poco diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso NE.
CGCG 160-158	gx	13h11m37s	+31°30.5'		CVn	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda, poco diffusa con Ø poco inferiore a 1' e condensazione centrale evidente — 380x.
CGCG 160-160	gx	13h12m18s	+26°41.1'		Com	16"	buona / ottimo	è un oggetto rotondo molto debole, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi; è come "schiacciata" tra 2 stelline brillanti distanti 1.5' e orientate da NW a SE — 270x.
CGCG 160-165	gx	13h13m26s	+27°45.8'		Com	16"	buona / ottimo	situata a un paio di primi a S di NGC 5032, è un piccolo oggetto abbastanza compatto con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 160-172	gx	13h15m47s	+31°50.8'		CVn	16"	m. buona / ottimo	a 270x appare come un debole alone asimmetrico che aggetta verso W da una stellina; a 380x è in effetti un ovale orientato ~ da E a W con dimensioni 40"×30".
CGCG 160-185	gx	13h18m32s	+31°20.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme 380x.
CGCG 160-200	gx	13h20m15s	+30°54.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto esteso 15" o 20" di luminosità uniforme che salta fuori in visione distolta a 380x.
CGCG 160-201	gx	13h20m15s	+30°59.2'		Com	16"	m. buona / ottimo	debole, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale osservabile a 380x.
CGCG 160-251	gx	13h00m36s	+28°08.8'		Com	16"	ottima / ottimo	piccolissima e molto debole, di forma indistinta; una stellina debolissima appare a tratti a ridosso di SE; è situata 3' a W di NGC 4907 nell'Ammasso della Coma — 380x.
CGCG 160-261	gx	13h00m59s	+27°54.0'		Com	24"	ottima / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 161-5	gx	13h18m40s	+31°32.6'		CVn	16"	buona / ottimo	molto debole, ma facilmente visibile come un piccolo "baffo" molto allungato da N a S ed esteso 20"30" al massimo — 380x.
CGCG 161-20	gx	13h20m22s	+31°30.9'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda, di una 40-ina di secondi di Ø, ma è meglio scalare a 270x.
CGCG 161-27	gx	13h21m19s	+31°23.3'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è la più facile del quartetto di UGC 8392; rotonda, diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza marcata — 380x.
CGCG 161-28	gx	13h42m31s	+30°15.0'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare solo in visione distolta a 380x, estesa max 30" o 40", ma non riesco a capirne l'eventuale orientamento.
CGCG 161-48	gx	13h25m57s	+31°37.1'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debole, rotonda, Ø di 30" e con nucleo stellare osservabile a 380x; è situata tra 2 deboli stelline distanti un paio di primi e orientate da E a W.
CGCG 161-60	gx	13h28m03s	+31°57.6'		CVn	16"	buona / ottimo	piccola, compatta, di luminosità uniforme, orientata da N a S per 20" o 30" — 380x.
CGCG 161-64	gx	13h28m33s	+32°04.1'		CVn	16"	buona / ottimo	è un piccolo oggetto di luminosità uniforme e di forma un po' irregolare esteso per 20" o 30" — 380x.
CGCG 161-101	gx	13h38m43s	+31°16.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, rotonda, 30" di Ø e con nucleo stellare visibile a 380x.
CGCG 161-102	gx	13h38m59s	+31°21.9'		CVn	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20", con piccolo bulge diffuso abbastanza contrastato — 380x.
CGCG 161-122	gx	13h41m45s	+27°00.3'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×30" — 380x.
CGCG 162-22	gx	13h53m02s	+31°48.8'		CVn	16"	buona / ottimo	è un debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo, con Ø di max 20"; c'è una stellina a un paio di primi verso S — 380x.
CGCG 162-49	gx	14h01m04s	+29°31.5'		CVn	16"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; purtroppo anche scendendo a 270x nel campo sono presenti solo deboli stelline.
CGCG 162-50	gx	14h01m07s	+31°51.8'		CVn	16"	buona / ottimo	a 380x appare solo come una stellina appena sfuocata, di 10"-15" di Ø.
CGCG 162-59	gx	14h04m48s	+30°44.6'		Boo	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme con aspetto a tratti un po' irregolare; è orientata da NE a SW e di dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 163-9	gx	14h13m44s	+29°25.7'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; a 270x è presente nel campo solo qualche debole stellina.
CGCG 163-29	gx	14h19m22s	+26°18.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, forse rotonda, di luminosità uniforme e Ø max di 30"; appare in visione distolta a poco più di 1' SE di una stellina brillante — 380x.
CGCG 163-30	gx	14h20m39s	+26°51.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenue nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 163-62	gx	14h29m12s	+30°04.6'		Boo	16"	buona / m. buono	molto debole, ma visibile senza difficoltà in visione distolta; approssim. circolare, di dimensioni poco inferiori a NGC 5642 da cui dista 3' verso nord — 270x.
CGCG 163-70	gx	14h31m05s	+28°17.2'		Boo	16"	buona / m. buono	piccola e diffusa, con nucleo stellare evidente a 380x, poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20".
CGCG 163-79	gx	14h33m41s	+28°03.2'		Boo	16"	discreta / ottimo	rotonda, poco diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 380x.
CGCG 163-81	gx	14h34m10s	+27°56.8'		Boo	16"	discreta / ottimo	più debole di CGCG 163-79, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NNW — 380x.
CGCG 163-82	gx	14h34m27s	+31°33.1'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso W — 380x.
CGCG 164-7	gx	14h39m00s	+30°48.8'		Boo	16"	buona / ottimo	debolissima, a tratti in visione distolta appare orientata come la coppia di stelline situate 1' a NNE e con dimensioni ~ 30"×20" — 380x.
CGCG 164-18	gx	14h25m28s	+30°25.7'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda, di ~ 30" di Ø e con nucleo stellare visibile a 380x.
CGCG 164-27	gx	14h28m08s	+31°43.5'		Boo	16"	buona / ottimo	fa parte, assieme a CGCG 164-28, del quartetto di IC 4508-9 — sono due debolissimi oggetti rotondi, molto piccoli, estesi non più di 15" o 20" e distanti 1.5' in direzione N-S; appaiono facilmente in visione distolta, meglio evidenti e contrastati a 270x.
CGCG 164-28	gx	14h48m07s	+31°44.3'		Boo	16"	buona / ottimo	v. **CGCG 164-27**
CGCG 164-32	gx	14h49m30s	+27°52.7'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare visibile a 380x; c'è una stellina a poco più di 1' verso W.
CGCG 165-4	gx	15h03m41s	+28°28.5'		Boo	28"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme alle 5 successive, dell'ammasso **AGC 2022** — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni di 30"×15"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso SW — 495x.
CGCG 165-5	gx	15h04m07s	+28°31.1'		Boo	28"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale stellare — 495x.
CGCG 165-6	gx	15h04m16s	+28°29.8'		Boo	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e una tenue condensazione centrale poco contrastata; forma coppia ravvicinata con **MAC 1504+2829B** situata a ridosso E — 495x.
CGCG 165-7	gx	15h04m32s	+28°33.5'		Boo	28"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 495x.
CGCG 165-8	gx	15h04m27s	+28°23.7'		Boo	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 495x.
CGCG 165-9	gx	15h04m26s	+28°28.2'		Boo	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 495x.
CGCG 165-14	gx	15h05m17s	+28°19.8'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina a 1' verso NE e un'altra appena percettibile 30" a N o NW — 380x.
CGCG 165-23	gx	15h09m07s	+26°30.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 380x.
CGCG 165-27	gx	15h10m09s	+31°53.3'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, con piccola condensazione centrale molto tenue, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 165-32	gx	15h13m25s	+30°27.5'		Boo	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, di forma a tratti un po' irregolare, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20", con piccolo e tenue condensazione centrale poco contrastata — 495x.
CGCG 165-35	gx	15h14m40s	+26°35.6'		Boo	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; situata tra due stelle brillanti orientate da E a W — 450x.
CGCG 165-38	gx	15h21m11s	+26°19.9'		CrB	24"	buona / buono	lama di luce molto debole, orientata da E a W ed estesa 45" — 450x.
CGCG 165-42	gx	15h21m50s	+26°18.7'		CrB	24"	buona / buono	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 165-44	gx	15h22m14s	+26°23.0'		CrB	24"	buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 165-50	gx	15h24m26s	+26°25.8'		CrB	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; forma una coppia serrata con PGC 55004, situata a ridosso W, la quale è di aspetto e dimensione simili, solo poco più debole e con tenue condensazione stellare — 450x.
CGCG 165-51	gx	15h24m20s	+29°57.3'		CrB	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 165-54	gx	15h25m39s	+29°36.2'		CrB	16"	buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SSW e un'altra poco più debole a 1' NE — 380x.
CGCG 165-61	gx	15h27m44s	+28°14.0'		CrB	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi allineata con una coppia di stelline abbastanza brillanti a ridosso N — 495x.
CGCG 166-4	gx	15h30m12s	+27°08.0'		CrB	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NNW — 450x.
CGCG 166-5	gx	15h30m16s	+27°05.9'		CrB	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente ed estesa di CGCG 166-4, dalla quale dista poco più di 2' a SSE; è rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 166-8	gx	15h34m02s	+27°20.4'		CrB	24"	buona / buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stella brillante un paio di primi a NW — 450x.
CGCG 166-11	gx	15h35m15s	+27°19.5'		CrB	24"	buona / buono	relativamente facile, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 166-12	gx	15h35m15s	+27°21.0'		CrB	24"	buona / buono	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 166-11 situata 1.5' a S, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 166-20	gx	15h36m23s	+31°07.4'		CrB	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso NW — 380x.
CGCG 166-22	gx	15h37m05s	+29°20.2'		CrB	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **PGC 3089159** situata a ridosso NW — piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e con nucleo stellare; la PGC è di dimensione simile, ma decisamente più debole e di luminosità uniforme — 495x.
CGCG 166-23	gx	15h38m43s	+29°24.9'		CrB	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 166-24	gx	15h38m50s	+29°25.4'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 495x.
CGCG 166-30	gx	15h40m35s	+28°21.6'		CrB	16"	m. buona / ottimo	assieme a IC 4569, IC 4570 e IC 4572 fa parte di un terzetto di gx poste in diagonale — presenta una condensazione centrale marcata circonfusa da un alone rotondo di una 30-ina di secondi di Ø; c'è una stellina a 1' verso W — 380x.
CGCG 166-34	gx	15h41m03s	+32°13.6'		CrB	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, salta fuori in visione distolta una 30-ina di secondi a N di una stellina brillante; forse rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 166-36	gx	15h41m30s	+27°59.2'		CrB	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a S; disturbata dalla SAO 83949 di 8ª grandezza situata 1.5' a ENE — 450x.
CGCG 166-44	gx	15h43m46s	+28°24.9'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme 380x.
CGCG 166-45	gx	15h44m02s	+27°42.0'		CrB	24"	ottima / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 166-48	gx	15h44m09s	+27°26.6'		CrB	24"	ottima / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 166-49	gx	15h45m10s	+26°30.4'		CrB	24"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 166-53	gx	15h45m48s	+30°12.1'		CrB	16"	buona / ottimo	fa parte assieme a CGCG 166-54 e a UGC 10019 di un terzetto di oggetti molto difficili — debolissima, appare solo a tratti se osservata a 270x, mentre è meglio evidente scalando a 188x; è diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 45".
CGCG 166-54	gx	15h46m25s	+30°16.0'		CrB	16"	buona / ottimo	fa parte assieme alla precedente e a UGC 10019 di un terzetto di oggetti molto difficili di cui rappresenta la componente meno ostica — molto debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
CGCG 166-55	gx	15h46m30s	+32°07.0'		CrB	16"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
CGCG 166-64	gx	15h50m34s	+28°38.3'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale osservabile a 380x.
CGCG 167-5	gx	15h56m02s	+30°25.0'		CrB	16"	buona / ottimo	debolissima, osservabile solo in visione distolta a 270x, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o 40"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 2' verso NW.
CGCG 167-8	gx	15h58m35s	+27°37.6'		CrB	16"	m. buona / buono	molto debole, rotonda, appena più brillante all'interno e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 167-9	gx	15h58m44s	+26°49.1'		CrB	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, grosso modo rotonda, diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno; c'è una stellina 1' a SE — 380x.
CGCG 167-18	gx	16h02m51s	+32°08.7'		CrB	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
CGCG 167-30	gx	16h09m37s	+28°03.1'		CrB	16"	buona / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso W — 380x.
CGCG 167-55	gx	16h14m11s	+29°51.1'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda, diffusa, di 30" di Ø e con tenue condensazione centrale — 380x.
CGCG 167-56	gx	16h14m28s	+29°58.4'		CrB	16"	m. buona / ottimo	debolissima, ma visibile senza problemi a 380x, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o poco meno; solo a tratti appare leggermente condensata.
CGCG 167-68	gx	16h19m44s	+31°16.9'		CrB	16"	buona / ottimo	è una sorta di debole alone esteso 20"-25" che aggetta verso SE da una doppia serrata con le componenti sbilanciate; quest'ultima si sdoppia a fatica anche a 380x.
CGCG 168-8	gx	16h25m16s	+30°19.9'		Her	28"	ottima / m. buono	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo NW, ma attenzione: questa stellina sembra allungata in direzione N-S come se avesse una compagna molto debole e irrisolta; tuttavia non si tratta di una compagna stellare ma di **2MASS 16251480+3019296**; anche quella stellina percettibile a momenti situata subito a SE è in realtà una minuscola galassietta, ossia la **PGC 1899007** — 495x.
CGCG 168-12	gx	16h27m27s	+29°47.3'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø < 30" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' SW — 495x.
CGCG 168-19	gx	16h30m49s	+29°23.9'		Her	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una stellina a ridosso SE — 495x.
CGCG 168-26	gx	16h37m58s	+32°52.3'		Her	28"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30"; (situata in mezzo a 2 stelline brillanti orientate da ENE a WSW) — 495x.
CGCG 168-27	gx	16h38m40s	+32°32.7'		Her	28"	ottima / m. buono	diffusa, anche questa rotonda con Ø < 30" e poco più brillante all'interno; stellina al bordo SW — 495x.
CGCG 169-4	gx	16h49m05s	+29°45.5'		Her	16"	buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo con Ø < 30", diffuso e di luminosità uniforme; appare in visione distolta a ~ 1.5' S di una stellina brillante — 380x.
CGCG 169-7	gx	16h51m04s	+30°39.8'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 495x.
CGCG 169-10	gx	16h52m56s	+30°30.1'		Her	16"	buona / ottimo	a prima vista appare come una sorta di debolissimo alone asimmetrico attorno a una stellina, con Ø di una 20-ina di secondi; solo a tratti sembra "staccarsi", ma occorre spingere a 380x; ci sono 3 stelline molto deboli allineate a W della gx e orientate da N a S.
CGCG 169-12	gx	16h56m22s	+29°19.9'		Her	28"	ottima / m. buono	è debolissima, ma a tratti in visione distolta appare orientata in visione distolta con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina subito a W e una a 1' verso S — 495x.
CGCG 169-16	gx	16h57m18s	+28°11.3'		Her	28"	ottima / m. buono	presenta una sorta di "barra" orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" circonfusa da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo, di dimensioni grosso modo 45"×30" e orientato da N a S — 495x.
CGCG 169-18	gx	16h57m53s	+28°07.7'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stella brillante a 1' SW e una coppia di stelline a 1' scarso NE — 495x.
CGCG 169-20	gx	16h58m08s	+29°54.7'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima e di aspetto confuso, in quanto c'è una doppia brillante sovrapposta; a tratti, in visione distolta, sembra aggettare leggermente verso S per una 20-ina di secondi; è tuttavia meglio visibile scalando a 270x.
CGCG 169-39	gx	17h04m24s	+28°27.8'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 169-41	gx	17h06m55s	+30°16.2'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme, salvo un tenue nucleo quasi stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 169-47	gx	17h08m33s	+31°48.3'		Her	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza rotonda, diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi, facilmente visibile in visione distolta a 270x.
CGCG 169-52	gx	17h10m13s	+30°18.5'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di ~ 40" e poco più brillante all'interno; situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti 1.5' — 380x.
CGCG 170-6	gx	17h15m28s	+30°53.7'		Her	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, piccola, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N e un'altra più debole a 1' a S in coppia con una 3ª — 380x.
CGCG 170-19	gx	17h22m39s	+30°52.5'		Her	16"	ottima / ottimo	assieme a CGCG 170-20 forma una coppia di galassiette molto deboli distanti meno di 1' in direzione NNE-SSW e di dimensioni simili; la 1ª è allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e poco più brillante all'interno; ha una stellina quasi a ridosso verso E; la 2ª è invece orientata da NE a SW con condensazione centrale più evidente — 380x.
CGCG 170-20	gx	17h22m38s	+32°52.2'		Her	16"	ottima / ottimo	v. **CGCG 170-19**
CGCG 170-22	gx	17h22m57s	+31°20.5'		Her	16"	ottima / ottimo	minuscolo oggetto molto debole e relativamente compatto, orientato da E a W con dimensioni 30"×15" — 380x.
CGCG 170-34	gx	17h30m30s	+29°19.0'		Her	16"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 270x.
CGCG 171-25	gx	17h55m05s	+28°57.5'		Her	16"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 40"; è situata tra una stellina brillante e una doppia debole dalle componenti molto ravvicinate — 270x.
CGCG 171-26	gx	17h55m19s	+28°40.7'		Her	16"	m. buona / buono	molto debole e molto piccola, relativamente compatta con Ø non superiore a 25" o 30" e di luminosità uniforme — 270x.
CGCG 172-29	gx	18h23m04s	+29°54.1'		Her	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SE; una piccola catena di 4 stelline sbilanciate si trova verso W — 450x.
CGCG 172-35	gx	18h25m38s	+32°00.0'		Lyr	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina brillante a ridosso N — 450x.
CGCG 173-3	gx	18h32m06s	+31°01.6'		Lyr	24"	m. buona / buono	relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale molto tenue — 450x.
CGCG 173-8	gx	18h34m09s	+32°11.0'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta subito a SE di una debole stellina; a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
CGCG 173-9	gx	18h34m17s	+32°11.7'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; è situata in mezzo a 2 stelline: una appena percettibile a N e l'altra più evidente a S — 450x.
CGCG 173-13	gx	18h35m06s	+30°37.5'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, grosso modo rotonda con Ø a 40"; c'è una stellina brillante subito a NW — 450x.
CGCG 173-18	gx	18h37m12s	+30°37.7'		Lyr	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø < 20"; appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti; c'è una debole stellina quasi a ridosso NE e una brillante a 1' SW — 450x.
CGCG 173-21	gx	18h39m48s	+32°51.7'		Lyr	24"	m. buona / buono	appare elusivamente in visione distolta a 450x; molto piccola, forse rotonda con Ø < 20", allineata ed equidistante con due stelline a SW (quella più vicina alla gx è molto debole).
CGCG 173-22	gx	18h39m51s	+32°48.4'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso NE — 450x.
CGCG 174-4	gx	06h27m53s	+35°31.1'		Aur	24"	m. buona / mediocre	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; è circondata da diverse stelline brillanti — 450x.
CGCG 175-3	gx	06h31m55s	+35°33.2'		Aur	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio osservabile a 380x.
CGCG 175-4	gx	06h32m02s	+33°06.6'		Aur	24"	m. buona / mediocre	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 175-6	gx	06h34m10s	+38°14.3'		Aur	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una doppia serrata a 1.5' NNE; una tripletta di stelline brillanti si trova una decina di primi a S — 450x.
CGCG 175-9	gx	06h39m28s	+33°34.0'		Aur	24"	m. buona / mediocre	piccola, debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una debole stellina al bordo NE ne confonde un po' la forma; un'altra stellina debole si trova a ridosso W; c'è poi una doppia stretta a un paio di primi WSW — 340x.

CGCG 175-10	gx	06h42m06s	+34°27.5'		Gem	24"	m. buona / mediocre	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a ridosso N — 450x.
CGCG 175-11	gx	06h42m15s	+34°26.0'		Gem	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso E; un piccolo asterismo di 5 stelline abbastanza brillanti che sembra foggiato come una paletta si trova 3' a SW — 450x.
CGCG 175-22	gx	06h51m54s	+36°54.8'		Aur	24"	m. buona / mediocre	chiazza molto debole e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; ci sono 2 stelline quasi a ridosso a NE e SE — 450x.
CGCG 175-23	gx	06h53m01s	+34°55.4'		Gem	24"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a N; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
CGCG 176-1	gx	06h55m28s	+33°16.9'		Gem	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e con piccolo bulge abbastanza brillante; è allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' NW (sull'asse della gx) e un'altra più brillante alla stessa distanza verso NE — 380x.
CGCG 176-3	gx	06h58m23s	+35°50.5'		Aur	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a ridosso verso NNE — 380x.
CGCG 176-13	gx	07h04m03s	+37°54.8'		Aur	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda, diffusa, e di luminosità uniforme, molto disturbata da una stellina brillante sovrapposta verso SE (questa stellina fa parte di un piccolo asterismo di 4 componenti) — 380x.
CGCG 176-15	gx	07h04m47s	+37°04.8'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; situata a ridosso W di un piccolo asterismo di 4 stelline — 450x.
CGCG 176-17	gx	07h06m24s	+33°37.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (il campo è molto ricco di stelline) — 450x.
CGCG 176-21	gx	07h09m42s	+36°22.1'		Aur	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 176-22	gx	07h09m41s	+33°22.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a E e una a 1' verso N — 450x.
CGCG 176-24	gx	07h10m15s	+33°39.8'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e con condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina quasi a ridosso N e un'altra a 1' verso E — 450x.
CGCG 176-31	gx	07h14m52s	+36°04.7'		Aur	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 176-33	gx	07h15m22s	+36°02.3'		Aur	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni analoghe alla precedente e con bulge molto tenue; c'è una stellina brillante a 1' SW — 450x.
CGCG 176-34	gx	07h16m04s	+37°25.2'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo N — 450x.
CGCG 176-39	gx	07h17m42s	+36°46.8'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo N — 450x.
CGCG 176-42	gx	07h23m15s	+37°21.5'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di deboli stelline subito a E — 450x.
CGCG 176-44	gx	07h24m05s	+37°57.2'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; una stellina percettibile solo a momenti appare a ridosso W — 450x.
CGCG 177-7	gx	07h24m20s	+32°35.5'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 177-13	gx	07h26m01s	+37°22.2'		Aur	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e poco diffusa, orientata da E a W, di dimensioni 20"×15" e con un nucleo stellare visibile solo a momenti; c'è una stellina brillante subito a S — 450x.
CGCG 177-19	gx	07h28m14s	+33°59.9'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' N (quella più vicina alla gx è più brillante); una piccola catena di 4 deboli stelline si trova a SE — 450x.
CGCG 177-32	gx	07h33m18s	+32°32.7'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso S e una debole subito a E — 450x.
CGCG 177-39	gx	07h37m13s	+35°40.1'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" o poco più e con nucleo stellare evidente; c'è una debole stellina subito a W — 450x.
CGCG 177-48	gx	07h49m37s	+32°44.3'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; situata tra una stellina brillante a WNW e una debole a E — 450x.
CGCG 178-5	gx	07h53m23s	+36°16.5'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 178-6	gx	07h57m04s	+33°05.0'		Gem	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci dovrebbe essere una stellina al bordo N; è allineata ed equidistante con 2 stelline orientate da N a S — 380x.
CGCG 178-7	gx	07h57m22s	+33°07.7'		Gem	16"	m. buona / m. buono	debole, molto piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 380x.
CGCG 178-9	gx	07h57m47s	+37°59.5'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 178-15	gx	07h59m57s	+35°48.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N — 380x.
CGCG 178-19	gx	08h02m39s	+34°46.6'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 178-21	gx	08h03m29s	+33°27.7'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di ~ 30", diffusa e con nucleo appena percettibile a 380x.
CGCG 178-22	gx	08h03m45s	+35°20.5'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 178-23	gx	08h04m11s	+34°51.4'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso NE; non sembra disturbata dalla SAO 60535 di 8ª grandezza situata 5' a NNE (questa stella fa coppia con un'altra brillante di 10ª a 1.5' SW) — 450x.
CGCG 178-25	gx	08h05m29s	+37°33.5'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 178-27	gx	08h05m30s	+37°32.1'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con piccola condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso W — 450x.
CGCG 178-28	gx	08h07m07s	+36°14.0'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa, a tratti condensata, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 178-31	gx	08h10m06s	+38°01.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi c'è una stellina a 1.5' SSW — 450x.
CGCG 178-34	gx	08h11m07s	+36°35.9'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; orientata e allineata con due stelline a NW; proseguendo in questa direzione, a 5' dalla gx c'è la SAO 60620 di 9ª grandezza — 450x.
CGCG 178-36	gx	08h13m18s	+34°55.9'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo stellare marcato con 2 tenuissimi baffi che appaiono però solo in visione distolta e che si dipartono a NW e a SE per una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a ~ 1' verso S — 380x.
CGCG 178-37	gx	08h13m47s	+37°03.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1.5' SE; una poco più evidente è alla stessa distanza verso NE — 450x.
CGCG 179-4	gx	08h24m12s	+37°51.2'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 179-5	gx	08h25m10s	+37°59.3'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 179-9	gx	08h29m08s	+38°14.3'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa, a tratti leggermente condensata, rotonda con Ø di ~ 30"; è meglio definita a 270x.
CGCG 179-14	gx	08h36m30s	+38°08.6'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 179-19	gx	08h42m57s	+37°32.8'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 179-20	gx	08h43m13s	+37°32.3'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	situata 3' a E della precedente, è molto debole, piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a S (quella a S è più brillante) — 450x.
CGCG 179-25	gx	08h45m27s	+34°25.1'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, piccola, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, appena più brillante all'interno; si trova al vertice rettangolo di un triangolo isoscele coi cateti lunghi 3' formato con una stellina brillante (a E) e una doppia stretta (a S) — 380x.
CGCG 179-27	gx	08h46m18s	+37°41.8'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stella brillante un paio di primi a N; meglio contrastata scalando a 340x — 450x.
CGCG 179-30	gx	08h47m25s	+37°38.6'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 179-33	gx	08h48m03s	+37°39.8'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' verso E, mentre alcune altre stelline molto debole si trovano attorno alla gx — 450x.
CGCG 180-5	gx	08h47m40s	+37°36.5'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole e molto debole, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo E (altresì denominata **CGCG 179-31**) — 450x.
CGCG 180-10	gx	08h48m12s	+36°46.8'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 180-20	gx	08h54m29s	+32°38.1'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto molto piccolo e relativamente compatto, non più esteso di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente a 380x a ridosso verso N di una stellina.
CGCG 180-46	gx	09h09m33s	+32°30.4'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza rotonda, piccola e molto diffusa con Ø max di 30"; è visibile solo a tratti in visione distolta a 270x; ci sono 3 stelline allineate un paio di primi verso W (quella centrale è la più brillante).
CGCG 180-50	gx	09h09m48s	+37°42.5'		Lyn	16"	buona / m. buono	debole, ma relativamente facile, rotonda, di luminosità pressoché uniforme. Poco diffusa e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 180-62	gx	09h14m26s	+36°06.7'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	macchiolina rotonda poco diffusa di 30"-35" di Ø e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 181-47	gx	09h29m33s	+36°10.8'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debolissima, rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline situate 1' a N e 2' a NE — 380x.
CGCG 181-50	gx	09h30m16s	+36°41.5'		LMi	16"	m. buona / ottimo	ancora più debole di CGCG 181-47 , ma in visione distolta salta fuori abbastanza facilmente a patto di scalare a 270x; forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
CGCG 181-54	gx	09h33m17s	+33°54.3'		LMi	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, rotonda e diffusa, di luminosità uniforme e Ø di ~ 30"; è disturbata dalla luce della SAO 61557 di magnitudo 9.6 situata a poco più di 1' NW — 380x.
CGCG 181-56	gx	09h33m34s	+33°38.9'		LMi	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare — 380x.
CGCG 181-57	gx	09h33m43s	+33°36.0'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a ~ 3' Se di CGCG 181-56, ma bisogna scalare a 270x; non riesco comunque a capire com'è fatta; sono entrambe situate in un campo molto povero.
CGCG 181-58	gx	09h33m54s	+34°03.7'		LMi	16"	m. buona / ottimo	è una chiazza evanescente, piccola e molto diffusa, estesa max 30"; appare solo a tratti in visione distolta a 380x, ma non riesco a capire com'è orientata.
CGCG 181-59	gx	09h34m01s	+33°59.5'		LMi	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e con piccolo nucleo evidente di aspetto quasi stellare visibile a 380x.
CGCG 181-63	gx	09h35m29s	+34°59.2'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e compatta, rotonda con Ø max di 20" e nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 181-64	gx	09h36m19s	+37°14.8'		LMi	16"	m. buona / ottimo	piccola, compatta e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso SW — 380x.
CGCG 181-75	gx	09h38m54s	+34°18.0'		LMi	16"	m. buona / ottimo	debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' SE; un'altra appena percettibile si trova a E — 380x.
CGCG 182-7	gx	09h44m31s	+32°48.8'		Leo	16"	buona / ottimo	molto debole e poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti — 380x.
CGCG 182-10	gx	09h45m15s	+34°42.7'		LMi	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" e nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 182-11	gx	09h45m20s	+36°09.4'		LMi	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo di una 30-ina di secondi di Ø che aggetta a E di una stellina; c'è un'altra stellina a meno di 1' verso N — 380x.
CGCG 182-13	gx	09h45m52s	+34°41.1'		LMi	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 50"×25" e con bulge diffuso appena accennato; c'è una stellina brillante a 1' NW — 380x.
CGCG 182-18	gx	09h47m23s	+34°47.0'		LMi	16"	buona / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata a 270x.
CGCG 182-19	gx	09h47m41s	+35°03.5'		LMi	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e appena più brillante all'interno — 380x.
CGCG 182-28	gx	09h53m18s	+36°05.1'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è poco più contrastata a 270x.
CGCG 182-49	gx	09h57m53s	+36°20.9'		LMi	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 182-58	gx	10h01m26s	+36°40.3'		LMi	16"	ottima / ottimo	abbastanza facile, piccola e condensata, diffusa con Ø di 25"-30"; poco più evidente a 380x.
CGCG 182-71	gx	10h04m54s	+37°21.5'		LMi	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 380x.
CGCG 183-3	gx	10h10m40s	+32°18.6'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, piccola, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 183-24	gx	10h26m14s	+37°27.6'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 50"×40" — 270x.
CGCG 183-29	gx	10h35m23s	+37°40.3'		LMi	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale — 380x.
CGCG 184-32	gx	10h52m51s	+37°44.4'		LMi	16"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø una 30-ina di secondi; appare leggermente condensata scalando a 270x.
CGCG 184-33	gx	10h52m59s	+37°36.8'		LMi	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è meglio definita a 270x.
CGCG 184-36	gx	10h53m38s	+34°02.0'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a poco più di 1' verso E — 380x.
CGCG 184-39	gx	10h57m42s	+37°39.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, con nucleo quasi stellare visibile a tratti a 380x; è orientata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina luminosa a 3' verso W.
CGCG 184-42	gx	11h00m10s	+35°19.3'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con nucleo stellare; appare poco più contrastata a 270x.
CGCG 185-10	gx	11h08m00s	+36°52.4'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 185-12	gx	11h09m52s	+37°00.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole, appare abbastanza facilmente in visione distolta, poco allungata da NE a SW (ossia come la coppia NGC 3545 A e B dalla quale dista 4.5' a NW), di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale evidente a 270x (a 380x il campo è virtualmente depleto).
CGCG 185-14	gx	11h09m58s	+37°08.2'		UMa	16"	ottima / m. buono	è un ovale piccolo e debole, di dimensioni 30"×20", orientato da NE a SW, di aspetto regolare e gradatamente più brillante verso l'interno — 270x.
CGCG 185-16	gx	11h11m18s	+35°23.1'		UMa	16"	buona / ottimo	debolissima e molto difficile da "catturare", perché a 270x il campo stellare è totalmente depleto; scalando a 132x il fondo cielo è troppo chiaro; solo a 188x si riesce a percepire: appare a tratti allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 60"×30".
CGCG 185-44	gx	11h21m31s	+33°57.5'		UMa	16"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, con nucleo stellare appena percettibile, allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 185-53	gx	11h23m11s	+34°29.4'		UMa	16"	m. buona / ottimo	lama di luce estremamente debole visibile solo in visione distolta un paio di primi a E di UGC 6397; è orientata in modo simile ed estesa altrettanto, ma è molto sottile — 380x.
CGCG 185-63	gx	11h26m17s	+35°20.4'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 185-64	gx	11h26m27s	+35°20.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	situata 2' scarsi a ESE di CGCG 185-63, è molto debole, di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 185-65	gx	11h26m38s	+35°25.4'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo lucore di luminosità uniforme di luminosità uniforme, diffuso e con Ø di una 30-ina di secondi situato a ridosso NW di una stellina brillante (che fa parte di una coppia separata da ~ 1' e orientata NE-SW) — 380x.
CGCG 185-66	gx	11h26m48s	+35°15.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è la più facile del gruppo — rotonda, di 30" di Ø e con nucleo stellare visibile a 380x; in visione distolta appare a tratti una sorta di piccola protuberanza che aggetta verso S.
CGCG 185-68	gx	11h27m35s	+36°04.3'		UMa	16"	buona / ottimo	assieme a CGCG 185-69 forma una coppia di gx che si separano facilmente a 380x: la 1ª è di aspetto più uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; la 2ª è piccola e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 185-69	gx	11h27m33s	+36°04.3'		UMa	16"	buona / ottimo	v. **CGCG 185-68**
CGCG 186-9	gx	11h34m28s	+33°10.8'		UMa	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo, diffuso e appena condensato con Ø di ~ 30"; c'è una stellina a poco più di 1' WNW — 380x.
CGCG 186-15	gx	11h38m36s	+33°52.1'		UMa	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno — 380x.
CGCG 186-18	gx	11h39m14s	+33°55.9'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debolissima, piccola e molto diffusa, di Ø max 20"; appare in visione distolta a 380x.
CGCG 186-22	gx	11h40m51s	+33°41.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	è un ovale molto debole orientato da E a W con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; disturbata dalla SAO 61251 situata a soli 3' W che non si riesce a tener fuori campo neppure a 380x.
CGCG 186-36	gx	11h44m45s	+33°19.2'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 186-58	gx	11h51m40s	+36°35.3'		UMa	16"	mediocre / ottimo	è una debolissima chiazza osservabile in visione distolta a 380x, allungata da NW a SE, molto diffusa e con dimensioni ~ 40"×20" (l'asse maggiore è pari grosso modo alla distanza delle 2 stelline brillanti subito a W) (situata 1.5' a W di UGC 6836).
CGCG 186-63	gx	11h53m07s	+35°01.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 187-17	gx	12h10m51s	+36°37.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, diffusa, rotonda, di 45" di Ø e con nucleo evidente di aspetto stellare — 380x.
CGCG 187-25	gx	12h14m14s	+32°25.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	situata un paio di primi a W di UGC 7243, è più debole, poco più piccola, più diffusa e di luminosità più uniforme, approssim. rotonda con Ø di ~ 40" — 380x.
CGCG 187-28	gx	12h14m49s	+33°01.2'		Com	24"	ottima / buono	piccola, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; ci sono 2 stelline quasi a ridosso della gx: una a W e l'altra più debole a SE — 450x.
CGCG 187-43	gx	12h26m55s	+37°54.5'		CVn	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale evidente e diffusa — 380x.
CGCG 188-9	gx	12h35m12s	+34°07.3'		CVn	16"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 189-38	gx	13h11m57s	+34°21.9'		CVn	16"	m. buona / ottimo	abbastanza facile, rotonda, poco diffusa e con nucleo stellare evidente — 380x.
CGCG 189-40	gx	13h12m29s	+34°03.4'		CVn	16"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare visibile a 380x; c'è una stellina a 1' verso SW.
CGCG 190-5	gx	13h24m44s	+32°32.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	a 270x si vedono in realtà 2 oggetti distanti 1.5' in direzione NW-SE; quella a SE, che è la gx che stavo cercando, è molto debole, rotonda con Ø di ~ 40"; l'altra, che da un controllo effettuato è risultata essere la MAC 1324-3233, è di luminosità e dimensioni appena inferiori e con nucleo stellare. Non posso spingere a 380x perché il campo diviene virtualmente depleto.
CGCG 190-22	gx	13h33m06s	+33°08.9'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 190-23	gx	13h33m13s	+33°06.5'		CVn	16"	ottima / ottimo	più debole di UGC 8539, dalla quale dista 5' NW, allungata all'incirca da N a S, di dimensioni 60"×30" e con bulge appena percettibile sul disco — 380x.
CGCG 190-42	gx	13h42m06s	+37°02.5'		CVn	16"	buona / buono	rotonda, diffusa, con piccola condensazione centrale abbastanza marcata e Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 380x.
CGCG 190-52	gx	13h46m11s	+36°35.8'		CVn	16"	buona / buono	debole, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×30" e appena più brillante all'interno — 270x.
CGCG 190-59	gx	13h48m35s	+37°06.8'		CVn	16"	buona / buono	relativamente facile, rotonda con alto gradiente di luce e Ø di 45" — 380x.
CGCG 191-4	gx	13h52m59s	+37°21.8'		CVn	16"	buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda a prima vista, mentre in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 380x.
CGCG 191-14	gx	13h54m03s	+37°22.8'		CVn	16"	buona / buono	molto piccola, poco allungata da E a W, dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 191-30	gx	13h59m57s	+38°12.1'	q 110	CVn	16"	buona / ottimo	galassietta piccola e facile, situata 1.5' a NE di NGC 5403; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; situata a 1.5' NE di NGC 5403 (riportata sull'Uranometria come **5403A**) — 380x.
CGCG 191-48	gx	14h04m15s	+35°48.0'		CVn	16"	buona / ottimo	piccolo oggetto relativamente compatto, di una 20-ina di secondi di Ø e nucleo stellare visibile a 380x; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline.
CGCG 191-71	gx	14h15m45s	+36°10.7'		Boo	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 192-10	gx	14h23m04s	+38°08.5'		Boo	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio scalare a 270x.
CGCG 192-18	gx	14h24m51s	+38°15.2'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e condensata, approssim. rotonda con Ø < 30" — 380x.
CGCG 192-25	gx	14h28m25s	+32°23.5'		Boo	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 192-27	gx	14h28m21s	+35°24.3'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso W; in visione distolta appare meglio a 380x.
CGCG 192-45	gx	14h35m44s	+35°04.5'		Boo	16"	buona / ottimo	più debole di MCG+6-32-70, dalla quale dista 6' a SE, con Ø non superiore a 30", diffusa e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 192-47	gx	14h35m56s	+36°43.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere a 380x, rotonda, diffusa, di 30" di Ø e con piccola condensazione centrale abbastanza marcata.
CGCG 192-60	gx	14h46m30s	+32°38.5'		Boo	16"	buona / ottimo	molto debole e piccola, ma a 380x appare chiaramente poco allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue nucleo stellare visibile a tratti.
CGCG 193-15	gx	15h04m33s	+35°57.9'		Boo	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta una condensazione centrale quasi stellare ben visibile a 380x.
CGCG 194-10	gx	15h34m01s	+32°49.2'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 194-11	gx	15h37m25s	+33°40.2'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e con condensazione centrale poco contrastata, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante al bordo SW — 495x.
CGCG 194-13	gx	15h38m38s	+36°57.5'		CrB	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, piccola, poco allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente a 380x.
CGCG 194-15	gx	15h40m56s	+32°47.0'		CrB	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; disturbata dalla SAO 64843 di 8ª ad appena 2.5' SW — 380x.
CGCG 194-16	gx	15h41m00s	+32°40.0'		CrB	16"	buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di Ø < 30" facilmente visibile in visione distolta a 380x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E.
CGCG 195-11	gx	16h04m51s	+34°36.5'		CrB	16"	m. buona / ottimo	assieme a CGCG 195-12 forma una coppia di galassiette rotonde, molto deboli e di luminosità uniforme, distanti 3' scarsi in direzione NW-SE; la 1ª è poco più evidente e più grande, con Ø di una 30-ina di secondi; la 2a, con Ø di una 20-ina di secondi, è invece situata quasi a ridosso NW di una stellina — 380x.
CGCG 195-12	gx	16h04m56s	+34°35.7'		CrB	16"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 195-11**
CGCG 196-5	gx	16h13m02s	+37°17.3'		CrB	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, con condensazione centrale visibile a tratti a 380x; non pare > 30"; c'è una doppia stretta a 3.5' SW.
CGCG 196-29	gx	16h18m01s	+35°16.0'		CrB	16"	buona / m. buono	è una galassia molto debole e diffusa, forse circolare, di una 30-ina di secondi di Ø situata a quasi a ridosso verso S di una stellina di 13a grandezza — 270x.
CGCG 196-31	gx	16h18m33s	+35°29.1'		CrB	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45" — 380x.
CGCG 196-33	gx	16h19m05s	+35°01.9'		CrB	16"	buona / m. buono	è un debolissimo oggetto che solo a tratti appare allungato E W, esteso non più di 20" o 30" — 270x.
CGCG 196-35	gx	16h19m22s	+35°34.5'		CrB	16"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme e molto diffusa; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30", ma occorre spingere a 380x.
CGCG 196-44	gx	16h21m11s	+36°04.1'		CrB	28"	ottima / m. buono	piccola, molto debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline abbastanza brillanti a 4' NW — 495x.
CGCG 196-47	gx	16h21m34s	+38°00.5'		Her	16"	m. buona / ottimo	debolissima, piccola e molto diffusa; appare a tratti in visione distolta quando si osserva NGC 6129 situata un paio di primi a ESE — 380x.
CGCG 196-50	gx	16h22m35s	+38°22.1'		CrB	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE — 495x.
CGCG 196-51	gx	16h22m47s	+37°33.3'		CrB	16"	buona / discreto	è una debole lama di luce piccola e relativamente compatta, orientata da NW a SE ed estesa una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NE (ultima gx osservata: albeggia) — 380x.
CGCG 196-52	gx	16h23m00s	+37°57.0'		Her	16"	m. buona / ottimo	appare facilmente in visione distolta quando si osserva la 6137 (dalla quale dista un paio di primi a N); è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, di luminosità uniforme, poco diffusa e situata a ~ 40" a N di una stellina — 380x.
CGCG 196-54	gx	16h23m08s	+35°50.3'		CrB	28"	ottima / m. buono	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30", con tenue bulge evidente — 495x.
CGCG 196-57	gx	16h23m39s	+35°00.7'		CrB	28"	ottima / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso NE — 495x.
CGCG 196-58	gx	16h23m56s	+36°13.7'		CrB	28"	ottima / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con bulge evidente, anche se poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' WNW — 495x.
CGCG 196-59	gx	16h24m07s	+36°13.9'		CrB	28"	ottima / m. buono	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso E — 495x.
CGCG 196-62	gx	16h26m30s	+35°40.3'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
CGCG 196-67	gx	16h27m29s	+38°52.2'		Her	16"	ottima / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e tenue condensazione centrale — 380x.
CGCG 196-71	gx	16h28m20s	+38°48.7'		Her	16"	ottima / m. buono	rotonda, relativamente compatta, di 30" di Ø e con nucleo stellare facilmente osservabile a 380x.
CGCG 196-75	gx	16h32m49s	+37°21.5'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stella brillante a 2' scarsi verso S — 380x.
CGCG 196-78	gx	16h33m49s	+33°19.7'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, con condensazione centrale appena accennata, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' verso NE e un'altra abbastanza brillante a 1.5' NW — 380x.
CGCG 196-98	gx	16h21m23s	+32°20.9'		CrB	28"	ottima / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 495x.
CGCG 197-1	gx	16h39m55s	+37°10.8'		Her	16"	ottima / m. buono	poco più debole di CGCG 197-2, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale quasi stellare 380x.
CGCG 197-2	gx	16h40m06s	+37°11.5'		Her	16"	ottima / m. buono	presenta un nucleo stellare abbastanza marcato circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW e un'altra a poco più di 1' a NW — 380x.
CGCG 197-5	gx	16h41m00s	+33°46.4'		CrB	16"	ottima / buono	molto debole, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 40"×15 e con nucleo stellare osservabile a 380x; c'è una stellina sul prolungamento dell'asse subito a WSW.
CGCG 197-6	gx	16h41m25s	+33°21.0'		Her	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, con dimensioni grosso modo 40"×20"; in visione distolta sembra aggettare verso SW da una coppia di deboli stelline distanti una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 197-12	gx	16h48m17s	+35°50.5'		Her	16"	buona / ottimo	fa parte, assieme a CGCG 197-13 e CGCG 197-14, di un terzetto piuttosto difficile — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' verso S — 380x.
CGCG 197-13	gx	16h48m17s	+35°54.0'		Her	16"	buona / ottimo	fa parte, assieme alla precedente e alla successiva, di un terzetto piuttosto difficile di cui tuttavia rappresenta il membro più evidente — debole, rotonda con Ø > 30" e poco più brillante verso l'interno — 380x.
CGCG 197-14	gx	16h48m42s	+35°56.6'		Her	16"	buona / ottimo	fa parte, assieme alle due precedenti, di un terzetto di cui rappresenta la componente più difficile da vedere — è debolissima, ma relativamente compatta, purtroppo immersa nell'alone di una doppia stretta molto brillante che ne attenua il contrasto; solo in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 197-22	gx	16h58m55s	+36°31.3'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina visibile solo a momenti quasi a ridosso verso E — 495x.
CGCG 197-36	gx	17h06m42s	+35°52.2'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, con nucleo stellare visibile a tratti, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 198-9	gx	17h07m58s	+34°49.1'		Her	16"	buona / discreto	piccola e molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 380x.
CGCG 198-20	gx	17h12m28s	+35°53.0'		Her	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 35"-40"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SSE — 380x.
CGCG 198-40	gx	17h24m08s	+33°50.5'		Her	16"	buona / discreto	debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a 45" verso W — 380x.
CGCG 198-42	gx	17h26m22s	+36°16.1'		Her	16"	buona / discreto	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø 45"; c'è una stellina a 1' verso NE — 380x.
CGCG 199-3	gx	17h39m30s	+33°54.3'		Her	24"	ottima / m. buono	debole, molto piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di 10"-12"; allineata con due stelline a E — 450x.
CGCG 199-5	gx	17h40m05s	+33°48.7'		Her	24"	ottima / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una sorta di debole stellina al bordo SE, che appare debolmente sfocata in visione distolta, e ne confonde un po' la forma, ma questa è in realtà la **2MASS 17400627+3348306 —** 450x.
CGCG 199-14	gx	17h43m59s	+36°52.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20".
CGCG 199-26	gx	17h52m37s	+37°44.9'		Her	24"	m. buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare; c'è una stellina brillante a 1.5' N — 450x.
CGCG 199-32	gx	18h00m12s	+34°30.0'		Her	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 200-6	gx	18h07m49s	+35°53.0'		Her	24"	m. buona / buono	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE (la più orientale di un piccolo asterismo orientato da NE a SW e formato da 4 componenti); una stellina appena percettibile si trova subito a NE e un'altra poco più evidente a 1' scarso NNW — 450x.
CGCG 201-7	gx	18h32m26s	+34°04.9'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; poco disturbata da una stellina brillante situata 1' scarso a SE; una stellina più debole si trova invece subito a N — 450x.
CGCG 201-14	gx	18h35m57s	+38°08.1'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo evidente; questo è allineato e quasi equidistante con una coppia di stelline a SW — 450x.
CGCG 201-15	gx	18h36m10s	+38°09.6'		Lyr	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 201-18	gx	18h37m41s	+37°21.8'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; allineata e quasi equidistante con due stelline abbastanza brillanti a SW; c'è una debole stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 201-19	gx	18h37m52s	+37°28.1'		Lyr	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; poco disturbata dalla SAO 67189 di 8ª grandezza situata 3' scarsi a SSE — 450x.
CGCG 201-20	gx	18h38m05s	+37°13.7'		Lyr	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo NW — 450x.
CGCG 201-25	gx	18h39m58s	+37°49.7'		Lyr	24"	m. buona / buono	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 201-30	gx	18h41m15s	+35°02.9'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W; la visione è un poco disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 202-1	gx	18h57m38s	+38°00.5'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotondeggiante con Ø di una 40-ina di secondi; solo a tratti, a 380x, appare una tenue e piccola condensazione centrale; c'è una stellina evidente a ridosso NW.
CGCG 203-6	gx	06h19m19s	+42°37.2'		Aur	28"	buona / mediocre	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso NW e una brillante a 1' verso E — 495x.
CGCG 203-7	gx	06h19m37s	+42°33.6'		Aur	28"	buona / mediocre	anche questa è molto piccola, molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a ridosso NE; la gx è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti distanti 1.5' e orientate da N a S — 495x.
CGCG 203-9	gx	06h25m03s	+40°17.7'		Aur	28"	buona / mediocre	altra galassietta molto piccola e debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una doppia a 1' E e una stellina più debole alla stessa distanza verso SW; la gx si trova in mezzo a 2 stelle brillanti orientate da NNW a SSE — 495x.
CGCG 204-6	gx	06h34m08s	+39°24.9'		Aur	28"	buona / mediocre	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata al margine E di un gruppo di stelle disperso e di forma triangolare che pare un vero e proprio ammasso aperto nel quale si contano una decina di componenti abbastanza brillanti — 495x.
CGCG 204-23	gx	06h51m54s	+40°52.5'		Aur	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S e una più evidente a 1' NE — 495x.
CGCG 204-27	gx	06h55m10s	+41°00.2'		Aur	16"	buona / m. buono	più evidente di UGC 3593, dalla quale dista 3' NNW; è un piccolo oggetto rotondo di 30" di Ø appena più brillante verso l'interno — 380x.
CGCG 205-7	gx	06h55m51s	+40°41.6'		Aur	20"	m. buona / buono	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia brillante un paio di primi a ESE — 360x.
CGCG 205-12	gx	07h03m04s	+39°14.4'		Aur	28"	m. buona / discreto	diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una terna arcuata di stelline brillanti a W — 495x.
CGCG 205-14	gx	07h05m56s	+41°00.7'		Aur	28"	m. buona / discreto	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella brillante a ridosso S (fa parte di un triangolo isoscele col vertice più acuto, la componente più debole, che punta a SW) — 495x.
CGCG 205-17	gx	07h07m13s	+44°49.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge diffuso abbastanza evidente — 450x.
CGCG 205-19	gx	07h09m11s	+43°41.8'		Aur	28"	m. buona / discreto	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 495x.
CGCG 205-21	gx	07h09m25s	+39°06.2'		Aur	20"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina al bordo E — 360x.
CGCG 205-25	gx	07h11m16s	+39°42.5'		Aur	20"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 360x.
CGCG 205-26	gx	07h11m37s	+39°39.9'		Aur	20"	m. buona / buono	debolissimo baffo di luce esteso sì e no 30" e orientato da N a S; c'è una stellina a ridosso N — 360x.
CGCG 205-37	gx	07h22m11s	+40°28.1'		Aur	20"	m. buona / buono	molto piccola e debole, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso W e una debole alla stessa distanza verso N — 360x.
CGCG 206-6	gx	07h25m55s	+40°42.0'		CVn	16"	ottima / m. buono	debole, diffusa, ma facilmente visibile, poco allungata da NW a SE, con dimensioni 45"×30"; presenta una piccola condensazione centrale evidente — 270x.
CGCG 206-16	gx	07h41m12s	+42°45.0'		Lyn	20"	buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a SW — 360x.
CGCG 206-22	gx	07h46m18s	+39°04.0'		Lyn	28"	ottima / ottimo	è una debole chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, disturbata da una stellina brillante a ridosso SE; in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 495x.
CGCG 206-27	gx	07h48m09s	+43°35.4'		Lyn	20"	buona / buono	molto debole e relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante un paio di primi a E e una debole a 1.5' verso NE — 360x.
CGCG 206-28	gx	07h48m57s	+43°47.2'		Lyn	20"	buona / buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E e una molto debole alla stessa distanza NE — 360x.
CGCG 206-29	gx	07h49m22s	+43°46.0'		Lyn	20"	buona / buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di deboli stelline a 1' SSE e SW orientate da E a W — 360x.
CGCG 206-36	gx	07h53m16s	+39°03.0'		Lyn	20"	buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare poco contrastato; a fianco verso E c'è un asterismo di 6 stelline brillanti foggiato come una "Z" speculare — 360x.
CGCG 207-1	gx	07h54m25s	+39°22.3'		Lyn	20"	buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo asterismo di 5 stelline foggiato a "λ" — 360x.

CGCG 207-12	gx	07h59m46s	+42°15.4'		Lyn	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N; allineata ed equidistante con 2 stelline a W (quella più vicina alla gx è molto debole) — 495x.
CGCG 207-17	gx	08h00m41s	+39°52.3'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	è più facile di NGC 2495, dalla quale dista poco più di 2' a NE, rotonda, molto piccola, con Ø di una 20-ina di secondi; 380x per tener fuori campo la SAO 42123 di magnitudo 7.6.
CGCG 207-25	gx	08h04m18s	+40°11.7'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto piccola, rotonda e relativamente compatta, con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 207-27	gx	08h05m05s	+40°10.3'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	è la più debole del quartetto (v. UGC 4200), rotonda con Ø di ~ 30"; appare in visione distolta a 380x, ma si stacca a fatica dal fondo cielo.
CGCG 207-29	gx	08h05m26s	+40°10.6'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	in visione distolta, a 380x, appare come un debolissimo ovale di dimensioni 40"×20" e appena più brillante verso l'interno.
CGCG 207-35	gx	08h08m27s	+39°57.8'		Lyn	20"	buona / buono	debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 42189 di 9ª grandezza situata 1' a S, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 360x.
CGCG 207-45	gx	08h13m49s	+41°39.0'		Lyn	28"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 207-47	gx	08h14m30s	+43°08.6'		Lyn	20"	buona / buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi scarsi a NE — 360x.
CGCG 207-48	gx	08h15m12s	+41°12.9'		Lyn	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1.5' SW — 495x.
CGCG 207-53	gx	08h49m46s	+40°14.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, estesa sì e no una 20-ina di secondi; appare a tratti in visione di-stolta a 380x.
CGCG 207-54	gx	08h18m42s	+39°08.6'		Lyn	20"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo N — 360x.
CGCG 207-56	gx	08h20m13s	+44°13.8'		Lyn	28"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N; una stellina brillante si trova a 1.5' verso NW — 495x.
CGCG 207-58	gx	08h21m10s	+39°15.8'		Lyn	20"	buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' W. Un piccolo oggetto molto debole ed esteso sì e no 10"-12" appare facilmente a ridosso SE e si tratta della galassietta **PGC 3088100** — 360x.
CGCG 208-2	gx	08h25m54s	+39°11.2'		Lyn	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso E — 495x.
CGCG 208-3	gx	08h26m01s	+40°58.9'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è un piccolo rettangolo di stelline a E — 495x.
CGCG 208-4	gx	08h27m27s	+41°29.7'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; una stellina appena percettibile appare a momenti quasi a ridosso verso E, ma da un controllo effettuato è risultata essere la **2MASS 08272988+4129305** — 495x.
CGCG 208-5	gx	08h28m25s	+40°37.8'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	diffusa, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 40"×20", con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina subito a E — 291x.
CGCG 208-10	gx	08h31m04s	+39°37.4'		Lyn	28"	m. buona / buono	diffusa, allungata da N a S, dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 495x.
CGCG 208-13	gx	08h32m20s	+41°21.5'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W — 291x.
CGCG 208-14	gx	08h32m27s	+41°59.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×30"; ci sono 3 stelline abbastanza brillanti e quasi allineate in direzione N-S a NE della gx — 495x.
CGCG 208-15	gx	08h33m13s	+41°05.7'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 360x.
CGCG 208-19	gx	08h33m55s	+39°47.9'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 495x.
CGCG 208-20	gx	08h33m57s	+41°24.3'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 291x.
CGCG 208-21	gx	08h34m40s	+38°21.8'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 208-22	gx	08h34m46s	+41°12.8'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline sbilanciate in luminosità a 2.5' verso N — 495x.
CGCG 208-25	gx	08h35m36s	+39°48.8'		Lyn	28"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' verso W — 495x.
CGCG 208-27	gx	08h36m42s	+41°28.3'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina molto debole subito a E e una più evidente a 1' SE — 291x.
CGCG 208-28	gx	08h37m06s	+41°27.3'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è un piccolo triangolo isoscele di stelline il cui vertice più acuto punta a NE — 291x.
CGCG 208-30	gx	08h37m20s	+41°32.9'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e appena più evidente all'interno, in visione distolta appare molto allungata da NNW a SSE con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 291x.
CGCG 208-31	gx	08h37m28s	+41°18.9'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 291x.
CGCG 208-32	gx	08h37m58s	+39°53.8'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 360x.
CGCG 208-37	gx	08h42m24s	+41°54.5'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; situata verso il margine occidentale di un ampio asterismo arcuato, orientato da NW a SE e formato da una decina di stelline brillanti — 291x.
CGCG 208-38	gx	08h42m40s	+40°49.1'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10"; situata verso il lato NW di un triangolo equilatero formato da 3 componenti abbastanza brillanti — 360x.
CGCG 208-39	gx	08h42m42s	+42°48.8'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale poco contrastata; allineata ed equidistante con 2 stelle brillanti a W; 3' a NE c'è invece la SAO 42509 di 9ª grandezza che tuttavia non disturba più di tanto l'osservazione — 291x.
CGCG 208-41	gx	08h44m51s	+43°02.8'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 291x.
CGCG 208-42	gx	08h44m57s	+42°58.6'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debole, molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 291x.
CGCG 208-43	gx	08h45m06s	+40°33.6'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	poco diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 45"×15"; c'è una debole stellina a 1' SSE — 291x.
CGCG 208-44	gx	08h45m42s	+41°17.0'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge evidente; situata tra una stella brillante 1.5' a E e una debole alla stessa distanza verso W — 291x.
CGCG 208-46	gx	08h47m45s	+39°32.2'		Lyn	28"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a un paio di primi verso N — 495x.
CGCG 208-47	gx	08h49m00s	+41°00.2'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 360x.
CGCG 208-51	gx	08h49m31s	+39°12.6'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline 1.5' a SW — 291x.
CGCG 208-54	gx	08h50m11s	+40°15.4'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	molto diffusa, con evidente condensazione centrale e nucleo stellare visibile a 380x; è rotonda con Ø di ~ 40".
CGCG 208-57	gx	08h50m38s	+40°15.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø che appare in visione distolta a ridosso verso N di un piccolo triangolo di stelline brillanti; a tratti appare una condensazione centrale molto tenue di aspetto stellare — 380x.
CGCG 208-58	gx	08h51m02s	+42°44.2'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con piccolo bulge evidente — 495x.
CGCG 208-60	gx	08h51m24s	+42°48.7'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 495x.
CGCG 208-62	gx	08h52m41s	+40°41.1'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante un paio di primi a S — 360x.
CGCG 209-5	gx	08h54m41s	+42°31.6'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	relativamente facile, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 80"×30" e con un bulge di 30"×10" poco contrastato — 291x.
CGCG 209-7	gx	08h55m28s	+42°01.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, rotonda con Ø < 30" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una coppia serrata di stelline brillanti a 1' versi N — 495x.
CGCG 209-8	gx	08h56m33s	+39°08.5'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline appena percettibili subito a E — 360x.
CGCG 209-17	gx	09h03m02s	+40°26.0'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 360x.
CGCG 209-19	gx	09h04m21s	+41°28.9'		Lyn	28"	m. buona / buono	chiazza molto debole e molto diffusa, di aspetto non chiaro per la presenza di una coppia di stelline all'interno che ne confondono un po' la forma (quella più interna potrebbe tuttavia anche essere il nucleo della gx); in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 30"-35" — 495x.
CGCG 209-20	gx	09h04m34s	+41°23.8'		Lyn	28"	m. buona / buono	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; ci sono 2 stelline abbastanza brillanti a 1' W e 1' NW — 495x.
CGCG 209-21	gx	09h04m43s	+42°19.2'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno — 495x.
CGCG 209-22	gx	09h04m48s	+40°35.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina a 1.5' verso S — 495x.
CGCG 209-23	gx	09h04m50s	+42°15.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a NW — 495x.
CGCG 209-25	gx	09h06m41s	+41°21.9'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N — 495x.
CGCG 209-27	gx	09h06m53s	+41°24.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a 1' verso E — 495x.
CGCG 209-28	gx	09h07m02s	+41°16.7'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; situata tra due stelline orientate da NNE a SSW — 495x.
CGCG 209-32	gx	09h14m13s	+43°08.1'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	compatta, poco allungata da N a S di dimensioni 40"×30" con nucleo stellare abbastanza evidente (purtroppo si fa fatica a tenere fuori campo la 36 Lyn a meno di 7' NW — 270x.
CGCG 209-36	gx	09h15m45s	+44°14.2'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	piccola e compatta, con Ø di una 20-ina di secondi e situata 1' a S di una stellina brillante — 270x.
CGCG 209-37	gx	09h15m45s	+42°16.0'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	in visione distolta, a 380x, appare di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccolo nucleo appena percettibile — 270x.
CGCG 209-40	gx	09h16m28s	+42°08.3'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente il visione distolta, rotonda con Ø max di 30" — 270x.
CGCG 209-47	gx	09h17m29s	+39°55.6'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissima ed elusiva, piccola, non più estesa di 30"; salta fuori solo a tratti in visione distolta a SE di una coppia di stelline distanti un paio di primi (situata 11' ENE di UGC 4889) — 270x.
CGCG 209-56	gx	09h21m02s	+39°09.4'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debole chiazza circolare di luminosità uniforme, diffusa e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 2' verso E — 495x.
CGCG 210-17	gx	09h37m45s	+43°06.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	facile, relativamente compatta, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge brillante; c'è una stellina a 1' NNE e una appena percettibile alla stessa distanza verso ENE (ossia sul prolungamento dell'asse della gx) — 495x.
CGCG 210-28	gx	09h43m48s	+42°28.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 495x.
CGCG 210-30	gx	09h43m59s	+42°26.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45" — 495x.
CGCG 210-38	gx	09h49m21s	+43°05.0'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è del tutto simile a NGC 3006, dalla quale dista 6.5' verso S, sia come dimensioni sia come luminosità, salvo il fatto che è orientata da SE a NW — 270x.
CGCG 210-42	gx	09h50m37s	+43°45.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" (o poco più) e con nucleo stellare evidente — 495x.
CGCG 211-14	gx	10h10m25s	+39°55.4'		LMi	28"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a W e una appena percettibile a 1' verso NE — 495x.
CGCG 211-16	gx	10h12m43s	+39°22.5'		LMi	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e di luminosità pressoché uniforme; disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata a ridosso N (e che fa una coppia larga con un'altra della stessa luminosità) — 495x.
CGCG 211-18	gx	10h13m14s	+39°40.5'		LMi	28"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" e un tenue nucleo stellare — 495x.
CGCG 211-28	gx	10h14m14s	+39°03.0'		LMi	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, con nucleo stellare; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 50"×25" — 380x.
CGCG 211-30	gx	10h14m30s	+39°30.1'		LMi	28"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 40" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S — 495x.
CGCG 211-31	gx	10h14m45s	+38°58.8'		LMi	16"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" e tenue di aspetto quasi stellare — 380x.
CGCG 211-32	gx	10h15m02s	+39°39.8'		LMi	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso S — 495x.
CGCG 211-34	gx	10h15m49s	+43°47.2'		UMa	28"	m. buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 211-36	gx	10h16m16s	+41°10.0'		LMi	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni grosso modo di 40"×13" (ossia con rapporto 3:1) — 495x.
CGCG 211-40	gx	10h18m56s	+40°36.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 211-53	gx	10h23m59s	+43°51.3'		UMa	28"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 40"×20" e con nucleo brillante; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo N — 495x.
CGCG 211-54	gx	10h24m22s	+41°42.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30", con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina un paio di primi a S e una più brillante alla stessa distanza verso S; una stellina percettibile solo a momenti si trova a ridosso W, ma si tratta in realtà di una minuscola galassietta estesa < 10" (la **2MASS 10242067+4142362**) — 495x.
CGCG 212-9	gx	10h26m54s	+44°00.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola, relativamente facile e compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20; situata in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti orientate da NE a SW (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 212-13	gx	10h29m45s	+40°29.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; è un po' disturbata dalla SAO 43362 di 7ª grandezza situata 4' a SE e che si fatica a tenere fuori campo — 495x.
CGCG 212-15	gx	10h29m56s	+42°07.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a un paio di primi verso N e una della stessa luminosità a 1.5' SSE — 495x.
CGCG 212-16	gx	10h30m11s	+43°21.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×15" (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 212-18	gx	10h30m38s	+44°00.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e con alto gradiente di luce — 495x.
CGCG 212-20	gx	10h32m38s	+43°59.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina un paio di primi a NE — 495x.
CGCG 212-21	gx	10h32m50s	+43°10.5'		UMa	20"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una debole stellina a 1' SW e una stellina brillante a 1.5' verso S — 360x.
CGCG 212-23	gx	10h33m50s	+40°17.9'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con bulge abbastanza evidente, ma poco contrastato — 495x.
CGCG 212-24	gx	10h34m30s	+39°36.9'		UMa	28"	m. buona / buono	forma una coppia con la successiva situata un paio di primi a NE — piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione centrale appena evidente; una sorta di stellina appare elusivamente a 1' scarso SW, ma si tratta di **PGC 2152734** — 495x.
CGCG 212-25	gx	10h34m39s	+39°38.5'		UMa	28"	m. buona / buono	poco più piccola della precedente, più compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
CGCG 212-26	gx	10h35m11s	+42°46.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale — 495x.
CGCG 212-31	gx	10h37m32s	+43°39.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con bulge diffuso poco contrastato — 495x.
CGCG 212-32	gx	10h38m06s	+39°10.6'		LMi	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con piccola condensazione centrale evidente — 495x.
CGCG 212-34	gx	10h40m01s	+39°07.3'		LMi	28"	ottima / ottimo	anche questa è relativamente facile, molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale brillante; c'è una stellina quasi a ridosso W — 495x.
CGCG 212-37	gx	10h41m20s	+42°22.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo S e una debole subito a SE — 495x.
CGCG 212-38	gx	10h41m44s	+40°02.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e basso gradiente di luce (situata in una piccola plaga depleta) — 495x.
CGCG 212-40	gx	10h42m53s	+40°08.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 495x.
CGCG 212-41	gx	10h43m10s	+39°02.3'		LMi	28"	ottima / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione stellare visibile a momenti — 495x.
CGCG 212-45	gx	10h44m39s	+38°45.6'		LMi	16"	ottima / ottimo	molto debole, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 1' (a 380x il campo è virtualmente depleto).
CGCG 212-50	gx	10h46m03s	+39°09.0'		LMi	28"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale — 495x.
CGCG 212-53	gx	10h47m27s	+38°56.1'		LMi	16"	buona / m. buono	molto debole, salta fuori in visione distolta quando si osserva UGC 5893; è un oggetto rotondo di 30" o 35" di Ø situato 1' a S di una debole stellina — 270x.
CGCG 213-4	gx	10h53m17s	+43°27.0'		UMa	28"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 40"×10" e con nucleo stellare evidente; situata all'interno di un triangolo isoscele di stelline abbastanza brillanti (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 213-7	gx	10h55m47s	+44°03.0'		UMa	28"	buona / m. buono	piccola, debole, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a NW (fanno parte di un triangolo isoscele aperto) — 495x.
CGCG 213-8	gx	10h56m16s	+42°20.0'		UMa	28"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e con evidente condensazione centrale, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 495x.
CGCG 213-9	gx	10h56m20s	+43°45.3'		UMa	28"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20", con piccola e tenue condensazione centrale — 495x.
CGCG 213-14	gx	10h58m43s	+43°19.2'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina visibile solo a momenti quasi a ridosso NE (situata in una piccola plaga depleta) — 495x.
CGCG 213-15	gx	10h59m55s	+43°08.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	tenue chiazza rotonda stemperata sul fondo cielo con Ø < 40" e di luminosità uniforme; c'è una stella brillante a 1' verso N — 495x.
CGCG 213-16	gx	10h59m53s	+43°22.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni poco superiori a 20"×10" — 495x.
CGCG 213-21	gx	11h03m11s	+41°42.3'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 50"×40" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una debole stellina a ridosso SE — 495x.
CGCG 213-24	gx	11h03m55s	+43°29.1'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole e molto impastata dalla luce della SAO 43597 di 9ª grandezza al bordo E che ne confonde la forma; non dovrebbe comunque essere più estesa di 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 213-25	gx	11h04m26s	+40°50.5'		UMa	28"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N (situata sul prosieguo occidentale di una stringa leggermente arcuata formata da 4 deboli stelline) — 495x.
CGCG 213-27	gx	11h05m22s	+38°14.0'		UMa	16"	mediocre / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 213-40	gx	11h17m08s	+42°28.2'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 213-41	gx	11h21m17s	+40°20.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue nucleo stellare, c'è una stellina a 1.5' verso N; la gx non sembra disturbata dalle SAO 43709 e 43710 di 7a grandezza situate simmetricamente 6' a NE e 6' a SE — 495x.
CGCG 214-7	gx	11h26m46s	+39°16.0'		UMa	20"	buona / buono	debole, diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a SW — 360x.
CGCG 214-11	gx	11h30m21s	+44°09.8'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso E — 495x.
CGCG 214-17	gx	11h32m53s	+43°30.9'		UMa	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso N — 495x.
CGCG 214-19	gx	11h37m16s	+39°16.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da E a W, con dimensioni 40"×10" e di luminosità uniforme — 495x
CGCG 214-20	gx	11h37m17s	+39°17.0'		UMa	28"	m. buona / ottimo	poco più evidente della precedente — situata 1' scarso verso S — molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15", poco diffusa e di luminosità uniforme — 495x.
CGCG 214-23	gx	11h39m06s	+43°14.8'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 214-25	gx	11h41m11s	+43°26.6'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a 1' E (fa parte di un piccolo asterismo di 5 componenti di forma vagamente rettangolare) — 495x.
CGCG 214-26	gx	11h47m26s	+43°45.5'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 214-31	gx	11h50m16s	+43°44.1'		UMa	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso SW; un'altra stellina (o forse un nodulo galattico) visibile solo a momenti si trova al bordo W — 450x.
CGCG 215-6	gx	11h55m47s	+39°13.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e a tratti condensata, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 495x.
CGCG 215-8	gx	11h57m25s	+39°45.8'		UMa	16"	buona / m. buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole un paio di primi a SE — 270x.
CGCG 215-15	gx	11h59m51s	+39°36.1'		UMa	16"	buona / m. buono	molto debole. Di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso E (situata al vertice rettangolo di un piccolo triangolo) — 380x.
CGCG 215-17	gx	12h03m00s	+39°25.0'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 215-19	gx	12h04m12s	+43°40.9'		UMa	28"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina subito a W e una a 1.5' verso NE — 495x.
CGCG 215-22	gx	12h05m16s	+43°10.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E; una stella brillante (la SAO 44023 di 8ª grandezza) si trova 3' verso E — 495x.
CGCG 215-24	gx	12h06m08s	+40°09.0'		UMa	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, diffusa rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' W — 450x.
CGCG 215-35	gx	12h09m15s	+41°36.6'		CVn	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva la stellina situata 1' a E — 380x.
CGCG 215-43	gx	12h10m05s	+43°26.5'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi a WSW (ossia a perpendicolo con l'asse maggiore della gx) e una più debole alla stessa distanza verso E — 495x.
CGCG 215-46	gx	12h10m44s	+38°20.2'		CVn	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile, piccola, poco diffusa, con nucleo stellare marcato, rotonda, di Ø < 30" — 380x.
CGCG 215-49	gx	12h10m59s	+43°15.0'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
CGCG 215-50	gx	12h11m56s	+40°39.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con **MAC 1211+4039** situata a ridosso E — sono entrambe piccole, poco diffuse, deboli e condensate: la CGCG appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10", mentre la MAC appare poco più evidente e "cicciotta", orientata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 495x.
CGCG 215-54	gx	12h14m38s	+43°32.1'		CVn	28"	ottima / ottimo	facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con evidente nucleo stellare — 495x.
CGCG 215-57	gx	12h17m05s	+42°56.8'		CVn	28"	ottima / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con una piccola e marcata condensazione centrale; c'è una stellina a 1' verso S — 495x.
CGCG 215-62	gx	12h20m31s	+39°38.0'		CVn	28"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' NW — 495x.
CGCG 215-64	gx	12h21m03s	+39°52.1'		Cvn	24"	m. buona / m. buono	fa parte di un terzetto abbastanza serrato assieme alle due successive — debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 215-65	gx	12h21m02s	+39°54.0'		Cvn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W — 450x.
CGCG 215-66	gx	12h21m06s	+39°53.6'		Cvn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 216-3	gx	12h27m38s	+40°09.6'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno; appare facilmente in visione distolta, ma si trova in un campo quasi depleto e si fatica alquanto a individuarla — 270x.
CGCG 216-6	gx	12h28m42s	+43°37.5'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale appena accennata — 495x.
CGCG 216-12	gx	12h34m03s	+43°25.0'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 216-13	gx	12h35m52s	+38°22.5'		CVn	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 380x.
CGCG 216-15	gx	12h36m59s	+40°20.9'		CVn	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 216-16	gx	12h38m22s	+42°12.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (o poco più); c'è una stellina brillante a 1.5' SSW; la gx è allineata con 2 stelle brillanti a W — 495x.
CGCG 216-27	gx	12h46m33s	+40°49.8'		CVn	28"	mediocre / ottimo	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 388x.
CGCG 216-33	gx	12h49m36s	+41°41.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con alto gradiente di luce, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 495x.
CGCG 217-8	gx	13h04m22s	+43°48.6'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 495x.
CGCG 217-14	gx	13h09m14s	+43°20.5'		CVn	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi. Una stellina appena percettibile situata 1.5' a NNE è risultata essere la PGC 2218965 — 495x.
CGCG 217-15	gx	13h10m42s	+44°01.5'		CVn	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NW — 450x.
CGCG 217-18	gx	13h12m52s	+40°32.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 217-24	gx	13h16m06s	+41°30.0'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con piccolo nucleo evidente — 495x.
CGCG 217-25	gx	13h16m15s	+41°29.7'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" (è situata 1.5' a E della precedente) — 495x.
CGCG 217-26	gx	13h17m38s	+43°48.6'		CVn	28"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ci sono 2 stelline molto deboli a 1.5' SE e a un paio di primi verso W — 495x.
CGCG 218-2	gx	13h21m05s	+42°26.9'		CVn	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 495x.
CGCG 218-7	gx	13h23m48s	+43°18.0'		CVn	28"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale — 495x.
CGCG 218-8	gx	13h24m33s	+42°45.8'		CVn	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
CGCG 218-9	gx	13h24m49s	+43°40.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a1.5' NNE — 450x.
CGCG 218-12	gx	13h27m04s	+41°57.4'		CVn	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è un piccolo asterismo di 4 stelline foggiate a trapezio regolare subito a W — 495x.
CGCG 218-15	gx	13h29m10s	+41°43.8'		CVn	28"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW — 495x.
CGCG 218-17	gx	13h29m57s	+41°37.5'		CVn	28"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NW — 495x.
CGCG 218-31	gx	13h39m03s	+43°34.0'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10". Un piccolo e debolissimo oggetto salta fuori abbastanza facilmente a 1' SE: si tratta di **PGC 2223395** — 495x.
CGCG 218-19	gx	13h31m56s	+44°08.4'		CVn	16"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 380x quando si fissa la MCG+7-28-25 situata poco più di 1' a NW.
CGCG 218-38	gx	13h41m00s	+42°25.9'		CVn	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni poco superiori a 30"×20" — 450x.
CGCG 218-35	gx	13h40m15s	+38°52.1'		CVn	16"	buona / ottimo	appariva nello stesso campo di NGC 5267 a 7' NW; è una galassietta compatta, orientata ~ da E a W con dimensioni 30"×15" — 380x.
CGCG 218-46	gx	13h47m46s	+38°15.5'	q 110	CVn	16"	buona / buono	situata 3' scarsi a S di NGC 5303 è molto debole, di luminosità pressoché uniforme, allungata all'incirca da E a W con dimensioni Ø 40"×20". È riportata sull'Uranometria come **5303B** — 270x.
CGCG 218-57	gx	13h50m14s	+42°44.8'		CVn	16"	buona / discreto	debolissima e molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso SW — 380x.
CGCG 219-5	gx	13h50m41s	+40°16.7'		CVn	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi o 45"; c'è una stellina a 1' verso SW — 285x.
CGCG 219-10	gx	13h51m29s	+43°48.3'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 219-9	gx	13h51m25s	+40°12.8'		CVn	16"	buona / ottimo	più debole e più piccola della precedente, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 219-23	gx	13h54m04s	+39°59.1'		CVn	16"	buona / discreto	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; meglio contrastata a 270x.
CGCG 219-24	gx	13h54m10s	+44°12.8'		CVn	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con **MAC 1354+4412** situata subito a SE — 495x.
CGCG 219-26	gx	13h35m50s	+40°16.3'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 219-32	gx	13h57m00s	+43°21.7'		CVn	28"	ottima / ottimo	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con un nucleo quasi stellare; è allineata con 3 stelline abbastanza brillanti a NNE — 495x.
CGCG 219-44	gx	14h01m35s	+38°41.2'		CVn	16"	buona / buono	piccolo oggetto rotondo, diffuso, di 30" di Ø e con condensazione centrale quasi stellare evidente a 380x; purtroppo è disturbata da una stellina brillante situata a ridosso verso E.
CGCG 219-50	gx	14h05m44s	+40°51.3'		CVn	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo W — 495x.
CGCG 219-51	gx	14h06m30s	+39°29.7'		CVn	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 219-52	gx	14h07m25s	+39°44.8'		Boo	24"	m. buona / m. buono	compatta e relativamente brillante, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 219-58	gx	14h13m04s	+42°00.3'		Boo	28"	m. buona / buono	nella posizione indicata si vede una stella abbastanza brillante con una "coda" molto tenue che aggetta verso E per una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 219-68	gx	14h19m34s	+40°20.2'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 495x.
CGCG 219-69	gx	14h20m40s	+40°18.9'		Boo	28"	m. buona / buono	appena più evidente di CGCG 219-68 — dalla quale dista 12.5' a E — anche questa diffusa e di luminosità uniforme, poco più grande e orientata nello stesso modo — 495x.
CGCG 220-4	gx	14h20m55s	+40°07.3'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una quadrato irregolare di stelline a S il cui vertice SW è una doppia stretta brillante — 380x.
CGCG 220-8	gx	14h22m32s	+39°35.1'		Boo	28"	m. buona / buono	molto allungata da NE a SW, molto diffusa alle 2 estremità, di dimensioni 60"×20" e con piccola condensazione centrale contrastata sul disco — 495x.
CGCG 220-22	gx	14h30m17s	+40°44.3'		Boo	28"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 495x.
CGCG 220-26	gx	14h31m28s	+39°15.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1.5' NW — 450x.
CGCG 220-30	gx	14h33m48s	+40°05.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 9376 situata quasi a ridosso SSW — poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30", molto diffusa e con evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina a 1' N — 450x.
CGCG 220-34	gx	14h36m46s	+39°57.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione N-S; appare in visione distolta a 1' N di una stellina brillante, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 220-51	gx	14h43m54s	+43°34.8'		Boo	28"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' N — 495x.
CGCG 220-59	gx	14h50m44s	+42°46.0'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, appare facilmente in visione distolta come un piccolo oggetto rotondo di ~ 20" di Ø — 380x.
CGCG 221-10	gx	14h54m39s	+42°01.4'	q 78	Boo	16"	m. buona / discreto	molto debole, di aspetto confuso e luminosità uniforme, forse circolare, con Ø di 1' È riportata sull'Uranometria come 1ZW 97 — 270x.
CGCG 221-11	gx	14h54m47s	+40°47.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale stellare — 450x.
CGCG 221-14	gx	14h55m27s	+41°154'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con marcata condensazione stellare, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una doppia stretta dalle componenti brillanti 3' a ENE — 450x.
CGCG 221-17	gx	14h58m33s	+43°52.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 221-19	gx	14h59m01s	+43°24.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con evidente condensazione centrale; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo molto allungato in direzione E-W — 495x.
CGCG 221-30	gx	15h07m18s	+40°39.2'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 221-32	gx	15h09m39s	+42°42.8'		Boo	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale; c'è una stellina subito a W — 495x.
CGCG 221-33	gx	15h10m36s	+41°03.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 221-34	gx	15h11m27s	+41°05.4'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e con condensazione centrale evidente; c'è una stella brillante un paio di primi a NE; una coppia di stelle molto brillanti di 9ª grandezza (SAO 45420 e 45422) si trova 3' a S — 450x.
CGCG 221-35	gx	15h12m26s	+40°33.2'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una evidente condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 221-38	gx	15h13m14s	+40°32.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con evidente condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 221-39	gx	15h13m15s	+40°31.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente (situata 1' a S della precedente) — 450x.
CGCG 221-40	gx	15h13m29s	+42°19.8'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.

CGCG 221-45	gx	15h15m06s	+43°09.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 221-47	gx	15h16m39s	+41°01.8'		Boo	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; non sembra granché disturbata da una stella di 10ª grandezza situata un paio di primi a SSE — 495x.
CGCG 221-48	gx	15h17m01s	+39°41.8'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 221-49	gx	15h17m14s	+40°56.7'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 221-50	gx	15h18m06s	+42°44.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, con tenue condensazione centrale, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; in visione distolta appaiono a tratti due debolissimi noduli diffusi a S e a W che le conferiscono un aspetto un po' irregolare — 450x.
CGCG 222-14	gx	15h29m16s	+39°37.7'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 222-15	gx	15h29m40s	+42°39.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e poco più brillante all'interno — 450x.
CGCG 222-25	gx	15h33m13s	+41°04.1'		Boo	16"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 380x.
CGCG 222-32	gx	15h36m32s	+41°48.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 222-40	gx	15h40m42s	+43°45.1'		Boo	28"	m. buona / buono	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 495x.
CGCG 222-41	gx	15h42m15s	+39°59.1'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 45" e poco più brillante all'interno; meglio visibile a 270x.
CGCG 222-43	gx	15h43m36s	+43°54.8'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 222-44	gx	15h43m46s	+43°46.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
CGCG 222-50	gx	15h44m51s	+43°30.8'		Boo	16"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
CGCG 222-53	gx	15h49m48s	+41°59.2'		Her	16"	m. buona / m. buono	è di aspetto puntiforme in visione diretta; in visione distolta appare invece come una debolissima stellina leggermente sfocata — 380x.
CGCG 222-55	gx	15h49m58s	+42°04.7'		Her	16"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta e condensata, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 380x.
CGCG 222-56	gx	15h50m05s	+42°19.5'		Her	28"	m. buona / buono	piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 495x.
CGCG 223-1	gx	15h49m38s	+42°02.0'		Her	28"	m. buona / buono	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare — 495x.
CGCG 223-9	gx	15h53m25s	+39°23.2'		CrB	28"	m. buona / buono	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
CGCG 223-10	gx	15h53m29s	+41°34.8'		Her	16"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 223-12	gx	15h55m02s	+41°34.7'		Her	16"	m. buona / m. buono	abbastanza facile, poco più brillante all'interno, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 223-13	gx	15h55m31s	+41°57.0'		Her	28"	m. buona / buono	presenta un piccolo bulge diffuso, abbastanza brillante, con 2 baffi molto tenui a N e S; la gx appare nel complesso molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina a 1.5' NW — 495x.
CGCG 223-14	gx	15h55m52s	+39°46.0'		Her	28"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente; situata a ridosso SW di un asterismo di 4 stelle brillanti foggiato a quadrilatero sghembo — 495x.
CGCG 223-16	gx	15h56m25s	+42°23.8'		Her	28"	m. buona / buono	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è allineata ed equidistante con due stelline a NE (quella più vicina alla gx è la più brillante) — 495x.
CGCG 223-17	gx	15h56m33s	+41°53.9'		Her	28"	m. buona / buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; forma una coppia con **UGC 10099** situata 1' a SSE — 495x.
CGCG 223-19	gx	15h57m24s	+41°54.2'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
CGCG 223-20	gx	15h57m59s	+40°02.1'		Her	28"	m. buona / buono	piccola e relativamente compatta, poco allungata da N a S, di dimensioni 20"×15" e con tenue condensazione centrale; situata a ridosso SW di una coppia di stelline orientate da NW a SE — 495x.
CGCG 223-21	gx	15h57m58s	+41°47.5'		Her	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a NE — 450x.
CGCG 223-22	gx	15h57m54s	+41°56.2'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 223-23	gx	15h58m48s	+41°56.3'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" (è la più facile del gruppo sparso di 8 galassie appartenente alla cartina di riferimento che avevo stampato e visibile nella corrispondente pagina web) — 450x.
CGCG 223-25	gx	15h59m57s	+41°28.7'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con due stelline a SSE; forma una coppia ravvicinata con la successiva — 450x.
CGCG 223-26	gx	16h00m04s	+41°28.7'		Her	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 30" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile al bordo meridionale — 450x.
CGCG 223-27	gx	16h00m33s	+43°55.6'		Her	24"	m. buona / discreto	chiazza circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; allineata ma non equidistante con due stelline abbastanza brillanti a SE — 450x.
CGCG 223-29	gx	16h02m17s	+42°55.0'		Her	16"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 380x.
CGCG 223-36	gx	16h05m29s	+42°37.6'		Her	16"	m. buona / m. buono	debolissima, ma a 380x appare facilmente in visione distolta a ~ 2' SSE di una stellina brillante (un'altra stellina, appena percettibile, si trova alla stessa distanza verso S); rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 223-37	gx	16h05m47s	+41°19.1'		Her	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme e Ø max di 30" — 380x.
CGCG 223-39	gx	16h05m36s	+44°12.4'		Her	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 223-40	gx	16h07m18s	+41°24.3'		Her	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
CGCG 223-43	gx	16h07m48s	+39°11.7'		CrB	24"	m. buona / discreto	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a E (fa parte di un piccolo triangolo rettangolo col vertice più acuto che punta a NE) — 450x.
CGCG 223-44	gx	16h09m16s	+41°44.7'		Her	24"	m. buona / discreto	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 223-47	gx	16h10m21s	+41°51.3'		Her	24"	m. buona / discreto	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale abbastanza evidente; situata tra una stellina abbastanza brillante a E e una più debole a W — 450x.
CGCG 223-49	gx	16h10m52s	+41°53.2'		Her	24"	m. buona / discreto	poco più grande della precedente situata 6' a WSW, molto diffusa, con un piccolo bulge abbastanza contrastato e nucleo stellare — 450x.
CGCG 223-50	gx	16h11m52s	+43°43.5'		Her	28"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a un paio di primi scarsi verso NNE (*ultima gx osservata nella sessione: è sorta la luna poco dopo l'ultimo quarto*) — 495x.
CGCG 223-51	gx	16h13m01s	+39°14.2'		CrB	28"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **PGC 2146028** situata a ridosso E — la CGCG è stranamente più debole e più piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; la PGC è anch'essa rotonda con Ø di 20" e una evidente condensazione centrale (credo tuttavia che il Megastar abbia invertito le coordinate delle due componenti) — 495x.
CGCG 223-53	gx	16h16m12s	+42°24.0'		Her	28"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **MAC 1616+4223**, ma le due gx non si riescono a separare; la CGCG è piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; solo a momenti, nella parte occidentale, appare come una "sbavatura" molto tenue da N a S evidentemente imputabile alla compagna — 495x.
CGCG 224-2	gx	16h21m05s	+39°55.0'		Her	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' verso E — 495x.
CGCG 224-7	gx	16h22m39s	+43°27.9'		Her	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una debole stellina a 1' ESE — 450x.
CGCG 224-10	gx	16h23m33s	+39°07.2'		CrB	16"	m. buona / m. buono	è la più evidente di un sestetto di galassie molto difficili — molto debole, rotonda con Ø di 35"-40", poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una coppia di stelline subito a N e a NE della gx con separazione pari al suo Ø; meglio contrastata a 270x.
CGCG 224-11	gx	16h23m23s	+41°39.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 224-12	gx	16h23m38s	+39°12.2'		CrB	28"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 224-13	gx	16h23m28s	+41°42.4'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina al bordo NW — 450x.
CGCG 224-15	gx	16h24m18s	+39°12.7'		CrB	28"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso NE — 495x.
CGCG 224-20	gx	16h25m42s	+39°36.0'		Her	28"	m. buona / discreto	relativamente brillante, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale; c'è una stella brillante a 1' SSW e una più debole e poco meno distante verso NW; una stellina percettibile solo a momenti appare a ridosso W della gx — 495x.
CGCG 224-21	gx	16h25m49s	+40°20.7'		Her	28"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale — 495x.
CGCG 224-25	gx	16h26m40s	+40°28.7'		Her	28"	ottima / buono	è una debole chiazza diffusa e circolare con Ø < 40" con una stellina al bordo N (questa fa parte di un piccolo asterismo di 3 componenti che formano un piccolo triangolo isoscele col vertice più acuto che punta a NW) — 495x.
CGCG 224-26	gx	16h26m53s	+41°15.2'		Her	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso NW (fa parte dell'ammasso **AGC 2197**) — 495x.
CGCG 224-27	gx	16h27m03s	+39°31.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto diffusa e gradatamente più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare — 450x.
CGCG 224-28	gx	16h27m22s	+39°06.6'		Her	28"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina abbastanza brillante a 2' verso W e una più debole alla stessa distanza SW (situata verso la parte sud-occidentale dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
CGCG 224-30	gx	16h27m37s	+40°40.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 224-42	gx	16h28m39s	+41°06.6'		Her	28"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con bulge evidente, ma poco contrastato (fa parte assieme alla successiva dell'ammasso **AGC 2197**) — 495x.
CGCG 224-43	gx	16h28m41s	+41°08.1'		Her	28"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione quasi stellare evidente — 495x.
CGCG 224-44	gx	16h28m50s	+39°50.1'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina 1.5' verso N — 495x.
CGCG 224-45	gx	16h28m53s	+39°33.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto piccola e debole, rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
CGCG 224-47	gx	16h29m24s	+40°52.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una evidente condensazione centrale — 450x.
CGCG 224-51	gx	16h30m24s	+40°39.9'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (fa parte, assieme alla successiva, dell'ammasso **AGC 2197**) — 495x.
CGCG 224-52	gx	16h30m18s	+40°35.9'		Her	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; è situata in mezzo a due stelline orientate da NW a SE — 495x.
CGCG 224-61	gx	16h30m54s	+39°50.8'		Her	16"	buona / ottimo	piccola, molto debole, abbastanza compatta, orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 380x.
CGCG 224-64	gx	16h31m03s	+39°47.5'		Her	16"	buona / ottimo	rotonda, diffusa e con Ø di 45"; presenta un nucleo puntiforme visibile a tratti o forse trattasi di una stellina a ridosso di questo — 380x.
CGCG 224-65	gx	16h31m03s	+39°50.3'		Her	16"	buona / ottimo	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; ricorda UGC 10429 situata 6' NW — 380x.
CGCG 224-76	gx	16h36m18s	+44°08.1'		Her	16"	m. buona / buono	molto debole, poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 270x.
CGCG 224-86	gx	16h40m30s	+39°14.1'		Her	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 495x.
CGCG 224-87	gx	16h40m28s	+39°19.2'		Her	28"	ottima / buono	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso S — 495x.
CGCG 224-97	gx	16h44m11s	+39°47.3'		Her	16"	ottima / ottimo	è situata a una decina di primi a E di NGC 6212; è una piccola gx con basso gradiente e di forma ovale, di dimensioni 40"×30" in direzione ENE-WSW — 285x.
CGCG 225-6	gx	16h52m43s	+39°22.2'		Her	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20"; ci sono 2 deboli stelline: una quasi a ridosso N e l'altra più evidente e poco più lontana verso W — 495x.
CGCG 225-10	gx	16h55m18s	+44°19.4'		Her	28"	ottima / m. buono	relativamente brillante e compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a 1.5' verso N; una stellina di luminosità simile si trova un paio di primi a SW, mentre una più debole è più o meno alla stessa distanza verso SE — 495x.
CGCG 225-14	gx	16h57m27s	+40°44.1'		Her	28"	ottima / m. buono	fa parte di un trio assieme alle 2 successive di un trio — diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso N — 495x.
CGCG 225-16	gx	16h57m40s	+40°42.4'		Her	28"	ottima / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, con piccola e marcata condensazione centrale; equidistante con 2 stelline a S e SE — 495x.
CGCG 225-17	gx	16h57m41s	+40°43.4'		Her	28"	ottima / m. buono	di aspetto simile alla precedente (situata 1' a N) anche questa è diffusa, con Ø di 30" e con evidente condensazione centrale — 495x.
CGCG 225-21	gx	16h58m51s	+40°07.3'		Her	28"	m. buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (c'è una coppia di stelline a 4' verso NW) — 495x.
CGCG 225-25	gx	17h01m00s	+39°33.9'		Her	28"	ottima / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale ben contrastata; disturbata dalla SAO 65725 di 8ª grandezza situata 1.5' a SW — 495x.
CGCG 225-27	gx	17h02m23s	+44°40.7'		Her	28"	ottima / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina molto brillante a ridosso E (fa parte di una coppia di luminosità simile orientata da NNE a SSW) — 495x.
CGCG 225-30	gx	17h02m58s	+40°31.5'		Her	28"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale evidente; c'è una stellina al bordo E e una quasi a ridosso verso N — 495x.
CGCG 225-31	gx	17h03m10s	+40°38.2'		Her	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 225-37	gx	17h05m16s	+41°49.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a N e un'altra percettibile solo a momenti a W — 450x.
CGCG 225-38	gx	17h05m28s	+41°44.2'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina visibile solo a momenti al bordo W — 450x.
CGCG 225-40	gx	13h19m46s	+47°42.9'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	debole chiazza molto debole e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso S — 495x.
CGCG 225-41	gx	17h06m44s	+43°04.9'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (o poco più); c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso SW — 495x.
CGCG 225-47	gx	17h08m26s	+40°47.4'		Her	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare evidente — 495x.
CGCG 225-50	gx	17h08m45s	+42°17.0'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare molto tenue — 495x.
CGCG 225-51	gx	17h09m12s	+40°55.3'		Her	28"	m. buona / m. buono	diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1.5' SSW — 495x.
CGCG 225-55	gx	17h10m05s	+42°22.3'		Her	28"	ottima / ottimo	chiazza rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a 1' SW — 495x.
CGCG 225-57	gx	17h10m35s	+39°55.5'		Her	28"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; allineata ed equidistante con 2 stelline a W; altresì allineata, ma non equidistante, con 2 stelline brillanti a NE — 495x.
CGCG 225-61	gx	17h11m44s	+42°41.7'		Her	16"	m. buona / ottimo	si vede abbastanza facilmente a 380x anche in visione diretta, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", diffusa e con bulge evidente.
CGCG 225-62	gx	17h12m13s	+39°44.5'		Her	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE — 495x.
CGCG 225-63	gx	17h12m32s	+40°58.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a E; una stella brillante si trova a 1.5' W — 450x.
CGCG 225-68	gx	17h13m04s	+42°23.3'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una coppia di stelle brillanti di 10ª grandezza a S e SW — 495x.
CGCG 225-69	gx	17h13m08s	+42°51.6'		Her	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo molto debole e relativamente compatto con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 225-70	gx	17h13m05s	+43°42.0'		Her	28"	ottima / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 495x.
CGCG 225-73	gx	17h13m40s	+40°57.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 225-75	gx	17h14m09s	+39°29.9'		Her	24"	m. buona / discreto	piccola, relativamente facile, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' N — 450x.
CGCG 225-76	gx	17h14m22s	+39°04.3'		Her	28"	m. buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
CGCG 225-79	gx	17h14m41s	+42°51.5'		Her	28"	ottima / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 225-81	gx	17h14m41s	+43°55.6'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso N — 495x.
CGCG 225-84	gx	17h15m15s	+43°17.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge poco contrastato; c'è una debole stellina subito a E — 450x.
CGCG 225-85	gx	17h15m31s	+39°11.3'		Her	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni poco superiori a 30"×20" — 495x.
CGCG 225-86	gx	17h55m28s	+42°04.1'		Her	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi ed evidente nucleo stellare — 380x.
CGCG 225-87	gx	17h15m30s	+43°45.1'		Her	28"	ottima / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 40"×10", con piccolo bulge oblungo e contrastato; la SAO 46285 leggermente aranciata di 9ª grandezza situata 2.5' a W non sembra disturbarne l'osservazione — 495x.
CGCG 225-88	gx	17h16m11s	+44°03.9'		Her	28"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 225-90	gx	17h16m23s	+44°03.8'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e appena più brillante all'interno; c'è una stellina abbastanza brillante 1' scarso a SW — 495x.
CGCG 225-91	gx	17h16m27s	+43°20.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", molto diffusa alle due estremità e con condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 225-94	gx	17h17m16s	+40°34.8'		Her	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccola condensazione centrale evidente; situata tra una coppia di stelline a 1.5' NE e la SAO 46604 di magnitudo 9.5 a SW — 495x.
CGCG 225-96	gx	17h17m46s	+39°29.3'		Her	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 495x.
CGCG 225-97	gx	17h17m44s	+40°41.9'		Her	28"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una debole stellina a ridosso E; un piccolo triangolo aperto di stelline si trova subito a E della gx — 495x.
CGCG 226-3	gx	17h19m57s	+39°08.1'		Her	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 226-5	gx	17h20m16s	+39°15.7'		Her	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 226-6	gx	17h21m21s	+43°52.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 226-10	gx	17h24m10s	+43°27.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 226-12	gx	17h25m02s	+41°56.0'		Her	24"	m. buona / ottimo	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 226-15	gx	17h26m01s	+39°19.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente brillante, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 226-16	gx	17h26m10s	+39°54.6'		Her	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina subito a SE — 495x.
CGCG 226-17	gx	17h27m16s	+41°08.6'		Her	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 495x.
CGCG 226-18	gx	17h27m10s	+44°24.1'		Her	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 226-19	gx	17h27m17s	+44°55.2'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 226-20	gx	17h29m22s	+40°15.1'		Her	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo E — 450x.
CGCG 226-21	gx	17h29m40s	+40°16.3'		Her	24"	buona / m. buono	rotonda con Ø simile alla precedente, ma poco più diffusa e con tenue condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 226-22	gx	17h29m31s	+43°35.5'		Her	28"	ottima / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 40"×20" e con bulge diffuso abbastanza evidente; c'è una coppia abbastanza serrata di deboli stelline a ridosso NNE (quella al bordo del fuso è molto difficile) — 495x.
CGCG 226-28	gx	17h33m20s	+43°54.8'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' N a una visibile solo a momenti a ridosso SW — 450x.
CGCG 226-36	gx	17h39m52s	+43°18.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante subito a E — 450x.
CGCG 226-37	gx	17h40m38s	+41°18.1'		Her	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione stellare evidente; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
CGCG 226-38	gx	17h42m07s	+44°18.4'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NE — 495x.
CGCG 226-39	gx	17h42m27s	+39°19.1'		Her	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 226-40	gx	17h43m15s	+39°09.0'		Her	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" e gradatamente più brillante verso l'interno — 495x.
CGCG 226-41	gx	17h43m23s	+39°13.1'		Her	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una doppia serrata quasi a ridosso E — 450x.
CGCG 226-42	gx	17h44m08s	+40°52.0'		Her	16"	m. buona / ottimo	debole oggetto relativamente compatto e di luminosità uniforme, poco allungato da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 226-43	gx	17h45m32s	+40°29.8'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni inferiori a 30"×20" e con tenue nucleo stellare; forma un piccolo triangolo isoscele molto aperto con due stelline a W e SW; completa una sorta di arco con 3 stelline brillanti di luminosità decrescente che si protende verso SSE — 495x.
CGCG 226-44	gx	17h46m00s	+39°41.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 226-46	gx	17h47m27s	+40°21.3'		Her	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 226-47	gx	17h48m40s	+39°39.2'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è un piccolo triangolo di stelline abbastanza brillanti subito a E — 495x.
CGCG 227-3	gx	17h56m37s	+40°14.9'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella brillante di 9ª grandezza subito a W e una molto debole alla stessa distanza a SE — 495x.
CGCG 227-6	gx	17h58m08s	+43°25.2'		Her	28"	ottima / ottimo	nonostante sia situata ad appena un paio di primi a E della brillante SAO 47096 di 7ª grandezza si vede abbastanza facilmente; piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 227-8	gx	17h59m19s	+44°17.9'		Her	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 227-11	gx	18h01m18s	+39°42.5'		Her	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 227-14	gx	18h01m40s	+44°34.0'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e appena più brillante all'interno; c'è una debole stellina a ridosso W; un piccolo asterismo foggiato a trapezio regolare si trova subito a NE — 495x.
CGCG 227-15	gx	18h02m01s	+44°28.6'		Her	28"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con evidente condensazione centrale — 495x.
CGCG 227-16	gx	18h02m40s	+42°47.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina brillante subito a SE e una più debole alla stessa distanza NE; forma una coppia ravvicinata con MAC 1802+4247: quest'ultima è molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; si separa facilmente dalla principale anche a 340x, ma è più evidente a 450x.
CGCG 227-19	gx	18h10m58s	+44°46.0'		Her	24"	m. buona / buono	è una sorta di piccolo "nodulo" che emerge con gran fatica dal bagliore della SAO 47282 verso SW; non dovrebbe essere più estesa di 15" o 20"; meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
CGCG 227-22	gx	18h17m26s	+40°01.8'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare molto evidente; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 227-24	gx	18h18m06s	+39°49.6'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE — 450x.
CGCG 227-25	gx	18h18m14s	+39°47.8'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 228-3	gx	18h19m26s	+40°58.4'		Lyr	24"	ottima / ottimo	debole, allungata da NW a SW con dimensioni 30"×15" e appena più brillante all'interno; c'è una debolissima stellina al bordo W — 450x.
CGCG 228-5	gx	18h23m55s	+40°49.1'		Lyr	28"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole estesa una 30-ina di secondi o, poco più, in direzione N-S; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NW e una debole alla stessa distanza verso SW — 495x.
CGCG 228-7	gx	18h26m41s	+42°40.2'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina visibile solo a momenti a ridosso NW; un'altra poco più evidente si trova a 1' scarso N — 450x.
CGCG 228-8	gx	18h27m40s	+41°45.9'		Lyr	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo W — 450x.
CGCG 228-17	gx	18h37m04s	+42°27.2'		Lyr	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 228-18	gx	18h37m27s	+39°21.6'		Lyr	24"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NW a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 228-25	gx	18h43m06s	+43°57.0'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto piccola, debole ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 228-26	gx	18h43m52s	+42°37.4'		Lyr	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, in visione distolta è di aspetto a tratti un po' irregolare, orientata da N a S, di dimensioni 30"×15", ma con una sorta di piccola "sbavatura" verso NE; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 228-27	gx	18h45m00s	+42°43.2'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
CGCG 228-29	gx	18h45m31s	+40°40.9'		Lyr	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 228-30	gx	18h46m22s	+40°35.0'		Lyr	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra due deboli stelline a ridosso rispettivamente NW e SE — 450x.
CGCG 229-2	gx	18h49m47s	+41°40.6'		Lyr	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso N e una più debole al bordo S — 450x.
CGCG 229-3	gx	18h54m42s	+39°37.2'		Lyr	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 229-4	gx	18h54m46s	+41°57.7'		Lyr	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina al bordo S — 450x.
CGCG 229-5	gx	18h55m06s	+39°31.7'		Lyr	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW; una decina di primi a E delle gx notasi un gruppo disperso e irregolare di una 15-ina di stelle che ricorda un ammasso aperto — 450x.
CGCG 229-9	gx	18h58m03s	+43°56.1'		Lyr	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SW e una debole a S: una brillante si trova a 1' verso E — 450x.
CGCG 229-10	gx	18h58m41s	+43°28.6'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW; una appena percettibile si trova dalla parte opposta — 495x.
CGCG 229-12	gx	19h00m03s	+43°26.4'		Lyr	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (il campo è molto ricco di stelle) — 450x.
CGCG 229-15	gx	19h05m26s	+42°27.7'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SW — 495x.
CGCG 229-17	gx	19h07m08s	+41°44.8'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 495x.
CGCG 229-18	gx	19h07m23s	+39°55.9'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a E e una appena percettibile al bordo N (a meno che non si tratti di un nodulo galattico) — 495x.
CGCG 229-19	gx	19h07m19s	+40°59.5'		Lyr	24"	ottima / ottimo	piccolo e debolissimo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi, orientato da NE a SW, situato a ridosso S di una stellina abbastanza brillante; come se non bastasse, la visione è disturbata dalla SAO 48105 di 7ª grandezza a 3.5' N che si fatica a tenere fuori campo a 450x.
CGCG 229-20	gx	19h08m01s	+41°25.8'		Lyr	24"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW e una coppia stretta di deboli stelline a ridosso SE — 450x.
CGCG 229-23	gx	19h08m41s	+43°20.6'		Lyr	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE — 450x.
CGCG 229-24	gx	19h09m21s	+43°03.8'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con bulge evidente abbastanza contrastato sul disco — 450x.
CGCG 229-26	gx	19h10m07s	+40°00.5'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline a 1' verso E — 495x.
CGCG 229-29	gx	19h10m31s	+44°18.6'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con bulge visibile anche se poco contrastato; c'è una stellina brillante subito a SE e una più debole a 1' verso E — 495x.
CGCG 229-38	gx	19h19m56s	+44°53.8'		Cyg	24"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una doppia stretta a 1' NW — 450x.
CGCG 230-1	gx	16h18m58s	+44°14.0'		Cyg	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 25"×20"; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti subito a NE — 495x.
CGCG 230-2	gx	19h19m10s	+44°09.6'		Cyg	28"	ottima / ottimo	rotonda con Ø < 30", poco diffusa e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina molto debole al bordo S; una abbastanza brillante si trova a ridosso verso N — 495x.
CGCG 230-4	gx	19h20m37s	+44°02.3'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta subito a SW (fa parte assieme alla successiva dell'ammasso **AGC 2319**) — 495x.
CGCG 230-7	gx	19h21m10s	+43°56.7'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW; un'altra stellina visibile però solo a momenti a ridosso W o NW è invece la **MAC 1921+4357** — 495x.
CGCG 230-8	gx	19h21m32s	+43°59.7'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW (fa parte dell'ammasso **AGC 2319**) — 495x.
CGCG 230-9	gx	19h21m19s	+43°59.9'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è un piccolo triangolo isoscele e rettangolo (situato subito all'esterno a NE dell'ammasso **AGC 2319**) — 495x.
CGCG 230-11	gx	19h22m13s	+44°15.3'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra 2 stelline abbastanza brillanti orientate da E a W e distanti 2.5'; una stellina più debole si trova invece subito a N — 495x.
CGCG 230-12	gx	19h23m50s	+39°34.0'		Lyr	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW; la visione è disturbata dalla SAO 68251 di 7a grandezza situata 1.5' a N — 450x.
CGCG 230-13	gx	19h24m03s	+42°20.3'		Lyr	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 230-18	gx	19h30m00s	+43°28.5'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	poco più debole della successiva — che ho osservato per prima — rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; situata all'interno di un asterismo di forma triangolare formato da 7 od 8 componenti (il vertice più acuto punta a NW) — 495x.
CGCG 230-19	gx	19h30m37s	+43°25.6'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso W — 495x.
CGCG 230-20	gx	19h30m48s	+41°18.2'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso N e una debole a ridosso S — 450x.
CGCG 230-21	gx	19h31m28s	+41°54.4'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **MAC 1931+4154** che tra l'altro è più evidente, pur restando un oggetto molto debole; la CGCG appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; è debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a ridosso N.
CGCG 230-22	gx	19h32m25s	+41°54.3'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 231-1	gx	05h14m05s	+50°00.6'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia dalle componenti brillante a 1' NNW — 450x.
CGCG 232-5	gx	06h03m11s	+49°56.4'		Aur	16"	ottima / buono	debolissima, ma visibile senza difficoltà in visione distolta in quanto molto piccola, forse rotonda con Ø max di 20"; purtroppo anche a 380x non si riesce a tener fuori campo la SAO 40801 di 6ª grandezza situata a soli 4' SW.
CGCG 233-17	gx	06h24m55s	+49°30.6'		Aur	28"	buona / mediocre	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SE e una subito a W (fanno parte di un piccolo trapezio irregolare orientato da N a S) — 495x.
CGCG 233-19	gx	06h30m36s	+46°00.1'		Aur	28"	buona / mediocre	è un baffo di luce molto tenue che si diparte a S di una debole stellina per una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 233-26	gx	06h31m45s	+50°15.6'		Lyn	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare visibile a tratti a 270x.
CGCG 234-2	gx	06h41m05s	+50°09.3'		Lyn	16"	ottima / buono	molto debole e molto allungata ~ da E a W, di dimensioni 60"×20", con piccolo bulge diffuso appena più contrastato — 380x.
CGCG 234-6	gx	06h45m03s	+45°29.1'		Aur	28"	buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' SE e una più o meno alla stessa distanza verso NE — 495x.
CGCG 234-8	gx	06h45m52s	+45°27.4'		Aur	28"	buona / mediocre	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 495x.
CGCG 234-13	gx	06h50m38s	+45°58.0'		Aur	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una doppia serrata quasi a ridosso NE — 495x.

CGCG 234-14	gx	06h51m03s	+48°43.5'		Aur	28"	m. buona / discreto	diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina brillante a1.5' SSW — 495x.
CGCG 234-31	gx	06h56m43s	+48°54.1'		Aur	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; è "incuneata" in un piccolo triangolo rettangolo di stelline — 450x.
CGCG 234-33	gx	06h57m36s	+45°22.4'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso E — 450x.
CGCG 234-39	gx	06h59m02s	+45°23.7'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 234-40	gx	07h01m42s	+47°33.1'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 234-42	gx	07h02m52s	+50°35.2'		Lyn	24"	ottima / buono	piccola e debolissima chiazza di luminosità uniforme, estesa sì e no una 20-ina di secondi che aggetta a SW di una stellina abbastanza brillante (la quale fa parte di un minuscolo triangolo rettangolo di componenti della stessa luminosità); forma una coppia ravvicinata con **MAC 0702+5034** situata a ridosso SE — 450x.
CGCG 234-48	gx	07h05m41s	+48°21.5'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a S — 495x.
CGCG 234-52	gx	07h06m30s	+46°08.2'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 234-53	gx	07h06m40s	+48°29.4'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e un bulge relativamente brillante; c'è una stellina a ridosso N; situata tra una stellina abbastanza brillante a 1' NE e una tripletta serrata a SW — 495x.
CGCG 234-55	gx	07h07m19s	+48°21.1'		Lyn	28"	m. buona / discreto	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 495x.
CGCG 234-56	gx	07h07m32s	+48°54.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 234-57	gx	07h07m52s	+48°24.8'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta subito a S di una stellina molto debole, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
CGCG 234-59	gx	07h08m00s	+48°40.0'		Lyn	16"	buona / m. buono	piccola, rotonda con Ø max di 30", poco diffusa, poco più brillante verso l'interno e nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 234-61	gx	07h08m10s	+48°55.8'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 234-62	gx	07h09m12s	+49°08.2'		Lyn	28"	m. buona / discreto	diffusa e con gradiente di luce molto basso, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; equidistante ma non allineata con 2 stelline brillanti a NW — 495x.
CGCG 234-67	gx	07h08m47s	+48°59.7'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
CGCG 234-68	gx	07h08m53s	+48°27.0'		Lyn	28"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE (situata verso il margine meridionale dell'ammasso **AGC 569**) — 495x.
CGCG 234-69	gx	07h09m04s	+48°34.4'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (situata quasi al centro dell'ammasso **AGC 569**) — 495x.
CGCG 234-71	gx	07h09m16s	+49°49.2'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 234-72	gx	07h09m13s	+46°05.9'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccolo nucleo quasi stellare evidente; c'è una stellina brillante un paio di primi scarsi a S — 450x.
CGCG 234-76	gx	07h09m38s	+46°04.9'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S e una debole a ridosso W — 450x.
CGCG 234-77	gx	07h09m39s	+47°54.9'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	poco più evidente della coppia UGC 3706 / MCG+8-13-84 osservata subito prima e situata 2.5' a E; è diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 234-78	gx	07h09m45s	+48°41.4'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; una stellina appena percettibile situata subito a W è risultata essere la **PGC 2323400** (fa parte dell'ammasso **AGC 569**) — 495x.
CGCG 234-80	gx	07h10m35s	+49°52.4'		Lyn	20"	m. buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso S — 360x.
CGCG 234-85	gx	07h10m48s	+48°13.4'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10" — 450x.
CGCG 234-86	gx	07h10m54s	+49°54.2'		Lyn	20"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata dalla SAO 41600 di magnitudo 7.5 situata 1.5' a E — 360x.
CGCG 234-89	gx	07h11m01s	+48°41.2'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge marcato; c'è una stellina brillante al bordo SW (quella centrale di 3 stelline allineate da N a S) — 495x.
CGCG 234-92	gx	07h11m09s	+49°54.0'		Lyn	20"	m. buona / buono	appare elusivamente e solo a momenti a ridosso NE di un piccolo triangolo di stelle brillanti fra cui la SAO 41600 — 360x.
CGCG 234-94	gx	07h11m31s	+49°04.7'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
CGCG 234-98	gx	07h12m05s	+50°35.5'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; a tratti, osservando a 380x, sembra di vedere qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è il nucleo o una debolissima stellina a ridosso.
CGCG 234-101	gx	07h12m44s	+50°03.7'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; a 380x appare a tratti una tenuissima nucleo stellare; c'è una stellina a 1' scarso verso SE.
CGCG 234-102	gx	07h12m51s	+49°00.3'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 80"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SSE — 450x.
CGCG 234-103	gx	07h12m56s	+49°45.9'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo W; allineata, ma non proprio equidistante con 2 stelline a W — 495x.
CGCG 234-104	gx	07h12m57s	+45°48.2'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni di 30"×15" scarsi — 450x.
CGCG 234-105	gx	07h13m38s	+50°01.8'		Lyn	16"	ottima / buono	debole oggetto rotondo, poco diffuso e condensato e con Ø di ~ 30" — 380x.
CGCG 234-106	gx	07h13m35s	+50°43.6'		Lyn	16"	ottima / buono	è un debolissimo ovale di 45"×30", orientato da N a S e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso del bordo meridionale — 380x.
CGCG 234-108	gx	07h13m54s	+50°23.9'		Lyn	16"	ottima / buono	relativamente facile, rotonda, di ~ 30", abbastanza compatta e con nucleo stellare visibile a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso di NE (la più meridionale di un piccolo arco di 3 stelline).
CGCG 234-112	gx	07h15m11s	+45°44.4'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo aperto di stelline — 450x.
CGCG 235-7	gx	07h20m33s	+49°05.3'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e poco diffusa, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 235-14	gx	07h26m11s	+48°57.3'		Lyn	28"	m. buona / discreto	poco diffusa, molto allungata da NNW a SSE, di dimensioni 30"×10" e con piccolo bulge brillante (ma non si tratterà di una stellina sovrapposta?); una stellina vera e propria si trova quasi a ridosso verso S — 495x.
CGCG 235-16	gx	07h26m51s	+48°42.1'		Lyn	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una debole stellina a ridosso NW e una più evidente a 1' SE — 495x.
CGCG 235-23	gx	07h39m35s	+49°21.3'		Lyn	20"	m. buona / buono	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 360x.
CGCG 235-25	gx	07h40m11s	+49°18.6'		Lyn	20"	m. buona / buono	forma una coppia con la successiva situata 1.5' a S — piccola e molto debole, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 360x.
CGCG 235-26	gx	07h40m15s	+49°17.0'		Lyn	20"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 360x.
CGCG 235-27	gx	07h41m09s	+49°23.8'		Lyn	20"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 20" — 360x.
CGCG 235-29	gx	07h42m32s	+49°11.5'		Lyn	20"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1.5' SW — 360x.
CGCG 235-48	gx	07h50m09s	+50°02.7'		Lyn	16"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda, con Ø di 35"-40" e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso N — 380x.
CGCG 235-49	gx	07h51m14s	+50°11.6'		Lyn	16"	ottima / buono	relativamente facile, piccola, rotonda, con nucleo stellare e Ø di 20"-25" — 380x.
CGCG 236-8	gx	07h51m52s	+49°48.8'		Lyn	28"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con marcata condensazione stellare; c'è un asterismo di 5 stelline abbastanza brillanti foggiato a "W" a NW della gx — 495x.
CGCG 236-9	gx	07h53m09s	+50°07.8'		Lyn	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø analogo a quello di UGC 4071 dalla quale dista 6.5' SSW; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
CGCG 236-13	gx	07h54m52s	+45°49.4'		Lyn	20"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 360x.
CGCG 236-16	gx	07h56m48s	+45°53.3'		Lyn	20"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø anche questa di una 30-ina di secondi — 360x.
CGCG 236-17	gx	07h56m44s	+45°52.6'		Lyn	20"	m. buona / buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 360x.
CGCG 236-23	gx	08h00m15s	+45°13.9'		Lyn	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; situata tra una stellina brillante a 1' SSE e una debole alla stessa distanza verso N (una tripletta di stelle brillanti si trova 6.5' a E) — 495x.
CGCG 236-34	gx	08h12m40s	+44°22.8'		Lyn	20"	buona / buono	appare come una stellina percettibile solo a momenti, situata a metà strada tra una debole stellina e la UGC 4272 situata 1.5' a SE — 360x.
CGCG 236-38	gx	08h15m17s	+46°04.5'		Lyn	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è la SAO 42246 di 9ª grandezza a un paio di primi verso NNE — 495x.
CGCG 236-39	gx	08h16m34s	+46°04.1'		Lyn	28"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
CGCG 237-4	gx	08h30m02s	+49°41.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×30"; c'è una stellina a 1' SW e una appena percettibile alla stessa distanza verso E; una coppia di stelline brillanti orientate da E a W si trova a NW — 495x.
CGCG 237-5	gx	08h29m57s	+44°56.4'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina subito a SW e una appena percettibile a ridosso N; non sembra disturbata dalla SAO 42388 di 9ª grandezza situata un paio di primi a W — 495x.
CGCG 237-8	gx	08h37m08s	+45°09.9'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 237-9	gx	08h37m49s	+47°21.0'		UMa	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1.5' WSW — 495x.
CGCG 237-10	gx	08h39m09s	+45°07.8'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline un paio di primi a N — 495x.
CGCG 237-12	gx	08h42m48s	+45°38.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; situata tra due stelline orientate da NE a SW e distanti un paio di primi — 495x.
CGCG 237-18	gx	08h46m20s	+47°09.4'		UMa	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con **MAC 0846+4709** situata a ridosso S — la CGCG è piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la MAC è molto piccola e più compatta, a tratti orientata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con un nucleo stellare abbastanza evidente — 495x.
CGCG 237-21	gx	08h48m24s	+47°17.3'		UMa	28"	m. buona / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è un piccolo triangolo isoscele di stelline a SW — 495x.
CGCG 237-72	gx	07h09m13s	+46°05.9'		Lyn	16"	buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e bulge poco più luminoso del disco — 380x.
CGCG 238-3	gx	09h00m36s	+46°41.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 495x.
CGCG 238-7	gx	09h04m41s	+46°35.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso NE — 495x.
CGCG 238-10	gx	09h06m56s	+49°46.4'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' scarso verso E e una appena percettibile alla stessa distanza SE — 495x.
CGCG 238-11	gx	09h07m11s	+46°12.7'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte del terzetto di UGC 4784 — è un piccolo oggetto relativamente compatto, di Ø max 30" e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 238-26	gx	09h16m48s	+49°46.8'		UMa	16"	m. buona / m. buono	debole galassietta rotonda relativamente compatta, rotonda con Ø di 35"×40" e una debole condensazione centrale; è situata tra 2 stelline distanti 1.5' in direzione ~ N-S: quella a S è poco più brillante — 270x.
CGCG 238-38	gx	09h21m11s	+45°53.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è molto disturbata dalla SAO 42816 di 8ª grandezza situata ad appena 1' SSW — 495x.
CGCG 238-51	gx	09h25m00s	+49°22.6'		UMa	24"	discreta / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con condensazione centrale di aspetto stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso N e una debole subito a W — 450x.
CGCG 238-53	gx	09h25m50s	+49°19.8'		UMa	24"	discreta / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 0925+4920 situata a una 40-ina di secondi NE e facilmente separabile a 450x — diffusa, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare; c'è una stella brillante a poco più di 1' verso SSW. La MAC è più debole e diffusa, con nucleo stellare evidente, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 238-54	gx	09h25m50s	+49°19.8'		UMa	24"	discreta / m. buono	forma una coppia ravvicinata con l'elusiva MAC 0925+4926 situata a ridosso verso NW — debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con tenue condensazione centrale. La MAC appare solo a momenti a 450x, ma non è altro che una stellina appena sfocata.
CGCG 238-58	gx	09h27m55s	+44°30.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; c'è una stella brillante a 2.5' SE — 495x.
CGCG 238-64	gx	09h30m13s	+49°28.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con bulge rotondo con Ø di 20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S — 495x.
CGCG 239-10	gx	09h34m12s	+46°42.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono 2 stelline rispettivamente a 1.5' E e 1.5 W — 495x.
CGCG 239-11	gx	09h36m31s	+48°28.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MCG+8-18-13** situata 1' a E — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 2 stelline rispettivamente a 1' W e 1' SW — 495x.
CGCG 239-12	gx	09h37m24s	+48°30.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20"; la visione è un po' disturbata da un piccolo asterismo di 4 stelle a E, di cui 2 molto brillanti (quella più a S è la SAO 42943 di 9ª grandezza); le 2 meno luminose formano una coppia ravvicinata ad appena 1' E della gx — 495x.
CGCG 239-13	gx	09h38m14s	+48°23.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' SSW — 495x.
CGCG 239-15	gx	09h38m48s	+48°34.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi. Forma una coppia ravvicinata con **MCG+8-18-16A** situata a ridosso SW — 495x.
CGCG 239-16	gx	09h39m17s	+47°29.7'		UMa	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 239-30	gx	09h49m02s	+47°02.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa rotonda con Ø < 30" e con piccolo nucleo abbastanza evidente — 495x.
CGCG 239-52	gx	10h02m33s	+44°47.3'		UMa	28"	m. buona / buono	debole e alquanto stemperata sul fondo cielo, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a poco più di 1' NNE — 495x.
CGCG 239-55	gx	10h03m29s	+46°37.7'		UMa	28"	m. buona / buono	diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina molto debole a 1' verso N — 495x.
CGCG 240-1	gx	10h03m23s	+48°21.9'		UMa	28"	m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
CGCG 240-2	gx	10h04m05s	+45°02.2'		UMa	28"	m. buona / buono	poco più debole di CGCG 239-52, osservata subito prima, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 495x.
CGCG 240-3	gx	10h04m48s	+46°43.2'		UMa	28"	m. buona / buono	debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza evidente — 495x.
CGCG 240-4	gx	10h04m52s	+46°41.4'		UMa	28"	m. buona / buono	molto piccola e molto debole, relativamente compatta, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
CGCG 240-6	gx	10h05m14s	+46°39.1'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso W — 495x.
CGCG 240-9	gx	10h07m19s	+46°32.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a N (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-11	gx	10h07m36s	+46°05.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola, relativamente facile, compatta e condensata, rotonda con Ø < 20" (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-12	gx	10h07m39s	+46°09.9'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×20"; allineata, ma non equidistante, con 2 stelline abbastanza brillanti a E (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-14	gx	10h10m11s	+46°57.1'		UMa	28"	m. buona / buono	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 40"×10" e con tenue bulge poco contrastato — 495x.
CGCG 240-16	gx	10h11m07s	+46°54.9'		UMa	28"	m. buona / buono	relativamente brillante, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con bulge evidente e contrastato; c'è una stellina a 1.5' SW — 495x.
CGCG 240-28	gx	10h19m21s	+49°07.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' SW e una molto debole a 1' SE (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-29	gx	10h19m26s	+44°24.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, con alto gradiente di luce, rotonda con Ø < 40" e un nucleo stellare evidente (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-42	gx	10h26m19s	+45°34.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-48	gx	10h29m35s	+49°46.9'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-50	gx	10h29m54s	+48°21.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-56	gx	10h34m41s	+44°37.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con evidente condensazione stellare; c'è una stellina brillante un paio di primi a W (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-58	gx	10h34m53s	+45°16.1'		UMa	28"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi verso SE — 495x.
CGCG 240-59	gx	10h35m05s	+44°44.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola e relativamente facile, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' NW (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 240-61	gx	10h35m13s	+44°35.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 241-2	gx	10h38m06s	+44°50.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15", con bulge evidente e contrastato; c'è una doppia serrata e brillante a un paio di primi verso NE e accompagnata da una più debole a 1' WSW; una debole stellina di 15-esima si trova a 1' W della gx — 495x.
CGCG 241-3	gx	10h38m37s	+44°31.4'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
CGCG 241-12	gx	10h47m17s	+47°25.3'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole chiazza molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e con condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso NNE — 495x.
CGCG 241-13	gx	10h48m19s	+50°01.4'		UMa	28"	ottima / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×13" (con rapporto 3:1) — 495x.
CGCG 241-15	gx	10h48m52s	+50°02.2'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina a 1' SW; la gx è allineata con questa e con 2 stelline brillanti a NE — 495x.
CGCG 241-18	gx	10h49m33s	+47°56.0'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con evidente condensazione centrale — 495x.
CGCG 241-19	gx	10h50m34s	+48°41.6'		UMa	20"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 360x.
CGCG 241-20	gx	10h50m45s	+46°50.5'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1' W e una brillante a 1.5' verso N — 495x.
CGCG 241-23	gx	10h52m15s	+49°41.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' SW — 495x.
CGCG 241-25	gx	10h52m28s	+45°53.3'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 241-27	gx	10h53m46s	+46°13.1'		UMa	28"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE; altre due stelline relativamente brillanti si trovano rispettivamente a 1' NW e 2' SW; la SAO 43509 di 9ª grandezza, situata 4' a S, si riesce a malapena a tenere fuori campo — 495x.
CGCG 241-28	gx	10h54m00s	+49°36.3'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza molto diffusa, forse rotonda con Ø, ma la forma è un po' compromessa da una stellina brillante al bordo SE; in visione distolta appare estesa 1' scarso; si trova sul lato maggiore di un triangolo isoscele molto aperto formato da 3 stelline situate a N, E e W — 450x.
CGCG 241-32	gx	10h54m17s	+49°02.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1.5' verso E, una molto debole un paio di primi a NE e una abbastanza brillante a 2' NNW — 495x.
CGCG 241-34	gx	10h54m38s	+47°28.2'		UMa	20"	buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia serrata brillante a 1.5' NW — 360x.
CGCG 241-35	gx	10h54m39s	+47°51.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata a ridosso S di un piccolo trapezio regolare formato da 4 stelline (quella a 1.5' verso E è la più debole, mentre la componente a 1' NW è la più brillante) — 495x.
CGCG 241-36	gx	10h54m43s	+46°33.2'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 50"×25" e con tenue bulge abbastanza contrastato sul disco — 450x.
CGCG 241-38	gx	10h55m06s	+49°36.5'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 241-43	gx	10h56m11s	+49°56.3'		UMa	20"	buona / buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 360x.
CGCG 241-50	gx	10h58m33s	+46°16.1'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 241-52	gx	10h59m33s	+49°59.1'		UMa	16"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto molto debole, rotondo, con Ø max di 20", facilmente osservabile in visione distolta (situato 6' SW di UGC 6071) — 270x.
CGCG 241-53	gx	10h59m53s	+50°00.9'		UMa	16"	m. buona / m. buono	è di dimensioni simili a UGC 6071, dalla quale dista 3' scarsi a SSW, ma è decisamente più debole, con Ø di 35" e di luminosità uniforme — 270x.
CGCG 241-55	gx	10h59m58s	+46°04.3'		UMa	24"	m. buona / buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 241-58	gx	11h01m03s	+44°53.3'		UMa	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e con condensazione centrale molto tenue, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso E e una molto luminosa a 2.5' WNW — 495x.
CGCG 241-60	gx	11h01m49s	+44°26.9'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; forma una coppia serrata con MAC 1101+4426 situata a ridosso E; quest'ultima è molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di 10"-12"; le 2 galassiette si separano abbastanza facilmente a 450x.
CGCG 241-63	gx	11h02m17s	+44°16.3'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue nucleo quasi stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 241-68	gx	11h04m04s	+45°15.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale evidente; c'è una stellina a 1.5' NE; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a ENE (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 241-70	gx	11h04m19s	+46°07.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' SE — 495x.
CGCG 241-71	gx	11h04m27s	+45°07.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; situata 1.5' a W di UGC 6135 (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 241-74	gx	11h05m08s	+44°44.8'		UMa	20"	buona / buono	relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare evidente; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a W e SW orientate come la gx — 360x.
CGCG 241-78	gx	11h06m37s	+46°02.3'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NNW a SSE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 241-79	gx	11h06m49s	+45°57.9'		UMa	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1.5' E — 450x.
CGCG 241-82	gx	11h07m20s	+46°23.0'		UMa	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 241-83	gx	11h08m01s	+46°51.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE (ossia come la coppia di stelline abbastanza brillanti situate 1.5' a S) con dimensioni 45"×15" — 495x.
CGCG 241-86	gx	11h08m32s	+47°20.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con bulge diffuso poco contrastato; situata in mezzo a 2 stelline orientate nello stesso modo — 495x.
CGCG 241-92	gx	11h10m56s	+46°56.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
CGCG 241-96	gx	11h11m52s	+45°32.5'		UMa	20"	buona / buono	debolissima, solo a momenti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" (ho fatto fatica a trovarla perché situata in un campo depleto) — 360x.
CGCG 242-4	gx	11h11m18s	+48°11.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	debolissima chiazza che aggetta per 20"-25" a E di una stella brillante di 10ª grandezza che tende a oscurarne la forma — 495x.
CGCG 242-5	gx	11h11m23s	+47°21.9'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" (altresì riportata sul Megastar come **CGCG 241-84**) — 495x.
CGCG 242-6	gx	11h12m27s	+45°15.9'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una coppia di stelline un paio di primi a S (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 242-13	gx	11h14m25s	+47°22.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; situata tra due stelline orientate da NE a SW (la prima è una doppia molto serrata e sbilanciata) — 495x.
CGCG 242-15	gx	11h15m41s	+46°07.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; è situata in una piccola zona depleta che ne rende difficile l'identificazione (l'unico riferimento è una coppia di deboli stelline 3' a S — presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 242-16	gx	11h17m08s	+49°56.7'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 495x.
CGCG 242-18	gx	11h17m41s	+47°05.0'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; ci sono 2 stelle brillanti a 1.5' NE e 1' SSE — 495x.
CGCG 242-20	gx	11h19m17s	+47°38.9'		UMa	24"	m. buona / m. buono	è una debole bolla circolare con Ø di 45", molto diffusa e poco più brillante verso l'interno; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 242-21	gx	11h20m34s	+46°49.5'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco disturbata da una stella brillante di 10a grandezza situata 1.5' a WNW — 495x.
CGCG 242-23	gx	11h21m25s	+46°17.3'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 242-26	gx	11h22m21s	+46°25.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW (presenza di chiarore lunare) — 495x.
CGCG 242-38	gx	11h27m36s	+47°22.8'		UMa	20"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta 2.5' a NNE — 360x.
CGCG 242-39	gx	11h27m55s	+47°23.8'		UMa	20"	buona / buono	poco più evidente di CGCG 242-38 situata 3.5' a WSW, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; la doppia stretta di cui alla gx precedente si trova 2.5' a NW; poco disturbata dalla SAO 43754 di 8ª grandezza 4.5' a NE — 360x.
CGCG 242-42	gx	11h30m40s	+47°01.0'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso NW; poco meglio evidente a 450x.
CGCG 242-44	gx	11h32m35s	+49°06.6'		UMa	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 242-52	gx	11h34m48s	+46°59.4'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni di 60"×20", con piccola e tenue condensazione centrale — 495x.
CGCG 242-60	gx	11h36m34s	+49°05.8'		UMa	16"	buona / m. buono	assieme a CGCG 242-61 forma una coppia di galassiette molto deboli distanti 4' in direzione NNW-SSE; la 1ª è più facile, diffusa, con nucleo stellare e Ø di una 20-ina di secondi; la 2ª è molto debole, ma visibile senza problemi in visione distolta, a tratti condensata e di dimensione simile — 380x.
CGCG 242-61	gx	11h36m37s	+49°03.8'		UMa	16"	buona / m. buono	v. **CGCG 242-60**
CGCG 242-63	gx	11h37m16s	+45°45.4'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x; una stellina percettibile solo a momenti appare a ridosso SE, ma da un controllo successivo è risultata essere la **MAC 1137+4544**.
CGCG 242-69	gx	11h38m54s	+49°39.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1.5' NW — 495x.
CGCG 242-70	gx	11h39m03s	+45°36.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; si trova quasi a ridosso W di una coppia di stelline brillanti orientate da NW a SE — 495x.
CGCG 242-73	gx	11h40m47s	+46°32.5'		UMa	24"	m. buona / m. buono	diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 242-75	gx	11h41m22s	+46°23.6'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 242-76	gx	11h43m05s	+48°23.9'		UMa	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 243-6	gx	11h48m03s	+46°10.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e appena più brillante all'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 495x.
CGCG 243-10	gx	11h49m16s	+46°07.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 495x.
CGCG 243-12	gx	11h49m13s	+49°55.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, difficile da "stanare" in quanto situata in una piccola zona depleta; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi c'è una stellina percettibile solo a momenti a 1' verso W — 495x.
CGCG 243-20	gx	11h51m57s	+46°49.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con evidente condensazione centrale; una debolissima stellina leggermente sfuocata appare a ridosso NE: si tratta di **2MASS 11515876+4649105** — 495x.
CGCG 243-21	gx	11h52m00s	+46°53.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella brillante 2.5' a E — 495x.
CGCG 243-24	gx	11h53m41s	+46°12.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; ci sono due stelline molto deboli: una quasi a ridosso E e l'altra a una 40-ina di secondi NW — 495x.
CGCG 243-27	gx	11h54m01s	+44°38.5'		UMa	28"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole che aggetta a N di una stella brillante che ne disturba un po' l'osservazione; in visione distolta appare estesa 1' scarso; c'è una coppia di stelline subito a NE — 495x.
CGCG 243-30	gx	11h55m45s	+49°17.7'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 243-41	gx	12h04m46s	+49°11.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma con pochi riferimenti stellari, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10", o poco più, e con piccolo bulge evidente; c'è una debole stellina a 1.5' SW — 495x.
CGCG 243-45	gx	12h09m14s	+47°03.5'		UMa	28"	ottima / m. buono	relativamente brillante, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare; ci sono 2 stelline a 1.5' SE e 1' verso N — 495x.
CGCG 243-46	gx	12h09m31s	+48°54.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; poco disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata a 1 verso S — 495x.
CGCG 243-47	gx	12h09m49s	+47°10.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' S e una più evidente a 1.5' verso W — 495x.
CGCG 243-49	gx	12h10m49s	+44°30.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 243-50	gx	12h12m30s	+45°41.1'		CVn	28"	m. buona / ottimo	diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso N e una più brillante 1.5' a ESE — 495x.
CGCG 243-51	gx	12h12m50s	+46°46.4'		CVn	16"	buona / buono	relativamente facile, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; forma un piccolo triangolo quasi rettangolo con 2 stelline: 1 a 2' NW e l'altra 2.5' NNW — 380x.
CGCG 243-65	gx	12h18m10s	+44°24.0'		CVn	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con un nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' scarso verso W; una coppia di stelle brillanti si trova 3.5' a SSE — 495x.
CGCG 244-2	gx	12h18m44s	+44°46.9'		CVn	28"	ottima / m. buono	relativamente brillante, diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge ben evidente; c'è una stellina a 1' NE — 495x.
CGCG 244-11	gx	12h24m29s	+46°01.1'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e tenue condensazione centrale appena percettibile — 380x.
CGCG 244-13	gx	12h25m29s	+47°16.4'		CVn	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso S — 380x.
CGCG 244-15	gx	12h25m46s	+45°17.4'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 244-21	gx	12h28m25s	+44°38.0'		CVn	16"	buona / scarso	debole lucore rotondo con Ø di ~ 1', abbastanza definito e di luminosità uniforme, situata a 1' W di una stellina brillante — 188x.
CGCG 244-25	gx	12h30m12s	+47°00.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE — 495x.
CGCG 244-26	gx	12h32m17s	+47°20.2'		CVn	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, a prima vista rotonda, ma osservando in visione distolta è in realtà molto diffusa e orientata da NE a SW, di dimensioni grosso modo di 60"×40" e con evidente condensazione centrale — 495x.
CGCG 244-29	gx	12h34m11s	+47°44.5'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; presenta un bulge esteso appena percettibile; una debole stellina si trova un paio di primi a ENE; a 1' NW di quest'ultima appare un'altra stellina percettibile solo a momenti che da un controllo effettuato è risultata essere **MAC 1234+4745B** — 450x.
CGCG 244-30	gx	12h34m41s	+44°23.7'		CVn	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 244-31	gx	12h34m47s	+47°45.5'		CVn	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 244-32	gx	12h36m15s	+47°23.3'		CVn	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 244-33	gx	12h36m51s	+45°39.1'		CVn	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 244-34	gx	12h37m14s	+49°26.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 45" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 244-38	gx	12h44m08s	+44°53.5'		CVn	24"	m. buona / buono	poco diffusa, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge brillante quasi stellare — 450x.
CGCG 245-1	gx	12h49m40s	+49°26.8'		CVn	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 245-7	gx	12h57m36s	+48°29.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE — 495x.
CGCG 245-8	gx	12h59m22s	+48°20.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale abbastanza evidente — 495x.
CGCG 245-12	gx	13h01m16s	+48°03.6'		CVn	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso E; un'altra più debole si trova praticamente al bordo E, ma quest'ultima, da un controllo successivo, è risultata essere la minuscola **PGC 2309701** — 450x.
CGCG 245-13	gx	13h03m10s	+47°20.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina appena percettibile subito a S — 495x.
CGCG 245-14	gx	13h03m54s	+47°23.2'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante un paio di primi a S — 495x.
CGCG 245-16	gx	13h04m23s	+47°35.8'		CVn	28"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø < 40" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina al bordo orientale — 495x.
CGCG 245-17	gx	13h04m56s	+47°30.2'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 495x.
CGCG 245-19	gx	13h05m41s	+49°25.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.

CGCG 245-20	gx	13h07m26s	+45°13.1'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 245-21	gx	13h07m27s	+45°09.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 245-23	gx	13h09m39s	+45°16.1'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è un piccolo triangolo molto aperto di stelline brillanti a E — 495x.
CGCG 245-24	gx	13h09m45s	+45°54.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 380x.
CGCG 245-27	gx	13h11m31s	+46°20.5'		CVn	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e poco più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 450x.
CGCG 245-29	gx	13h12m08s	+45°25.6'		CVn	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 495x.
CGCG 245-31	gx	13h12m17s	+44°50.4'		CVn	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 245-33	gx	13h12m57s	+47°27.4'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 50"×25" e con piccolo bulge abbastanza contrastato; c'è una coppia sbilanciata di stelline a 1' SE; un'altra debole stellina si trova a 1' NW — 495x.
CGCG 246-5	gx	13h28m50s	+46°15.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; situata all'interno di un triangolo isoscele di stelline brillanti col vertice più acuto che punta a NW — 450x.
CGCG 246-6	gx	13h29m15s	+46°30.1'		CVn	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto debolissimo, rotondo con Ø di ~ 45", visibile abbastanza facilmente in visione distolta; è situata 10' a SE di NGC 5173; allineata con una coppia di deboli stelline a SSE — 270x.
CGCG 246-11	gx	13h31m38s	+46°09.1'		CVn	16"	buona / discreto	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 246-14	gx	13h34m37s	+46°09.3'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e poco più brillante all'interno; ci sono 2 stelline a 1.5' verso S e verso ENE — 495x.
CGCG 246-15	gx	13h34m58s	+45°46.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a SE; una visibile solo a momenti appare a ridosso NW — 450x.
CGCG 246-24	gx	13h52m39s	+46°21.0'		CVn	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 246-26	gx	13h55m02s	+44°35.2'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 15"; c'è una stellina a 1.5' verso W — 495x.
CGCG 247-5	gx	14h09m07s	+46°47.2'		Boo	28"	m. buona / buono	è un baffo di luce molto tenue, orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' W e una appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso E — 495x.
CGCG 247-8	gx	14h11m04s	+48°57.9'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e con nucleo stellare percettibile a momenti; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 495x.
CGCG 247-12	gx	14h12m36s	+46°12.3'		Boo	16"	buona / discreto	debolissima e diffusa, appare in visione distolta a ridosso SW di una stellina, a tratti allungata da E a W con dimensioni ~ 60"×30" — 270x.
CGCG 247-18	gx	14h19m27s	+45°50.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 247-19	gx	14h19m25s	+45°51.8'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 247-20	gx	14h19m43s	+49°14.2'		Boo	28"	buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; poco disturbata dalla SAO 44997 di 8ª grandezza situata 4' a NNE — 388x.
CGCG 247-22	gx	14h22m12s	+49°50.6'		Boo	28"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 388x.
CGCG 247-25	gx	14h22m46s	+46°32.8'		Boo	28"	m. buona / buono	molto piccola, debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina subito a S — 495x.
CGCG 247-27	gx	14h26m03s	+49°31.3'		Boo	28"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a W distanti 3' — 388x.
CGCG 247-32	gx	14h29m14s	+44°42.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge abbastanza evidente; situata all'interno di un triangolo isoscele di stelle brillanti con vertice più acuto che punta a NE — 450x.
CGCG 247-36	gx	14h30m12s	+45°32.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto piccola e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una doppia a un paio di primi verso S — 450x.
CGCG 247-38	gx	14h31m18s	+47°29.9'		Boo	28"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, appare facilmente in visione distolta, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 495x.
CGCG 247-40	gx	14h32m13s	+45°55.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale molto tenue; situata tra due stelline orientate da E a W — 450x.
CGCG 248-17	gx	14h41m17s	+44°28.8'		Boo	16"	m. buona / m. buono	piccola, rotonda, evidente, con Ø di una 30-ina di secondi o 40" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
CGCG 248-19	gx	14h43m31s	+49°23.6'		Boo	28"	buona / ottimo	diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; ci sono 2 stelline poste simmetricamente a 1' SE e 1' SW — 388x.
CGCG 248-20	gx	14h44m56s	+49°42.9'		Boo	28"	buona / ottimo	molto piccola e poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; non sembra gran che disturbata dalla SAO 45198 di magnitudo 8.6 situata 3.5' a SW — 388x.
CGCG 248-21	gx	14h48m08s	+48°05.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente; c'è una debole stellina quasi a ridosso NW; una coppia di stelline brillanti si trova a poco più di 1' sempre a NW — 450x.
CGCG 248-26	gx	14h55m41s	+45°32.4'		Boo	16"	m. buona / m. buono	debolissima, forse rotonda con Ø di 25"-30"; ci sono 2 stelline a ridosso: una a E e l'altra a NE — 380x.
CGCG 248-33	gx	14h57m29s	+45°50.7'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole, con tenue condensazione centrale, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 248-34	gx	14h58m28s	+48°29.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 248-35	gx	14h58m32s	+48°29.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	più diffusa della precedente e con condensazione centrale più tenue, rotonda con Ø simile — 450x.
CGCG 248-37	gx	14h58m44s	+48°28.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø < 30"; a prima vista pare di aspetto simile a CGCG 248-34 — 450x.
CGCG 248-38	gx	14h59m00s	+48°24.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 248-40	gx	14h59m35s	+49°19.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S, estesa una 40-ina di secondi e spessa 1/3 — 450x.
CGCG 248-46	gx	15h01m33s	+49°06.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza circolare con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NW; poco disturbata dalla SAO 45335 di 7a grandezza situata 6' a N — 450x.
CGCG 248-50	gx	15h03m56s	+48°33.0'		Boo	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina a 1.5' verso W — 495x.
CGCG 248-51	gx	15h04m23s	+49°22.2'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di ~ 20" — 380x.
CGCG 248-52	gx	15h04m24s	+49°23.9'		Boo	16"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; a prima vista appare più debole di CGCG 248-51 situata 1.5' a S — 380x.
CGCG 248-53	gx	15h04m59s	+48°38.8'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso N; disturbata da una stella brillante di 9ª grandezza situata 3' a SW — 495x.
CGCG 248-55	gx	15h05m26s	+49°14.4'		Boo	16"	m. buona / m. buono	facile, compatta e con nucleo stellare; è piccolissima, con dimensioni 20"×10" o poco più (in pratica è estesa i 2/3 della distanza della coppia di stelline un paio di primi a NNE e orientata nello stesso modo) — 380x.
CGCG 249-7	gx	15h08m24s	+49°39.9'		Boo	28"	m. buona / discreto	relativamente brillante, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge molto contrastato; c'è una stellina a ridosso W e una più brillante a 1.5' sempre verso W — 495x.
CGCG 249-8	gx	15h09m30s	+46°29.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 249-9	gx	15h10m24s	+45°10.0'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole chiazza molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina al bordo NW; situata all'interno di un trapezio oblungo formato da 4 stelle brillanti e orientato da NE a SW — 495x.
CGCG 249-11	gx	15h11m48s	+46°15.2'		Boo	16"	buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con bulge visibile a tratti appena più brillante del disco — 380x.
CGCG 249-17	gx	15h20m41s	+49°06.4'		Boo	28"	m. buona / discreto	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale poco contrastata; situata subito a N di un piccolo trapezio di stelline — 495x.
CGCG 249-18	gx	15h20m57s	+45°43.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è molto disturbata dalla SAO 45500 di magnitudo 6.7 situata ad appena 3' verso S; a tratti, in visione distolta, appare un piccolo oggetto diffuso estremamente tenue che è risultato essere **MAC 1520+4543** — 450x.
CGCG 249-21	gx	15h25m04s	+48°27.4'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20" — 495x.
CGCG 249-25	gx	15h27m47s	+47°01.6'		Boo	28"	m. buona / discreto	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, diffusa e a tratti condensata; c'è una stellina 1.5' a NNE — 495x.
CGCG 249-26	gx	15h30m00s	+45°54.8'		Boo	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 249-27	gx	15h31m53s	+45°25.8'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso SW (quest'ultima, da un controllo successivamente effettuato, è risultata essere la **2MASS 15315126+4525241** — 495x.
CGCG 249-28	gx	15h32m55s	+44°32.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 249-30	gx	15h33m08s	+44°32.2'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 249-31	gx	15h35m30s	+46°45.3'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 495x.
CGCG 249-33	gx	15h35m57s	+46°44.9'		Boo	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale evidente — 495x.
CGCG 249-34	gx	15h36m27s	+47°51.3'		Boo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 40"; c'è una debole stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 250-3	gx	15h41m58s	+48°33.4'		Boo	28"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con una tenue condensazione centrale (forma una coppia con **MCG+8-29-1** situata un paio di primi a W) — 495x.
CGCG 250-6	gx	15h44m27s	+47°00.4'		Boo	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 250-10	gx	15h46m31s	+46°00.0'		Boo	24"	buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 400x.
CGCG 250-13	gx	15h49m08s	+44°42.0'		Her	28"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ~ 1' verso E e una più evidente a un paio di primi nella stessa direzione — 495x.
CGCG 250-16	gx	15h53m44s	+49°57.0'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso NW e una della stessa luminosità a 1' NE; una 3a stellina più debole si trova al bordo meridionale — 450x.
CGCG 250-18	gx	15h55m04s	+45°29.2'		Her	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, più che altro disturbata da una stellina brillante situata a ridosso verso E; la gx è rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo di aspetto quasi stellare — 400x.
CGCG 250-19	gx	15h55m17s	+47°57.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 250-22	gx	15h55m43s	+49°32.1'		Her	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è un piccolo triangolo isoscele di stelline a S — 495x.
CGCG 250-23	gx	15h56m08s	+48°05.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	galassietta facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con evidente nucleo stellare — 450x.
CGCG 250-27	gx	15h57m09s	+48°11.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza contrastata, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso S — 450x.
CGCG 250-31	gx	15h58m57s	+44°45.8'		Her	28"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente — 495x.
CGCG 250-32	gx	15h59m01s	+46°01.4'		Her	28"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare evidente — 495x.
CGCG 250-33	gx	15h58m59s	+48°31.8'		Her	28"	m. buona / buono	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo E — 495x.
CGCG 250-34	gx	16h00m11s	+46°47.0'		Her	28"	m. buona / buono	debolissima, forse rotonda con Ø sì e no di 30" — 495x.
CGCG 250-35	gx	16h00m43s	+48°33.5'		Her	24"	buona / buono	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di 35"-40" — 400x.
CGCG 250-36	gx	16h00m57s	+45°25.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un tenue nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso S e una più debole a 1' SE — 450x.
CGCG 250-37	gx	16h01m48s	+47°23.3'		Her	28"	m. buona / buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con tenue condensazione centrale — 495x.
CGCG 250-38	gx	16h01m43s	+48°49.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione stellare; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 250-40	gx	16h02m01s	+48°39.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, poco diffusa e condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' scarso NE e un'altra più debole poco più distante a SE — 450x.
CGCG 250-45	gx	06h05m05s	+45°26.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", con bulge evidente anche se poco contrastato; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' E — 450x.
CGCG 250-48	gx	16h11m01s	+49°47.7'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una doppia stretta a 1.5' NW, una debole alla stessa distanza verso N e una appena percettibile quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 250-50	gx	16h13m53s	+48°17.8'		Her	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 251-3	gx	16h15m09s	+46°46.5'		Her	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, appare facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 400x.
CGCG 251-5	gx	16h16m18s	+47°58.9'		Her	28"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E — 495x.
CGCG 251-9	gx	16h20m21s	+49°56.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 251-10	gx	16h21m39s	+49°26.9'		Her	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 251-11	gx	16h22m01s	+49°31.2'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a 1' SE — 450x.
CGCG 251-19	gx	16h27m02s	+49°32.1'		Her	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" con nucleo stellare marcato; c'è una stellina un paio di primi a NW — 495x.
CGCG 251-25	gx	16h32m57s	+50°24.1'		Her	24"	m. buona / discreto	assieme alle due successive fa parte di un terzetto — questa è rotonda con Ø di 45", diffusa e con condensazione quasi stellare abbastanza marcata; c'è una stellina al bordo NE e una molto debole quasi a ridosso SE; ma quest'ultima, da un controllo successivamente effettuato, è risultata essere la PGC 2371774 — 450x.
CGCG 251-26	gx	16h33m14s	+50°23.9'		Her	24"	m. buona / discreto	diffusa, rotonda con Ø simile, ma con basso gradiente di luce — 450x.
CGCG 251-27	gx	16h33m21s	+50°24.4'		Her	24"	m. buona / discreto	È la più debole del terzetto, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 251-33	gx	16h36m06s	+50°24.5'		Her	28"	ottima / buono	debole chiazza diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; situata tra due stelline orientate grosso modo da E a W — 495x.
CGCG 251-36	gx	16h38m37s	+49°08.3'		Her	28"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa e più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 495x.
CGCG 251-39	gx	16h40m59s	+50°30.6'		Her	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 495x.
CGCG 251-42	gx	16h45m03s	+50°49.7'		Her	28"	ottima / buono	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20" o poco più; c'è una coppia di stelline subito a E; una 3a stellina appena percettibile appare solo a momenti a S; un piccolo triangolo isoscele di stelline si trova 2' a NW; la SAO 30073 di magnitudo 8.5, situata 1.5' a SW, disturba un po' l'osservazione — 495x.
CGCG 252-1	gx	16h48m24s	+48°42.5'		Her	28"	ottima / buono	molto piccola e relativamente brillante, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una debole stellina a 1' SSE — 495x.
CGCG 252-15	gx	17h00m36s	+47°15.9'		Her	28"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso SW — 495x.
CGCG 252-16	gx	17h01m29s	+48°25.5'		Her	28"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa e con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 252-17	gx	17h03m06s	+46°22.4'		Her	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina subito a N — 495x.
CGCG 252-23	gx	17h10m58s	+46°24.4'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 252-28	gx	17h13m37s	+49°07.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 252-29	gx	17h14m19s	+45°45.0'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 252-31	gx	17h14m33s	+48°24.0'		Her	24"	buona / buono	molto diffusa e appena più brillante all'interno rotonda con Ø di 35"-40"; c'è una stellina a ridosso SE e un'altra della stella luminosità a 1' verso E; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 252-32	gx	17h15m03s	+47°40.6'		Her	24"	buona / buono	diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 252-33	gx	17h15m15s	+48°27.5'		Her	24"	buona / buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 252-34	gx	17h16m18s	+47°18.2'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 252-36	gx	17h17m37s	+48°38.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 252-37	gx	17h17m56s	+48°28.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	anche questa si presenta relativamente compatta, piccola, rotonda con Ø < 20" e condensata — 450x.
CGCG 252-38	gx	17h18m02s	+50°14.8'		Her	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 252-40	gx	17h19m14s	+48°58.8'		Her	16"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ~ 1' verso NW — 380x.
CGCG 252-42	gx	17h19m14s	+49°58.6'		Her	16"	ottima / ottimo	piccola, rotonda, abbastanza netta ai bordi, con Ø max di 20" o 25" e di luminosità uniforme — 270x.
CGCG 252-43	gx	17h19m31s	+47°42.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole chiazza poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 252-45	gx	17h21m18s	+49°13.6'		Her	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 253-3	gx	17h22m43s	+48°11.6'		Her	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" **[questa è la mia 25-millesima gx osservata]** — 450x.
CGCG 253-7	gx	17h24m39s	+45°29.6'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE (fa parte di una coppia) — 450x.
CGCG 253-8	gx	17h24m39s	+48°20.9'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' verso E — 495x.
CGCG 253-9	gx	17h24m49s	+45°27.4'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare tenue; c'è una stella brillante un paio di primi a WNW e una coppia di stelline alla stessa distanza verso NW — 450x.
CGCG 253-1	gx	17h20m29s	+50°22.6'		Dra	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' NNW (situata sul confine tra Draco ed Ercole) — 495x.
CGCG 253-10	gx	17h24m47s	+45°55.0'		Her	24"	buona / buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 253-11	gx	17h25m45s	+45°30.5'		Her	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
CGCG 253-16	gx	17h34m31s	+47°13.0'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S — 495x.
CGCG 253-17	gx	17h34m33s	+49°59.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stella brillante a 1' SSE — 450x.
CGCG 253-18	gx	17h34m33s	+50°15.6'		Her	28"	ottima / m. buono	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e un piccolo nucleo evidente; c'è una stellina a 1' NNE — 495x.
CGCG 253-19	gx	17h34m54s	+50°45.3'		Dra	28"	m. buona / buono	piccola, relativamente compatta e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 253-21	gx	17h37m32s	+46°18.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 253-22	gx	17h37m29s	+48°58.1'		Her	28"	ottima / ottimo	debole chiazza circolare molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo S — 495x.
CGCG 253-23	gx	17h37m43s	+46°23.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 253-26	gx	17h39m31s	+48°21.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	anche questa è relativamente facile, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 253-30	gx	17h43m29s	+49°05.9'		Her	28"	ottima / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 253-31	gx	17h43m49s	+48°02.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NW; la SAO 46915 di 9ª grandezza si trova a poco più di 2' NW — 450x.
CGCG 253-35	gx	17h47m11s	+45°01.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 253-36	gx	17h47m18s	+45°42.5'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 253-37	gx	17h50m53s	+47°11.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge evidente — 450x.
CGCG 253-38	gx	17h51m53s	+49°32.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 253-39	gx	17h52m40s	+44°59.0'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola e debole chiazza diffusa e rotondeggiante con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; aggetta a S di una stellina abbastanza brillante, la più luminosa di un piccolo triangolo rettangolo isoscele — 495x.
CGCG 254-3	gx	17h57m32s	+45°15.7'		Her	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, piccola, diffusa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale evidente; situata a ridosso SW di una stellina — 495x.
CGCG 254-5	gx	17h57m42s	+45°08.3'		Her	28"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con **MAC 1757+4507** situata a ridosso S — sono entrambe molto deboli, allungate da E a W con dimensioni 30"×15"; la MAC presenta un nucleo puntiforme — 495x.
CGCG 254-8	gx	18h00m40s	+48°13.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 254-9	gx	18h01m49s	+45°18.7'		Her	24"	m. buona / buono	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con piccolo bulge evidente c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 254-10	gx	18h02m03s	+45°17.5'		Her	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con una coppia di stelline a NW — 450x.
CGCG 254-14	gx	18h04m59s	+45°27.6'		Her	28"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **MAC 1804+4527** situata a ridosso N — le 2 gx sono entrambe molto deboli, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi; la coppia si trova in mezzo a 2 stelline distanti 1' in direzione E-W; la MAC presenta una condensazione stellare, mentre la CGCG è di aspetto più uniforme — 495x.
CGCG 254-19	gx	18h08m46s	+46°50.0'		Her	24"	ottima / ottimo	debole e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso S; situata in mezzo a due deboli stelline orientate da N a S e distanti 1.5'; una 3ª stellina molto debole si trova a ridosso SE; l'orientamento della gx si apprezza meglio scalando a 340x. Un piccolo oggetto sfocato esteso sì e no 10" appare facilmente subito a NE e si tratta in effetti di **PGC 2288073**.
CGCG 254-24	gx	18h13m24s	+46°07.4'		Her	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra due stelline orientate da N a S e distanti poco più di 1' — 450x.
CGCG 254-34	gx	18h20m31s	+47°34.7'		Dra	24"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata a ridosso SE di un piccolo triangolo isoscele di stelline — 450x.
CGCG 254-35	gx	18h21m39s	+48°24.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina al bordo NW, mentre una brillante si trova a 1' verso N — 450x.
CGCG 254-37	gx	18h22m44s	+47°37.1'		Dra	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a ridosso W; una coppia di stelline si trova 1' a SE — 450x.
CGCG 254-38	gx	18h23m58s	+48°34.7'		Dra	28"	ottima / ottimo	diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina subito a E e una abbastanza brillante a 1' SW — 495x.
CGCG 255-3	gx	18h30m39s	+48°18.5'		Dra	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20" e con tenue bulge abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso W; non bisogna scendere sotto i 450x, perché la visione è molto disturbata dalla SAO 47554 di 8ª grandezza situata ad appena 1' SW.
CGCG 255-4	gx	18h33m37s	+48°14.2'		Dra	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' SW; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 255-5	gx	18h33m42s	+48°17.6'		Dra	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 255-10	gx	18h42m20s	+46°06.3'		Lyr	28"	ottima / ottimo	debole chiazza circolare con Ø di una 40-ina di secondi e molto stemperata sul fondo cielo; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE e una appena percettibile al margine SE; una 3ª stellina si trova subito a NE — 495x.
CGCG 255-15	gx	18h47m27s	+50°24.6'		Dra	28"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso SW e una poco più evidente e più distante a NW; una coppia di stelle brillanti a E ne disturbano un po' l'osservazione — 495x.
CGCG 255-16	gx	18h47m30s	+50°23.3'		Dra	28"	m. buona / buono	relativamente brillante, piccola diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata e quasi equidistante con due stelle brillanti a NNE (situata poco più di 1' a S della precedente) — 495x.
CGCG 255-20	gx	18h56m33s	+51°00.9'		Dra	28"	m. buona / buono	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 495x.
CGCG 255-24	gx	19h00m48s	+50°52.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 255-26	gx	19h03m31s	+50°46.7'		Dra	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 495x.
CGCG 255-27	gx	19h04m37s	+49°38.5'		Dra	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 256-1	gx	19h03m29s	+45°36.8'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; situata al vertice meridionale di un piccolo quadrato formato con 3 stelline — 450x.
CGCG 256-5	gx	19h07m03s	+46°10.7'		Lyr	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare a momenti rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; equidistante e quasi allineata con due stelle brillanti a N (fanno parte di un triangolo isoscele molto aperto orientato da N a S con componenti della stessa luminosità) — 450x.
CGCG 256-9	gx	19h12m19s	+46°15.1'		Lyr	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W (fa parte di un piccolo pentagono quasi regolare: la componente di SE è una doppia molto stretta e sbilanciata) — 450x.
CGCG 256-10	gx	19h13m13s	+45°19.3'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità pressoché uniforme; 2 deboli stelline si trovano a ridosso N e NW — 495x.
CGCG 256-11	gx	19h13m43s	+45°49.1'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 256-14	gx	19h17m47s	+46°49.3'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; ci sono 2 stelline molto deboli a ridosso E e NE e 2 appena percettibili al bordo S e a ridosso SW — 495x.
CGCG 256-15	gx	19h37m39s	+50°39.4'		Cyg	28"	ottima / m. buono	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare molto tenue — 495x.
CGCG 256-20	gx	19h34m08s	+49°16.2'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata; c'è una doppia serrata a ridosso NW (meglio comunque tenere fuori campo la SAO 48589 di 6ª grandezza situata 4' a W) — 495x.
CGCG 257-1	gx	19h39m25s	+50°52.4'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	piccola, debolissima, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SE — 450x.
CGCG 257-2	gx	19h39m57s	+50°55.5'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 257-3	gx	19h40m46s	+50°53.4'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 257-5	gx	19h41m40s	+50°18.3'		Cyg	28"	buona / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge diffuso abbastanza contrastato; c'è una coppia di stelline a ridosso NW — 495x.
CGCG 257-7	gx	19h41m46s	+50°35.7'		Cyg	28"	buona / ottimo	poco più debole di UGC 11465 — osservata subito prima — dalla quale dista un paio di primi verso S, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare — 495x.
CGCG 257-10	gx	19h43m39s	+50°32.5'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo meridionale — 450x.
CGCG 257-23	gx	19h56m55s	+50°10.0'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 257-25	gx	19h57m17s	+50°21.9'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è un minuscolo gruppetto foggiato a "Y" a ridosso SE (la componente più a E è abbastanza brillante) — 495x.
CGCG 257-26	gx	19h57m28s	+50°25.2'		Cyg	28"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 257-28	gx	19h59m04s	+50°47.5'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 257-29	gx	19h59m04s	+50°48.2'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	poco più debole e più piccola della precedente, rotonda con Ø di 20"; c'è una stellina al bordo S e una più evidente a ridosso verso E — 450x.
CGCG 257-30	gx	19h59m35s	+50°28.3'		Cyg	28"	buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a ridosso NW — 495x.
CGCG 257-32	gx	19h59m50s	+50°29.0'		Cyg	28"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W — 495x.
CGCG 257-33	gx	20h01m05s	+51°01.2'		Cyg	28"	buona / ottimo	debole, diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge oblungo abbastanza evidente; c'è una stellina al bordo NE (la più meridionale di una piccola losanga a 4 componenti orientata come la gx); una debole stellina si trova al bordo S — 495x.
CGCG 257-36	gx	20h08m20s	+50°40.7'		Cyg	28"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole al bordo SW e una poco più evidente a ridosso W — 495x.
CGCG 258-1	gx	05h11m20s	+51°32.0'		Aur	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20".
CGCG 258-3	gx	05h13m04s	+52°13.8'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; situata al vertice meridionale di un piccolo triangolo equilatero formato con due stelline a N e NW — 450x.
CGCG 258-5	gx	05h16m03s	+51°47.2'		Aur	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia dalle componenti brillanti a 2' NW — 450x.
CGCG 258-6	gx	05h16m54s	+53°11.5'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; la SAO 25110 di 8a grandezza situata 2.5' a E disturba un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 258-8	gx	05h22m36s	+51°22.4'		Aur	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente in visione distolta, ma soltanto a 450x; non ne capisco la forma, ma dovrebbe essere estesa una 20-ina di secondi.
CGCG 260-4	gx	06h16m09s	+54°32.1'		Aur	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, grosso modo circolare con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a 1' verso N — 270x.
CGCG 260-20	gx	06h37m20s	+56°22.7'		Lyn	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline molto deboli a SE — 450x.
CGCG 260-22	gx	06h38m45s	+53°21.3'		Lyn	24"	ottima / buono	piccola e relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 260-37	gx	06h48m36s	+51°50.5'		Lyn	24"	ottima / buono	molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 260-40	gx	06h52m44s	+55°35.7'		Lyn	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 261-17	gx	07h03m59s	+56°29.2'		Lyn	24"	ottima / buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da ENE a WSW con dimensioni grosso modo di 60"×20"; meglio tuttavia non scalare gli ingrandimenti — 450x.
CGCG 261-22	gx	07h05m33s	+54°04.6'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 30"-40" verso S — 380x.
CGCG 261-42	gx	07h16m10s	+56°49.4'		Lyn	24"	ottima / buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni poco superiori a 20"×10" (è situata 1' a E di UGC 3765) — 450x.
CGCG 261-45	gx	07h19m02s	+52°52.6'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debolissima, ma in visione distolta, osservando a 380x, appare a tratti allungata ~ da N a S con dimensioni 40"×20".
CGCG 261-65	gx	07h25m19s	+55°30.6'		Lyn	24"	ottima / buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
CGCG 262-2	gx	07h27m46s	+53°04.7'		Lyn	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 262-3	gx	07h28m08s	+52°28.3'		Lyn	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, piccola, abbastanza compatta, condensata e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; è rotonda con Ø di 25"-30"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline orientate da N a S.
CGCG 262-9	gx	07h34m43s	+54°49.5'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, ma individuabile senza problemi in visione distolta a 380x; è di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina percettibile solo a tratti a ridosso verso E.
CGCG 262-15	gx	07h39m28s	+55°33.0'		Lyn	28"	buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; in visione distolta appare una stellina molto debole e appena diffusa a ridosso E, ma questa è in realtà la **2MASS 07392934+5532582** con la quale forma una coppia serrata interagente — 495x.
CGCG 262-26	gx	07h46m15s	+53°46.0'		Lyn	16"	ottima / buono	è un ovale di 45"×30", orientato da E a W, diffuso e con condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 262-35	gx	07h50m16s	+55°24.5'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debole e di luminosità pressoché uniforme; in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni di 40"×20" — 380x.
CGCG 262-38	gx	07h51m51s	+55°05.3'		Lyn	16"	ottima / buono	chiazza rotonda molto debole, di luminosità uniforme e Ø di ~ 1'; meglio visibile a 270x.
CGCG 262-47	gx	07h54m46s	+55°32.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	è debolissima, ma è stranamente più visibile di NGC 2457 dalla quale dista poco più di 1' verso W; è approssim. circolare e di Ø simile — 270x.
CGCG 262-53	gx	07h58m46s	+50°27.6'		Lyn	16"	ottima / m. buono	piccola e debolissima gx che tuttavia a 380x, in visione distolta, appare a tratti allungata da N a S con dimensioni ~ 30"×20".
CGCG 262-56	gx	08h00m53s	+55°33.8'		Lyn	16"	ottima / buono	è ancora più debole di CGCG 262-59, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, probabilmente rotonda con Ø di ~ 30" e di luminosità uniforme.
CGCG 262-59	gx	08h01m29s	+55°36.0'		Lyn	16"	ottima / buono	molto debole, rotonda, appena più brillante all'interno con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 263-1	gx	08h04m13s	+55°23.9'		Lyn	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale osservabile a 380x.
CGCG 263-2	gx	08h04m35s	+55°32.6'		Lyn	16"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, di dimensioni max 20"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è disturbata dalla SAO 26651 di 7.7 situata a soli 4' verso SE.

CGCG 263-17	gx	08h13m14s	+52°27.5'		Lyn	16"	ottima / buono	debole bolla circolare di luminosità uniforme, molto diffusa e con Ø di 45"; appare poco più contrastata sul fondo cielo scendendo a 270x.
CGCG 263-22	gx	08h19m25s	+55°05.8'		Lyn	28"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso S — 495x.
CGCG 263-23	gx	08h20m21s	+54°08.4'		Lyn	16"	ottima / buono	debole, ma si vede facilmente a 380x, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso del bordo meridionale.
CGCG 263-26	gx	08h21m33s	+55°09.1'		Lyn	28"	buona / buono	molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 495x.
CGCG 263-27	gx	08h21m49s	+56°17.4'		Lyn	16"	ottima / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 263-31	gx	08h27m31s	+54°54.3'		Lyn	16"	ottima / buono	debole, rotonda, poco diffusa e poco più brillante all'interno; tuttavia a 380x sembra di aspetto un po' irregolare (ossia non perfettamente rotonda); forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline situate a N e NW.
CGCG 263-34	gx	08h28m06s	+55°05.9'		Lyn	16"	ottima / buono	piccolo oggetto rotondo relativamente compatto, con Ø di ~ 20" e facilmente visibile a 380x.
CGCG 263-36	gx	08h29m21s	+55°31.1'		Lyn	16"	ottima / buono	piccola gx relativamente compatta, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e facilmente visibile a 380x; forma una coppia ravvicinata con UGC 4427 situata 1' a W.
CGCG 263-38	gx	08h29m28s	+55°00.9'		Lyn	16"	ottima / buono	debole, rotonda, di luminosità pressoché uniforme, diffusa e con Ø < 1' — 380x.
CGCG 263-43	gx	08h32m28s	+52°36.4'		Lyn	16"	ottima / buono	rotonda, poco diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare visibile a 380x.
CGCG 263-44	gx	08h32m43s	+52°26.5'		Lyn	16"	ottima / buono	allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" con nucleo stellare osservabile a 380x.
CGCG 263-78	gx	08h44m25s	+55°01.5'		UMa	16"	ottima / buono	fa parte di un quintetto assieme a CGCG 263-80, CGCG 263-82, UGC 4564 e MCG+9-15-13 — è un piccolo oggetto rotondo di 15"-20" di Ø che salta fuori facilmente in visione distolta a 380x quando si osserva la successiva, dalla quale dista 2' a W.
CGCG 263-80	gx	08h44m38s	+55°01.1'		UMa	16"	ottima / buono	fa parte di un quintetto assieme a CGCG 263-78, CGCG 263-82, UGC 4564 e MCG+9-15-13 — presenta un piccolo nucleo abbastanza marcato circonfuso da un alone rotondo con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 263-82	gx	08h45m09s	+54°58.7'		UMa	16"	ottima / buono	fa parte di un quintetto assieme a CGCG 263-78, CGCG 263-80, UGC 4564 e MCG+9-15-13 — relativamente facile in visione distolta a 380x, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' NW.
CGCG 264-27	gx	13h14m08s	+62°12.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta a 380x a ridosso verso W di una stellina; è estesa non più di 20" o 30".
CGCG 264-89	gx	09h16m43s	+53°31.0'		UMa	16"	m. buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; si trova a poco più di 1' S (o SW) di una stellina brillante — 270x.
CGCG 265-8	gx	09h22m29s	+50°25.8'		UMa	16"	m. buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, con bulge poco più brillante, rotondo che pare una stellina sfocata di 10"-15" di Ø sovrapposta alla gx — 270x.
CGCG 265-16	gx	09h25m25s	+50°24.1'		UMa	16"	m. buona / m. buono	piccola, compatta, relativamente brillante, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 270x.
CGCG 265-17	gx	09h26m05s	+50°26.3'		UMa	16"	m. buona / m. buono	in visione diretta sembra a prima vista una stellina appena sfuocata, mentre in visione distolta appare un alone molto tenue e piccolo, rotondo con Ø di 25"-30" — 270x.
CGCG 265-35	gx	09h46m45s	+54°25.6'		UMa	16"	ottima / m. buono	fa parte, assieme alle tre successive e a MCG+9-16-50, di un quintetto di galassiette molto deboli — poco meno evidente della seconda elencata e più piccola, con Ø di 25" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 265-36	gx	09h46m53s	+54°26.7'		UMa	16"	ottima / m. buono	fa parte, assieme alla precedente, alle due successive e a MCG+9-16-50, di un quintetto di galassiette molto deboli di cui rappresenta il membro più evidente: è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 380x.
CGCG 265-37	gx	09h47m06s	+54°18.7'		UMa	16"	ottima / m. buono	fa parte, assieme alle due precedenti, alla successiva e a MCG+9-16-50, di un quintetto di galassiette molto deboli, di cui rappresenta il membro più debole: di fatto è quasi elusiva, appare solo in visione distolta ed estesa max 20" — 380x.
CGCG 265-40	gx	09h47m22s	+54°28.4'		UMa	16"	ottima / m. buono	fa parte, assieme alle tre precedenti e a MCG+9-16-50, di un quintetto di galassiette molto deboli —molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 25"-30" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 265-43	gx	09h48m23s	+54°00.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima, quasi elusiva, piccola, con Ø max 20"; salta fuori solo a tratti in visione distolta a 380x.
CGCG 266-7	gx	10h01m14s	+55°43.0'		UMa	16"	m. buona / buono	molto debole, ma visibile senza problemi in visione distolta a 270x, diffusa con dimensioni di ~ 40"; è ubicata 3' o 4' E di una stellina doppia con componenti separate da una 30-ina di secondi; è talvolta riportata come MCG+9-17-9 (situata 6.5' NW di NGC 3079) — 270x.
CGCG 267-8	gx	10h44m19s	+52°46.2'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo abbastanza marcato di aspetto quasi stellare — 380x.
CGCG 267-10	gx	10h46m16s	+51°04.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso S e una debole a ridosso SE; un minuscolo triangolo di deboli stelline si trova un paio di primi verso E — 495x.
CGCG 267-17	gx	10h49m58s	+51°52.2'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccola, debole, piccola e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 20"×15" e con tenue condensazione centrale — 495x.
CGCG 267-25	gx	10h54m07s	+53°01.8'		UMa	16"	ottima / ottimo	è debolissima, ma in visione distolta appare subito allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 267-49	gx	11h11m46s	+52°07.0'		UMa	24"	buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; non sembra particolarmente disturbata dalla SAO 27943 di 8ª situata a poco più di 1' SSW — 450x.
CGCG 268-3	gx	11h13m13s	+55°33.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina subito a E — 495x.
CGCG 268-6	gx	11h14m06s	+55°42.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 495x.
CGCG 268-7	gx	11h14m56s	+50°20.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale — 495x.
CGCG 268-23	gx	11h21m57s	+52°57.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un asterismo irregolare di 5 stelle brillanti a una 10-ina di primi verso S — 495x.
CGCG 268-27	gx	11h22m50s	+51°12.5'		UMa	28"	ottima / m. buono	poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" e poco più brillante all'interno; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 495x.
CGCG 268-31	gx	11h24m01s	+55°57.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, ma con nucleo stellare evidente, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NE — 495x.
CGCG 268-32	gx	11h24m25s	+51°14.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di 45" e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina subito a E — 495x.
CGCG 268-33	gx	11h25m32s	+51°10.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina al bordo SW; qualcosa simile a una stellina appena percettibile appare a tratti a ridosso S, ma si tratta in realtà di **2MASS 11253305+5110202** — 495x.
CGCG 268-34	gx	11h26m11s	+52°07.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante, compatta, rotonda con Ø di ~ 40"; a 380x non è particolarmente disturbata dalla luce della stella di 7ª situata 2' a W.
CGCG 268-42	gx	11h29m58s	+52°11.0'		UMa	16"	m. buona / buono	molto debole e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 268-43	gx	11h30m31s	+51°27.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente compatta, forse leggermente allungata da N a S con dimensioni 50"×40" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 268-47	gx	11h32m44s	+54°55.6'		UMa	16"	m. buona / discreto	rotonda, diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi, con condensazione centrale abbastanza marcata di aspetto quasi stellare — 270x.
CGCG 268-54	gx	11h35m04s	+54°39.6'		UMa	16"	ottimo/ scarso	è un piccolo oggetto molto debole, rotondo e con Ø di una 30-ina di secondi — 188x.
CGCG 268-61	gx	11h36m03s	+55°04.5'		UMa	16"	ottimo/ scarso	molto debole, ma ciò nonostante si individua con facilità; è piccola, poco diffusa, di dimensioni di ~ 30", e condensazione centrale appena evidente — 188x.
CGCG 268-72	gx	11h42m24s	+54°46.5'		UMa	16"	m. buona / discreto	più debole e diffusa di MCG+9-19-160, dalla quale dista 2.5' a S, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 270x.
CGCG 268-75	gx	11h43m46s	+55°02.8'		UMa	16"	m. buona / buono	debole, circolare, relativamente compatta, poco più brillante all'interno e con Ø max di 30" — 270x.
CGCG 269-48	gx	12h15m45s	+54°51.5'		UMa	16"	ottimo/ scarso	debole, ma relativamente facile da individuare; è orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 188x.
CGCG 270-8	gx	12h31m52s	+52°24.0'		UMa	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N (fa parte di un piccolo trapezio molto aperto di 4 componenti equidistanti tra loro: quella più a E è la più debole) — 495x.
CGCG 270-20	gx	12h46m27s	+50°47.5'		Cvn	24"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 270-24	gx	12h48m09s	+54°01.4'		UMa	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 40" — 450x.
CGCG 270-47	gx	13h05m03s	+53°39.2'		UMa	16"	buona / buono	debole, poco diffusa, rotonda, di una 30-ina di secondi di Ø e con nucleo stellare visibile a tratti; forma un piccolo triangolo isoscele ottusangolo con 2 stelline a SW — 380x.
CGCG 270-52	gx	13h06m06s	+53°36.8'		UMa	16"	buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare subito allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 271-12	gx	13h07m41s	+53°06.6'		UMa	28"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 271-14	gx	13h08m02s	+53°56.1'		UMa	28"	m. buona / buono	anche questa è relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale molto tenue — 495x.
CGCG 271-16	gx	13h08m33s	+54°49.9'		UMa	28"	m. buona / buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' verso E — 495x.
CGCG 271-17	gx	13h08m42s	+52°01.0'		Cvn	24"	buona / ottimo	relativamente brillante, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 271-26	gx	13h14m46s	+53°49.2'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20", con bulge contrastato e un nucleo stellare evidente; poco disturbata dalla SAO 28684 di 9ª grandezza situata 2.5' a W — 450x.
CGCG 271-30	gx	13h18m16s	+53°57.9'		UMa	28"	m. buona / buono	poco più evidente ed estesa della successiva (osservata per prima), poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e una condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' SE — 495x.
CGCG 271-31	gx	13h18m30s	+54°04.0'		UMa	28"	m. buona / buono	molto diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S — 495x.
CGCG 271-38	gx	13h24m38s	+52°57.5'		UMa	28"	m. buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso NE — 495x.
CGCG 272-18	gx	04h01m16s	+54°25.1'		UMa	24"	buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da E a W di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge evidente e contrastato — 450x.
CGCG 272-32	gx	14h07m39s	+54°47.7'		Boo	24"	buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 272-37	gx	14h10m01s	+54°52.9'		Boo	24"	buona / m. buono	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare evidente; situata tra due deboli stelline orientate da N a S — 450x.
CGCG 273-3	gx	14h21m37s	+50°23.4'		Boo	16"	m. buona / discreto	molto debole, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme (c'è da dire che al momento dell'osservazione era molto bassa) — 270x.
CGCG 273-12	gx	14h33m06s	+53°15.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole e diffusa, con piccola condensazione centrale poco contrastata, rotonda con Ø di 45"; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 273-13	gx	14h33m10s	+53°14.0'		Boo	24"	ottima / ottimo	poco più evidente di CGCG 273-12, dalla quale dista un paio di primi a S, di Ø simile, ma con condensazione centrale più estesa e maggiormente contrastata; anche questa è poco meglio definita scalando a 340x; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso S.
CGCG 273-18	gx	14h39m46s	+51°19.0'		Boo	28"	m. buona / m. buono	piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, ma è molto disturbata dalla SAO 29231 di grandezza 11.8 situata a ridosso NW — 495x.
CGCG 273-20	gx	14h38m38s	+54°16.7'		Boo	28"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare evidente — 495x.
CGCG 273-26	gx	14h45m45s	+51°34.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 274-11	gx	15h04m40s	+54°42.8'		Dra	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 45", molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno (a 495x l'unico utile riferimento è una stellina di 12-esima grandezza situata 5' a SW). Un piccolo oggetto debolissimo appare solo a momenti subito a SW: si tratta di **MAC 1504+5442**, ma non riesco a capirne la forma.
CGCG 274-19	gx	15h07m57s	+52°31.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e appena più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 274-24	gx	15h08m40s	+52°27.2'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 274-26	gx	15h08m57s	+52°26.8'		Boo	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 274-30	gx	15h10m57s	+52°27.5'		Boo	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge appena percettibile; c'è una stellina a 1' scarso NW — 495x.
CGCG 274-31	gx	15h11m03s	+52°0.0'		Boo	28"	m. buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina subito a SE e una poco più debole a 1' verso E — 495x.
CGCG 274-32	gx	15h11m01s	+52°33.5'		Boo	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e appena più evidente all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 274-45	gx	15h28m04s	+55°32.7'		Dra	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 275-6	gx	15h48m07s	+55°43.1'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; 3 stelline brillanti allineate ed equidistanti si trovano a S della gx — 495x.
CGCG 275-14	gx	15h54m45s	+53°08.7'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una "coroncina" di 4 stelline a N — 495x.
CGCG 275-15	gx	15h55m11s	+52°10.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e con gradiente di luce molto basso; c'è una stellina subito a SSE (il campo è punteggiato di stelline brillanti) — 495x.
CGCG 275-19	gx	16h00m24s	+52°54.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso verso E; una più evidente si trova subito a SW — 495x.
CGCG 275-21	gx	16h05m49s	+55°21.9'		Dra	16"	buona / mediocre	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda, con Ø di ~ 20" e con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti; è situata a ridosso SW di una stellina (la più meridionale e la più brillante di 3 stelline allineate in direzione NNW-SSE) — 270x.
CGCG 275-22	gx	16h05m49s	+55°16.3'		Dra	16"	buona / mediocre	è un debole lucore approssim. rotondo con Ø di ~ 40", di luminosità uniforme e con bassissima luminanza superficiale; è situato 1' NW di una stellina brillante — 270x.
CGCG 275-28	gx	16h11m23s	+52°27.3'		Dra	28"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e con evidente condensazione centrale, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 276-4	gx	16h14m57s	+55°52.4'		Dra	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' ENE — 495x.
CGCG 276-6	gx	16h15m46s	+54°40.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; è situata all'interno di un piccolo asterismo di 6 o 7 stelline piuttosto deboli — 450x.
CGCG 276-8	gx	16h17m49s	+52°12.1'		Dra	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 276-14	gx	16h23m18s	+55°45.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 276-16	gx	16h24m33s	+55°54.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo puntiforme — 450x.
CGCG 276-17	gx	16h24m34s	+55°59.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare appena evidente — 450x.
CGCG 276-23	gx	16h29m26s	+55°29.3'		Dra	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; un nodulo stellare appare a momenti, ma anche spingendo a 580x non riesco a capire se appartiene alla gx o se si tratta di una stellina sovrapposta.
CGCG 276-25	gx	16h33m02s	+53°12.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 276-30	gx	16h35m18s	+55°38.0'		Dra	28"	ottima / buono	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" o poco più — 495x.
CGCG 276-32	gx	16h36m48s	+55°44.2'		Dra	28"	ottima / buono	relativamente compatta e poco più brillanti all'interno, rotonda con Ø < 30" — 495x.
CGCG 276-35	gx	16h39m00s	+51°30.5'		Dra	28"	ottima / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
CGCG 276-37	gx	16h42m03s	+51°30.9'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 12" o 15" — 495x.
CGCG 276-38	gx	16h42m52s	+51°33.9'		Dra	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; allineata ed equidistante con 2 stelline a SSW — 495x.
CGCG 276-40	gx	16h44m16s	+51°30.1'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debole chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, orientata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SE — 495x.
CGCG 276-43	gx	16h47m39s	+53°49.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una coppia di stelline sbilanciate in luminosità quasi a ridosso verso S; a S di questa ci sono 3 stelline allineate in direzione N-S — 495x.
CGCG 276-44	gx	16h47m27s	+56°45.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SE; allineata, ma non equidistante con due stelle brillanti a W (fanno parte di un piccolo triangolo isoscele molto aperto: la componente più a S è la più debole) — 495x.
CGCG 276-45	gx	16h49m11s	+53°25.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	la componente più facile della stringa di 5 galassiette di cui fa parte MCG-27-91 e successive — è diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata — 450x.
CGCG 276-52	gx	16h50m42s	+53°39.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, di luminosità pressoché uniforme salvo un nucleo stellare visibile solo a momenti , allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 45" verso W — 450x.
CGCG 277-12	gx	16h52m39s	+54°50.0'		Dra	28"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale — 495x.
CGCG 277-14	gx	16h53m03s	+54°49.9'		Dra	28"	ottima / buono	poco più brillante della precedente, dalla quale dista 3.5' verso W, e con condensazione centrale più evidente, rotonda con Ø simile; c'è una stellina appena percettibile al bordo N — 495x.
CGCG 277-20	gx	17h00m53s	+55°06.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 495x.
CGCG 277-22	gx	17h03m29s	+55°08.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge abbastanza contrastato di aspetto quasi stellare — 450x.
CGCG 277-26	gx	17h06m43s	+52°06.7'		Dra	28"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue nucleo stellare; allineata ed equidistante con 2 stelline a SSE (quella più a S è molto debole) — 495x.
CGCG 277-27	gx	17h09m53s	+55°40.0'		Dra	28"	ottima / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 277-31	gx	17h14m47s	+52°23.3'		Dra	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile subito a W — 495x.
CGCG 277-32	gx	17h15m32s	+52°18.4'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; allineata ed equidistante con due stelline a S — 495x.
CGCG 277-33	gx	17h15m45s	+52°50.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 277-37	gx	17h20m41s	+51°53.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina appena percettibile subito a W; un altro oggetto debolissimo molto piccolo appare un paio di primi a NE: si tratta di **PGC 2402514** — 495x.
CGCG 277-41	gx	17h24m09s	+53°28.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; situata tra due deboli stelline orientate da E a W — 495x.
CGCG 278-10	gx	17h37m04s	+54°13.2'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con MCG+9-29-12, molto debole, piccola, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme — 495x.
CGCG 278-11	gx	17h37m00s	+55°00.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N — 495x.
CGCG 278-13	gx	17h37m52s	+54°03.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia sbilanciata di stelline a 1' E e un'altra più o meno alla stessa distanza NNE — 495x.
CGCG 278-15	gx	17h40m16s	+51°03.4'		Dra	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 495x.
CGCG 278-16	gx	17h40m41s	+51°10.9'		Dra	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è un nodulo (o una stellina) appena percettibile verso la parte meridionale della gx — 495x.
CGCG 278-21	gx	17h44m27s	+55°49.7'		Dra	28"	ottima / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W; situata tra due stelline orientate da N a S e distanti un paio di primi — 495x.
CGCG 278-22	gx	17h44m38s	+56°29.8'		Dra	28"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' scarso NW — 495x.
CGCG 278-27	gx	17h47m05s	+54°52.9'		Dra	24"	ottima / m. buono	debole chiazza circolare molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45" — 450x.
CGCG 278-28	gx	17h47m38s	+51°26.0'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' S e una poco più brillante a 1.5 NNW — 450x.
CGCG 278-34	gx	17h49m32s	+55°30.5'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline a NW distanti una 30-ina di secondi e orientate come la gx — 495x.
CGCG 278-37	gx	17h51m04s	+51°01.4'		Dra	28"	ottima / buono	diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale contrastata; c'è una stellina a 1' SE; una stella brillante di 10ª grandezza si trova a 1.5' verso S — 495x.
CGCG 278-38	gx	17h52m06s	+52°26.8'		Dra	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da WNW a ESE, di dimensioni 50"×25" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE — 495x.
CGCG 278-39	gx	17h56m51s	+54°23.8'		Dra	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso NE — 495x.
CGCG 278-41	gx	17h57m44s	+54°26.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 495x.
CGCG 278-43	gx	17h59m42s	+52°22.6'		Dra	28"	ottima / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 2 stelline a ridosso E e S (quest'ultima è più evidente) — 495x.
CGCG 279-3	gx	18h10m22s	+54°13.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; poco disturbata dalla SAO 30784 di 6a grandezza situata a meno di 4' NNE — 450x.
CGCG 279-6	gx	18h15m43s	+51°47.2'		Dra	28"	ottima / m. buono	relativamente facile, ma molto disturbata da una stellina brillante a ridosso SW che ne confonde un po' la forma; poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge evidente — 495x.
CGCG 279-10	gx	18h22m51s	+51°19.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; stellina quasi a ridosso W. C'è un asterismo disperso e di forma vagamente triangolare formato da 6 stelle brillanti a S della gx: la componente centrale (quella più a N) è una doppia stretta — 495x.
CGCG 279-18	gx	18h35m57s	+51°26.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	è un debolissimo lucore di forma indistinta esteso una 20-ina di secondi che aggetta a SE di una stellina — 450x.
CGCG 279-20	gx	18h36m27s	+53°50.5'		Dra	28"	ottima / m. buono	poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 495x.
CGCG 280-5	gx	18h50m57s	+55°45.6'		Dra	28"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; forma una coppia serrata con **MAC 1850+5545** situata quasi a ridosso a SW; quest'ultima è molto piccola, estesa sì e no una 10-ina di secondi e appare solo a tratti in visione distolta — 495x.
CGCG 280-6	gx	18h52m00s	+55°43.5'		Dra	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline a 1' verso E, mentre una stellina si trova subito a SW — 495x.
CGCG 280-7	gx	18h53m32s	+55°22.7'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; equidistante, ma non proprio allineata, con 2 deboli stelline a N — 495x.
CGCG 280-12	gx	18h57m07s	+51°08.9'		Dra	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e a tratti condensata, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40"; c'è una debole stellina a 1' S e una appena percettibile quasi a ridosso verso N — 495x.
CGCG 280-14	gx	19h08m21s	+52°32.2'		Cyg	28"	ottima / m. buono	piccola, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso SW — 495x.
CGCG 280-15	gx	19h08m29s	+52°13.4'		Cyg	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una coppia di deboli stelline a ridosso E; una stellina abbastanza brillante si trova a 1' NE — 495x.
CGCG 280-16	gx	19h08m33s	+53°21.4'		Cyg	28"	ottima / m. buono	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso poco contrastato — 495x.
CGCG 280-17	gx	19h09m29s	+52°53.6'		Cyg	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e con piccola condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NW e una più debole e poco più distante verso SW — 495x.
CGCG 280-21	gx	19h15m15s	+51°31.2'		Cyg	28"	m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline molto deboli a NW — 495x.
CGCG 280-22	gx	19h15m24s	+51°23.9'		Cyg	28"	m. buona / buono	molto debole e piccola, diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; 3 stelline allineate si protendono a NW (quella più meridionale si trova a ridosso N della gx) — 495x.
CGCG 280-23	gx	19h19m27s	+52°19.9'		Cyg	28"	ottima / m. buono	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di aspetto confuso a causa di una coppia di stelline — la più a N delle quali abbastanza brillante — situate all'interno; una 3a stellina molto debole si trova quasi a ridosso verso E; la gx è estesa 30" o poco più — 495x.
CGCG 280-24	gx	19h20m30s	+54°12.7'		Cyg	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a una 40-ina di secondi verso SW — 495x.
CGCG 281-9	gx	19h44m34s	+52°51.8'		Cyg	28"	buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo S che ne confonde un po' la forma (questa stellina ha una compagna appena percettibile a ridosso W) — 495x.
CGCG 282-3	gx	20h20m35s	+56°15.0'		Cyg	28"	buona / ottimo	è un debole lucore diffuso approssim. rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SW dalla quale sembra a prima vista aggettare; allineata ed equidistante con due deboli stelline a ENE — 495x.
CGCG 284-8	gx	06h15m51s	+61°04.4'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; è poco più evidente a 380x e relativamente facile in visione distolta.
CGCG 285-13	gx	07h02m55s	+62°46.2'		Cam	16"	ottima / m. buono	gx debole e diffusa, ma facilmente visibile a 270x; a 380x pare poco allungata all'incirca da N a S con dimensioni 40"×30"; ci sono 3 stelline allineate e ravvicinate a 1.5' SW.
CGCG 286-13	gx	07h23m04s	+58°05.8'		Lyn	16"	ottima / buono	debole, rotonda, di luminosità pressoché uniforme con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 286-15	gx	07h23m55s	+57°16.9'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø di 35"-40"; c'è una doppia brillante a 1.5' verso S; debole stellina a poco più di 1' NW; meglio osservabile a 270x.
CGCG 286-21	gx	07h28m32s	+57°44.7'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di 30"-35" — 495x.
CGCG 286-25	gx	07h32m28s	+58°13.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 495x.
CGCG 286-26	gx	07h32m33s	+59°20.8'		Lyn	16"	m. buona / buono	debolissima, diffusa, estesa una 30-ina di secondi, osservabile in visione distolta a 380x; c'è una stellina a 1' verso E.
CGCG 286-27	gx	07h32m59s	+58°16.8'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	elusivo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 20-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a 5' NE di CGCG 286-25 — 495x.
CGCG 286-35	gx	07h36m34s	+59°16.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza rotonda assai stemperata sul fondo cielo che a 270x, in visione distolta, appare estesa per ~ 1'.
CGCG 286-38	gx	07h37m16s	+57°35.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole chiazza diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata dalla SAO 26424 di 7ª grandezza situata 3.5' a SW — 495x.
CGCG 286-45	gx	07h39m14s	+59°23.0'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto rotondo molto debole, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 286-70	gx	07h51m12s	+62°04.9'		Cam	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e nucleo quasi stellare molto marcato; c'è una stellina quasi a ridosso SW e un'altra percettibile solo a tratti verso il bordo SE — 380x.
CGCG 286-80	gx	07h57m22s	+62°24.7'		Cam	16"	m. buona / ottimo	debole, di luminosità uniforme, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; solo a tratti sembra di vedere a 380x una condensazione centrale molto tenue.
CGCG 287-2	gx	07h51m31s	+61°53.3'		Cam	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo S; forma una coppia ravvicinata con **MAC 0751+6152**, un piccolo oggetto relativamente compatto esteso una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 287-12	gx	07h57m11s	+61°39.7'		Cam	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina brillante a 1' SE; è situata all'interno di un vasto triangolo equilatero ai cui vertici ci sono coppie di stelline luminose — 450x.
CGCG 287-18	gx	07h58m12s	+59°12.2'		Lyn	28"	m. buona / scarso	relativamente facile, piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 388x.
CGCG 287-23	gx	07h59m51s	+56°54.9'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 287-27	gx	08h01m30s	+56°54.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a ridosso verso S — 495x.
CGCG 287-34	gx	08h02m20s	+56°43.0'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW — 495x.
CGCG 287-35	gx	08h03m49s	+61°17.3'		Cam	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni di 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 287-40	gx	08h06m33s	+61°04.4'		Cam	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 287-44	gx	08h09m20s	+57°50.0'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte del sestetto di NGC 2521 — molto piccola e condensata, rotonda con Ø max di 20" — 380x.
CGCG 287-46	gx	08h09m52s	+57°54.8'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte del sestetto di NGC 2521 — relativamente compatta e facile da vedere, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 380x.
CGCG 287-47	gx	08h10m07s	+57°50.2'		Lyn	16"	m. buona / m. buono	fa parte del sestetto di NGC 2521 — piccola e debolissima, rotonda con Ø di ~ 20"; appare a 380x quasi a ridosso SW di una stellina brillante.
CGCG 287-52	gx	08h12m50s	+57°55.3'		Lyn	16"	ottima / m. buono	abbastanza evidente, piccola, compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 287-53	gx	08h13m17s	+58°00.6'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta a 380x quasi a ridosso di una stellina che si trova a N; non dovrebbe essere più estesa di 20"-25".
CGCG 287-56	gx	08h14m39s	+58°01.4'		Lyn	28"	buona / buono	debole chiazza molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo NE (situata al centro dell'ammasso **AGC 634**) — 495x.
CGCG 287-60	gx	08h15m26s	+58°10.7'		Lyn	16"	ottima / m. buono	è di aspetto simile a CGCG 287-61 (osservata per prima) come dimensioni, ma presenta un piccolo nucleo poco più marcato — 380x.
CGCG 287-61	gx	08h15m39s	+58°17.8'		Lyn	16"	ottima / m. buono	rotonda, diffusa, con Ø di ~ 45" e tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
CGCG 287-64	gx	08h16m05s	+58°00.3'		Lyn	28"	buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso N e un'altra a 1' N con le quali è allineata (situata verso il margine orientale dell'ammasso **AGC 634**) — 495x.
CGCG 287-67	gx	08h18m11s	+57°45.5'		Lyn	28"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 287-72	gx	08h20m46s	+56°29.5'		Lyn	28"	buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1.5' SE — 495x.
CGCG 287-78	gx	08h32m58s	+61°48.2'		UMa	16"	ottima / buono	è molto debole e diffusa, probabilmente rotonda con Ø di ~ 45"; meglio scendere a 270x, perché a 380x il campo è virtualmente depleto (e diventa difficilissimo orientarsi).
CGCG 288-2	gx	08h38m37s	+61°26.6'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 288-27	gx	09h13m05s	+60°14.7'		UMa	16"	ottima / buono	debolissimo oggetto rotondo, diffuso, con Ø di ~ 30" e appena più brillante al centro; c'è una stellina a 1.5' verso N; si vede con molta difficoltà a 380x, perché il campo è depleto.
CGCG 290-16	gx	10h13m39s	+59°26.1'		UMa	16"	ottima / buono	presenta un nucleo stellare abbastanza marcata circonfuso da un tenue alone diffuso, forse rotondo con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 290-21	gx	10h16m18s	+60°18.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una coppia di stelline brillanti situate rispettivamente a W e WSW, la più luminosa delle quali ad appena 1' W della gx — 450x.
CGCG 290-31	gx	10h22m25s	+57°02.2'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, solo a momenti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 290-35	gx	10h24m05s	+57°59.5'		UMa	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 290-38	gx	10h25m35s	+57°08.1'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 290-39	gx	10h26m17s	+57°17.6'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a meno di 1' verso E — 450x.
CGCG 290-49	gx	10h33m28s	+57°03.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso E — 495x.
CGCG 290-51	gx	10h33m51s	+57°03.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e una piccola condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a ridosso SE; una abbastanza brillante si trova a poco più di 1' verso NE; tra quest'ultima e la gx si nota un piccolo oggetto diffuso, rotondo con Ø di 10"-12" che è risultato essere la **PGC 2800959** — 495x.
CGCG 290-53	gx	10h34m10s	+61°36.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	è di Ø analogo a CGCG 290-54 (osservata per prima), ma più debole e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 290-54	gx	10h34m14s	+61°38.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo, relativamente compatto con Ø di una 20-ina di secondi con nucleo stellare; è situata tra 2 stelline: una brillante a S e una più debole a N — 380x.
CGCG 290-63	gx	10h42m50s	+60°19.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 290-67	gx	10h44m38s	+56°22.2'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole ovale a basso gradiente di luce, orientato da E a W con dimensioni 52"×25" — 380x.
CGCG 291-3	gx	10h47m43s	+59°24.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile subito a SE *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
CGCG 291-17	gx	10h58m47s	+59°29.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è un piccolo baffo molto tenue, orientato da E a W ed esteso una 20-ina di secondi; situata 1.5' a S di NGC 3470 *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
CGCG 291-26	gx	11h05m02s	+59°41.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con piccolo nucleo evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a un paio di primi verso E *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
CGCG 291-29	gx	11h06m47s	+57°14.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 291-41	gx	11h13m19s	+56°28.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile subito a NW; un'altra stellina che appare però solo a momenti si trova subito a N — 495x.
CGCG 291-43	gx	11h14m23s	+62°04.3'		UMa	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; situata tra due stelline orientate da NW a SE e distanti ~ 4' — 450x.
CGCG 291-44	gx	11h14m42s	+57°49.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge evidente; c'è una coppia di stelline a S orientate da NE a SW e distanti 1.5' — 495x.
CGCG 291-74	gx	11h28m41s	+57°50.1'		UMa	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo, con Ø di una 40-ina di secondi e con evidente condensazione centrale; una coppia di stelline brillanti si trova a ~ 30" verso NE — 270x.

CGCG 292-1	gx	11h30m17s	+58°08.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di aspetto un po' irregolare e bassissima luminanza superficiale, grosso modo rotonda con Ø di ~ 1'; è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti distanti 2' e orientate da NE a SW: la gx è poco spostata verso NW rispetto alla congiungente — 380x.
CGCG 292-27	gx	11h46m35s	+61°45.0'		UMa	16"	ottima / buono	debole, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale visibile a 380x.
CGCG 292-34	gx	11h48m50s	+60°11.7'		UMa	16"	m. buona / buono	relativamente facile e compatta; presenta un nucleo marcato di aspetto stellare circonfuso da un alone poco allungato da NW a SE di dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 292-49	gx	11h56m27s	+60°25.1'		UMa	24"	m. buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø > 30" e leggermente più brillante all'interno — 450x.
CGCG 292-60	gx	12h02m11s	+56°21.9'		UMa	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 292-63	gx	12h03m14s	+62°06.7'		UMa	24"	buona / m. buono	è una piccola galassietta rotonda, molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 292-79	gx	12h11m25s	+58°45.5'		UMa	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 293-40	gx	12h54m22s	+58°53.7'		UMa	24"	m. buona / ottimo	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 293-42	gx	12h54m50s	+58°53.0'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 294-23	gx	13h09m31s	+62°09.8'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15", disturbata purtroppo dalla luce di una stella di 6ª che brilla a 4.5' NE; situata 2' ESE di NGC 5007 — 380x.
CGCG 294-25	gx	13h10m04s	+60°13.5'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo puntiforme appena percettibile; situata tra due stelline orientate da N a S 2.5' — 450x.
CGCG 294-33	gx	13h21m03s	+58°32.5'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' N — 450x.
CGCG 294-38	gx	13h28m59s	+61°54.8'		UMa	16"	ottima / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; è situata quasi a ridosso W di una stellina brillante — 270x.
CGCG 294-57	gx	13h38m40s	+61°45.0'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 295-10	gx	13h45m01s	+61°16.8'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" (o poco più) e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 295-31	gx	14h00m03s	+59°15.9'		UMa	16"	buona / buono	molto debole, rotonda, di una 30-ina di secondi di Ø e con condensazione centrale abbastanza netta; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 380x.
CGCG 296-12	gx	14h33m53s	+56°30.8'		Dra	24"	ottima / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante un paio di primi a E che disturba un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 297-7	gx	15h13m29s	+58°30.5'		Dra	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 297-9	gx	15h15m04s	+61°12.2'		Dra	24"	ottima / m. buona	è una lama di luce molto debole orientata da E a W, estesa 45" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 297-11	gx	15h17m25s	+56°39.8'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con gradiente di luce molto basso, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1.5' NNW — 495x.
CGCG 298-1	gx	15h51m24s	+61°04.9'		Dra	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina appena percettibile una 40-ina di secondi a W, ma questa è risultata essere la **PGC 2611617** — 450x.
CGCG 298-2	gx	15h51m27s	+61°09.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	poco più debole della precedente, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 298-6	gx	15h57m55s	+58°09.7'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
CGCG 298-7	gx	15h59m43s	+59°28.6'		Dra	28"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare marcato — 495x.
CGCG 298-8	gx	16h00m11s	+58°23.1'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 298-20	gx	16h13m45s	+61°01.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline brillanti a SE con le quali forma un piccolo triangolo rettangolo — 450x.
CGCG 298-22	gx	16h15m03s	+61°46.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 298-27	gx	16h17m27s	+59°19.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" (situata subito a E di UGC 10331) — 495x.
CGCG 298-39	gx	16h27m20s	+62°39.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, a tratti poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 299-13	gx	16h40m55s	+61°17.4'		Dra	16"	ottima / discreto	debolissima, diffusa ed estesa per max 30"; appare a tratti a ~ 1' S di una debole stellina — 270x.
CGCG 299-18	gx	16h41m45s	+57°50.9'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; è situata in mezzo a due stelline: una brillante a NW e l'altra più debole a SE — 450x.
CGCG 299-19	gx	16h42m04s	+57°53.8'		Dra	24"	ottima / m. buono	diffusa, orientata da N a S con nucleo stellare e dimensioni analoghe alla precedente — 450x.
CGCG 299-27	gx	16h46m13s	+62°13.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e un nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ridosso S e una appena percettibile a NE — 450x.
CGCG 299-39	gx	16h58m43s	+57°05.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 299-44	gx	17h01m06s	+58°41.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; (la SAO 30199 di 9ª grandezza si riesce a mala pena a tenere fuori campo) — 495x.
CGCG 299-45	gx	17h01m13s	+60°15.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante un paio di secondi scarsi verso E — 495x.
CGCG 299-46	gx	17h02m22s	+61°10.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a SW — 450x.
CGCG 299-48	gx	17h03m15s	+61°27.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 299-52	gx	17h06m16s	+60°42.3'		Dra	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; disturbata dalla SAO 17348 di magnitudo 7.5 — 450x.
CGCG 299-57	gx	17h11m00s	+56°56.1'		Dra	28"	ottima / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline a 1.5' NE — 495x.
CGCG 299-58	gx	17h11m50s	+57°35.4'		Dra	28"	ottima / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale evidente; c'è una stellina a 1' SE — 495x.
CGCG 299-60	gx	17h13m16s	+57°40.6'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø max di 15" — 495x.
CGCG 299-63	gx	17h15m08s	+57°18.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' NNE — 495x.
CGCG 299-67	gx	17h15m23s	+57°26.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø < 40" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso NNE — 495x.
CGCG 300-2	gx	17h15m54s	+61°21.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	chiazza molto debole, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 300-14	gx	17h20m26s	+62°36.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a1' scarso verso NW — 450x.
CGCG 300-17	gx	17h22m41s	+60°00.7'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 495x.
CGCG 300-23	gx	17h24m31s	+56°54.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo stellare circonfuso da un debole alone rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a NNE — 495x.
CGCG 300-36	gx	17h27m32s	+60°05.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione stellare — 450x.
CGCG 300-42	gx	17h29m02s	+60°05.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	è una chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 300-49	gx	17h32m12s	+59°56.5'		Dra	28"	m. buona / ottimo	gx facile, piccola e relativamente compatta, poco allungata da N a S, di dimensioni 25"×20" e con nucleo stellare evidente — 495x.
CGCG 300-57	gx	17h39m51s	+59°16.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 300-59	gx	17h40m53s	+62°36.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 300-70	gx	17h47m17s	+61°18.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. circolare con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 300-72	gx	17h47m45s	+61°40.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a momenti quasi a ridosso NNW di MAC 1747+6140 — 450x.
CGCG 300-73	gx	17h48m21s	+58°29.7'		Dra	28"	ottima / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; poco disturbata dalla SAO 30588 di 8ª grandezza situata 2.5' a N — 495x.
CGCG 300-75	gx	17h49m09s	+61°40.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 300-77	gx	17h49m49s	+59°36.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
CGCG 300-81	gx	17h50m17s	+59°37.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 300-82	gx	17h50m35s	+57°17.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo S; una abbastanza brillante si trova a 1.5' verso W — 495x.
CGCG 300-83	gx	17h50m26s	+59°47.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, orientata da NE a SW, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 300-88	gx	17h51m01s	+62°49.3'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole, forma una coppia ravvicinata con **MAC 1751+6249**, situata a ridosso E e dalla quale si separa con difficoltà; sono entrambe molto piccole, estese sì e no 15", ma è difficile capire l'eventuale orientamento; solo la CGCG mostra a tratti un tenue nucleo quasi stellare — 495x.
CGCG 301-4	gx	17h56m35s	+92°37.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	appare tutto sommato facilmente fra i bagliori di una coppia di stelle molto brillanti di 7ª grandezza (SAO 17695 e 17696), poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e con tenue condensazione stellare che sembra a tratti decentrata verso N — 450x.
CGCG 301-5	gx	17h56m54s	+62°07.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 301-10	gx	17h59m46s	+62°46.9'		Dra	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 301-12	gx	18h03m56s	+60°28.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
CGCG 301-13	gx	18h04m26s	+56°56.8'		Dra	28"	ottima / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e tenue nucleo stellare — 495x.
CGCG 301-15	gx	18h09m50s	+58°22.7'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale molto tenue; situata sul lato occidentale di un piccolo triangolo isoscele formato da 3 stelline (quella a S è molto debole) — 495x.
CGCG 301-22	gx	18h13m02s	+57°09.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo W; un'altra stellina di luminosità simile si trova subito a S, mentre una 3a debole è quasi a ridosso E — 495x.
CGCG 301-26	gx	18h15m44s	+61°41.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole e molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 301-29	gx	18h27m34s	+62°07.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 301-30	gx	18h32m24s	+59°52.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	diffusa e poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 450x.
CGCG 301-32	gx	18h34m13s	+59°51.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 301-35	gx	18h42m46s	+62°28.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	piccolo baffo di luce molto tenue e diffuso che si protende a di una stellina abbastanza brillante per una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 302-3	gx	18h45m32s	+59°58.8'		Dra	28"	m. buona / buono	diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge evidente quasi stellare; c'è una stellina a 1' verso E — 495x.
CGCG 302-5	gx	18h53m08s	+57°18.0'		Dra	28"	ottima / m. buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante al bordo N — 495x.
CGCG 302-12	gx	19h22m23s	+58°15.0'		Dra	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S — 495x.
CGCG 302-13	gx	19h24m29s	+59°42.0'		Dra	28"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a ridosso S e una della stessa luminosità uniforme a 1' ENE; forma una coppia ravvicinata con **MAC 1924+5941** situata 1' a ESE — 495x.
CGCG 303-2	gx	19h33m28s	+62°05.3'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a S — 450x.
CGCG 303-10	gx	19h47m11s	+32°31.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S — 450x.
CGCG 303-12	gx	19h48m27s	+58°13.8'		Cyg	28"	buona / ottimo	lama di luce relativamente facile e compatta, orientata da NW a SE, estesa una 40-ina di secondi e con condensazione centrale appena percettibile; situata sul lato occidentale di un trapezio di stelline brillanti — 495x.
CGCG 303-14	gx	19h52m08s	+60°55.7'		Dra	28"	buona / ottimo	molto debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme salvo un nucleo stellare visibile però solo a momenti; ci sono 3 stelline arcuate abbastanza brillanti a NNE — 495x.
CGCG 304-1	gx	20h12m44s	+61°42.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; alcune stelline molto brillanti presenti nel campo disturbano un po' la visione — 450x.
CGCG 307-4	gx	05h11m07s	+67°34.6'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima, molto allungata ~ da N a S per una 40-ina di secondi; un tenuissimo bulge puntiforme appare a tratti a 380x; c'è una stellina a S.
CGCG 307-7	gx	05h13m17s	+66°27.8'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20".
CGCG 307-8	gx	05h18m22s	+67°43.9'		Cam	16"	ottima / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; c'è una stellina appena percettibile subito a NW.
CGCG 307-10	gx	05h20m49s	+66°14.8'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 307-15	gx	05h31m26s	+67°43.8'		Cam	16"	ottima / ottimo	rotonda, diffusa, Ø ~ 45" e con condensazione centrale evidente a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
CGCG 307-16	gx	05h31m44s	+67°36.7'		Cam	16"	ottima / ottimo	più debole e più piccola di CGCG 307-15, appare condensata a 380x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 307-17	gx	05h32m39s	+67°42.6'		Cam	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto di 30"×15" orientato da N a S (o da NW a SE, non capisco bene) dotato di condensazione centrale ben evidente a 380x.
CGCG 307-20	gx	05h43m13s	+67°16.4'		Cam	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme, poco diffuso e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 307-21	gx	05h43m40s	+68°56.7'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole e molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", con nucleo stellare percettibile a 380x; ci sono 2 deboli stelline a N e NW orientate da E a W e distanti una 40-ina di secondi.
CGCG 308-4	gx	05h56m46s	+68°44.5'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale puntiforme osservabile a 380x; c'è una stellina a 45" W.
CGCG 308-9	gx	06h08m30s	+64°43.4'		Cam	16"	ottima / buono	gx evidente, poco diffusa, con piccolo bulge abbastanza marcato, allungata da E a W e di dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso N (questa è la terzultima di una serpentina di 10 stelline che partono da NE) — 380x.
CGCG 308-12	gx	06h13m05s	+64°33.7'		Cam	16"	ottima / buono	debole, diffusa, estesa -, 45", con piccola condensazione centrale abbastanza evidente a 380x.
CGCG 308-13	gx	06h14m02s	+64°42.6'		Cam	16"	ottima / buono	più debole e compatta di CGCG 308-12, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale marcata (forse si tratta di una debole stellina sovrapposta) — 380x.
CGCG 308-17	gx	06h16m42s	+66°30.5'		Cam	16"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale appena accennata a 380x.
CGCG 308-25	gx	06h25m01s	+64°33.9'		Cam	16"	ottima / buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno — 380x.
CGCG 309-3	gx	06h44m12s	+66°06.0'		Cam	16"	ottima / ottimo	piccolo e debole oggetto relativamente compatto, condensato e allungato da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 30" verso NE — 380x.
CGCG 309-9	gx	05h42m37s	+69°14.3'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima, osservabile solo in visione distolta a 270x (a 380x si stempera troppo!); a tratti, tuttavia, appare decisamente allungata da NE a SW con dimensioni ~ 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E (situata 9' a SSE di NGC 1961).
CGCG 309-12	gx	06h59m26s	+64°11.3'		Cam	16"	ottima / ottimo	debolissima; è situata all'interno di un trapezio di deboli stelline i cui lati paralleli sono orientati da E a W (come le 2 stelline brillanti situate 5' o 6' più a S); in visione distolta appare leggermente condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 309-15	gx	07h03m46s	+64°02.0'		Cam	16"	m. buona / ottimo	debole, ma facilmente visibile in visione distolta a 380x; è allungata da E a W, di dimensioni ~ 40"×20" con piccolo bulge abbastanza evidente.
CGCG 309-18	gx	07h05m20s	+64°02.5'		Cam	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi35"; non è difficile a 380x.
CGCG 309-28	gx	07h18m04s	+68°20.6'		Cam	16"	ottima / m. buono	piccola, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme salvo un tenuissimo nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 309-29	gx	07h17m53s	+63°29.1'		Cam	16"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20"e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; è situata tra 2 stelline distanti 1.5' e orientate da E a W.
CGCG 309-30	gx	07h18m43s	+63°11.2'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di 25"-30"; c'è una stellina a 45" verso W; un'altra stellina si trova a 1' NW — 380x.
CGCG 309-33	gx	07h28m52s	+63°23.3'		Cam	16"	m. buona / ottimo	molto debole, con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; a 270x, in visione distolta, appare allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a meno di 1' verso SE.
CGCG 309-35	gx	07h31m44s	+63°14.6'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o 25"; nucleo stellare visibile a tratti a 380x; ci sono 2 stelline situate alla stessa distanza verso NE e SE.
CGCG 309-39	gx	07h35m08s	+65°00.5'		Cam	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; a tratti a 380x sembra di vedere un tenuissimo nucleo stellare (a meno che non si tratti della solita stellina sovrapposta).
CGCG 310-4	gx	07h37m24s	+62°20.4'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, appena più brillante all'interno, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso SE — 380x.
CGCG 310-18	gx	07h49m03s	+63°04.1'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, con condensazione centrale molto tenue e di una 30-ina di secondi di Ø — 380x.
CGCG 310-21	gx	07h53m14s	+68°05.8'		Cam	24"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta e condensata, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' N (fa parte di una losanga alle quale appartengono le SAO 14347 e 14355 di 9ª grandezza) — 450x.
CGCG 310-22	gx	07h57m32s	+63°53.8'		Cam	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, approssim. circolare con Ø < 40" e un nucleo quasi stellare contrastato; c'è una stellina brillante a ridosso W — 450x.
CGCG 310-31	gx	08h03m25s	+37°09.4'		Cam	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e una tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 310-35	gx	08h07m31s	+67°33.9'		Cam	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata sul cateto NE di un triangolo equilatero — 450x.
CGCG 310-36	gx	08h08m20s	+64°22.9'		Cam	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" e un nucleo quasi stellare; c'è una stellina a 1.5' NE e un'altra più debole a 1' NW; la visione è un po' disturbata dalla SAO 14439 di 9a grandezza situata 3' a SSE — 450x.
CGCG 310-47	gx	08h21m57s	+66°31.4'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la visione è un po' disturbata dalla stellina brillante situata a S e dalla SAO 14518 di 6ª grandezza situata 4' scarsi verso E — 450x.
CGCG 310-50	gx	08h23m43s	+64°21.0'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø max 15"; c'è una stellina al bordo S; una appena percettibile si trova poco più di 1' a NW — 450x.
CGCG 310-51	gx	08h23m42s	+62°16.3'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono due stelline a ridosso W e SE; queste, assieme a una 3a poco più distante verso SE, formano un piccolo triangolo isoscele — 450x.
CGCG 311-4	gx	08h27m51s	+63°16.7'		UMa	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 311-5	gx	08h29m21s	+67°11.0'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; ci sono due stelline a ridosso N e NE (la prima è molto debole) — 450x.
CGCG 311-7	gx	08h30m10s	+67°01.8'		UMa	24"	ottima / ottimo	piccola chiazza molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione stellare; c'è una stellina a 1.5' N e una più debole subito a W — 450x.
CGCG 311-9	gx	08h36m43s	+66°14.0'		UMa	16"	m. buona / mediocre	molto debole, ma relativamente compatta, anche se visibile con difficoltà; è estesa max 30" — 270x.
CGCG 311-12	gx	08h41m36s	+66°26.8'		UMa	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
CGCG 311-13	gx	08h43m28s	+67°57.5'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 311-17	gx	08h43m53s	+64°58.2'		UMa	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare; equidistante, anche se non proprio allineata, con due stelline a N — 450x.
CGCG 311-18	gx	08h44m03s	+64°58.5'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 311-19	gx	08h50m59s	+65°38.2'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con evidente condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE — 450x.
CGCG 311-21	gx	08h54m10s	+67°54.5'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; un oggetto molto piccolo, diffuso e debolissimo si trova a ridosso S: da un controllo successivo è risultato di fatto essere la **MAC 0854+6753** — 450x.
CGCG 311-23	gx	08h56m10s	+62°21.0'		UMa	16"	ottima / m. buono	molto piccola, poco diffusa, con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti a 380x, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20".
CGCG 311-25	gx	08h57m22s	+68°14.0'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 311-28	gx	09h02m19s	+63°48.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e leggermente condensata al centro — 380x.
CGCG 312-8	gx	09h25m01s	+64°33.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 45"×20" e con nucleo stellare ben visibile a 380x; c'è una stellina a 1' SE; bisogna cercar di tener fuori campo la SAO 14874 di magnitudo 8.2 situata 5' a E.
CGCG 312-9	gx	09h25m03s	+64°32.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo di luminosità uniforme, facilmente visibile in visione distolta e con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 312-12	gx	09h29m38s	+62°32.7'		UMa	16"	buona / mediocre	molto piccola, di aspetto quasi stellare se osservata a bassi ingrandimenti nelle serate di seeing scarso, compatta, con Ø di una 15-ina di secondi — 270x.
CGCG 313-2	gx	10h10m16s	+62°54.8'		UMa	16"	ottima / ottimo	difficilissima, in quanto letteralmente soffocata dalla luce della SAO 15105 di 7ª grandezza; solo a tratti in visione distolta utilizzando 380x sembra aggettare dalla stella verso W per una 40-ina di secondi; ho trovato di aiuto concentrarsi sulla debole stellina situata subito a SE della gx.
CGCG 313-11	gx	10h19m13s	+63°58.0'		UMa	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 313-13	gx	10h19m24s	+63°59.4'		UMa	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 313-17	gx	10h25m46s	+66°57.0'		UMa	16"	ottima / ottimo	debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; è situata a 1' NE della SAO 15172 di magnitudo 8.8 — 380x.
CGCG 313-26	gx	10h35m09s	+64°27.0'		UMa	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; ci sono due stelline a 1.5' N e SW; la gx è un po' disturbata da una doppia brillante e sbilanciata situata 5' più a S (la componente più luminosa è la SAO 15228 di magnitudo 9.5) — 450x.
CGCG 313-42	gx	11h01m22s	+64°46.2'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø e di luminosità uniforme che appare in visione distolta a 380x.
CGCG 314-4	gx	11h03m04s	+64°46.4'		UMa	16"	ottima / ottimo	piccolo e debole oggetto rotondo con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 314-11	gx	11h10m02s	+63°38.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, compatta, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø di neppure 30"; c'è una stellina a 1' verso E — 380x.
CGCG 314-15	gx	11h11m57s	+67°44.3'		UMa	24"	buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una debole stellina a 1.5' verso N — 450x.
CGCG 314-28	gx	11h26m57s	+63°25.5'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 314-34	gx	11h35m28s	+63°07.2'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è un piccolo triangolo irregolare di stelline a W della gx — 450x.
CGCG 314-36	gx	11h36m07s	+62°15.0'		UMa	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni ~ 60"× 30"; c'è una stellina a 1' verso W — 380x.
CGCG 314-37	gx	11h36m18s	+63°05.5'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 315-11	gx	12h04m51s	+63°07.9'		UMa	16"	ottima / scarso	poco più evidente di UGC 7079, dalla quale dista 4' scarsi a SE; è rotonda con dimensioni analoghe — 270x.
CGCG 315-30	gx	12h16m50s	+65°49.8'		Dra	24"	buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 315-38	gx	12h25m53s	+62°25.8'		UMa	16"	ottima / scarso	debolissimo ovale di luminosità uniforme, diffuso, orientato da E a W con dimensioni ~ 40"×20" — 270x.
CGCG 315-48	gx	12h35m07s	+63°07.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	forma un trio con le due seguenti — debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
CGCG 315-49	gx	12h35m42s	+63°58.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	allungata da N a S, anche questa di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 315-50	gx	12h35m44s	+63°59.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 316-21	gx	13h35m31s	+66°07.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' W — 450x.
CGCG 317-17	gx	14h07m42s	+65°37.1'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 318-1	gx	14h38m09s	+66°20.3'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; la SAO 16458 di magnitudo 7.6 a 9' verso E si riesce a tenere fuori campo a 450x.
CGCG 318-2	gx	14h47m11s	+62°35.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 318-8	gx	14h53m34s	+64°37.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (c'è MCG+11-18-15 un paio di primi a SSE) — 450x.
CGCG 318-13	gx	15h04m56s	+62°42.9'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso NW e un'altra appena più debole a 1' scarso S — 450x.
CGCG 318-16	gx	15h07m08s	+65°56.1'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile e compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e poco più brillante all'interno — 450x.
CGCG 318-23	gx	15h13m02s	+64°43.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 319-8	gx	15h19m30s	+67°30.3'		UMi	24"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" (o poco più) e con nucleo stellare visibile a momenti — 450x.
CGCG 319-12	gx	15h24m15s	+67°08.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ci sono 4 stelle brillanti allineate da NW a SE a E del campo oculare — 450x.
CGCG 319-15	gx	15h26m25s	+66°05.5'		UMi	24"	ottima / m. buona	molto piccola, relativamente facile e compatta, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 319-17	gx	15h29m32s	+67°38.5'		UMi	16"	ottima / discreto	è un debolissimo oggetto poco diffuso esteso non più di 30" e visibile solo a tratti in visione distolta — 270x.
CGCG 319-20	gx	15h34m32s	+67°49.2'		UMi	24"	m. buona / ottimo	difficilissima, emerge a fatica dal bagliore della SAO 16773 di 7ª grandezza situata 1' scarso a S; appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 319-23	gx	15h47m31s	+68°03.4'		Dra	24"	ottima / m. buona	molto debole, ma relativamente compatta, a tratti leggermente condensata, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 319-24	gx	15h48m09s	+68°12.4'		Dra	24"	ottima / m. buona	relativamente compatta e brillante, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (situata quasi a ridosso SW di UGC 10057 — 450x.
CGCG 319-26	gx	15h48m35s	+68°05.9'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 450x.
CGCG 319-27	gx	15h50m34s	+67°09.9'		Dra	16"	m. buona / m. buono	piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; presenta una condensazione centrale puntiforme visibile a tratti — 270x.
CGCG 319-34	gx	15h57m03s	+63°50.5'		Dra	16"	ottima / discreto	molto debole, rotonda, estesa 20"-25", salta fuori con relativa facilità in visione distolta — 270x.
CGCG 319-35	gx	15h56m42s	+66°58.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno; allineata con 3 stelline brillanti di 11-esima situate a SSW — 450x.
CGCG 319-37	gx	15h57m51s	+64°00.3'		Dra	16"	ottima / discreto	debolissima, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" — 270x.
CGCG 319-38	gx	15h59m19s	+65°14.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta, poco più brillante all'interno, molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 45"×15"; altresì definita come **Hickson 80A** — 450x.
CGCG 319-40	gx	16h02m28s	+64°21.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con tenue bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina debolmente sfuocata subito a S, ma questa è risultata essere la **2MASS 16022629+6420303** — 450x.
CGCG 319-41	gx	16h02m43s	+66°29.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole chiazza diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE e una debole alla stessa distanza verso SW; meglio evidente restando a 450x.
CGCG 320-6	gx	16h04m13s	+65°32.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 320-7	gx	16h09m30s	+64°22.6'		Dra	16"	ottima / discreto	assieme a CGCG 320-8 forma una coppia di debolissimi oggetti distanti un paio di primi che appaiono solo in visione distolta; il 1º è appena più evidente e poco più esteso, mentre il 2º mostra una tenue stellare visibile a tratti; dimensioni stimate: 20" e 25" rispettivamente — 270x.
CGCG 320-8	gx	16h09m34s	+64°22.0'		Dra	16"	ottima / discreto	v. **CGCG 320-7**
CGCG 320-9	gx	16h10m21s	+67°50.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 320-15	gx	16h14m25s	+64°59.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 320-27	gx	16h22m31s	+64°29.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia brillante e serrata a 2.5' SW — 450x.
CGCG 320-30	gx	16h29m48s	+67°22.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a ridosso SW; occorre tuttavia tenere fuori campo la SAO 17121 di 9ª grandezza situata 4' a SE — 450x.
CGCG 320-32	gx	16h36m14s	+66°02.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 320-35	gx	16h38m00s	+63°15.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione quasi stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 320-39	gx	16h45m16s	+67°55.3'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso W — 450x.
CGCG 320-40	gx	16h45m25s	+67°57.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	situata 1' a NE della precedente è relativamente facile, poco diffusa, con tenue condensazione centrale, allungata da N a S e di dimensioni analoghe — 450x.
CGCG 320-41	gx	16h46m08s	+65°32.3'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 320-43	gx	16h46m32s	+65°32.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una debole stellina subito a NE — 450x.
CGCG 320-52	gx	16h54m31s	+66°26.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	poco più evidente di CGCG 320-53, rotonda con Ø < 40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo meridionale (fa parte di un terzetto) — 450x.
CGCG 320-53	gx	16h54m34s	+66°28.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20", e con condensazione stellare abbastanza evidente (fa parte di un terzetto) — 450x.
CGCG 321-2	gx	16h52m02s	+65°13.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; poco disturbata dalla SAO 17247 di 8ª grandezza situata 3' a WSW — 450x.
CGCG 321-10	gx	16h58m36s	+68°32.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 321-12	gx	17h03m39s	+64°08.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; disturbata da una coppia di stelline situate 1' a N — 450x.
CGCG 321-18	gx	17h27m52s	+68°24.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 321-19	gx	17h30m22s	+67°19.3'		Dra	24"	ottima / m. buona	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 321-20	gx	17h34m31s	+67°02.5'		Dra	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso E — 495x.
CGCG 321-21	gx	17h34m18s	+68°01.1'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 321-22	gx	17h35m15s	+63°23.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 321-23	gx	17h35m21s	+68°05.9'		Dra	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 321-28	gx	17h38m23s	+68°02.2'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole e poco diffusa, con tenue nucleo stellare, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 321-32	gx	17h42m13s	+67°29.0'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, più che altro molto disturbata da una stella brillante (SAO 17612 di 9ª grandezza) situata a ridosso E; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno — 495x.
CGCG 321-36	gx	17h43m20s	+68°45.7'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso SSW — 450x.
CGCG 321-43	gx	17h47m00s	+68°36.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 321-45	gx	17h49m54s	+68°24.4'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 322-17	gx	18h15m44s	+67°26.6'		Dra	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e una tenue condensazione centrale — 495x.
CGCG 322-19	gx	17h53m33s	+64°10.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 322-21	gx	17h55m17s	+66°32.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW, dimensioni 45"×30" (il campo è molto povero di stelline di riferimento) — 450x.
CGCG 322-23	gx	17h56m29s	+65°12.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.

CGCG 322-24	gx	17h56m43s	+65°15.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e con elusiva condensazione centrale visibile solo a momenti, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 322-27	gx	18h01m23s	+63°00.4'		Dra	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline brillanti a W; una debole stellina si trova subito a SW — 495x.
CGCG 322-29	gx	18h01m24s	+65°21.3'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di 15"-20"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso S — 450x.
CGCG 322-31	gx	18h05m15s	+68°20.0'		Dra	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" scarsi; c'è una stella brillante subito a E e un'altra più debole allineata sempre verso E — 495x.
CGCG 322-32	gx	18h08m15s	+63°40.8'		Dra	28"	m. buona / discreto	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' SW e una appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso NE; una coppia di stelline si trova un paio di primi a N — 495x.
CGCG 322-33	gx	18h10m30s	+64°02.4'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; è situata all'interno di una losanga irregolare formata da 4 stelline — 450x.
CGCG 322-34	gx	18h12m50s	+63°53.1'		Dra	24"	ottima / m. buona	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 322-39	gx	18h19m49s	+63°40.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un triangolo isoscele molto schiacciato con 2 stelline a SW e a S — 450x.
CGCG 323-4	gx	18h53m36s	+66°13.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 323-5	gx	18h53m28s	+68°28.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso SW (appartiene a un ammasso denominato AGC 2312) — 450x.
CGCG 323-7	gx	19h03m03s	+63°50.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 323-8 situata a 1' SW; sono 2 galassiette molto deboli, diffuse, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; la 2ª è poco più evidente; c'è una doppia stretta abbastanza brillante a NW della 1ª (ovvero 1' a N della 2a) con la quale le gx formano un piccolo triangolo isoscele — 450x.
CGCG 323-8	gx	19h03m08s	+63°50.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	v. **CGCG 323-7**
CGCG 323-13	gx	19h27m13s	+65°18.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, situata a ridosso S di una stellina dalla quale sembra a prima vista aggettare, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
CGCG 323-14	gx	19h27m18s	+65°19.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	baffo di luce molto debole orientato da E a W ed esteso una 40-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
CGCG 324-2	gx	19h46m05s	+64°08.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 324-5	gx	19h51m20s	+63°21.9'		Dra	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 3 stelline allineate a SE e una doppia stretta a 1' NW — 495x.
CGCG 325-4	gx	20h54m53s	+65°09.5'		Cep	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; poco disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a NW — 450x.
CGCG 326-1	gx	01h50m00s	+75°15.9'		Cas	24"	buona / buono	debolissima chiazza diffusa, forse circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline brillanti a N e una debole a ridosso W — 450x.
CGCG 327-2	gx	02h56m18s	+75°05.3'		Cas	16"	ottima / m. buono	piccolo oggetto rotondo molto debole, ma relativamente compatto, di luminosità uniforme e con Ø di una 20-ina di secondi osservabile abbastanza facilmente a 380x.
CGCG 327-4	gx	03h30m29s	+74°56.9'	q 14	Cas	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
CGCG 327-13	gx	04h03m17s	+71°43.2'		Cam	16"	ottima / buono	è debolissima, ma nei momenti in cui salta fuori in visione distolta appare allungata ~ da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 327-16	gx	04h13m03s	+75°00.3'		Cam	24"	buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a 1' N — 450x.
CGCG 328-3	gx	04h28m45s	+69°34.8'		Cam	16"	ottima / buono	più piccola di UGC 3046, dalla quale dista 4' a NW, e di aspetto più compatto; ha un Ø max di 20"-25" e presenta una nucleo stellare — 380x.
CGCG 328-7	gx	04h34m06s	+73°18.0'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di dimensioni analoghe a UGC 3069; è allungata ~ da N a S e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 328-10	gx	04h35m21s	+70°06.3'		Cam	16"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, rotonda con Ø max di 30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a ridosso verso NE — 380x.
CGCG 328-12	gx	04h38m25s	+73°18.2'		Cam	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 328-13	gx	04h38m13s	+73°18.7'		Cam	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 1' scarso a NW della precedente e in visione distolta è la prima ad apparire) — 450x.
CGCG 328-14	gx	04h39m29s	+73°17.5'		Cam	24"	buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a una 40-ina di secondi verso S — 450x.
CGCG 328-15	gx	04h40m05s	+74°11.1'		Cam	16"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente compatta, appena più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 328-18	gx	04h45m21s	+73°23.5'		Cam	24"	buona / m. buono	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 328-29	gx	04h57m15s	+72°24.2'		Cam	24"	buona / m. buono	diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 328-31	gx	05h00m08s	+72°19.0'		Cam	24"	buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a una 30-ina di secondi W — 450x.
CGCG 328-39	gx	05h25m04s	+72°34.5'		Cam	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso S e una abbastanza brillante a 1' ENE — 450x.
CGCG 328-40	gx	05h29m53s	+74°30.0'		Cam	24"	buona / ottimo	è un oggetto minuscolo e molto debole, con condensazione stellare situato quasi a ridosso W di una debole, stellina; in visione distolta non sembra più estesa di 10" (altresì riportata sul Megastar come **CGCG 329-5**) — 450x.
CGCG 329-2	gx	05h21m42s	+72°20.0'		Cam	16"	ottima / ottimo	piccola gx relativamente compatta, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente a 380x; è situata poco più di 1' NW di una stellina.
CGCG 329-3	gx	05h23m09s	+72°58.0'		Cam	24"	buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 329-5	gx	05h28m58s	+74°54.7'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale visibile solo a momenti, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' WSW — 450x.
CGCG 329-11	gx	05h43m23s	+69°25.8'		Cam	16"	ottima / buono	debole oggetto rotondo abbastanza evidente, di luminosità pressoché uniforme e Ø di ~ 40"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 380x.
CGCG 329-14	gx	05h45m35s	+73°36.5'		Cam	24"	buona / ottimo	gx difficile da osservare, in quanto situata a ridosso NW di una stella brillante; appare diffusa e di luminosità uniforme, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 329-16	gx	05h45m39s	+69°03.6'		Cam	16"	ottima / buono	debole, rotonda, di luminosità pressoché uniforme, poco diffusa e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ~ 1' verso N — 380x.
CGCG 329-20	gx	06h08m41s	+74°50.5'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata tra due stelline abbastanza brillanti (quella a NE ha una compagna più debole subito a S) — 450x.
CGCG 329-34	gx	06h36m59s	+74°16.9'		Cam	24"	buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con piccola condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 329-36	gx	06h40m49s	+73°53.0'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW e un'altra più debole alla stessa distanza verso N — 450x.
CGCG 330-4	gx	06h30m29s	+74°26.6'		Cam	16"	ottima / buono	debole, piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di ~ 30" e tenue condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
CGCG 330-9	gx	06h39m49s	+74°20.0'		Cam	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 330-11	gx	06h44m21s	+74°26.6'		Cam	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo W — 450x.
CGCG 330-13	gx	06h47m01s	+74°31.7'		Cam	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 330-20	gx	06h56m42s	+73°41.7'		Cam	24"	buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 330-28	gx	07h11m58s	+73°04.7'		Cam	16"	ottima / buono	è una debole bolla rotonda di luminosità uniforme e con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' verso SE — 380x.
CGCG 331-7	gx	07h38m16s	+73°44.8'		Cam	16"	ottima / m. buono	debolissima chiazza rotonda con Ø di una 40-ina di primi e molto stemperata sul fondo cielo; appare tuttavia senza problemi in visione distolta a 270x.
CGCG 331-9	gx	07h40m31s	+69°55.5'		Cam	16"	ottima / ottimo	debole e relativamente compatta, rotonda, di Ø < 30" e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 331-10	gx	07h40m36s	+69°47.9'		Cam	16"	ottima / ottimo	poco più debole e più piccola di CGCG 331-9, rotonda, diffusa, con condensazione centrale di aspetto quasi stellare e Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 331-18	gx	07h51m48s	+71°01.6'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline a 1' W — 450x.
CGCG 331-27	gx	08h06m10s	+73°19.8'		Cam	16"	ottima / m. buono	debolissima, estesa non più di una 30-ina di secondi; appare solo a momenti in visione distolta, ma è preferibile scalare a 270x.
CGCG 331-37	gx	08h21m57s	+73°60.0'		Cam	20"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina subito a N — 360x.
CGCG 331-45	gx	08h30m00s	+70°49.9'		UMa	16"	ottima / m. buono	debolissima macchiolina rotonda molto piccola e diffusa, con Ø di ~ 20" e una condensazione centrale appena percettibile a 380x.
CGCG 331-46	gx	08h30m05s	+70°07.2'		UMa	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 331-47	gx	08h30m26s	+70°53.5'		UMa	16"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, rotonda con Ø di 25"-30" e condensazione centrale visibile a 380x; c'è una debolissima stellina a 1' N (c'è per caso un'altra stellina o un nodulo al bordo meridionale?).
CGCG 331-49	gx	08h34m46s	+70°09.8'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 331-50	gx	08h35m36s	+70°36.7'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (il campo è ricco di stelline brillanti) — 450x.
CGCG 331-60	gx	08h44m45s	+69°05.5'		UMa	24"	ottima / ottimo	di aspetto simile a CGCG 332-6 (osservata subito prima), ma poco più debole. Altresì denominata CGCG 332-7 — 450x.
CGCG 332-6	gx	08h44m19s	+68°50.4'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline brillanti a NE. Altresì denominata **CGCG 331-59** — 450x.
CGCG 332-21	gx	08h51m58s	+71°48.9'		UMa	16"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W e un'altra molto debole a 1' verso S — 380x.
CGCG 332-26	gx	08h53m19s	+68°28.3'		UMa	16"	ottima / m. buono	debole oggetto rotondo con Ø di ~ 30", relativamente compatto e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 332-33	gx	09h12m14s	+73°35.6'		Cam	16"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e bassissimo gradiente; c'è una stellina a neppure 1' verso NW — 380x.
CGCG 332-40	gx	09h18m49s	+71°43.8'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 332-44	gx	09h21m41s	+71°40.8'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensata — 450x.
CGCG 333-15	gx	10h05m10s	+70°33.4'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola ed evidente condensazione centrale — 450x.
CGCG 333-16	gx	10h05m16s	+70°19.7'		UMa	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e una evidente condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso SSE — 450x.
CGCG 333-32	gx	10h29m51s	+69°05.0'		UMa	24"	buona / m. buono	debole, diffusa, a tratti appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 333-40	gx	10h35m33s	+72°40.7'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 333-41	gx	10h35m57s	+72°37.0'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile subito a S — 450x.
CGCG 333-59	gx	10h51m33s	+68°41.7'		UMa	16"	ottima / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; forma un piccolo triangolo con 2 stelline; una a 1' SE e l'altra, più brillante,1.5' verso S — 380x.
CGCG 333-64	gx	10h58m57s	+72°38.5'		UMa	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e facile, molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una condensazione stellare marcata (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta); c'è una stella brillante a 1' SW (forma una coppia ravvicinata con CGCG 333-66 situata 1' scarso SE) — 450x.
CGCG 333-66	gx	10h59m05s	+72°38.0'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella brillante a poco più di 1' verso W (forma una coppia ravvicinata con CGCG 333-64 situata 1' scarso NW) — 450x.
CGCG 334-10	gx	11h05m56s	+72°31.5'		UMa	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, relativamente compatta, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 334-23	gx	11h21m07s	+69°26.5'		UMa	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; situata tra due stelline: una a 1' W e una doppia a ENE; una doppia stretta molto brillante si trova 3' a S — 450x.
CGCG 334-26	gx	11h21m26s	+69°17.0'		UMa	24"	buona / m. buono	piccola, molto debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 334-33	gx	11h28m17s	+72°56.9'		Dra	20"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 360x.
CGCG 334-50	gx	11h46m45s	+70°39.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina brillante a 1.5' WSW e una più debole alla stessa distanza verso N — 450x.
CGCG 334-52	gx	11h49m54s	+70°43.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni poco superiori a 30"×20" — 450x.
CGCG 335-28	gx	12h55m30s	+70°49.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1.5' W — 450x.
CGCG 336-5	gx	13h12m54s	+69°21.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta un bulge molto tenue di 20"×10" orientato da N a S meglio visibile restando a 450x; c'è una stellina a 1' NNE e un piccolo parallelogramma di deboli stelline subito a S.
CGCG 336-15	gx	13h43m00s	+72°19.9'		UMi	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale evidente anche se poco contrastata — 450x.
CGCG 336-30	gx	13h53m11s	+69°18.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" (è situata a ridosso E di UGC 8823) — 450x.
CGCG 336-45	gx	14h10m39s	+72°20.0'		UMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (altresì riportata sul Megastar come **CGCG 337-5**) — 450x.
CGCG 336-46	gx	14h11m58s	+72°16.5'		UMi	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso SSE (altresì riportata sul Megastar come **CGCG 337-6**) — 450x.
CGCG 337-4	gx	14h07m35s	+73°01.9'		UMi	20"	buona / scarso	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 360x.
CGCG 337-12	gx	14h27m12s	+69°54.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 337-16	gx	14h35m38s	+73°31.8'		UMi	20"	buona / scarso	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 30"; quasi allineata ed equidistante con due stelline a NNE; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi a S — 360x.
CGCG 337-21	gx	14h50m47s	+73°49.3'		UMi	20"	buona / scarso	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione N-S situato a ridosso W di una coppia di stelline molto sbilanciate in luminosità (quella a più a E è relativamente brillante) — 360x.
CGCG 337-27	gx	15h02m15s	+68°15.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare poco contrastato; c'è una stellina a 1' SE e un'altra di luminosità simile a 1.5' WSW — 450x.
CGCG 337-28	gx	15h02m27s	+69°52.9'		UMi	24"	ottima / m. buona	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a 1' N — 450x.
CGCG 337-31	gx	15h10m44s	+71°00.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e diffusa, in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina brillante subito a S; impossibile tenere fuori campo la SAO 8187 di 8ª grandezza situata 2.5' a E — 450x.
CGCG 337-33	gx	15h15m36s	+69°18.9'		UMi	24"	ottima / m. buona	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo quasi stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 337-34	gx	15h15m50s	+69°16.4'		UMi	24"	ottima / m. buona	relativamente brillante, poco diffusa e con nucleo stellare marcato, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 337-35	gx	10h12m47s	+65°16.3'		UMa	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di 20" o poco più; situata tra una stellina abbastanza brillante a ridosso W e una più debole dalla parte opposta — 450x.
CGCG 337-37	gx	15h20m15s	+73°43.7'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione stellare appena percettibile; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso E, mentre una brillante si trova a 1' verso NE; a NE appare, solo a momenti, una terza stellina, ma quest'ultima è in realtà la **MAC 1520+7734** — 450x.
CGCG 338-5	gx	15h21m46s	+68°53.2'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 338-6	gx	15h23m44s	+68°37.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
CGCG 338-10	gx	15h37m38s	+73°15.4'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, presenta un nucleo stellare abbastanza marcato e un tenue alone che in visione distolta appare orientato da NE a SW con dimensioni 30"×20"; è situata tra due stelline: una doppia serrata e sbilanciata a 1' NW e una più debole a SE — 450x.
CGCG 338-11	gx	15h37m57s	+72°33.2'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 338-14	gx	15h42m55s	+70°49.7'		UMi	24"	ottima / m. buona	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina molto brillante a 1' scarso SSE — 450x.
CGCG 338-16	gx	15h45m37s	+70°43.5'		UMi	24"	ottima / m. buona	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo con una stellina brillante un paio di primi a NE e una più debole a 1' ESE — 450x.
CGCG 338-20	gx	15h48m08s	+69°27.6'		Dra	24"	ottima / m. buona	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 338-22	gx	15h48m52s	+69°38.6'		UMi	24"	ottima / m. buona	debole, molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 338-25	gx	15h49m24s	+71°10.3'		UMi	24"	ottima / m. buona	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 338-28	gx	15h51m59s	+68°51.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola e poco debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 338-30	gx	15h53m04s	+68°52.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso W — 450x.
CGCG 338-38	gx	16h01m05s	+71°29.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni poco superiori a 30"×15" — 450x.
CGCG 338-39	gx	16h01m26s	+70°23.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; è situata tra 2 stelline abbastanza brillanti orientate da NNW a SSE: quella più a N è una doppia stretta e sbilanciata — 450x.
CGCG 338-41	gx	16h02m07s	+70°25.0'		Dra	24"	ottima / m. buona	relativamente facile diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 1' scarso — 450x.
CGCG 338-42	gx	16h04m15s	+69°27.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 338-46	gx	16h07m15s	+69°55.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 338-51	gx	16h15m14s	+74°13.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile (*presenza di chiarore lunare*) — 450x.
CGCG 338-52	gx	16h16m06s	+70°57.5'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è allineata ed equidistante con due stelline brillanti a NNW — 450x.
CGCG 338-58	gx	16h27m49s	+73°57.4'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e a tratti condensata, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" (altresì nota come **CGCG 339-7**)
CGCG 338-59	gx	16h29m27s	+74°02.3'	q 159	Dra	24"	m. buona / ottimo	di aspetto a prima vista simile alla precedente, ma poco più debole e uniforme, rotonda con Ø < 20" (altresì denominata **CGCG 339-8**) — 450x.
CGCG 339-6	gx	16h28m33s	+69°41.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una condensazione stellare — 450x.
CGCG 339-11	gx	16h35m45s	+71°41.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 339-17	gx	16h42m45s	+73°39.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma più che altro disturbata da una stella brillante quasi a ridosso W; in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" (in visione diretta sembra circolare) — 450x.
CGCG 339-18	gx	16h43m13s	+74°42.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; non sembra disturbata dalla SAO 8606 di 10ª grandezza situata un paio di primi a W — 450x.
CGCG 339-21	gx	16h50m32s	+69°01.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante subito a NW (sul prolungamento dell'asse maggiore della gx) — 450x.
CGCG 339-22	gx	16h51m40s	+68°55.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 339-23	gx	16h51m26s	+74°34.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma appare facilmente in visione distolta a poco più di 1' W di una stellina brillante; molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso verso SW — 450x.
CGCG 339-24	gx	16h53m04s	+70°25.9'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole lama di luce con piccolo bulge diffuso evidente, orientata da N a S ed estesa 45"; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 339-30	gx	17h10m59s	+69°36.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con bulge appena percettibile; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 339-33	gx	17h12m01s	+72°38.8'		Dra	24"	buona / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x.
CGCG 339-34	gx	17h14m42s	+71°12.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una coppia di stelline appena percettibili a 1' SW — 450x.
CGCG 339-40	gx	17h24m23s	+42°09.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e di luminosità pressoché uniforme; è allineata ed equidistante con 2 stelline a S (le quali fanno parte di un piccolo asterismo di 4 componenti foggiato a "L") — 450x.
CGCG 339-41	gx	17h25m25s	+68°50.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 339-48	gx	17h31m56s	+71°50.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta un paio di primi a NE — 450x.
CGCG 339-50	gx	17h33m13s	+70°46.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 339-52	gx	17h33m38s	+72°58.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni poco superiori a 30"×20" (il campo è ricco di stelline, alcune delle quali brillanti) — 450x.
CGCG 340-4	gx	17h30m23s	+71°19.8'		Dra	24"	ottima / m. buona	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e a tratti condensata — 450x.
CGCG 340-7	gx	17h32m06s	+73°51.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo equilatero con due stelline a S e SW — 450x.
CGCG 340-12	gx	17h36m42s	+70°54.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 340-14	gx	17h38m00s	+69°58.5'		Dra	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" scarsi (a 495x il campo di ~ 10' centrato sulla gx è virtualmente depleto).
CGCG 340-18	gx	17h42m38s	+69°40.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 340-20	gx	17h49m34s	+72°13.1'		Dra	24"	buona / ottimo	debole lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; presenta un nucleo puntiforme ben evidente, ma potrebbe anche trattarsi di una stellina sovrapposta — 450x.
CGCG 340-22	gx	17h50m07s	+71°49.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 340-23	gx	17h51m05s	+74°47.7'		Dra	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con piccolo nucleo abbastanza brillante — 450x.
CGCG 340-27	gx	17h56m50s	+70°17.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 340-30	gx	17h58m15s	+70°39.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 1758+7039 situata a ridosso verso S; le 2 galassiette si separano facilmente a 450x; sono di aspetto simile, estese una 15-ina di secondi e a tratti condensate (la condensazione centrale della MAC sembra un poco più evidente); c'è una stellina a meno di 1' N della coppia.
CGCG 340-33	gx	18h03m24s	+70°13.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 340-34	gx	18h03m41s	+69°51.1'		Dra	24"	ottima / m. buona	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 340-36	gx	18h07m28s	+70°15.2'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 495x.
CGCG 340-38	gx	18h10m12s	+69°17.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	chiazza circolare molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
CGCG 340-41	gx	18h11m37s	+74°12.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; ci sono 3 stelline allineate a 1' verso E e orientate come la galassia — 450x.
CGCG 340-46	gx	18h25m07s	+70°31.0'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina molto debole subito a S — 495x.
CGCG 340-49	gx	18h30m29s	+74°07.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 340-51	gx	18h34m48s	+74°03.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è un baffo di luce molto debole, orientato da NW a SE ed esteso una 40-ina di secondi; situata tra una doppia stretta a WSW e una stellina brillante a ENE che disturba un po' la visione — 450x.
CGCG 341-7	gx	18h46m49s	+70°21.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a N; la visione è purtroppo disturbata dalla SAO 9244 di 7ª grandezza situata 1.5' a N — 450x.
CGCG 341-9	gx	18h48m49s	+73°21.8'		Dra	24"	buona / ottimo	rotonda con Ø < 30", poco diffusa e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 341-10	gx	18h50m18s	+73°21.1'		Dra	24"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
CGCG 341-13	gx	18h56m17s	+69°54.4'		Dra	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di 1' scarso; poco meglio definita scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N.
CGCG 341-16	gx	19h03m11s	+73°47.7'		Dra	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 341-24	gx	19h15m54s	+74°28.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una coppia di stelline un po' sbilanciate in luminosità a 1' verso N e una terza appena più evidente a 1' scarso verso W.
CGCG 341-25	gx	19h16m50s	+70°30.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 341-27	gx	19h29m17s	+72°08.3'		Dra	24"	buona / buono	piccola lama di luce molto debole, estesa una 30-ina di secondi e orientata da N a S; è situata in mezzo a due stelline distanti 1.5' e orientate da NW a SE — 450x.
CGCG 341-29	gx	19h32m29s	+72°28.0'		Cas	24"	buona / buono	debole baffo di luminosità uniforme che si diparte verso W per una 40-ina di secondi da una stellina brillante che disturba un poco l'osservazione — 450x.
CGCG 341-30	gx	19h33m37s	+74°07.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata all'interno di un asterismo triangolare formato da 5 stelline brillanti — 450x.
CGCG 342-1	gx	19h58m35s	+69°35.2'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; situata tra 2 stelline molto deboli orientate da E a W e distanti 2.5' — 495x.
CGCG 343-2	gx	21h54m54s	+74°29.3'		Cep	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 344-4	gx	23h40m38s	+78°15.2'		Cep	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, ma è difficile stabilirlo perché è disturbata da una stellina brillante a ridosso NW; c'è una stellina appena percettibile al bordo SE — 450x.
CGCG 344-6	gx	23h42m08s	+78°10.8'		Cep	24"	buona / buono	piccola, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 345-1	gx	00h42m12s	+79°15.7'		Cep	24"	buona / m. buono	piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una stellina brillante a ridosso SE disturba un poco l'osservazione — 450x.
CGCG 345-3	gx	01h40m11s	+81°09.6'		Cep	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
CGCG 346-4	gx	03h19m16s	+76°03.9'		Cas	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 346-5	gx	03h41m49s	+77°00.5'		Cam	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20"; situata tra una doppia stretta e sbilanciata a W e una stellina a E — 450x.
CGCG 346-9	gx	04h03m05s	+75°51.5'		Cam	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 450x.
CGCG 347-8	gx	04h55m11s	+75°39.0'		Cam	24"	m. buona / discreto	poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30", diffusa e con piccolo bulge evidente; c'è una stellina molto debole subito a W — 450x.
CGCG 347-21	gx	05h44m14s	+75°37.2'		Cam	24"	buona / ottimo	debole, ma comunque relativamente facile da individuare, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 495x.
CGCG 348-3	gx	05h44m33s	+79°35.3'		Cam	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e con condensazione stellare appena percettibile, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 348-20	gx	06h26m44s	+80°30.3'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE (la quale si trova tra la gx e una doppia stretta) — 450x.
CGCG 348-24	gx	06h47m53s	+79°21.3'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e con tenue bulge appena evidente, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 348-25	gx	06h53m28s	+80°52.1'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, visibile a tratti solo in visione distolta, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 380x.
CGCG 349-2	gx	07h09m23s	+77°52.2'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; è meglio contrastata scalando a 340x (altresì riportata sull'Uranometria come CGCG 348-29).
CGCG 349-14	gx	08h01m56s	+75°56.5'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; il visione distolta appare orientata all'incirca da NW a SE con dimensioni di 60"×40" — 380x.
CGCG 349-24	gx	08h25m08s	+74°29.8'		Cam	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, con bassissimo gradiente, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — 380x.
CGCG 349-25	gx	08h27m59s	+75°23.7'		Cam	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, con bassissima luminanza superficiale, approssim. rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 380x.
CGCG 350-17	gx	09h15m27s	+77°00.0'		Cam	20"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e condensata (sembra a prima vista una piccola planetaria) rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia di stelle brillanti a 6' NE (sono la SAO 6794 di 7ª grandezza e la SAO 6799 di 9ª) — 360x.
CGCG 350-23	gx	09h29m26s	+77°37.9'		Dra	20"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 30" scarsi — 360x.
CGCG 350-32	gx	09h50m19s	+75°44.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' WSW e una molto brillante (la SAO 6971) a 3' verso SW che disturba (situata 23' scarsi a WSW di NGC 3061) — 450x.
CGCG 350-56	gx	10h30m55s	+78°55.9'		Dra	20"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a N — 360x.
CGCG 351-25	gx	10h30m22s	+74°59.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 351-39	gx	10h46m01s	+74°42.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 351-41	gx	10h48m39s	+76°48.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 50"×25" — 450x.
CGCG 351-44	gx	10h51m07s	+76°47.7'		Dra	16"	ottima / ottimo	si vede facilmente in visione distolta, piccola, molto allungata da N a S, di dimensioni 40"×15" con nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina brillante a ridosso verso N — 380x.
CGCG 351-57	gx	11h13m17s	+76°55.8'		Dra	28"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 388x.
CGCG 351-58	gx	11h18m04s	+75°08.9'		Dra	28"	buona / buono	debole, diffusa e a tratti condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 388x.
CGCG 351-59	gx	11h19m30s	+75°00.5'		Dra	28"	buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; la gx è disturbata dalla SAO 7335 di 8ª grandezza situata 4.5' a N — 388x.
CGCG 351-65	gx	11h35m17s	+78°47.6'		Dra	28"	buona / buono	molto debole e a tratti condensata, rotonda con Ø di 20"-25" — 388x.
CGCG 351-71	gx	11h55m05s	+79°25.6'		Cam	28"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata 1' a E — sono di aspetto del tutto simile, molto deboli e di luminosità uniforme, rotonde con Ø di una 30-ina di secondi — 388x.
CGCG 351-72	gx	11h55m34s	+79°25.5'		Cam	28"	buona / buono	*vedi galassia precedente.*
CGCG 352-4	gx	11h36m02s	+78°58.1'		Dra	28"	buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare molto tenue — 388x.
CGCG 352-13	gx	11h59m58s	+76°14.5'		Dra	28"	buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 388x.
CGCG 352-16	gx	12h04m48s	+76°07.1'		Dra	28"	buona / buono	piccola e debole, forse rotonda con Ø di 12"-15"; è situata in mezzo tra la successiva e una stellina a 1.5' SW — 388x.
CGCG 352-17	gx	12h05m08s	+76°08.0'		Dra	28"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 388x.
CGCG 352-25	gx	12h15m19s	+75°36.8'		Dra	28"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline: una a 1' NE e l'altra abbastanza brillante a 1.5 verso N — 388x.
CGCG 352-26	gx	12h17m30s	+77°16.8'		Cam	28"	buona / buono	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 388x.
CGCG 352-27	gx	12h20m04s	+75°29.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 450x.
CGCG 352-30	gx	12h22m17s	+74°50.3'		Dra	28"	buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo quasi stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' verso S — 388x.
CGCG 352-34	gx	12h33m05s	+77°58.5'		Cam	28"	buona / buono	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 388x.
CGCG 352-35	gx	12h33m50s	+77°42.7'		Cam	28"	buona / buono	anche questa è molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso W — 388x.
CGCG 352-36	gx	12h35m17s	+75°55.1'		Dra	20"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi 360x.
CGCG 352-40	gx	12h45m38s	+74°28.9'		Dra	20"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso W — 360x.
CGCG 352-43	gx	12h51m23s	+78°42.6'		Cam	28"	buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 388x.
CGCG 352-44	gx	12h54m01s	+74°38.9'		Dra	28"	buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata quasi a ridosso SE della SAO 7691 di 8ª grandezza (riesce a emergere abbastanza facilmente nel bagliore della stella); una doppia stretta dalle componenti brillanti si trova 3' a E — 388x.

CGCG 352-46	gx	12h55m05s	+78°58.8'		Cam	28"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 388x.
CGCG 352-47	gx	12h55m06s	+79°26.9'		Cam	28"	buona / buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale molto tenue — 388x.
CGCG 352-48	gx	12h56m26s	+79°02.2'		Cam	28"	buona / buono	molto debole e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; un piccolo ed elusivo oggetto diffuso appare a tratti a ridosso S della gx: questo è risultato essere **MAC 1256+7901** — 388x.
CGCG 352-54	gx	13h01m16s	+80°01.8'		Cam	24"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (è altresì riportata sul Megastar come **CGCG 353-9**) — 450x.
CGCG 352-60	gx	13h13m36s	+78°14.5'		Cam	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' SW (è altresì riportata sul Megastar come **CGCG 353-15**) — 450x.
CGCG 353-17	gx	13h30m00s	+75°34.1'		UMi	20"	buona / scarso	molto debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW; una coppia di stelle brillanti si trova un paio di primi a N (sono la SAO 7829 e SAO 7830 entrambe di 9ª grandezza) — 360x.
CGCG 353-20	gx	13h34m19s	+75°45.2'		UMi	20"	buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; molto disturbata dalla SAO 7846 di 8ª grandezza situata 2.5' a N — 360x.
CGCG 353-34	gx	14h17m59s	+80°07.0'		Cam	20"	buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 360x.
CGCG 353-44	gx	14h34m35s	+77°58.0'		UMi	24"	m. buona / buono	molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con nucleo evidente quasi stellare (altresì riportata sul Megastar come **CGCG 354-7**) — 450x.
CGCG 353-45	gx	14h38m53s	+78°10.1'		UMi	20"	buona / scarso	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile subito a NW — 360x.
CGCG 353-46	gx	14h48m08s	+79°45.3'		UMi	20"	buona / scarso	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 360x.
CGCG 354-12	gx	14h51m32s	+74°30.8'		UMi	20"	buona / scarso	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline a poco più di 1' verso E orientata come la gx — 360x.
CGCG 354-13	gx	14h51m03s	+79°36.5'		UMi	20"	buona / scarso	è un baffo di luce molto debole, orientato da NW a SE che sembra a prima vista aggettare a SE di una stellina abbastanza brillante — 360x.
CGCG 354-17	gx	15h03m23s	+80°12.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline deboli, la più settentrionale delle quali si trova a ridosso N della gx — 450x.
CGCG 354-20	gx	15h10m49s	+75°04.7'		Umi	16"	ottima / buono	molto debole, approssim. rotonda con Ø di ~ 45" e appena più brillante all'interno — 270x.
CGCG 354-23	gx	15h20m36s	+79°29.8'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di aspetto un po' irregolare, nel senso che appare a prima vista allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15", ma in visione distolta sembra orientata in direzione opposta; in effetti, da un controllo successivamente effettuato, risulta formata da 2 gx forse interagenti — 450x.
CGCG 354-27	gx	15h48m20s	+74°31.5'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 355-12	gx	16h30m57s	+78°57.3'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; meglio definita e contrastata scalando a 340x.
CGCG 355-15	gx	16h33m36s	+77°05.5'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso N (è quella centrale di un piccolo triangolo molto aperto) — 450x.
CGCG 355-20	gx	16h44m22s	+77°50.3'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; ci sono 3 stelline nelle immediate vicinanze: a SSE, a W e una appena percettibile a NW (altresì denominata Hickson 84A) — 450x.
CGCG 355-26	gx	17h04m14s	+78°37.7'		UMi	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 356-1	gx	17h12m38s	+80°11.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 356-2	gx	17h18m17s	+78°01.1'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; ci sono due stelline molto deboli quasi a ridosso N e NW; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 356-12	gx	19h08m54s	+76°42.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 357-3	gx	19h15m32s	+76°05.6'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e con condensazione centrale osservabile solo a momenti, allungata da NW a SE (come la coppia di stelline situata un paio di primi a W) con dimensioni 30"×20"; ci sono due deboli stelline a 1' scarso SE e SW — 450x.
CGCG 357-4	gx	19h24m55s	+77°16.7'		Dra	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 357-5	gx	19h25m37s	+79°55.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e con condensazione centrale appena percettibile, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso SE; meglio evidente a 450x.
CGCG 357-7	gx	19h35m34s	+76°00.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; è situata tra due stelline: una abbastanza brillante a 1' verso E e l'altra debole dalla parte opposta — 450x.
CGCG 357-8	gx	19h36m48s	+79°49.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale visibile solo a momenti; c'è una stellina subito a N e una appena percettibile dalla parte opposta — 450x.
CGCG 358-2	gx	21h23m45s	+79°53.6'		Cep	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a SSW (poco più della separazione della doppia brillante a 2.5' verso W) — 450x.
CGCG 360-4	gx	01h15m55s	+85°09.4'		Cep	24"	ottima / m. buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare; è situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo isoscele di stelline con luminosità decrescente, a partire da quella più a W (altresì riportata come CGCG 361-1) — 450x.
CGCG 361-6	gx	02h09m06s	+85°20.9'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x (altresì riportata come CGCG 360-9).
CGCG 361-7	gx	02h29m23s	+84°01.3'		Cep	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 361-8	gx	02h37m10s	+84°52.1'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra 2 stelline che le stanno a ridosso: una a NW e l'altra appena percettibile dalla parte opposta — 450x.
CGCG 361-9	gx	04h26m17s	+86°11.7'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW e una molto debole alla stessa distanza SE; una appena percettibile si trova poco più a E (altresì riportata come CGCG 362-1) — 450x.
CGCG 362-2	gx	04h22m21s	+82°25.6'		Cep	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; è situata a ridosso NE di un piccolo triangolo di stelline — 450x.
CGCG 362-7	gx	05h36m32s	+81°44.2'		Cam	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW; una doppia stretta si trova a 1.5' verso S; meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 362-8	gx	05h42m44s	+82°27.7'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 362-9	gx	05h45m32s	+82°09.2'		Cam	24"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (o poco più); c'è un piccolo asterismo triangolare di 4 stelle a NW (quella più a N è una doppia stretta) — 450x.
CGCG 362-11	gx	05h56m28s	+82°49.3'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 362-14	gx	06h06m04s	+82°43.2'		Cam	24"	buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, anche questa è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 362-17	gx	06h23m06s	+83°12.6'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una doppia stretta e sbilanciata a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 362-21	gx	06h35m28s	+81°34.3'		Cam	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 362-23	gx	06h40m50s	+82°54.1'		Cam	16"	ottima / buono	è un debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 30-ina di secondi e luminosità uniforme; ci sono 2 deboli stelline a N distanti ~ 40" — 380x.
CGCG 362-34	gx	07h14m57s	+85°56.4'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso E (altresì riportata come CGCG 363-18) — 450x.
CGCG 362-35	gx	07h15m06s	+85°46.5'		Cep	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 362-39	gx	07h17m51s	+85°00.3'		Cep	24"	ottima / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina visibile solo a momenti subito a N (altresì riportata come CGCG 363-24) — 450x.
CGCG 362-48	gx	07h57m28s	+85°43.0'		Cep	16"	ottima / m. buono	è un diffuso chiarore esteso per 30"-35", ben evidente in visione distolta e situato a ridosso verso NE di una stellina brillante; presenta una tenue nucleo stellare osservabile a 380x malgrado una falcetta di Luna.
CGCG 363-1	gx	06h06m20s	+84°25.1'		Cam	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo W che a prima vista appare come un semplice rinforzo di luce della gx (altresì riportata come CGCG 362-12) — 450x.
CGCG 363-8	gx	06h49m16s	+83°48.0'		Cam	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 363-16	gx	06h55m07s	+81°02.9'		Cam	16"	ottima / buono	debolissima, visibile in visione distolta a S di una stellina brillante; è poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 363-41	gx	08h33m39s	+85°59.0'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 364-2	gx	08h26m26s	+84°56.3'		Cam	24"	ottima / m. buono	debolissimo baffo di luce orientato da NW a SE ed esteso una 40-ina di secondi; appare un po' a fatica in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x; è altresì riportata come CGCG 363-39 (è sorta una falcetta di luna) — 450x.
CGCG 364-14	gx	09h47m20s	+81°49.6'		Cam	20"	m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una tripletta di stelline (due delle quali debolissime) a 1' verso S — 360x.
CGCG 365-4	gx	12h50m17s	+80°21.9'		Cam	28"	buona / buono	molto debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 2097 di 7ª grandezza situata 4' a NW, molto diffusa e a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 388x.
CGCG 365-6	gx	12h52m50s	+80°19.5'		Cam	28"	buona / buono	molto piccola e debole, diffusa rotonda con Ø < 20" — 388x.
CGCG 365-11	gx	13h20m58s	+80°22.5'		Cam	20"	buona / scarso	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso N; un asterismo di 4 stelline brillanti posto a triangolo molto aperto si trova 5' a S della gx — 360x.
CGCG 366-9	gx	14h25m47s	+83°17.4'		UMi	20"	buona / scarso	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20" o poco più; c'è una coppia di deboli stelline a 1' ESE — 360x.
CGCG 366-21	gx	15h36m52s	+82°21.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza forse circolare, estesa una 30-ina di secondi, molto diffusa e disturbata dalla SAO 2587 di 9ª grandezza situata 1.5' a NE — 450x.
CGCG 366-26	gx	15h53m53s	+81°48.3'		UMi	24"	m. buona / ottimo	appare come un alone eccentrico molto debole e diffuso che tende ad aggettare a E di una stellina brillante; in visione distolta non sembra comunque più estesa di 20" (altresì riportata come CGCG 367-5) — 450x.
CGCG 367-4	gx	15h51m01s	+81°46.6'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso S (altresì riportata come CGCG 366-24) — 450x.
CGCG 367-8	gx	16h11m17s	+81°18.5'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 367-10	gx	16h22m52s	+82°23.5'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo meridionale — 450x.
CGCG 367-15	gx	16h37m12s	+82°00.4'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente (ultima galassia osservata: inizia ad albeggiare) — 450x.
CGCG 367-21	gx	16h53m52s	+81°38.4'	q 159	UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 20"; c'è una debole stellina a 1' SE (fa parte dell'ammasso AGC 2247) — 450x.
CGCG 367-24	gx	17h41m38s	+83°08.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 368-2	gx	19h11m49s	+83°54.3'		Dra	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (è sorta la Luna all'ultimo quarto) — 450x.
CGCG 368-3	gx	19h26m10s	+84°03.3'		Dra	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; situata all'interno di un piccolo triangolo ottusangolo di stelline — 450x.
CGCG 370-3A	gx	12h00m39s	+88°08.2'		UMi	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e a tratti debolmente screziata a 450x, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N (altresì riportata come CGCG 370-3B).
CGCG 370-4B	gx	07h08m15s	+86°39.5'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' scarso W (altresì riportata come CGCG 362-33) — 450x.
CGCG 370-6B	gx	07h32m24s	+86°40.0'		Cep	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina molto debole al bordo SW — 450x.
CGCG 370-7B	gx	08h06m06s	+86°42.6'		Cep	24"	ottima / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20", ma è meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 370-11B	gx	08h06m06s	+86°42.6'		UMi	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 370-12B	gx	17h45m16s	+87°38.5'		UMi	24"	buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di ~ 30" — 450x.
CGCG 370-15B	gx	20h56m41s	+87°52.8'		UMi	24"	buona / ottimo	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi, ma osservabile solo in visione distolta — 450x.
CGCG 372-8	gx	20h02m40s	+01°52.0'		Aql	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, con tenue nucleo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E e un'altra più brillante a S — 450x.
CGCG 372-9	gx	20h06m45s	−01°44.5'		Aql	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, ma tuttavia appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø < 40" (il campo è abbastanza ricco di stelle anche ad alti ingrandimenti).
CGCG 372-10	gx	20h07m18s	+03°08.2'		Aql	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a S e un'altra più brillante e poco più distante verso NW — 450x.
CGCG 372-12	gx	20h09m36s	+03°13.0'		Aql	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza forse circolare, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE e un'altra appena percettibile a ridosso E — 450x.
CGCG 372-15	gx	20h13m05s	+01°14.3'		Aql	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 372-18	gx	20h14m12s	+03°14.2'		Aql	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 372-19	gx	20h17m33s	+00°00.1'		Aql	24"	buona / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso verso W e un'altra di luminosità simile poco più lontana verso E — 400x.
CGCG 372-20	gx	20h18m26s	+02°18.9'		Aql	24"	buona / buono	debolissima lama di luce estesa sì e no 1' e orientata da E a W, poco meglio definita scalando a 340x; situata subito a N di un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti; una coppia serrata di deboli stelline si trova quasi a ridosso S della gx — 450x.
CGCG 373-1	gx	20h20m11s	+02°41.4'		Aql	24"	buona / buono	molto diffusa e situata a ridosso E di una stellina abbastanza brillante che ne confonde la forma; forse circolare con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 373-4	gx	20h21m34s	+03°35.9'		Aql	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso E — 450x.
CGCG 373-7	gx	20h26m15s	+01°06.2'		Aql	24"	buona / buono	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 373-11	gx	20h26m56s	−02°16.6'		Aql	24"	m. buona / buono	nella posizione indicata è presente solo una stellina brillante; solo in visione distolta si nota, ogni tanto, che l'alone attorno a questa non è perfettamente rotondo, ma leggermente ovalizzato in direzione E-W, ma potrebbe trattarsi di un effetto visivo — 450x.
CGCG 373-12	gx	20h28m07s	+01°02.2'		Aql	24"	buona / buono	anche questa è debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, forse circolare con Ø < 30" — 450x.
CGCG 373-15	gx	20h28m10s	+00°29.5'		Aql	16"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, ma relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e condensazione centrale evidente a 380x; c'è una stellina a ridosso verso W.
CGCG 373-16	gx	20h29m25s	−00°10.4'		Aql	24"	buona / buono	relativamente compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 400x.
CGCG 373-19	gx	20h30m00s	−00°51.3'		Aql	24"	m. buona / buono	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme; è situata in mezzo a 2 stelline brillanti orientate da NNW a SSE e distanti 3' — 450x.
CGCG 373-22	gx	20h30m23s	−00°50.5'		Aql	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; è incastonata in un piccolo triangolo isoscele formato con una stellina ben evidente a SW e altre due molto deboli rispettivamente a S e SW — 450x.
CGCG 373-23	gx	20h30m31s	−01°00.8'		Aql	24"	m. buona / buono	debole poco diffusa e con nucleo stellare abbastanza evidente rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina subito a SE — 450x.
CGCG 373-24	gx	20h30m31s	+01°52.0'		Aql	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; il campo è ricco di stelle brillanti: una si trova subito a N della gx — 400x.
CGCG 373-26	gx	20h30m39s	−02°19.5'		Aql	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; sembra a prima vista aggettare verso N da una stellina — 450x.
CGCG 373-28	gx	20h31m13s	+00°16.5'		Aql	24"	buona / m. buono	è una debolissima lama di luce estesa 1' scarso e orientata da NE a SW; c'è una debole stellina a 1' N; sembra poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 373-29	gx	20h31m27s	−01°58.5'		Aql	24"	buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 400x.
CGCG 373-32	gx	20h32m40s	+00°37.9'		Aql	24"	ottima / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia stretta di deboli stelline a 1.5' SW — 450x.
CGCG 373-36	gx	20h33m36s	+02°37.8'		Del	24"	ottima / buono	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 373-40	gx	20h36m09s	+01°44.1'		Aql	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 340x.
CGCG 373-41	gx	20h37m01s	+02°48.3'		Del	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"; è situata a ridosso E di una stella brillante che disturba la visione facendo perdere contrasto; la visione non migliora sensibilmente forzando a 580x.
CGCG 373-42	gx	20h37m06s	−01°56.8'		Aql	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE; un'altra stellina, più brillante, si trova a 1' verso NW — 450x.
CGCG 373-44	gx	20h38m38s	+01°44.3'		Aqr	24"	buona / buono	un debolissimo baffo di luce che aggetta verso NW da una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi; appare però solo a momenti in visione distolta a 450x.
CGCG 373-45	gx	20h39m22s	+02°05.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a NE — 340x.
CGCG 373-46	gx	20h39m26s	+02°01.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da NNE a SSW (come UGC 11607 situata 4.5' verso E), di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso verso SE — 340x.
CGCG 373-49	gx	20h40m11s	−01°37.1'		Aqr	24"	buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi scarsi — 450x.
CGCG 374-1	gx	20h43m38s	−01°47.6'		Aqr	24"	ottima / buono	piccola molto debole e poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 374-2	gx	20h43m53s	−01°52.6'		Aqr	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso sud — 450x.
CGCG 374-3	gx	20h43m56s	−00°22.8'		Aqr	24"	ottima / buono	è un debolissimo baffo di luce che aggetta a N di una stellina luminosa per una 30-ina di secondi (estesa grosso modo come la distanza delle due stelline situate 1' a E); poco meglio evidente in visione distolta forzando a 580x.
CGCG 374-8	gx	20h44m58s	+01°30.8'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; presenta un bassissimo contrasto sul fondo cielo, ma la visione non migliora scalando a 340x.
CGCG 374-9	gx	20h45m50s	+00°10.7'		Aqr	16"	m. buona / buono	debole, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30", con tenue e piccolo bulge visibile abbastanza facilmente a 380x — ci sono 2 stelline ravvicinate a 1' SE.
CGCG 374-10	gx	20h46m16s	−00°13.3'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
CGCG 374-11	gx	20h46m38s	+00°20.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	situata nel campo di NGC 6962 — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30".
CGCG 374-12	gx	20h46m45s	−01°22.1'		Aqr	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 374-20	gx	20h50m52s	−00°19.5'		Aqr	24"	buona / buono	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 450x.
CGCG 374-21	gx	20h52m22s	+00°04.5'		Aqr	24"	buona / buono	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SW e una coppia di stelline a S; stellina appena percettibile al bordo SE — 340x.
CGCG 374-24	gx	20h54m33s	−00°07.1'		Aqr	24"	buona / buono	assieme a CGCG 374-25 e CGCG 374-26 fa parte di un terzetto orientato da N a S e situato a cavallo dell'equatore celeste — questa è la più difficile, debolissima e molto piccola, rotonda con Ø di max 15" — 450x.
CGCG 374-25	gx	20h54m32s	+00°02.5'		Aqr	24"	buona / buono	assieme alla precedente e alla successiva fa parte di un terzetto orientato da N a S e situato a cavallo dell'equatore celeste —questa è invece la più evidente del trio; è comunque molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 374-26	gx	20h54m41s	−00°03.1'		Aqr	24"	buona / buono	assieme alle due precedenti fa parte di un terzetto orientato da N a S e situato a cavallo dell'equatore celeste —debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 374-27	gx	20h55m19s	+00°32.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 374-29	gx	20h55m22s	+02°21.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e condensata, disturbata da una stella abbastanza brillante situatale a ridosso verso SE; la gx è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 374-30	gx	20h55m36s	−00°38.2'		Aqr	24"	buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo molto debole, condensato e con Ø di una 30-ina di secondi; è situato a ridosso NE di una doppia stretta e sbilanciata — 450x.
CGCG 374-31	gx	20h56m42s	−00°49.1'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 374-32	gx	20h56m58s	+02°17.2'		Aqr	24"	ottima / buono	chiazza circolare molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 374-33	gx	20h57m07s	+02°16.9'		Aqr	24"	ottima / buono	è un piccolo oggetto molto tenue, diffuso ed esteso una 20-ina di secondi che in visione distolta sembra aggettare a N dalla più meridionale di una coppia di stelline brillanti orientate da NW a SE e distanti 40"; meglio visibile a 450x.
CGCG 374-34	gx	20h58m38s	+00°54.8'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 374-35	gx	20h59m36s	+02°10.0'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×40" e gradatamente più brillante verso l'interno; situata all'interno di un asterismo di 9 stelle di cui 5 brillanti — 450x.
CGCG 374-38	gx	21h01m16s	+02°20.7'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 374-39	gx	21h01m33s	+01°37.5'		Aqr	24"	discreta / buono	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni; c'è una stellina a ridosso verso SW (la quale fa parte di una stringa di 4 componenti allineate da N a S).
CGCG 374-40	gx	21h02m04s	−02°10.2'		Aqr	24"	ottima / buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 374-42	gx	21h04m42s	+00°26.9'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" o poco più; alcune stelle brillanti nel campo disturbano un poco l'osservazione — 450x.
CGCG 374-43	gx	21h06m22s	−00°46.3'		Aqr	24"	ottima / buono	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
CGCG 375-2	gx	21h09m23s	−01°50.2'		Aqr	24"	buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 375-3	gx	21h10m48s	−01°58.9'		Aqr	16"	ottima / ottimo	debolissima, molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare solo a tratti in visione distolta a 380x a ridosso SW di una stellina.
CGCG 375-4	gx	21h11m07s	−02°02.3'		Aqr	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, di ~ 30" di Ø e con nucleo stellare ben visibile a 380x; c'è una doppia stretta a 1' verso E.
CGCG 375-5	gx	21h11m15s	+03°31.3'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole, poco diffusa e condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 375-9	gx	21h12m18s	−01°19.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente facile, poco diffusa, orientata da E a W con dimensioni 20"×15"; allineata ed equidistante con 2 stelle brillanti a S (quella più a S è la SAO 145196 di magnitudo 9.5) — 450x.
CGCG 375-10	gx	21h12m55s	+01°40.0'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole e spampanata, di aspetto a prima vista un po' confuso, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio evidente e contrastata a 340x.
CGCG 375-11	gx	21h13m13s	−00°22.0'		Equ	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 375-12	gx	21h13m19s	−00°09.9'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" (situata 12' a N di CGCG 375-11) — 450x.
CGCG 375-14	gx	21h13m33s	−01°22.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 375-16	gx	21h14m00s	+00°32.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, diffusa, con nucleo stellare e Ø di 20" scarsi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di SE — 450x.
CGCG 375-22	gx	21h16m04s	+01°01.1'		Aqr	24"	buona / buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina appena percettibile subito a S — 450x.
CGCG 375-26	gx	21h19m00s	−00°57.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 375-32	gx	21h22m59s	+01°01.6'		Aqr	24"	ottima / buono	piccola, debole e relativamente compatta, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina subito a W; situata a fianco, verso E, di un asterismo di stelle brillanti; un altro asterismo curioso di 5 stelle foggiato a "paletta" si trova 5' o 6' più a E — 450x."
CGCG 375-33	gx	21h23m24s	+02°11.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 375-38	gx	21h27m40s	+03°14.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; la visione è purtroppo disturbata dalla SAO 126812 di magnitudo 7.5 situata 7' a SE — 450x.
CGCG 375-43	gx	21h28m51s	+01°15.5'		Aqr	24"	buona / buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E. In visione distolta appare un piccolo debolissimo oggetto, non più esteso di 10" o 15" subito a N della gx: da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la PGC 1189544 — 450x.
CGCG 375-44	gx	21h29m13s	−00°17.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 375-48	gx	21h31m00s	−00°00.0'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 376-1	gx	21h31m43s	+00°21.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta a 450x; è allungata da N a S con dimensioni 30"×15".
CGCG 376-3	gx	21h31m48s	+03°35.3'		Peg	24"	buona / buono	diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a ridosso verso E — 450x.
CGCG 376-4	gx	21h32m12s	−02°11.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa, e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni poco superiori a 20"×10" — 450x.
CGCG 376-6	gx	21h32m38s	+02°31.7'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E — 450x.
CGCG 376-7	gx	21h32m35s	+02°41.7'		Peg	16"	m. buona / buono	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, relativamente compatta e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' verso W — 380x.
CGCG 376-8	gx	21h32m42s	−00°07.7'		Aqr	24"	buona / buono	debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 376-9	gx	21h33m04s	−01°30.2'		Aqr	24"	ottima / buono	debolissima e situata in una piccola zona depleta; in visione distolta appare a tratti posta praticamente di taglio, estesa una 40-ina di secondi e orientata da NE a SW — 450x.
CGCG 376-12	gx	21h35m10s	+00°33.6'		Aqr	24"	ottima / buono	debolissima e diffusa, molto piccola, forse circolare con Ø < 20"; c'è una debole stellina a 1' scarso verso E — 450x.
CGCG 376-16	gx	21h37m08s	+00°26.8'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; meglio visibile scalando a 340x.
CGCG 376-17	gx	21h37m22s	+00°23.8'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole e più piccola, sia di CGCG 376-16, sia di CGCG 376-18, con Ø < 20" e nucleo stellare visibile a tratti a 450x.
CGCG 376-18	gx	21h37m40s	+00°34.9'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di max 20"; molto disturbata dalla SAO 126934 di 7ª grandezza situata ad appena 1.5' verso E — 450x.
CGCG 376-19	gx	21h39m13s	−00°30.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo, non più esteso di 15" e privo di condensazione; forma un piccolo triangolo equilatero con una stellina brillante a meno di 1' NNE e un'altra debole a E — 450x.
CGCG 376-24	gx	21h42m10s	+02°39.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; è allineata con 2 stelline brillanti a NW — 450x.
CGCG 376-25	gx	21h43m38s	+02°38.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
CGCG 376-26	gx	21h43m53s	−00°59.0'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma abbastanza compatta; tutto sommato appare facilmente in d a 450x, orientata da E a W con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme.
CGCG 376-27	gx	21h43m51s	−00°19.3'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e condensata, probabilmente rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso S — 450x.
CGCG 376-28	gx	21h44m52s	+01°32.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa e con tenue nucleo stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 376-29	gx	21h45m07s	+03°06.0'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e leggermente più brillante all'interno — 450x.
CGCG 376-30	gx	21h45m20s	−02°12.4'		Aqr	24"	ottima / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di 30" scarsi — 450x.
CGCG 376-33	gx	21h48m28s	+01°52.6'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta a 1' verso S — 450x.
CGCG 376-36	gx	21h50m51s	−00°50.9'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con condensazione centrale visibile a tratti, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 376-40	gx	21h51m08s	+02°42.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 376-41	gx	21h51m20s	−01°39.0'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 376-42	gx	21h51m18s	−00°57.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, con nucleo stellare, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo orientale — 450x.
CGCG 376-43	gx	21h51m15s	+02°30.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è una debole chiazza poco diffusa e relativamente facile da individuare a 450x che aggetta verso E da una stellina brillante per una 20-ina di secondi.
CGCG 376-46	gx	21h52m03s	+03°03.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, appare a 270x come una stellina leggermente sfocata a ~ 1' NW di una stellina brillante (la gx si trova a circa metà strada tra questa stellina e NGC 7147 — 380x.
CGCG 376-49	gx	21h53m08s	+03°42.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo approssim. circolare con Ø di 45"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio visibile scalando a 340x; praticamente allineata con 3 stelline a E.
CGCG 376-51	gx	21h53m27s	+00°22.3'		Aqr	24"	buona / buono	elusiva, appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotti i 450x (a 340x di fatto non sono riuscito a scorgerla); forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 376-52	gx	21h54m19s	+00°21.3'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina subito a NW — 450x.
CGCG 377-2	gx	21h56m10s	−01°38.4'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una catena di 4 stelle brillanti di distanza via via crescente che da 1.5' a E della galassia si diparte verso S — 450x.
CGCG 377-4	gx	21h56m51s	+02°10.3'		Aqr	16"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 377-5	gx	21h56m21s	+02°21.1'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; è comunque molto disturbata da due stelle brillanti distanti poco più di 1' in direzione N-S, la più a N delle quali si trova subito a SW della gx — 450x.
CGCG 377-7	gx	21h56m45s	+02°35.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme; è posta praticamente a perpendicolo con una coppia ravvicinata di stelline abbastanza brillanti distanti < 30" (quella a SW è più luminosa) — 450x.
CGCG 377-11	gx	22h00m51s	−01°50.3'		Aqr	24"	ottima / buono	debole e poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 377-12	gx	22h02m25s	−02°06.2'		Aqr	16"	ottima / discreto	poco più evidente di CGCG 377-13 e di dimensioni simili, rotonda e con tenue condensazione centrale — 270x.
CGCG 377-13	gx	22h01m41s	−02°05.9'		Aqr	16"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, estesa per ~ 30"; salta fuori in visione distolta — 270x.
CGCG 377-19	gx	22h04m13s	−00°01.9'		Aqr	24"	buona / buono	molto piccola, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 20"×15" e a tratti leggermente condensata — 450x.
CGCG 377-20	gx	22h04m25s	+00°43.0'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" e condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 377-22	gx	22h04m51s	+02°30.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, orientata da N a S e con dimensioni analoghe a IC 1428 , ossia 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso verso SW — 450x.
CGCG 377-24	gx	22h06m21s	+01°07.3'		Aqr	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una evidente condensazione stellare — 450x.
CGCG 377-26	gx	22h06m35s	+00°03.4'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 377-27	gx	22h07m14s	−00°35.9'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 377-28	gx	22h07m54s	+01°22.5'		Aqr	24"	ottima / buono	piccola e debolissima, molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata a ridosso S di una debole stellina; un'altra stellina brillante si trova a 1' verso S — 450x.
CGCG 377-29	gx	22h07m57s	+00°22.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, appare a momenti orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; l'orientamento, tuttavia, si nota meglio scalando a 340x.
CGCG 377-32	gx	22h09m06s	+02°01.0'		Aqr	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 377-33	gx	22h09m26s	−01°38.8'		Aqr	24"	m. buona / buono	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi SW e un'altra appena percettibile a poco più di 1' verso E — 450x.
CGCG 377-34	gx	22h10m29s	−00°01.3'		Aqr	24"	m. buona / buono	molto debole, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 377-36	gx	22h11m09s	+02°06.4'		Aqr	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare osservabile a 450x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
CGCG 377-37	gx	22h11m28s	+01°56.1'		Aqr	24"	m. buona / buono	debole, piccola e relativamente compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una debole stellina a una 40-ina di secondi verso NW — 450x.
CGCG 377-38	gx	22h11m49s	+02°26.3'		Aqr	24"	m. buona / buono	debole, appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 377-39	gx	22h11m53s	+00°06.5'		Aqr	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 377-40	gx	22h14m21s	+01°01.1'		Aqr	24"	ottima / buono	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 377-41	gx	22h14m55s	+00°16.5'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 377-44	gx	22h18m38s	−01°34.2'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30 — 450x.
CGCG 377-46	gx	22h19m25s	+02°26.4'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.

CGCG 378-2	gx	22h22m32s	+02°46.5'		Peg	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è disturbata da una stellina brillante situata < 1' verso SW — 450x.
CGCG 378-3	gx	22h24m09s	+02°43.7'		Peg	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 378-4	gx	22h25m43s	+03°13.9'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; è situata sul lato occidentale di un piccolo triangolo isoscele formato da deboli stelline: la componente più a N è praticamente a ridosso della galassia — 450x [questa è la mia 20-millesima galassia osservata — 3 ottobre 2016].
CGCG 378-5	gx	22h26m03s	+01°12.3'		Aqr	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 378-6	gx	23h26m15s	+00°40.1'		Aqr	24"	ottima / buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 378-7	gx	22h26m27s	+03°28.4'		Peg	24"	ottima / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso NE — 450x.
CGCG 378-8	gx	22h27m21s	−01°22.0'		Aqr	24"	ottima / buono	è un lucore molto tenue, diffuso e di forma indistinta, situato all'interno di un piccolo triangolo molto allungato: le due stelline più vicine sono praticamente a ridosso della gx; la visione è comunque disturbata dalla SAO 146092 di 7ordf; grandezza situata 5' a NW — 450x.
CGCG 378-9	gx	22h28m51s	−01°53.9'		Aqr	16"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 270x.
CGCG 378-11	gx	22h33m33s	+01°51.0'		Aqr	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; disturbata dalla SAO 127601 di 8ª grandezza situata 4' scarsi a E — 450x.
CGCG 378-12	gx	22h34m16s	+03°35.2'		Peg	24"	ottima / buono	poco diffusa e con piccola condensazione centrale appena visibile, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 378-13	gx	22h39m18s	−01°42.0'		Aqr	24"	buona / buono	è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si fissa l'occhio su quella stellina molto debole situata ~ 1' a ENE; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio evidente e contrastata scalando a 340x.
CGCG 378-14	gx	22h40m29s	+03°11.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto disturbata dalla SAO 127679 di magnitudo 8.6 situata 4' a S; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20", ma è meglio non scendere sotto i 450x.
CGCG 378-15	gx	22h40m30s	+03°21.5'		Peg	24"	buona / buono	debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" e nucleo stellare abbastanza marcato (la Croce di Einstein non è tuttavia visibile neppure a 570x).
CGCG 378-17	gx	22h42m58s	−02°04.5'		Aqr	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno; in visione distolta appare circolare con Ø di una 40-ina di secondi; la visione è un po' disturbata da una stellina brillante situata 1' a NNW — 450x.
CGCG 378-18	gx	22h43m11s	+03°28.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale a tratti stellare, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 379-1	gx	22h44m01s	+01°40.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso N — 450x.
CGCG 379-9	gx	22h51m31s	+01°28.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola e disturbata chiazza circolare di luminosità uniforme con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata da un triangolo molto schiacciato di stelline brillanti, una della quali è situata a 1.5' SE — 450x.
CGCG 379-15	gx	22h55m17s	+02°14.8'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente facile, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20", con bulge diffuso ed evidente — 450x.
CGCG 379-19	gx	22h58m39s	+02°55.4'		Psc	24"	buona / buono	debole, molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 379-24	gx	23h03m41s	+01°02.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele schiacciato con due stelline, a NE e NW — 450x.
CGCG 379-25	gx	23h03m38s	+01°51.0'		Psc	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 379-27	gx	23h04m30s	+02°18.7'		Psc	24"	buona / buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, diffusa alle estremità, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 450x.
CGCG 379-33	gx	23h05m56s	+02°59.4'		Psc	16"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme; a tratti appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 270x.
CGCG 380-5	gx	23h11m10s	−00°09.1'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 380-7	gx	23h12m05s	−01°34.4'		Psc	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 380-9	gx	23h12m20s	−01°32.0'		Psc	24"	buona / buono	chiazza circolare molto diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a ridosso verso E che disturba un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 380-15	gx	23h14m50s	−00°14.5'		Psc	24"	buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di di 12"-15" — 450x.
CGCG 380-17	gx	23h15m14s	−01°14.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline a SSW e a SSE: quest'ultima è più brillante — 450x.
CGCG 380-18	gx	23h15m43s	+00°24.7'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 270x.
CGCG 380-19	gx	23h15m46s	+01°01.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 380-23	gx	23h18m08s	−00°23.4'		Psc	16"	m. buona / discreto	debole, diffusa, rotonda con Ø forse > 30"; presenta una piccola e tenue condensazione centrale visibile a tratti a 270x.
CGCG 380-27	gx	23h19m00s	+02°51.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 380-29	gx	23h19m28s	−01°49.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	assieme a CGCG 380-31 forma una coppia di oggetti molto deboli di aspetto simile, facilmente osservabili a 380x, di luminosità uniforme e dimensioni non superiori ai 20".
CGCG 380-30	gx	23h19m23s	+01°07.6'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 380-31	gx	23h12m31s	−01°50.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	v. **CGCG 380-29**
CGCG 380-33	gx	23h20m07s	−00°21.0'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo meridionale — 450x.
CGCG 380-35	gx	23h20m29s	−01°00.1'		Psc	16"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma un triangolo isoscele con 2 stelline: 2.5' NNE e 2.5' WNW 270x.
CGCG 380-38	gx	23h21m07s	+00°24.0'		Psc	24"	buona / buono	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SE — 450x.
CGCG 380-39	gx	23h21m07s	+02°53.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 380-41	gx	23h21m25s	−00°59.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 380-42	gx	23h21m39s	+01°26.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; si trova in mezzo a 2 stelline distanti 2.5', una a WNW e l'altra più debole a ESE.
CGCG 380-43	gx	23h21m52s	−00°41.4'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, a tratti appare allungata da N a S con dimensioni ~ 60"×20" — 270x.
CGCG 380-44	gx	23h22m05s	+01°28.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' verso E un'altra di luminosità simile a 1' scarso SW — 450x.
CGCG 380-45	gx	23h22m00s	+01°41.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 380-46	gx	23h22m23s	+03°29.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 380-47	gx	23h22m39s	−00°59.1'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una doppia stretta a meno di 1' verso S — 450x.
CGCG 380-49	gx	23h23m00s	+01°24.4'		Psc	24"	m. buona / ottimo	allungata da N a S con dimensioni 30"×15", poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina una 40-ina di secondi a W — 450x.
CGCG 380-51	gx	23h24m20s	+01°26.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, a tratti leggermente condensata, rotonda con Ø max di 15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N; una stellina appena percettibile appare a momenti a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 380-53	gx	23h24m45s	+01°01.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma si trova in una piccola zona di cielo depleta a 450x (e d'altra parte non riesco a vederla scalando a 340x); forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; una stellina appena percettibile salta fuori a ~ 1' verso NE.
CGCG 380-55	gx	23h26m16s	−01°58.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 380-56	gx	23h26m30s	+01°57.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e con condensazione stellare visibile solo a momenti, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 380-57	gx	23h26m31s	+00°50.2'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 380-58	gx	23h26m33s	+02°19.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	assieme a CGCG 380-59 forma una coppia di gx relativamente facili, diffuse e di aspetto simile, con gli assi maggiori orientati a perpendicolo; la 1ª è allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20", mentre la 2a, appena più piccola, lo è da NW a SE; presentano entrambe un tenue bulge abbastanza evidente — 450x.
CGCG 380-59	gx	23h26m34s	+02°20.1'		Psc	24"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 380-58**
CGCG 380-60	gx	23h26m41s	+03°45.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 380-67	gx	23h31m03s	−02°13.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina a un paio di primi scarsi SSW — 450x.
CGCG 381-2	gx	23h32m14s	+02°24.5'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente facile, piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 381-8	gx	23h33m52s	−01°20.0'		Psc	24"	buona / discreto	debole lama di luce, poco diffusa, orientata da NE a SW, estesa 45" e con nucleo stellare appena percettibile; l'osservazione è disturbata dalla SAO 146780 di 6ª grandezza situata 6.5' a NE — 450x.
CGCG 381-10	gx	23h36m07s	−01°53.7'		Psc	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 381-14	gx	23h37m08s	−01°21.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto debole e di luminosità uniforme, solo a tratti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 45"×30", ma occorre restare a 450x (a 340x è più confusa).
CGCG 381-15	gx	23h37m20s	−01°41.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E; è situata tra 2 stelline orientate all'incirca da N a S e distanti 4': quella a S è più brillante — 450x.
CGCG 381-17	gx	23h37m43s	−00°31.1'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; c'è una coppia stretta e sbilanciata a 1' verso E; la gx si trova all'interno di un piccolo triangolo irregolare di stelline brillanti — 450x.
CGCG 381-18	gx	23h38m52s	+01°47.3'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissimo lucore circolare, molto diffuso e di luminosità uniforme, con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E; forse poco meglio evidente a 188x.
CGCG 381-19	gx	23h39m09s	+00°27.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 381-20	gx	23h39m25s	−01°26.9'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di una 40-ina di secondi; è situata tra 2 stelline distanti 3.5' e orientate da NW a SE: quella a SE è più brillante — 270x.
CGCG 381-21	gx	23h39m41s	−00°02.1'		Psc	24"	buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di < 20"; c'è una stellina brillante a 1' SE — 450x.
CGCG 381-23	gx	23h40m30s	+02°46.5'		Psc	16"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NNW a SSE con dimensioni 40"×30" (a perpendicolo con la congiungente delle 2 stelline subito a N e a NW — 270x.
CGCG 381-24	gx	23h41m08s	−01°02.3'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 381-27	gx	23h41m40s	−01°20.0'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto di 10"-15" di Ø che appare solo a tratti in visione distolta a un paio di primi NW di UGC 12739 — 380x.
CGCG 381-29	gx	23h41m52s	+03°14.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 381-30	gx	23h42m41s	+01°57.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 381-31	gx	23h43m56s	+00°13.1'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 381-32	gx	23h43m58s	+02°44.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale quasi stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 381-34	gx	23h44m06s	+01°28.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 381-35	gx	23h44m14s	+00°48.2'		Psc	24"	m. buona / buono	piccolo e debole oggetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø e leggermente più brillante all'interno; allineata ed equidistante con 3 stelline situate a NE — 450x.
CGCG 381-37	gx	23h44m22s	+02°48.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 381-39	gx	23h45m06s	−02°02.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 381-44	gx	23h46m54s	+01°46.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 381-45	gx	23h47m00s	−00°26.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione stellare — 450x.
CGCG 381-47	gx	23h47m13s	−00°28.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 381-48	gx	23h47m21s	+01°56.0'		Psc	16"	ottima / scarso	molto debole, diffusa, appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
CGCG 381-49	gx	23h48m18s	+02°30.5'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; in visione distolta sembra quasi aggettare verso E da una stellina brillante — 450x.
CGCG 381-50	gx	23h48m30s	−01°31.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 381-51	gx	23h48m42s	+02°14.4'		Psc	24"	m. buona / buono	debole chiazza rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme, purtroppo immersa nei bagliori della SAO 128393 di 7ª situata un paio di primi a SE — 450x.
CGCG 381-54	gx	23h50m47s	−02°11.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso WNW — 450x.
CGCG 381-58	gx	23h53m31s	−00°44.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, con piccolo bulge diffuso e nucleo stellare visibile a momenti, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 381-59	gx	23h53m49s	−00°58.5'		Psc	24"	buona / buono	molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 60"×15" e con tenue bulge diffuso poco contrastato; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 381-62	gx	23h55m16s	−01°25.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e con condensazione stellare evidente, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 382-5	gx	23h56m13s	−00°32.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW (ossia a perpendicolo con la congiungente di 2 stelle brillanti con le quali forma un triangolo irregolare e schiacciato: la componente a E è una doppia stretta) con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 382-12	gx	23h59m22s	+01°52.5'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 382-13	gx	23h59m29s	+01°35.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e con tenue condensazione stellare, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 382-14	gx	00h00m04s	−00°05.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline, la più occidentali delle quali è molto brillante — 450x.
CGCG 382-15	gx	00h00m08s	−00°02.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	di aspetto e dimensioni simili alla precedente, forse poco meno diffusa; è disturbata da una coppia di stelline brillanti situate 1.5' a S e 2.5' a SW — 450x.
CGCG 382-16	gx	00h00m13s	+01°07.2'		Psc	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono 2 stelle brillanti presenti nello stesso campo: a 3.5' SW e a 6' SE — 450x.
CGCG 382-17	gx	00h00m36s	−01°45.8'		Psc	24"	buona / buono	poco diffusa e leggermente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 382-20	gx	00h02m53s	+03°30.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole e relativamente compatta, con condensazione quasi stellare appena percettibile, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 382-22	gx	00h03m17s	+03°37.3'		Psc	24"	buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 382-23	gx	00h04m07s	−00°51.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 382-24	gx	00h04m47s	−01°34.2'		Psc	24"	buona / buono	allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20", poco diffusa e di luminosità uniforme; è allineata con 2 stelline a N — 450x.
CGCG 382-25	gx	00h04m49s	−01°29.9'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 382-26	gx	00h05m03s	−01°41.6'		Psc	24"	m. buona / buono	appare facilmente in visione distolta, molto piccola con dimensioni max di 15" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 382-27	gx	00h06m57s	+03°06.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	forma un terzetto serrato con MAC 0006+0306A e MAC 0006+0306B — le tre componenti si riescono a separare facilmente a 450x, ma spingendo a 580x la visione sembra ancora migliore; la CGCG è piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensata; la prima MAC è la più debole delle 3, rotonda con Ø di una decina di secondi; l'altra MAC è più piccola, relativamente compatta e condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10".
CGCG 382-29	gx	00h10m39s	−00°13.2'		Psc	24"	m. buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø > 30" e tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 382-30	gx	00h11m06s	+02°40.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; disturbata dalla SAO 109063 di 9ª grandezza situata un paio di primi a SE — 450x.
CGCG 382-31	gx	00h11m40s	−00°28.5'		Psc	24"	buona / buono	oggetto rotondo molto piccolo e molto debole, con condensazione centrale visibile a tratti a 400x e Ø max di 20".
CGCG 382-33	gx	00h12m10s	+01°47.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 382-38	gx	00h16m37s	+01°32.1'		Psc	16"	ottima / buono	elusiva macchiolina di luce osservabile solo a tratti in visione distolta; salta fuori facilmente a 270x.
CGCG 382-39	gx	00h16m40s	+01°36.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono due deboli stelline a ridosso E e NE (forma una coppia ravvicinata con MCG+0-1-54 situata subito a S) — 450x.
CGCG 382-40	gx	00h16m47s	+00°42.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 382-42	gx	00h17m55s	+00°20.1'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; un tenuissimo nodulo all'estremità SW, è visibile solo a momenti, è risultato essere la MAC 0017+0019; quest'ultima è meglio visibile spingendo a 580x, ma la gx principale si disperde troppo.
CGCG 382-41	gx	00h17m26s	−00°58.7'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40" — 400x.
CGCG 383-8	gx	00h24m19s	−01°38.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 383-12	gx	00h25m15s	−01°06.7'		Psc	24"	m. buona / buono	molto diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 383-20	gx	00h27m52s	+03°29.4'		Psc	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a NW e un'altra appena percettibile quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 383-26	gx	00h28m48s	+03°25.8'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola, relativamente brillante e compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 383-31	gx	00h29m48s	−00°14.7'		Cet	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 383-34	gx	00h31m58s	+02°37.9'		Psc	24"	m. buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 383-44	gx	00h37m36s	+00°16.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 383-48	gx	00h38m28s	+00°07.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 383-49	gx	00h38m30s	+01°42.6'		Cet	24"	discreta / buono	piccola, debole, relativamente compatta e condensata, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 383-50	gx	00h39m00s	+01°52.7'		Cet	24"	discreta / buono	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
CGCG 383-52	gx	00h39m20s	−02°08.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 383-65	gx	00h40m35s	+01°40.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è un piccolo asterismo di 4 stelle foggiato a "L" a 3.5' verso S: la componente più occidentale è leggermente diffusa e in effetti, da un controllo successivamente effettuato, è risultata poi essere la piccola PGC 143672 — 450x.
CGCG 383-71	gx	00h41m56s	−01°54.5'		Cet	24"	buona / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione centrale quasi stellare percepibile a 400x.
CGCG 383-72	gx	00h41m48s	−01°44.2'		Cet	16"	m. buona / ottimo	si vede facilmente a 380x, piccola, con Ø poco superiore a 30" e con evidente condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una stellina a poco più di 1' NNW.
CGCG 383-77	gx	00h42m39s	+02°44.2'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" — 450x.
CGCG 384-5	gx	00h48m00s	+01°12.2'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, con tenue bulge diffuso appena percettibile, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 384-12	gx	00h50m05s	−01°57.1'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e leggermente condensata, allungata da NE a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 384-16	gx	00h52m00s	−00°29.2'		Cet	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; presenta una condensazione centrale appena percettibile a 380x.
CGCG 384-20	gx	00h53m29s	+02°46.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 384-28	gx	00h55m19s	−01°16.6'		Cet	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 119** che vede al centro UGC 579 e UGC 583 già osservate col 16" in altra data — relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 384-29	gx	00h55m13s	−01°04.6'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; meglio definita a 450x.
CGCG 384-32	gx	00h56m03s	−01°20.0'		Cet	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 119** — rotonda con Ø < 30", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 384-33	gx	00h56m01s	+03°33.6'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 384-35	gx	00h56m11s	−01°07.0'		Cet	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso AGC 119 — piccola, debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 384-36	gx	00h56m23s	−01°12.5'		Cet	24"	buono/ buono	fa parte dell'ammasso **AGC 119** — relativamente compatta, orientata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge quasi stellare — 450x.
CGCG 384-37	gx	00h56m26s	−01°16.5'		Cet	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 119** — diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale di aspetto stellare (è situata a ridosso S di UGC 583) — 450x.
CGCG 384-40	gx	00h56m39s	−01°17.7'		Cet	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso AGC 119 e assieme a CGCG 384-42 forma una coppia di gx di aspetto simile, molto piccole e abbastanza compatte, entrambe orientate da E a W con dimensioni 30"×10"; la 1ª si trova a 1' NE di una stellina brillante, mentre la 2ª è poco più evidente e con nucleo stellare maggiormente in risalto — 450x.
CGCG 384-41	gx	00h56m40s	−00°23.2'		Cet	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 384-42	gx	00h56m51s	−01°16.3'		Cet	24"	buona / buono	v. **CGCG 384-40**
CGCG 384-19	gx	00h52m53s	+01°12.8'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; allineata ed equidistante con due stelline a W; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 384-23	gx	00h53m53s	+00°58.8'		Cet	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×40" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 384-43	gx	00h56m52s	+00°00.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 384-53	gx	01h00m34s	−01°41.1'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, molto disturbata dalla SAO 129076 di 7ª grandezza situata un paio di primi a NE; rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x — 1' NW di UGC 626.
CGCG 384-55	gx	01h01m08s	+00°51.5'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 384-59	gx	01h02m51s	−01°33.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina al bordo N — 450x.
CGCG 384-60	gx	01h02m48s	−01°28.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
CGCG 384-64	gx	01h04m15s	−01°06.8'		Cet	24"	buona / discreto	piccola e debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 384-73	gx	01h06m24s	−00°08.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 384-74	gx	01h06m31s	−02°11.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme e di aspetto un po' confuso; dovrebbe essere estesa almeno 1', c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 384-75	gx	01h06m54s	+01°56.7'		Cet	24"	buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 384-76	gx	01h07m09s	−00°37.3'		Cet	24"	m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; non sembra particolarmente disturbata dalla SAO 129127 situata un paio di primi a NNW — 450x.
CGCG 385-6	gx	01h08m38s	+02°16.1'		Cet	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso AGC 147 — relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina debolissima visibile a tratti quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 385-7	gx	01h09m02s	+01°22.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 385-13	gx	01h10m01s	+00°24.7'		Cet	24"	buona / discreto	molto diffusa e con tenue condensazione centrale, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, ma la forma è un po' compromessa da una stellina brillante situata al bordo NE — 450x.
CGCG 385-32	gx	01h13m13s	+01°16.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e a tratti condensata, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina visibile solo a momenti a ridosso NW — 450x.
CGCG 385-33	gx	01h13m27s	+00°09.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 385-36	gx	01h14m10s	−01°51.2'		Cet	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' SE — 450x.
CGCG 385-39	gx	01h10m57s	+00°38.0'		Cet	24"	buona / discreto	molto debole e anche piuttosto spampanata, meglio contrastata scalando a 340x, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 385-40	gx	01h14m34s	+03°43.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 385-45	gx	01h14m47s	+01°07.3'		Cet	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 385-49	gx	01h15m00s	+01°41.5'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 385-50	gx	01h14m57s	+01°47.9'		Cet	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 385-54	gx	01h15m51s	+03°36.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, malgrado la vicinanza della SAO 109769 di magnitudo 9.4 situata ad appena 1' verso N; poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 385-63	gx	01h18m45s	−00°54.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è molto disturbata dalla SAO 129219 di 8ª grandezza (è doppia) situata a 2.5' NNW; è allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 385-66	gx	01h19m16s	+02°12.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, più che altro situata in una piccola zona di cielo depleta; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; equidistante con 2 stelline appena percettibili a E e NE — 450x.
CGCG 385-67	gx	01h19m23s	+02°15.2'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole e molto diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 385-68	gx	01h19m30s	+03°13.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante a ridosso S — 450x.
CGCG 385-73	gx	01h20m08s	+00°04.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 385-81	gx	01h21m26s	+03°38.5'		Psc	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare facilmente allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 385-82	gx	01h22m00s	−01°02.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 385-83	gx	01h21m57s	−01°00.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	situata 1.5' a NNW della precedente, è molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 385-86	gx	01h22m35s	−00°34.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 385-87	gx	01h22m36s	+01°53.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina brillante a un paio di primi WSW — 450x.
CGCG 385-88	gx	01h22m41s	+03°36.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 385-90	gx	01h22m46s	+01°43.8'		Cet	24"	ottima / buono	molto disturbata dalla SAO 109834 di 6ª grandezza situata 2.5' a W e da un'altra stella brillante alla stessa distanza dalla parte opposta; in visione distolta appare molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25" — 450x.
CGCG 385-93	gx	01h23m17s	−00°54.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 385-96	gx	01h23m26s	+01°42.3'		Cet	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina brillante a 1' NW; fa parte dell'ammasso AGC 189 — 450x.
CGCG 385-97	gx	01h23m38s	+01°33.8'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NW; fa parte dell'ammasso AGC 189 — 450x.
CGCG 385-98	gx	01h23m41s	+01°49.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 385-99	gx	01h23m56s	−01°38.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 385-100	gx	01h24m08s	−01°51.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×20", con tenue bulge diffuso e poco contrastato — 450x.
CGCG 385-102	gx	01h24m19s	−01°44.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è orientata da NNW a SSE (ossia a perpendicolo rispetto alla precedente), delle stesse dimensioni, ma con nucleo più piccolo ed evidente — 450x.
CGCG 385-105	gx	01h24m29s	+01°08.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 385-110	gx	01h24m49s	+00°54.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	più evidente di CGCG 385-105 — osservata subito prima e dalla quale dista 15' a SSE — relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 385-112	gx	01h24m51s	−01°41.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×15"; è di aspetto simile a CGCG 385-99, ma poco più evidente; situata all'interno dell'ammasso AGC 194 — 450x.
CGCG 385-125	gx	01h25m40s	+01°10.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 385-129	gx	01h25m51s	−01°19.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	situata a ridosso verso E di una coppia di stelline abbastanza brillanti; è di aspetto un po' confuso a 340x; a 450x appare chiaramente rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale quasi stellare (situata a 2.5' NW della coppia NGC 545,-7 osservata in altra data col 16").
CGCG 385-137	gx	01h26m31s	+01°27.5'		Cet	24"	ottima / buono	piccola e debole, poco diffusa e condensata, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 385-138	gx	01h26m44s	−01°18.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole è diffusa, a tratti allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 385-140	gx	01h26m24s	−00°56.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare con Ø non superiore a 15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 385-141	gx	01h26m56s	−00°00.9'		Cet	24"	ottima / buono	piccola e debolissima, solo a tratti condensata, immersa nei bagliori della SAO 129304 di 9ª grandezza; forse rotonda con Ø una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E — 450x.
CGCG 385-150	gx	01h27m57s	+02°08.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø < 30" e un nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 385-155	gx	01h28m30s	+00°00.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 385-161	gx	01h29m00s	+01°49.7'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 385-164	gx	01h30m19s	+02°24.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 385-167	gx	01h31m12s	−01°29.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 386-3	gx	01h31m51s	−02°13.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o poco più — 450x.
CGCG 386-13	gx	01h35m29s	+03°29.8'		Psc	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 386-17	gx	01h36m23s	+03°45.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; piuttosto disturbata dalla SAO 110007 di magnitudo 8.5 situata 2' a NNE — 450x.
CGCG 386-23	gx	01h38m41s	−00°09.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma più che altro difficile da vedere perché situata in una piccola zona di cielo depleta; in visione distolta appare tuttavia relativamente compatta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 386-28	gx	01h40m14s	−00°30.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 386-29	gx	01h41m25s	−02°06.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, meglio contrastata scalando a 340x nonostante la vicinanza di una stella brillante situata 4' scarsi a NE; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20".
CGCG 386-30	gx	01h42m16s	−02°13.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 386-31	gx	01h42m18s	−02°08.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, anche se disturbata dalla SAO 129461 di 8ª grandezza situata un paio di primi a SE; è rotonda con Ø < 30", poco diffusa e di luminosità uniforme; una debolissima "coda" estesa una 15-ina di secondi appare a tratti in visione distolta a SW della gx, poco meglio evidente forzando a 580x; quest'ultima è risultata essere la MAC 0142-0208.
CGCG 386-32	gx	01h42m30s	−00°49.2'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 386-37	gx	01h47m20s	+02°50.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N — 450x.
CGCG 386-39	gx	01h49m53s	+03°40.9'		Psc	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 386-44	gx	01h51m13s	−01°24.5'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N — 450x.
CGCG 386-45	gx	01h51m13s	−01°03.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.

CGCG 386-47	gx	01h52m24s	−01°08.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 386-48	gx	01h52m34s	+01°20.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 386-52	gx	01h54m22s	−00°37.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	è situata a ridosso verso N di una brillante stella di 10a; presenta un nucleo stellare circonfuso da un piccolo alone rotondo poco diffuso e con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a poco più di 30" NW (ma da un controllo effettuato si tratterebbe invece di PGC 1138730, di magnitudo 15.6 che a quanto pare resta di aspetto stellare anche a 450x).
CGCG 386-53	gx	01h54m26s	−00°12.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme; praticamente equidistante con 2 stelline brillanti a S — 380x.
CGCG 387-4	gx	01h56m48s	−00°12.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare abbastanza chiaramente allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; la visione era un po' disturbata sia dalla SAO 129575 di 9ª grandezza situata a 2.5' SE, sia dalla presenza della Luna di età 5 giorni a una 20-ina di gradi di distanza — 450x.
CGCG 387-6	gx	01h56m55s	−00°38.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un tenue nucleo stellare — 450x.
CGCG 387-16	gx	01h58m29s	−01°27.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' W e una debole alla stessa distanza verso S — 450x.
CGCG 387-17	gx	01h58m36s	−01°27.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	situata 2' scarsi a E della precedente — relativamente brillante e compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; si trova all'interno di un piccolo triangolo rettangolo molto allungato e formato con 3 deboli stelline — 450x.
CGCG 387-20	gx	01h59m11s	+00°06.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o poco più — 450x.
CGCG 387-21	gx	01h59m47s	−00°17.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
CGCG 387-24	gx	02h00m26s	+02°40.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 387-25	gx	02h01m21s	−01°18.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
CGCG 387-26	gx	02h01m50s	−01°19.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, a tratti appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
CGCG 387-40	gx	02h27m25s	+02°07.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un quintetto di galassiette relativamente facili — poco più piccola di UGC 1617, dalla quale dista un paio di primi a W, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 387-46	gx	02h08m16s	+01°11.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco più debole e di dimensioni simili a CGCG 387-47, osservata per prima e dalla quale dista 1' a NW, anch'essa rotonda e con condensazione stellare visibile solo a momenti *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 387-47	gx	02h08m20s	+01°11.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una decina di secondi*(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 387-52	gx	02h11m06s	−00°39.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MCG+0-6-48 situata a ridosso verso E — molto debole e di luminosità uniforme; appare facilmente in visione distolta a 450x, a tratti molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; la MCG è diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare abbastanza marcato.
CGCG 387-54	gx	02h11m12s	−00°49.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40.20; c'è una stellina a 1' verso SE — 450x.
CGCG 387-67	gx	02h17m12s	+01°42.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 387-68	gx	02h17m36s	−00°29.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione quasi stellare poco contrastata — 450x.
CGCG 388-8	gx	02h23m04s	−01°44.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 388-10	gx	02h24m14s	+03°16.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	piccola, debole e diffusa, a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SE — 450x.
CGCG 388-20	gx	02h28m10s	+00°48.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 388-22	gx	02h28m21s	+00°41.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 388-35	gx	02h31m43s	+00°54.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 388-36	gx	02h31m42s	+02°47.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare a momenti a ridosso NE di una debole stellina; non è più estesa di 10"-12"; situata una 40-ina di secondi a S di IC 233; la coppia è comunque meglio evidente a forzando a 580x.
CGCG 388-39	gx	02h31m49s	+01°15.7'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, piccola e condensata, con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 388-49	gx	02h33m18s	+01°19.2'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 388-52	gx	02h33m52s	+01°08.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 388-62	gx	02h36m38s	+01°06.4'		Cet	24"	ottima / m. buono	lucore molto debole, approssim. circolare con Ø < 30" e di luminosità uniforme situato a ridosso N di una stellina brillante — 450x.
CGCG 388-64	gx	02h36m57s	−02°11.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 40"; poco disturbata dai bagliori della SAO 130020 di magnitudo 7.5 che a 450x si riesce tuttavia a tenere fuori dal campo.
CGCG 388-66	gx	02h37m33s	+01°39.1'		Cet	24"	buona / buono	assieme a CGCG 388-67 forma una coppia di galassiette molto deboli, diffuse, di luminosità uniforme, di aspetto e luminosità simili; la 1ª è allungata da E a W con dimensioni 30"×20", mentre la 2ª lo è da NE a SW; appaiono entrambe poco meglio contrastate a 340x.
CGCG 388-67	gx	02h37m36s	+01°36.3'		Cet	24"	buona / buono	v. **CGCG 388-66**
CGCG 388-87	gx	02h39m24s	+01°57.7'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" — 450x.
CGCG 388-96	gx	02h41m57s	+01°14.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 389-3	gx	02h44m34s	−01°26.6'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole, molto piccola, compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 389-9	gx	02h46m24s	−01°44.5'		Cet	24"	ottima / m. buono	piccola, poco diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 20"×15" e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 389-12	gx	02h46m36s	+01°26.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 389-17	gx	02h47m28s	−00°16.1'		Cet	16"	ottima / ottimo	molto debole, appare facilmente in visione distolta quando si osserva NGC 1094 dalla quale dista appena 1' verso N; è molto allungata da ENE a WSW con dimensioni 40"×15" — 380x.
CGCG 389-18	gx	02h47m47s	+03°09.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto piccola, debole e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' N; non sembra disturbata dalla SAO 110754 di 9ª grandezza situata un paio di primi a E — 450x.
CGCG 389-26	gx	02h49m35s	−00°43.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, a tratti in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
CGCG 389-27	gx	02h49m40s	−00°04.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 389-28	gx	02h49m41s	−00°31.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 389-37	gx	02h51m56s	−00°50.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 389-43	gx	02h54m50s	−01°22.0'		Eri	24"	buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; si trova in mezzo a 2 stelline orientate da NNE a SSW; la 1ª è abbastanza brillante, l'altra è molto debole.
CGCG 389-48	gx	02h56m24s	+01°58.8'		Cet	24"	buona / discreto	relativamente facile e compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con nucleo appena percettibile — 450x.
CGCG 389-51	gx	02h56m59s	−01°18.3'		Eri	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (questa gx, assieme a CGCG 389-53 e a MCG+0-8-54 situata 3.5 a SSE, è difficile da osservare a causa del campo quasi privo di stelline di riferimento) — 450x.
CGCG 389-53	gx	02h57m15s	−01°25.4'		Eri	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15".
CGCG 389-59	gx	02h59m50s	+03°05.0'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
CGCG 389-62	gx	03h01m45s	−00°35.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 389-66	gx	03h03m30s	−02°14.9'		Eri	24"	m. buona / ottimo	piccola, compatta e brillante, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con bulge stellare abbastanza marcato — 450x.
CGCG 389-72	gx	03h04m20s	−02°18.3'		Eri	24"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 389-74	gx	03h05m08s	+00°20.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 389-76	gx	03h05m18s	−00°09.7'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo N — 450x.
CGCG 389-78	gx	03h05m31s	−00°24.3'		Cet	24"	buona / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e con evidente condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 450x.
CGCG 389-80	gx	03h05m48s	−00°10.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare; c'è una stellina una 40-ina di secondi a S — 450x.
CGCG 389-82	gx	03h07m00s	+03°16.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e poco diffusa, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 390-1	gx	03h07m32s	−00°57.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	rotonda, diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1' verso NE — 450x.
CGCG 390-4	gx	03h07m49s	−00°47.0'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 390-7	gx	03h08m28s	+00°23.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
CGCG 390-8	gx	03h08m47s	−00°44.0'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" — 450x.
CGCG 390-11	gx	03h09m33s	−02°01.0'		Eri	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 390-14	gx	13h11m05s	−00°32.8'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda, diffusa con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
CGCG 390-20	gx	03h12m02s	−00°04.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø una 30-ina di secondi, poco diffusa e con tenue condensazione centrale appena percettibile; disturbata dalla SAO 130341 di 9ª grandezza situata ad appena 1' SW — 450x.
CGCG 390-21	gx	03h12m13s	−01°03.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	rotonda con Ø < 40", poco diffusa e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a poco meno di 1' NW — 450x.
CGCG 390-22	gx	03h12m20s	−00°10.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto piccola e con nucleo stellare (e di fatto a 340x sembra poco più di una stellina debolmente sfocata), estesa sì e no una dozzina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SE.
CGCG 390-23	gx	03h12m24s	+02°44.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 390-26	gx	03h12m55s	+02°45.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, di luminosità uniforme e a tratti condensata, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
CGCG 390-29	gx	03h13m48s	+00°41.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra 2 stelline di 14-esima orientate da NE a SW; non si riesce purtroppo a tener fuori campo la SAO 111062 di 7ª grandezza a poco più di 4' NE — 450x.
CGCG 390-31	gx	03h14m19s	−01°18.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo N; un'altra stellina appena più evidente di trova a 1' verso W — 450x.
CGCG 390-35	gx	03h14m45s	+03°11.2'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; ci sono 3 deboli stelline allineate a 3' NNW; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 390-38	gx	03h15m35s	−01°01.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 45"×30"; nonostante a 2.5' verso E si trovi una stella brillante, la visione migliora leggermente scalando a 340x.
CGCG 390-43	gx	03h17m02s	+03°39.0'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, orientata come CGCG 390-44, dalla quale dista 4.5' a NW e di dimensioni analoghe — 450x.
CGCG 390-44	gx	03h17m18s	+03°36.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 390-48	gx	13h17m36s	−01°43.4'		Eri	16"	ottima / buono	è debolissima, ma a tratti in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 380x.
CGCG 390-53	gx	03h18m05s	−01°20.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 390-58	gx	03h19m43s	+00°33.9'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; appare facilmente in visione distolta a 450x quando si osserva CGCG 390-59 situata 1.5 a NE.
CGCG 390-59	gx	03h19m47s	+00°35.1'		Cet	24"	buona / buono	rotonda con Ø > 30", di aspetto molto regolare e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W — 450x.
CGCG 390-65	gx	03h20m32s	−02°00.3'		Eri	16"	m. buona / discreto	debolissima e di forma indistinta, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio visibile a 188x.
CGCG 390-66	gx	03h20m33s	−00°20.4'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30" — 380x.
CGCG 390-70	gx	03h20m43s	−01°00.1'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 390-73	gx	03h22m09s	−00°50.2'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa, rotonda con Ø < 40" e un nucleo stellare evidente; forma un piccolo triangolo equilatero con una stellina abbastanza brillante a S e una più debole a SW (che fa parte di una doppia stretta) — 450x.
CGCG 390-78	gx	03h23m00s	+01°21.9'		Cet	16"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, grosso modo rotonda con Ø di ~ 40" e nucleo stellare evidente a 380x.
CGCG 390-79	gx	03h23m24s	+00°26.7'		Cet	24"	ottima / buono	chiazza circolare molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata un paio di primi a N di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 390-83	gx	03h24m28s	−00°05.2'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 390-95	gx	03h29m34s	−01°32.5'		Eri	24"	discreta / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 450x.
CGCG 390-96	gx	03h30m17s	−00°55.2'		Tau	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale quasi stellare poco contrastata — 450x.
CGCG 390-97	gx	03h30m29s	+00°45.1'		Eri	24"	discreta / buono	assieme alla successiva CGCG 390-98 situata 3.5' più a N forma una coppia di galassiette molto difficili; la 1ª è poco più evidente, forse rotonda con Ø con Ø di una 30-ina di secondi; la 2ª è debolissima, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15" — 450x.
CGCG 390-98	gx	03h30m29s	+00°48.7'		Eri	24"	discreta / buono	v. **CGCG 390-97**
CGCG 391-1	gx	03h31m52s	+02°16.9'		Tau	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile; è rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 391-3	gx	03h32m04s	+02°00.8'		Tau	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 391-7	gx	03h32m44s	−01°04.1'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 391-8	gx	03h33m05s	−01°58.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 391-9	gx	03h34m38s	+03°35.6'		Tau	24"	m. buona / mediocre	molto debole e relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 391-10	gx	03h34m35s	−01°56.1'		Eri	24"	m. buona / mediocre	è di aspetto e dimensione simili a CGCG 391-8, dalla quale dista poco meno di 23' a E (non si riescono a mantenere entrambe nello stesso campo nemmeno scalando a 340x) — 450x.
CGCG 391-13	gx	03h35m50s	−01°59.0'		Eri	24"	buona / buono	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 391-14	gx	03h36m01s	+01°06.3'		Tau	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' WNW — 450x.
CGCG 391-15	gx	03h36m04s	−01°57.4'		Eri	24"	buona / buono	relativamente compatta e con nucleo stellare appena percettibile, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 391-16	gx	03h36m53s	+01°01.8'		Tau	24"	discreta / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 391-17	gx	03h37m14s	+01°51.6'		Tau	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline brillanti, 1' a N e 1' a NW — 450x.
CGCG 391-21	gx	03h38m15s	+01°10.4'		Tau	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 0338+0110; molto debole e diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; la MAC è debolissima, molto diffusa e più estesa, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30"; la visione è meglio contrastata scalando a 340x, ma le gx si separano meglio a 450x.
CGCG 391-22	gx	03h39m09s	−02°00.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 391-23	gx	03h39m29s	+02°34.2'		Tau	24"	m. buona / mediocre	debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; disturbata dalla SAO 111326 di magnitudo 8.6 situata appena un paio di primi a W — 450x.
CGCG 391-26	gx	03h40m17s	+01°05.6'		Tau	24"	m. buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 391-27	gx	03h40m37s	−01°23.6'		Eri	24"	buona / buono	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con tenue bulge diffuso — 340x.
CGCG 391-30	gx	03h43m14s	−01°01.1'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto diffusa, rotonda con Ø < 40" e una piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 391-32	gx	03h44m13s	+01°42.4'		Tau	24"	discreta / buono	è un debolissimo baffo di luce, a tratti condensato, orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta subito a W di una stellina — 450x.
CGCG 391-34	gx	03h44m51s	+03°20.2'		Tau	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 391-35	gx	03h46m58s	+01°25.0'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 391-36	gx	03h47m51s	−02°09.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta a ridosso verso NW — 450x.
CGCG 391-37	gx	03h49m08s	+01°09.8'		Tau	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 391-38	gx	03h49m46s	−01°46.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e tenue condensazione centrale; situata a ridosso verso W di un trapezio di deboli stelline di luminosità crescente a partire da quella meridionale.
CGCG 391-40	gx	03h51m34s	−00°28.1'		Eri	24"	discreta / buono	assieme alla successiva CGCG 391-41 forma una coppia di debolissime galassiette che in visione distolta appaiono orientate in modo tra loro ortogonale; la 1ª sembra più "cicciotta", allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20", mentre la 2ª lo è da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 391-41	gx	03h51m40s	−00°30.6'		Eri	24"	discreta / buono	v. **CGCG 391-40**
CGCG 391-43	gx	03h52m20s	−00°58.4'		Eri	24"	buona / buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 392-4	gx	04h09m14s	−01°28.3'		Eri	24"	ottima / discreto	rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 392-9	gx	04h15m24s	−00°58.0'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø > 20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 450x.
CGCG 392-11	gx	04h16m09s	+02°04.6'		Tau	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la visione è poco disturbata da due stelle brillanti situate rispettivamente a 4.5' verso E (SAO 111711 di 9ª grandezza) e a 3' NNE — 450x.
CGCG 392-15	gx	04h17m24s	+00°18.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un minuscolo triangolo equilatero con due stelline, a NE e a NW — 450x.
CGCG 392-17	gx	04h17m44s	+01°33.9'		Tau	24"	m. buona / m. buono	è un debole lucore abbastanza evidente che aggetta verso E da una stellina brillante; la gx non sembra comunque più estesa di 20" o 25" — 450x.
CGCG 393-3	gx	04h19m48s	−00°54.8'		Eri	24"	ottima / discreto	debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale quasi stellari; è allineata con una coppia di stelline a SSW — 450x.
CGCG 393-6	gx	04h20m33s	−02°01.8'		Eri	24"	ottima / discreto	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20".
CGCG 393-7	gx	04h20m13s	+02°19.5'		Tau	24"	m. buona / ottimo	diffusa, con condensazione centrale marcata di aspetto quasi stellare, orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso verso NW e un'altra poco più distante verso S — 450x.
CGCG 393-8	gx	04h20m56s	+02°38.0'		Tau	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente; in visione distolta appare poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 393-10	gx	04h21m33s	−02°20.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 393-11	gx	04h21m43s	−02°12.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	di aspetto simile a MCG+0-12-17 — osservata subito prima e dalla quale dista 2' scarsi a SW — e con lo stesso Ø; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE — 450x.
CGCG 393-14	gx	04h23m09s	−00°15.2'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 393-17	gx	04h24m35s	−02°25.1'		Eri	24"	ottima / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 450x.
CGCG 393-21	gx	04h27m39s	−02°32.6'		Eri	24"	ottima / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 393-23	gx	04h29m21s	−00°12.4'		Eri	24"	ottima / discreto	è debolissima, ma in visione distolta appare abbastanza facilmente orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; meglio comunque scalare a 340x; c'è un piccolo asterismo di forma triangolare subito a SW.
CGCG 393-24	gx	04h29m32s	+00°12.7'		Eri	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con nucleo puntiforme, marcato — 450x.
CGCG 393-26	gx	04h29m54s	−00°45.0'		Eri	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 45" — 450x.
CGCG 393-42	gx	04h35m58s	−02°10.2'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 393-43	gx	04h35m58s	−02°02.7'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 393-44	gx	04h36m24s	−02°51.0'		Eri	16"	ottima / scarso	assieme a CGCG 390-59 forma una coppia di gx facili e relativamente brillanti; la 1ª è poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30", con condensazione centrale piccola e abbastanza contrastata; c'è una stellina a ridosso verso SW; la 2ª è invece allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale diffusa ed evidente — 270x.
CGCG 393-45	gx	04h36m30s	−02°52.0'		Eri	16"	ottima / scarso	v. **CGCG 393-44**
CGCG 393-52	gx	04h38m04s	−02°03.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con tenue nucleo abbastanza evidente; c'è una stellina subito a SE — 450x.
CGCG 393-53	gx	04h38m08s	−02°09.2'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e con condensazione centrale — 450x.
CGCG 393-63	gx	04h40m35s	+00°27.7'		Tau	24"	buona / scarso	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile subito a NE — 340x.
CGCG 393-64	gx	04h40m37s	+00°30.3'		Tau	24"	buona / scarso	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (situata 3' scarsi a N di CGCG 393-63) — 340x.
CGCG 393-67	gx	04h41m31s	−01°20.5'		Eri	16"	ottima / scarso	debolissima chiazza molto diffusa e appena più brillante all'interno, forse rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina a ridosso verso N (la quale fa parte di un piccolo asterismo foggiato a trapezio irregolare — 270x.
CGCG 393-70	gx	04h41m53s	+01°04.1'		Tau	24"	buona / scarso	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a meno di 1' SW (fa parte di una bisciola di 5 stelline brillanti orientate da E a W — 340x.
CGCG 394-4	gx	04h45m54s	−02°12.3'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 400x.
CGCG 394-6	gx	04h46m26s	+00°22.0'		Ori	24"	buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 340x.
CGCG 394-11	gx	04h47m29s	−01°12.8'		Ori	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina subito a N e un'altra di luminosità simile a 1' verso E — 450x.
CGCG 394-14	gx	04h48m23s	+00°13.5'		Ori	24"	buona / buono	rotonda, poco diffusa, con Ø < 30" e di luminosità uniforme; è situata in mezzo a 2 stelline orientate da N a S e distanti un paio di primi — 450x.
CGCG 394-15	gx	04h48m30s	−01°32.3'		Ori	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 394-19	gx	04h51m09s	+02°22.1'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 394-21	gx	04h51m36s	−02°33.6'		Ori	24"	ottima / discreto	poco diffusa, molto allungata da NNE a SSW, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 394-25	gx	04h53m10s	+02°20.5'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole e disturbata da una stellina brillante situata al bordo orientale; molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; una stellina più brillante si trova a 1' SSE — 450x.
CGCG 394-28	gx	04h53m54s	+01°41.0'		Ori	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 394-32	gx	04h54m36s	−01°22.1'		Ori	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW — 450x.
CGCG 394-37	gx	04h55m58s	+02°14.1'		Ori	16"	ottima / scarso	debole, rotonda, poco diffusa, con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 270x.
CGCG 394-42	gx	04h56m27s	+00°42.7'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a SSE — 450x.
CGCG 394-44	gx	04h56m52s	+02°47.8'		Ori	24"	ottima / discreto	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso di NW; anche a 450x sono presenti nel campo alcune stelle brillanti fra cui una molto luminosa (la SAO 112248 di magnitudo 7.5) situata 1.5' a SE della gx.
CGCG 394-45	gx	04h56m53s	−00°35.2'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 394-46	gx	04h57m09s	−00°49.6'		Ori	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 394-48	gx	04h57m29s	−00°51.7'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 450x.
CGCG 394-49	gx	04h57m33s	−01°07.3'		Ori	24"	ottima / discreto	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare molto contrastato; c'è una doppia stretta un paio di primi a NE; anche a 450x si fa fatica a tenere fuori campo la SAO 131625 di 6ª grandezza situata 5' a NW.
CGCG 394-52	gx	04h57m58s	+00°47.8'		Ori	24"	buona / buono	poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; presenta un nucleo puntiforme, ma questo appare un poco decentrato verso NW: non si può escludere che si tratti in realtà di una stellina sovrapposta (è sorto l'ultimo quarto di luna).
CGCG 394-53	gx	04h58m14s	−00°10.3'		Ori	16"	ottima / scarso	molto piccola, ma relativamente facile da vedere a 270x, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; presenta una condensazione centrale puntiforme visibile a tratti.
CGCG 394-55	gx	04h58m31s	−00°34.4'		Ori	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW — 450x.
CGCG 394-56	gx	04h58m33s	−00°33.2'		Ori	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø > 20" e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso di SE — 450x.
CGCG 394-60	gx	04h59m02s	−01°29.6'		Ori	24"	ottima / ottimo	diffusa e molto debole, di aspetto a prima vista un po' confuso; solo a momenti a 450x appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' verso N.
CGCG 394-61	gx	04h59m13s	−00°35.3'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, con nucleo puntiforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 394-62	gx	04h59m23s	−01°09.5'		Ori	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 450x.
CGCG 394-64	gx	04h49m56s	−00°09.5'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW (ossia come le 2 stelle brillanti all'interno delle quali si trova) con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 394-68	gx	05h01m43s	−00°30.3'		Ori	24"	ottima / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 394-74	gx	05h04m12s	−01°09.3'		Ori	24"	ottima / discreto	chiazza molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, meglio contrastata scalando a 340xin visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stretta con le componenti brillanti a 2' NW — 450x.
CGCG 394-77	gx	05h06m00s	+02°30.1'		Ori	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 395-2	gx	05h08m50s	−00°35.2'		Ori	24"	ottima / discreto	debole, ma relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 395-4	gx	05h09m09s	−00°41.7'		Ori	24"	ottima / discreto	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 395-5	gx	05h09m40s	−00°15.1'		Ori	24"	ottima / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; una stellina percettibile solo a momenti si trova al bordo occidentale, mentre una più evidente si trova a 1' sempre verso W — 450x.
CGCG 395-6	gx	05h10m06s	+00°54.7'		Ori	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di 15"-20" e condensata; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SW — 450x.
CGCG 395-9	gx	05h10m22s	−00°43.8'		Ori	24"	ottima / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 395-16	gx	05h12m49s	+02°43.2'		Ori	24"	m. buona / buono	facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a N — 450x.
CGCG 395-19	gx	05h13m44s	+01°57.2'		Ori	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; si fatica alquanto a capirne la forma, perché è disturbata dalla SAO 112535 di 7ª grandezza situata 3' a W — 450x.
CGCG 395-22	gx	05h14m11s	+01°52.8'		Ori	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 396-1	gx	05h34m17s	+02°48.7'		Ori	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina al bordo NE e una quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 398-6	gx	20h00m25s	+06°41.6'		Aql	24"	m. buona / discreto	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a E e una molto debole a ridosso NW — 450x.
CGCG 398-7	gx	20h03m08s	+07°06.4'		Aql	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 398-8	gx	20h03m37s	+07°00.0'		Aql	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E — 450x.
CGCG 398-9	gx	20h03m41s	+07°09.8'		Aql	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø poco superiore a 30" — 450x.
CGCG 398-10	gx	20h05m45s	+06°44.2'		Aql	24"	m. buona / discreto	debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, tant'è che si riesce a capire abbastanza facilmente che è orientata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20" — 450x.
CGCG 398-11	gx	20h06m05s	+08°09.3'		Aql	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di 10"-15", appare facilmente in visione distolta a 450x a ridosso SW di una stellina; una coppia abbastanza stretta di stelline brillanti si trova subito a W.
CGCG 398-14	gx	20h07m21s	+06°26.7'		Aql	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni di 45"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso verso N e una appena percettibile al bordo meridionale; meglio contrastata scalando a 340x — 450x.
CGCG 398-17	gx	20h09m00s	+08°39.3'		Aql	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio definita scalando a 340x.
CGCG 398-24	gx	20h14m40s	+06°30.8'		Aql	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 399-1	gx	20h20m08s	+07°47.0'		Aql	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina appena percettibile a 1' SW — 450x.
CGCG 399-3	gx	20h22m37s	+03°55.9'		Aql	24"	m. buona / ottimo	è una sorta di debolissimo alone asimmetrico che in visione distolta tende ad aggettare verso E da una stellina; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 399-5	gx	20h23m04s	+09°32.6'		Del	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata ~ da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo occidentale — 450x.
CGCG 399-12	gx	20h28m40s	+04°20.7'		Del	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma più che altro disturbata dalla luce di 2 stelline brillanti; diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; sembra come "stirata" da 2 stelline situate ai bordi N e S — 450x.
CGCG 399-13	gx	20h29m42s	+03°43.2'		Del	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 399-14	gx	20h30m35s	+04°44.9'		Del	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 399-15	gx	20h30m52s	+04°45.7'		Del	24"	buona / m. buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' E — 450x.
CGCG 399-16	gx	20h31m21s	+04°36.5'		Del	24"	buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a una 40-ina di secondi verso SW e un'altra molto più debole a ridosso W — 400x.
CGCG 399-17	gx	20h31m30s	+07°06.8'		Aql	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele molto allungato in direzione E-W — 450x.
CGCG 399-18	gx	20h31m35s	+07°09.7'		Aql	24"	m. buona / discreto	debolissima, molto diffusa e di forma indistinta, più che altro disturbata da una stellina a ridosso N e da una più debole a S; queste due stelline danno l'impressione che la gx sia effettivamente orientata da N a S ed estesa come la loro distanza — 450x.
CGCG 399-20	gx	20h33m26s	+06°03.2'		Del	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 399-21	gx	20h34m37s	+09°08.1'		Del	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso W — 450x.
CGCG 399-26	gx	20h39m22s	+08°54.8'		Dra	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, poco allungata da NE a SW con dimensioni 25"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W e un'altra debole a ~ 1' S — 450x.
CGCG 399-29	gx	20h42m39s	+06°32.6'		Del	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolmente condensata, rotonda con Ø di appena una decina di secondi; c'è una debole stellina subito a NW 450x.
CGCG 400-1	gx	20h45m25s	+06°04.4'		Del	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e con condensazione centrale quasi stellare, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; è situata tra 2 stelline orientate da E a W: quella a W è evidente, mentre l'altra è molto debole — 450x.
CGCG 400-5	gx	20h50m24s	+07°17.1'		Del	24"	buona / ottimo	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20", ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina quasi a ridosso E e un'altra molto debole alla stessa distanza verso N.
CGCG 400-10	gx	20h53m48s	+07°50.8'		Del	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 400-11	gx	20h55m33s	+07°28.8'		Del	24"	buona / discreto	è una debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da E a W che appare tuttavia senza difficoltà in visione distolta a 450x; è situata quasi a ridosso NE di una stellina abbastanza brillante; una stellina molto debole si trova subito a NW e una terza appena percettibile è a ridosso verso E (presenza di deboli chiarore lunare).

CGCG 400-12	gx	20h56m57s	+06°49.1'		Dra	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia a 1' verso NW — 450x.
CGCG 400-13	gx	20h57m26s	+07°28.0'		Del	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 400-14	gx	20h58m15s	+08°21.5'		Del	24"	buona / discreto	debolissima e disturbata dalla luce di una doppia stretta situata subito a S; solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10"; un'altra stellina si trova quasi a ridosso verso N (presenza di debole chiarore lunare) — 450x.
CGCG 400-15	gx	20h58m15s	+08°25.7'		Del	24"	buona / discreto	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi ; c'è una stellina a ridosso SE (presenza di debole chiarore lunare) — 450x.
CGCG 400-17	gx	21h00m13s	+09°33.5'		Equ	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con PGC 1366929 situata una 40-ina di secondi a NE — molto piccola e debole poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø 12"-15"; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a ENE — 450x.
CGCG 400-18	gx	21h00m24s	+09°27.2'		Equ	24"	buona / ottimo	anche questa è molto piccola e debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 400-21	gx	21h02m36s	+08°18.8'		Equ	24"	discreta / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N (a prima vista e a ingrandimenti minori pareva di vedere un nucleo stellare). A 1.5' NE si nota un piccolo oggetto diffuso molto debole, esteso non più di 10" o 15" e con una stellina a ridosso verso E o NE: da un controllo successivamente effettuato è risultata essere la PGC 3091640. A 4' NNE c'è poi un'altra gx, debole, di luminosità uniforme e con Ø > 20"; anche questa, da un controllo successivo, è risultata essere PGC 1345581 — 570x.
CGCG 400-22	gx	21h04m29s	+07°58.8'		Equ	24"	m. buona / m. buono	debole lama di luce orientata da N a S per 1' (come le 2 stelline a SE, ma più estesa della loro separazione), di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina al bordo N — 450x.
CGCG 400-26	gx	21h05m39s	+07°43.5'		Equ	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta con piccola condensazione centrale abbastanza evidente allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è un piccolo parallelogramma di stelline subito a S — 400x.
CGCG 400-27	gx	21h05m40s	+09°14.0'		Equ	24"	ottima / buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
CGCG 400-29	gx	21h07m01s	+03°50.6'		Equ	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 401-1	gx	15h16m02s	+69°20.2'		UMi	24"	ottima / m. buona	debole, molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 450x.
CGCG 401-6	gx	21h12m48s	+08°47.0'		Equ	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø > 30" e appena più brillante all'interno — 400x.
CGCG 401-7	gx	21h13m13s	+06°44.0'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni che in visione distolta sono di 40"×20" — 450x.
CGCG 401-9	gx	21h13m45s	+04°50.3'		Equ	24"	ottima / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; allineata ed equidistante con due stelline a NW — 450x.
CGCG 401-10	gx	21h15m10s	+07°08.3'		Equ	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con MAC 2115+0708 — situata a ridosso NNW — con la quale tende a fondersi in un unico oggetto di forma confusa; le due gx si separano a fatica, ma nonostante l'ottimo seeing la coppia pare meglio definita scalando a 340x; sono entrambe di luminosità uniforme: la CGCG è orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15", mentre la MAC è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 401-11	gx	21h15m17s	+07°47.3'		Equ	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 401-12	gx	21h15m58s	+09°32.5'		Equ	24"	m. buona / mediocre	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 340x.
CGCG 401-13	gx	21h18m53s	+05°51.0'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 50"×20" e di luminosità uniforme; c'è un piccolo triangolo sbilenco di stelline abbastanza brillanti subito a W 450x.
CGCG 401-18	gx	21h22m18s	+07°06.5'		Equ	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a 1' verso N — 340x.
CGCG 401-20	gx	21h25m02s	+03°51.3'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 401-22	gx	21h26m05s	+05°27.2'		Equ	24"	discreta / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; in visione distolta appare abbastanza distintamente un debole nodulo quasi a ridosso verso N ed esteso 15"-20"; non riesco tuttavia a capire se fa parte della gx o se si tratta di un oggetto separato.
CGCG 401-23	gx	21h26m05s	+06°42.7'		Equ	24"	ottima / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 401-24	gx	21h26m18s	+05°06.8'		Peg	24"	discreta / buono	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
CGCG 401-25	gx	21h28m06s	+08°37.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 401-28	gx	21h30m44s	+04°11.4'		Peg	24"	ottima / buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 402-1	gx	21h31m22s	+09°25.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissimo lucore diffuso e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi, situato quasi a ridosso SW di una stellina brillante che disturba la visione — 450x.
CGCG 402-4	gx	21h33m49s	+07°26.2'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debole e diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso SW — 340x.
CGCG 402-5	gx	21h34m09s	+08°46.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccolo e debole oggetto rotondo, diffuso con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena accennata — 450x.
CGCG 402-6	gx	21h34m13s	+08°39.4'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 402-7	gx	21h36m07s	+07°56.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 50"×20" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina al bordo NNE e un'altra poco più lontana sempre nella stessa direzione — 450x.
CGCG 402-18	gx	21h45m59s	+07°52.2'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 340x.
CGCG 402-20	gx	21h46m12s	+09°33.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 402-21	gx	21h46m17s	+09°41.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	di aspetto simile alla precedente, dalla quale dista 7.5' verso N, orientata da NE a SW e appena più evidente — 450x.
CGCG 402-23	gx	21h51m03s	+06°14.7'		Peg	24"	buona / m. buono	chiazza rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, molto debole e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 402-24	gx	21h52m15s	+08°24.0'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima, in ad appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 45"×15" e di luminosità uniforme; a 1.5' appare un piccolo oggetto diffuso e rotondo con Ø di una 15-ina di secondi che da un controllo successivamente effettuato è risultato poi essere la PGC 67522 — 450x.
CGCG 402-25	gx	21h53m05s	+04°18.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15", poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 402-28	gx	21h55m36s	+06°36.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina luminosa a 1' S — 450x.
CGCG 403-2	gx	21h55m43s	+05°48.5'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 403-4	gx	21h56m22s	+07°22.0'		Peg	24"	buona / m. buono	piccola, poco diffusa e condensata, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 403-7	gx	21h58m12s	+08°22.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccolo e debolissimo oggetto probabilmente rotondo con Ø max di una 20-ina di secondi — 400x.
CGCG 403-9	gx	21h58m37s	+07°26.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo NE appena percettibile a 400x; una stellina brillante si trova sempre verso NE a meno di 1' dalla gx.
CGCG 403-10	gx	21h58m39s	+08°27.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta a 400x; è rotonda con Ø simile a quello di IC 1414 (~ 40") dalla quale dista 5.5' verso NE.
CGCG 403-12	gx	21h59m34s	+09°24.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo la cui componente più settentrionale lambisce la gx; poco meglio contrastata scalando a 340x, ma a 450x salta fuori una stellina appena percettibile a ridosso verso W.
CGCG 403-17	gx	22h02m55s	+09°34.7'		Peg	24"	buona / m. buono	è un debole oggetto rotondo molto piccolo, con Ø di 10"-15"; c'è una stellina brillante a ridosso SW la quale fa parte di un piccolo asterismo costituito da 4 stelle di eguale luminosità e foggiato grosso modo a croce latina — 450x.
CGCG 403-19	gx	22h04m18s	+04°40.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo quasi stellare; in visione diretta appare in effetti solo il nucleo, mentre il resto si osserva in visione distolta; la gx si trova, infatti, all'interno di un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti e proprio a ridosso della componente al vertice più acuto — 450x.
CGCG 403-23	gx	22h06m44s	+09°21.1'		Peg	24"	buona / m. buono	debole e diffusa, con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E — 450x.
CGCG 403-24	gx	22h07m09s	+06°29.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 403-25	gx	22h17m24s	+07°02.4'		Peg	24"	m. buona / mediocre	relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge rotondo abbastanza marcato — 450x.
CGCG 403-26	gx	22h07m40s	+08°55.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, a tratti in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina al bordo SW e un'altra poco più brillante quasi a ridosso verso N; una coppia di stelline si trova a 1' verso SE — 400x.
CGCG 403-31	gx	22h17m25s	+09°12.8'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 404-2	gx	22h20m10s	+07°52.7'		Peg	24"	discreta / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 400x, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; a 1' S e SE ci sono 2 stelline appena percettibili allineate ed equidistanti con una più brillante a E — 400x.
CGCG 404-4	gx	22h21m41s	+06°55.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
CGCG 404-6	gx	22h23m20s	+04°29.4'		Peg	24"	ottima / buono	piccola, molto debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 404-8	gx	22h23m56s	+03°46.0'		Peg	24"	ottima / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' W — 450x.
CGCG 404-9	gx	22h24m00s	+08°54.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 404-13	gx	22h24m55s	+09°31.0'		Peg	24"	buona / m. buono	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare evidente che rimane tale anche a 570x; c'è una stellina a poco più di 1' verso SW.
CGCG 404-14	gx	22h25m11s	+08°31.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-15"; c'è una coppia di deboli stelline subito a SW — 450x.
CGCG 404-15	gx	22h25m18s	+08°25.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto disturbata da una stellina brillante situata una 40-ina di secondi a W; solo a momenti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15"; una stellina appena percettibile si trova subito a S — 450x.
CGCG 404-20	gx	22h32m31s	+08°12.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è una piccola e debole chiazza diffusa, di luminosità uniforme che aggetta verso S da una stellina brillante per una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 404-26	gx	22h38m21s	+08°36.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; 3 stelline brillanti a guisa di piccolo arco si trovano a ridosso verso W — 450x.
CGCG 405-5	gx	22h44m13s	+09°25.1'		Peg	24"	buona / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a ridosso verso N — 450x.
CGCG 405-7	gx	22h44m19s	+05°21.8'		Peg	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 405-13	gx	22h54m10s	+08°32.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina quasi a ridosso NE e un'altra molto debole e poco più distante a W — 450x.
CGCG 405-24	gx	23h01m16s	+09°35.9'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 405-28	gx	23h03m36s	+09°17.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole ovale di 45"×30" orientato da NE a SW, di luminosità uniforme e diffuso; c'è una stellina a ridosso verso SE — 380x.
CGCG 405-33	gx	23h06m26s	+08°24.2'		Peg	24"	buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 405-34	gx	23h07m13s	+08°45.1'		Peg	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge rotondo, evidente e contrastato — 450x.
CGCG 406-2	gx	23h08m27s	+04°39.7'		Psc	24"	buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, molto disturbata dalla SAO 127991 di magnitudo 7.2 situata un paio di primi a NE; è rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 406-3	gx	23h09m39s	+05°40.3'		Peg	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' S e un'altra più brillante alla stessa distanza verso E — 450x.
CGCG 406-4	gx	23h10m00s	+06°47.4'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 406-5	gx	23h09m52s	+07°31.0'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' SW — 450x.
CGCG 406-6	gx	23h10m21s	+07°22.2'		Psc	24"	buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 406-9	gx	23h10m33s	+08°08.5'		Psc	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø poco superiore a 20" — 450x.
CGCG 406-10	gx	23h10m38s	+08°11.4'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 406-11	gx	23h10m39s	+09°11.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta a 380x un paio di primi SSE di una debole doppia molto stretta.
CGCG 406-13	gx	23h10m51s	+09°09.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	forma una coppia molto ravvicinata con MAC 2310+0909: sono 2 piccolissimi oggetti molto deboli che si separano facilmente a 270x (anzi appaiono meglio contrastati a quest'ingrandimento e oltre tutto a 380x il campo è virtualmente depleto); il 1º è solo leggermente più grande, con Ø max di 20" e presenta a tratti una nucleo stellare.
CGCG 406-15	gx	23h11m19s	+04°58.8'		Psc	16"	m. buona / discreto	relativamente compatta, piccola, poco diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata dalla SAO 128019 di 7ª situata un paio di primi NW; c'è un piccolo triangolo equilatero di stelline a 6' verso S — 380x.
CGCG 406-16	gx	23h11m36s	+07°44.6'		Psc	24"	buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 406-19	gx	23h12m49s	+09°10.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con bulge appena percettibile — 450x.
CGCG 406-27	gx	23h14m29s	+04°11.5'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di ~ 30" — 270x.
CGCG 406-34	gx	23h15m30s	+04°54.0'		Psc	24"	ottima / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 406-40	gx	23h16m43s	+04°59.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	è una piccola chiazza molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi che aggetta a E di una stellina evidente — 450x.
CGCG 406-43	gx	23h17m21s	+05°39.2'		Psc	24"	m. buona / buono	assieme a CGCG 406-44 forma una coppia di galassiette molto deboli e di luminosità uniforme, distanti 1' in direzione N-S; la 1ª è rotonda, molto diffusa e con Ø < 30"; la 2ª è più evidente, allungata da E a W con dimensioni 40"×30", pure di luminosità uniforme; appaiono comunque meglio contrastate scalando a 340x.
CGCG 406-44	gx	23h17m21s	+05°39.6'		Psc	24"	m. buona / buono	v. **CGCG 406-43**
CGCG 406-54	gx	23h18m16s	+06°49.5'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 406-55	gx	23h18m31s	+05°40.1'		Psc	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di di una 20-ina di secondi e un piccolo nucleo appena evidente — 450x.
CGCG 406-57	gx	23h18m49s	+06°13.5'		Psc	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 406-63	gx	23h19m12s	+09°17.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole e diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 406-67	gx	23h19m34s	+09°29.7'		Peg	16"	buona / mediocre	appare come un oggetto di luminosità uniforme esteso per non più di 20" e situato a ~ 1' di distanza SE di NGC 7609. Altresì nota come **Hickson 95B** — 270x.
CGCG 406-78	gx	23h21m13s	+07°22.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, compatta, con piccolo nucleo brillante, allungata da NE a SW e di dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 406-79	gx	23h21m06s	+08°06.2'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, allungata da E a W con nucleo puntiforme visibile a tratti a 270x.
CGCG 406-81	gx	23h21m06s	+09°42.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; equidistante, seppure non allineata, con due stelline a N — 450x.
CGCG 406-82	gx	23h21m17s	+07°28.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta a 380x, a tratti allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e appena condensata.
CGCG 406-86	gx	23h11m41s	+08°59.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	salta fuori in visione distolta come un baffo esteso poco più di 30" a ridosso di una stellina brillante; questa stellina forma una coppia ravvicinata con un'altra di uguale magnitudo a 15" NW — 380x.
CGCG 406-87	gx	23h21m49s	+03°49.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge debolmente contrastato sul disco — 450x.
CGCG 406-89	gx	23h21m46s	+09°20.5'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 406-92	gx	23h22m01s	+09°17.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 406-94	gx	23h22m43s	+04°13.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da ENE a WSW con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a meno di 1' verso NW — 450x.
CGCG 406-100	gx	23h24m51s	+09°31.1'		Peg	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 406-101	gx	23h24m57s	+09°28.5'		Peg	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con piccolo nucleo quasi stellare contrastato — 450x.
CGCG 406-102	gx	23h25m02s	+08°15.9'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; allineata ed equidistante con 3 stelline a NW orientate come la gx — 450x.
CGCG 406-103	gx	23h25m25s	+03°47.8'		Psc	24"	m. buona / mediocre	piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare; completa un piccolo trapezio formato con 3 stelline e di dimensioni grosso modo 3'×1.5' — 450x.
CGCG 406-106	gx	23h25m46s	+05°04.6'		Psc	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 406-107	gx	23h25m48s	+08°02.5'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 406-114	gx	23h27m59s	+08°47.0'		Peg	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 406-115	gx	23h28m19s	+07°37.4'		Peg	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una doppia stretta e brillante a 1' NW — 450x.
CGCG 406-116	gx	23h28m39s	+09°34.6'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola, diffusa, rotonda con Ø max di 20" e nucleo stellare; c'è una doppia stretta a ridosso verso E — 450x.
CGCG 406-118	gx	23h28m56s	+09°41.9'		Peg	24"	m. buona / buono	è la più evidente di un piccolo gruppo di gx difficili (quali appartengono anche CGCG 406-116 e CGCG 406-119) — rotonda con Ø > 20", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 406-119	gx	23h29m23s	+09°44.8'		Peg	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale visibile a tratti a 450x; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW.
CGCG 406-122	gx	23h30m43s	+03°58.1'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; forma un piccolo arco con 2 stelline situate rispettivamente a 1' NNE e 2' NE — 450x.
CGCG 406-125	gx	23h31m37s	+08°36.0'		Peg	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 407-3	gx	23h32m26s	+05°51.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale molto tenue; ha una compagna appena percettibile a ridosso verso E estesa 15" e con nucleo stellare visibile a tratti; la separazione è meglio evidente a forzando a 580x; questa compagna è poi risultata essere la MAC 2332+0550.
CGCG 407-4	gx	23h32m35s	+06°51.0'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con tenue bulge poco contrastato sul disco; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 450x.
CGCG 407-5	gx	23h33m06s	+09°45.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; si trova al vertice rettangolo di un piccolo triangolo formato con 2 stelline: una a poco più di 1' NE e l'altra alla stessa distanza verso NW — 450x.
CGCG 407-8	gx	23h33m35s	+04°28.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e nucleo stellare appena percettibile; c'è una debole stellina a 1' WSW (in direzione di una più brillante) — 450x.
CGCG 407-9	gx	23h33m39s	+08°48.8'		Peg	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' W — 450x.
CGCG 407-12	gx	23h34m24s	+04°59.6'		Psc	24"	m. buona / buono	poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 407-20	gx	23h36m52s	+06°51.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta, e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; forma un piccolo triangolo isoscele aperto con 2 stelline, 1' a N e 1.5' a NW — 450x.
CGCG 407-21	gx	23h37m01s	+04°56.2'		Psc	16"	ottima / scarso	debolissima e di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare chiaramente allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 270x.
CGCG 407-25	gx	23h37m30s	+08°04.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è un piccolo e curioso asterismo di 5 stelline brillanti a 7' verso W — 450x.
CGCG 407-27	gx	23h37m44s	+08°05.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; si trova all'interno di un trapezio il cui vertice orientale è occupato da una coppia di stelline distanti una 20-ina di secondi.
CGCG 407-29	gx	23h38m07s	+07°59.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 407-30	gx	23h38m14s	+07°48.5'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW (come le 2 stelline distanti 6' in mezzo alle quali si trova), con dimensioni 60"×40" — 400x.
CGCG 407-35	gx	23h39m15s	+04°24.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 407-38	gx	23h40m23s	+04°01.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, a tratti condensata, allungata da N a S con dimensioni 15.10 — 450x.
CGCG 407-39	gx	23h40m23s	+06°15.0'		Psc	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 407-40	gx	23h40m51s	+04°35.3'		Psc	16"	m. buona / discreto	galassietta facile e relativamente compatta, con evidente condensazione centrale, allungata da NW a SE e di dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso NW — 380x.
CGCG 407-42	gx	23h41m29s	+04°10.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 407-44	gx	23h42m03s	+04°18.6'		Psc	24"	buona / discreto	diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso WNW — 450x.
CGCG 407-45	gx	23h42m20s	+06°55.4'		Psc	24"	buona / m. buono	piccola, debole poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 407-46	gx	23h43m17s	+04°33.1'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 407-47	gx	23h43m59s	+08°19.9'		Peg	24"	discreta / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 407-49	gx	23h44m28s	+05°39.8'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 407-50	gx	23h44m30s	+09°15.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 407-53	gx	23h44m57s	+09°11.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 407-60	gx	23h48m58s	+06°08.0'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra 2 stelline orientate grosso modo da N a S e distanti poco più di 2'; a meno di 1' SE ce n'è una terza (poco più brillante di quella a S) — 450x.
CGCG 407-61	gx	23h49m46s	+08°12.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con condensazione stellare molto evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 407-63	gx	23h50m59s	+08°40.7'		Peg	24"	m. buona / buono	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 407-65	gx	23h51m33s	+08°44.3'		Peg	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata come CGCG 407-63, ma con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 407-66	gx	23h51m46s	+06°02.4'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, molto piccola e forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; più facile è la MAC 2351+0602 situata 1' verso W, rotonda con Ø anch'essa di ~ 20" e nucleo stellare; a ingrandimenti inferiori pare una debole stellina sfocata — 450x.
CGCG 407-68	gx	23h53m16s	+07°25.5'		Psc	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a NE — 450x.
CGCG 408-16	gx	00h03m23s	+05°42.2'		Psc	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di 45" e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 408-22	gx	00h04m50s	+05°44.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge quasi stellare evidente; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 408-27	gx	00h05m27s	+05°10.6'		Psc	16"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, visibile a tratti in visione distolta — 270x.
CGCG 408-29	gx	00h06m14s	+08°53.3'		Psc	24"	discreta / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 408-33	gx	00h06m48s	+04°56.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; è situata in una piccola zona depleta, per cui è preferibile scalare a 340x.
CGCG 408-47	gx	00h19m14s	+04°08.0'		Psc	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con PGC 1250 a S — sono due macchioline rotonde molto deboli, di aspetto a prima vista simili, situate a ridosso NW e SW di una stellina abbastanza brillante; la 1ª è poco più estesa e più distante dalla stella; sono entrambe di luminosità uniforme con dimensioni rispettivamente di 20" e 15".
CGCG 409-7	gx	00h22m50s	+06°49.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, salta fuori in visione distolta all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline; a 380x appare come un fuso di 50"×25" orientato da NE a SE.
CGCG 409-12	gx	00h25m25s	+06°42.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; a tratti sembra di intravedere qualcosa di puntiforme: forse un accenno del nucleo.
CGCG 409-18	gx	00h28m27s	+05°00.2'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, poco più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 409-21	gx	00h30m29s	+05°51.6'		Psc	24"	m. buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni simili a CGCG 409-12 ; c'è una stellina abbastanza brillante a una 40-ina di secondi verso N — 450x.
CGCG 409-25	gx	00h31m09s	+04°30.2'		Psc	24"	discreta / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; appare facilmente in visione distolta quando si fissa lo sguardo su una coppia serrata e sbilanciata di deboli stelline situata subito a E — 450x.
CGCG 409-26	gx	00h31m19s	+08°28.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	è più piccola di UGC 312, dalla quale dista poco più di 1' W, rotonda, con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare — 380x.
CGCG 409-34	gx	00h33m25s	+07°51.3'		Psc	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, a prima vista sembra rotonda, ma scalando a 340x appare più chiaramente allungata da NNE a SSW (come la coppia di stelline brillanti situate 5' a N), con dimensioni 45"×30".
CGCG 409-37	gx	00h34m17s	+05°32.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo SE — 450x.
CGCG 409-40	gx	00h34m49s	+07°27.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante e compatta, orientata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale quasi stellare abbastanza contrastata; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 409-41	gx	00h34m54s	+05°38.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 409-46	gx	00h35m56s	+08°43.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e piccola condensazione centrale abbastanza evidente a 380x; c'è una stellina a 1.5' SE.
CGCG 409-49	gx	00h37m56s	+04°54.7'		Psc	24"	discreta / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10" — 450x.
CGCG 409-52	gx	00h39m02s	+06°48.9'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 409-63	gx	00h41m47s	+08°23.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina doppia a un paio di primi verso E — 450x.
CGCG 409-64	gx	00h41m56s	+08°21.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; la stellina doppia di prima si trova un paio di primi a N — 450x.
CGCG 410-1	gx	00h44m33s	+08°36.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un oggetto molto piccolo e debole, ma relativamente compatto, di Ø max 25"-30", con nucleo stellare visibile a tratti; si vede con relativa facilità solo a 380x.
CGCG 410-9	gx	00h48m54s	+09°43.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a 1' SE — 450x.
CGCG 410-11	gx	00h50m06s	+07°11.6'		Psc	24"	buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 410-17	gx	00h56m04s	+09°36.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 450x.
CGCG 410-18	gx	00h56m58s	+09°01.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; 380x per tenere fuori campo la SAO 109549 di 9.5.
CGCG 410-22	gx	00h59m18s	+06°55.2'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con nucleo stellare.
CGCG 410-26	gx	01h03m08s	+06°49.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 410-27	gx	01h03m14s	+08°49.5'		Psc	24"	buona / buono	piccola e relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 30"× 10" e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 410-31	gx	01h06m22s	+06°17.0'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola chiazza circolare, poco diffusa, con Ø < 30" e nucleo stellare abbastanza evidente — 400x.
CGCG 410-33	gx	01h06m35s	+09°11.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 411-8	gx	01h13m55s	+07°25.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissimo ovale di 30"×20" orientato da E a W e appena più brillante all'interno; osservata a 380x per tenere fuori campo la Zeta Psc, doppia con componenti di 5ª e 6ª.
CGCG 411-12	gx	01h15m04s	+05°22.6'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 411-14	gx	01h15m53s	+05°19.5'		Psc	24"	m. buona / buono	poco più facile di CGCG 411-12, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"× 15" e con piccolo bulge marcato di aspetto quasi stellare; situata tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da E a W — 450x.
CGCG 411-20	gx	01h18m54s	+04°20.4'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 411-21	gx	01h19m04s	+04°19.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	situata 2.5' a ESE della precedente, è molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
CGCG 411-22	gx	01h19m18s	+04°34.7'		Psc	24"	buona / buono	brillante, compatta e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina luminosa a una 40-ina di secondi NE — 450x.
CGCG 411-24	gx	01h20m32s	+07°20.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NW che interferisce un po' con l'osservazione — 450x.
CGCG 411-37	gx	01h22m27s	+09°03.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole e poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 411-42	gx	01h23m19s	+07°47.8'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NNW a SSE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 2' scarsi verso SSW (ossia sul prolungamento dell'asse maggiore della gx) — 450x.
CGCG 411-45	gx	01h23m50s	+07°47.2'		Psc	24"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con MAC 0123+0747 situata a ridosso di SW — anche a prima vista si notano facilmente 2 nuclei quasi stellari ravvicinati (quello della CGCG è poco più marcato); le 2 gx si riescono comunque a separare a fatica a 450x; in visione distolta la CGCG appare a momenti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15", mentre la MAC sembra più rotonda, con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 411-58	gx	01h28m44s	+06°52.0'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 412-1	gx	01h32m18s	+03°51.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a S — 450x.
CGCG 412-9	gx	01h37m40s	+06°55.2'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 412-19	gx	01h42m50s	+08°05.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 412-24	gx	01h44m42s	+04°53.7'		Psc	24"	ottima / buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione NNE-SSW e situato subito a NNE di una stellina abbastanza brillante; a ~ 30" N di quest'ultima ce n'è un'altra appena percettibile — 450x.
CGCG 412-29	gx	01h49m10s	+05°38.4'		Psc	24"	ottima / ottimo	piccola, compatta e con nucleo stellare abbastanza marcato, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 412-30	gx	01h49m45s	+03°46.4'		Psc	24"	ottima / buono	relativamente compatta e con condensazione stellare abbastanza evidente, rotonda con Ø < 20 — 450x.
CGCG 412-40	gx	01h53m37s	+08°21.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 412-44	gx	01h54m42s	+05°25.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di aspetto un po' confuso, con una stellina a ridosso E che, nonostante sia debole, disturba un po' la visione; a tratti, in visione distolta, appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20", ma occorre osservarla più volte, alternando gli occhi — 450x.
CGCG 412-45	gx	01h55m07s	+05°22.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a SW; poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 412-47	gx	01h55m26s	+08°41.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata tra 2 deboli stelline orientate da N a S e distanti 1' — 450x.
CGCG 413-1	gx	01h56m05s	+05°46.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un piccolo oggetto molto debole e di luminosità uniforme, con Ø di una 20-ina di secondi che si riesce tutta-via a catturare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
CGCG 413-2	gx	01h56m16s	+05°36.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola; appare tuttavia facilmente in visione distolta a 450x tra NGC 741 ed MCG-1-6-5; non sembra più estesa di 15".
CGCG 413-10	gx	01h56m37s	+05°48.2'		Psc	16"	buona / ottimo	debole, rotonda, poco diffusa, con Ø max di 30"; presenta un nucleo puntiforme visibile solo a tratti 380x.
CGCG 413-14	gx	01h57m08s	+04°33.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 413-20	gx	01h58m53s	+05°25.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 413-21	gx	01h59m00s	+06°31.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 413-30	gx	02h02m09s	+08°26.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto diffuso, facilmente visibile in visione distolta a 380x, con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare.
CGCG 413-42	gx	02h06m15s	+09°38.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o poco più; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 413-56	gx	02h11m04s	+07°40.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.

CGCG 413-59	gx	02h12m24s	+08°37.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 413-60	gx	02h13m09s	+09°28.5'		Cet	24"	buona / buono	più debole e più piccola di UGC 1705, dalla quale dista poco più di 1' a SSW, diffusa, rotonda e a tratti condensata — 450x.
CGCG 413-68	gx	02h17m03s	+05°17.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 414-1	gx	02h20m14s	+08°12.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, in visione distolta appare orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta nel centro della gx) — 450x.
CGCG 414-5	gx	02h22m39s	+05°32.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 3 stelline a SE (quella più esterna è la più brillante) — 450x.
CGCG 414-6	gx	02h24m12s	+05°22.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1.5' SW e una appena percettibile a 1' verso NE — 450x.
CGCG 414-7	gx	02h24m18s	+06°28.9'		Cet	24"	buona / buono	è un ovale poco diffuso e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 414-8	gx	02h25m17s	+04°26.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 414-16	gx	02h33m13s	+09°41.7'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a NW — 450x.
CGCG 414-18	gx	02h33m35s	+06°08.3'		Cet	24"	buona / buono	chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; c' una stellina evidente al bordo S (fa parte di una losanga irregolare molto stretta orientata da E a W) — 450x.
CGCG 414-19	gx	02h33m31s	+06°31.7'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (a E della gx c'è un piccolo asterismo allungato da N a S formato da 5 stelline di cui 4 brillanti) — 450x.
CGCG 414-25	gx	02h36m24s	+07°32.0'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 414-30	gx	02h38m39s	+04°02.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 414-34	gx	02h40m38s	+08°50.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale quasi stellare abbastanza contrastata; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 414-36	gx	02h41m03s	+08°44.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	è allineata con la coppia NGC 1044-46 situata a SE — piccola e debole, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
CGCG 414-37	gx	02h41m08s	+08°13.0'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 414-40	gx	02h41m35s	+07°11.2'		Cet	24"	buona / buono	costituisce una coppia ravvicinata con MAC 0241+0710 situata a ridosso SSW; è compatta e a prima vista di aspetto quasi stellare; a 450x appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 30" verso W; la MAC è molto debole, di luminosità uniforme e di dimensioni simili; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S; un'altra stellina relativamente brillante si trova a 1' SW.
CGCG 414-42	gx	02h42m25s	+08°12.6'		Cet	24"	buona / buono	difficilissima in quanto letteralmente "annegata" nella luce della SAO 110696 di 10ª grandezza; solo in visione distolta ci si accorge a tratti che l'alone della stella non è regolare, ma tende ad aggettare verso NW — 450x.
CGCG 414-43	gx	02h42m52s	+07°35.9'		Cet	24"	buona / buono	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 414-44	gx	02h43m02s	+08°07.8'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, grosso modo rotonda con Ø < 30"; c'è una coppia serrata di stelline brillante a 5' verso W.
CGCG 414-46	gx	02h43m43s	+07°41.5'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con un bulge appena evidente; situata a SE di un piccolo asterismo triangolare formato da 4 stelline piuttosto deboli — 450x.
CGCG 415-3	gx	02h44m01s	+05°02.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 415-4	gx	02h44m00s	+05°25.8'		Cet	24"	m. buona / buono	assieme a CGCG 415-5 forma una coppia di deboli galassiette relativamente facili distanti 1' in direzione NW-SE; la 1ª è rotonda e leggermente condensata; la 2ª è poco più estesa ed evidente, con Ø di una 20-ina di secondi e con una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 450x.
CGCG 415-5	gx	02h43m58s	+05°26.3'		Cet	24"	m. buona / buono	v. **CGCG 415-4**
CGCG 415-6	gx	02h44m43s	+05°20.1'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso verso NW — 450x.
CGCG 415-15	gx	02h51m05s	+04°27.2'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, relativamente compatta; a 450x appare chiaramente orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; ci sono tre stelline brillanti ed equidistanti allineate in direzione NW-SE che disturbano un po' il campo visuale; una 4ª stellina poco meno luminosa si trova a 1' NNE della gx — 450x.
CGCG 415-18	gx	02h53m24s	+09°25.9'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 415-19	gx	02h53m21s	+03°49.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 415-23	gx	02h54m33s	+09°27.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
CGCG 415-33	gx	02h56m28s	+04°36.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale evidente — 450x.
CGCG 415-34	gx	02h56m29s	+06°19.0'		Cet	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, disturbata da una stellina al bordo N; in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" (fa parte dell'ammasso AGC 400) — 450x.
CGCG 415-36	gx	02h56m40s	+09°25.4'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; ci sono tre stelline allineate da N a S subito a E della gx — 450x.
CGCG 415-38	gx	02h56m57s	+06°12.3'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (fa parte dell'ammasso **AGC 400**) — 450x.
CGCG 415-40	gx	02h57m34s	+05°58.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 415-41	gx	02h57m42s	+06°02.0'	q 176	Cet	24"	m. buona / m. buono	è in realtà costituita da due piccole galassiette molto ravvicinate che si separano facilmente a 450x; sono di aspetto simile, compatte, rotonde con Ø di una 15-ina di secondi ed entrambe con condensazione stellare — riportate al quadro 176 dell'Uranometria come 3Z52; il Guide 8 le denomina PGC 11188-9.
CGCG 415-42	gx	02h57m46s	+05°57.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	baffo di luce molto debole e diffuso, orientato da NW a SE ed esteso una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 415-43	gx	02h57m57s	+05°47.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 0257+0546 situata a ridosso SE — le due galassiette si separano facilmente a 450x; la 1ª è orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare; la MAC è grosso modo rotonda con Ø < 20" e presenta una piccola condensazione centrale evidente.
CGCG 415-46	gx	02h58m21s	+06°05.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	debole, rotonda, con condensazione centrale quasi stellare abbastanza evidente e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' NE — 380x.
CGCG 415-47	gx	02h58m25s	+06°35.5'		Cet	24"	buona / buono	relativamente facile, molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S, di dimensioni 60"×45" e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 415-49	gx	02h59m01s	+06°16.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare molto tenue — 450x.
CGCG 415-50	gx	02h59m16s	+06°08.0'		Cet	16"	ottima / ottimo	è un debole oggetto rotondo esteso non più di 25" o 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ~ 45" verso SE — 380x.
CGCG 415-52	gx	03h00m09s	+05°48.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 415-54	gx	03h03m04s	+04°23.6'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
CGCG 415-55	gx	03h03m18s	+04°16.7'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 415-59	gx	03h05m13s	+05°51.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	è una bolla circolare di luminosità pressoché uniforme, cono Ø di una 30-ina di secondi e di aspetto molto regolare — 450x.
CGCG 415-61	gx	03h05m55s	+04°51.5'		Cet	24"	buona / ottimo	diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso S (fa parte di una coppia larga orientata da NE a SW) — 450x.
CGCG 416-3	gx	03h10m09s	+04°50.9'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (è situata a ridosso S di un piccolo asterismo irregolare formato da 4 stelline brillanti — 450x.
CGCG 416-12	gx	03h27m36s	+05°44.9'		Tau	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 417-2	gx	03h37m41s	+04°57.2'		Tau	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, poco meno evidente di UGC 2802, dalla quale dista un paio di primi a W, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 417-5	gx	03h42m07s	+04°14.0'		Tau	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 417-6	gx	03h43m54s	+06°31.8'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di deboli stelline a ridosso W — 450x.
CGCG 417-8	gx	03h51m10s	+03°47.7'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debole e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 417-9	gx	03h52m53s	+07°03.4'		Tau	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra 2 deboli stelline orientate da NE a SW — 450x.
CGCG 417-10	gx	03h54m48s	+06°15.8'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con piccolo bulge molto tenue; c'è una stellina percettibile solo a momenti subito a S — 450x.
CGCG 418-2	gx	03h56m58s	+08°30.8'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina brillante a 1.5' NNE e una poco più debole alla stessa distanza verso S — 450x.
CGCG 418-4	gx	03h59m24s	+06°40.8'		Tau	16"	ottima / scarso	piccola, abbastanza compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
CGCG 418-5	gx	03h59m25s	+06°41.9'		Tau	16"	ottima / scarso	poco più piccola e più debole di CGCG 418-4, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale visibile a tratti — 270x.
CGCG 418-9	gx	04h05m30s	+04°24.7'		Tau	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 418-11	gx	04h06m49s	+06°56.5'		Tau	24"	ottima / buono	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è un trio di stelline allineate ed equidistanti ~ 2' a NE — 450x.
CGCG 418-15	gx	04h13m12s	+06°33.5'		Tau	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 419-1	gx	04h21m20s	+03°27.3'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile visibile tuttavia solo a momenti a ridosso W.
CGCG 419-3	gx	04h22m21s	+07°13.2'		Tau	24"	ottima / buono	debole, diffusa e a tratti poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di deboli stelline un paio di primi a W e un'altra coppia più larga grosso modo alla stessa distanza verso SE, ma orientata a perpendicolo con la prima — 450x.
CGCG 419-4	gx	04h22m33s	+03°12.1'		Tau	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e con una tenuissima screziatura interna visibile a 450x; è allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20".
CGCG 419-7	gx	04h25m38s	+07°18.4'		Tau	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso N e un'altra più debole a poco più di 1' NW — 450x.
CGCG 419-9	gx	04h28m51s	+07°45.2'		Tau	24"	ottima / buono	molto debole e poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 419-15	gx	04h31m14s	+08°30.7'		Tau	16"	ottima / scarso	è un piccolo e debole oggetto rotondo con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ~ 1' verso NE — 270x.
CGCG 419-17	gx	04h32m00s	+06°46.7'		Tau	16"	ottima / scarso	debole, piccola e rotonda, con Ø di 25" e di luminosità uniforme — 270x.
CGCG 419-18	gx	04h34m44s	+08°08.6'		Tau	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 30"; forma una coppia abbastanza ravvicinata con **MCG+1-12-11** situata 1.5' a NNW — 450x.
CGCG 419-20	gx	04h35m41s	+08°15.1'		Tau	16"	ottima / ottimo	a 380x si vede solo un tenuissimo alone esteso una 30-ina di secondi che circonda una stellina abbastanza brillante: quella situata 6' SSE, di luminosità simile, di fatto ne è priva; l'effetto è evidente in visione distolta.
CGCG 420-14	gx	04h53m27s	+07°08.2'		Ori	24"	ottima / buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
CGCG 420-15	gx	04h53m26s	+04°03.7'		Ori	24"	buona / scarso	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 340x.
CGCG 420-16	gx	04h53m52s	+03°44.5'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione stellare — 450x.
CGCG 420-17	gx	04h53m57s	+03°35.6'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SW; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 420-21	gx	04h58m12s	+03°58.1'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (il campo è ricco di stelle brillanti) — 450x.
CGCG 420-28	gx	05h01m18s	+07°34.3'		Ori	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 420-32	gx	05h03m34s	+04°40.8'		Ori	24"	buona / scarso	relativamente compatta e brillante, piccola e condensata, rotonda con Ø < 20"; il campo è molto ricco di stelle brillanti — 340x.
CGCG 421-5	gx	05h12m09s	+05°27.7'		Ori	24"	m. buona / ottimo	debole chiazza circolare con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e appena più brillante verso l'interno; c'è una stellina brillante a 1' W e una doppia abbastanza stretta alla stessa distanza verso SE — 450x.
CGCG 421-9	gx	05h15m15s	+06°15.9'		Ori	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante e compatta, piccola, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 421-30	gx	05h20m12s	+05°30.3'		Ori	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; poco meglio definita scalando a 340x.
CGCG 421-31	gx	05h20m12s	+05°55.3'		Ori	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 5' a N di CGCG 421-30) — 450x.
CGCG 421-34	gx	05h20m48s	+03°15.6'		Ori	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia con CGCG 421-35 situata a 1' SE — relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare evidente — 450x.
CGCG 421-35	gx	05h20m53s	+03°15.0'		Ori	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia con CGCG 421-34 situata a 1' NW — poco allungata da E a W di dimensioni 20"×15" e con nucleo stellare più debole — 450x.
CGCG 421-43	gx	05h22m43s	+03°41.3'		Ori	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 424-2	gx	20h22m31s	+10°09.0'		Del	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccolo nucleo evidente; c'è una stellina appena percettibile a NW (a poco meno della distanza che separa la gx dalla stellina brillante a SE — 450x.
CGCG 424-3	gx	20h24m22s	+12°34.7'		Del	24"	buona / ottimo	baffo di luce molto tenue e diffuso, esteso una 30-ina di secondi in direzione E-W; c'è una stellina brillante a ridosso NW che disturba molto la visione (a prima vista la gx sembra dipartirsi da questa) — 450x.
CGCG 424-5	gx	20h25m30s	+10°34.3'		Del	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a ridosso verso SW e un'altra poco più distante a SE — 450x.
CGCG 424-6	gx	20h26m26s	+15°01.1'		Del	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una doppia stretta a W subito irrisolta subito a W che a prima vista dà l'impressione di un piccolo oggetto diffuso — 450x e 580x.
CGCG 424-7	gx	20h26m43s	+10°41.7'		Del	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi e una nucleo stellare — 450x.
CGCG 424-8	gx	20h27m35s	+12°04.6'		Del	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' W (il campo ne è comunque ricco) — 450x.
CGCG 424-10	gx	20h27m53s	+13°31.0'		Del	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; ci sono 3 stelline allineate (quella centrale più brillante) a 1' verso E — 450x.
CGCG 424-11	gx	20h28m13s	+14°17.0'		Del	24"	m. buona / discreto	è una piccola e debolissima chiazza, diffusa, situata a ridosso N di una coppia di stelline appena percettibili; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una tripletta irrisolta di deboli stelline situate un paio di primi scarsi più a W dà l'impressione di un piccolo oggetto diffuso orientato da NE a SW con dimensioni di 20"×10" — 450x.
CGCG 424-16	gx	20h30m18s	+13°38.8'		Del	24"	buona / ottimo	è una debolissima lama di luce che si diparte a N di una stellina; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; un'altra stellina poco più evidente si trova quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 424-27	gx	20h37m04s	+12°39.1'		Del	24"	ottima / m. buono	debole e relativamente compatta, poco più brillante all'interno, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 424-30	gx	20h38m09s	+10°43.5'		Del	24"	buona / discreto	diffusa e poco più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; allineata con 4 stelline brillanti a NE; un'altra stellina abbastanza brillante si trova subito a W (presenza di debole chiarore lunare) — 450x.
CGCG 424-31	gx	20h38m09s	+10°43.5'		Del	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' NW (presenza di debole chiarore lunare)— 450x.
CGCG 424-33	gx	20h38m45s	+09°43.5'		Del	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; forma un piccolissimo triangolo isoscele con 2 stelline, a W e a S — 450x.
CGCG 424-34	gx	20h38m38s	+12°10.5'		Del	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, estesa una 40-ina di secondi e con una stellina brillante al bordo NE — 400x.
CGCG 424-39	gx	20h40m44s	+10°47.1'		Del	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 424-42	gx	20h42m14s	+11°33.9'		Del	24"	buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
CGCG 425-4	gx	20h45m24s	+12°57.2'		Del	24"	buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa, grosso modo rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 425-5	gx	20h46m46s	+11°17.2'		Del	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø che in visione distolta è < 40"; anche se vi è presenza di debole chiarore lunare, la gx appare poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 425-7	gx	20h47m24s	+13°05.1'		Del	24"	buona / buono	debole oggetto rotondo, diffuso, con Ø max di 30" e nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 400x.
CGCG 425-8	gx	20h48m01s	+13°44.4'		Del	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
CGCG 425-9	gx	20h49m18s	+11°18.2'		Del	24"	ottima / m. buono	piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 425-10	gx	20h49m53s	+09°57.5'		Del	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è un mini triangolo di deboli stelline a ridosso SE (situate a poco meno di 4' NNW di NGC 6972) — 450x.
CGCG 425-12	gx	20h49m58s	+13°02.1'		Del	24"	buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
CGCG 425-13	gx	20h50m13s	+13°20.7'		Del	24"	buona / ottimo	è una debolissima chiazza oblunga estesa una 30-ina di secondi, orientata da E a W e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante subito a S; la visione è molto disturbata dalla SAO 106549 di magnitudo 6.8 situata 3' a S — 450x.
CGCG 425-14	gx	20h50m29s	+09°49.0'		Del	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso W — 450x.
CGCG 425-15	gx	20h52m00s	+13°29.7'		Del	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø < 40"; c'è una debole stellina a ridosso verso N — 450x.
CGCG 425-18	gx	20h55m29s	+15°30.8'		Del	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 425-19	gx	20h55m30s	+15°31.5'		Del	24"	ottima / m. buono	poco più evidente di CGCG 425-18, dalla quale dista 45" a NNE, molto piccola, compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 425-22	gx	20h57m09s	+13°31.5'		Del	24"	buona / discreto	è una debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa ~ 1'; appare in visione distolta a poco più di 1' NE di una stellina brillante, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
CGCG 425-25	gx	20h57m45s	+13°59.6'		Del	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SW 450x.
CGCG 425-26	gx	20h58m04s	+11°03.2'		Del	24"	buona / buono	debole, rotonda, diffusa e di luminosità pressoché uniforme con Ø di 45"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 400x.
CGCG 425-27	gx	20h58m06s	+13°30.9'		Del	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; in visione distolta sembra aggettare a E di una debole stellina — 450x.
CGCG 425-28	gx	20h59m07s	+11°08.8'		Equ	24"	buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 425-30	gx	20h59m27s	+13°56.1'		Del	24"	buona / discreto	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 450x.
CGCG 425-31	gx	21h00m06s	+09°55.9'		Equ	24"	discreta / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 425-32	gx	21h00m45s	+13°19.6'		Del	24"	discreta / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S e di luminosità pressoché uniforme, salvo una tenue condensazione centrale osservabile però solo a tratti — 570x.
CGCG 425-34	gx	21h02m22s	+10°58.3'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, poco diffusa e condensata, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 425-36	gx	21h02m54s	+15°23.5'		Del	24"	buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 425-39	gx	21h03m58s	+13°08.5'		Del	24"	buona / ottimo	piccolo e debolissimo baffo di luce che si estende a S di una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 425-42	gx	21h07m36s	+12°19.7'		Equ	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente facile, poco diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare; c'è una piccola catena di 4 stelline che parte da E e si estende verso SW — 450x.
CGCG 426-2	gx	21h07m35s	+15°10.0'		Del	24"	m. buona / m. buono	facile, poco diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30"; stella brillante di 10ª a poco più di 1' verso W — 450x.
CGCG 426-3	gx	21h08m07s	+12°02.3'		Equ	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, a tratti allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso di NE (la componente mediana di un triangolo molto aperto); stellina appena percettibile a ridosso SW — 340x.
CGCG 426-8	gx	21h10m06s	+12°03.4'		Equ	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso E; una più brillante si trova subito a N — 450x.
CGCG 426-9	gx	21h10m57s	+15°13.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE e un'altra più debole e poco più distante a WSW — 450x.
CGCG 426-10	gx	21h11m21s	+11°27.4'		Equ	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; situata tra due deboli stelline distanti 1' e orientate da NE a SW — 450x.
CGCG 426-11	gx	21h11m33s	+11°20.3'		Equ	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 426-12	gx	21h11m37s	+11°29.8'		Equ	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, addirittura di aspetto quasi stellare a 340x, mentre a 450x in visione distolta appare estesa non più di 10"-12".
CGCG 426-13	gx	21h11m35s	+13°20.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 426-15	gx	21h12m01s	+11°29.7'		Equ	24"	m. buona / m. buono	poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20", diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a una 30-ina di secondi verso SW — 400x.
CGCG 426-17	gx	21h12m16s	+13°01.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×30" — 380x.
CGCG 426-21	gx	21h12m42s	+13°58.9'		Peg	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa con alto gradiente e Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 380x.
CGCG 426-26	gx	21h14m44s	+10°52.3'		Equ	24"	m. buona / m. buono	debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante di 11-esima a ridosso NE che infastidisce 450x.
CGCG 426-28	gx	21h15m42s	+15°40.4'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 426-29	gx	21h16m25s	+10°16.4'		Equ	24"	m. buona / mediocre	piccola, diffusa, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e condensazione centrale di aspetto quasi stellare evidente — 340x.
CGCG 426-30	gx	21h16m33s	+11°29.7'		Equ	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio tuttavia scalare a 280x.
CGCG 426-31	gx	21h16m47s	+15°03.5'		Peg	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso SSE — diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 426-32	gx	21h16m48s	+15°02.9'		Peg	24"	ottima / buono	più compatta e brillante della precedente situata a ridosso NNW, poco allungata da N a S con dimensioni 25"×20" — 450x.
CGCG 426-33	gx	21h16m53s	+13°16.2'		Peg	24"	ottima / buono	relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×20"; situata subito a NW di un piccolo asterismo di 6 deboli stelline — 450x.
CGCG 426-35	gx	21h17m32s	+15°27.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina molto debole al bordo N; una coppia di stelline altrettanto deboli si trova subito a E (insieme formano un minuscolo triangolo) — 450x.
CGCG 426-41	gx	21h20m21s	+10°19.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi: c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 426-43	gx	21h21m36s	+11°18.0'		Equ	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N; c'è una doppia stretta a un paio di primi NNW, ma a causa del seeing si fatica a separare — 340x.
CGCG 426-44	gx	21h21m49s	+10°39.3'		Equ	24"	buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di 45" e piccolo nucleo appena percettibile — 400x.
CGCG 426-47	gx	21h22m41s	+14°52.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante a meno di 1' verso NE — 450x.
CGCG 426-48	gx	21h23m04s	+15°23.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso E — 380x.
CGCG 426-49	gx	21h23m22s	+10°08.0'		Equ	24"	m. buona / m. buono	debole ovale molto diffuso, orientato da E a W con dimensioni 45"×30" e solo a tratti poco più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' verso NW — 450x.
CGCG 426-51	gx	21h24m58s	+10°51.7'		Equ	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 426-52	gx	21h25m01s	+12°26.4'		Equ	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W — 450x.
CGCG 426-56	gx	21h27m11s	+15°15.8'		Peg	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia serrata con MAC 2127+1515 situata a ridosso verso W; a causa del seeing si sdoppiano tuttavia solo a tratti; la galassia è comunque debolissima, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; la compagne è anche lei debolissima, ma più compatta, con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a 1' SE e un'altra appena percettibile subito a S; meglio contrastate scalando a 340x.
CGCG 426-57	gx	21h28m02s	+12°44.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' NW e una percettibile solo a momenti più o meno alla stessa distanza verso N; tre stelline allineate della stessa luminosità si trovano a E della gx — 450x.
CGCG 427-1	gx	21h31m38s	+11°49.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme; è situata al vertice rettangolo di un piccolo triangolo formato con 2 stelline: 45" a W e 1.5' a E — 450x.
CGCG 427-7	gx	21h37m31s	+14°35.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	rotonda, poco diffusa e leggermente condensata, con Ø di una 30-ina di secondi; è allineata ed equidistante con 2 deboli stelline situate a SE.
CGCG 427-8	gx	21h38m00s	+14°33.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	più debole di CGCG 427-7, ma relativamente compatta, rotonda con Ø simile; c'è una stellina a 45" verso E — 400x.
CGCG 427-9	gx	21h39m17s	+10°20.0'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima lama di luce molto piccola che a prima vista sembra come aggettare verso N da una stellina abbastanza brillante per una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 427-10	gx	21h39m43s	+10°20.3'		Peg	24"	buona / m. buono	debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso SE e un'altra di egual magnitudo poco più lontano — 450x.
CGCG 427-12	gx	21h40m21s	+12°21.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×20".
CGCG 427-15	gx	21h42m20s	+14°48.5'		Peg	24"	m. buona / mediocre	piccolo oggetto rotondo con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffuso e leggermente più brillante all'interno — 450x.
CGCG 427-17	gx	21h42m27s	+13°54.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	diffusa e appena più brillante all'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 50"×40" — 400x.
CGCG 427-19	gx	21h45m10s	+10°06.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	allungata da E a W, di dimensioni 30"×20", poco diffusa e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a SW e un'altra più brillante a NW — 450x.
CGCG 427-26	gx	21h49m59s	+14°05.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 400x.
CGCG 427-27	gx	21h50m38s	+13°17.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è un ovale relativamente compatto e di luminosità pressoché uniforme, orientato da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con una stellina al bordo NW — 400x.
CGCG 427-28	gx	21h50m47s	+14°06.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole e molto diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina al bordo N — 450x.
CGCG 427-29	gx	21h51m02s	+14°32.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; situata all'interno di un piccolo asterismo irregolare di forma vagamente triangolare — 450x.
CGCG 427-30	gx	21h52m07s	+12°40.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare solo a tratti orientata ~ da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" (a prima vista è di forma indistinta) — 450x.
CGCG 427-31	gx	21h52m24s	+12°38.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline diseguali a N; la SAO 107460 di 8ª grandezza situata 6' a S si riesce a malapena a tenere fuori campo — 450x.
CGCG 427-32	gx	21h52m38s	+12°32.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	appare facilmente malgrado la luce intensa della SAO 107460 di 8ª grandezza situata ad appena 3' W, rotonda, poco diffusa, con Ø > 30" e poco più brillante all'interno; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso N — 450x.
CGCG 427-33	gx	21h53m00s	+10°12.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 427-34	gx	21h52m53s	+15°34.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un quartetto assieme alle tre successive — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso; c'è una stellina a ridosso verso N; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 427-35	gx	21h53m16s	+15°36.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un quartetto assieme alla precedente e alle due successive — debole, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 427-36	gx	21h53m20s	+15°33.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un quartetto assieme alle due precedente e alla successiva — poco diffusa, rotonda, con tenue nucleo stellare e Ø < 30" — 450x.
CGCG 427-37	gx	21h53m23s	+15°31.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un quartetto assieme alle tre precedenti — rotonda, di Ø simile a CGCG 427-36, ma con condensazione centrale più marcata — 450x.
CGCG 427-38	gx	21h53m47s	+10°03.1'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debole, rotonda con Ø > 30" e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso SW e un'altra poco più lontana a SE — 450x.
CGCG 428-8	gx	21h59m24s	+10°29.1'		Peg	24"	ottima / m. buono	diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø < 30"; c'è una stella abbastanza brillante subito a S (fa parte di una coppia di stelle luminose distanti 1' e orientate da NW a SE) — 450x.
CGCG 428-9	gx	21h59m43s	+10°19.4'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE — 450x.
CGCG 428-10	gx	21h59m53s	+13°34.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a W — meglio visibile scalando a 340x.
CGCG 428-12	gx	22h00m39s	+11°22.4'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 428-13	gx	22h01m39s	+09°58.9'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme e di Ø di 30", situata a ridosso E di una stellina brillante (la quale fa parte di un asterismo di stelline brillanti molto utile come riferimento); c'è una debolissima stellina percettibile a tratti a ridosso verso E (o NE) — 380x.
CGCG 428-14	gx	22h01m42s	+11°51.4'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debole e molto diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 428-15	gx	22h01m56s	+15°10.5'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto piccola, purtroppo disturbata da una stellina brillante a ridosso verso N; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" (o poco più) — 450x.
CGCG 428-20	gx	22h03m07s	+12°57.0'		Peg	24"	buona / m. buono	debole, molto diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 428-26	gx	22h04m19s	+12°58.1'		Peg	24"	buona / m. buono	più evidente di CGCG 428-20 e con tenue condensazione centrale diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; è situata all'interno di un piccolo asterismo di 4 stelle fatto a uncino — 450x.
CGCG 428-27	gx	22h04m29s	+12°26.6'		Peg	24"	buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo NE — 450x.
CGCG 428-28	gx	22h06m02s	+14°18.1'		Peg	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e nucleo stellare; c'è una stellina a 1' scarso verso S (è sorta una cospicua falce di luna) — 450x.
CGCG 428-33	gx	22h07m17s	+14°24.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 428-36	gx	22h09m11s	+13°30.4'		Peg	24"	discreta / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a ridosso verso S — 400x.
CGCG 428-38	gx	22h09m40s	+13°38.1'		Peg	24"	discreta / m. buono	più debole di CGCG 428-36 dalla quale dista una decina di primi a NE; in visione distolta appare a tratti molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 428-41	gx	22h11m36s	+10°53.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 428-49	gx	22h13m46s	+13°47.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare visibile a momenti — 450x.
CGCG 428-52	gx	22h14m06s	+13°29.2'		Peg	24"	discreta / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30" o poco più; c'è una stellina brillante a ridosso verso NE — 400x.
CGCG 428-53	gx	22h14m10s	+13°16.8'		Peg	24"	discreta / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 400x.
CGCG 428-54	gx	22h14m22s	+13°57.2'		Peg	24"	discreta / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare molto tenue — 400x.
CGCG 428-55	gx	22h14m24s	+15°22.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso S di una stellina brillante — 450x.
CGCG 428-56	gx	22h14m26s	+15°21.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e con tenue nucleo stellare, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 428-57	gx	22h14m32s	+13°46.3'		Peg	24"	discreta / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 400x.
CGCG 428-59	gx	22h14m51s	+13°42.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 428-61	gx	22h15m03s	+15°24.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
CGCG 428-62	gx	22h15m29s	+15°34.1'		Peg	24"	discreta / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi scarsi e di luminosità uniforme — 400x.
CGCG 428-63	gx	22h16m00s	+14°07.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con piccola condensazione centrale di aspetto quasi stellare e Ø di ~ 40"; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' verso SE — 380x.
CGCG 428-65	gx	22h17m12s	+14°14.3'		Peg	24"	buona / m. buono	è un tenuissimo alone esteso una 20-ina di secondi che circonda una stellina; anche a 570x si fa fatica a dirimere la questione; una stellina appena percettibile è visibile solo a tratti a ridosso verso NW.
CGCG 428-66	gx	22h17m09s	+14°29.9'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissimo ovale di 50"×30" orientato da E a W e di luminosità uniforme; c'è una stellina al bordo SW — 450x.
CGCG 429-6	gx	22h28m32s	+12°02.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è molto debole, ma in visione distolta pare relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 429-12	gx	22h36m50s	+14°23.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, a tratti poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso NW — 450x.

CGCG 429-16	gx	22h39m22s	+13°52.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 45" verso NW — 450x.
CGCG 429-21	gx	22h41m11s	+13°20.4'		Peg	16"	buona / m. buono	appare solo a tratti come una stellina leggermente sfuocata a 45" di una stellina che costituisce il vertice occidentale di un piccolo triangolo equilatero formato con la coppia NGC 7194-5 — 270x.
CGCG 429-22	gx	22h41m22s	+09°44.6'		Peg	24"	m. buona / buono	relativamente facile, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo quasi stellare — 450x.
CGCG 430-1	gx	22h44m10s	+09°59.4'		Peg	24"	m. buona / buono	fa parte assieme a CGCG 430-2 e CGCG 430-3 di un terzetto di galassiette quasi allineate ed equidistanti in direzione N-S — presenta un nucleo stellare marcato circonfuso da un tenue alone rotondo molto stemperato e con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso S e una coppia si stelline brillanti subito a SW — 450x.
CGCG 430-2	gx	22h44m11s	+10°01.8'		Peg	24"	m. buona / buono	fa parte assieme alla precedente e alla successiva di un terzetto di galassiette quasi allineate ed equidistanti in direzione N-S e di cui rappresenta la componente più debole: è allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo 40"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 430-3	gx	22h44m09s	+10°04.2'		Peg	24"	m. buona / buono	fa parte assieme alle due precedenti di un terzetto di galassiette quasi allineate ed equidistanti in direzione N-S e di cui rappresenta la componente più facile: è rotonda, poco diffusa, con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 430-5	gx	22h45m59s	+10°52.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	è praticamente offuscata da una stellina sovrapposta situata 1' scarso NNW di NGC 7374; solo in visione distolta appare a momenti circonfusa da un piccolo alone molto tenue — 450x.
CGCG 430-9	gx	22h46m39s	+11°11.9'		Peg	24"	buona / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo meridionale; meglio definita scalando a 340x.
CGCG 430-13	gx	22h49m37s	+12°00.4'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina al bordo orientale — 450x.
CGCG 430-15	gx	22h45m59s	+10°52.0'		Peg	16"	buona / m. buono	piccola, compatta e molto debole; a 270x appare in visione distolta a 1' NW di NGC 7374.
CGCG 430-17	gx	22h50m00s	+12°03.5'		Peg	24"	buona / ottimo	relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un marcato nucleo quasi stellare; c'è una stella brillante quasi a ridosso verso SW — 450x.
CGCG 430-21	gx	22h50m52s	+12°33.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è un quadrato perfetto di stelle brillanti con componenti della stessa luminosità a 5' NE — 450x.
CGCG 430-22	gx	22h51m00s	+11°14.0'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata~ da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 430-23	gx	22h50m59s	+12°03.4'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 430-31	gx	22h56m09s	+13°05.9'		Peg	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, allungata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 430-32	gx	22h57m09s	+13°11.3'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 430-35	gx	22h58m32s	+10°43.9'		Peg	24"	m. buona / buono	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina brillante a ~ 1' verso NE — 450x.
CGCG 430-37	gx	22h58m53s	+14°42.5'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" ; c'è una stellina a 1' verso W.
CGCG 430-43	gx	22h59m36s	+14°05.4'		Peg	24"	buona / ottimo	debolissima, poco diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso NW e un'altra appena percettibile al bordo SW — 450x.
CGCG 430-44	gx	23h00m32s	+13°02.0'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 430-46	gx	23h00m46s	+13°37.1'		Peg	24"	m. buona / buono	diffusa e di luminosità uniforme, salvo una lieve screziatura che appare solo a tratti a 450x; è rotonda con Ø di una 40-ina di secondi.
CGCG 430-48	gx	23h01m19s	+10°22.3'		Peg	24"	buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata quasi nel mezzo di 2 stelline abbastanza brillanti — 450x.
CGCG 430-52	gx	23h02m15s	+10°28.8'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 430-54	gx	23h02m40s	+13°19.7'		Peg	24"	buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 430-56	gx	23h03m36s	+10°23.2'		Peg	24"	buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; è equidistante con 2 stelline a NW con le quali forma un piccolo arco — 450x.
CGCG 430-57	gx	23h03m44s	+10°40.0'		Peg	24"	buona / ottimo	poco più estesa e diffusa di CGCG 430-56, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' verso SW — 450x.
CGCG 430-59	gx	23h05m20s	+14°10.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; un poco disturbata da una stellina brillante situata un paio di primi a NE — 450x.
CGCG 430-62	gx	23h06m50s	+15°01.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 431-24	gx	23h14m44s	+10°25.1'		Peg	24"	m. buona / mediocre	diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 431-26	gx	23h14m57s	+09°59.7'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 431-27	gx	23h15m03s	+13°09.5'		Peg	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 431-30	gx	23h16m26s	+15°44.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 431-60	gx	23h25m10s	+12°18.3'		Peg	24"	ottima / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso SW; una coppia sbilanciata di stelline brillanti si trova subito a E della gx; una seconda coppia stretta si trova a 1.5' verso, mentre una terza coppia, stavolta poco più larga, è situata 4' a NE — 450x.
CGCG 431-63	gx	23h25m30s	+09°52.1'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; poco meglio contrastata a 340x.
CGCG 431-75	gx	23h29m24s	+14°12.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 432-2	gx	23h33m27s	+14°20.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, rotonda con Ø 20"-25", poco diffusa e con nucleo stellare — 450x.
CGCG 432-14	gx	23h38m13s	+12°13.3'		Peg	24"	m. buona / mediocre	piccola, diffusa e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di max 20"; c'è una stellina al bordo SW — 450x.
CGCG 432-25	gx	23h44m32s	+12°42.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con MAC 2344+1241 situata a ridosso S; le due gx si separano con difficoltà a 450x (poco meglio a 580x, ma rimane comunque una coppia piuttosto difficile); la CGCG si vede facilmente, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la MAC appare come un piccolo "pendaglio" diffuso molto debole.
CGCG 432-27	gx	23h44m35s	+11°41.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, presenta una condensazione centrale evidente circonfusa da un tenuissimo alone rotondo con Ø di ~ 1' — 380x.
CGCG 432-29	gx	23h46m30s	+14°53.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	presenta una condensazione centrale molto evidente e un piccolo alone esteso per max 25"-30"; c'è una stellina a 1' NW; a bassi ingrandimenti potrebbe essere facilmente scambiata per una stella — 380x.
CGCG 432-30	gx	23h47m04s	+14°50.5'		Peg	16"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso verso W visibile a 380x.
CGCG 432-31	gx	23h47m09s	+15°35.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; poco disturbata dalla SAO 108833 di 9ª grandezza situata 3' a N — 450x.
CGCG 432-34	gx	23h50m48s	+15°39.0'		Peg	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20".
CGCG 433-3	gx	23h56m45s	+13°52.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, ma salta fuori senza problemi in visione distolta a 380x osservando la stellina a poco più di 1' verso E; è piccola, con dimensioni max di 20".
CGCG 433-14	gx	00h01m26s	+13°06.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante subito a W; è altresì nota come **Hickson 100B** — 450x.
CGCG 433-16	gx	00h01m34s	+15°04.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 1.5' W di una stellina, ma è meglio scalare a 340x.
CGCG 433-17	gx	00h02m04s	+12°31.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 433-24	gx	00h07m54s	+12°00.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 433-26	gx	00h08m28s	+10°12.3'		Psc	24"	discreta / buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un piccolo nucleo quasi stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 434-4	gx	00h23m18s	+13°42.1'		Psc	24"	buona / buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 434-10	gx	00h26m10s	+12°48.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, rotonda, di una 20-ina di secondi di Ø e con condensazione centrale visibile a tratti — 380x.
CGCG 434-12	gx	00h26m53s	+11°34.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20" (situata poco più di 2' a W di UGC 260) — 450x.
CGCG 434-14	gx	00h28m48s	+11°38.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 434-16	gx	00h29m39s	+11°36.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 434-24	gx	00h35m06s	+14°21.3'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 434-25	gx	00h36m10s	+12°38.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; salta fuori in visione distolta, meglio a 380x.
CGCG 435-4	gx	00h47m30s	+15°41.8'		Psc	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE — 450x.
CGCG 435-5	gx	00h47m35s	+14°09.3'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, purtroppo disturbata da una stellina situata a ridosso verso N; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 435-6	gx	00h47m45s	+12°16.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e con piccola condensazione centrale poco contrastata; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a poco più di 2' verso SE — 450x.
CGCG 435-13	gx	00h51m03s	+10°44.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, in visione distolta appare poco diffusa, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 435-21	gx	00h55m17s	+12°19.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30"; c'è una stellina a 1' verso E (fa parte di una stringa di stelline molto deboli orientate da N a S — 270x.
CGCG 435-22	gx	00h55m26s	+12°06.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva macchiolina rotonda, piccola e assai stemperata sul fondo cielo, con dimensioni 25"-30"; appare a tratti in visione distolta 1' a S di una coppia di debolissime stelline, ma è meglio scalare a 270x.
CGCG 435-26	gx	00h57m32s	+15°04.1'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 450x a 1' SSW di una stellina brillante, ma non riesco a capire com'è fatta; non sembra tuttavia più estesa di 20".
CGCG 435-28	gx	00h58m29s	+11°35.2'		Psc	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; occorre scalare a 340x, perché il campo circostante è totalmente depleto.
CGCG 435-32	gx	00h59m07s	+12°58.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto, molto piccolo e relativamente compatto, con Ø max di 15", visibile senza difficoltà a 380x.
CGCG 435-33	gx	00h59m36s	+12°59.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	altro debolissimo oggetto forse rotondo, con Ø di una 20-ina di secondi, di luminosità uniforme e diffuso; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelline distanti 1.5'; c'è una stellina a ridosso NW — 380x.
CGCG 435-38	gx	01h05m42s	+14°44.0'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; meglio evidente a 450x.
CGCG 435-40	gx	01h06m35s	+10°31.3'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 436-8	gx	01h12m09s	+12°14.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, ancorché disturbata dalla SAO 92310 di 7ª grandezza situata ad appena 3' a NE; è compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 436-15	gx	01h14m13s	+12°40.1'		Psc	24"	m. buona / buono	molto piccola, debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare relativa-mente compatta, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 436-16	gx	01h15m54s	+13°21.2'		Psc	16"	ottima / buono	molto piccola e relativamente compatta, poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme salvo una condensazione centrale molto tenue visibile a tratti a 380x.
CGCG 436-23	gx	01h19m24s	+12°27.7'		Psc	16"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 849, situata 1' a S — è più evidente, piccola, rotonda, del Ø di 30" e con condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 380x.
CGCG 436-25	gx	01h19m46s	+10°10.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 436-26	gx	01h20m00s	+12°20.9'		Psc	16"	ottima / buono	debolissima, estesa 30" o 40"; appare solo a momenti in visione distolta quando di appoggia lo sguardo su un paio di stelline situate rispettivamente 3' a N e 3' a W — 380x.
CGCG 436-30	gx	01h20m03s	+14°21.7'		Psc	16"	ottima / scarso	debole, ma relativamente facile, piccola e compatta, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 270x.
CGCG 436-31	gx	01h20m49s	+11°53.7'		Psc	24"	buona / buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e condensata; c'è una stellina a ridosso verso S e un'altra abbastanza brillante subito a NE — 450x.
CGCG 436-32	gx	01h21m09s	+15°41.7'		Psc	16"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, estesa una 20-ina di secondi; appare solo in visione distolta a 380x; c'è una stellina brillante a 1' W.
CGCG 436-34	gx	01h31m31s	+14°30.3'		Psc	16"	ottima / scarso	debole, relativamente compatta, appena più brillante all'interno, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; c'è una debole stellina a 1' verso S — 270x.
CGCG 436-35	gx	01h21m16s	+11°43.3'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 30" — 450x.
CGCG 436-53	gx	01h27m12s	+10°37.1'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina subito a W — 450x.
CGCG 436-59	gx	01h28m28s	+10°48.3'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 436-68	gx	01h31m10s	+09°57.1'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 437-6	gx	01h36m00s	+14°33.9'		Psc	24"	buona / m. buono	debole, relativamente compatta e a tratti condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 437-7	gx	01h38m55s	+15°01.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
CGCG 437-14	gx	01h43m31s	+14°23.8'		Psc	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 437-18	gx	01h44m30s	+12°25.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e con basso gradiente di luce, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 437-46	gx	01h50m55s	+12°33.0'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø < 20"; è poco spostata verso E rispetto alla congiungente di 2 stelline orientate da N a S — 450x.
CGCG 437-53	gx	01h55m52s	+14°56.4'		Ari	24"	ottima / ottimo	piccola, diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 438-2	gx	01h56m10s	+10°47.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina brillante a ridosso verso N.
CGCG 438-22	gx	02h04m51s	+11°25.3'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto disturbata dalla SAO 92781 di 9ª grandezza situata a 1' SSE; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 438-37	gx	02h11m14s	+14°07.2'		Ari	16"	ottima / ottimo	piccola, relativamente brillante, compatta, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 438-39	gx	02h11m31s	+14°18.0'		Ari	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 438-40	gx	02h11m33s	+13°55.0'		Ari	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto compatto con Ø di ~ 20", facilmente visibile a 380x.
CGCG 438-42	gx	02h12m04s	+15°35.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge diffuso poco contrastato sul disco; c'è un piccolo triangolo isoscele molto allungato subito a N col vertice più acuto che punta a NW (ossia orientato come la gx) — 450x.
CGCG 438-43	gx	02h12m39s	+14°22.0'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con condensazione stellare — 450x.
CGCG 438-47	gx	02h17m13s	+09°48.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 438-48	gx	02h17m22s	+09°51.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	poco più evidente di CGCG 438-47, dalla quale dista 3' a NE, anche questa è di luminosità uniforme e Ø simile; allineata ed equidistante con 2 stelline a W (quella più vicina è la più brillante) — 450x.
CGCG 439-5	gx	02h25m13s	+15°03.5'		Ari	24"	ottima / ottimo	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante un paio di primi verso W — 450x.
CGCG 439-8	gx	02h26m15s	+10°24.9'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina un paio di primi a S e una più debole alla stessa distanza verso SW — 450x.
CGCG 439-10	gx	02h28m22s	+10°22.9'		Cet	24"	buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 439-12	gx	02h29m46s	+10°12.0'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 439-14	gx	02h31m49s	+09°44.2'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 439-17	gx	02h34m15s	+10°33.6'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 439-21	gx	02h38m53s	+10°17.7'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 439-26	gx	02h40m33s	+14°17.9'		Ari	24"	ottima / ottimo	rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e piccola condensazione centrale diffusa; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline situate 2' a NNE e 2.5' a E (la 1a è più brillante); una stellina debole a poco più di 1' SE; una tripletta serrata si trova 3' a NW — 450x.
CGCG 440-5	gx	02h46m24s	+11°05.5'		Ari	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" (o poco più); c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 440-11	gx	02h48m29s	+11°59.6'		Ari	24"	buona / buono	appare elusivamente in visione distolta quando si osserva **PGC 10628** situata un paio di primi scarsi a NE; in visione distolta non sembra più estesa di 15" — 450x.
CGCG 440-12	gx	02h48m36s	+14°15.9'		Ari	24"	ottima / ottimo	poco più debole di UGC 2282 situata 3' a NNE, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' W — 450x.
CGCG 440-17	gx	02h49m53s	+14°24.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 440-39	gx	02h58m14s	+11°08.0'		Ari	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, con marcata condensazione centrale quasi stellare, grosso modo rotonda con Ø di ~ 30" — 380x.
CGCG 441-13	gx	03h29m24s	+13°45.5'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' verso W — 450x.
CGCG 445-1	gx	04h59m03s	+12°24.1'		Ori	24"	ottima / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata dalla luce della SAO 90241 di 9a grandezza situata 1.5' a NW; una debole stellina si trova 1' scarso a W della gx — 450x.
CGCG 445-2	gx	05h03m56s	+11°00.4'		Ori	24"	ottima / buono	debole e molto piccola, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso SSE; una coppia di stelline orientate da E a W si trova a 1' NW — 450x.
CGCG 447-1	gx	20h28m13s	+14°17.0'		Sge	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, appare come “incastonata" tra 2 stelline brillanti orientate da N a S; la gx è in realtà minore di questa distanza, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 447-3	gx	20h24m04s	+15°45.4'		Del	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia molto ravvicinata con **2MASS 20240580+1545243** situata a ridosso verso E — a prima vista paiono di aspetto simile, ma forzando a 580x si nota che la CGCG è poco più estesa e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, mentre la compagna è poco più piccola (Ø 15") e presenta una condensazione centrale più evidente.
CGCG 447-10	gx	20h33m26s	+16°04.5'		Del	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina subito a E e una abbastanza brillante a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 447-11	gx	20h33m27s	+19°05.2'	q 159	Sge	24"	m. buona / ottimo	è un tenuissimo baffo di luce che aggetta elusivamente a E di una stellina per una 20-ina sì e no di secondi; una doppia stretta si trova quasi a ridosso verso W — 450x.
CGCG 447-12	gx	20h36m17s	+19°12.5'		Del	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa, di forma indistinta ed estesa < 30", immersa nei bagliori della SAO 106288 di 8ª grandezza situata a ridosso E; in visione distolta appare aggettare dall'alone della stella — 450x.
CGCG 447-18	gx	20h43m24s	+16°59.3'		Del	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W; disturbata da una doppia stretta molto brillante situata a 2.5' SSE — 450x.
CGCG 448-4	gx	20h46m10s	+18°56.1'		Del	24"	buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 448-5	gx	20h47m28s	+16°25.3'		Del	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare approssim. rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile subito a SE — 450x.
CGCG 448-6	gx	20h47m35s	+20°48.3'		Vul	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza forse rotonda con Ø < 30"; c'è una coppia di deboli stelline a ridosso W e SW — 450x.
CGCG 448-7	gx	20h48m08s	+16°23.0'		Del	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 448-9	gx	20h48m44s	+16°43.0'		Del	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 448-10	gx	20h49m17s	+17°05.0'		Del	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 40"; sembra letteralmente "accendersi" in visione distolta, anche se l'effetto è più vistoso scalando a 340x; c'è una stellina a ridosso verso W.
CGCG 448-12	gx	20h50m38s	+16°36.1'		Del	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' SW — 450x.
CGCG 448-14	gx	20h51m00s	+16°34.0'		Del	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e condensata, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 448-15	gx	20h51m22s	+18°58.7'		Del	16"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, visibile a tratti a 380x, ma ciò nonostante è meglio definita di UGC 11643 dalla quale dista 1' NW: a tratti appare infatti allungata da E a W con dimensioni 20"×10".
CGCG 448-18	gx	20h56m18s	+17°19.2'		Del	24"	ottima / ottimo	debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 448-19	gx	20h56m30s	+17°13.9'		Del	24"	ottima / ottimo	anche a 450x è di aspetto praticamente stellare, forse a causa del nucleo puntiforme che maschera un minuscolo alone; c'è una piccola losanga di deboli stelline a ridosso S; la visione è comunque un po' disturbata dalla SAO 106682 di 8ª grandezza situata a poco più di 1' NNE.
CGCG 448-22	gx	20h58m17s	+17°50.1'		Del	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 448-23	gx	20h58m58s	+17°40.4'		Del	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso SW; è un po' disturbata da una doppia molto stretta e brillante situata a 1' NW — 450x.
CGCG 448-28	gx	21h00m51s	+16°18.3'		Del	24"	ottima / buono	relativamente compatta, rotonda con Ø una 30-ina di secondi (poco inferiore alla distanza delle 2 stelline brillanti situate 2.5' NNW) e di luminosità pressoché uniforme — 340x.
CGCG 448-30	gx	21h01m16s	+16°09.7'		Del	24"	ottima / buono	debolissima, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N (situata a 3.5' ESE del globulare NGC 7006) — 340x.
CGCG 448-33	gx	21h03m07s	+16°01.8'		Del	24"	buona / buono	debole, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e tenue condensazione centrale abbastanza evidente a 400x; c'è una stellina quasi a ridosso verso E.
CGCG 448-35	gx	21h03m43s	+16°03.0'		Del	24"	buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 400x.
CGCG 449-2	gx	21h07m27s	+18°03.2'		Del	16"	buona / m. buono	debole, rotonda, diffusa con Ø di una 30-ina di secondi e poco più brillante all'interno — 380x.
CGCG 449-5	gx	21h08m21s	+18°12.1'		Del	16"	buona / m. buono	poco più evidente di CGCG 449-2, rotonda e di Ø simile, con condensazione centrale osservabile a 380x.
CGCG 449-7	gx	21h09m08s	+16°06.0'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa, con tenue e piccola condensazione centrale, rotonda con Ø < 30"; situata in un campo molto ricco di stelle — 340x.
CGCG 449-12	gx	21h14m38s	+19°00.3'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda di una 40-ina di secondi di Ø e con condensazione centrale; meglio tuttavia scalare a 270x.
CGCG 449-14	gx	21h16m46s	+20°18.3'		Vul	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
CGCG 449-20	gx	21h23m21s	+17°15.5'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 25"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S — 450.
CGCG 449-21	gx	21h23m33s	+17°35.1'		Peg	16"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 30"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 30" ENE — 380x.
CGCG 449-22	gx	21h23m50s	+17°34.3'		Peg	16"	buona / ottimo	è poco più evidente, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 449-24	gx	21h24m11s	+15°59.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina quasi a ridosso SW, mentre una brillante si trova a 1' verso E — 450x.
CGCG 450-2	gx	21h34m57s	+20°36.1'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, situata a ridosso SE di una stellina brillante; in visione distolta appare orientata grosso modo da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 450-7	gx	21h51m40s	+16°21.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E e un'altra della stessa luminosità a 1' NE — 450x.
CGCG 451-1	gx	21h57m35s	+16°38.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole ma relativamente compatta allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso vesto SW, un'altra poco più evidente a NE e una terza abbastanza brillante a W — 450x.
CGCG 451-9	gx	22h06m38s	+17°27.6'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a meno di 1' SE (questa stellina ha una debole compagna a N) — 450x.
CGCG 451-10	gx	22h07m48s	+18°31.8'		Peg	24"	ottima / buono	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, probabilmente rotonda con Ø < 40"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 451-12	gx	22h09m02s	+17°50.3'		Peg	24"	ottima / buono	assieme a CGCG 451-13 forma una coppia di piccoli oggetti diffusi distanti 1' in direzione N-S e di luminosità uniforme; il 1º è orientato da E a W con dimensioni 20"×10", mentre il 2º è rotondo con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 451-13	gx	22h09m03s	+17°50.3'		Peg	24"	ottima / buono	v. **CGCG 451-12**
CGCG 451-14	gx	22h08m58s	+18°58.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 451-15	gx	22h09m13s	+20°23.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 450x.
CGCG 451-17	gx	22h09m39s	+17°39.7'		Peg	24"	ottima / buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø max di 20"; è allineata con una coppia di deboli stelline a ESE — 450x.
CGCG 451-19	gx	22h09m47s	+18°30.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso NW — 450x.
CGCG 451-20	gx	22h09m59s	+16°29.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 452-1	gx	22h20m08s	+18°51.3'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 452-3	gx	22h20m21s	+18°56.5'		Peg	24"	ottima / buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 25"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 45" verso NE e un'altra più debole quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 452-6	gx	22h24m20s	+17°08.8'		Peg	24"	ottima / buono	è un debole ovale diffuso e di luminosità uniforme, orientato da E a W con dimensioni 30"×20" e con una stellina quasi a ridosso verso NE; appare tuttavia meglio definita scalando a 340x.
CGCG 452-16	gx	22h28m27s	+19°30.5'		Peg	16"	buona / ottimo	debolissima chiazza di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø > 30" ; appare in visione distolta a 380x; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso E, mentre ce n'è una brillante a 1' NW.
CGCG 452-18	gx	22h28m38s	+16°56.0'		Peg	24"	buona / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 452-21	gx	22h31m40s	+20°42.8'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare poco allungata da NE a SW (ossia orientata come il piccolo arco di stelline subito a SE) con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 452-24	gx	22h33m50s	+20°48.4'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
CGCG 452-25	gx	22h34m00s	+20°16.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme; orientata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 452-28	gx	22h34m59s	+20°47.5'		Peg	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 452-29	gx	22h35m29s	+19°40.8'		Peg	24"	ottima / buono	debole, diffusa e con bulge appena percettibile, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 452-35	gx	22h36m51s	+19°28.3'		Peg	16"	buona / m. buono	debolissima, appare a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
CGCG 452-37	gx	22h37m39s	+20°00.9'		Peg	24"	ottima / buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 452-38	gx	22h38m18s	+18°35.3'		Peg	16"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×45"; c'è un piccolo triangolo di stelle subito a NE — 380x.
CGCG 452-39	gx	22h39m09s	+18°37.6'		Peg	16"	buona / ottimo	debolissima, rotonda e di luminosità uniforme, con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 40" verso W — 380x.
CGCG 452-40	gx	22h39m12s	+19°02.8'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina visibile solo a momenti a 1' scarso verso N — 450x.
CGCG 452-43	gx	22h41m56s	+20°15.7'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale quasi stellare ben visibile a 380x.
CGCG 452-44	gx	22h42m07s	+19°38.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" (o poco meno); c'è una stellina a 1' W e una abbastanza brillante brillante alla stessa distanza verso N — 450x.
CGCG 453-2	gx	22h44m17s	+19°55.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 453-10	gx	22h48m28s	+15°54.9'		Peg	24"	buona / ottimo	piccola e debole chiazza circolare con Ø < 30" che aggetta a SE dalla più meridionale di una coppia di stelline abbastanza brillanti orientate da NW a SE — 450x.
CGCG 453-11	gx	22h48m49s	+18°33.8'		Peg	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e leggermente più brillante all'interno, poco allungata da N a S con Ø 30"×20"; c'è una stellina subito a E; disturbata dalla SAO 108197 situata ad appena 2.5' SSE.
CGCG 453-13	gx	22h49m31s	+17°26.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 453-16	gx	22h53m06s	+16°45.1'		Peg	24"	buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; la SAO 108231 di magnitudo 5.7 situata 5' a NNW si riesce a tenere fuori campo a 450x.
CGCG 453-19	gx	22h54m08s	+20°13.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima e diffusa, meglio evidente a 340x, approssim. rotonda con Ø < 30".
CGCG 453-21	gx	22h54m39s	+15°45.2'		Peg	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 453-22	gx	22h54m49s	+19°23.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso S e una poco più evidente a 1' verso NE — 450x.
CGCG 453-25	gx	22h55m32s	+19°17.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente facile e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare visibile a tratti; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 453-26	gx	22h55m37s	+19°10.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, rotonda con Ø < 20" e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
CGCG 453-27	gx	22h55m42s	+19°20.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 453-28	gx	22h56m14s	+19°07.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di < 30" e una condensazione stellare visibile a momenti — 450x.
CGCG 453-37	gx	22h58m57s	+20°23.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 453-38	gx	22h59m36s	+17°58.3'		Peg	24"	ottima / buono	compatta e condensata, rotonda con Ø < 30" (già debolmente visibile nel 16" a 270x). A 3.5' WNW c'è una debole coppia stellare molto serrata che a prima vista e/o in visione distolta potrebbe essere scambiata per un piccolo oggetto diffuso — 450x.
CGCG 453-39	gx	22h59m46s	+18°01.7'		Peg	24"	ottima / buono	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (anche questa era visibile nel 16") — 450x.
CGCG 453-41	gx	23h00m00s	+17°53.6'		Peg	24"	ottima / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 453-43	gx	23h00m26s	+16°41.3'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 453-46	gx	23h01m07s	+19°36.5'		Peg	24"	m. buona / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso N (la quale fa parte di un arco di 4 stelline di luminosità e distanze crescenti e che piega verso NE — 450x.
CGCG 453-53	gx	23h03m09s	+20°01.0'		Peg	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 453-55	gx	23h03m27s	+19°56.0'		Peg	24"	m. buona / buono	diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e con piccolo bulge abbastanza marcato — 450x.
CGCG 453-56	gx	23h03m25s	+20°15.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi WNW — 450x.
CGCG 453-57	gx	23h04m03s	+20°11.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola chiazza circolare, me, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; molto disturbata da una stellina brillante a ridosso E — 450x.
CGCG 453-60	gx	23h04m25s	+17°57.2'		Peg	24"	m. buona / buono	piccola e relativamente compatta, senza condensazione apprezzabile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 453-62	gx	23h04m56s	+19°33.1'		Peg	24"	m. buona / buono	diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N — 450x.
CGCG 453-65	gx	23h05m27s	+21°09.7'		Peg	24"	m. buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30" e nucleo stellare appena percettibile; stella abbastanza brillante a 1.5' SSW — 450x.
CGCG 453-66	gx	23h05m37s	+16°27.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con di 30"-35"; forma un piccolo triangolo rettangolo allungato con 2 stelline situate a NE e a N — 380x.
CGCG 453-69	gx	23h05m53s	+16°53.6'		Peg	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale osservabile solo a momenti — 450x.
CGCG 454-15	gx	23h15m33s	+19°02.9'		Peg	16"	ottima / ottimo	compatta, debole, di dimensioni ~30"; presenta un nucleo stellare visibile a tratti. Altresì nota come **Hickson 93D** (situata 4' scarsi a E di NGC 7549) — 380x.
CGCG 454-17	gx	23h16m24s	+15°51.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 454-19	gx	23h16m38s	+15°53.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a NE sul prolungamento dell'asse della gx — 450x.
CGCG 454-20	gx	23h16m45s	+18°24.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x, ma a 450x appare più facilmente una stellina assai debole subito a S; un'altra debole stellina, più evidente, si trova più o meno alla stessa distanza verso E.
CGCG 454-23	gx	23h17m21s	+18°25.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un piccolo trapezio di deboli stelline un paio di primi a NW.
CGCG 454-25	gx	23h17m21s	+18°03.3'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile però solo a momenti; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
CGCG 454-27	gx	23h17m43s	+16°42.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	forma una coppia con CGCG 454-29 situata 1.5' a E — è una galassietta molto difficile, perché, ancora più del caso successivo, si trova molto vicino alla SAO 108513 di 8ª grandezza situata un paio di primi scarsi a WSW; appare solo a momenti spingendo a 580x e non dovrebbe essere più estesa di 20" o 25".

CGCG 454-28	gx	23h17m40s	+18°24.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con tenue nucleo quasi stellare — 450x.
CGCG 454-29	gx	23h17m49s	+16°42.7'		Peg	24"	ottima / m. buono	forma una coppia con CGCG 454-27 situata 1.5' a W — diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; purtroppo la visione è disturbata dalla SAO 108513 di 8ª grandezza situata 3' a W e che non si riesce a tenere fuori nemmeno a 580x.
CGCG 454-31	gx	23h18m25s	+20°09.8'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
CGCG 454-36	gx	23h19m21s	+19°01.3'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 454-37	gx	23h19m18s	+19°32.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 454-41	gx	23h20m05s	+16°15.1'		Peg	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, situata in una piccola zona di cielo depleta; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 454-42	gx	23h20m07s	+16°17.4'		Peg	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso ESE — 450x.
CGCG 454-44	gx	23h20m37s	+16°12.5'		Peg	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta, molto allungata da ENE a WSW, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 454-45	gx	23h20m48s	+18°54.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N; un'altra stellina poco più brillante si trova a 1' verso W — 450x.
CGCG 454-50	gx	23h22m19s	+18°44.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 454-54	gx	23h23m04s	+18°01.0'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 454-55	gx	23h23m08s	+17°30.5'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso di SW — 450x.
CGCG 454-56	gx	23h20m21s	+20°34.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	assieme a CGCG 454-57, CGCG 454-61 e a MCG+3-59-50 fa parte di un quartetto di gx poste a "L" — allungata da E a W, di dimensioni 30"×20", diffusa e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina a una 40-ina di secondi NE — 450x.
CGCG 454-57	gx	23h23m20s	+20°35.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	la più evidente di un quartetto cui appartengono le precedente, CGCG 454-61 e MCG+3-59-50 — diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina (la stessa della gx precedente) a 1' SE — 450x.
CGCG 454-59	gx	23h23m33s	+19°36.0'		Peg	24"	m. buona / buono	rotonda con Ø < 30", poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
CGCG 454-61	gx	23h23m37s	+20°36.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è la più debole di un quartetto cui appartengono CGCG 454-56, CGCG 454-57 e MCG+3-59-50 — rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 454-62	gx	23h23m51s	+16°38.7'		Peg	24"	m. buona / discreto	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 60"×40"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 454-67	gx	23h07m24s	+17°48.9'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, con condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso ESE — 270x.
CGCG 454-68	gx	23h27m45s	+18°34.4'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto molto piccolo, di 15" o 20" di Ø; salta fuori in visione distolta a 380x.
CGCG 454-69	gx	23h28m05s	+18°31.9'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' SE; disturbata dalla SAO 108625 di magnitudo 7.7 situata un paio di primi a E — 380x.
CGCG 454-71	gx	23h28m29s	+19°51.8'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debole oggetto rotondo relativamente compatto e di luminosità uniforme, con Ø di una 20-ina di secondi; è situata a neppure 2' SE della brillante SAO 108627 di 7ª grandezza — 380x.
CGCG 454-72	gx	23h28m30s	+17°16.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20", relativamente compatta e con basso gradiente di luce; c'è una stellina a ridosso verso NW — 380x.
CGCG 454-73	gx	23h28m37s	+17°16.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto più debole e poco più piccola di CGCG 454-72, dalla quale dista 1.5' a E, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 380x.
CGCG 454-75	gx	23h29m37s	+19°22.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore assai stemperato sul fondo cielo, forse rotondo con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W e un'altra abbastanza brillante subito a NE — 450x.
CGCG 454-83	gx	23h31m49s	+19°40.8'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 450x.
CGCG 455-10	gx	23h33m08s	+16°12.4'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 455-15	gx	23h34m31s	+16°48.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, debole e poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 455-21	gx	23h35m06s	+21°38.1'		Peg	16"	buona / m. buono	rotonda, diffusa, con condensazione centrale di aspetto stellare e Ø di 30" — 270x.
CGCG 455-24	gx	23h35m49s	+16°22.1'		Peg	24"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con nucleo quasi stellare.
CGCG 455-28	gx	23h36m19s	+21°10.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, molto piccola, a tratti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina brillante a 1' W; una doppia stretta e sbilanciata si trova a più di 2' verso NE (fa parte dell'ammasso AGC 2626) — 450x.
CGCG 455-32	gx	23h37m41s	+18°53.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 455-34	gx	23h38m16s	+17°20.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza circolare di almeno 40" di Ø e di luminosità uniforme; non sembra meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a 1' W e un'altra poco più brillante a 1.5' verso WNW.
CGCG 455-38	gx	23h39m59s	+21°43.3'		Peg	16"	buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda, relativamente compatta e con Ø di una 30-ina di secondi; è situata all'interno di un triangolo equilatero di stelline deboli coi lati di ~ 3' — 270x.
CGCG 455-45	gx	23h45m09s	+19°54.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 455-46	gx	23h46m46s	+16°02.6'		Peg	24"	discreta / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 455-53	gx	23h50m33s	+19°05.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 455-55	gx	23h51m14s	+20°13.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia sbilanciata di stelline a 1' SSW — 450x.
CGCG 455-59	gx	23h51m27s	+20°35.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, con gradiente medio di luce, rotonda con Ø di 35"-40" — 380x.
CGCG 455-60	gx	23h51m39s	+18°48.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ci sono due stelline abbastanza brillanti: una a 1.5' SW e l'altra a un paio di primi scarsi verso W — 450x.
CGCG 455-62	gx	23h51m56s	+16°33.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione stellare poco contrastata — 450x.
CGCG 456-5	gx	23h57m28s	+18°18.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è la SAO 108929 di magnitudo 7.8 a 4' scarsi SSE — 380x.
CGCG 456-6	gx	23h57m38s	+18°11.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo relativamente compatto e appena condensato, di 15" o 20" di Ø; è situata diametralmente opposta, rispetto a CGCG 456-5, alla SAO 108929 magnitudo 7.8 che disturba l'osservazione — 380x.
CGCG 456-11	gx	23h59m29s	+21°24.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 456-13	gx	00h00m02s	+15°52.9'		Peg	24"	discreta / buono	piccola, poco diffusa e condensata, a 450x appare poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15".
CGCG 456-16	gx	00h01m58s	+21°37.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 456-22	gx	00h03m03s	+18°52.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina al bordo SE e una brillante a1' scarso verso N — 450x.
CGCG 456-25	gx	00h03m28s	+16°44.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	galassietta elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 380x, ma non riesco a capire com'è orientata.
CGCG 456-27	gx	00h03m44s	+16°11.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" e condensata; forma un minuscolo triangolo equilatero con 2 stelline a S (debole) e SW (più evidente) — 450x.
CGCG 456-33	gx	00h08m32s	+18°09.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' NE e un'altra alla stessa distanza verso NW — 450x.
CGCG 456-36	gx	00h10m39s	+16°35.4'		Peg	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1.5' NNE; 3 stelline allineate si trovano a 3' verso NW — 450x.
CGCG 456-37	gx	00h11m43s	+20°58.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola e relativamente brillante, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale quasi stellare — 450x.
CGCG 456-38	gx	00h13m06s	+18°30.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; si trova sull'ipotenusa di un piccolo triangolo rettangolo; la visione è un poco disturbata da una stellina brillante situata a poco più di 3' SSE — 450x.
CGCG 456-43	gx	00h15m03s	+16°50.2'		Psc	24"	buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina appena percettibile a N — 450x.
CGCG 456-47	gx	00h15m43s	+19°56.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 456-49	gx	00h15m53s	+19°46.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, compatta, con nucleo stellare evidente a 380x; è poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20".
CGCG 456-50	gx	00h15m48s	+19°59.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale abbastanza brillante evidente; è disturbata da una stella situata a 1' NNW — 450x.
CGCG 456-55	gx	00h18m25s	+18°30.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi con una stellina brillante a 1' NNE — 450x.
CGCG 457-4	gx	00h19m57s	+19°58.8'		Peg	24"	buona / buono	piccolo e debole lucore che aggetta a E di una stellina; a 450x appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15".
CGCG 457-8	gx	00h20m52s	+21°32.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso NW — 450x.
CGCG 457-13	gx	00h24m44s	+21°06.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni poco inferiori a 30"×20"; situata a ridosso E di un evidente asterismo di 6 stelline foggiato a "V" — 450x.
CGCG 457-19	gx	00h33m33s	+19°57.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 457-24	gx	00h39m49s	+21°12.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE e una percettibile solo a momenti al bordo NW (fa parte dell'ammasso AGC 75) — 450x.
CGCG 458-1	gx	00h44m26s	+16°48.8'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente brillante e compatta, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale di aspetto stellare — 450x.
CGCG 458-2	gx	00h44m31s	+16°50.3'		Psc	24"	m. buona / buono	più debole della precedente e di luminosità uniforme, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 458-3	gx	00h44m50s	+20°06.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco più brillante all'interno e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una doppia molto sbilanciata a 1' SW — 450x.
CGCG 458-10	gx	00h56m15s	+19°58.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è disturbata dalla SAO 92165 di 9ª grandezza situata 4.5' a E — 450x.
CGCG 458-14	gx	01h00m22s	+19°50.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una debole stellina quasi a ridosso W — 450x.
CGCG 458-15	gx	01h01m02s	+16°40.4'		Psc	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; disturbata dalla SAO 92201 di 9ª grandezza situata un paio di primi a ENE — 450x.
CGCG 458-16	gx	01h03m05s	+17°45.0'		Psc	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme; a 450x sembra grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E che però si vede solo a momenti; una debole stellina si trova a 1' SW.
CGCG 458-21	gx	01h07m49s	+16°28.1'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø < 30"; è disturbata da una stellina situata proprio al bordo orientale; nonostante questo sembra meglio definita scalando a 340x.
CGCG 459-9	gx	01h09m26s	+16°56.6'		Psc	16"	ottima / buono	è più evidente di UGC 708 diffusa, rotonda, con piccola condensazione centrale evidente a 380x e Ø di 45"; ci sono 3 stelline allineate a W, utili come riferimento.
CGCG 459-10	gx	01h09m30s	+19°51.9'		Psc	24"	buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 459-15	gx	01h12m23s	+16°31.8'		Psc	16"	ottima / buono	piccolo e debole oggetto diffuso di 35"-40" di dimensioni, appena più luminoso all'interno; c'è una stellina a ~ 1' SW — 380x.
CGCG 459-16	gx	01h12m33s	+16°32.7'		Psc	16"	ottima / buono	poco più evidente e più grande di CGCG 459-15, ma di aspetto più confuso; è grosso modo rotonda con Ø di 45"; il nucleo, a 380x, appare leggermente decentrato verso N.
CGCG 459-17	gx	01h13m24s	+15°47.0'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 400x.
CGCG 459-19	gx	01h15m30s	+20°01.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; una coppia irrisolta di debolissime stelline appare in visione distolta a circa 1.5' verso N: da un controllo effettuato successivamente nella posizione ci sono due elusive galassiette che non sono riuscito a separare, ossia 2MASS 01152772 +2003227 e 01152855+2003200 — 450x.
CGCG 459-20	gx	01h16m08s	+20°01.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 459-21	gx	01h16m44s	+16°24.0'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a poco più di 1' verso E — 380x.
CGCG 459-29	gx	01h19m37s	+18°26.3'		Psc	16"	ottima / buono	molto debole e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 380x.
CGCG 459-31	gx	01h19m57s	+21°22.8'		Psc	24"	buona / ottimo	debole, compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; è allineata con 2 stelline a SE della gx; una coppia di stelline brillanti si trova a 1' verso NNE — 450x.
CGCG 459-32	gx	01h20m15s	+17°49.8'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; piuttosto disturbata da due stelline brillanti situate 1.5' a W e a SE — 450x.
CGCG 459-34	gx	01h20m18s	+21°29.3'		Psc	24"	buona / buono	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 459-39	gx	01h21m36s	+18°23.7'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, ma visibile senza difficoltà a 380x, piccola, diffusa, appena condensata, con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale quasi stellare.
CGCG 459-40	gx	01h21m42s	+18°34.1'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda e appena più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso NNE — 450x.
CGCG 459-49	gx	01h25m03s	+15°51.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia stretta e sbilanciata a 1' SE — 450x.
CGCG 459-55	gx	01h27m00s	+15°58.9'		Psc	16"	ottima / scarso	è un debole oggetto rotondo di luminosità uniforme, con Ø max di 30"; è situato 1' NW di una stellina; un'altra stellina si trova a poco più di 1' SW — 270x.
CGCG 459-58	gx	01h28m24s	+16°27.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	assieme a CGCG 459-59 forma una coppia di galassiette abbastanza facili, distanti 1' in direzione N-S; la 1ª è orientata da NE a SW, di dimensioni poco inferiori a 30"×15" e con condensazione stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso W; la 2ª è circolare con Ø < 30" e di aspetto più uniforme; anche questa ha la sua brava stellina abbastanza brillante subito a E — 450x.
CGCG 459-59	gx	01h28m24s	+16°28.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 459-58**
CGCG 459-61	gx	01h28m51s	+18°59.2'		Psc	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda, con Ø di una 30-ina di secondi, con tenue ed evidente condensazione centrale; a 380x tuttavia il campo è depleto.
CGCG 459-62	gx	01h28m58s	+19°33.9'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, con Ø di ~ 30" e di luminosità pressoché uniforme; meglio scalare a 270x.
CGCG 459-63	gx	01h29m11s	+19°42.7'		Psc	16"	m. buona / m. buono	altra gx debolissima, ma forse meglio visibile di CGCG 459-62; è diffusa e con piccola condensazione centrale; meglio anche in questo caso scendere a 270x; c'è un mini gruppetto di 4 stelline un paio di primi verso E.
CGCG 459-64	gx	01h29m46s	+16°55.6'		Psc	16"	ottima / scarso	debole oggetto rotondo di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 30-ina di secondi35", diffuso; situata poco più di 1' E di una stellina brillante — 270x.
CGCG 460-3	gx	01h31m49s	+18°35.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 30"; presenta una condensazione centrale evidente e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso NE — 450x.
CGCG 460-13	gx	01h36m20s	+17°49.0'		Psc	24"	buona / m. buono	piccola, poco diffusa, a 450x appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15"; disturbata da una stellina brillante situata quasi a ridosso verso NW.
CGCG 460-18	gx	01h40m42s	+20°50.4'		Psc	16"	ottima / mediocre	piccolo oggetto rotondo, diffuso, poco più brillante all'interno e con Ø di ~ 30"; c'è una stellina a ~ 1' verso NE — 270x.
CGCG 460-20	gx	01h43m56s	+17°03.7'		Psc	16"	ottima / mediocre	piccolo oggetto rotondo relativamente compatto con nucleo stellare visibile a tratti a 380x malgrado il seeing scarso.
CGCG 460-26	gx	01h48m14s	+18°44.9'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole chiazza circolare di luminosità uniforme, diffusa e con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 460-29	gx	01h50m02s	+16°53.1'		Psc	24"	buona / m. buono	piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile — 450x.
CGCG 460-45	gx	01h54m44s	+18°02.8'		Ari	16"	ottima / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta e condensata, si vede facilmente a 380x; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 461-3	gx	01h55m44s	+17°59.9'		Ari	16"	ottima / buono	debolissimo oggetto rotondo, condensato, con Ø di una 20-ina di secondi, osservabile in visione distolta a 380x.
CGCG 461-9	gx	01h57m09s	+17°46.2'		Ari	24"	m. buona / m. buono	sarebbe una galassia abbastanza facile, se non fosse quasi totalmente immersa nei bagliori della i Ari di 5ª grandezza situata 4' a NE; altre 2 stelle brillanti si trovano rispettivamente a 1.5' N e 3' NNW; è compatta, di luminosità uniforme e allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 461-12	gx	01h57m36s	+16°46.4'		Ari	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 461-14	gx	01h58m14s	+21°21.0'		Ari	16"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 461-15	gx	01h58m19s	+20°57.7'		Peg	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a meno di 1' verso SE — 450x.
CGCG 461-22	gx	02h00m28s	+16°33.6'		Ari	16"	ottima / ottimo	è un bolla di luce leggermente ovale, di dimensioni 40"×35", orientata ~ da E a W e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' NW — 380x.
CGCG 461-27	gx	02h01m44s	+17°55.7'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; il campo è disturbato da un triangolo di stelle brillanti fra cui la SAO 92755 di 7ª grandezza situata poco più di 3' a NW — 450x.
CGCG 461-39	gx	02h03m46s	+18°17.7'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, ma più che altro offuscata da 2 stelline molto brillanti (la più luminosa ad appena 2.5' S della gx è la SAO 92774 di 6a grandezza); è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, relativamente compatta e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 461-43	gx	02h05m04s	+15°51.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 450x.
CGCG 461-44	gx	02h05m56s	+18°26.9'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo S; una stellina più evidente si trova invece a 1.5' verso S — 450x.
CGCG 461-45	gx	02h06m32s	+16°59.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	è di aspetto curioso, nel senso che appare allungata da N a S con dimensioni di 40"×20", ma presenta due noduli alle estremità (quello a N è più brillante), come se fosse di fatto formata da due oggetti ravvicinati e non risolti — 450x.
CGCG 461-46	gx	02h07m28s	+19°11.7'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
CGCG 461-55	gx	02h10m21s	+21°23.1'		Ari	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda, di luminosità uniforme e con Ø < 30" — 380x.
CGCG 461-56	gx	02h10m57s	+19°08.5'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata in mezzo a due stelline orientate da NE a SW e distanti 5' — 450x.
CGCG 461-63	gx	02h13m37s	+17°05.2'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 461-64	gx	02h13m43s	+17°05.9'		Ari	24"	ottima / ottimo	situata 1.5' a NE della precedente, è molto debole, piccola e diffusa; in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 461-68	gx	02h15m18s	+18°00.4'		Ari	16"	ottima / ottimo	molto debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 45" — 270x.
CGCG 461-70	gx	02h16m12s	+17°58.3'		Ari	16"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme; in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio visibile a 270x.
CGCG 462-6	gx	02h22m25s	+17°40.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 462-8	gx	02h24m29s	+20°59.4'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso NW; poco meglio evidente restando a 450x.
CGCG 462-9	gx	02h25m14s	+20°57.3'		Ari	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una coppia sbilanciata di stelline a 1' W orientata nello stesso modo — 450x.
CGCG 462-13	gx	02h26m56s	+20°32.0'		Ari	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' E — 450x.
CGCG 462-23	gx	02h32m54s	+19°15.5'		Ari	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø > 30" e situata tra 2 stelline abbastanza brillanti, orientate da N a S e distanti un paio di primi; c'è una stellina appena percettibile al bordo S — 380x.
CGCG 462-29	gx	02h35m27s	+19°39.4'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale; allineata ed equidistante con una stellina brillante a S e un'altra molto più debole — 450x.
CGCG 462-32	gx	02h37m02s	+20°25.6'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 2 deboli stelline a SE e SW — 450x.
CGCG 462-34	gx	02h37m21s	+20°24.9'		Ari	24"	m. buona / ottimo	poco più debole e più piccola di CGCG 462-32, di luminosità uniforme e Ø < 30" — 450x.
CGCG 462-38	gx	02h39m33s	+17°37.8'		Ari	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con piccolo bulge quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 462-40	gx	02h40m14s	+17°53.0'		Ari	16"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; in visione distolta appare a ridosso SW di una stellina abbastanza brillante — 380x.
CGCG 462-42	gx	02h40m50s	+21°36.5'		Ari	24"	m. buona / buono	diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con piccola ed evidente condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 462-48	gx	02h43m15s	+16°36.5'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' SW e una coppia di stelline brillanti a 2' SSW — 450x.
CGCG 462-49	gx	02h43m26s	+16°40.2'		Ari	24"	m. buona / m. buono	di aspetto simile alla precedente, ma di aspetto più uniforme; forma una coppia ravvicinata con PGC 87158 situata a ridosso S: quest'ultima è di dimensioni all'incirca analoghe, ma appare condensata — 450x.
CGCG 463-2	gx	02h44m10s	+16°32.7'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a 1.5' N e una appena percettibile alla stessa distanza verso SW — 450x.
CGCG 463-13	gx	02h47m07s	+15°55.7'		Ari	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 463-14	gx	02h47m31s	+16°06.7'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da ENE a WSW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti quasi a ridosso ENE — 450x.
CGCG 463-15	gx	02h47m59s	+15°56.8'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 463-22	gx	02h49m26s	+15°48.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole e relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10", con piccola e tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 463-32	gx	02h55m17s	+16°09.7'		Ari	24"	buona / buono	facile e relativamente compatta, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 463-33	gx	02h56m56s	+15°58.4'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, orientata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 463-41	gx	02h57m37s	+16°04.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e leggermente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 463-43	gx	03h00m10s	+18°54.2'		Ari	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella brillante a 1' verso E — 495x.
CGCG 463-44	gx	03h00m20s	+18°44.5'		Ari	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina al bordo E (la più occidentale di un piccolo triangolo isoscele molto lungo e orientato da E a W); un'altra stellina si trova a 1' verso W — 495x.
CGCG 463-49	gx	03h04m33s	+17°40.9'		Ari	28"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente facile, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo E — 495x.
CGCG 463-50	gx	03h25m23s	+19°22.9'		Ari	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
CGCG 464-7	gx	03h12m26s	+19°14.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 465-12	gx	03h54m16s	+15°55.7'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante subito a E (che fa parte di un piccolo asterismo triangolare di 4 componenti di luminosità simile) — 450x.
CGCG 464-14	gx	03h24m00s	+16°11.0'		Ari	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa con condensazione centrale molto tenue visibile a tratti; è allungata da E a W con dimensioni 50"×30" — 380x.
CGCG 466-4	gx	04h00m33s	+20°19.7'		Tau	28"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina a 1' scarso SE — 495x.
CGCG 466-5	gx	04h00m43s	+21°03.2'		Tau	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 495x.
CGCG 466-7	gx	04h02m39s	+21°33.6'		Tau	16"	ottima / ottimo	debole, diffusa, gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo di aspetto quasi stellare; è rotonda con Ø di 45" — 380x.
CGCG 466-8	gx	04h02m55s	+21°29.0'		Tau	16"	ottima / ottimo	è debolissima, ma appare senza tanti problemi in visione distolta a 380x; a tratti appare poco allungata da NW a SE (ossia a perpendicolo con le 2 stelline a NE con le quali è allineata.
CGCG 469-3	gx	05h10m50s	+16°28.6'		Tau	24"	ottima / ottimo	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø < 30"; forma un piccolo triangolo isoscele ottusangolo con 2 stelline brillanti a W; alcune stelle molto luminose sono presenti nel campo (siamo all'interno dell'ammasso aperto NGC 1807) — 570x.
CGCG 471-2	gx	21h16m53s	+24°12.2'		Vul	16"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, piccola, di dimensioni non superiori ai 20"-25"; c'è una coppia di deboli stelline quasi a ridosso verso S e un'altra singola diametralmente opposta; la gx è situata all'interno della planetaria PK 72-17.1 che però non ho visto — 380x.
CGCG 471-4	gx	21h18m33s	+22°44.8'		Vul	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 25"-30"; c'è una stellina brillante a soli 1.5' SE — 380x.
CGCG 471-6	gx	21h18m59s	+25°25.9'		Vul	16"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio spingere a 380x; poco disturbata dalla SAO 89612 di 9ª situata a soli 3' verso N.
CGCG 473-1	gx	21h59m30s	+23°43.1'		Peg	24"	ottima / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 473-3	gx	22h05m09s	+26°36.4'		Vul	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è molto disturbata dalla SAO 90214 di 6ª situata a soli 4' N e che si fatica a tenere fuori campo anche a 380x.
CGCG 473-8	gx	22h12m26s	+27°12.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, con nucleo stellare, molto allungata all'incirca da E a W con dimensioni 45"×15", purtroppo disturbata dalla SAO 90319 di magnitudo 8.6 situata ad appena 1' SW — 450x.
CGCG 473-9	gx	22h17m13s	+25°12.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W e un'altra ancora più debole poco più distante dalla parte opposta — 450x.
CGCG 473-10	gx	22h17m45s	+27°37.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 20"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline: 1' a W e 30" a NW — 450x.
CGCG 473-11	gx	22h19m06s	+24°35.9'		Peg	24"	ottima / mediocre	debole e molto diffusa, in visione distolta appare orientata grosso modo da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 473-12	gx	22h21m48s	+25°19.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 474-29	gx	22h48m19s	+24°49.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 475-1	gx	22h52m35s	+24°43.8'		Peg	24"	ottima / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 475-5	gx	22h57m28s	+26°06.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; disturbata da una stellina brillante situata 1' a NE — 450x.
CGCG 475-9	gx	22h58m13s	+25°13.3'		Peg	16"	buona / ottimo	rotonda, diffusa, di una 40-ina di secondi di Ø e con condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina a 1' NW; è meglio definita a 270x.
CGCG 475-12	gx	22h58m26s	+26°38.3'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso W — 450x.
CGCG 475-16	gx	22h59m42s	+26°12.3'		Peg	16"	buona / ottimo	debolissima, ma più evidente di UGC 12291, dalla quale dista 6' a S, a tratti poco allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con tenue nucleo stellare — 380x.
CGCG 475-22	gx	23h02m06s	+25°45.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 475-27	gx	23h03m10s	+23°17.7'		Peg	24"	ottima / buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N; disturbata dalla SAO 90975 di magnitudo 8.6 situata un paio di primi a SE — 450x.
CGCG 475-39	gx	23h07m30s	+27°41.0'		Peg	24"	ottima / buono	debolissima, in visione distolta appare solo a momenti orientata da NE a SW con dimensioni di circa 30"×15" — 450x.
CGCG 475-41	gx	23h10m17s	+26°37.2'		Peg	16"	buona / ottimo	debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e piccolo nucleo appena più contrastato visibile a 380x; c'è una stellina percettibile a tratti a poco più di 1' verso SW.
CGCG 475-57	gx	23h16m00s	+27°27.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia brillante stretta e sbilanciata a 2.5' verso W — 450x.
CGCG 475-61	gx	23h18m41s	+25°16.0'		Peg	16"	m. buona / buono	piccolo oggetto rotondo di Ø max 20" visibile a tratti in visione distolta quasi a ridosso di una stellina subito a NE — 270x.
CGCG 476-4	gx	23h19m14s	+26°03.3'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 380x.
CGCG 476-9	gx	23h20m03s	+26°13.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	è un piccolo oggetto rotondo molto debole, ma relativamente compatto e facile da vedere, con Ø di una 20-ina di secondi 20" — 270x.
CGCG 476-28	gx	23h23m37s	+25°11.7'		Peg	16"	buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 380x.
CGCG 476-30	gx	23h24m26s	+25°23.1'		Peg	16"	buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo di una 20-ina di secondi di Ø e con una stellina a ridosso verso SW — 270x.
CGCG 476-34	gx	23h25m43s	+22°54.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso W — 450x.
CGCG 476-36	gx	23h26m09s	+22°47.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a momenti appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; poco disturbata da 2 stelline abbastanza brillanti con le quali forma un piccolo triangolo isoscele molto schiacciato — 450x.
CGCG 476-37	gx	23h26m34s	+25°38.5'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 476-49	gx	23h29m37s	+23°56.8'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra una stellina abbastanza brillante a SE e una appena percettibile a NW — 450x.
CGCG 476-52	gx	23h30m03s	+26°00.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	diffusa e con condensazione centrale abbastanza marcata, grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi; è situata sul lato orientale di un triangolo equilatero formato da stelle di luminosità simile — 450x.
CGCG 476-55	gx	23h30m09s	+25°31.8'		Peg	24"	buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; sembra aggettare verso S da una stellina brillante — 450x.
CGCG 476-56	gx	23h30m15s	+22°49.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina subito a ESE (sul prolungamento dell'asse della gx) — 450x.
CGCG 476-59	gx	23h31m43s	+27°19.2'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; si trova in mezzo a 2 stelline: quella a SW è abbastanza brillante e disturba un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 476-61	gx	23h32m02s	+23°33.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' scarso NW — 450x.
CGCG 476-62	gx	23h32m03s	+23°54.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione quasi stellare poco contrastata (purtroppo anche a 450x si fatica a tenere fuori campo la SAO 91333 di magnitudo 6.6 situata 7' a SW).
CGCG 476-63	gx	23h32m23s	+23°30.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 476-66	gx	23h33m13s	+26°52.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima, probabilmente rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina appena percettibile subito a N e un'altra più evidente e poco più distante a < 1' verso SW — 450x.
CGCG 476-67	gx	23h33m26s	+25°39.0'		Peg	16"	m. buona / ottimo	più debole di CGCG 476-68 (osservata per prima), in visione distolta appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 476-68	gx	23h33m45s	+25°47.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 476-71	gx	23h34m39s	+26°43.4'		Peg	24"	ottima / ottimo	diffusa, allungata da N a S, dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge evidente abbastanza contrastato; c'è una stellina brillante quasi a ridosso verso N (la quale fa parte di un gruppo disperso di una decina di stelle anche brillanti che disturbano l'osservazione) — 450x.
CGCG 476-74	gx	23h35m47s	+24°35.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata 1' a SE di una stellina brillante; occorre osservarla a 570x per allontanare il più possibile la SAO 91367, una stella arancione di magnitudo 6.6 che si trova a soli 2.5 verso SE.
CGCG 476-79	gx	23h37m20s	+26°52.7'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso SE (fa parte di una coppia orientata come la gx) — 450x.
CGCG 476-80	gx	23h37m26s	+27°04.3'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso W — 450x.
CGCG 476-81	gx	23h37m45s	+26°30.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con bulge abbastanza contrastato — 450x.
CGCG 476-83	gx	23h38m00s	+26°27.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20", con tenue bulge diffuso e assai poco contrastato — 450x.
CGCG 476-84	gx	23h38m16s	+26°49.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
CGCG 476-85	gx	23h38m18s	+26°53.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso SW — 450x.
CGCG 476-86	gx	23h38m23s	+27°09.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale visibile solo a tratti (fa parte del gruppo di CGCG 476-96) — 380x.
CGCG 476-88	gx	23h38m30s	+26°35.9'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 476-89	gx	23h38m29s	+26°49.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a ridosso NE e una più brillante a ridosso E — 450x.
CGCG 476-90	gx	23h38m29s	+26°58.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia con IC 5341 situata 40" a SE; le due galassie sono di aspetto simile, rotonde con Ø di una 30-ina di secondi e una piccola condensazione centrale — 450x.
CGCG 476-95	gx	23h38m44s	+27°12.9'		Peg	16"	ottima / ottimo	poco più debole di CGCG 476-96 e di dimensioni simili; presenta anch'essa una condensazione centrale visibile a tratti a 380x.
CGCG 476-96	gx	23h38m51s	+27°16.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	è la più evidente di un piccolo gruppo di gx molto deboli (di cui alcune non sono visibili); rotonda, poco diffusa, con Ø di 25"-30" e nucleo stellare molto tenue — 380x.
CGCG 476-97	gx	23h39m18s	+25°01.2'		Peg	16"	buona / m. buono	debole, rotonda, diffusa, poco più brillante all'interno e con Ø di ~ 40" — 270x.
CGCG 476-105	gx	23h40m19s	+27°33.6'		Peg	24"	buona / ottimo	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 1' SE e un'altra più debole a poco più di 1' NW — 450x.

CGCG 476-108	gx	23h41m00s	+25°36.3'		Peg	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare; c'è una debole stellina a 1' verso WNW — 450x.
CGCG 476-109	gx	23h40m54s	+27°30.6'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 476-111	gx	23h41m06s	+25°10.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 476-112	gx	23h41m16s	+25°33.1'		Peg	24"	m. buona / buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 476-117	gx	23h42m38s	+27°05.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
CGCG 476-120	gx	23h42m57s	+27°28.2'		Peg	16"	m. buona / ottimoo	relativamente facile, rotonda, di 30" di Ø, poco diffusa e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile proprio a ridosso verso S — 380x.
CGCG 476-123	gx	23h43m32s	+27°18.7'		Peg	16"	m. buona / discreto	debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE, con dimensioni 40"×20" — 270x.
CGCG 477-5	gx	23h45m48s	+27°35.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 477-6	gx	23h47m33s	+27°25.6'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, a tratti in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 380x.
CGCG 477-9	gx	23h48m19s	+24°05.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole e assai stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia si stelline brillanti a 1.5' W e un'altra a 1' verso S; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 477-10	gx	23h48m32s	+24°36.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e con tenue condensazione stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 477-16	gx	23h50m47s	+27°17.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	è stranamente di aspetto stellare a prima vista, forse perché debolissima e con nucleo puntiforme; a tratti, tuttavia, appare effettivamente circonfusa da un piccolissimo alone di ~ 20" di Ø — 380x.
CGCG 477-20	gx	23h51m00s	+27°13.1'		Peg	16"	ottima / m. buono	debolissima, appare solo in visione distolta a 380x; a tratti sembra allungata da E a W per ~ 30", ma in altri momenti lo sembra da NE a SW.
CGCG 477-21	gx	23h51m18s	+27°17.6'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa, di 15" o 20" di Ø; a prima vista appare nulla più di una stellina sfocata — 380x.
CGCG 477-22	gx	23h51m21s	+24°39.5'		Peg	24"	buona / buono	piccola e debolissima, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 477-27	gx	23h53m18s	+27°42.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 477-28	gx	23h53m48s	+27°25.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e assai poco contrastata sul fondo cielo, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 477-36	gx	23h59m14s	+25°56.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SE — 450x.
CGCG 477-44	gx	00h03m13s	+25°10.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccolo e debolissimo lucore rotondo con Ø di 15"-20" situato a ridosso NW di una stellina brillante; una stellina molto debole si trova a ridosso SW; occorre tuttavia spingere a 580x per averne una visione più chiara (altresì designata CGCG 478-16) — 450x.
CGCG 477-49	gx	00h04m45s	+26°50.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; è allineata con 3 stelline, in mezzo alle quali si trova; quella più vicina verso NW è in realtà una tripletta molto serrata (anche se una componente appare solo a momenti) che danno a prima vista l'aspetto di un piccolo oggetto diffuso (altresì designata CGCG 478-21) — 450x.
CGCG 477-51	gx	00h05m06s	+22°11.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, situata a ridosso N di una debole stellina; forse rotonda con Ø < 20" (altresì nota come CGCG 478-23) — 450x.
CGCG 477-56	gx	00h07m40s	+25°35.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è un piccolo e debolissimo baffo a tratti condensato che in visione distolta sembra aggettare da una stellina abbastanza brillante; una stellina appena percettibile si trova a ridosso E — 450x.
CGCG 478-4	gx	23h56m35s	+27°12.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi in direzione E-W; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; allineata ed equidistante con due stelline a W (altresì designata CGCG 477-32).
CGCG 478-22	gx	00h05m00s	+22°08.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 40" e nucleo stellare evidente; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 450x.
CGCG 478-35	gx	00h09m51s	+26°47.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele di stelline appena percettibili (altresì designata CGCG 477-63) — 450x.
CGCG 478-44	gx	00h14m13s	+22°46.0'		And	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con di 30"; disturbata da una brillante stellina arancione situata 2' a S — 380x.
CGCG 478-45	gx	00h14m55s	+26°19.8'		And	16"	m. buona / buono	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
CGCG 478-48	gx	00h16m57s	+22°31.4'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 478-50	gx	00h17m30s	+26°15.5'		And	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 478-52	gx	00h18m00s	+24°33.7'		And	24"	buona / buono	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità pressoché uniforme; è situata all'interno di un piccolo triangolo quasi equilatero di stelline della stessa luminosità — 450x.
CGCG 479-18	gx	00h22m50s	+24°09.1'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 479-21	gx	00h23m17s	+24°57.2'		And	24"	m. buona / m. buono	anche questa è molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a SW — 450x.
CGCG 479-24	gx	00h24m02s	+25°39.7'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto piccola e relativamente compatta; solo a 450x e in visione distolta si riesce a momenti a capire che è orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×15".
CGCG 479-30	gx	00h26m10s	+25°39.6'		And	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e molto piccola, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 479-33	gx	00h28m13s	+23°27.3'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 479-35	gx	00h28m28s	+23°29.8'		And	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, di luminosità pressoché uniforme e con una stellina evidente al bordo meridionale — 450x.
CGCG 479-40	gx	00h33m36s	+23°23.9'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; situata in mezzo a due stelline orientate da N a S e distanti 1.5': quella a S è appena percettibile — 450x.
CGCG 479-46	gx	00h37m12s	+25°50.4'		And	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a 1' NE e una brillante a 2' verso W — 450x.
CGCG 479-49	gx	00h38m32s	+23°36.8'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; ci sono due stelline abbastanza brillanti a 1' N ed E — 450x.
CGCG 479-52	gx	00h38m57s	+26°52.7'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' WSW — 450x.
CGCG 479-54	gx	00h39m25s	+25°15.3'		And	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' verso NE — 450x.
CGCG 479-57	gx	00h40m30s	+24°26.6'		And	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 40" e tenue condensazione centrale quasi stellare; allineata ed equidistante con 2 deboli stelline — 450x.
CGCG 479-58	gx	00h40m30s	+25°01.6'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 479-60	gx	00h42m01s	+25°33.9'		And	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 479-61	gx	00h42m49s	+23°29.4'		And	24"	buona / buono	piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 479-65	gx	00h43m42s	+23°28.6'		And	24"	buona / buono	diffusa e con alto gradiente di luce e nucleo di aspetto stellare, rotonda con Ø di 45" — 450x.
CGCG 479-69	gx	00h45m54s	+25°15.9'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE — 450x.
CGCG 479-70	gx	00h45m57s	+25°13.1'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso WSW, mentre una stella brillante si trova a 1' verso W — 450x.
CGCG 480-3	gx	00h46m56s	+24°45.4'		And	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 480-13	gx	00h50m13s	+24°29.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata a 3' SW di CGCG 480-14 — 450x.
CGCG 480-14	gx	00h50m26s	+24°31.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 480-20	gx	00h54m42s	+24°52.2'		Psc	24"	buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; completa, al vertice più meridionale, un piccolo trapezio formato con 3 stelline di luminosità abbastanza simile — 450x.
CGCG 480-21	gx	00h55m49s	+24°08.9'		And	16"	ottima / scarso	debole, ma facilmente visibile a 270x, poco allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare abbastanza evidente.
CGCG 480-22	gx	00h56m04s	+26°18.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una stellina sfuocata appena percettibile appare in visione distolta subito a SE, allineata ed equidistante con altre 2 stelline più brillanti: questa è poi risultata essere la PGC 3319 — 450x.
CGCG 480-31	gx	01h00m28s	+27°01.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
CGCG 480-33	gx	01h01m58s	+26°29.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 480-38	gx	01h04m52s	+22°19.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso E; una coppia di stelline si trova a W e NW — 450x.
CGCG 480-39	gx	01h05m02s	+22°05.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 480-42	gx	01h06m29s	+24°52.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina molto debole a poco più di 1' SE; disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a NNW — 450x.
CGCG 480-44	gx	01h07m17s	+24°30.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' SSW — 450x.
CGCG 480-47	gx	01h10m53s	+24°27.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' W e una doppia serrata poco più distante verso ESE — 450x.
CGCG 480-48	gx	01h11m31s	+23°13.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una doppia stretta e debole a ridosso NE (la MAC 0111+2312 appare elusivamente quasi a ridosso verso S) — 450x.
CGCG 481-1	gx	01h16m13s	+25°11.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso NE — 450x.
CGCG 481-5	gx	01h23m07s	+22°10.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
CGCG 481-6	gx	01h23m13s	+22°15.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 481-11	gx	01h35m11s	+21°54.1'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NNW (la quale fa parte di un piccolo triangolo irregolare di stelline di luminosità decrescente a partire da quella più occidentale) — 450x.
CGCG 482-3	gx	01h42m14s	+27°40.5'		Psc	16"	ottima / mediocre	debolissima, osservabile abbastanza facilmente in visione distolta a 270x, rotonda con Ø di ~ 30"; a 380x appare a tratti una condensazione centrale molto tenue, ma solo negli istanti in cui le stelle si "sgonfiano"; c'è una doppia stretta e brillante a 3' NNW.
CGCG 482-7	gx	01h44m32s	+21°55.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 482-8	gx	01h44m50s	+21°52.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 482-15	gx	01h47m48s	+25°34.4'		Ari	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata con 2 stelline brillante a N — 450x.
CGCG 482-29	gx	01h55m05s	+24°02.5'		Ari	24"	ottima / molto buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 482-30	gx	01h55m25s	+24°08.4'		Ari	24"	ottima / molto buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina subito a NW — 450x.
CGCG 482-31	gx	01h55m41s	+23°04.4'		Ari	24"	ottima / molto buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 482-36	gx	01h59m38s	+27°26.0'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo NE; una stella brillante si trova a 1' verso W: questa è la più settentrionale di un piccolo asterismo foggiato a trapezio irregolare — 450x.
CGCG 482-41	gx	02h00m04s	+23°45.8'		Ari	16"	ottima / buono	debole, ma relativamente facile a 380x, rotonda, poco diffusa e con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ~ 1' verso S.
CGCG 482-46	gx	01h02m03s	+23°25.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme; situata in mezzo a 2 deboli stelline distanti un paio di primi in direzione NE-SW — 450x.
CGCG 482-47	gx	02h01m08s	+26°50.6'		Tri	16"	ottima / m. buono	piccola, diffusa con condensazione centrale di aspetto quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 482-50	gx	02h01m49s	+23°41.4'		Ari	24"	ottima / molto buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 482-55	gx	02h02m39s	+27°34.4'		Ari	16"	ottima / m. buono	molto allungata da N a S, dimensioni 45"×15" e con tenue bulge diffuso; c'è una stellina a ridosso verso W — 380x.
CGCG 482-56	gx	02h02m45s	+27°40.6'		Ari	16"	ottima / m. buono	assieme a CGCG 482-58 forma una coppia di galassiette debolissime, ma visibili senza difficoltà in visione distolta a 380x — la 1ª è poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; la 2ª è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e leggermente condensata — 380x.
CGCG 482-58	gx	02h02m48s	+27°40.8'		Ari	16"	ottima / m. buono	v. **CGCG 482-56**
CGCG 482-62	gx	02h03m40s	+26°16.7'		Ari	16"	ottima / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 380x, piccola, probabilmente rotonda con Ø di ~ 30"; a W c'è un trapezio regolare di stelline.
CGCG 482-63	gx	02h03m51s	+25°55.5'		Ari	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, anche se immersa nei bagliori della 10 Ari di 5.6m situata a meno di 3' verso E, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" e poco più luminosa al centro — 380x.
CGCG 483-1	gx	02h05m20s	+25°06.3'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 483-2	gx	02h05m44s	+24°14.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 450x.
CGCG 483-5	gx	02h09m02s	+27°32.2'		Ari	24"	ottima / molto buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 483-7	gx	02h10m15s	+25°40.9'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole e diffusa, disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso S; in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 483-13	gx	02h16m18s	+23°38.5'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 483-14	gx	02h16m37s	+26°20.8'		Ari	24"	ottima / molto buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 483-24	gx	02h23m31s	+27°19.4'		Ari	24"	m. buona / m. buono	piccola, rotonda con Ø < 20", relativamente compatta e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
CGCG 483-26	gx	02h23m52s	+25°32.5'		Ari	16"	ottima / buono	si vede con relativa facilità a 380x, poco diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 483-30	gx	02h24m44s	+25°31.9'		Ari	16"	ottima / buono	elusivo oggetto di max 20" di Ø, condensato che appare a tratti in visione distolta, meglio a 380x.
CGCG 483-32	gx	02h27m59s	+27°31.5'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 483-34	gx	02h25m10s	+23°51.1'		Ari	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 483-35	gx	02h25m16s	+24°15.9'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" e bulge appena percettibile; c'è una debole stellina a SE — 450x.
CGCG 483-36	gx	02h25m22s	+23°49.6'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 483-38	gx	02h25m40s	+27°17.7'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 483-39	gx	02h25m38s	+23°00.1'		Ari	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 483-40	gx	02h25m41s	+24°57.9'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 483-42	gx	02h25m45s	+24°46.7'		Ari	24"	m. buona / buono	relativamente facile, piccola e diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 483-45	gx	02h25m56s	+24°54.4'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso SSW — 450x.
CGCG 483-47	gx	02h26m15s	+26°06.4'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole e poco diffusa, sembra aggettare verso NE da una stellina brillante; è di dimensioni 45"×15" con piccolo bulge quasi stellare abbastanza evidente (situata 3' a N di UGC 1891) — 450x.
CGCG 483-53	gx	02h26m54s	+25°02.0'		Ari	24"	m. buona / buono	situata a NE del gruppo — debole relativamente compatta di luminosità uniforme allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 483-58	gx	02h27m42s	+26°13.6'		Ari	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, estesa una 30-ina di secondi, forse rotonda; meglio osservabile scalando a 270x.
CGCG 483-61	gx	02h28m01s	+21°47.8'		Ari	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 483-62	gx	02h28m14s	+23°55.2'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 483-70	gx	02h30m16s	+23°09.2'		Ari	16"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e condensata, piccola, rotonda con Ø < 30" — 380x.
CGCG 483-73	gx	02h30m51s	+26°11.6'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 484-1	gx	02h31m35s	+26°10.0'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia stellina stretta e molto sbilanciata a 1.5' E — 450x.
CGCG 484-3	gx	02h32m00s	+23°45.3'		Ari	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 484-4	gx	02h32m54s	+25°05.6'		Ari	16"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 484-6	gx	02h32m56s	+21°53.6'		Ari	16"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con piccola condensazione centrale quasi stellare visibile a tratti a 380x.
CGCG 484-11	gx	02h35m50s	+24°27.4'		Ari	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso di NE — 450x.
CGCG 484-13	gx	02h36m15s	+27°10.7'		Ari	24"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE; è un po' disturbata dalla SAO 75461 di 8a grandezza situata a poco più di 1' SW — 450x.
CGCG 484-15	gx	02h36m59s	+25°26.6'		Ari	16"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30", con tenue condensazione centrale di aspetto quasi stellare visibile a tratti 380x.
CGCG 484-21	gx	02h50m51s	+22°46.3'		Ari	24"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge poco contrastato — 450x.
CGCG 484-26	gx	02h57m59s	+25°25.5'		Ari	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 495x.
CGCG 485-3	gx	02h58m10s	+24°02.0'		Ari	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; ci sono 4 stelline orientate da N a S, allineate ed equidistanti a W della gx; una stellina più debole si trova a 1.5' SSE — 495x.
CGCG 485-4	gx	02h58m18s	+25°27.0'		Ari	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; ci sono 3 deboli stelline allineate da NW a SE a S della gx — 495x.
CGCG 485-5	gx	02h58m43s	+25°24.6'		Ari	28"	m. buona / ottimo	minuscolo baffo di luce relativamente compatto, orientato da N a S ed esteso max 15"; forma una coppia ravvicinata con **MAC 0258+2523** situata 1' verso S — 495x.
CGCG 487-6	gx	04h01m57s	+23°14.9'		Tau	28"	m. buona / ottimo	è un piccolo baffo di luce molto debole che in visione distolta pare aggettare a SE di una stellina — 495x.
CGCG 487-10	gx	04h02m10s	+21°57.1'		Tau	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccola condensazione centrale abbastanza contrastata; c'è una coppia di stelline a 1.5' SE e una stellina alla stessa distanza verso NNE — 495x.
CGCG 487-12	gx	04h02m26s	+26°49.4'		Tau	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a SE, una abbastanza brillante a 1.5' verso N e una stella brillante di 10ª grandezza a poco più di 1' NW — 495x.
CGCG 487-13	gx	04h02m31s	+21°53.4'		Tau	28"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20", con bulge evidente e contrastato; c'è una stellina subito a N — 495x.
CGCG 487-20	gx	04h05m42s	+25°29.8'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta non appare più estesa di 15" (c'è comunque da dire che al momento dell'osservazione era già molto bassa sull'orizzonte) — 450x.
CGCG 487-23	gx	04h08m03s	+23°17.6'		Tau	16"	ottima / ottimo	oggetto rotondo molto debole, poco diffuso, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' verso S — 380x.
CGCG 487-28	gx	04h14m15s	+24°39.6'		Tau	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 495x.
CGCG 493-8	gx	21h48m29s	+29°23.8'		Cyg	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, rotonda con Ø max di 25"-30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole subito a S e un'altra appena percettibile a 380x a uguale distanza verso W.
CGCG 493-12	gx	21h55m05s	+30°35.1'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 493-15	gx	21h57m12s	+30°43.8'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole oggetto rotondo di una 30-ina di secondi di Ø, diffuso e poco più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' NW — 380x.
CGCG 493-16	gx	21h57m23s	+30°43.2'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 380x e sembra aggettare verso NE per una 20-ina di secondi da una stellina molto debole.
CGCG 494-3	gx	22h11m06s	+29°36.6'		Peg	24"	ottima / molto buono	piccola, debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 494-4	gx	22h11m08s	+29°38.6'		Peg	24"	ottima / molto buono	più facile della precedente, diffusa, di Ø simile e con condensazione centrale quasi stellare; c'è una stellina a 1' WNW; poco disturbata dalla SAO 90297 di 8a grandezza 3' scarsi verso W — 450x.
CGCG 494-7	gx	22h14m56s	+31°46.5'		Peg	24"	ottima / molto buono	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione stellare; c'è una stellina a ridosso NW e una più brillante subito a N — 450x.
CGCG 494-9	gx	22h16m12s	+27°54.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è un baffo di luce molto debole e di luminosità uniforme che aggetta verso S da una stellina ed esteso una 30-ina di secondi; meglio non scendere sotto i 450x per ridurre il piccolo abbagliamento indotto da una stella ambrata abbastanza luminosa situata a poco più di 1' SSE.
CGCG 494-16	gx	22h22m36s	+28°28.2'		Peg	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e a tratti condensata, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W — 450x.
CGCG 494-17	gx	22h22m46s	+29°46.6'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso N — 450x.
CGCG 494-19	gx	22h23m09s	+32°08.9'		Peg	24"	ottima / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45; c'è una stringa di 6 stelline che da quella subito a NE della gx si protende verso NW per 5' o 6' — 450x.
CGCG 495-1	gx	22h27m12s	+31°30.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE; 3 stelline poste ad arco si trovano a NE della gx — 450x.
CGCG 495-13	gx	22h41m16s	+33°37.4'		Peg	24"	ottima / molto buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante a 1' scarso N e una debole alla stessa distanza verso W — 450x.
CGCG 495-31	gx	22h49m59s	+31°35.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" (il campo è pieno di stelline brillanti) — 450x.
CGCG 495-33	gx	22h49m33s	+32°22.0'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
CGCG 495-40	gx	22h52m41s	+29°19.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente; situata tra 2 stelline brillante orientate da N a S — 450x.
CGCG 496-7	gx	22h53m29s	+31°38.7'		Peg	24"	ottima / molto buono	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 496-11	gx	22h53m49s	+31°46.6'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 496-15	gx	22h54m42s	+32°19.1'		Peg	24"	ottima / molto buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 40" e un nucleo stellare abbastanza evidente; ci sono 3 deboli stelline ad arco subito a SE — 450x.
CGCG 496-18	gx	22h55m00s	+31°48.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NW — 450x.
CGCG 496-19	gx	22h55m07s	+31°18.5'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 450x.
CGCG 496-20	gx	22h55m06s	+32°11.1'		Peg	24"	ottima / molto buono	relativamente facile, poco diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 496-21	gx	22h55m24s	+31°43.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia abbastanza stretta a 1' verso E — 450x.
CGCG 496-22	gx	22h55m25s	+31°51.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 496-24	gx	22h55m55s	+31°40.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a N — 450x.
CGCG 496-25	gx	22h56m21s	+28°26.6'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata da una stellina brillante a 1.5' NE — 450x.
CGCG 496-29	gx	23h00m10s	+31°22.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto più debole di UGC 12297, dalla quale dista 2' a S, più piccola, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; osservabile senza difficoltà a 380x.
CGCG 496-31	gx	23h00m39s	+30°44.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa di luminosità pressoché uniforme, orientata grosso modo da E a W, di dimensioni 60"×30" e con una stellina a ridosso verso N — 380x.
CGCG 496-39	gx	23h05m46s	+28°41.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
CGCG 496-49	gx	23h10m05s	+30°13.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S: questa stellina fa parte di un piccolo asterismo di 6 o 7 componenti — 380x.
CGCG 496-50	gx	23h10m11s	+29°55.0'		Peg	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso W 450x.
CGCG 496-56	gx	23h12m39s	+33°41.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
CGCG 496-59	gx	23h14m04s	+31°39.0'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, con Ø max di 20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline.
CGCG 496-61	gx	23h14m14s	+31°30.1'		Peg	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare a tratti a 380x, ma non riesco a capire com'è fatta; ogni tanto sembra di vedere una condensazione centrale appena accennata.
CGCG 496-62	gx	23h14m23s	+28°26.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 496-66	gx	23h14m40s	+28°33.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale evidente; c'è una stellina subito a NE — 450x.
CGCG 496-69	gx	23h15m01s	+28°29.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 496-70	gx	23h15m10s	+28°57.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole, allungata da N a S, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge diffuso appena più contrastato sul disco — 380x.
CGCG 496-74	gx	23h17m18s	+28°35.8'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata a ridosso S della SAO 91145 di magnitudo 7.5 che tende a offuscarla — 580x.
CGCG 496-75	gx	23h17m26s	+29°03.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, con Ø di 15"-20"; appare con relativa facilità in visione distolta a 380x a ~ 1' NW di una stellina.
CGCG 496-77	gx	23h17m46s	+29°01.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	piccola, abbastanza compatta, Ø 20" e con condensazione centrale visibile a 380x.
CGCG 496-78	gx	23h18m15s	+29°13.8'		Peg	16"	ottima / ottimo	presenta un marcato nucleo stellare circonfuso da un piccolo alone abbastanza compatto con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
CGCG 497-7	gx	23h21m39s	+33°29.1'		Peg	16"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 270x.
CGCG 497-11	gx	23h23m22s	+29°25.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW — 450x.
CGCG 497-12	gx	23h23m34s	+29°10.9'		Peg	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo di luminosità uniforme, abbastanza regolare, con Ø di una 30-ina di secondi, molto debole, ma osservabile senza difficoltà a 380x.
CGCG 497-13	gx	23h24m39s	+27°50.7'		Peg	24"	buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e con gradiente di luce molto basso, rotonda con Ø di 45"; è situata tra 2 stelline distanti 2.5' e orientate da NW a SE — 450x.
CGCG 497-16	gx	23h25m22s	+28°51.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole macchiolina rotonda relativamente compatta e di luminosità uniforme, con Ø ma x 30"; c'è una stellina a ridosso verso W: questa fa parte di un terzetto di deboli stelline poste ad arco — 380x.
CGCG 497-19	gx	23h26m36s	+32°50.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare abbastanza facilmente orientata da E a W con dimensioni grosso modo 40"×20"; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
CGCG 497-21	gx	23h27m32s	+30°02.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 497-23	gx	23h28m01s	+32°09.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile subito a NW — 450x.
CGCG 497-24	gx	23h28m11s	+32°28.4'		Peg	16"	m. buona / discreto	è di luminosità pressoché uniforme, estesa una 40-ina di secondi e molto stemperata ai bordi — 270x.
CGCG 497-26	gx	23h28m49s	+29°44.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina subito a NW — 450x.
CGCG 497-29	gx	23h29m53s	+32°05.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta un tenue nucleo quasi stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stellina a 1' NE.
CGCG 497-30	gx	23h29m55s	+32°39.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con piccolo bulge evidente abbastanza contrastato — 450x.
CGCG 497-31	gx	23h30m21s	+32°53.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, situata a ridosso di una stellina brillante che confonde un po' l'osservazione; in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 497-46	gx	23h39m08s	+32°05.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo relativamente compatto, con nucleo stellare appena accennata e con Ø di ~ 20"; forma una piccola triangolo isoscele con una stella brillante a N e una molto debole a W — 380x.
CGCG 497-52	gx	23h43m57s	+29°08.1'		Peg	28"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con piccolo bulge evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SW. Forma coppia ravvicinata con MCG+5-55-51 situata 1' a S — 495x.
CGCG 498-6	gx	23h45m06s	+29°03.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; praticamente allineata ed equidistante con 2 stelline a E — 450x.
CGCG 498-7	gx	23h45m07s	+28°12.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
CGCG 498-12	gx	23h47m24s	+28°23.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' W e una coppia serrata di deboli stelline a un paio di primi verso E; è situata tra la SAO 91492 di 8a grandezza a E e la SAO 91482 di magnitudo 10.6 a W — 450x.
CGCG 498-17	gx	23h49m48s	+30°02.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; poco disturbata dalla SAO 91526 di magnitudo 8.8 situata 2.5' a NE — 450x.
CGCG 498-23	gx	23h52m12s	+31°27.9'		Peg	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con tenue condensazione stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una doppia sbilanciata e abbastanza brillante a ridosso W: la gx sembra inglobare la componente più debole — 495x.
CGCG 498-27	gx	23h53m39s	+29°15.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo quasi stellare evidente; c'è una stellina percettibile solo a momenti al bordo NE — 450x.
CGCG 498-28	gx	23h53m46s	+29°15.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" o poco più (le dimensioni, tuttavia, si notano meglio scalando a 340x); c'è una stellina a 1' W e una coppia a 1.5' SW.
CGCG 498-33	gx	23h54m56s	+30°12.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni inferiori a 30"×20"; c'è una stellina a ridosso N e una poco più brillante a 1' scarso WSW; è altresì nota come **CGCG 499-5** — 450x.
CGCG 498-34	gx	23h55m21s	+30°23.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva — molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; una stellina appena percettibile appare a tratti a ridosso N; è altresì nota come **CGCG 499-6** — 450x.
CGCG 498-35	gx	23h55m23s	+30°23.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE; è altresì nota come **CGCG 499-7** — 450x.
CGCG 498-36	gx	23h55m28s	+30°15.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; situata quasi nel mezzo di 2 stelline, una a 1' NW e l'altra più debole alla stessa distanza verso S; è altresì nota come **CGCG 499-8** — 450x.
CGCG 498-41	gx	23h56m16s	+29°24.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è altresì nota come **CGCG 499-13** — 450x.
CGCG 498-50	gx	23h58m18s	+29°35.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella brillante a 1.5' SSE che disturba l'osservazione; è altresì nota come **CGCG 499-22** — 450x.
CGCG 498-61	gx	00h00m44s	+28°24.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa, appare facilmente come una sorta di appendice che si diparte verso W da **UGC 12899** per una 30-ina di secondi; presenta un nucleo stellare appena percettibile; è altresì nota come **CGCG 499-33** — 450x.
CGCG 498-66	gx	00h01m36s	+33°33.7'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' N e una più debole alla stessa distanza verso W (altresì nota come **CGCG 499-38**) — 450x.
CGCG 498-68	gx	00h03m09s	+31°02.2'		Peg	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina brillante a 1' SSE — 380x.
CGCG 498-75	gx	00h04m48s	+32°16.3'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 495x.
CGCG 499-2	gx	23h54m22s	+30°17.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; è altresì nota come **CGCG 498-30** — 450x.
CGCG 499-9	gx	23h55m38s	+29°14.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	anche questa è molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; è altresì nota come **CGCG 498-37** — 450x.
CGCG 499-10	gx	23h55m45s	+30°12.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso SW; è altresì nota come **CGCG 498-38** — 450x.
CGCG 499-14	gx	23h56m43s	+29°53.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è altresì nota come **CGCG 498-42** (ultima gx osservata: albeggia) — 450x.
CGCG 499-16	gx	23h57m05s	+33°41.5'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; ci sono 3 deboli stelline allineate ed equidistanti a E ((altresì nota come **CGCG 498-44**) — 450x.
CGCG 499-18	gx	23h57m42s	+32°46.0'		And	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a ridosso E (altresì nota come **CGCG 498-46**) — 450x.

CGCG 499-23	gx	23h58m28s	+28°02.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccola condensazione centrale evidente; è altresì nota come **CGCG 498-51** — 450x.
CGCG 499-25	gx	23h58m42s	+28°05.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina brillante a 1' SE; è altresì nota come **CGCG 498-53** — 450x.
CGCG 499-26	gx	23h59m44s	+28°17.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina brillante a ridosso E; è altresì nota come **CGCG 498-54** — 450x.
CGCG 499-39	gx	00h02m50s	+31°29.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di alone molto tenue e stemperato sul fondo cielo, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi che aggetta a E di una stellina; meglio definita e contrastata scalando a 340x.
CGCG 499-49	gx	00h05m29s	+32°31.6'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è un asterismo foggiato a "Y" orientato da E a W di 4 stelline brillanti (una di queste si trova subito a SW della gx); allineata ed equidistante con due stelline più deboli a NW — 450x.
CGCG 499-61	gx	00h10m16s	+32°06.4'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di forma indistinta situata a ridosso W di una coppia di stelline orientate da N a S (quella meridionale più brillante); non ne capisco la forma, ma in visione distolta non sembra più estesa di 30" — 450x.
CGCG 499-68	gx	00h10m43s	+28°33.8'		And	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è molto disturbata da una stellina brillante a ridosso N — 450x.
CGCG 499-73	gx	00h11m51s	+33°06.4'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una stellina a 1.5' W — 450x.
CGCG 499-74	gx	00h12m09s	+27°54.7'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 499-81	gx	00h13m45s	+30°11.7'		And	16"	ottima / ottimo	piccola e debole, di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con una stellina a ridosso verso NE; quest'ultima fa parte di un piccolo triangolo rettangolo di stelline molto deboli — 380x.
CGCG 499-82	gx	00h13m56s	+28°45.8'		And	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina brillante un paio di primi a S — 450x.
CGCG 499-84	gx	00h14m13s	+28°32.7'		And	24"	ottima / ottimo	debole, diffuse e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo S — 450x.
CGCG 499-85	gx	00h14m27s	+28°30.8'		And	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 499-87	gx	00h15m14s	+31°30.0'		And	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale evidente; la visione è un po' disturbata dalla SAO 53755, una stella gialla di 5ª grandezza situata 2.5' a NW — 495x.
CGCG 499-88	gx	00h15m15s	+29°21.8'		And	28"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 495x.
CGCG 499-91	gx	00h16m24s	+28°58.5'		And	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×15" — 450x.
CGCG 499-92	gx	00h16m33s	+30°20.7'		And	16"	buona / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, con condensazione stellare appena percettibile, approssim. rotonda con Ø di ~ 1' — 270x.
CGCG 499-94	gx	00h16m25s	+30°22.4'		And	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 30" S —380x.
CGCG 499-95	gx	00h16m49s	+29°37.1'		And	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno — 380x.
CGCG 499-97	gx	00h16m56s	+27°53.4'		And	24"	buona / buono	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 499-98	gx	00h17m03s	+29°56.4'		And	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; ci sono 2 deboli stelline a 1' N e NW — 450x.
CGCG 499-99	gx	00h17m17s	+30°12.5'		And	16"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda, di luminosità uniforme e Ø < 30" — 380x.
CGCG 499-101	gx	00h17m46s	+30°09.1'		And	24"	ottima / buono	baffo di luce molto debole e relativamente compatto, di luminosità uniforme, orientato da NE a SW e di dimensioni 30"×10"; è soffocato dal bagliore della SAO 73876 di magnitudo 8.7 situata a ridosso SW — 450x.
CGCG 499-102	gx	00h17m59s	+29°28.2'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale evidente; allineata ed equidistante con due stelline a S — 450x.
CGCG 499-103	gx	00h18m14s	+29°57.1'		And	24"	ottima / buono	debole, diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a S — 450x.
CGCG 499-113	gx	00h21m13s	+30°28.5'		And	16"	buona / m. buono	relativamente facile e compatta, molto piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è un piccolo triangolo di stelline brillanti subito a NW e molto utile come rifermento — 380x.
CGCG 499-115	gx	00h21m17s	+30°30.4'		And	16"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 500-1	gx	00h21m12s	+29°38.7'		And	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e poco più brillante all'interno — 450x.
CGCG 500-3	gx	00h21m18s	+29°51.5'		And	28"	m. buona / discreto	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 12"-15"; situata a ridosso W di un piccolo triangolo rettangolo di stelline — 495x.
CGCG 500-5	gx	00h21m26s	+29°37.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante al margine SW dalla quale sembra aggettare e che disturba un po' la visione — 450x.
CGCG 500-7	gx	00h22m16s	+30°14.8'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S (fa parte di un piccolo asterismo di 4 componenti che ricorda vagamente un "4"); un altro piccolo raggruppamento di una dozzina di stelle di forma ellittica si trova a W: 7 di queste sono brillanti — 450x.
CGCG 500-10	gx	00h22m46s	+29°56.4'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso E che ne confonde un po' la forma; altre 4 stelline molto deboli o appena percettibili si trovano a N e a E — 450x.
CGCG 500-11	gx	00h23m13s	+29°50.2'		And	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" (o poco più) e con piccolo bulge evidente — 450x.
CGCG 500-12	gx	00h23m39s	+30°17.4'		And	16"	buona / m. buono	debolissima, solo a tratti in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni ~ 30"×20"; c'è una stellina a meno di 1' verso S — 270x.
CGCG 500-13	gx	00h23m41s	+30°33.5'		And	16"	buona / m. buono	molto debole, rotonda, con condensazione centrale appena accennata e Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 500-15	gx	00h24m37s	+29°17.2'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina una 40-ina di secondi a E — 450x.
CGCG 500-19	gx	00h25m14s	+30°02.2'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e stemperata sul fondo cielo, oltretutto disturbata da alcune stelle molto brillanti che fanno perdere contrasto; in visione distolta appare approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; è allineata con 2 stelline a S (quella più vicina alla gx è la SAO 73966 di 10ª grandezza); una stellina più debole si trova invece subito a N — 450x.
CGCG 500-22	gx	00h27m32s	+30°59.7'		And	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; situata tra due stelline distanti 1' in direzione NNW-SSE — 495x.
CGCG 500-25	gx	00h28m15s	+33°16.0'		And	28"	m. buona / discreto	molto piccola e molto debole, poco diffusa, orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a S — 495x.
CGCG 500-27	gx	00h28m17s	+31°12.0'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 500-28	gx	00h28m35s	+31°09.3'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; allineata, ma non equidistante, con due stelline a E — 450x.
CGCG 500-30	gx	00h28m42s	+30°42.7'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 500-32	gx	00h29m07s	+31°00.3'		And	16"	buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' verso W — 380x.
CGCG 500-34	gx	00h29m43s	+30°03.0'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 30"×20" scarsi e con condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 500-42	gx	00h32m44s	+30°45.0'		And	16"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 270x.
CGCG 500-43	gx	00h32m53s	+30°39.0'		And	16"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina a 1' verso W — 270x.
CGCG 500-48	gx	00h35m13s	+29°47.9'		And	16"	buona / m. buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' circa verso W; piccolo arco di 3 stelline a N — 270x.
CGCG 500-50	gx	00h36m18s	+32°54.2'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 500-51	gx	00h36m45s	+30°49.9'		And	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c' una doppia brillante e sbilanciata a 1' verso N — 495x.
CGCG 500-52	gx	00h37m07s	+28°50.0'		And	16"	buona / m. buono	molto piccola e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 270x.
CGCG 500-58	gx	00h38m28s	+29°37.5'		And	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE (situata all'estremità orientale dell'ammasso **AGC 71**)— 495x.
CGCG 500-60	gx	00h38m47s	+32°25.0'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 500-61	gx	00h38m51s	+29°30.8'		And	28"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina al bordo S — 495x.
CGCG 500-65	gx	00h39m45s	+33°09.5'		And	16"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NNE — 270x.
CGCG 500-68	gx	00h41m34s	+29°31.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, visibile in visione distolta a 380x, molto piccola, estesa max 20" e a tratti condensata.
CGCG 500-69	gx	00h41m37s	+29°12.1'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 500-74	gx	00h42m48s	+29°55.3'		And	16"	buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, rotonda, di Ø > 30" e con evidente condensazione centrale — 380x.
CGCG 500-77	gx	00h43m29s	+30°03.1'		And	16"	m. buona / discreto	nella posizione indicata appare solo una stellina appena percettibile (presumibilmente il nucleo della gx); una stellina più brillante si trova a ridosso di CGCG 500-74 verso W — 270x.
CGCG 500-80	gx	00h44m08s	+30°21.0'		And	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con una piccola condensazione appena percettibile a 380x.
CGCG 500-81	gx	00h45m45s	+29°50.1'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 500-83	gx	00h46m24s	+29°37.4'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; situata tra due stelline: una abbastanza brillante a SE e l'altra debole verso W — 450x.
CGCG 500-85	gx	00h46m34s	+29°43.5'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 500-89	gx	00h46m49s	+29°48.2'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra 2 stelline brillanti distanti 4' in direzione NNE-SSW — 450x.
CGCG 500-92	gx	00h47m04s	+28°04.0'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 500-94	gx	00h47m11s	+32°41.5'		And	16"	ottima / ottimo	debolissimo e piccolo oggetto rotondo di 25"-30" di Ø, luminosità uniforme e con una stellina a ridosso verso N — 380x.
CGCG 501-6	gx	00h46m39s	+31°43.0'		And	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a S; due stelline brillanti situate a W e NW della gx disturbano un po' l'osservazione — 450x.
CGCG 501-7	gx	00h46m47s	+27°56.5'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; poco disturbata da una stellina abbastanza brillante situata a ridosso NW — 450x.
CGCG 501-15	gx	00h47m31s	+31°39.6'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa che in visione distolta appare estesa sì e no una 30-ina di secondi; è situata a ridosso W di 3 stelline allineate ed equidistanti (la più brillante di queste fa parte di un piccolo trapezio); meglio tuttavia non scalare gli ingrandimenti (altresì nota come **CGCG 500-95**) — 450x.
CGCG 501-16	gx	00h47m50s	+29°57.6'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 501-17	gx	00h48m02s	+29°57.4'		And	24"	m. buona / ottimo	situata 2.5' a E della precedente, di aspetto simile, rotonda, diffusa e di luminosità più uniforme; c'è una doppia abbastanza stretta un paio di primi a NE — 450x.
CGCG 501-18	gx	00h48m09s	+28°36.8'		And	16"	buona / m. buono	poco diffusa e poco allungata da WNW a ESE (si stima in base alle 2 stelline in mezzo alle quali si trova e che sono orientate da NNW a SSE) e con nucleo stellare — 380x.
CGCG 501-24	gx	00h50m51s	+28°42.0'		Psc	28"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a SW — 495x.
CGCG 501-26	gx	00h51m00s	+29°32.2'		Psc	28"	m. buona / discreto	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare molto tenue; c'è un piccolo asterismo di forma triangolare formato da 4 stelline brillanti subito a N della gx — 495x.
CGCG 501-28	gx	00h55m35s	+29°41.8'		Psc	16"	m. buona / discreto	debolissima, salta fuori in visione distolta a 270x; è di luminosità uniforme e solo a tratti appare allungata da N a S con dimensioni di 30"×20".
CGCG 501-34	gx	00h53m35s	+31°25.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una debole stellina a ridosso SW; un'altra stellina poco più evidente di trova a 1.5' verso E — 450x.
CGCG 501-35	gx	00h54m05s	+30°20.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso SW (che fa parte di un piccolo triangolo isoscele molto aperto) — 450x.
CGCG 501-37	gx	00h54m41s	+28°45.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo molto debole e di luminosità uniforme con Ø di una 20-ina di secondi; salta fuori facilmente in visione distolta a 380x quando si osserva UGC 554 situata a 3' scarsi SSE.
CGCG 501-50	gx	00h57m45s	+32°32.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso W; 3 stelline quasi allineate in direzione E-W si trovano 1.5' a S (quella più a E la più luminosa) — 450x.
CGCG 501-51	gx	00h57m42s	+33°21.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' SE e una brillante a 1.5' SW — 450x.
CGCG 501-55	gx	00h58m01s	+30°42.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" scarsi — 450x.
CGCG 501-56	gx	00h59m32s	+31°47.9'		Psc	16"	buona / m. buono	assieme a CGCG 501-58 forma una coppia di debolissimi oggetti poco diffusi, di luminosità uniforme, rotondi con Ø di una 30-ina di secondi; il 2° è molto disturbato dalla luce della SAO 54330 di 8ª grandezza situata un paio di primi NNE; a meno di 1' NE del 2° c'è una stellina appena percettibile — 380x.
CGCG 501-57	gx	00h59m40s	+29°23.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, situata in mezzo a due stelline molto deboli distanti un paio di primi in direzione NE-SW (queste stelline sono allineate ed equidistanti con una terza più brillante a NE) — 450x.
CGCG 501-58	gx	00h59m53s	+31°49.6'		Psc	16"	buona / m. buono	v. **CGCG 501-58**
CGCG 501-60	gx	01h00m40s	+30°07.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	relativamente compatta e leggermente condensata, rotonda con Ø < 30" — 380x.
CGCG 501-64	gx	01h01m13s	+30°09.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	poco diffusa, rotonda, di 30" di Ø e con condensazione centrale marcata; c'è una stellina a poco più di 1' verso SW — 380x.
CGCG 501-67	gx	01h01m53s	+30°08.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	poco allungata da N a S (grosso modo come UGC 632 dalla quale dista 9' a E), di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione centrale diffusa — 380x.
CGCG 501-69	gx	01h02m11s	+32°24.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	forma una coppia abbastanza ravvicinata con CGCG 501-70 situata un paio di primi a N — piccola e molto debole, con nucleo stellare, poco allungata da N a S e di dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
CGCG 501-70	gx	01h02m10s	+32°27.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	forma una coppia abbastanza ravvicinata con CGCG 501-69 situata un paio di primi a S — molto debole, rotonda e condensata, con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
CGCG 501-72	gx	01h03m31s	+32°19.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un lucore molto tenue, non più esteso di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme che aggetta verso S da una stellina brillante — 380x.
CGCG 501-73	gx	01h04m46s	+32°58.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata tra 2 stelline; una evidente a SE e una molto debole dalla parte opposta — 450x.
CGCG 501-76	gx	01h05m35s	+31°58.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale molto tenue — 450x.
CGCG 501-77	gx	01h05m34s	+32°25.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi e una evidente condensazione centrale quasi stellare; c'è una coppia di stelline a ridosso E — 450x.
CGCG 501-91	gx	01h07m58s	+33°18.2'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 35"-40" e nucleo stellare visibile a tratti a 270x.
CGCG 501-92	gx	01h08m03s	+31°40.5'		Psc	28"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 291x.
CGCG 501-97	gx	01h08m40s	+33°32.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 501-99	gx	01h08m52s	+32°06.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di ~ 30" di Ø e condensato — 380x.
CGCG 501-102	gx	01h09m13s	+31°58.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e con evidente nucleo stellare; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; si trova all'interno di un piccolo triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta a SW — 380x.
CGCG 501-106	gx	01h09m20s	+33°29.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a N — 450x.
CGCG 501-107	gx	01h09m33s	+32°10.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, solo a tratti in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni ~ 40"×20" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 501-108	gx	01h09m45s	+31°08.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 501-109	gx	01h09m42s	+32°27.1'		Psc	16"	m. buona / discreto	molto debole, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30", diffusa e di luminosità uniforme — 270x.
CGCG 501-112	gx	01h10m03s	+32°54.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una coppia di stelline a 1.5' SE — 450x.
CGCG 501-113	gx	01h10m21s	+30°11.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
CGCG 501-114	gx	01h10m20s	+32°23.2'		Psc	16"	m. buona / discreto	piccola e debolissima lama di luce, solo a tratti più brillante al centro, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a ridosso SW e un'altra più brillante e poco più distante a NE — 270x.
CGCG 501-117	gx	01h10m52s	+32°35.6'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e una tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina a ridosso W e un'altra più brillante a 1' scarso verso SE — 450x.
CGCG 501-119	gx	01h11m08s	+33°13.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale appena percettibile — 380x.
CGCG 501-120	gx	01h11m11s	+32°42.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, ma disturbata da due stelline brillanti in mezzo alle quali si trova; è diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
CGCG 501-124	gx	01h11m21s	+27°55.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; forma una coppia ravvicinata con MAC 0111+2755, situata a ridosso SW, e con la quale si fonde a prima vista; si separano comunque con difficoltà anche a 450x; c'è una stellina a 1' N della coppia.
CGCG 501-128	gx	01h12m10s	+32°00.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 502-14	gx	01h15m49s	+31°49.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente facile da vedere in visione distolta, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da WNW a ESE (ossia a perpendicolo con le 2 stelline brillanti situate a SE) con dimensioni 40"×30" — 380x.
CGCG 502-16	gx	01h15m59s	+33°38.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma più che altro molto disturbata da una stella brillante situata quasi a ridosso verso S; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
CGCG 502-21	gx	01h16m33s	+28°58.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 502-22	gx	01h18m41s	+32°15.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a SW — 450x.
CGCG 502-31	gx	01h19m45s	+32°56.9'		Psc	28"	m. buona / mediocre	piccola, diffusa e con nucleo stellare abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata e quasi equidistante con 2 stelline a NE (le 2 più brillanti di un triangolo equilatero) — 291x.
CGCG 502-35	gx	01h20m33s	+29°37.0'		Psc	16"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile subito a NE — 270x.
CGCG 502-39	gx	01h20m53s	+33°25.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	appare in visione distolta come una sorta di tenuissimo alone asimmetrico che aggetta verso N dalla più meridionale di una coppia di stelline brillanti; l'effetto è stranamente più vistoso a 340x (a 450x sembra infatti impastarsi con l'alone delle stelle).
CGCG 502-43	gx	01h21m06s	+33°22.7'		Psc	16"	m. buona / m. buono	piccola, compatta, di 30" massimo di Ø e di luminosità uniforme; assieme alla successiva fa parte di un gruppo molto esteso — 270x.
CGCG 502-44	gx	01h21m17s	+33°05.4'		Psc	28"	m. buona / mediocre	relativamente facile, poco diffusa,rotonda con Ø < 30" e una piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S e un piccolo triangolo isoscele di stelline più deboli un paio di primi a NW (già osservata col 16") — 291x.
CGCG 502-45	gx	01h21m32s	+32°12.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto disturbata da una stellina brillante a ridosso S; è approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 502-47	gx	01h21m35s	+33°36.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole e molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme; allineata ed equidistante con 2 stelline a SE — 450x.
CGCG 502-54	gx	01h22m17s	+28°47.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissimo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi e orientato da NE a SW; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio restare a 450x.
CGCG 502-56	gx	01h22m55s	+28°50.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NW — 450x.
CGCG 502-62	gx	01h23m59s	+33°18.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo, relativamente molto debole, ma relativamente compatto e condensato, Ø di 15"-20", facilmente visibile a 380x; si trova al vertice orientale di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline.
CGCG 502-69	gx	01h23m52s	+32°39.5'		Psc	28"	m. buona / buono	debole diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline a S — 495x.
CGCG 502-72	gx	01h23m59s	+33°18.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola, debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 502-73	gx	01h23m57s	+28°38.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina quasi a ridosso NE.
CGCG 502-74	gx	01h24m11s	+32°45.9'		Psc	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE e una più debole subito a S — 495x.
CGCG 502-80	gx	01h24m50s	+32°14.1'		Psc	16"	ottima / ottimo	fa parte del quartetto di UGC 950 — è debolissima, ma appare facilmente in visione distolta a 380x, probabilmente rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 502-85	gx	01h26m34s	+31°37.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima, rotonda, molto diffusa e con Ø di una 40-ina di secondi; meglio scalare a 270x.
CGCG 502-89	gx	01h28m52s	+31°41.6'		Psc	28"	m. buona / buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' NW e una più debole alla stessa distanza verso NE — 495x.
CGCG 502-90	gx	01h28m58s	+31°18.7'		Psc	28"	m. buona / buono	è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 495x.
CGCG 502-93	gx	01h29m13s	+33°40.1'		And	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 502-94	gx	01h29m14s	+31°45.8'		Psc	28"	m. buona / buono	molto debole, ma poco più evidente di — dalla quale dista 6' a NE — diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE — 495x.
CGCG 502-96	gx	01h29m44s	+31°18.5'		Psc	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1.5' verso E — 495x.
CGCG 502-97	gx	01h29m46s	+32°01.3'		Psc	28"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una coppia di stelline a NE e un'altra a 1' SE: queste 3 formano un minuscolo triangolo rettangolo a E della gx — 495x.
CGCG 502-99	gx	01h30m05s	+29°46.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole subito a SW; un'altra appena più evidente si trova 1.5' a NE — 450x.
CGCG 502-100	gx	01h30m15s	+33°15.8'		Psc	28"	m. buona / buono	piccola e molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
CGCG 502-104	gx	01h32m02s	+33°12.4'		Tri	24"	m. buona / discreto	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S — 450x.
CGCG 502-106	gx	01h32m04s	+33°10.7'		Tri	24"	m. buona / discreto	situata 1.5' a S di CGCG 502-104, è poco più evidente di quest'ultima; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×20" — 450x.
CGCG 502-111	gx	01h34m14s	+32°02.5'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno; a 380x appare allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30".
CGCG 502-112	gx	01h34m15s	+32°34.8'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina a ridosso S; poco meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 502-113	gx	01h34m21s	+32°38.4'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni anche questa di 40"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' verso W — 450x.
CGCG 502-114	gx	02h35m09s	+31°02.3'		Tri	24"	ottima / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (situata verso il margine nord-orientale di M33) — 450x.
CGCG 502-115	gx	01h35m11s	+32°42.5'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; poco meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 502-116	gx	01h35m17s	+33°03.0'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" (è disturbata dalla SAO 54804 di magnitudine 8.7 situata 3.5' a N che anche a 450x è difficile tenere fuori campo).
CGCG 503-5	gx	01h41m33s	+28°20.4'		Psc	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, disturbata da una stellina brillante al bordo N, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo SW — 495x.
CGCG 503-7	gx	01h42m52s	+31°28.7'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una doppia a 1' SW — 495x.
CGCG 503-8	gx	01h43m08s	+27°45.0'		Psc	16"	ottima / scarso	debole, diffusa, orientata da NW a SE con dimensioni 45"×30" e appena più brillante all'interno — 380x.
CGCG 503-9	gx	01h43m28s	+30°36.1'		Tri	28"	m. buona / buono	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", con bulge molto diffuso e appena contrastato; c'è una stellina a 1' NE — 495x.
CGCG 503-10	gx	01h43m34s	+28°57.2'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø < 30" e appena più brillante all'interno; c'è una doppia serrata a 1.5' verso E — 495x.
CGCG 503-11	gx	01h43m42s	+31°36.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" o poco più; situata tra 2 deboli stelline distanti 1.5' e orientate da WNW a ESE — 495x.
CGCG 503-12	gx	01h43m47s	+29°10.0'		Tri	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' W; la visione è un po' disturbata da una stella brillante situata 6' a SE e da una coppia sbilanciata (la componente più luminosa è la SAO 74894 di 10ª grandezza) che si trova 3.5' a E — 450x.
CGCG 503-20	gx	01h46m55s	+31°52.2'		Tri	28"	ottima / ottimo	debole diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 495x.
CGCG 503-21	gx	01h46m53s	+33°23.4'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 450x.
CGCG 503-22	gx	01h46m58s	+28°45.4'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
CGCG 503-23	gx	01h46m26s	+32°06.6'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata a ridosso S di una coppia di stelline — 450x.
CGCG 503-25	gx	01h49m13s	+33°05.7'		Tri	28"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE, ma da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la **PGC 2022981** — 495x.
CGCG 503-30	gx	01h50m33s	+33°37.6'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 503-31	gx	01h50m40s	+32°29.7'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da ENE a WSW con dimensioni 60"×20" — 450x.
CGCG 503-35	gx	01h51m13s	+32°37.5'		Tri	24"	ottima / mediocre	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è qualcosa di estremamente debole a ridosso W o SW, ma non riesco a capire se è una stellina o un baffo della stessa gx (il seeing non è purtroppo gran che) — 450x.
CGCG 503-37	gx	01h49m35s	+32°34.8'		Tri	24"	ottima / mediocre	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; è situata a ridosso SE di UGC 1281 — 450x.
CGCG 503-38	gx	01h51m34s	+33°30.3'		Tri	24"	ottima / ottimo	è di aspetto a prima vista simile a CGCG 503-30 (osservata subito prima e presente nello stesso campo, 14.5' a NW), ma a tratti appare più piccola, con Ø di una 20-ina di secondi e più condensata — 450x.
CGCG 503-39	gx	01h51m43s	+30°23.1'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e più che altro disturbata da una stella brillante di 9ª grandezza situata 3' a SSW; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 503-42	gx	01h52m19s	+31°32.3'		Tri	24"	m. buona / m. buono	è una chiazza lattescente molto debole e diffusa situata a ridosso NE di una stellina brillante che tende a offuscarne un po' la forma; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; una stellina appena percettibile è a ridosso NE, mentre una più brillante si trova subito a N — 450x.
CGCG 503-46	gx	01h53m22s	+28°59.7'		Tri	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo quadrilatero sghembo di deboli stelline — 495x.
CGCG 503-48	gx	01h53m41s	+31°28.4'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso NW e una debole alla stessa distanza verso SW — 495x.
CGCG 503-49	gx	01h54m15s	+32°07.1'		Tri	24"	m. buona / discreto	chiazza molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; la forma è tuttavia un po' confusa da una coppia di stelline a ridosso SE — 450x.
CGCG 503-56	gx	01h56m50s	+31°42.2'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 503-63	gx	01h57m49s	+27°52.0'		Tri	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatte e condensata, rotonda con Ø < 20"; è immersa nella luce della SAO 75048 di 6ª grandezza situata a 4' SSW — 450x.
CGCG 503-65	gx	01h58m31s	+32°05.7'		Tri	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 503-68	gx	02h00m16s	+32°03.6'		Tri	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 495x.
CGCG 503-70	gx	02h00m30s	+29°53.9'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso E — 495x.
CGCG 503-71	gx	02h00m33s	+32°28.0'		Tri	28"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 40" — 495x.
CGCG 503-80	gx	02h04m18s	+28°39.5'		Tri	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
CGCG 504-5	gx	02h04m53s	+32°16.8'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina brillante a 1.5' NW e una della stessa luminosità un paio di primi verso E — 450x.
CGCG 504-13	gx	02h07m15s	+32°57.1'		Tri	24"	ottima / mediocre	debole diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 504-14	gx	02h07m26s	+32°57.2'		Tri	24"	ottima / mediocre	poco più piccola della precedente, dalla quale dista un paio di primi a E, anche questa rotonda con Ø < 30" e con condensazione stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 504-15	gx	02h07m59s	+28°52.2'		Tri	28"	ottima / ottimo	poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale evidente — 495x.
CGCG 504-22	gx	02h10m39s	+31°20.2'		Tri	24"	ottima / mediocre	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo stellare molto tenue — 450x.
CGCG 504-23	gx	02h10m59s	+31°17.7'		Tri	24"	ottima / mediocre	debole lama di luce di luminosità uniforme, estesa 1' scarso e orientata da NE a SW — 450x.
CGCG 504-25	gx	02h10m59s	+32°43.8'		Tri	24"	ottima / mediocre	forma una coppia ravvicinata con UGC 1671 situata 2' scarsi a S — sono 2 gx visualmente di aspetto molto simile, entrambe molto allungate da E a W con dimensioni 60"×20" e a tratti appena più brillanti all'interno; solo a momenti la UGC appare leggermente più cicciotta — 450x.
CGCG 504-29	gx	02h12m06s	+31°35.2'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; disturbata da una stella di 10ª grandezza situata a 1' verso S — 450x.
CGCG 504-34	gx	02h13m54s	+31°51.7'		Tri	28"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE. Una stellina assai molto debole e condensata appare a ~ 1' WNW: si tratta di **2MASS 02134998+3152019** — 495x.
CGCG 504-39	gx	02h15m11s	+31°11.0'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina subito a SE — 495x.
CGCG 504-48	gx	02h17m34s	+29°31.3'		Tri	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 495x.
CGCG 504-50	gx	02h18m00s	+31°52.9'		Tri	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 495x.
CGCG 504-51	gx	02h18m15s	+32°58.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni anche questa di 40"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline a NE (quella più vicina alla gx è una doppia molto sbilanciata); un'altra stellina si trova a 1.5' SW — 495x.
CGCG 504-56	gx	02h19m26s	+32°02.9'		Tri	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo W e una più debole a ridosso NE; la visione è comunque disturbata dalla SAO 55455 di magnitudo 9.5 situata un paio di primi a ENE (la mediana di 3 stelle brillanti orientate da NNW a SSE) — 495x.
CGCG 504-69	gx	02h22m40s	+28°27.9'		Tri	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso W; è situata tra 2 stelline orientate da E a W: quella a W è brillante — 380x.
CGCG 504-70	gx	02h23m21s	+32°11.8'		Tri	16"	ottima / m. buono	assieme a CGCG 504-71 forma una coppia di galassiette facili da vedere, poco diffuse e di aspetto molto simile, rotonde con Ø di una 30-ina di secondi; presentano entrambe una piccola e tenue condensazione centrale; sono distanti 1' in direzione NE-SW — 380x.
CGCG 504-71	gx	02h23m22s	+32°11.8'		Tri	16"	ottima / m. buono	v. **CGCG 504-70**
CGCG 504-78	gx	02h26m06s	+28°59.8'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
CGCG 504-88	gx	02h28m09s	+32°21.5'		Tri	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia abbastanza serrata di stelline appena percettibili a ridosso SW che si notano poco meglio spingendo a 580x.
CGCG 504-96	gx	02h29m41s	+28°34.6'		Tri	16"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SW e un'altra a 45" SE — 380x.
CGCG 504-97	gx	02h29m49s	+31°27.2'		Tri	16"	ottima / m. buono	debolissima, ma osservabile senza grossi problemi in visione distolta a 270x; è di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20".
CGCG 504-100	gx	02h30m33s	+28°44.0'		Tri	16"	ottima / m. buono	debolissima, ma osservabile senza difficoltà in visione distolta a 380x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
CGCG 504-101	gx	02h30m33s	+30°52.4'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata tra due stelline abbastanza brillanti distanti 3' in direzione NW-SE — 450x.
CGCG 505-4	gx	02h32m54s	+30°44.6'		Ari	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' verso W — 495x.
CGCG 505-7	gx	02h33m37s	+32°32.2'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 495x.
CGCG 505-8	gx	02h33m39s	+33°00.9'		Tri	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.

CGCG 505-9	gx	02h33m47s	+30°11.4'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; una debolissima stellina appare a tratti al bordo meridionale — 450x.
CGCG 505-17	gx	02h34m36s	+29°57.4'		Ari	28"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **MAC 0234+2957** situata a ridosso N — sono due piccole galassiette facili, di aspetto simile, rotonde con Ø di 20" o poco più; la CGCG è più diffusa e con condensazione centrale più piccola, mentre la MAC presenta un gradiente di luce più uniforme — 495x.
CGCG 505-19	gx	02h36m24s	+31°42.6'		Tri	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline a ridosso N e orientate come la galassia — 450x.
CGCG 505-42	gx	02h43m33s	+32°15.2'		Tri	16"	ottima / m. buono	relativamente facile, con alto gradiente, allungata da E a W, di dimensioni 45"×30" e poco diffusa — 380x.
CGCG 505-50	gx	02h45m13s	+32°17.0'		Tri	28"	m. buona / buono	relativamente facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×15", molto diffusa alle due estremità NE e SW, con piccolo bulge rotondo e contrastato; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
CGCG 505-52	gx	02h46m01s	+28°01.7'		Ari	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' NE — 495x.
CGCG 506-1	gx	02h58m19s	+32°20.2'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una coppia di stelline a ridosso W — 495x.
CGCG 506-3	gx	03h01m46s	+29°12.6'		Ari	16"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare rotonda, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi; è situata praticamente a ridosso della SAO 75690 di 9ª grandezza — 380x.
CGCG 508-6	gx	04h03m56s	+30°50.4'		Tau	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una stellina subito a S; a SE è presente una losanga di stelle brillanti: la componente più a N è una doppia abbastanza stretta — 450x.
CGCG 512-9	gx	21h46m43s	+38°30.0'		Cyg	24"	ottima / molto buono	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SE e una appena percettibile a ridosso E — 450x.
CGCG 513-5	gx	22h08m38s	+38°05.1'		Lac	16"	ottima / ottimo	è più debole della CGCG 513-6 (osservata per prima) e più piccola; appare abbastanza facilmente a 380x, rotonda con Ø di ~ 30"; c'è una stellina a ridosso verso W.
CGCG 513-6	gx	22h09m26s	+39°12.9'		Lac	16"	m. buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta a 380x quando si fissa la stellina brillante situata un paio di primi a SE; molto piccola, ma non riesco a capire com'è orientata.
CGCG 513-8	gx	22h09m43s	+38°11.8'		Lac	16"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme rotonda con Ø di 45"; c'è una quasi a ridosso verso E facilmente visibile a 380x.
CGCG 513-10	gx	22h10m15s	+36°39.3'		Lac	24"	ottima / molto buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 45"×30" — 450x.
CGCG 513-16	gx	22h13m21s	+38°49.9'		Lac	24"	ottima / molto buono	debole, diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" (ci sono 3 stelline allineate a E della gx) — 450x.
CGCG 513-17	gx	22h13m49s	+37°01.6'		Lac	24"	ottima / molto buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a 1' SW; un asterismo di 4 stelline brillanti si trova subito a N — 450x.
CGCG 514-8	gx	22h19m39s	+35°31.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 30" o poco più; c'è una stellina appena percettibile subito a N; piccolo triangolo di deboli stelline a 1' verso E — 450x.
CGCG 514-11	gx	22h21m17s	+34°35.2'		Peg	24"	ottima / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, di aspetto a tratti un po' irregolare, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" — 450x.
CGCG 514-13	gx	22h22m02s	+35°39.8'		Lac	24"	ottima / molto buono	debole lama di luce orientata da NW a SE, estesa 1' e con tenue bulge diffuso; ci sono; c'è un piccolo asterismo di 5 stelline subito a SE — 450x.
CGCG 514-19	gx	22h22m53s	+35°45.8'		Lac	24"	ottima / molto buono	molto debole, molto allungata da NE a SW, con dimensioni 45"×15", poco diffusa e di luminosità uniforme; è situata tra due stelline orientate da N a S e distanti un paio di primi — 450x.
CGCG 514-31	gx	22h26m40s	+35°03.5'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x.
CGCG 514-36	gx	22h28m34s	+33°59.9'		Peg	24"	ottima / molto buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 514-37	gx	22h28m44s	+39°05.2'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso SW e una brillante a 1' verso E — 450x.
CGCG 514-47	gx	22h30m34s	+39°37.1'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con tenue nucleo quasi stellare — 450x.
CGCG 514-48	gx	22h30m51s	+36°66.8'		Lac	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a E; una stellina più debole si trova ridosso SW — 450x.
CGCG 514-51	gx	22h31m34s	+34°42.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e con piccolo bulge abbastanza evidente, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; situata in mezzo a due stelline orientate da ENE a WSW — 450x.
CGCG 514-52	gx	22h31m54s	+34°26.3'		Peg	24"	ottima / buono	debolissima chiazza di forma indistinta ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una doppia stretta a ridosso E — 450x.
CGCG 514-55	gx	22h32m55s	+39°12.5'		Lac	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto pressoché rotondo, di luminosità uniforme e con Ø di ~ 30" visibile in visione distolta a 380x; poco più facile da vedere dell'elusiva UGC 12075 situata 1' verso W.
CGCG 514-56	gx	22h33m09s	+39°09.3'		Lac	16"	ottima / ottimo	è un oggetto rotondo molto debole, con Ø di una 30-ina di secondi e visibile senza problemi in visione distolta a 380x; c'è una coppia di stelline appena percettibili distanti una 15-ina di secondi quasi a ridosso verso NW.
CGCG 514-58	gx	22h35m00s	+37°12.0'		Lac	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata al vertice meridionale di un piccolo triangolo equilatero formato con due stelline brillanti a N e NW — 450x.
CGCG 514-66	gx	22h36m23s	+34°32.6'		Peg	24"	m. buona / buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W; meglio contrastata ed evidente scalando a 340x.
CGCG 514-70	gx	22h37m14s	+38°38.8'		Lac	24"	ottima / molto buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 60"×30", con bulge esteso e poco contrastato sul disco — 450x.
CGCG 514-72	gx	02h25m56s	+24°54.4'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso SSW — 450x.
CGCG 514-73	gx	22h37m28s	+35°31.6'		Peg	24"	ottima / molto buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina al bordo S — 450x.
CGCG 514-77	gx	22h38m22s	+35°57.5'		Lac	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 514-79	gx	22h38m30s	+34°14.5'		Peg	16"	ottima / ottimo	poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30", diffusa e con condensazione centrale quasi stellare visibile a 380x.
CGCG 514-81	gx	22h38m30s	+35°22.7'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×20"; disturbata da una stellina brillante al bordo W — 450x.
CGCG 514-84	gx	22h38m41s	+35°52.2'		Lac	24"	ottima / ottimo	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina a ridosso SW — 450x.
CGCG 514-87	gx	22h38m59s	+35°26.3'		Peg	16"	m. buona / buono	piccola e molto debole, estesa per non più di 20", visibile abbastanza facilmente solo in visione distolta a 380x.
CGCG 514-88	gx	22h39m22s	+35°57.9'		Lac	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e nucleo stellare evidente; c'è una doppia serrata a 1.5' SSW — 450x.
CGCG 514-89	gx	22h39m45s	+34°22.8'		Peg	16"	ottima / buono	debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 40"; si nota facilmente in visione distolta a ridosso verso W di una stellina — 270x.
CGCG 514-94	gx	22h41m23s	+34°37.3'		Peg	16"	ottima / ottimo	debole e diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a 30" SW — 380x.
CGCG 514-97	gx	22h41m47s	+36°06.3'		Lac	24"	ottima / molto buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E; disturbata da una stella brillante a 1' scarso SE — 450x.
CGCG 514-98	gx	22h41m49s	+37°43.1'		Lac	24"	ottima / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso E (fa parte di una terna di stelline abbastanza brillanti allineate da N a S); una stella brillante si trova un paio di primi a SE — 450x.
CGCG 514-100	gx	22h42m10s	+35°55.7'		Lac	24"	ottima / molto buono	debole, molto diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
CGCG 514-101	gx	22h42m56s	+36°06.6'		Lac	24"	ottima / molto buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×15"; c'è una stellina subito a S e una di luminosità simile a 1' verso E; una 3a più debole si trova a 1' ESE — 450x.
CGCG 515-9	gx	22h53m24s	+34°01.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina brillante a 1' scarso S e una doppia serrata poco più distante verso NW — 450x.
CGCG 515-10	gx	22h53m25s	+37°10.5'		Lac	16"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline: una brillante a ~ 1' NW e l'altra più debole a ~ 1' SW — 380x.
CGCG 515-11	gx	22h55m14s	+36°40.3'		Lac	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco allungata da E a W con tenue nucleo stellare visibile a 380x; c'è una stellina quasi a ridosso W; una bella doppia con componenti distanti una 10-ina di secondi e orientate in direzione E-W si trova a 3' verso E.
CGCG 515-22	gx	23h03m44s	+34°59.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	è una debolissima chiazza grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; salta fuori facilmente in visione distolta a 380x; c'è una stellina a 1' verso NW.
CGCG 515-23	gx	23h04m46s	+36°01.3'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 515-26	gx	23h07m20s	+36°21.8'		And	16"	ottima / ottimo	piccolo e debole oggetto relativamente compatto, facile da vedere a 380x, poco allungato da N a S, dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; ci sono 2 stelline appena percettibili: una a ridosso E, l'altra poco più il là verso SE.
CGCG 516-1	gx	23h13m16s	+36°27.7'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
CGCG 516-4	gx	23h27m19s	+37°13.3'		And	16"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di almeno 1' — 380x.
CGCG 517-1	gx	23h56m39s	+39°24.0'		And	28"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ci sono 3 stelline quasi allineate in direzione NE-SW a un paio di primi verso W — 495x.
CGCG 517-2	gx	23h49m59s	+37°50.5'		And	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma solo a tratti sembra orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina a 1' verso N. Forma una coppia ravvicinata con **KUG 2347+375B** situata a ridosso S — 495x.
CGCG 517-3	gx	23h50m03s	+36°51.0'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata tra 2 stelline orientate da E a W (quella a W è poco più evidente) — 450x.
CGCG 517-4	gx	23h50m18s	+36°40.2'		And	24"	m. buona / m. buono	baffo di luce molto tenue, esteso una 40-ina di secondi in direzione NE-SW che aggetta a NE di una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 517-6	gx	23h54m44s	+34°20.8'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un'evidente condensazione centrale; c'è una debole stellina a 1' scarso NW e una più evidente a 1.5' verso S — 495x.
CGCG 517-7	gx	23h57m34s	+37°01.8'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina al bordo SW e una appena percettibile a quello NE — 495x.
CGCG 517-10	gx	00h00m22s	+34°37.0'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline subito a E — 450x.
CGCG 517-16	gx	00h07m06s	+35°49.1'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi (ci sono alcune stelle molto brillanti nel campo oculare: meglio non scendere sotto i 450x).
CGCG 518-9	gx	00h01m58s	+36°38.9'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e a tratti condensata, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
CGCG 518-14	gx	00h07m54s	+39°43.1'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a SSE — 450x.
CGCG 518-17	gx	00h10m42s	+35°51.2'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso NW e una di luminosità simile a poco più di 1' SE — 450x.
CGCG 518-20	gx	00h16m34s	+36°11.9'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è un piccolo triangolo di stelline di luminosità diseguale a un paio di primi verso W — 450x.
CGCG 518-22	gx	00h17m12s	+35°53.0'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE e una coppia sbilanciata in luminosità a 1' SW (la componente a NW è abbastanza brillante); inoltre c'è la SAO 53783 di 8ª grandezza a 4' SE che è in realtà una doppia serrata — 495x.
CGCG 518-25	gx	00h21m34s	+38°05.6'		And	24"	buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; a 6' scarsi verso N c'è la SAO 53835 di magnitudo 6.5 — 450x.
CGCG 519-4	gx	00h21m55s	+39°33.9'		And	28"	m. buona / buono	piccola chiazza rotonda molto debole con Ø di una 30-ina di secondi, molto disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza a ridosso N dalla quale sembra aggettare (questa stella fa parte di un triangolo molto irregolare allungato da N a S con le 3 componenti quasi della stessa luminosità) — 495x.
CGCG 519-5	gx	00h23m01s	+38°12.1'		And	28"	m. buona / buono	debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE — 495x.
CGCG 519-9	gx	00h30m04s	+38°19.7'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a W; disturbata dalla HD 2611 di magnitudo 7.5 situata un paio di primi a W — 450x.
CGCG 519-14	gx	21h07m46s	+03°52.7'		Equ	24"	discreta / buono	piccola e relativamente compatta, con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 519-15	gx	00h39m30s	+36°20.8'		And	16"	m. buona / discreto	debole, piccola, poco diffusa, poco allungata da ENE a WSW (ossia come le 2 stelline a NE) con dimensioni 30"×20"; presenta un nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una stellina a ridosso verso W.
CGCG 519-16	gx	00h39m46s	+35°51.1'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale molto tenue; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline della stessa luminosità a SE — 450x.
CGCG 519-18	gx	00h41m54s	+37°06.1'		And	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (si trova al vertice meridionale di un piccolo triangolo formato con 2 stelline brillanti, 2' a WNW e 2' a ENE — 495x.
CGCG 519-22	gx	00h46m39s	+36°19.9'		And	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con UGC 480 situata 1.5' a W — debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 519-23	gx	00h47m53s	+36°25.2'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 520-7	gx	01h00m12s	+35°17.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 520-9	gx	01h02m55s	+37°40.4'		And	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso N e una stella brillante un paio di primi a S — 495x.
CGCG 520-11	gx	01h06m24s	+33°46.3'		And	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 520-15	gx	01h07m36s	+34°02.0'		And	28"	m. buona / mediocre	debole diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SE — 291x.
CGCG 520-16	gx	01h07m44s	+39°40.8'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
CGCG 520-19	gx	01h08m46s	+38°49.0'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e condensazione centrale molto tenue; c'è una coppia di stelline a 1' di distanza W e NW — 450x.
CGCG 520-24	gx	01h12m49s	+37°01.4'		And	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; praticamente allineata ed equidistante con due stelle brillanti di 9a grandezza situate subito a S e che disturbano l'osservazione; una stellina si trova quasi a ridosso N della gx — 450x.
CGCG 520-28	gx	01h13m39s	+38°10.3'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
CGCG 520-31	gx	01h14m25s	+34°03.6'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza circolare con Ø di una 40-ina di secondi diffusa e di luminosità uniforme; poco meglio definita scalando a 340x.
CGCG 520-32	gx	01h15m10s	+33°47.5'		And	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; molto disturbata dalla SAO 54550 di 8a grandezza situata un paio di primi a S — 450x.
CGCG 521-2	gx	01h20m28s	+38°09.4'		Psc	16"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 380x.
CGCG 521-3	gx	01h20m57s	+34°59.2'		And	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza rotonda di una 40-ina di secondi di Ø; c'è una stellina a poco più di 1' verso E — 270x.
CGCG 521-6	gx	01h21m17s	+36°41.2'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; c'è una coppia di deboli stelline subito a E — 450x.
CGCG 521-9	gx	01h22m31s	+39°12.0'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
CGCG 521-11	gx	01h22m49s	+33°58.1'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" con condensazione centrale appena percettibile; in visione distolta sembra a prima vista aggettare verso S da una stellina abbastanza brillante — 450x.
CGCG 521-12	gx	01h22m54s	+39°15.4'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 40", gradatamente più brillante verso l'interno e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina quasi a ridosso NW e una poco più brillante e distante a N — 450x.
CGCG 521-14	gx	01h23m11s	+39°04.5'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 521-15	gx	01h23m30s	+34°34.1'		And	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto relativamente compatto e condensato, rotondo con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SSW — 380x.
CGCG 521-17	gx	01h24m01s	+33°52.0'		And	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo e debolissimo lucore, forse rotondo con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; si riesce, comunque, a individuare senza difficoltà in visione distolta a 270x.
CGCG 521-33	gx	01h28m20s	+39°29.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30" — 450x.
CGCG 521-34	gx	01h28m24s	+37°53.6'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
CGCG 521-37	gx	01h29m12s	+39°33.3'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; si trova nello stesso campo di CGCG 521-33 e UGC 1059, già osservate in altra data col 24" — 495x.
CGCG 521-38	gx	01h29m40s	+33°49.9'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SW — 450x.
CGCG 521-43	gx	01h32m04s	+39°11.8'		And	28"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N — 495x.
CGCG 521-48	gx	01h34m58s	+33°55.4'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 521-53	gx	01h35m38s	+35°28.0'		Tri	24"	m. buona / discreto	è un lucore molto debole, diffuso, rotondo con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 521-57	gx	01h37m58s	+34°49.4'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW (si scorge a fatica a 340x) — 450x.
CGCG 521-58	gx	01h38m06s	+36°56.8'		And	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina visibile solo a momenti a ridosso E — 450x.
CGCG 521-63	gx	01h39m33s	+35°09.5'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×15"; poco meglio definita scalando a 340x.
CGCG 521-64	gx	01h39m57s	+34°24.5'		Tri	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, salta fuori in visione distolta a 270x, approssim. rotonda con Ø > 30".
CGCG 521-67	gx	01h41m07s	+38°38.8'		And	24"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina molto debole al bordo N; una coppia di stelline più evidenti si trova a 1' NW; infine c'è una stellina abbastanza brillante 1.5' a S — 450x.
CGCG 521-68	gx	01h41m15s	+34°48.7'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole chiazza circolare diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 521-71	gx	01h43m26s	+36°35.2'		And	24"	ottima / ottimo	molto debole e di aspetto un po' confuso, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; una condensazione molto tenue appare solo a momenti, ma sembra come decentrata verso N; è situata sul lato N-S di un piccolo triangolo quasi rettangolo di stelline brillanti — 450x.
CGCG 521-74	gx	01h44m38s	+34°39.7'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una debole stellina a 1' N e una più brillante a 1.5' verso E — 450x.
CGCG 521-75	gx	01h44m39s	+35°48.4'		And	24"	ottima / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; situata tra due stelline molto deboli a E e NW — 450x.
CGCG 521-77	gx	01h45m21s	+34°15.7'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; ci sono due stelline a ridosso W e S — 450x.
CGCG 522-2	gx	01h46m28s	+34°55.6'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' SW — 450x.
CGCG 522-3	gx	01h46m57s	+34°46.3'		Tri	24"	m. buona / discreto	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW (la più vicina alla gx di una piccola losanga irregolare formata da 4 componenti di cui due brillanti) — 450x.
CGCG 522-6	gx	01h47m44s	+35°01.3'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 522-8	gx	01h48m02s	+35°14.0'		Tri	28"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' SW — 495x.
CGCG 522-11	gx	01h49m18s	+34°58.1'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, estesa si e no 15"; appare facilmente in visione distolta a ridosso S di una debole stellina — 450x.
CGCG 522-13	gx	01h49m25s	+34°58.4'		Tri	24"	m. buona / discreto	piccola, relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø < 20" e un nucleo stellare evidente — 450x.
CGCG 522-19	gx	01h50m41s	+33°44.5'		Tri	24"	ottima / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso W — 450x.
CGCG 522-25	gx	01h52m03s	+36°07.8'		And	28"	m. buona / ottimo	debole e molto spampanata, di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina molto debole a ridosso SW e una più distante (e più evidente) a SE (situata, assieme a CGCG 522-30, nell'ammasso **AGC 262**)— 495x.
CGCG 522-26	gx	01h52m07s	+35°24.8'		Tri	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia sbilanciata subito a SE — 450x.
CGCG 522-28	gx	01h52m09s	+39°22.9'		And	24"	m. buona / buono	molto piccola e relativamente facile, poco diffusa e con Ø stellare evidente; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 522-29	gx	01h52m14s	+35°09.4'		Tri	28"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, non ne capisco la forma ma in visione distolta non sembra più estesa di 20". Forma una coppia ravvicinata con **MAC 0152+3509** situata a ridosso NE:un oggetto molto piccolo che appare elusivamente e solo a momenti; gli unici riferimenti per individuare la coppia sono 2 stelline orientate da N a S situate a 2.5' W e 3' NW — 495x.
CGCG 522-30	gx	01h52m17s	+36°02.2'		And	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una doppia molto sbilanciata a 1.5' SW — 495x.
CGCG 522-33	gx	01h52m32s	+36°06.9'		And	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte dell'ammasso **AGC 262**) — 495x.
CGCG 522-45	gx	01h53m24s	+36°00.7'		And	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; poco disturbata da una stellina brillante a ridosso NE (ha una compagna appena percettibile verso la gx); fa parte dell'ammasso **AGC 262** — 495x.
CGCG 522-48	gx	01h53m50s	+36°21.0'		And	16"	m. buona / m. buono	debole bolla circolare di 45" di Ø, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme che appare facilmente in visione distolta a 270x.
CGCG 522-51	gx	01h53m50s	+36°47.2'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline subito a NE e un'altra alla stessa distanza verso SE — 450x.
CGCG 522-53	gx	01h53m57s	+36°38.5'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20", diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
CGCG 522-57	gx	01h54m53s	+37°31.7'		And	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' verso S — 495x.
CGCG 522-60	gx	01h54m58s	+35°25.2'		Tri	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
CGCG 522-61	gx	01h54m59s	+36°52.1'		And	24"	m. buona / buono	diffusa, rotonda con Ø di 30"-35", diffusa e con tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
CGCG 522-62	gx	01h55m02s	+36°55.1'		And	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 522-65	gx	01h55m14s	+35°27.5'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
CGCG 522-67	gx	01h55m38s	+37°23.8'		And	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' SW — 495x.
CGCG 522-68	gx	01h55m40s	+37°02.3'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 522-72	gx	01h56m21s	+35°34.3'		Tri	24"	m. buona / discreto	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
CGCG 522-75	gx	01h56m21s	+37°30.6'		And	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E e una 1.5' a SE — 495x.
CGCG 522-77	gx	01h56m30s	+37°20.1'		And	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE — 495x.
CGCG 522-79	gx	01h56m40s	+35°35.5'		Tri	24"	m. buona / discreto	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con dimensioni di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 522-82	gx	01h56m48s	+35°59.6'		And	24"	m. buona / discreto	è un piccolo e debolissimo alone che aggetta a E di una coppia di stelline; quella più a N è molto brillante e tende a cancellarla; non ne capisco la forma, ma a 450x non sembra più estesa di 20".
CGCG 522-83	gx	01h56m58s	+35°56.7'		And	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
CGCG 522-85	gx	01h57m38s	+37°27.3'		And	24"	buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina molto debole a S e un'altra più brillante a SE — 450x.
CGCG 522-89	gx	01h58m00s	+36°55.0'		And	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso E (fa parte di un piccolo quadrato orientato da NE a SW) — 495x.
CGCG 522-91	gx	01h58m06s	+37°34.7'		And	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo quasi stellare evidente; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline brillanti, 1' a E e 2' a SSE (i due cateti sono orientati secondo le direzioni cardinali) — 450x.
CGCG 522-93	gx	01h58m35s	+38°43.1'		And	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una doppia sbilanciata a ridosso W e una stellina percettibile solo a momenti al margine N — 450x.
CGCG 522-95	gx	01h58m56s	+37°44.7'		And	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso S — 495x.
CGCG 522-98	gx	01h59m22s	+36°49.6'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 522-99	gx	01h59m59s	+36°35.5'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al margine SE — 495x.
CGCG 522-103	gx	02h00m59s	+37°54.7'		And	28"	ottima / ottimo	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20"; una stellina abbastanza brillante a ridosso SE ne disturba l'osservazione — 495x.
CGCG 522-104	gx	02h01m00s	+38°47.1'		And	24"	m. buona / buono	molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 522-108	gx	02h05m17s	+34°47.4'		Tri	24"	m. buona / buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x; è orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×15".
CGCG 522-109	gx	02h05m31s	+34°55.1'		Tri	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
CGCG 522-112	gx	02h07m01s	+34°53.0'		Tri	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso NE (fa parte di un piccolo triangolo equilatero); una stellina appena percettibile appare a tratti al bordo meridionale — 450x.
CGCG 522-115	gx	02h08m40s	+35°55.2'		Tri	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare evidente — 495x.
CGCG 522-119	gx	02h09m56s	+38°10.7'		And	28"	ottima / ottimo	molto debole e relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso N — 495x.
CGCG 522-121	gx	02h09m56s	+34°56.5'		Tri	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30"; si trova al vertice SW di un triangolo equilatero il cui lato opposto è formato da 4 stelline quasi perfettamente allineate in direzione NW-SE (anche tenendo fuori campo la β Tri di 3ª grandezza situata 6' a NW, questa causa dei fastidiosi riflessi nell'oculare) — 495x.
CGCG 522-122	gx	02h09m58s	+35°43.2'		Tri	28"	ottima / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina a 1.5' verso N — 495x.
CGCG 522-123	gx	02h09m59s	+37°00.5'		Tri	28"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 495x.
CGCG 522-132	gx	02h11m30s	+34°49.0'		Tri	28"	ottima / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' WSW e una più debole alla stessa distanza verso N; la gx è poi allineata e quasi equidistante con altre 2 stelline a WNW — 495x.
CGCG 522-138	gx	02h13m45s	+36°09.2'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o poco più; c'è una stellina subito a NE e una di luminosità uguale a 1' SW — 495x.
CGCG 522-139	gx	02h14m08s	+35°43.2'		Tri	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue nucleo stellare; c'è una coppia di deboli stelline a 1' verso E — 495x.
CGCG 522-141	gx	02h14m56s	+36°35.0'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S cono dimensioni 60"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
CGCG 523-3	gx	02h15m17s	+33°49.4'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale visibile solo a momenti — meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 523-6	gx	02h15m55s	+33°48.6'		Tri	24"	ottima / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; allineata con due stelline a ESE (quella più vicina alla galassia è molto debole); meglio contrastata scalando a 340x.
CGCG 523-7	gx	02h17m19s	+37°06.4'		Tri	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; è situata a ridosso W di un piccolo asterismo triangolare formato da 4 stelline — 450x.
CGCG 523-9	gx	02h17m49s	+35°48.4'		Tri	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 523-16	gx	02h18m41s	+37°07.9'		Tri	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare poco contrastato — 450x.
CGCG 523-19	gx	02h19m07s	+33°48.3'		Tri	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 495x.
CGCG 523-24	gx	02h20m21s	+37°51.3'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; situata tra due stelline: una abbastanza brillante a NE e l'altra appena percettibile dalla parte opposta — 450x.
CGCG 523-32	gx	02h22m22s	+39°07.1'		And	28"	m. buona / buono	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è un asterismo di 9 stelline a guisa di un piccolo ammasso aperto molto povero a S della gx; le due componenti a W sono le più brillanti — 495x.
CGCG 523-34	gx	02h23m56s	+37°13.7'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 495x.
CGCG 523-37	gx	02h25m27s	+37°10.4'		Tri	16"	buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø di 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW (situata 5' a SW di UGC 1882) — 380x.
CGCG 523-48	gx	02h29m01s	+38°05.9'		And	24"	ottima / buono	relativamente facile, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
CGCG 523-52	gx	02h30m27s	+38°21.8'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso NW — 495x.
CGCG 523-57	gx	02h33m04s	+35°30.5'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 495x.
CGCG 523-59	gx	02h33m22s	+39°40.6'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a ridosso NE; c'è un piccolo asterismo di 5 componenti subito a S; forma una coppia ravvicinata con **PGC 2153794** situata a ridosso SSE — 495x.
CGCG 523-62	gx	02h34m14s	+34°28.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole e spampanata, pare un alone asimmetrico che aggetta a NW di una stellina abbastanza brillante che ne confonde la forma; non è comunque più estesa di 30" — 495x.
CGCG 523-64	gx	02h34m37s	+34°52.2'		Tri	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E e una più debole subito a NW — 450x.
CGCG 523-65	gx	02h34m44s	+34°29.9'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 495x.
CGCG 523-88	gx	02h41m24s	+36°57.8'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", con bulge diffuso ed evidente — 495x.
CGCG 523-90	gx	02h42m03s	+35°42.5'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a ridosso W; allineata ed equidistante con 2 stelline sempre a W — 495x.
CGCG 523-91	gx	02h42m12s	+35°43.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a N; altre 2 stelline più brillanti si trovano rispettivamente 1' a NW e 1' a S (situata un paio di primi a NE della precedente) — 495x.
CGCG 524-13	gx	02h46m15s	+39°21.5'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 524-15	gx	02h46m35s	+35°02.4'		Per	24"	ottima / buono	diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
CGCG 524-19	gx	02h47m33s	+34°54.5'		Per	24"	ottima / buono	debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' W; tra questa e la gx ce n'è una appena percettibile — 450x.
CGCG 524-23	gx	02h49m09s	+36°27.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline a SE e una più brillante alla stessa distanza verso SW — 495x.
CGCG 524-26	gx	02h49m52s	+34°59.3'		Per	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso verso E — 495x.
CGCG 524-28	gx	02h51m38s	+37°50.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S e una più debole subito a SW — 495x.
CGCG 524-29	gx	02h52m01s	+38°18.1'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø simile alla precedente — 495x.
CGCG 524-35	gx	02h55m29s	+36°12.1'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso S — 495x.
CGCG 524-41	gx	03h00m06s	+39°29.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi ed evidente condensazione stellare; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 495x.
CGCG 524-54	gx	03h07m46s	+38°22.3'		Per	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto rotondo, di Ø max 30", diffuso e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' NNW — 380x.
CGCG 524-59	gx	03h10m31s	+35°05.0'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" (o poco più); allineata con 2 stelline a E — 450x.
CGCG 525-8	gx	03h14m15s	+35°32.4'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce di aspetto uniforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S e una più brillante subito a NE; meglio comunque non scalare gli ingrandimenti — 450x.
CGCG 525-22	gx	03h20m54s	+37°52.0'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; quasi allineata ed equidistante con 2 stelline a W: quella più occidentale è brillante — 450x.

CGCG 525-32	gx	13h26m15s	+38°03.9'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N (fa parte di un piccolo triangolo rettangolo col vertice più debole che punta a W; 3' a N c'è un piccolo gruppo serrato e irrisolto di 4 debolissime stelline che dà l'impressione di un oggetto diffuso — 450x.
CGCG 525-39	gx	03h31m08s	+39°37.8'		Per	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30"; disturbata dalla SAO 56504 di 9ª grandezza situata a poco più di 1' NW; meglio evidente scalando a 340x.
CGCG 525-43	gx	03h34m19s	+39°35.6'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; meglio evidente a a 450x.
CGCG 526-6	gx	03h42m28s	+38°58.1'		Per	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso N; una stellina brillante si trova a 1' SW — 450x.
CGCG 530-14	gx	22h10m31s	+40°53.6'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" o poco meno — 450x.
CGCG 530-21	gx	22h17m10s	+41°06.1'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata a ridosso N di una stellina — 450x.
CGCG 531-4	gx	22h23m27s	+41°10.9'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' E e una appena percettibile a ridosso W — 450x.
CGCG 531-12	gx	22h47m24s	+40°52.0'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; ci sono 2 stelline a ridosso rispettivamente a N e a SW (quest'ultima è poco più debole) — 450x.
CGCG 532-3	gx	22h58m29s	+40°25.8'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con 2 stelle brillanti 1' a N e 1.5' a NE — 450x.
CGCG 532-5	gx	23h03m23s	+41°24.9'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con bulge luminoso e contrastato — 450x.
CGCG 532-7	gx	23h05m08s	+41°57.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale evidente, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" (o poco più); c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S; poco disturbata dalla SAO 52661 di 9ª grandezza situata 2.5' a NW — 450x.
CGCG 532-18	gx	23h22m31s	+45°36.6'		And	24"	m. buona / ottimo	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a ridosso SE e una poco più evidente subito a E — 450x.
CGCG 533-4	gx	23h24m36s	+44°13.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; situata tra una stellina brillante a SW e una coppia sbilanciata a NE; altre 2 deboli stelline si trovano a 1' SW e 1' SE — 450x.
CGCG 533-15	gx	23h37m13s	+44°09.5'		And	24"	m. buona / ottimo	diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 533-16	gx	23h40m23s	+43°15.2'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 450x.
CGCG 533-18	gx	23h43m57s	+45°24.9'		And	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NE e una debole a ridosso S — 495x.
CGCG 534-1	gx	23h55m10s	+43°54.3'		And	28"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×30" e con un nucleo quasi stellare marcato; 3 stelle brillanti poste ad arco si trovano a NW della gx (quella centrale è la SAO 53476 di magnitudo 9.6) — 495x.
CGCG 534-3	gx	23h57m58s	+44°12.1'		And	28"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso E; occorre tuttavia tenere fuori campo la SAO 53531 di 9ª grandezza situata 3' a ENE e che fa coppia larga con un'altra stella brillante di 10ª alla stessa distanza verso NNE — 495x.
CGCG 534-7	gx	00h07m56s	+41°20.0'		And	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline a ridosso E e una stellina molto debole subito a S — 495x.
CGCG 534-12	gx	00h21m59s	+41°48.0'		And	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia con la successiva situata 1.5' a ESE — molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 450x.
CGCG 534-13	gx	00h22m07s	+41°47.6'		And	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia con la precedente situata 1.5' a WNW — debolissima chiazza molto stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x.
CGCG 535-6	gx	00h27m23s	+39°50.3'		And	24"	buona / discreto	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" (o poco più) — 450x.
CGCG 535-8	gx	00h28m41s	+44°03.1'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso N e una più evidente a 1' NW; una coppia serrata e sbilanciata si trova 1.5' verso W — 450x.
CGCG 535-12	gx	00h36m21s	+45°39.9'		And	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo marcatamente stellare (ma forse si tratta solo di una stellina sovrapposta) con due piccoli "sbuffi" appena percettibili a N e a S; c'è una stellina subito a W — 450x.
CGCG 535-20	gx	00h45m58s	+45°27.9'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 536-3	gx	00h52m40s	+39°53.2'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e con condensazione centrale visibile solo a momenti; ci sono 2 stelline appena percettibili situate 1' scarso a E e NE (quest'ultima appare prima) — 450x
CGCG 536-5	gx	00h53m38s	+41°06.0'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a 1' scarso NW (la quale fa parte di un asterismo irregolare di 6 stelline foggiato grosso modo a "M" o "W") — 450x.
CGCG 536-7	gx	00h54m36s	+42°16.5'		And	24"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale evidente; è situata quasi nel mezzo di 2 stelline orientate da N a S e distanti 1.5' — 450x.
CGCG 536-8	gx	00h55m11s	+42°13.3'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma molto disturbata dalla SAO 36765 di 8ª grandezza situata un paio di primi scarsi a N; appare diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale — 450x.
CGCG 536-14	gx	00h57m42s	+43°42.2'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 40"×30" e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 536-18	gx	01h06m53s	+44°17.0'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina a 1' SE e una più o meno alla stessa distanza verso SW; una percettibile solo a momenti si trova quasi a ridosso verso S, ma questa è in realtà la **PGC 2240527** — 450x.
CGCG 536-23	gx	01h12m59s	+40°01.2'		And	28"	m. buona / m. buono	diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline a NW (quella più vicina alla gx è la più brillante) — 495x.
CGCG 536-30	gx	01h21m01s	+40°26.8'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×10" — 450x.
CGCG 537-4	gx	01h28m21s	+40°13.5'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 495x.
CGCG 537-8	gx	01h30m10s	+45°37.0'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
CGCG 537-9	gx	01h30m46s	+40°40.3'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' W e una a 1' NE; una 3ª stellina appena percettibile si trova alla stessa distanza verso NW — 495x.
CGCG 537-12	gx	01h33m29s	+44°56.5'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta e a tratti condensata, allungata da NE a SW con dimensioni inferiori a 30"×15"; c'è una debole stellina subito a NE — 450x.
CGCG 537-19	gx	01h40m33s	+45°25.7'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S; 3 stelline serrate e orientate da N a S si trovano a 1' verso N — 495x.
CGCG 538-15	gx	02h05m46s	+45°11.8'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline subito a NW (le più meridionali di una "bisciola" di stelline orientate da NW a SE) — 450x.
CGCG 538-18	gx	02h06m46s	+45°35.8'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a SW — 450x.
CGCG 538-20	gx	02h06m51s	+45°40.6'		And	24"	m. buona / m. buono	di aspetto e dimensioni simili alla precedente, ma orientata da E a W; c'è una stellina subito a NW e una abbastanza brillante a 1' verso W — 450x.
CGCG 538-28	gx	02h09m35s	+44°29.6'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S — 495x.
CGCG 538-30	gx	02h10m39s	+41°31.1'		And	24"	m. buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
CGCG 538-31	gx	02h10m55s	+41°20.9'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 450x.
CGCG 538-34	gx	02h14m00s	+41°52.6'		And	28"	m. buona / buono	poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso N — 495x.
CGCG 538-41	gx	02h19m14s	+41°43.0'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N — 450x.
CGCG 538-43	gx	02h20m04s	+41°16.5'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
CGCG 538-46	gx	02h20m35s	+41°34.4'		And	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 40"; poco disturbata da una stella brillante situata 1.5' a W — 450x.
CGCG 538-50	gx	02h22m18s	+42°48.3'		And	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a W e una più debole a N — 495x.
CGCG 538-65	gx	02h24m53s	+43°19.5'		And	28"	ottima / buono	facile, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni poco superiori a 30"×20" e con bulge molto brillante; c'è una stellina quasi a ridosso verso W, mentre una coppia di stelline si trova subito a SE — 495x.
CGCG 539-6	gx	02h24m02s	+41°59.8'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo NW (fa parte di una coppia di stelline della stessa luminosità orientate da E a W); è altresì nota come **CGCG 538-60** — 450x.
CGCG 539-15	gx	02h25m23s	+41°43.6'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola e debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ridosso SW — 495x.
CGCG 539-19	gx	02h25m47s	+41°07.7'		And	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15", assai sfumata alle estremità del fuso, con piccolo bulge leggermente oblungo e brillante; situata tra una stellina subito a N e una debole quasi a ridosso dall'altra parte; c'è una coppia di stelline brillanti a SW — 495x.
CGCG 539-24	gx	02h26m46s	+41°50.1'		And	28"	m. buona / buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina brillante a 1' N e una della stessa luminosità poco più distante verso E — 495x.
CGCG 539-25	gx	02h26m53s	+41°41.4'		And	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, molto diffusa, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile al bordo N; un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a losanga irregolare si trova 1.5' a NW — 495x.
CGCG 539-26	gx	02h26m55s	+42°01.0'		And	28"	m. buona / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 40"; allineata ed equidistante con 2 stelline a N — 495x.
CGCG 539-29	gx	02h27m31s	+41°55.9'		And	28"	m. buona / buono	debole e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 50"×25" — 495x.
CGCG 539-31	gx	02h27m37s	+42°00.5'		And	28"	m. buona / buono	piccola, relativamente compatta e con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø < 30" (si trova praticamente nel bagliore della SAO 38041 di magnitudo 8.6 situata subito a E) — 495x.
CGCG 539-33	gx	02h30m27s	+41°26.7'		And	28"	m. buona / ottimo	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; allineata ed equidistante con due deboli stelline a N; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NW — 495x.
CGCG 539-37	gx	02h31m22s	+43°28.0'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a ridosso E — 450x.
CGCG 539-38	gx	02h31m27s	+40°14.9'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
CGCG 539-44	gx	02h33m40s	+41°20.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; una stellina appena percettibile appare a 1' verso W, ma questa è risultata essere la **2MASS 02333490+4120422** — 450x.
CGCG 539-45	gx	02h33m43s	+40°05.7'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo N e una brillante quasi a ridosso E — 495x.
CGCG 539-48	gx	02h34m04s	+42°40.5'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina subito a NW e una della stessa luminosità a 1' SW — 495x.
CGCG 539-50	gx	02h34m26s	+41°08.9'		And	28"	ottima / buono	relativamente facile, ma con basso gradiente di luce, diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 495x.
CGCG 539-55	gx	02h35m23s	+40°16.9'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 38144 di 9ª grandezza situata 1' a W; in visione distolta appare diffusa, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una coppia di stelline molto deboli a ridosso N — 495x.
CGCG 539-72	gx	02h39m35s	+40°46.6'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
CGCG 539-73	gx	02h39m36s	+42°00.9'		Per	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a W — 495x.
CGCG 539-77	gx	01h41m42s	+44°04.6'		Per	28"	ottima / buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina brillante subito a N e una molto debole quasi a ridosso W — 495x.
CGCG 539-79	gx	02h42m18s	+42°20.2'		Per	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; allineata ed equidistante con due deboli stelline a NE — 495x.
CGCG 539-90	gx	02h45m06s	+42°46.0'		Per	28"	ottima / buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina all'interno decentrata verso E e una stellina abbastanza brillante a ridosso S — 495x.
CGCG 539-91	gx	02h45m20s	+42°33.3'		Per	24"	m. buona / m. buono	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta, ma anche a 450x non se ne riesce a capire la forma; che si tratti di un piccolo baffo di luce lo si evince solo forzando a 570x; salta fuori più facilmente una stellina appena percettibile che si trova sul prolungamento della gx verso NW.
CGCG 539-92	gx	02h45m32s	+42°09.5'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale poco contrastata; forma una coppia ravvicinata con **UGC 2226** situata a ridosso E: quest'ultima è diffusa, poco allungata da N a S, dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale molto evidente — 450x.
CGCG 539-108	gx	02h49m48s	+41°27.8'		Per	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 539-118	gx	02h52m59s	+41°32.1'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15", molto sfumata alle due estremità del fuso e con piccolo bulge brillante; c'è una stellina quasi a ridosso W — 495x.
CGCG 539-121	gx	02h54m17s	+42°43.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (o poco più); situata tra una stellina brillante a E e una più debole a W; c'è una coppia abbastanza serrata di stelline a 1' verso S — 495x.
CGCG 539-126	gx	02h54m45s	+41°31.7'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, a prima vista rotonda con Ø, ma osservando con attenzione si nota che è poco orientata da E a W con dimensioni 50"×40" — 495x.
CGCG 540-2	gx	02h53m40s	+41°43.5'		Per	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a ridosso NW e una di luminosità simile poco più distante verso SE (altresì nota come **CGCG 539-120**) — 450x.
CGCG 540-10	gx	02h54m44s	+41°52.1'		Per	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' WNW (altresì nota come **CGCG 539-128**) — 450x.
CGCG 540-11	gx	02h54m48s	+41°18.3'		Per	28"	m. buona / ottimo	poco diffusa e condensata, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina brillante quasi a ridosso W — 495x.
CGCG 540-41	gx	03h06m52s	+42°31.4'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e un nucleo stellare evidente; ci sono 2 deboli stelline a ridosso N ed E; una terna di stelline brillanti orientate da NE a SW ne disturbano un poco l'osservazione — 495x.
CGCG 540-62	gx	03h14m09s	+42°44.9'		Per	24"	buona / buono	relativamente brillante e a tratti debolmente screziata, poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 450x.
CGCG 540-74	gx	03h16m27s	+41°37.6'		Per	16"	buona / ottimo	rotonda, con Ø max di 20"-25", poco più brillante all'interno — 270x.
CGCG 540-79	gx	03h17m04s	+41°38.0'		Per	28"	ottima / discreto	relativamente facile, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina al bordo meridionale — 388x.
CGCG 540-82	gx	03h17m43s	+42°23.1'		Per	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina subito a NE — 450x.
CGCG 540-85	gx	03h17m51s	+41°27.1'		Per	28"	ottima / discreto	diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 388x.
CGCG 540-87	gx	03h18m22s	+41°24.6'		Per	16"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø maggiore di 1' — 270x.
CGCG 540-89	gx	03h18m36s	+41°28.6'		Per	28"	ottima / discreto	allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con bulge diffuso poco contrastato; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a ridosso S; situata 1.5' a W della coppia NGC 1267-68 — 388x.
CGCG 540-97	gx	03h19m26s	+40°28.7'		Per	28"	ottima / discreto	debole, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina al bordo S e una molto debole a quello opposto — 388x.
CGCG 540-113	gx	03h21m21s	+41°27.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa alle estremità, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare ben evidente; c'è una stellina subito a S — 495x.
CGCG 540-115	gx	03h21m34s	+41°30.4'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni che in visione distolta arrivano a 60"×20" e con tenue bulge poco contrastato; c'è una doppia serrata a 1' S — 495x.
CGCG 540-120	gx	03h22m12s	+40°43.6'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 541-3	gx	03h25m26s	+40°32.2'		Per	24"	buona / buono	chiazza diffusa molto debole che aggetta a W di una stellina brillante per una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti c'è una debole stellina subito a W — 450x.
CGCG 541-10	gx	03h27m59s	+39°54.3'		Per	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
CGCG 541-11	gx	03h28m28s	+40°09.3'		Per	24"	buona / buono	molto piccola e debole, compatta, orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; appare a fatica tra il bagliore della SAO 56476 di 7ª grandezza situata ad appena 1' NNE — 450x.
CGCG 541-19	gx	03h31m01s	+43°14.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S, una doppia serrata e sbilanciata a 1' WSW e una appena percettibile quasi a ridosso verso E — 495x.
CGCG 541-24	gx	03h39m37s	+41°05.0'		Per	24"	ottima / m. buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, orientata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a 1' E e un'altra poco più vicina verso NW.
CGCG 547-4	gx	23h37m14s	+49°33.4'		And	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, allungata da ENE a WSW, di dimensioni 60"×30" e con piccolo bulge abbastanza contrastato — 450x.
CGCG 548-6	gx	23h47m53s	+49°28.5'		Cas	24"	ottima / ottimo	molto allungata da NW a SW con dimensioni 45"×15", poco diffusa e appena più brillante all'interno — 450x.
CGCG 548-18	gx	23h57m30s	+47°26.3'		And	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un piccolo oggetto diffuso molto debole esteso una decina di secondi e a tratti irregolare che appare abbastanza facilmente a ridosso verso N: da un controllo successivamente effettuato è risultato essere la **2MASS 23573106 +4726599** — 450x.
CGCG 548-24	gx	00h04m27s	+47°29.4'		And	24"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta e poco più brillante all'interno, allungata da WNW a ESE con dimensioni 50"×25" — 450x.
CGCG 548-25	gx	00h05m28s	+46°32.6'		And	24"	buona / discreto	piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
CGCG 549-3	gx	23h52m29s	+47°23.1'		And	28"	m. buona / buono	lama di luce molto debole orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso; c'è una stellina sovrapposta nel centro (a meno che non si tratti di un nucleo brillante — 495x.
CGCG 549-4	gx	23h52m47s	+46°48.2'		And	24"	buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; un terzetto serrato situato 1' a S (la componente centrale è visibile solo a momenti) dà a prima vista l'impressione di un piccolo oggetto diffuso — 450x.
CGCG 549-5	gx	23h54m01s	+47°29.3'		And	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, molto diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di 45" e nucleo stellare; c'è una coppia di stelle brillanti un paio di primi a NE e la SAO 53454 di 9ª grandezza a 3' verso W — 450x.
CGCG 549-6	gx	23h55m26s	+47°16.8'		And	24"	buona / discreto	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con piccolo nucleo abbastanza evidente; c'è una coppia di deboli stelline al bordo E e NE — 450x.
CGCG 549-14	gx	00h00m13s	+46°57.9'		And	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, quasi offuscata dalla SAO 53560 di 8a grandezza situata 1.5' a SSW; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
CGCG 549-17	gx	00h07m25s	+46°59.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
CGCG 549-19	gx	00h07m30s	+47°02.4'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N; forma una coppia ravvicinata con UGC 61 situato subito a W — 450x.
CGCG 549-22	gx	00h09m33s	+48°08.1'		And	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SW, di dimensioni 60"×30" e con tenue bulge poco contrastato; ci sono due stelline a ridosso: una a NE e una più debole a NW — 450x.
CGCG 549-23	gx	00h09m42s	+49°50.5'		And	24"	buona / discreto	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; a ridosso S si trova **PGC 2354919**, più debole, rotonda e con Ø simile; una debole stellina si trova subito a NE della coppia — 450x.
CGCG 549-24	gx	00h13m42s	+48°41.7'		And	24"	buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile al bordo E; una stellina si trova subito a N — 450x.
CGCG 549-38	gx	00h22m01s	+49°08.0'		Cas	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NNW a SSE con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina brillante a ridosso N (quella centrale di 3 stelline allineate da E a W) — 450x.
CGCG 549-40	gx	00h25m27s	+48°29.5'		Cas	24"	m. buona / ottimo	piccolo alone esteso sì e no una 20-ina di secondi ed estremamente tenue che circonda una stella; una stellina si trova quasi a ridosso SE — 450x.
CGCG 550-3	gx	00h26m51s	+49°07.0'		Cas	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
CGCG 550-5	gx	00h28m12s	+49°05.5'		Cas	24"	m. buona / ottimo	debole poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø simile alla precedente; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo S — 450x.
CGCG 550-12	gx	00h45m51s	+49°40.2'		Cas	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 10-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S e una appena percettibile a ridosso E — 450x.
CGCG 550-13	gx	00h46m15s	+49°29.0'		Cas	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 60"×30"; c'è una coppia serrata di stelline appena percettibili a ridosso S (quella a W è più evidente); un'altra stellina appena percettibile si trova subito a SE — 450x.
CGCG 550-20	gx	00h58m03s	+46°14.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a ridosso SE; una coppia di stelline appena percettibili si trova 1' verso S, mentre un'ultima visibile solo a momenti appare a SW — 450x.
CGCG 551-5	gx	01h03m26s	+46°57.6'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' scarso verso W — 450x.
CGCG 551-11	gx	01h16m04s	+46°43.8'		And	24"	m. buona / ottimo	forma un trio con la coppia UGC 813-816 situata subito con le quali è allineata in direzione ENE-WSW — poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" e poco più brillante all'interno — 450x.
CGCG 551-14	gx	01h18m11s	+49°58.5'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a SE e una appena percettibile al bordo NE — 450x.
CGCG 551-15	gx	01h20m31s	+50°08.7'		And	28"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa e con alto gradiente di luce, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con piccolo bulge quasi stellare — 495x.
CGCG 551-17	gx	01h26m38s	+48°23.6'		And	24"	m. buona / buono	piccola, debole, diffusa, poco più evidente all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; non sembra particolarmente disturbata dalla SAO 37215 di 9ª grandezza situata 1.5' a E; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso NNE e una più debole a 1' verso W; infine, una stellina appena percettibile appare subito a S (*presenza di chiarore lunare*) — 450x.
CGCG 551-21	gx	01h31m51s	+49°08.0'		And	28"	m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NNE — 495x.
CGCG 551-23	gx	01h32m35s	+49°24.3'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da ENE a WSW con dimensioni grosso modo di 60"×30" (o poco meno); c'è una doppia serrata, a mala pena separabile a 450x, a ridosso WSW; subito a E c'è invece una stellina abbastanza brillante; una luminosa si trova a 1' scarso verso N; la gx è meglio contrastata scalando a 340x (*presenza di chiarore lunare*)
CGCG 552-3	gx	01h39m09s	+48°17.0'		And	28"	m. buona / buono	molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×30" e con piccolo bulge contrastato; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 495x.
CGCG 552-5	gx	01h40m42s	+45°50.1'		And	24"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stella brillante a 1.5' NW — 450x.
CGCG 552-11	gx	01h55m21s	+46°33.5'		And	28"	m. buona / buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con piccolo bulge contrastato; c'è una stellina al bordo NE; una stellina abbastanza brillante si trova a 1' scarso SE e una più debole più o meno alla stessa distanza verso S — 495x.
CGCG 552-13	gx	01h55m37s	+47°33.6'		And	28"	m. buona / buono	molto piccola e molto debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W e una di luminosità simile subito a NW — 495x.
CGCG 552-17	gx	02h01m42s	+46°24.3'		And	28"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×10" e con piccolo bulge contrastato; c'è una stellina a 1' NW — 495x.
CGCG 552-18	gx	02h01m54s	+46°19.8'		And	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina a ridosso SW e una debole a 1' verso N — 495x.
CGCG 553-15	gx	02h29m10s	+48°25.9'		And	28"	m. buona / ottimo	diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccola condensazione centrale contrastata, c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W e una più debole subito a N — 495x.
CGCG 554-3	gx	02h47m26s	+47°48.1'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 45"; è praticamente compresa tra due stelline ai bordi NE e SW — 495x.
CGCG 554-7	gx	02h49m42s	+46°34.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; equidistante ma non allineata con due stelline abbastanza brillanti a NW — 495x.
CGCG 554-10	gx	02h50m47s	+46°45.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 495x.
MAC 0000+0147	gx	00h00m01s	+01°47.2'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 20"× 10" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0002+2725	gx	00h02m44s	+27°25.7'		Peg	16"	m. buona / buono	relativamente facile e abbastanza compatta, poco allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme; forma un piccolo triangolo quasi equilatero con 2 stelline, a SSE e SSW: la prima delle 2 è più brillante — 380x.
MAC 0004+3120	gx	00h04m20s	+31°20.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile subito a SE — 450x.
MAC 0004+3122	gx	00h01m15s	+31°22.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0005+1721	gx	00h05m50s	+17°21.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ma situata in un piccola plaga depleta a 450x, orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente.
MAC 0005+3222A	gx	00h07m47s	+32°22.3'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 495x.
MAC 0005+3259	gx	00h05m20s	+32°59.2'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; è situata quasi a ridosso NE della coppia PGC 368-9 — 580x.
MAC 0006+0306A	gx	00h06m56s	+03°06.6'		Psc	24"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 382-27**
MAC 0006+0306B	gx	00h06m57s	+03°06.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 382-27**
MAC 0006+2606	gx	00h06m09s	+26°06.7'		Peg	24"	buona / buono	molto piccola, appare facilmente in visione distolta a 450x, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10".
MAC 0007+0323	gx	00h07m20s	+03°23.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	è un debolissimo baffo orientato da NE a SW che tuttavia appare come tale solo a momenti in visione distolta; non sembra più estesa di 30"; una stellina appena percettibile percettibile appare ogni tanto a ridosso della gx, ma non riesco a capire dove — 450x.
MAC 0008+2659	gx	00h08m14s	+27°00.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è un baffo di luce molto debole, orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi; appare facilmente quando si osserva UGC 68, dalla quale dista 1' scarso a E — 450x.
MAC 0009+2817	gx	00h09m53s	+28°17.3'		Peg	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; situata tra una doppia a 1' NE e una stellina subito a SW — 495x.
MAC 0009+2819	gx	00h09m41s	+28°19.7'		Peg	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0009+3316	gx	00h09m48s	+33°16.5'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0010+2626	gx	00h10m49s	+26°06.0'		And	24"	buona / buono	debolissima, a 450x salta fuori in visione distolta a 1' scarso SE di una stellina; probabilmente rotonda con Ø non superiore a 20".
MAC 0010+2813	gx	00h10m05s	+28°13.7'		Peg	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 1' NE di UGC 92 — 495x.
MAC 0010+2815	gx	00h10m13s	+28°15.8'		Peg	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, piccola, poco diffusa e con evidente condensazione centrale, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0011+0143	gx	00h11m44s	+01°43.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a momenti a ridosso SE di CGCG 382-33, ma è poco più di una stellina debolmente sfuocata — 450x.
MAC 0012+0146	gx	00h12m11s	+01°46.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima, situata a N di un piccolo triangolo isoscele di stelline brillanti; appare in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma; non sembra comunque più estesa di 15" o 20" — 450x.
MAC 0012+1830	gx	00h12m54s	+18°30.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0013+3108	gx	00h13m12s	+31°08.7'		And	24"	m. buona / buono	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta a 450x, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" e di luminosità pressoché uniforme.
MAC 0014+0512	gx	00h14m46s	+05°12.9'		Psc	24"	ottima / ottimo	appare facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 142, situata 3' a NW, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0015+0230	gx	00h15m55s	+02°30.4'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta, ma è preferibile scalare a 340x; rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0016+1727	gx	00h16m13s	+17°27.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0017+0019	gx	00h17m54s	+00°19.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	appare come un tenuissimo nodulo situato all'estremità SW di CGCG 382-42; è meglio visibile spingendo a 580x, anche se così la gx principale si stempera troppo sul fondo cielo.
MAC 0017+2957	gx	00h17m46s	+29°57.7'		And	24"	ottima / buono	debolissima, appare in visione distolta a una 30-ina di secondi N di una stellina; a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 340x.
MAC 0018+3003	gx	00h18m12s	+30°03.3'		And	24"	ottima / buono	(fa parte del gruppo di NGC 68) — molto debole e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 0020+2152	gx	00h20m24s	+21°52.6'		And	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×10", poco diffusa e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante al bordo NW — 450x.
MAC 0020+2317	gx	00h20m07s	+23°17.3'		And	24"	buona / buono	è una galassietta elusiva, non più estesa di 15" o 20" che salta fuori a tratti in visione distolta a 450x.
MAC 0021+0158	gx	00h21m16s	+01°58.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare a momenti in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0022+0227	gx	00h22m59s	+02°27.6'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 0022+3016	gx	00h22m26s	+30°16.2'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, poco diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile subito a W — 450x.
MAC 0023+0221	gx	00h23m07s	+02°21.3'		Psc	24"	m. buona / buono	appare poco più che una debolissima stellina sfuocata; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, ma non è più estesa di 10"-15" — 450x.
MAC 0025+2016	gx	00h25m29s	+20°16.5'		Psc	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, non più estesa di una 30-ina di secondi; appare condensata a 270x (altresì denominata **LEDA 212516**).
MAC 0026+1334	gx	00h26m11s	+13°34.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	debolissima macchiolina rotonda di 25"30" max di Ø che salta fuori in visione distolta a 380x; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' NW (altresì denominata **LEDA 212517**).
MAC 0027+3944	gx	00h27m35s	+39°44.0'		And	24"	buona / discreto	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ridosso NW; una stella brillante (SAO 53908) si trova a 1.5' verso W — 450x.
MAC 0027+3951	gx	00h27m31s	+39°51.2'		And	24"	buona / discreto	appare solo come una debolissima stellina leggermente sfuocata — 450x.
MAC 0027+3952	gx	00h26m27s	+39°52.2'		And	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0028+0319	gx	00h28m14s	+03°19.2'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0028+3316	gx	00h28m10s	+33°16.1'		And	28"	m. buona / discreto	piccolo e debolissimo baffo di luce esteso sì e no 20" e orientato da N a S; poco disturbata da una coppia sbilanciata di stelline abbastanza brillanti situata 1' a SW — 450x.
MAC 0029+0010	gx	00h29m45s	+00°10.2'		Cet	24"	discreta / buono	v. **MCG+0-2-60**
MAC 0029+0018	gx	00h29m24s	+00°19.0'		Cet	24"	discreta / buono	piccolo e debolissimo baffo di luminosità uniforme, orientato da E a W ed esteso sì e no una 20-ina di secondi; in visione distolta sembra aggettare a S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 0029+1041	gx	00h29m56s	+10°42.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni che in visione distolta appaiono di 60"×15" — 450x.
MAC 0029+1142	gx	00h29m39s	+11°43.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso N — 450x.
MAC 0029+2335	gx	00h29m04s	+23°35.8'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' SE — 450x.
MAC 0031+1033	gx	00h31m36s	+10°33.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	assieme a MAC 0031+1033A forma una coppia di deboli oggetti rotondi, diffusi e di luminosità uniforme, distanti poco più di 1' in direzione E-W; il 1º è poco più grande, con Ø di una 20-ina di secondi, mentre il Ø del 2º non è superiore ai 15".
MAC 0031+1033A	gx	00h31m41s	+10°34.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	v. **MAC 0031+1033**
MAC 0032+0238	gx	00h32m05s	+02°38.5'		Cet	24"	m. buona / buono	relativamente facile e compatta, appena più brillante all'interno, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 0033+0240	gx	00h33m12s	+02°40.7'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola, diffusa e molto debole, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N — 450x.
MAC 0033+1959	gx	00h33m47s	+19°59.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina subito a N (fa parte di un asterismo molto allungato foggiato a "Y") — 450x.
MAC 0034+0543	gx	00h34m57s	+05°43.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0035+0542	gx	00h35m11s	+05°42.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola, diffusa, con condensazione centrale puntiforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0036+0841	gx	00h36m07s	+08°41.7'		Psc	16"	ottima / ottimo	è debolissima, ma relativamente compatta, perché quando salta fuori in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza luminosa a ~ 1' verso W — 380x.
MAC 0037+0330	gx	00h37m43s	+03°30.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0037+2936A	gx	00h37m53s	+29°36.5'		And	28"	m. buona / discreto	v. **MAC 0037+2937A**
MAC 0037+2936B	gx	00h37m59s	+29°36.3'		And	28"	m. buona / discreto	v. **MAC 0037+2937A**
MAC 0037+2937A	gx	00h37m05s	+29°37.6'		And	28"	m. buona / discreto	fa parte, assieme alle due precedenti, alle due seguenti e a **MAC 0038+2936A**, di un gruppo di piccole e debolissime galassiette estese una 15-ina di secondi e facenti parte dell'ammasso **AGC 71** — le prime 3 sono grosso modo allineate in direzione E-W: la più evidente è **MAC 0037+2937B** (**MAC 0037+2937A** è situata al margine occidentale dell'ammasso e si trova tra 2 deboli stelline distanti un paio di primi in direzione N-S). Le 3 successive sono pure allineate in direzione E-W e si trovano verso il centro dell'ammasso; quella che appare prima è **MAC 0038+2936A**, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" o poco più — 495x.
MAC 0037+2937B	gx	00h37m12s	+29°37.8'		And	28"	m. buona / discreto	v. **MAC 0037+2937A**
MAC 0037+2937C	gx	00h37m16s	+29°37.9'		And	28"	m. buona / discreto	v. **MAC 0037+2937A**
MAC 0038+0012	gx	00h38m15s	+00°12.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta a 1' N di una stellina brillante, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.

MAC 0038+0429	gx	00h38m49s	+04°29.1'		Cet	24"	buona / buono	piccola, debole e condensata, rotonda con Ø < 20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline a S e SW — 450x.
MAC 0038+0646	gx	00h38m50s	+06°46.7'		Psc	24"	buona / buono	debolissima, ma appare facilmente in visione distolta a 450x, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10".
MAC 0038+2935C	gx	00h38m41s	+29°35.2'		And	28"	m. buona / discreto	(il Megastar riporta questa gx subito a W dell'ammasso **AGC 71**) — è una debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 495x.
MAC 0038+2936A	gx	00h38m03s	+29°36.4'		And	28"	m. buona / discreto	v. **MAC 0037+2937A**
MAC 0038+3059	gx	00h38m10s	+30°59.8'		And	24"	m. buona / m. buono	molto deboli, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0038+3132	gx	00h38m44s	+31°42.7'		And	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, appare elusivamente a 450x allineata con 2 stelline a SSW — 450x.
MAC 0039+0146	gx	00h39m29s	+01°46.3'		Cet	24"	discreta / buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0039+0639	gx	00h39m36s	+06°39.9'		Psc	24"	buona / buono	molto debole e diffusa (sembra la CGCG 409-52 in miniatura: quest'ultima, è situata 12.5' a NW), di luminosità uniforme e con Ø di 20" — 450x.
MAC 0039+0641A	gx	00h39m16s	+06°41.3'		Psc	24"	buona / buono	assieme a MAC 0039+0642B forma una coppia di debolissime galassiette, distanti tra loro 1.5' in direzione N-S, entrambe rotonde e che saltano fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; la 1ª è più evidente e poco più estesa, con Ø di una 20-ina di secondi; l'altra è di luminosità uniforme e di Ø inferiore.
MAC 0039+0642B	gx	00h39m16s	+06°42.8'		Psc	24"	buona / buono	v. **MAC 0039+0641A**
MAC 0039+2113A	gx	00h39m29s	+21°13.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a ridosso SW; è disturbata dalla SAO 74175 di 6ª grandezza situata 2' scarsi a NW (fa parte dell'ammasso AGC 75) — 450x.
MAC 0039+2114	gx	00h39m42s	+21°14.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta a ridosso NW di una debole stellina; non ne intuisco la forma, ma dovrebbe essere estesa meno di 30"; occorre tuttavia tenere fuori campo la SAO 74175 di 6ª grandezza situata 4.5' a WNW (fa parte dell'ammasso AGC 75) — 450x.
MAC 0040+0650B	gx	00h40m46s	+06°50.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto probabilmente rotondo, di una 20-ina di secondi di Ø; salta fuori in visione distolta, ma bisogna spingere a 380x.
MAC 0040+0700A	gx	00h40m21s	+07°00.8'		Psc	16"	ottima / ottimo	assieme a MAC 0040+0700B forma una coppia di oggetti rotondi, molto piccoli, di 10"-15" di Ø, separati da meno di 30" in direzione E-W e di aspetto simile — 380x.
MAC 0040+0700B	gx	00h40m22s	+07°00.9'		Psc	16"	ottima / ottimo	v. **MAC 0040+0700A**
MAC 0040+2932	gx	00h40m27s	+29°32.4'		And	28"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da N a S e con dimensioni 20"×15"; situata 1' a S di UGC 428 — 495x.
MAC 0041+0819	gx	00h41m23s	+08°19.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	assieme a MAC 0041+0821 forma una coppia di distanti ~ 2.5' in direzione NNW-SSE e di aspetto simile, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi, diffuse e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0041+0821	gx	00h41m18s	+08°21.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	v. **MAC 0041+0819**
MAC 0045+2949	gx	00h45m22s	+29°49.7'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con un bulge appena percettibile — 450x.
MAC 0046+2946	gx	00h46m01s	+29°46.6'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta allineata ed equidistante con una doppia e una stellina brillante situate a WNW; in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0048+0114B	gx	00h48m38s	+01°14.8'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0048+0125B	gx	00h48m40s	+01°25.8'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, situata a ridosso di una stellina brillante rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0048+2803	gx	00h48m45s	+28°03.4'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 0048+3153	gx	00h48m16s	+31°53.3'		And	24"	m. buona / buono	è una debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x in quanto relativamente compatta.
MAC 0048+3157	gx	00h48m53s	+31°57.5'		And	24"	m. buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20" o poco più e un tenue nucleo stellare; la galassietta appare facilmente in visione diretta a 1' E di NGC 262 — 450x.
MAC 0049+2427	gx	00h49m50s	+24°27.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	chiazza circolare con Ø < 30"molto debole e stemperata sul fondo cielo, situata tra 2 deboli stelline, a W e a NE; la visione è un poco disturbata da una stella che brilla a 1' SE — 450x.
MAC 0049+2436	gx	00h49m35s	+24°36.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0049+3210	gx	00h49m41s	+32°10.2'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; ci sono due deboli stelline a E e SW — 450x.
MAC 0049+3213	gx	00h49m37s	+32°14.0'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, ma poco più evidente di MAC 0049+3210 (osservata subito prima), piccola, rotonda con Ø < 20" e a tratti condensata — 450x.
MAC 0050+2434	gx	00h50m20s	+24°34.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, nondimeno appare facilmente in visione distolta a 450x a 1.5' S di una stellina; non più estesa di 10"-12".
MAC 0051+4045	gx	00h51m49s	+40°45.8'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile a una 40-ina di secondi E e una poco più evidente alla stessa distanza verso SW — 450x.
MAC 0052+0226	gx	00h52m06s	+02°26.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 531, dalla quale dista 1' a NNE; è molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MAC 0053+0055	gx	00h53m45s	+00°55.6'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0054+2916	gx	00h54m51s	+29°16.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0054+3127	gx	00h54m35s	+31°27.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" — 450x.molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0054+3128	gx	00h54m13s	+31°28.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 450x.
MAC 0056+0002	gx	00h56m26s	+00°02.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, più che altro disturbata da una stellina abbastanza brillante situata un paio di primi a S, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una stellina appena percettibile appare solo a momenti a poco più di 1' NW — 450x.
MAC 0056+0007	gx	00h56m20s	−00°07.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; appare facilmente in visione distolta quando si cerca di osservare la MAC successiva — 450x.
MAC 0056+0007A	gx	00h56m39s	+00°07.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	appare a tratti ed elusivamente in visione distolta a 1' N di una coppia di stelline; non dovrebbe essere comunque più estesa di 10"-15" — 450x.
MAC 0056+0008	gx	00h56m11s	−00°08.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare a momenti in visione distolta a ridosso SE di una stellina (ce n'è un'altra poco più brillante a 1.5' verso W) — 450x.
MAC 0056+0040	gx	00h56m11s	+00°40.9'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0057+0006A	gx	00h57m24s	+00°06.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole e diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 20"×10" (o poco più) e con nucleo stellare debole, ma evidente: di fatto appare solo questo in visione diretta — 450x.
MAC 0057+0800	gx	00h57m42s	+08°00.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x.
MAC 0057+0803	gx	00h57m50s	+08°03.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva MAC 0057+0800 — 450x.
MAC 0058+0755	gx	00h58m03s	+07°55.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0058+2647	gx	00h58m10s	+26°48.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti subito a N, ma quest'ultima è risultata essere la PGC 1788978 — 450x.
MAC 0058+2653	gx	00h58m28s	+26°53.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; poco disturbata dalla SAO 74409 di 9ª grandezza situata 3' a SE — 450x.
MAC 0059+2708	gx	00h59m00s	+27°08.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina brillante subito a SW — 450x.
MAC 0102+0644	gx	01h02m58s	+06°44.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta come un baffo orientata da E a W ed estese non più di 20" — 450x.
MAC 0102+2659	gx	01h02m12s	+26°59.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da N a S, di dimensioni 45"×15" e con condensazione centrale diffusa appena percettibile — 450x.
MAC 0103+0836A	gx	01h03m32s	+08°36.7'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, si vede facilmente in visione distolta a 450x, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; molto disturbata dalla SAO 109634 di 8ª ad appena 2' WSW.
MAC 0105+3156	gx	01h05m47s	+31°56.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0105+3223	gx	01h05m51s	+32°23.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
MAC 0106+0121A	gx	01h06m03s	+01°21.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima, piccola, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0106+0121B	gx	01h06m10s	+01°21.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	poco più evidente di MAC 0106+0121A dalla quale dista un paio di primi a E; è diffusa, di luminosità uniforme e di Ø analogo — 450x.
MAC 0107+0054	gx	01h07m01s	+00°54.6'		Cet	24"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0107+0203	gx	01h07m20s	+02°03.3'		Cet	24"	buona / discreto	appare elusivamente quasi a ridosso NW di una stella brillante di 10ª grandezza che offusca un po' i dintorni; essendo molto piccola, non più di 10" o 12", ho provato a spingere a 580x ed effettivamente appare con maggiore facilità (anche se il seeing non è perfetto).
MAC 0107+0222	gx	01h07m54s	+02°23.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0107+2500	gx	01h07m04s	+25°00.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	tenuissimo baffo esteso una 20-ina di secondi che in visione distolta aggetta a NE di una stellina brillante — 450x.
MAC 0107+3358	gx	01h07m02s	+33°58.9'		And	28"	m. buona / mediocre	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione N-S; c'è una stellina brillante a ridosso SE — 291x.
MAC 0108+0204	gx	01h08m23s	+02°04.4'		Cet	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 147** — piccola e molto debole di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0108+0209B	gx	01h08m35s	+02°09.7'		Cet	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 147** — elusiva e molto piccola, non più estesa di 15", appare in visione distolta a ridosso SE di una stellina.
MAC 0108+0209C	gx	01h08m51s	+02°09.2'		Cet	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 147** — debolissima, di aspetto e dimensioni simili alla successiva, ma senza condensazione.
MAC 0108+0211B	gx	01h08m43s	+02°11.5'		Cet	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 147** — piccolo oggetto rotondo, molto debole e condensato, rotondo con Ø non superiore a 15" — 450x.
MAC 0108+0212B	gx	01h08m11s	+02°12.1'		Cet	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 147** — molto debole, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø < 20".
MAC 0109+0211A	gx	01h09m19s	+02°11.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso S di UGC 720, ma anche a 450x è poco più di una stellina sfuocata.
MAC 0109+1419B	gx	01h09m26s	+14°09.9'		Psc	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima galassietta diffusa ed estesa per non più di una 20-ina di secondi; — 380x.
MAC 0109+1955	gx	01h09m23s	+19°55.8'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 0110+1723	gx	01h10m08s	+17°23.7'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0110+1724	gx	01h10m48s	+17°24.9'		Psc	24"	buona / m. buono	è una lama di luce molto debole, orientata da NE a SW, estesa 45" e con nucleo stellare (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 450x.
MAC 0110+1736	gx	01h10m55s	+17°36.8'		Psc	24"	buona / m. buono	molto piccola e debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme; appare senza difficoltà in visione distolta subito a S di una stellina brillante; a tratti sembra allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0110+1745B	gx	01h10m40s	+17°45.6'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa, disturbata da una stellina brillante situata a 1' verso NE; grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0110+1801	gx	01h10m20s	+19°49.5'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø poco inferiore a PGC 4209, dalla quale dista 1.5' a NNE — 450x.
MAC 0110+1949	gx	01h11m32s	−14°02.5'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in parte disturbata dalle stelle brillanti presenti nel campo, fra cui la SAO 92286 di magnitudo 7.8 a 3.5' WNW; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0110+3254	gx	01h10m00s	+32°54.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW; salta fuori solo a momenti in visione distolta quando si osserva CGCG 501-112 situata quasi a ridosso NE — 450x.
MAC 0111+1716	gx	01h11m59s	+17°16.2'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MAC 0111+1718	gx	01h11m53s	+17°18.1'		Psc	24"	buona / m. buono	piccola, debolissima e di luminosità uniforme, non più estesa di 15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 0111+1726B	gx	01h11m26s	+17°26.9'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, ma poco più evidente di MAC 0110+1724 , poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" e leggermente condensata; un piccolo arco formato da 4 stelline di luminosità differente a W si trova a NW della gx — 450x.
MAC 0111+1727A	gx	01h11m31s	+17°27.5'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, a tratti condensata forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0111+1756	gx	01h11m28s	+17°56.8'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0111+2312	gx	01h11m30s	+23°12.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente quasi a ridosso S di CGCG 480-48; è molto piccola, estesa sì e no 15"; a tratti sembra quasi d'intravedere un nucleo puntiforme — 450x.
MAC 0111+2755	gx	01h11m20s	+27°55.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 501-124 con la quale sembra fondersi a prima vista; si separa con difficoltà dalla compagna anche a 450x; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' N della coppia.
MAC 0112+1241	gx	01h12m38s	+12°41.5'		Psc	24"	buona / m. buono	poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø > 20" — 450x.
MAC 0112+1718	gx	01h12m13s	+17°19.6'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0112+1721	gx	01h12m19s	+17°21.3'		Psc	24"	buona / m. buono	anche questa è molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 0112+1722	gx	01h12m05s	+17°22.3'		Psc	24"	buona / m. buono	piccolo oggetto rotondo molto debole, diffuso e di luminosità uniforme, salta fuori in visione distolta a meno di 1' SW di una stellina — 450x.
MAC 0112+3158	gx	01h12m32s	+31°58.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0113+0026	gx	01h13m15s	+00°26.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; situata all'interno di un triangolo isoscele di stelline brillanti — 450x.
MAC 0113+0227	gx	01h13m45s	+02°28.0'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e leggermente condensata — 450x.
MAC 0114+0031B	gx	01h14m47s	+00°31.5'		Cet	24"	buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, solo a tratti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15".
MAC 0114+0042	gx	01h13m47s	+00°42.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	è una debolissima chiazza di aspetto un po' irregolare, forse rotonda con Ø ed estesa < 30"; appare solo a momenti, ma è meglio scalare a 340x.
MAC 0114+0047	gx	01h14m31s	+00°47.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0114+0141	gx	01h14m28s	+01°41.7'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0114+1240	gx	01h14m06s	+12°40.9'		Psc	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta, ma non è più estesa di 10" o 15" — 450x.
MAC 0115+0147	gx	01h15m15s	+01°47.1'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
MAC 0117+1442	gx	01h17m29s	+14°42.1'		Psc	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 827 situata a ridosso WNW; è di aspetto simile e addirittura più evidente della compagna, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale visibile a momenti — 450x.
MAC 0118+0210	gx	01h18m38s	+02°10.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza forse circolare, molto diffusa e con Ø < 30"; a tratti appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se è il nucleo o una stellina a ridosso — 450x.
MAC 0119+0218	gx	01h19m36s	+02°19.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, relativamente compatta, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0119+0535A	gx	01h19m15s	+05°35.7'		Psc	24"	m. buona / buono	oggetto molto debole, esteso max 15" o 20"; salta fuori facilmente in visione distolta a 1' N di una stellina — 400x.
MAC 0119+1948	gx	01h19m39s	+19°48.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo esteso una 30-ina di secondi in direzione N-S; appare in visione distolta ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0120+0121	gx	01h20m42s	+01°21.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a meno di 1' verso N — 450x.
MAC 0120+0712	gx	01h20m53s	+07°12.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0121+0525	gx	01h21m34s	+05°25.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, e piccola diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0121+0631	gx	01h21m34s	+06°31.1'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta in una piccola zona depleta, forse rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0121+1140	gx	01h21m07s	+11°40.9'		Psc	24"	buona / buono	debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di 20" e di luminosità uniforme.
MAC 0121+1927	gx	01h21m21s	+19°27.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile e compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con piccola condensazione centrale evidente — 450x.
MAC 0121+1944	gx	01h21m54s	+19°44.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0121+4950	gx	01h21m28s	+49°50.6'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0122+0528	gx	01h22m02s	+05°28.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 0122+0636	gx	01h22m25s	+06°36.6'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0122+0903B	gx	01h22m38s	+09°03.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	è molto debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø ~ 20" — 450x.
MAC 0122+0907	gx	01h22m58s	+09°07.2'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, sembra a prima vista aggettare verso NE da una stellina; è probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0122+1927	gx	01h22m39s	+19°27.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	mappare solo come una stellina debolmente sfuocata, condensata ed estesa non più di 10" — 450x.
MAC 0122+1929	gx	01h22m21s	+19°29.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima lama di luminosità uniforme che in visione distolta appare orientata da N a S per una 40-ina di secondi — 450x.
MAC 0122+1931	gx	01h22m33s	+19°31.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
MAC 0122+1937	gx	01h22m11s	+19°37.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; è un poco disturbata dalla stellina brillante che si trova subito a NNE.
MAC 0122+1937A	gx	01h22m41s	+19°37.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza di forma indistinta ed estesa una 30-ina di secondi; è purtroppo disturbata da una coppia di stelle brillanti situate 1.5' a N.
MAC 0122+2217	gx	01h22m53s	+22°17.0'		Psc	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente in visione distolta a 450x a ~ 1' ENE di una stellina; non dovrebbe essere più estesa di una decina di secondi.
MAC 0122+3324	gx	01h22m53s	+33°24.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; meglio comunque non scendere sotto i 450x.
MAC 0122+4947	gx	01h22m22s	+49°47.8'		And	28"	m. buona / m. buono	è una "righetta" abbastanza evidente, nonostante la vicinanza di una stellina brillante situata subito a NE, orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi — 495x.
MAC 0122+4957	gx	01h22m24s	+49°57.1'		And	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 495x.
MAC 0122+5001	gx	01h22m58s	+50°02.0'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0123+0139B	gx	01h23m39s	+01°40.0'		Cet	24"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-15", situata verso il centro dell'ammasso **AGC 189** — 450x.
MAC 0123+0146	gx	01h23m24s	+01°46.1'		Cet	24"	ottima / buono	piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella brillante a poco più di 1' SSE; fa parte dell'ammasso AGC 189 — 450x.
MAC 0123+0747	gx	01h23m51s	+07°47.0'		Psc	24"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con CGCG 411-45 situata a ridosso di NW — anche a prima vista si notano facilmente 2 nuclei quasi stellari ravvicinati (quello della CGCG è poco più marcato); le 2 gx si riescono comunque a separare a fatica a 450x; in visione distolta la CGCG appare a momenti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15", mentre la MAC sembra più rotonda, con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0123+0908	gx	01h23m09s	+09°08.7'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di max 15" e a tratti condensata — 450x.
MAC 0123+1504	gx	01h23m34s	+15°04.9'		Psc	24"	ottima / buono	molto debole, piccola e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0123+1951	gx	01h23m26s	+49°51.1'		And	28"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi che aggetta a N di una stellina — 495x.
MAC 0123+3311	gx	01h23m07s	+33°11.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 45" S (situata 2.5' a NE di NGC 494) — 450x.
MAC 0123+3333	gx	01h23m15s	+33°33.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissimo baffo di luce orientato da NW a SE ed esteso una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0124+0145	gx	01h24m23s	+01°45.0'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola, diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 0124+0200	gx	01h24m33s	+02°00.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0124+0203	gx	01h24m54s	+02°03.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0124+1641	gx	01h24m14s	+16°41.6'		Psc	24"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo molto piccolo, con Ø di 10"-15" che appare in visione distolta a 450x.
MAC 0124+2836	gx	01h24m11s	+28°36.3'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0124+3324	gx	01h24m36s	+33°24.4'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima e diffusa, a tratti condensata, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0125+0142	gx	01h25m05s	+01°42.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	facile, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
MAC 0125+0145A	gx	01h25m48s	+01°45.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0125+0145B	gx	01h25m52s	+01°45.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	salta fuori abbastanza facilmente a ~ 1' ENE di MAC 0125+0145A, poco più debole, rotonda e con Ø inferiore — 450x.
MAC 0125+0158	gx	01h25m11s	+01°58.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" (un po' difficoltosa da studiare in quanto il campo nei dintorni è depleto) — 450x.
MAC 0125+0802	gx	01h25m44s	+08°02.4'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW (ossia come le 2 stelline brillanti a N) con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
MAC 0125+0803	gx	01h25m34s	+08°03.4'		Psc	24"	buona / m. buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta alternando gli occhi; non ne capisco la forma; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a WSW — 450x.
MAC 0126+0209	gx	01h26m08s	+02°09.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 0126+1908	gx	01h26m09s	+19°08.4'		Psc	24"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza praticamente immersa nell'alone della ρ Piscium di 5ª grandezza situata un paio di primi a NNE; in visione distolta appare poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 0127+0210	gx	01h27m14s	+02°10.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi e orientato da N a S; appare in visione distolta a 450x anche se la visione è un poco disturbata dalla SAO 109897 di 9ª grandezza situata 3' a SSW.
MAC 0127+1914	gx	01h27m28s	+19°14.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0128+1109	gx	01h28m27s	+11°09.8'		Psc	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, ancorché situata a 1' SE di una stellina brillante che interferisce; poco diffusa, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina al bordo orientale che sembra a prima vista una protuberanza della gx — 450x.
MAC 0128+4813	gx	01h28m39s	+48°13.1'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MAC 0129+1104	gx	01h29m25s	+11°04.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' scarso verso SE — 450x.
MAC 0130+0225	gx	01h30m16s	+02°25.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 1' NW di CGCG 385-164; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MAC 0130+0225A	gx	01h30m03s	+02°25.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, ma non difficile da vedere in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a NW.
MAC 0132+0353	gx	01h32m15s	+03°53.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta quando si osserva CGCG 412-1 situata poco più di 1' a SE; solo a momenti appare orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0135+0330	gx	01h35m42s	+03°30.1'		Psc	24"	ottima / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una decina di secondi; c'è una stellina a 1' NW e un'altra appena percettibile più o meno alla stessa distanza verso S — 450x.
MAC 0136+0334	gx	01h36m17s	+03°34.6'		Psc	24"	ottima / buono	v. **MAC 0136+0335**
MAC 0136+0335	gx	01h36m18s	+03°35.5'		Psc	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con la precedente situata a 1' scarso verso S; sono due oggetti piccoli, molto deboli, ma relativamente compatti e di luminosità uniforme; questa è rotonda con Ø di 10"-15", mentre MAC 0136+0334 appare a momenti come un tenuissimo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0136+1439	gx	01h36m19s	+14°39.4'		Psc	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0137+0102	gx	01h37m53s	+01°02.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, estesa ~ 1' e orientata da NE a SW; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 1163 dalla quale dista 3' scarsi a N — 450x.
MAC 0138+1502	gx	01h38m52s	+15°03.0'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un oggetto situato un paio di primi scarsi NW di CGCG 437-7; appare in visione distolta con 20" di Ø; c'è una stellina doppia 1' verso N; a 380x il campo è depleto.
MAC 0139+4347	gx	01h39m57s	+43°47.0'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MAC 0143+3029	gx	01h43m17s	+30°29.5'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 495x.
MAC 0143+3031	gx	01h43m37s	+30°31.1'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 20"×10"; c'è una stellina a 1' scarso WNW e una appena percettibile subito a S — 495x.
MAC 0143+3120	gx	01h43m54s	+31°26.5'		Tri	28"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce orientato da NE a SW ed esteso una 30-ina di secondi; la visione è comunque un po' disturbata da una brillante stella di 10a grandezza situata 2.5' a ENE — 495x.
MAC 0143+3121	st?	01h43m56s	+31°21.8'		Tri	24"	m. buona / m. buono	nella posizione indicata si vede soltanto una stella abbastanza brillante; non si nota traccia di alone circonfuso, salvo un effetto diffusione molto tenue che pare appena più marcato forzando a 580x.
MAC 0144+3118	gx	01h44m40s	+31°18.2'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0144+3815	gx	01h44m27s	+38°15.8'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, in visione distolta appare allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con un tenue bulge diffuso visibile solo a momenti — 450x.
MAC 0145+2848	gx	01h45m27s	+28°48.5'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, forse rotonda con Ø < 20".
MAC 0146+2757A	gx	01h46m44s	+27°57.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	è un debole ovale diffuso e appena più brillante all'interno, orientato da N a S con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline a 1' W — 450x.
MAC 0146+3501	gx	01h46m43s	+35°01.1'		Tri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare come un oggetto diffuso molto piccolo, forse rotondo con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 0147+1111	gx	01h47m28s	+11°11.3'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 0147+1129	gx	01h47m02s	+11°29.5'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, sembra una stellina sfuocata, facilmente visibile a 450x, rotonda con Ø di una decina di secondi.
MAC 0147+3146	gx	01h47m08s	+31°46.5'		Tri	28"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, diffusa rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E (quest'ultima ha una compagna appena percettibile a SW) — 495x.
MAC 0148+1323	gx	01h48m28s	+13°23.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 20-ina di secondi e che solo a momenti appare leggermente condensato; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso WSW — 450x.
MAC 0149+0539	gx	01h48m03s	+05°39.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0149+3231	gx	01h49m32s	+32°31.5'		Tri	24"	ottima / mediocre	debolissima, molto piccola e a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a E — 450x.
MAC 0149+3237	gx	01h49m43s	+32°37.5'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole e diffusa, situata a ridosso E di una stellina abbastanza brillante; in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0150+0014	gx	01h50m57s	+00°14.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	presenta un nucleo stellare evidente e un piccolo alone visibile tuttavia solo in visione distolta e non più esteso di 15" (è sorta la Luna poco superiore all'ultimo quarto) — 450x.
MAC 0150+1655	gx	01h50m07s	+16°55.7'		Psc	24"	buona / m. buono	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; c'è una stellina appena percettibile al bordo N — 450x.
MAC 0150+3228A	gx	01h50m24s	+32°29.0'		Tri	24"	ottima / mediocre	è un debolissimo filo di luce esteso una 30-ina di secondi esteso una 30-ina di secondi in direzione NW-SE; appare solo a momenti in visione distolta; c'è una stellina appena percettibile subito a SW (situata 6' a SW di UGC 1306) — 450x.
MAC 0150+3228B	gx	01h50m58s	+32°28.1'		Tri	24"	ottima / mediocre	debolissima, molto piccola e diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata 3' a SE di UGC 1306) — 450x.
MAC 0150+3229A	gx	01h50m23s	+32°30.0'		Tri	24"	ottima / mediocre	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata 6' scarsi a SW di UGC 1306) — 450x.
MAC 0150+3230B	gx	01h50m49s	+32°30.6'		Tri	24"	ottima / mediocre	debolissima e molto piccola, solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" (situata un paio di primi a SSE di UGC 1306) — 450x.
MAC 0150+3233A	gx	01h50m19s	+32°33.9'		Tri	24"	ottima / mediocre	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 6' a WNW di UGC 1306) — 450x.
MAC 0150+3233B	gx	01h50m37s	+32°33.9'		Tri	24"	ottima / mediocre	è un debolissimo baffo di luce esteso < 30" e orientato da N a S che sembra dipartirsi a S di una doppia stretta e sbilanciata (situata a poco più di 2' NW di UGC 1306) — 450x.
MAC 0150+3233C	gx	01h50m50s	+32°34.0'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata a poco più di 1' NE di UGC 1306) — 450x.
MAC 0150+3234	gx	01h50m29s	+32°34.5'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (situata un paio di primi a NW di UGC 1306) — 450x.
MAC 0150+3257B	gx	01h50m02s	+32°57.2'		Tri	16"	ottima / ottimo	oggetto molto piccolo e condensato, di una 20-ina di secondi di Ø con una stellina a 30" a E — 380x.
MAC 0150+3309C	gx	01h50m20s	+33°09.3'		Tri	16"	ottima / ottimo	debolissima, osservabile solo in visione distolta; mi è abbastanza facilmente quando ho fissato la stellina doppia situata un paio di primi a S — 380x.
MAC 0150+3399	gx	01h51m00s	+33°39.8'		Tri	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce che appare a tratti in visione distolta, meglio a 450x; è orientata da E a W ed estesa < 40"; c'è una coppia di stelline appena percettibili a ridosso NW.
MAC 0151+3225	gx	01h51m04s	+32°25.5'		Tri	24"	ottima / mediocre	piccolo e debolissimo lucore esteso non più di 20" e "incastrato" tra due stelline: una brillante a ridosso SW e una debole dalla parte opposta (situata 8' a SSE di UGC 1306) — 450x.
MAC 0151+3602	gx	01h51m22s	+36°02.3'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 495x.
MAC 0151+4806	gx	01h51m36s	+48°06.5'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
MAC 0152+0125	gx	01h52m20s	+01°25.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0152+3509	gx	01h52m15s	+35°09.8'		Tri	28"	ottima / ottimo	oggetto molto piccolo che appare elusivamente e solo a momenti a ridosso NE della già debolissima **CGCG 522-29** (gli unici riferimenti per individuare la coppia sono 2 stelline orientate da N a S e situate a 2.5' W e 3' NW) — 495x.
MAC 0152+3603	gx	01h52m34s	+36°03.1'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0152+3608A	gx	01h52m40s	+36°08.4'		Cet	16"	m. buona / m. buono	è una minuscola ed elusiva macchiolina (poco più di una stellina sfuocata) che solo a momenti in visione distolta sembra staccarsi a SW di NGC 705; non è comunque più estesa di una 10-ina di secondi v. gruppo di NGC 703) — 380x.
MAC 0152+3608A	gx	01h52m40s	+36°08.4'		And	28"	m. buona / ottimo	appare solo a momenti in visione distolta come una stellina appena percettibile situata a ridosso S di **NGC 705** — 495x.
MAC 0153+0824	gx	01h53m34s	+08°24.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo baffo di luce situato a ridosso W di una stellina abbastanza brillante; in visione distolta appare orientata da N a S ed estesa una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0153+1656	gx	01h53m54s	+16°56.7'		Ari	24"	m. buona / m. buono	piccolissimo oggetto rotondo molto debole e uniforme con Ø di 10"-15".
MAC 0154+0558	gx	01h54m49s	+05°58.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 340x, in quanto situata in una piccola zona depleta.
MAC 0155+1453	gx	01h55m53s	+14°53.9'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa, approssim. circolare con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0155+2403	gx	01h55m12s	+24°03.9'		Ari	24"	ottima / molto buono	debole e diffusa, disturbata da una stellina brillante a ridosso E, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 0155+3614	gx	01h55m05s	+36°14.2'		And	24"	m. buona / buono	debolissima, appare in visione distolta allineata ed equidistante con due stelline a E; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0156+1454	gx	01h56m13s	+14°54.4'		Ari	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno; in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina a 1' W — 450x.
MAC 0156+3213	gx	01h56m38s	+32°13.8'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti condensata, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata presso il margine W dell'ammasso **AGC 278**) — 495x.
MAC 0157+1310	gx	01h57m04s	+13°10.0'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0157+1310A	gx	01h57m06s	+13°10.7'		Ari	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti tra una stellina a 1.5' NE e la MAC 0157+1310; è molto piccola e di aspetto quasi stellare — 450x.
MAC 0157+1310B	gx	01h57m20s	+13°10.2'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissima, piccola e condensata, rotonda con Ø di max 15"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
MAC 0157+3215	gx	01h57m24s	+32°15.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata 1.5' a E della coppia PGC 7346-49 (situata all'interno dell'ammasso **AGC 278**) — 495x.
MAC 0158+3203	gx	01h58m35s	+32°03.9'		Tri	28"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 30" in direzione N-S che pare a prima vista aggettare a S di una debole stellina — 495x.
MAC 0159+0240	gx	01h59m31s	+02°40.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
MAC 0200+1853	gx	02h00m19s	+18°54.0'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
MAC 0200+3752	gx	02h00m31s	+37°52.8'		And	28"	ottima / ottimo	tenuissimo baffo esteso una 30-ina di secondi in direzione N-S situato in mezzo a 2 stelline orientate nello stesso modo (quella più a N è abbastanza brillante) — 495x.
MAC 0201+1827	gx	02h01m56s	+18°27.8'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30"; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 450x.
MAC 0201+1939	gx	02h01m29s	+19°39.4'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e condensata, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.

MAC 0201+4015	gx	02h01m57s	+46°15.0'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata a ridosso E di un piccolo trapezio regolare di stelline abbastanza brillanti — 495x.
MAC 0202+1818A	gx	02h02m37s	+18°18.8'		Ari	24"	m. buona / m. buono	assieme MAC 0202+1818B forma una coppia di piccoli oggetti estesi 10"-15" che si separano facilmente a 178x; la 2a è appena più evidente.
MAC 0202+1818B	gx	02h02m36s	+18°18.3'		Ari	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 0202+1818A**
MAC 0203+0740	gx	02h03m12s	+07°41.0'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0203+0741	gx	02h03m26s	+07°41.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0203+1821	gx	02h03m49s	+18°21.5'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a SE — 450x.
MAC 0203+1938	gx	02h03m09s	+19°38.8'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo e di luminosità uniforme, esteso non più di 10" o 15"; appare facilmente in visione distolta a 450x subito a N di una stellina brillante.
MAC 0203+1941	gx	02h03m09s	+19°41.9'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, poco diffusa e a tratti condensata, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0204+1810	gx	02h04m20s	+18°10.5'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto piccola e debole, allungata da N a S con dimensioni grosso modo 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
MAC 0205+2135	gx	02h05m17s	+21°35.9'		Ari	24"	ottima / molto buono	appare elusivamente in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma; non sembra comunque più estesa di 15" o 20"; c'è una stellina appena percettibile subito a SW — 450x.
MAC 0206+1450	gx	02h06m02s	+14°50.5'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissima, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso SE — 450x.
MAC 0206+1524	gx	02h06m50s	+15°24.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a SE — 450x.
MAC 0207+0155	gx	02h07m22s	+01°55.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale visibile solo a momenti; c'è una stellina brillante a 1' NE — 450x.
MAC 0207+0906	gx	02h07m15s	+09°06.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, appare facilmente in visione distolta a 450x a ~ 1' SW di una debole stellina; rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0207+0907	gx	02h07m30s	+09°07.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata 1.5' a SE — 450x.
MAC 0207+1528	gx	02h07m01s	+15°28.7'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0207+2822	gx	02h07m44s	+28°22.3'		Tri	28"	m. buona / buono	molto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensata; c'è una coppia serrata di deboli stelline a ridosso S — 495x.
MAC 0208+0106	gx	02h08m18s	+01°06.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15", per vederla non bisogna però scendere sotto i 450x.
MAC 0208+0246	gx	02h08m56s	+02°46.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di una decina di secondi — 450x.
MAC 0208+2813	gx	02h08m23s	+28°13.6'		Tri	28"	m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, appare solo a momenti in visione distolta a ridosso SW di una debole stellina; non sembra più estesa di 20" — 495x.
MAC 0208+2820	gx	02h08m08s	+28°20.6'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (più evidente di UGC 1625 dalla quale dista 1' verso NE) — 495x.
MAC 0208+2820A	gx	02h08m00s	+28°20.3'		Tri	28"	m. buona / buono	appare elusivamente e solo a tratti subito a NW di UGC 1625, ma non sembra più estesa di 12"-15" — 495x.
MAC 0208+3037	gx	02h08m29s	+30°37.3'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 495x.
MAC 0208+3047	gx	02h08m42s	+30°47.8'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da N a S, anche questa con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a ridosso S e una poco più distante a NNW — 495x.
MAC 0208+4128	gx	02h08m22s	+41°28.1'		And	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di debolissimo nodulo di aspetto quasi stellare che si "stacca" solo a momenti a S di **UGC 1626** — 450x.
MAC 0209+0639A	gx	02h09m50s	+06°39.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti quasi a ridosso N — 450x.
MAC 0209+1950	gx	02h09m42s	+19°50.0'		Ari	24"	ottima / molto buono	debolissima e molto piccola, estesa sì e no una decina di secondi; appare in visione distolta quasi a ridosso N di una stellina — 450x.
MAC 0209+3043	gx	02h09m34s	+30°43.2'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi orientato da NE a SW — 495x.
MAC 0209+3044	gx	02h09m25s	+30°44.6'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, situata al margine N di NGC 826 che pur "allungandone" a tratti l'aspetto non si riesce a separare dalla principale — 495x.
MAC 0209+4428	gx	02h09m23s	+44°28.2'		And	28"	m. buona / m. buono	debolissimo chiarore diffuso e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline di luminosità simile subito a N — 495x.
MAC 0209+4433	gx	02h09m26s	+44°33.9'		And	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NW e una debole poco più distante subito a N — 495x.
MAC 0209+4447	gx	02h09m07s	+44°47.3'		And	28"	m. buona / buono	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso NW e una abbastanza brillante a 1' scarso verso S — 495x.
MAC 0210+3158	gx	02h10m14s	+31°59.0'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0210+3501	gx	02h10m41s	+35°01.2'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø < 20", poco disturbata da una stellina abbastanza brillante a ridosso verso S — 495x.
MAC 0211+1553	gx	02h11m19s	+15°53.0'		Ari	16"	ottima / ottimo	è un piccolo oggetto esteso 15"20", abbastanza facile a 380x con una stellina a ridosso verso N
MAC 0211+1914	gx	02h11m04s	+19°14.3'		Ari	24"	ottima / molto buono	debolissima, molto piccola e diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0211+2549	gx	02h11m23s	+25°49.8'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo molto piccolo e di luminosità uniforme, non più esteso di 15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a una 30-ina di secondi NNE di MCG+4-6-9 — 450x.
MAC 0211+2556	gx	02h11m27s	+25°56.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	è una piccola galassietta difficilissima da vedere, in quanto immersa nei bagliori della 16 Ari di 6ª grandezza (dalla quale dista ~ 3' verso E); appare più facilmente a 570x, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e molto diffusa.
MAC 0211+3105	gx	02h11m55s	+31°05.2'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma non sembra più estesa di 10"-12".
MAC 0212+0510	gx	02h13m56s	+05°10.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta a poco più di 1' E di una stellina, a tratti allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0212+3057	gx	02h12m17s	+30°57.8'		Tri	24"	ottima / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a ridosso NE di una stellina, a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MAC 0212+3132	gx	02h12m00s	+31°32.6'		Tri	24"	ottima / mediocre	piccola e disturbata, appare in visione distolta a 450x a ~ 1.5' SW di una stella di 10ª grandezza, forse rotonda con Ø di una 20.
MAC 0212+3916	gx	02h12m39s	+39°16.8'		And	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente a 450x subito a NE di una debole stellina, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0213+0118	gx	02h13m29s	+01°18.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0213+1648	gx	02h13m32s	+16°48.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	baffo di luce molto debole orientato da NW a SE ed esteso una 30-ina di secondi; è situato a ridosso S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 0214+0629	gx	02h14m14s	+36°29.8'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0214+3047	gx	02h14m50s	+30°47.5'		Tri	24"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0214+3051A	gx	02h14m47s	+30°51.6'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 450x.
MAC 0214+3051B	gx	02h14m44s	+30°51.6'		Tri	24"	m. buona / discreto	debolissimo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi e orientato da NE a SW; appare in visione distolta a ridosso W della precedente — 450x.
MAC 0214+3539	gx	02h14m10s	+35°28.8'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione NW-SE; allineata e quasi equidistante con 2 stelline a SE — 495x.
MAC 0215+3050	gx	02h15m00s	+30°50.1'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto piccola e situata a ridosso E di una stellina abbastanza brillante che disturba un po' l'osservazione, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0215+3105	gx	02h15m14s	+31°05.6'		Tri	28"	m. buona / buono	piccolo e debolissimo baffo di luce orientato da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina a 1' SSW — 495x.
MAC 0215+3106	gx	02h15m11s	+31°06.1'		Tri	28"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 495x.
MAC 0215+3129	gx	02h15m00s	+31°30.2'		Tri	24"	ottima / mediocre	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di 10"-15"; situata subito a SW di una coppia di stelline orientate da N a S — 450x.
MAC 0216+0511	gx	02h16m15s	+05°11.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza circolare con Ø < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
MAC 0216+2522	gx	02h16m17s	+25°22.2'		Cet	24"	m. buona / buono	indubbiamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale quasi stellare — 450x.
MAC 0217+1312	gx	02h17m41s	+13°12.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissima, appare a momenti in visione distolta a 450x; non dovrebbe essere più estesa di 20".
MAC 0219+3348	gx	02h19m57s	+33°49.0'		Tri	28"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1.5' SE — 495x.
MAC 0219+3433	gx	02h19m24s	+34°33.3'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0220+3831	gx	02h20m38s	+38°31.2'		And	24"	ottima / buono	piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x subito a NE di una stellina molto debole; situata 1' a E di UGC 1798.
MAC 0222+1202	gx	02h22m17s	+12°02.5'		Ari	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, osservabile abbastanza facilmente in visione distolta a 340x, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale visibile a tratti; è allineata con 2 stelline a NNW.
MAC 0222+4205	gx	02h22m59s	+42°05.6'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; un piccolo triangolo isoscele di 3 stelline si trova a ridosso verso S — 450x.
MAC 0223+1138	gx	02h23m13s	+11°38.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0223+1657	gx	02h23m32s	+16°57.5'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto molto piccolo, con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione distolta a 450x quando si osserva la MCG+3-7-7 situata a poco più di 1' Ne.
MAC 0223+2633	gx	02h23m34s	+26°33.5'		Ari	16"	ottima / discreto	presenta più o meno le stesse dimensioni di NGC 900, situata 3' scarsi più a S — 270x.
MAC 0223+2847	gx	02h23m12s	+28°47.9'		Tri	24"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
MAC 0223+2855	gx	02h23m29s	+28°55.3'		Tri	24"	ottima / ottimo	anche questa è debolissima, salta fuori in visione distolta, orientata da E a W, di dimensioni ~ 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MAC 0223+3705	gx	02h23m52s	+37°05.5'		Tri	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso S — 495x.
MAC 0223+3708	gx	02h23m07s	+37°08.6'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, a tratti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; ci sono 3 stelline abbastanza brillanti e allineate da ENE a WSW subito a N — 495x.
MAC 0223+4259	gx	02h23m13s	+42°59.3'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, è situata a ridosso SE del nucleo di **UGC 1841**; scalando a 340x, appare in visione distolta come immersa nell'alone della gx principale.
MAC 0223+4300	gx	02h23m20s	+43°00.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso SSE — 450x.
MAC 0223+4313	gx	02h23m11s	+43°13.2'		And	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE e una più brillante a 1' scarso verso SE — 495x.
MAC 0224+0312	gx	02h24m07s	+03°12.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, solo a momenti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 30"×20", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0224+1703	gx	02h24m14s	+17°03.9'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20".
MAC 0224+2714	gx	02h24m24s	+27°14.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma stranamente meglio definita a 450x, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a < 1' verso E
MAC 0224+2849	gx	02h24m19s	+28°49.6'		Tri	24"	ottima / ottimo	sempre debolissima e di aspetto confuso, a tratti appare orientata da E a W, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
MAC 0224+3655	gx	02h24m08s	+36°55.2'		Tri	28"	m. buona / ottimo	è un debole baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione NW-SE; c'è una debole stellina al bordo NE e una più evidente quasi a ridosso NW — 495x.
MAC 0224+4136	gx	02h24m02s	+41°36.7'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è un piccolo gruppo serrato di 4 stelline, di cui 2 brillanti orientate da N a S, quasi a ridosso SE della gx — 495x.
MAC 0224+4137	gx	02h24m10s	+41°37.8'		And	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente — 495x.
MAC 0224+4140	gx	02h24m25s	+41°40.3'		And	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NE — 495x.
MAC 0224+4234	gx	02h24m32s	+42°34.7'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×10"; sembra come "incastrata" tra due stelline abbastanza brillanti orientate nello stesso modo — 450x.
MAC 0225+2020	gx	02h25m31s	+20°20.9'		Ari	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; occorre tuttavia tenere fuori campo la SAO 75359 di 8a grandezza situata 5.5' a SE.
MAC 0225+2449	gx	02h25m48s	+24°49.3'		Ari	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, solo a tratti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0225+2451	gx	02h25m14s	+24°52.0'		Ari	24"	m. buona / buono	anche questa è debolissima, ma a 450x in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; situata in mezzo a 2 stelle brillanti che disturbano in parte la visione.
MAC 0225+2716	gx	02h25m59s	+27°16.2'		Ari	24"	m. buona / buono	debolissima, ma in visione distolta appare abbastanza facilmente orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina a poco più di 1' NW — 450x.
MAC 0225+2727	gx	02h25m21s	+27°27.1'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta a SW di 3 stelline molto deboli e allineate in direzione E-W; forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x
MAC 0225+4134	gx	02h25m11s	+41°34.3'		And	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con due deboli stelline a S — 495x.
MAC 0225+4145	gx	02h25m24s	+41°45.6'		And	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta subito a S della successiva, estesa non più di 15" — 495x.
MAC 0225+4146	gx	02h25m24s	+41°46.4'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; è allineata con 3 stelline a N: la più debole si trova al bordo della gx — 495x.
MAC 0225+4150	gx	02h25m01s	+41°50.2'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto disturbata da una stella brillante a poco più di 1' verso S; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MAC 0225+4246	gx	02h25m10s	+42°46.5'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a ridosso W — 495x.
MAC 0225+4256	gx	02h25m53s	+42°56.5'		And	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, orientata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare evidente; situata a ridosso S di un piccolo asterismo triangolare formato con 4 stelline abbastanza brillanti — 495x.
MAC 0226+2258	gx	02h26m32s	+22°28.5'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole e a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a E (la più settentrionale di 3 molto deboli allineate da NW a SE) — 450x.
MAC 0226+2448	gx	02h26m42s	+24°48.0'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è allineata ed equidistante con una coppia di stelline a N — 450x.
MAC 0226+2456	gx	02h26m15s	+24°56.1'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata; c'è una stellina appena percettibile subito a E — 450x.
MAC 0226+2600	gx	02h26m57s	+26°00.9'		Ari	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, ancorché immersa nei bagliori della HD 15141 di 6ª grandezza situata ad appena 1.5' a N; è allungata da E a W, con dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0226+2608	gx	02h26m45s	+26°08.2'		Ari	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0226+2717	gx	02h26m09s	+27°17.6'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a S — 450x.
MAC 0226+2830	gx	02h26m04s	+28°30.1'		Tri	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso sì e no 30" e orientato da E a W; salta fuori a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0226+2901	gx	02h26m03s	+29°01.0'		Tri	28"	m. buona / buono	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione NNW-SSE; appare solo a tratti in visione distolta (situata 1' NNW di CGCG 504+78) — 495x.
MAC 0226+3201	gx	02h26m45s	+32°01.7'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una debole stellina a 1' scarso verso E — 450x.
MAC 0226+4143	gx	02h26m05s	+41°43.5'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" o poco più; situata tra 2 stelline quasi a ridosso: una a W e l'altra appena percettibile a NE — 495x.
MAC 0226+4245	gx	02h26m35s	+42°45.5'		And	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da E a W ed estesa 45" con bulge diffuso molto tenue — 495x.
MAC 0227+2420	gx	02h27m49s	+24°20.1'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0227+2445	gx	02h27m07s	+24°45.1'		Ari	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø < 20".
MAC 0227+2802	gx	02h27m39s	+28°02.4'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MAC 0227+2804	gx	02h27m40s	+28°04.8'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 495x.
MAC 0227+2805A	gx	02h27m33s	+28°06.1'		Tri	28"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata quasi a ridosso verso E — sono due debolissime galassiette molto piccole estese sì e no una decina di secondi; c'è una debole stellina subito a SW — 495x.
MAC 0227+2805B	gx	02h27m34s	+28°06.0'		Tri	28"	m. buona / buono	v. MAC 0227+2805A
MAC 0227+2813A	gx	02h27m34s	+28°13.8'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola e molto debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia di deboli stelline a 1' verso W — 495x.
MAC 0227+2813B	gx	02h27m50s	+28°14.0'		Tri	28"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, appare solo come una stellina appena sfuocata, ma è disturbata da una stella brillante di 9ª grandezza situata 1' a SE — 495x.
MAC 0227+2814A	gx	02h27m52s	+28°14.6'		Tri	28"	m. buona / buono	piccolo e debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 20-ina di secondi; c'è una stella brillante di 9ª grandezza situata a 1' verso S — 495x.
MAC 0227+2814B	gx	02h27m56s	+28°14.3'		Tri	28"	m. buona / buono	appare soltanto come una stellina appena percettibile situata 1' NNE di una stella brillante di 9ª grandezza — 495x.
MAC 0227+4141	gx	02h27m12s	+41°41.3'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo: la componente più a E è la più debole.
MAC 0228+2523	gx	02h28m43s	+25°23.9'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, relativamente compatta e condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
MAC 0228+2809B	gx	02h28m55s	+28°09.1'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola e poco più evidente di UGC 1958 situata subito a E, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina appena percettibile subito a S — 495x.
MAC 0228+2812	gx	02h28m10s	+28°12.7'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N (poco disturbata da una stella brillante di magnitudo 8. 5 situata un paio di primi a N — 495x.
MAC 0228+2814	gx	02h28m22s	+28°14.8'		Tri	28"	m. buona / buono	molto piccola e molto debole, ma più che altro disturbata da una stella brillante di magnitudo 8. 5 situata un paio di primi a W, a tratti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MAC 0228+3118	gx	02h28m14s	+31°19.0'		Tri	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo baffo di luce che si "stacca" a momenti subito a N del bulge di NGC 931 — 450x.
MAC 0228+3820	gx	02h28m46s	+38°20.6'		And	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina subito a ESE — 495x.
MAC 0228+3821	gx	02h28m30s	+38°21.2'		And	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MAC 0228+3824	gx	02h28m23s	+38°24.6'		And	28"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente facile e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N (situata a 1' SE di **UGC 1933**) — 495x.
MAC 0228+4211	gx	02h29m00s	+42°11.9'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, situata a ridosso E di una stellina; in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20".
MAC 0229+2513	gx	02h29m12s	+25°13.5'		Ari	24"	m. buona / ottimo	minuscolo oggetto diffuso, esteso una decina di secondi e situato a ridosso S di una stellina brillante; appare in visione distolta a 450x quando si osserva MAC 0229+2514 dalla quale dista 1' scarso verso SW.
MAC 0229+2514	gx	02h29m14s	+25°14.1'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso S; subito a S di quest'ultima si nota un minuscolo oggetto, esteso una decina di secondi che da un controllo effettuato successivamente è poi risultato essere la MAC 0229+2513 — 450x.
MAC 0229+2858	gx	02h29m37s	+28°58.6'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, appare facilmente in visione distolta quando si osserva **PGC 9494** (dalla quale dista 1' scarso a SW), orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 0229+3822	gx	02h29m18s	+38°22.5'		And	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con piccolo bulge evidente; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a SW e orientate come la gx (situata 1.5' a SE di UGC 1960) — 495x.
MAC 0230+4218B	gx	02h30m18s	+42°19.1'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 450x.
MAC 0230+4318	gx	02h30m19s	+43°18.6'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso W — 450x.
MAC 0231+0946	gx	02h31m47s	+09°46.6'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0231+4323	gx	02h31m05s	+43°23.9'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso < 30"; c'è una stellina a ridosso verso S; la gx appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 0233+0536	gx	02h33m05s	+05°36.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da NE a SW; salta fuori a momenti in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
MAC 0233+0937	gx	02h33m24s	+09°37.1'		Cet	24"	buona / buono	debolissima e di aspetto quasi stellare, appare abbastanza facilmente in visione distolta 1' a N di NGC 975, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0233+3009	gx	02h33m50s	+30°10.0'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso forse una 30-ina di secondi, appare elusivamente e a tratti subito a S della successiva — 450x.
MAC 0233+3010	gx	02h33m50s	+30°10.5'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 1' a SSE di **CGCG 505-9**) — 450x.
MAC 0233+3306	gx	02h33m27s	+33°06.3'		Tri	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con una tenue condensazione centrale stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 450x.
MAC 0234+2957	gx	02h34m36s	+29°57.9'		Ari	28"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 505-17** situata a ridosso S — sono 2 piccole galassiette facili, di aspetto simile, rotonde con Ø di 20" o poco più; la CGCG è più diffusa e con condensazione centrale più piccola, mentre la MAC presenta un gradiente di luce più uniforme — 495x.
MAC 0234+3224	gx	02h34m27s	+32°24.6'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; ci sono 2 stelline quasi a ridosso a SE e SW — 495x.
MAC 0234+3225	gx	02h34m26s	+32°25.4'		Tri	28"	m. buona / buono	debolissima lama di luce orientata da N a S e che in visione distolta pare estesa per 40"-45" — 495x.
MAC 0234+3233	gx	02h34m28s	+32°33.7'		Tri	28"	m. buona / buono	debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare appena percettibile; la gx è situata tra 2 stelline orientate da E a W e distanti 1.5' (quella a W è molto debole) — 495x.
MAC 0234+3253	gx	02h34m35s	+32°53.5'		Tri	24"	ottima / ottimo	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W; appare in visione distolta a 1' verso E di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0234+3431	gx	02h34m34s	+34°31.9'		Tri	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' W; la stellina appena percettibile a ridosso SW è in realtà la **KUG 231+343** — 495x.
MAC 0234+3516	gx	02h25m49s	+35°16.5'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" scarsi e un nucleo stellare abbastanza evidente; poco disturbata dalla SAO 55541 di 10ª grandezza situata 1.5' a W; c'è un piccolo triangolo di stelline un paio di primi a S — 495x.
MAC 0234+4010	gx	02h34m57s	+40°10.4'		And	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a NE — 495x.
MAC 0234+4415	gx	02h34m20s	+44°15.0'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' verso N — 450x.
MAC 0236+1028	gx	02h36m28s	+10°28.6'		Cet	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo quasi stellare appena percettibile; poco più evidente scalando a 340x.
MAC 0236+4234	gx	02h36m50s	+42°34.4'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, estesa < 20" e situata tra due deboli stelline distanti un paio di primi in direzione NNW-SSE — 450x.
MAC 0237+0726	gx	02h37m20s	+07°26.4'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1.5' verso WNW — 450x.
MAC 0237+2324	gx	02h37m51s	+23°24.2'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma molto piccola e relativamente compatta, in visione distolta si presenta a momenti come una edge-on orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0237+4240	gx	02h37m41s	+42°40.0'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 0238+1016	gx	02h38m58s	+10°16.6'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e di aspetto confuso, appare in visione distolta a 1.5' SE di CGCG 439-21; solo a momenti appare come un baffo di luce orientato da NE a SW ed esteso sì e no una 30-ina di secondi, ma questo si evince meglio scalando a 340x (è sorta una falce di luna).
MAC 0238+1814	gx	02h38m51s	+18°14.5'		Ari	24"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, estesa sì e no 12" o 15" e situata quasi a ridosso W di una stellina; meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 0238+4131	gx	02h38m48s	+41°31.9'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta a 450x, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20".
MAC 0238+4135A	gx	02h38m25s	+41°35.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale appena percettibile, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0239+1731	gx	02h39m56s	+17°31.8'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale molto tenue; c'è una stellina molto debole subito a E e una abbastanza brillante a 1' SE — 450x.
MAC 0239+1819	gx	02h39m31s	+18°19.1'		Ari	24"	m. buona / buono	molto piccola, ma poco più evidente della precedente, diffusa e a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0239+4255B	gx	02h39m52s	+42°55.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena evidente; c'è una stellina al bordo N e una a ridosso W — 495x.
MAC 0240+0809	gx	02h41m48s	+08°23.1'		Cet	24"	buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0240+1727	gx	02h40m10s	+17°27.4'		Ari	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina al bordo S — 450x.
MAC 0240+3658	gx	02h40m30s	+36°58.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una coppia di stelline brillanti a SE — 495x.
MAC 0240+4205	gx	02h40m25s	+42°05.8'		Per	28"	ottima / buono	debole, molto piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 0240+4356	gx	02h40m23s	+43°56.8'		Per	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti, forse rotonda con Ø max 20"; c'è una doppia serrata a 1' WNW e una stellina di luminosità simile a SSW — 450x.
MAC 0241+0105	gx	02h41m44s	+01°05.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e a tratti leggermente condensata — 450x.
MAC 0241+0106	gx	02h41m23s	+01°06.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0241+0114	gx	02h41m35s	+01°14.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; appare a 450x in visione distolta a ridosso SW di una stellina brillante.
MAC 0241+0710	gx	02h41m34s	+07°10.8'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme e di dimensioni simili a CGCG 414-40, a ridosso della quale si trova verso SSW; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S; un'altra stellina relativamente brillante si trova a 1' SW — 450x.
MAC 0241+0803	gx	02h41m47s	+08°03.5'		Cet	24"	buona / buono	debolissima e di forma indistinta, ma comunque non più estesa di 20"; è situata in una piccola zona depleta salvo una stellina molto debole subito a S della galassia; occorre scalare a 340x per riuscire a scovarla.
MAC 0241+0823	gx	02h40m41s	+08°09.1'		Cet	24"	buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0241+0844	gx	02h41m07s	+08°44.1'		Cet	24"	m. buona / mediocre	si separa facilmente da **NGC 1044** situata a ridosso NW (q 175) — molto piccola e compatta, rotonda con Ø di 10"-15" e un nucleo stellare — 450x
MAC 0241+4215	gx	02h41m35s	+42°15.2'		Per	28"	ottima / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e tenue nucleo stellare; c'è un mini triangolo rettangolo di stelline subito a S (la componente più a E è appena percettibile) — 495x.
MAC 0242+0259	gx	02h42m22s	+02°59.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0242+4137	gx	02h42m16s	+41°37.0'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 0242+4749	gx	02h42m23s	+47°49.3'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, estesa non più di 20"; aggetta verso W dalla più settentrionale di una coppia di stelline orientate da N a S — 450x.
MAC 0243+0139	gx	02h43m24s	+01°45.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0243+3129	st?	02h43m07s	+31°29.9'		Tri	24"	ottima / buono	è stranamente di aspetto stellare, senza alcuna traccia di nebulosità — 450x.
MAC 0243+3220	gx	02h43m18s	+32°20.7'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø 12"-15"; c'è una coppia di stelline brillanti a un paio di primi verso E — 495x.
MAC 0243+3222	gx	02h43m20s	+32°22.7'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 495x.
MAC 0243+3224	gx	02h43m19s	+32°24.7'		Tri	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata subito a SE di **NGC 1060**) — 495x.
MAC 0243+3231	gx	02h44m00s	+32°31.8'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MAC 0243+3218	gx	02h43m03s	+32°18.7'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0243+4130	gx	02h43m12s	+41°30.9'		Per	24"	m. buona / ottimo	piccolo e debole oggetto nebuloso, orientato da NE a SW con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
MAC 0243+4152	gx	02h43m28s	+41°52.7'		Per	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20", con piccola ed evidente condensazione centrale; disturbata dalla SAO 38279 di magnitudo 8.5 situata quasi a ridosso SW — 495x.
MAC 0243+4155	gx	02h43m51s	+41°55.9'		Per	28"	m. buona / m. buono	piccolo e debolissimo lucore esteso sì e no 15" che aggetta a E di una debole stellina molto debole (situata 1.5' a W della successiva) — 495x.
MAC 0243+4156	gx	02h43m59s	+41°56.2'		Per	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia serrata a mala pena risolvibile a ridosso N; un'altra stellina si trova subito a S — 495x.
MAC 0243+4200	gx	02h43m42s	+42°01.3'		Per	28"	m. buona / m. buono	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra una stellina a N e una doppia stretta e sbilanciata a S — 495x.
MAC 0243+4422	gx	02h43m43s	+44°22.3'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratti grosso modo rotonda con Ø < 15"; forma un minuscolo triangolo equilatero con due stelline a S e SE — 495x.
MAC 0243+4423	gx	02h43m27s	+44°23.3'		Per	28"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi, situata in mezzo a due deboli stelline orientate da NNE a SSW — 495x.
MAC 0244+0047	gx	02h44m44s	+00°47.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, forse rotonda con Ø di una 20 — 450x.
MAC 0244+1117	gx	02h44m44s	+11°17.7'		Ari	24"	buona / buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta subito a 1' W di una stellina, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0244+1645	gx	02h44m58s	+16°45.0'		Ari	24"	m. buona / m. buono	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NNW a SSE (ossia come UGC 2217 dalla quale dista 3.5' a ENE); appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0244+4234B	gx	02h44m48s	+42°35.0'		Per	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina subito a W — 450x.
MAC 0245+0054A	gx	02h45m27s	+00°54.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	è un debole nodulo diffuso con nucleo stellare che a 450x appare a ridosso SW di UGC 2229.
MAC 0245+0055	gx	02h45m31s	+00°55.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente tra due stelline orientate da NE a SW e distanti ~ 1'; ma anche a 450x è soltanto una debolissima stellina sfuocata.
MAC 0245+1855	gx	02h45m50s	+18°55.6'		Ari	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
MAC 0245+3922	gx	02h45m11s	+39°22.5'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0245+4223	gx	02h45m51s	+42°23.3'		Per	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi in direzione E-W che appare però solo a momenti in visione distolta a 450x.
MAC 0245+4232	gx	02h46m00s	+42°32.5'		Per	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, rotonda con Ø < 30", diffusa e leggermente condensata; c'è una debole stellina a 1' verso E; un'altra appena percettibile si trova al bordo NE — 450x.
MAC 0245+4234	gx	02h45m26s	+42°35.0'		Per	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare solo a momenti orientata da N a S con dimensioni 15"×10"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso W — 450x.
MAC 0246+1854	gx	02h46m32s	+18°54.7'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta subito a N di una debole stellina; è rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0246+4224A	gx	02h46m13s	+42°25.1'		Per	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore di forma indistinta esteso < 30" con una stellina a ridosso verso NE — 450x.
MAC 0246+4224B	gx	02h46m15s	+42°24.4'		Per	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0246+4237A	gx	02h46m18s	+42°37.7'		Per	28"	ottima / buono	debolissima, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15"; situata all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline — 495x.
MAC 0246+4237B	gx	02h46m27s	+42°37.7'		Per	28"	ottima / buono	molto piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 495x.
MAC 0246+4240	gx	02h46m54s	+42°40.2'		Per	28"	ottima / buono	debole e poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con tenue condensazione centrale; situata all'interno di un triangolo equilatero di stelline — 495x.
MAC 0247+3935	gx	02h57m23s	+39°35.7'		Per	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di 20"-25" — 495x.
MAC 0247+4751	gx	02h47m44s	+47°51.0'		Per	28"	m. buona / m. buono	piccolo e debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso < 30" e situato subito a NE di una stellina — 495x.
MAC 0248+1201	gx	02h48m49s	+12°01.3'		Ari	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di 20"-25" e di luminosità pressoché uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0248+4758	gx	02h48m25s	+47°58.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.

MAC 0249+1244	gx	02h49m57s	+12°43.7'		Ari	24"	m. buona / m. buono	assieme alla MAC 0249+1245 e alla coppia MAC 0250+1243A e B forma un gruppo abbastanza compatto di piccole e debolissime galassiette che appaiono a fatica a 450x, anche perché la visione è disturbata dalla SAO 93132 di 7a grandezza situata 4.5' a S (si riesce a malapena a tenere fuori campo forzando a 580x); questa è una delle più evidenti.
MAC 0249+1245	gx	02h49m56s	+12°44.8'		Ari	24"	m. buona / m. buono	questa è invece debolissima, anche se appare abbastanza facilmente in visione distolta all'incirca nel mezzo tra una stellina abbastanza brillante 3' a WNW e una debole a SE — 450x.
MAC 0249+1254B	gx	02h49m44s	+12°54.4'		Ari	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, rotonda con Ø sì e no di 15"; appare in visione distolta al vertice occidentale di un piccolo triangolo rettangolo formato con 2 stelline a E e a S — 450x.
MAC 0249+1550	gx	02h49m23s	+15°50.5'		Ari	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; allineata ed equidistante con una debole stellina a NW e una brillante che disturba l'osservazione — 450x.
MAC 0249+1815	gx	02h49m40s	+18°15.8'		Ari	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0249+1819	gx	02h49m38s	+18°19.1'		Ari	24"	m. buona / buono	appare elusivamente in visione distolta solo a 450x, ma non riesco a capirne la forma; non è comunque più estesa di 15" — 450x.
MAC 0249+4134A	gx	02h49m51s	+41°34.1'		Per	24"	m. buona / ottimo	debolissima ma relativamente compatta, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x quando si fissa lo sguardo sulla stellina situata quasi a ridosso verso S; appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0249+4706	gx	02h49m41s	+47°06.9'		Per	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata a ridosso S di UGC 2294 — 450x.
MAC 0250+0806	gx	02h50m58s	+08°06.2'		Cet	24"	buona / buono	piccola e molto debole, estesa 10" o 15"; appare in visione distolta a 1' S di una stellina appena percettibile a 450x.
MAC 0250+0809	gx	02h50m09s	+08°09.4'		Cet	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stella brillante a 1.5' NE — 450x.
MAC 0250+0813	gx	02h50m17s	+08°13.8'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima, solo in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0250+1243A	gx	02h50m00s	+12°43.4'		Ari	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente a 580x e non sembra più estesa di 10"-12".
MAC 0250+1243B	gx	02h50m01s	+12°44.0'		Ari	24"	m. buona / m. buono	questa infine pare la più evidente delle 4, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 580x.
MAC 0250+1253	gx	02h50m11s	+12°53.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a tratti a ridosso N di UGC 2320; in visione distolta non sembra più estesa di 15" — 450x.
MAC 0250+1826	gx	02h50m20s	+18°26.8'		Ari	24"	m. buona / buono	piccolo e debolissimo lucore esteso una 15-ina di secondi che pare aggettare a NE di una debole stellina — 450x.
MAC 0250+4138	gx	02h50m56s	+41°38.0'		Per	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; disturbata dalla SAO 38389 di 9ª grandezza situata ad appena 1.5' N — 450x — 3.5' a SE di NGC 1106.
MAC 0250+4637	gx	02h50m47s	+46°37.7'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, molto diffusa in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline poco sbilanciate in luminosità a 1' scarso verso S — 495x.
MAC 0250+4639	gx	02h50m16s	+46°39.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta, solo a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MAC 0251+1330	gx	02h52m00s	+13°31.3'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0251+4637	gx	02h51m07s	+46°37.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una coppia serrata di deboli stelline subito a N — 495x.
MAC 0252+4123	gx	02h52m16s	+41°23.9'		Per	28"	m. buona / m. buono	piccolo e debolissimo baffo di luce esteso sì e no 20" e orientato da N a S; c'è una stellina subito a E e una poco più debole a ridosso SE, ma quest'ultima, da un controllo effettuato successivamente, è in realtà risultata essere la **PGC 197737** — 495x.
MAC 0252+4134	gx	02h52m08s	+41°34.8'		Per	28"	m. buona / m. buono	di aspetto a prima vista simile a **PGC 10883** — osservata subito prima e situata 6' scarsi più a E — e con Ø simile (~ 30"), ma più diffusa e con nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NE — 495x.
MAC 0252+4153	gx	02h52m26s	+41°53.0'		Per	24"	m. buona / ottimo	chiazza diffusa molto debole e di aspetto uniforme situata tra due stelline orientate da NE a SW; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; una 3ª stellina molto debole si trova subito a NW — 450x.
MAC 0253+0555	gx	02h53m05s	+05°55.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata a 340x; c'è una coppia di stelline brillanti a Se.
MAC 0253+0601	gx	02h53m56s	+06°01.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima, appare in visione distolta a 450x subito a N di una stellina; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0253+0603	gx	02h53m38s	+06°03.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	appare elusivamente a 450x (a 340x il fondo cielo sembra ancora un po' chiaro!), ma non riesco a capirne la forma; non sembra comunque più estesa di 20".
MAC 0253+4132	gx	02h53m47s	+41°32.8'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; situata subito a E di una stellina — 495x.
MAC 0254+1604	gx	02h54m39s	+16°04.7'		Ari	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0254+3605	gx	02h54m49s	+36°05.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 495x.
MAC 0254+3619	gx	02h54m52s	+36°19.3'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo baffo di luce esteso non più di 20" e orientato da NE a SW; c'è una debole stellina al bordo NE — 495x.
MAC 0254+4126	gx	02h54m32s	+41°26.3'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 0254+4136	gx	02h54m34s	+41°36.6'		Per	28"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø < 30" e con condensazione centrale abbastanza marcata (situata 1' a E di NGC 1130) — 495x.
MAC 0254+4153	gx	02h54m36s	+41°53.4'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quasi a ridosso W di una stellina; non è più estesa di 10"-12" — 450x.
MAC 0255+0919	gx	02h55m42s	+09°19.5'		Cet	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, appare facilmente in visione distolta quando si osserva IC 1897 situata 2.5' a E, forse rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
MAC 0256+0552	gx	02h56m53s	+05°52.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 2 stelline brillanti: una a 1' scarso NW e l'altra a poco più di 1' verso N — 450x.
MAC 0256+0554	gx	02h56m40s	+05°54.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, assai diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con di 40"×20" (situata 4' a NW di MAC 0256+0552) — 450x.
MAC 0256+0611	gx	02h56m29s	+06°11.7'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una debole stellina subito a E (fa parte dell'ammasso AGC 400) — 450x.
MAC 0256+0621	gx	02h56m19s	+06°21.6'		Cet	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, forse rotonda con Ø di 12"-15" (fa parte dell'ammasso **AGC 400**).
MAC 0256+0622	gx	02h56m07s	+06°22.6'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina a 1' verso E (fa parte dell'ammasso AGC 400) — 450x.
MAC 0256+0922	gx	02h56m06s	+09°22.7'		Cet	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0257+0546	gx	02h57m57s	+05°47.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 415-43 situata a ridosso NW — le due galassiette si separano facilmente a 450x; la 1ª è grosso modo rotonda con Ø < 20" e presenta una piccola condensazione centrale evidente; la 2ª è più diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare.
MAC 0257+0608C	gx	02h57m55s	+06°08.3'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø sì e no di 10"; appare in visione distolta a ridosso E di una stellina; un'altra stellina poco più brillante a 1' N (fa parte dell'ammasso AGC 400) — 450x.
MAC 0257+0613	gx	02h57m02s	+06°13.6'		Cet	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø rotonda con Ø < 20"; quasi allineata ed equidistante con due stelline a SE (fa parte dell'ammasso AGC 400) — 450x.
MAC 0257+0622	gx	02h57m38s	+06°22.9'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (fa parte dell'ammasso AGC 400) — 450x.
MAC 0257+1539	gx	02h57m45s	+15°39.4'		Ari	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza circolare con Ø < 30"; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti: quella più vicina alla gx è la più luminosa e presenta una doppia strettissima a ridosso SE che dà l'impressione di un piccolo oggetto diffuso — 450x.
MAC 0257+1543	gx	02h57m16s	+15°43.1'		Ari	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, poco diffusa, rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
MAC 0257+1559	gx	02h57m33s	+15°59.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, con tenue condensazione centrale abbastanza evidente, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0257+1606	gx	02h57m58s	+16°06.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatte e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 450x.
MAC 0257+1607	gx	02h57m46s	+16°07.6'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso N e un'altra più debole ~ 40" a SE — 450x.
MAC 0258+0352	gx	02h58m13s	+03°52.9'		Cet	24"	buona / buono	diffusa e solo a momenti appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x.
MAC 0258+0610	gx	02h58m38s	+06°10.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 0258+0611	gx	02h58m55s	+06°11.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MAC 0258+0612	gx	02h58m29s	+06°12.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 0258+0617	gx	02h58m56s	+06°17.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0258+0620A	gx	02h58m34s	+06°20.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W — 450x.
MAC 0258+0621A	gx	02h58m51s	+06°21.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	assieme a MAC 0258+0622 forma una coppia di gx molto deboli e si separano a fatica anche a 450x; la 1ª è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi scarsi, diffusa e di luminosità uniforme; la 2ª in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15", anch'essa di luminosità uniforme; forse è quella delle due che appare un attimo prima.
MAC 0258+0622	gx	02h58m51s	+06°22.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 0258+0621A**
MAC 0258+0625	gx	02h58m45s	+06°25.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma; non sembra comunque più estesa di 20" — 450x.
MAC 0258+1556	gx	02h58m51s	+15°56.0'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 0258+1604	gx	02h58m13s	+16°04.9'		Ari	24"	ottima / ottimo	debolissima e di aspetto confuso, ma non più estesa di 15" o 20" — 450x.
MAC 0258+1605	gx	02h58m35s	+16°05.3'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni di 30"×20" — 450x.
MAC 0258+1605A	gx	02h58m56s	+16°06.0'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0258+2523	gx	02h58m44s	+25°23.7'		Ari	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso W; forma una coppia ravvicinata con **CGCG 485-5** situata 1' a N — 495x.
MAC 0259+0542B	gx	02h59m51s	+05°42.1'		Cet	24"	m. buona / mediocre	assieme a MAC 0259+0544 forma una coppia di galassiette rotonde facili da vedere a 450x, di aspetto simile, relativamente compatte, con Ø di una 20-ina di secondi ed entrambe con nucleo stellare; distanti tra loro 2.5' in direzione N-S.
MAC 0259+0544A	gx	02h59m49s	+05°44.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	assieme a MAC 0259+0542B forma una coppia di galassiette rotonde facili da vedere a 450x, di aspetto simile, relativamente compatte, con Ø di una 20-ina di secondi ed entrambe con nucleo stellare; distanti tra loro 2.5' in direzione N-S.
MAC 0259+0556A	gx	02h59m43s	+05°56.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	appare elusivamente quando si osserva MAC 0259+0556B, dalla quale dista meno di 1' a W; è di aspetto indistinto ed estesa 15"-20" — 450x.
MAC 0259+0556B	gx	02h59m46s	+05°56.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
MAC 0259+1849	gx	02h59m47s	+18°49.3'		Ari	28"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a E; una coppia di stelline appena percettibili si trova a 1' scarso verso N — 495x.
MAC 0259+1851	gx	02h59m48s	+18°52.0'		Ari	28"	m. buona / ottimo	è un'altra elusiva lama di luce orientata da NE a SW ed estesa circa il doppio della precedente — 495x.
MAC 0300+1842	gx	03h00m47s	+18°42.3'		Ari	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione E-W, ma appare soltanto in visione distolta — 495x.
MAC 0300+4300	gx	03h00m58s	+43°00.8'		Per	24"	m. buona / ottimo	è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x come una stellina leggermente sfuocata a ridosso SW di UGC 2470 — 450x.
MAC 0300+4448	gx	03h00m51s	+44°48.4'		Per	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 450x.
MAC 0301+4343	gx	03h01m48s	+43°43.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina appena percettibile al bordo occidentale — 495x.
MAC 0302+3540	gx	03h02m17s	+35°41.0'		Per	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare a tratti in visione distolta quando si fissa la stellina subito a S; è allungata da N a S con dimensioni 40"×20" (circa 2/3 della distanza delle 2 stelline a E) — 380x.
MAC 0302+4342	gx	03h02m04s	+43°42.3'		Per	28"	m. buona / ottimo	debolissima, appare elusivamente in visione distolta, ma è molto piccola, estesa sì e no 10"-12" — 495x.
MAC 0302+4344	gx	03h02m40s	+43°45.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	anche questa è molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina al bordo S — 495x.
MAC 0303+0143	gx	03h03m45s	+01°43.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina al bordo S — 450x.
MAC 0303+0431	gx	03h03m36s	+04°32.0'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0303+4625	gx	03h03m49s	+46°25.1'		Per	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a ridosso E — 450x.
MAC 0304+0221	gx	03h04m31s	+02°21.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; a 450x appare abbastanza facilmente in visione distolta a E di una stellina.
MAC 0304+4326	gx	03h04m36s	+43°26.2'		Per	24"	m. buona / m. buono	appare come un debolissimo baffo di luce che a 450x, in visione distolta, sembra aggettare verso E da una stella brillante per una 40-ina di secondi *(presenza di chiarore lunare)*.
MAC 0305+0012	gx	03h05m18s	+00°12.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina brillante subito a SE — 450x.
MAC 0307+0016	gx	03h07m47s	+00°16.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta subito a W di una stellina abbastanza brillante; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x
MAC 0307+0028	gx	03h07m52s	+00°28.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; meglio comunque scalare a 340x.
MAC 0308+4252	gx	03h08m28s	+42°52.8'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N — 450x.
MAC 0309+4215	gx	03h09m52s	+42°15.2'		Per	28"	m. buona / ottimo	appare facilmente il nucleo sfuocato "annegato" nei bagliori della SAO 38612 di 9ª grandezza situata a ridosso NW — 495x.
MAC 0310+3155	gx	03h10m16s	+31°55.3'		Per	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a tratti a 1' E di UGC 2565; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 15"; situata tra la UGC e una stellina a E — 450x.
MAC 0310+3156	gx	03h10m37s	+31°56.6'		Per	24"	ottima / m. buono	appena più evidente della precedente, ma comunque debolissima, salta fuori in visione distolta, ma solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 0310+4200	gx	03h10m42s	+42°00.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole chiazza molto diffusa e con basso gradiente di luce, allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30"; c'è una debole stellina subito a E e una più brillante a 1' verso W — 495x.
MAC 0310+4218	gx	03h10m29s	+42°18.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola lama di luce molto debole orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi; 2 stelline abbastanza brillanti si trovano rispettivamente a 1' S e SW — 495x.
MAC 0312+1754	gx	03h12m47s	+17°54.3'		Ari	28"	m. buona / ottimo	debolissima e stemperata sul fondo cielo, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 3 stelline a ESE (quella centrale è la più brillante) — 495x.
MAC 0312+1853	gx	03h12m48s	+18°53.6'		Ari	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-12"; è equidistante con due stelline a WSW e SW — 495x.
MAC 0312+1920	gx	03h12m33s	+19°20.9'		Ari	24"	ottima / ottimo	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina brillante una 40-ina di secondi a SE — 450x.
MAC 0313+0242	gx	03h13m47s	+02°43.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta subito a N di una stellina; una stellina appena percettibile si trova grosso modo alla stessa distanza a N della galassietta — 450x.
MAC 0313+0246	gx	03h13m39s	+02°46.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente a 450x tra UGC 2599 e una stellina abbastanza brillante situata 1.5' a N.
MAC 0313+4123	gx	03h13m44s	+41°23.5'		Per	24"	buona / buono	molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
MAC 0313+4152	gx	03h13m52s	+41°52.3'		Per	24"	ottima / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a poco più di 1' N di una stellina brillante e a 1' W di una più debole; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0313+4157	gx	03h13m46s	+41°57.8'		Per	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa e con nucleo stellare evidente — 450x.
MAC 0314+0232	gx	03h14m39s	+02°32.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale poco contrastata — 450x.
MAC 0314+0239	gx	03h14m27s	+02°40.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una dozzina di secondi e un nucleo stellare appena percettibile; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' scarso SE di NGC 1254 — 450x.
MAC 0314+4159	gx	03h14m49s	+41°59.6'		Per	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, un poco disturbata da una stellina abbastanza brillante situata a ridosso S, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0314+4246	gx	03h14m32s	+42°46.3'		Per	24"	buona / buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con un tenue nucleo stellare — 450x.
MAC 0315+0237A	gx	03h15m11s	+02°37.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta subito a N di una stellina; forse rotonda con Ø < 20"
MAC 0315+0238	gx	03h15m18s	+02°38.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	assieme a MAC 0315+0239 forma una coppia di gx che appaiono facilmente in visione distolta quando si osserva MAC 0315+0237A; sono entrambe molto piccole, orientate da NW a SE, con dimensioni 20"×10"; la prima è poco più evidente — 450x.
MAC 0315+0239	gx	03h15m19s	+02°39.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	v. **MAC 0315+0238**
MAC 0315+0247	gx	03h15m21s	+02°47.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 450x subito a W di una stellina; orientata da N a S con dimensioni 30"×15".
MAC 0315+4045	gx	03h15m47s	+40°45.4'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a W — 450x.
MAC 0315+4109	gx	03h15m40s	+41°08.8'		Per	28"	ottima / discreto	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' verso N e una più evidente subito a W — 388x.
MAC 0315+4203	gx	03h15m09s	+42°03.3'		Per	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0316+4100	gx	03h16m59s	+41°00.0'		Per	28"	ottima / discreto	piccola, molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 388x.
MAC 0316+4110	gx	03h16m27s	+41°10.8'		Per	28"	ottima / discreto	anche questa è piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 388x.
MAC 0316+4205	gx	03h16m05s	+42°05.3'		Per	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; situata a 1' NE di UGC 2618 — 450x.
MAC 0317+4210	gx	03h17m45s	+42°10.9'		Per	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante a ridosso SW — 450x.
MAC 0318+3742	gx	03h18m17s	+37°42.8'		Per	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e a tratti condensata, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a W — 450x.
MAC 0318+4058	gx	03h18m28s	+40°58.4'		Per	28"	ottima / discreto	debolissimo baffo di luce esteso una 40-ina di secondi in direzione NE-SW situato a ridosso di una coppia si deboli stelline orientate da N a S e distanti come le dimensioni della gx — 388x.
MAC 0318+4104	gx?	03h18m22s	+41°04.4'		Per	28"	ottima / discreto	nella posizione segnata appare solo una stellina brillante; è vero che pare circonfusa da un tenuissimo alone, ma potrebbe trattarsi di un effetto di riverberazione — 388x.
MAC 0318+4110A	gx	03h18m37s	+41°01.2'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 388x.
MAC 0318+4110B	gx	03h18m46s	+41°01.9'		Per	28"	ottima / discreto	debolissima, appare solo in visione distolta, grosso modo rotonda con Ø simile alla precedente — 388x.
MAC 0318+4137	gx	03h18m58s	+41°38.1'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole e piccola, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; allineata ed equidistante con due stelline a N — 388x.
MAC 0319+4024	gx	03h19m22s	+40°24.6'		Per	28"	ottima / discreto	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×10"; solo a momenti appare un tenuissimo bulge diffuso — 388x.
MAC 0319+4026	gx	03h19m57s	+40°27.0'		Per	28"	ottima / discreto	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, situata tra 2 stelline brillanti orientate da N a S (fanno parte di un piccolo triangolo equilatero: la stella più a N è la meno luminosa) — 388x.
MAC 0319+4108	gx	03h19m07s	+41°08.6'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 388x.
MAC 0319+4116	gx	03h19m44s	+41°16.6'		Per	28"	ottima / discreto	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina brillante a ridosso E — 388x.
MAC 0319+4127	gx	03h19m44s	+41°27.4'		Per	28"	ottima / discreto	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 388x.
MAC 0319+4136	gx	03h18m58s	+41°38.1'		Per	28"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce esteso sì e no 30" in direzione E-W; appare solo a momenti in visione distolta a NW di una stellina — 495x.
MAC 0319+4158	gx	03h19m46s	+41°58.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina appena percettibile al bordo S — 495x.
MAC 0319+4200	gx	03h19m54s	+42°00.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15"; una stellina appena percettibile appare a momenti subito a NE — 495x.
MAC 0320+4231	gx	03h20m42s	+42°31.2'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata in mezzo a due stelline orientate da E a W (quella a W è più debole; quella a E fa parte di un piccolo triangolo equilatero) — 495x.
MAC 0322+4048	gx	03h22m31s	+40°49.0'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0322+4127	gx	03h22m09s	+41°27.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 495x.
MAC 0323+0001	gx	03h23m46s	+00°01.8'		Tau	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto tenue e di aspetto uniforme, orientata da NNW a SSE ed estesa una 40-ina di secondi; è disturbata da una stella brillante a SSE (ossia sul prolungamento dell'asse maggiore della gx) — 450x.
MAC 0323+4116	gx	03h23m51s	+41°16.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, grosso modo rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 495x.
MAC 0323+4123	gx	03h23m53s	+41°23.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N; due stelle brillanti si trovano si trovano a 1' scarso W e 1' NW — 495x.
MAC 0324+4116	gx	03h24m37s	+41°16.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW — 495x.
MAC 0327+3959	gx	03h27m55s	+39°59.8'		Per	24"	buona / buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
MAC 0328+0541	gx	03h28m04s	+05°41.6'		Tau	24"	m. buona / mediocre	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" (o poco inferiori) — 450x.
MAC 0338+0110	gx	03h38m12s	+01°10.2'		Tau	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 391-21 (situata 1' scarso a ENE); è debolissima, molto diffusa e più estesa della compagna, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30"; la visione è meglio contrastata a 340x, ma le gx si separano meglio a 450x.
MAC 0340+0103	gx	03h40m44s	+01°03.4'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' NW e un'altra brillante a 1.5' verso NE — 450x.
MAC 0349+0658	gx	03h49m58s	+06°58.6'		Tau	24"	ottima / ottimo	piccola, debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S — 450x.
MAC 0350+0659	gx	03h50m34s	+06°59.9'		Tau	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0352+4950	gx	07h52m29s	+49°50.3'		Lyn	28"	ottima / ottimo	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W; c'è una stellina subito a S — 495x.
MAC 0401+0538	gx	04h01m53s	+05°38.1'		Tau	24"	ottima / discreto	appare come un debolissimo nodulo a ridosso SW di IC 2019 e che a prima vista dà l'impressione alla gx principale di essere allungata in quella direzione — 450x.
MAC 0401+2317	gx	04h01m49s	+23°17.3'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, forse rotonda con Ø di max 15"; situata sul lato SW di un pentagono esteso circa 3', formato da 5 stelline ai vertici e una al centro — 495x.
MAC 0403+2144	gx	04h03m03s	+21°44.8'		Tau	28"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta pare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE e una abbastanza brillante a 1.5' verso SW — 495x.
MAC 0403+2507	gx	04h03m15s	+25°07.2'		Tau	28"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce esteso sì e no 30" e orientato da NW a SE; c'è una stellina subito a S — 495x.
MAC 0404+3311	gx	04h04m19s	+33°11.8'		Per	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline brillanti a W (quella a S è più brillante); appare più facilmente di UGC 2944 dalla quale dista meno di 7' SW — 270x.
MAC 0405+0700	gx	04h05m57s	+07°00.9'		Tau	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina appena percettibile a 1.5' NW — 450x.
MAC 0406+0703	gx	04h06m05s	+07°03.6'		Tau	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; appare in visione distolta quando si osserva MAC 0405+0700 situata a 3' SSW — 450x.
MAC 0406+7839	gx	04h06m04s	+78°39.8'		Cam	24"	buona / m. buono	minuscola galassietta estesa una decina di secondi e con nucleo puntiforme; ci sono 2 deboli stelline a ridosso: a S e a SE — 450x.
MAC 0408+0353	gx	04h08m19s	+03°53.8'		Tau	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15".
MAC 0409+3659	gx	04h09m58s	+36°59.9'		Per	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno *(presenza di chiarore lunare)* — 450x.
MAC 0411+3447	gx	04h11m53s	+34°47.9'		Per	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina al bordo meridionale e un'altra di luminosità simile subito a NW — 450x.
MAC 0412+1329	gx	04h12m49s	+13°29.8'		Tau	24"	ottima / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' W — 450x.
MAC 0413+1321	gx	04h13m14s	+13°21.2'		Tau	24"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0414+0631	gx	04h14m26s	+06°31.4'		Tau	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e solo a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a E che disturba un po' l'osservazione; una stella luminosa si trova a 5' scarsi WSW, ma a 450x si riesce a tenere, seppure con fatica, fuori campo.
MAC 0418+0210	gx	04h18m50s	+02°10.0'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme; è visibile in visione distolta a 450x subito a W di una doppia stretta (siglata MCG+0-11-51), ma solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 40"×20".
MAC 0418+0229	gx	04h18m21s	+02°29.4'		Tau	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; è molto disturbata da 3 stelline brillanti allineate da NW a SE: quella più a SE è la SAO 111735 di 7ª grandezza; la galassietta forma un piccolo triangolo equilatero con le due componenti più a NW — 450x.
MAC 0418+0310	gx	04h18m17s	+03°10.4'		Tau	24"	ottima / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1'; appare facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 0422+0328	gx	04h22m17s	+03°28.8'		Tau	24"	m. buona / ottimo	piccola e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione centrale — 450x.
MAC 0429+0039	gx	04h29m42s	+00°39.1'		Tau	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 0431+0224	gx	04h31m10s	+02°24.0'		Tau	24"	ottima / discreto	è un debolissimo baffo di luce osservabile in visione distolta che aggetta a NW di una stellina brillante per una 20-ina di secondi; meglio evidente a 580x nonostante il seeing non sia dei migliori (situata 12.5' a W di UGC 3081).
MAC 0443+0028	gx	04h43m41s	+00°28.9'		Ori	24"	m. buona / discreto	elusivo e minuscolo oggetto che appare a tratti al vertice più acuto di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelline orientate da NW a SE e distanti poco più di 1'; non è comunque più estesa di 10" — 450x.
MAC 0446+0805	gx	04h46m42s	+08°05.8'		Ori	24"	ottima / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è situata al vertice orientale di un quadrato regolare formato con 3 stelline brillanti — 450x.
MAC 0452+0115	gx	04h52m57s	+01°15.4'		Ori	24"	buona / buono	debolissima chiazza estesa 20-ina di secondi, appare in visione distolta a 450x a ridosso SW di una stellina.
MAC 0456+0143	gx	04h56m38s	+01°43.7'		Ori	24"	buona / scarso	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 340x.
MAC 0457+0041	gx	04h57m19s	+00°41.3'		Ori	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo baffo di luce che aggetta per una 20-ina di secondi a E di una stellina brillante — 450x.
MAC 0457+7218	gx	04h57m42s	+72°18.2'		Cam	24"	buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce orientata da N a S ed estesa sì e no una 30-ina di secondi; appare tuttavia come tale solo a momenti e situata a ridosso SW di una stellina; stranamente meglio visibile scalando a 340x.
MAC 0458+0256	gx	04h58m41s	+02°56.4'		Ori	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0500+0425	gx	05h00m35s	+04°25.0'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo NE; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline abbastanza brillanti, a NE e a N — 450x.
MAC 0501+0737	gx	05h01m39s	+07°37.6'		Ori	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E (una 2ª stellina di luminosità simile si trova 1' a E) — 450x.
MAC 0505+0221	gx	05h05m21s	+02°21.6'		Ori	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare solo a momenti in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata 13' a SW di CGCG 394-77).
MAC 0505+0233A	gx	05h05m56s	+02°33.3'		Ori	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, estesa 10"-15"; c'è una stellina appena percettibile subito a E e un'altra più brillante ancora più a E con le quali la gx è allineata (situata poco più di 3' a NNW di CGCG 394-77) — 450x.
MAC 0506+0224	gx	05h06m33s	+02°24.2'		Ori	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso NW di una stellina brillante; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; alcune stelline molto deboli appaiono a N e a S della gx.
MAC 0514+0148	gx	05h14m38s	+01°48.8'		Ori	24"	ottima / ottimo	debole lucore molto diffuso e di luminosità uniforme, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
MAC 0515+1919	gx	05h15m38s	+19°19.2'		Tau	16"	ottima / ottimo	è debolissima, ma a tratti in visione distolta, appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 380x.
MAC 0521+0338	gx	05h21m55s	+03°38.7'		Ori	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' scarso SE (situata 12' a WSW di CGCG 421-43) — 450x.
MAC 0558+7947	gx	05h58m22s	+79°47.9'		Cam	24"	buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e appena più brillante all'interno — 450x.
MAC 0606+7456	gx	06h06m31s	+74°56.8'		Cam	24"	buona / ottima	debole, relativamente compatta e con condensazione centrale abbastanza evidente, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
MAC 0633+4037	gx	06h33m09s	+40°37.4'		Aur	28"	buona / mediocre	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso verso E — 495x.
MAC 0638+5322A	gx	06h38m44s	+53°22.9'		Lyn	24"	ottima / buono	è un elusivo baffo di luce esteso sì e no una 30-ina di secondi e orientato da N a S (non ho visto la MAC 0638+5322 situata subito a S) — 450x.
MAC 0639+7358	gx	06h39m55s	+73°58.0'		Cam	24"	buona / ottima	appare elusivamente in visione distolta a ~ 1' E di una stellina appena percettibile, forse rotonda con Ø < 30", anche se la forma resta per lo più indistinta — 450x.
MAC 0639+7415	gx	06h39m39s	+74°15.5'		Cam	24"	buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 20"×15"; è situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele la cui stellina più settentrionale è brillante — 450x.
MAC 0640+3043	gx	06h40m08s	+30°13.2'		Gem	24"	m. buona / mediocre	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø max di 20"; una doppia stretta a ridosso S non si riesce a risolvere (penso a causa del seeing) — 450x.
MAC 0646+7410	gx	06h46m48s	+74°10.8'		Cam	24"	buona / m. buono	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette debolissime distanti 3' in direzione NW-SE; in visione distolta appaiono entrambe rotonde con Ø di una 15-ina di secondi, poco diffuse e di luminosità uniforme; 2ª è poco evidente, ma per osservarle occorre comunque non scendere sotto i 450x.
MAC 0646+7412	gx	06h46m08s	+74°13.0'		Cam	24"	buona / m. buono	v. **MAC 0646+7410**
MAC 0649+2540	gx	06h49m39s	+25°40.1'		Gem	24"	ottima / discreto	molto piccola e poco diffusa, forse rotonda con Ø di 10"-12"; non riesco tuttavia a capire se presenta un nucleo stellare marcato o se si tratta di una stellina sovrapposta — 450x.
MAC 0651+3236	gx	06h51m49s	+32°36.9'		Gem	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0652+3120	gx	06h52m21s	+31°20.5'		Gem	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante a NE — 450x.
MAC 0652+5535	gx	06h52m57s	+55°35.9'		Lyn	24"	ottima / buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' verso S e una più evidente e poco più distante a NE — 450x.
MAC 0658+2501	gx	06h58m54s	+25°01.8'		Gem	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, appare elusivamente in visione distolta a ridosso S di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0700+4735	gx	07h00m52s	+47°36.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima chiazza situata a ridosso S di una stellina; appare in visione distolta, ma non ne capisce la forma; comunque non più estesa di 20" — 450x.
MAC 0701+4733	gx	07h01m17s	+47°33.9'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MAC 0702+5034	gx	07h02m55s	+50°35.0'		Lyn	24"	ottima / buono	debolissima, diffusa e a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata a ridosso SE di **CGCG 234-42**) — 450x.
MAC 0703+3919	gx	07h03m01s	+39°19.6'		Aur	28"	m. buona / discreto	lama di luce molto tenue estesa una 30-ina di secondi estesa una 40-ina di secondi in direzione NW-SE; allineata ed equidistante con 2 stelline a E — 495x.
MAC 0704+5409	gx	07h04m10s	+54°09.3'		Lyn	16"	ottima / m. buono	debolissimo oggetto rotondo di 20"-25" di Ø, diffuso e osservabile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x posando lo sguardo sulla stellina che si trova 40" a NE.
MAC 0705+4822	gx	07h05m57s	+48°22.9'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto piccola, poco diffusa, orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina molto debole a ridosso W — 495x.
MAC 0708+4856	gx	07h08m07s	+48°57.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente come una stellina sfuocata a 1' N di CGCG 234-61 — 450x.
MAC 0709+4835	gx	07h09m01s	+48°35.3'		Lyn	28"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, solo a tratti condensata, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0709+4946	gx	07h09m21s	+49°46.5'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0709+5002	gx	07h09m21s	+50°02.8'		Lyn	20"	buona / buono	piccola e debolissima, appare solo a momenti a ridosso E di una stellina; c'è doppia serrata subito a SE — 360x.
MAC 0710+4812	gx	07h10m52s	+48°12.2'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, situata a ridosso N di una stellina che ne confonde un po' la forma; non sembra comunque più estesa di 15" — 450x.
MAC 0711+4831	gx	07h11m01s	+48°31.9'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, relativamente compatta, estesa una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 0712+1233	gx	07h12m45s	+12°33.8'		CMi	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con due deboli stelline a SW — 450x.
MAC 0712+4901	gx	07h12m10s	+49°01.9'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	piccolo e debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; è situata tra due stelline abbastanza brillanti distanti un paio di primi in direzione ENE-WSW (queste ultime sono a loro volta allineate con altre due componenti poco più luminose verso WSW) — 450x.
MAC 0713+1217	gx	07h13m38s	+12°17.7'		Gem	16"	buona / m. buono	debole, allungata ~ da N a S, di dimensioni 60"×30" con una stellina appena percettibile al bordo settentrionale — 270x.
MAC 0713+1224	gx	07h13m22s	+12°24.3'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata da una coppia di stelle brillanti ravvicinate situata a 1' NNW — 450x.

MAC 0714+3608	gx	07h14m20s	+36°08.3'		Aur	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, salta fuori in visione distolta a ridosso NW di una stellina, ma solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; non bisogna però scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 0717+4058	gx	07h17m57s	+40°59.0'		Aur	20"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, appare a tratti a ridosso SW di UGC 3781, ma la visione è disturbata dalla SAO 41670 di 7ª grandezza situata 4' a SW — 360x
MAC 0718+0941	gx	07h17m57s	+09°41.3'		CMi	24"	ottima / m. buono	debolissima, ma salta fuori facilmente in visione distolta a 450x quando si osserva UGC 3787, dalla quale dista una 40-ina di secondi a E; è molto piccola e a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10".
MAC 0724+4852	gx	07h24m42s	+48°52.8'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MAC 0726+3723	gx	07h26m44s	+37°23.1'		Aur	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; è situata a ridosso SE di UGC 3849 — 450x.
MAC 0727+0630	gx	07h27m07s	+06°30.7'		CMi	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø < 20"; allineata ed equidistante con due stelline ravvicinate molto deboli a S; una terza stellina di luminosità simile subito a SE della gx completa un minuscolo triangolo rettangolo isoscele — 450x.
MAC 0727+5256	gx	07h27m04s	+52°57.0'		Lyn	24"	ottima / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta , grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0728+1820	gx	07h28m42s	+18°20.8'		Gem	24"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto molto debole, rotondo con Ø di una 15-ina di secondi, relativamente compatto e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso SE — 450x.
MAC 0730+0939	gx	07h30m48s	+09°39.3'		CMi	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a ridosso N di una stellina (quella situata al bordo occidentale di NGC 2402); è molto piccola, approssim. circolare con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0734+1841	gx	07h34m05s	+18°41.7'		Gem	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente in visione distolta a ridosso W di CGCG 87-11 come una stellina debolmente sfuocata — 450x.
MAC 0735+1131	gx	07h35m42s	+11°31.2'		CMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta subito a W di una stellina — 450x.
MAC 0735+5734	gx	07h35m12s	+57°34.9'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 495x.
MAC 0736+5725	gx	07h36m33s	+57°25.6'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 495x.
MAC 0736+5728	gx	07h36m39s	+57°28.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0737+1935	gx	07h37m28s	+19°35.4'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0737+1940	gx	07h37m49s	+19°40.3'		Gem	24"	m. buona / m. buono	poco più evidente, di Ø simile e anch'essa di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0739+1715	gx	07h39m56s	+17°15.1'		Gem	24"	ottima / discreto	più evidente di CGCG 87-26, dalla quale dista poco più di 1' a NW, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata; c'è una stellina subito a NE — 450x.
MAC 0739+1804	gx	07h39m04s	+18°04.4'		Gem	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 450x.
MAC 0741+2907	gx	07h41m19s	+29°07.3'		Gem	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta subito a W di una stellina non più estesa di 10"-12" — 450x.
MAC 0742+5401	gx	07h42m40s	+54°01.1'		Lyn	28"	m. buona / buono	è un piccolo baffo orientato da N a S che appare elusivamente e solo a tratti subito a SW di una stellina; una stellina appena percettibile si vede a momenti a ridosso verso W — 495x.
MAC 0742+6507	gx	07h42m56s	+65°08.1'		Cam	16"	ottima / ottimo	altro debolissimo oggetto rotondo, di una 20-ina di secondi di Ø e con condensazione centrale stellare — 380x.
MAC 0746+1632	gx	07h46m48s	+16°32.7'		Gem	24"	ottima / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta; è molto piccola, estesa < 20", ma non riesco a capirne la forma — 450x.
MAC 0746+1828	gx	07h46m55s	+18°29.0'		Gem	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0746+2216	gx	07h46m56s	+22°16.6'		Gem	24"	m. buona / buono	molto debole, orientata come CGCG 118-6, dalla quale dista un paio di primi a SW, ma più piccola, di dimensioni 20"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW — 450x.
MAC 0746+3029	gx	07h46m32s	+30°29.4'		Gem	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso verso S — 450x.
MAC 0747+4123	gx	07h47m43s	+41°23.2'		Lyn	20"	buona / buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stella brillante di 10ª grandezza quasi a ridosso SW che disturba la visione — 360x.
MAC 0747+4131	gx	07h47m01s	+41°31.5'		Lyn	20"	buona / buono	è un elusivo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi che aggetta a S di UGC 4018, ma appare solo a momenti in visione distolta a 360x.
MAC 0748+2250	gx	07h48m08s	+22°50.6'		Gem	24"	ottima / buono	molto debole e piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile — 450x.
MAC 0749+5202B	gx	07h49m23s	+52°02.9'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto piccola, forse rotonda con Ø sì e no di 15"; sembra quasi apparire prima di MCG+9-13-62, dalla quale dista 1' scarso a NW, ma l'effetto potrebbe essere ascrivibile a una stellina situata a ridosso N — 495x.
MAC 0750+2750	gx	07h50m20s	+27°50.6'		Gem	24"	ottima / buono	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
MAC 0751+6152	gx	07h51m29s	+61°52.7'		Cam	24"	ottima / ottimo	è un piccolo oggetto relativamente compatto esteso una 15-ina di secondi e situato a ridosso S di CGCG 287-2 — 450x.
MAC 0752+0940	gx	07h52m09s	+09°40.6'		CMi	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' W — 450x.
MAC 0752+2320	gx	07h52m30s	+23°20.1'		Gem	24"	m. buona / buono	è un elusivo baffo di luce che appare solo a momenti in visione distolta, a tratti orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0754+2554	gx	07h54m10s	+25°54.4'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta quasi a ridosso SW di una stellina (la più orientale di un piccolo triangolo rettangolo), ma non bisogna scendere sotto i 450x (allineata ed equidistante con CGCG 118-20 e 118-21 a SE).
MAC 0754+6352	gx	07h54m10s	+63°52.3'		Cam	24"	ottima / ottimo	molto piccola, debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0757+2553	gx	07h57m21s	+25°53.7'		Gem	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con PGC 1753534 situata 1' scarso a S, di aspetto simile, ma meno evidente e poco più estesa; la coppia appare poco meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 0757+2729	gx	07h57m06s	+27°29.1'		Gem	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 10-ina di secondi, appare in visione distolta a ridosso S di una stellina che fa parte di una piccola losanga irregolare foggiata a "crocifisso"; a tratti appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se trattasi del nucleo della gx o di una stellina appena percettibile a ridosso— 450x.
MAC 0758+2403	gx	07h58m15s	+24°03.7'		Gem	24"	ottima / buono	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti e alternando gli occhi appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15", ma è meglio scalare a 340x.
MAC 0759+0742	gx	07h59m39s	+07°42.7'		CMi	24"	m. buona / ottimo	appare in visione distolta a 450x, ma è debolissima, forse rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0800+2433	gx	08h00m12s	+24°33.9'		Gem	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza forse circolare con Ø < 30", appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0800+5630	gx	08h00m56s	+56°30.9'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola, allungata da E a W, di dimensioni 20"×10", diffusa alle estremità E e W e con condensazione centrale molto tenue — 495x.
MAC 0801+2518	gx	08h01m18s	+25°18.3'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 4167 situata subito a S — debolissima, in visione distolta appare a tratti come un baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0801+2721	gx	08h01m37s	+27°21.5'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a N e una più brillante a poco più di 1' SSE (allineata ed equidistante con CGCG 148-96 148-94 a SSW) — 450x.
MAC 0801+5635	gx	08h01m11s	+56°35.8'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, rotonda con Ø < 20" e solo a momenti condensata — 495x.
MAC 0801+5640	gx	08h01m13s	+56°40.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due deboli stelline a SW — 495x.
MAC 0801+5649	gx	08h01m33s	+56°49.8'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi in direzione NE-SW, ma appare solo a tratti in visione distolta — 495x.
MAC 0801+5654	gx	08h01m14s	+56°54.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi, situato in mezzo a due stelline orientate da NE a SW; tuttavia il campo è molto disturbato dalla SAO 26621 di 8ª grandezza situata 2.5' a NNE — 495x.
MAC 0801+5656	gx	08h01m48s	+56°56.8'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata dalla SAO 26621 di 8ª grandezza situata 3' a W — 495x.
MAC 0802+0921	gx	08h02m11s	+09°21.7'		CMi	24"	m. buona / buono	debolissima, appare in visione distolta a 450x, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0802+0943	gx	07h35m43s	+11°42.6'		Cnc	24"	ottima / discreto	è una debolissima chiazza diffusa e molto stemperata sul fondo cielo, estesa forse una 30-ina di secondi; appare a momenti in visione distolta a ridosso S di una debole stellina; non pare meglio contrastata scalando a 340x (situata 3' a N di CGCG 59-21).
MAC 0802+5640	gx	08h02m30s	+56°40.7'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole e poco diffusa, in visione distolta appare a tratti molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 495x.
MAC 0802+5646	gx	08h02m22s	+56°46.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' verso W — 495x.
MAC 0803+2627	gx	08h03m42s	+26°27.3'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 0805+3727	gx	08h05m08s	+37°27.0'		Lyn	24"	m. buona / ottimo	molto debole e debolissima, estesa 10"-12"; appare in visione distolta a 1.5' W di una stellina — 450x.
MAC 0806+0430	gx	08h06m30s	+04°30.2'		CMi	24"	buona / discreto	debolissima, salta fuori in visione distolta subito a S di una stellina appena percettibile, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0806+0533	gx	08h06m38s	+05°33.2'		CMi	24"	buona / discreto	piccola e debolissima, rotonda con Ø < 20"; è osservabile in visione distolta a meno di 1' verso E di una debole stellina — 450x.
MAC 0807+0424A	gx	08h07m16s	+04°24.7'		CMi	24"	buona / discreto	molto piccola e debole, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 20"×10" o poco più e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a una 30-ina di secondi verso N — 450x.
MAC 0807+3900	gx	08h07m26s	+39°01.0'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme; solo a momenti appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0808+0238	gx	08h08m36s	+02°38.0'		CMi	24"	buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, piccola, rotonda con Ø non superiore a 15"; c'è una stellina abbastanza brillante a una 40-ina di secondi verso W — 450x.
MAC 0809+1927	gx	08h09m21s	+19°27.9'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0810+0515	gx	08h10m07s	+05°15.9'		CMi	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme; completa un piccolo arco formato con 4 stelline che si protende verso N; la visione è comunque molto disturbata dalla SAO 116427 di 8ª grandezza situata a 1' ENE; in visione distolta appare a tratti circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0810+0515A	gx	08h10m31s	+05°15.6'		CMi	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile (se non fosse disturbata dalla SAO 116427 di 8ª grandezza che non si riesce a tenere fuori campo), molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
MAC 0810+0523	gx	08h10m34s	+05°23.2'		CMi	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo uniforme orientato da NW a SE ed esteso una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 0812+1657	gx	08h12m43s	+16°57.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e in parte disturbata da una stella di 10ª grandezza situata a poco più di 1' NE; solo a momenti in visione distolta appare orientata da NE a SW, ma non riesco a valutarne le dimensioni che non sembrano comunque maggiori di 25"-30" — 450x.
MAC 0813+1658	gx	08h13m56s	+16°58.5'		Gem	24"	m. buona / buono	debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, a tratti orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0813+4551	gx	08h13m36s	+45°51.7'		Lyn	24"	m. buona / discreto	piccola, debolissima e poco diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20" c'è una stellina a 1' scarso verso E — 450x.
MAC 0813+5815	gx	08h13m59s	+58°15.0'		Lyn	28"	buona / buono	debole, molto piccola e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 0814+5812	gx	08h14m48s	+58°12.5'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
MAC 0814+5817	gx	08h14m25s	+58°17.9'		Lyn	28"	buona / buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" (o poco più) — 495x.
MAC 0814+5821A	st?	08h14m31s	+58°21.2'		Lyn	28"	buona / buono	nella posizione indicata si vede soltanto una stellina abbastanza brillante; non credo si tratti del nucleo della gx e comunque non ho notato la presenza di alcun alone attorno a essa — 495x.
MAC 0814+5822	gx	08h14m18s	+58°22.9'		Lyn	28"	buona / buono	molto debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 495x.
MAC 0814+5816	gx	08h14m45s	+58°16.8'		Lyn	16"	ottima / m. buono	assieme a MAC 0814+5823 forma una coppia di oggetti debolissimi e molto piccoli, di 15"-20" max di Ø e di aspetto simile che saltano fuori in visione distolta a 380x; la 1ª è situata 3' a N di UGC 4281; la 2ª si trova invece a 7' NW di UGC 4289.
MAC 0815+4116	gx	08h15m54s	+41°16.9'		Lyn	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×15"; c'è una stellina un paio di primi a W — 495x.
MAC 0816+5816	gx	08h16m32s	+58°16.9'		Lyn	28"	buona / buono	molto debole, piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 495x.
MAC 0814+5823	gx	08h14m57s	+58°23.0'		Lyn	16"	ottima / m. buono	v. **MAC 0814+5816**
MAC 0818+5635	gx	08h18m31s	+56°36.0'		Lyn	28"	buona / buono	molto piccola e debole, in visione distolta appare rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina subito a SW — 495x.
MAC 0818+5636	gx	08h18m31s	+56°36.5'		Lyn	28"	buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' SSW — 495x.
MAC 0818+5637	gx	08h18m39s	+56°37.1'		Lyn	28"	buona / buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N — 495x.
MAC 0818+5637A	gx	08h18m54s	+56°37.8'		Lyn	28"	buona / buono	è un altro debolissimo baffo orientato ortogonalmente alla precedente e pure esteso ~ 30" — 495x.
MAC 0818+5939	gx	0818m58s	+59°39.5'		UMa	28"	m. buona / buono	è un'elusiva lama di luce estesa sì e no una 30-ina di secondi e orientata da E a W, ma appare solo a momenti in visione distolta — 495x.
MAC 0817+0041	gx	08h17m11s	+00°41.1'		Hya	24"	discreta / m. buono	molto debole e piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, allungata da E a W con dimensioni 30"×15".
MAC 0819+5632	gx	08h19m05s	+56°32.0'		Lyn	28"	buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; un oggetto molto piccolo e diffuso situato a meno di 1' verso N è la **PGC 2540250** — 495x.
MAC 0820+5638	gx	08h20m10s	+56°38.9'		Lyn	28"	buona / buono	piccola, molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso S — 495x.
MAC 0821+5516	gx	08h21m29s	+55°16.0'		Lyn	28"	buona / buono	piccola, debole poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo quasi equilatero: le due componenti a NE e SSE si vedono facilmente, mentre quella a W è appena percettibile — 495x.
MAC 0821+6627	st?	08h21m46s	+66°27.5'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ridosso NW (si fatica un po' a tenere fuori campo la SAO 14518 di 6ª grandezza situata 7' a NE) — 450x.
MAC 0819+0428	gx	08h19m55s	+04°28.2'		Hya	24"	buona / discreto	molto debole e piccola, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 25"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0822+5616	gx	08h22m17s	+56°16.1'		Lyn	16"	ottima / m. buono	(altresì denominata **LEDA 139072**) — piccolissima, allungata da N a S, dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare visibile a 380x; un altro debolissimo "oggetto", visibile però solo a momenti in visione distolta a 380x, si trova 1.5' più a N, ma è di aspetto quasi stellare; da un controllo effettuato successivamente questa è risultata essere la **MAC 0822+561**.
MAC 0823+0730	gx	08h23m54s	+07°30.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata dalla SAO 116708 di magnitudo 8.5 situata 3' a NW; appare in visione distolta, ma ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0826+1720	gx	08h26m07s	+17°20.7'		Cnc	24"	buona / buono	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta a 450x e solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni ~ 20"×10"— 450x.
MAC 0826+4050	gx	08h26m33s	+40°50.6'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole, piccola e appena più brillante all'interno, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×15" — 495x.
MAC 0828+3024A	gx	08h28m26s	+30°24.5'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	molto piccola, con condensazione centrale stellare e Ø max di 20"; in visione distolta, a 380x, sembra lambire la stellina a Se.
MAC 0828+3024B	gx	08h28m44s	+30°24.3'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø di 30", poco diffusa e con nucleo stellare visibile a 380x.
MAC 0829+1505	gx	08h29m15s	+15°05.2'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, a tratti condensata, rotonda con Ø di 15"-20" — 450x.
MAC 0829+7011	st?	08h29m51s	+70°11.1'		UMa	24"	ottima / ottimo	debolissima, approssim. circolare con Ø grosso modo di 20"-25"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0830+3954	gx	08h30m19s	+39°54.3'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	molto piccola, appare a tratti elusivamente a ~ di 1' NE di UGC 4441 — 360x.
MAC 0831+3940	gx	08h31m44s	+39°40.2'		Lyn	28"	m. buona / buono	piccola, debole, diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a W. Una sorta di debolissimo nodulo appare a momenti a ridosso W, quasi volesse "allungarla": da un controllo effettuato si tratta in effetti di **2MASS 08314342+3940080** — 495x.
MAC 0831+3941	gx	08h31m42s	+39°41.0'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0832+3021A	gx	08h32m39s	+30°21.7'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	appare solo a momenti come una stellina appena percettibile a ridosso N di CGCG 149-46 — 450x.
MAC 0833+0009	gx	08h33m08s	+00°09.7'		Hya	24"	buona / m. buono	molto piccola e debolissima, tuttavia, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, a 400x, a ridosso S di una stellina; a 570x appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 20"×10".
MAC 0833+4115	gx	08h33m22s	+41°15.3'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, estesa 12"-15", appare in visione distolta quasi a ridosso ESE di UGC 4465 — 360x.
MAC 0833+4117	gx	08h33m01s	+41°17.9'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	piccola e molto debole, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una debole stellina subito a SE e una più evidente a 1' N; una brillante si trova a 1.5' verso E — 291x.
MAC 0834+4116	gx	08h34m24s	+41°16.0'		Lyn	28"	m. buona / buono	è un piccolo ed elusivo baffo di luce esteso non più di 20" e orientato da E a W; c'è una stella brillante un paio di primi a NW, una debole alla stessa distanza verso ENE e una appena percettibile subito a 1' WSW — 495x.
MAC 0835+1236	gx	08h35m09s	+12°36.6'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo esteso meno di 20", appare abbastanza facilmente in visione distolta ~ 1' a E di una debole stellina — 450x.
MAC 0835+3954	gx	08h35m28s	+39°55.0'		Lyn	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0835+3954A	gx	08h35m48s	+39°54.1'		Lyn	28"	m. buona / buono	piccola, debole e poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 20"×10" e con tenue condensazione centrale — 495x.
MAC 0835+3955	gx	08h35m36s	+39°55.8'		Lyn	28"	m. buona / buono	è un elusivo baffo di luce esteso sì e no una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare in visione distolta a 1' N di una stellina — 495x.
MAC 0836+4722	gx	08h36m45s	+47°22.4'		UMa	28"	m. buona / buono	forma una coppia serrata con **MCG+8-16-17** situata a ridosso SE (v. voce corrispondente).
MAC 0837+2452	gx	08h37m25s	+24°52.8'		Cnc	24"	m. buona / buono	debolissima, in visione distolta appare a momenti molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10", ma tutto sommato è meglio scalare a 340x.
MAC 0838+1934	gx	08h38m26s	+19°35.1'		Cnc	24"	ottima / molto buono	è un elusivo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; appare a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0838+2453A	gx	08h38m05s	+24°53.5'		Cnc	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta subito a NW di CGCG 120-11, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
MAC 0838+2514	gx	08h38m46s	+25°14.2'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 12"-15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SE — 450x.
MAC 0838+2519	gx	08h38m01s	+25°19.6'		Cnc	24"	ottima / molto buono	piccola, molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile; forma una coppia ravvicinata con CGCG 120-10 situata 1' scarso più a E — 450x.
MAC 0841+6628	gx	08h41m48s	+66°28.8'		UMa	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 311-12 situata un paio di primi a SSW — 450x.
MAC 0842+4041	gx	08h42m04s	+40°41.3'		Lyn	20"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso W — 360x.
MAC 0843+1142	gx	08h43m24s	+11°42.7'		Cnc	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole situata tra una stellina brillante a NE (che ne offusca un po' la visione) e una più debole dalla parte opposta *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
MAC 0843+3734	gx	08h43m19s	+37°34.5'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	appare solo come una debole stellina appena sfuocata — 450x.
MAC 0843+6458	gx	08h43m15s	+64°58.2'		UMa	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0843+6756	gx	08h43m02s	+67°56.5'		UMa	24"	ottima / ottimo	debole, piccola diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è più facile di CGCG 311-13 situata 2.5' a ENE — 450x.
MAC 0844+0946	gx	08h44m59s	+09°46.7'		Cnc	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0844+4259	gx	08h44m12s	+42°59.5'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	piccola e debolissima, appare in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (forma un triangolo rettangolo con una stellina a 3' NW e una a 2' verso N) — 291x.
MAC 0845+2610	gx	08h45m55s	+26°10.1'		Cnc	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
MAC 0845+4116	gx	08h45m19s	+41°16.3'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 291x.
MAC 0845+4433	gx	08h45m50s	+44°33.1'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto piccola, debole poco diffusa e condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stella brillante a un paio di primi verso NW — 495x.
MAC 0846+4709	gx	08h46m20s	+47°09.1'		UMa	28"	m. buona / buono	forma una coppia serrata con **CGCG 237-18** situata a ridosso N — molto piccola e più compatta della compagna, a tratti orientata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con un nucleo stellare abbastanza evidente — 495x.
MAC 0846+4820	gx	08h46m13s	+48°20.9'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e un nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' SW e una di luminosità uguale a 1.5' verso NW — 495x.
MAC 0847+1857	gx	08h47m40s	+18°57.5'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0847+1902A	gx	08h47m49s	+19°02.8'		Cnc	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, non ne capisco la forma, ma dovrebbe essere estesa una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0847+3932	gx	08h47m59s	+39°32.3'		Lyn	28"	m. buona / buono	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1.5' verso E; la galassietta non sembra disturbata dalla SAO 61054 di 8ª grandezza situata 3.5' a N (e che si fatica a tenere fuori campo) — 495x.
MAC 0848+7402	gx	08h48m24s	+74°02.3'		Cam	20"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' N di una debole stellina, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 360x.
MAC 0849+4145	gx	08h49m19s	+41°45.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione NW-SE; appare in visione distolta a circa 1' W di UGC 4615 — 495x.
MAC 0850+1214	gx	08h50m27s	+12°14.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, di forma indistinta, ma comunque non più estesa di 20"; appare in visione distolta tra due stelline orientate da NE a SW e distanti un paio di primi — 450x.
MAC 0850+4248	gx	08h50m57s	+42°48.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione centrale visibile a momenti — 495x.
MAC 0851+1223	gx	08h51m09s	+12°23.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, appare facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 0851+4147	gx	08h51m50s	+42°47.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW (fa parte di una losanga di 4 componenti orientata da NE a SW) — 495x.
MAC 0852+1816	gx	08h52m56s	+18°16.7'		Cnc	24"	ottima / buono	molto debole, sembra a prima vista aggettare da una stellina abbastanza brillante, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0853+0020	gx	08h53m59s	+00°21.0'		Hya	24"	m. buona / ottimo	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S osservabile solo in visione distolta a 450x; c'è una stellina quasi a ridosso W.
MAC 0853+1809	gx	08h53m46s	+18°09.3'		Cnc	24"	ottima / buono	debolissima e disturbata da una stella brillante situata 1.5' a W, forse rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0853+3509B	gx	08h53m54s	+35°09.0'		Lyn	16"	m. buona / ottimo	è una sorta di appendice irrisolta che aggetta verso N da UGC 4653 e che conferisce a quest'ultima un aspetto irregolare; è difficile comunque da separare anche a 380x.
MAC 0854+1808	gx	08h54m38s	+18°08.2'		Cnc	24"	ottima / buono	debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 20-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina molto debole a 1' scarso NW — 450x.
MAC 0854+6753	gx	08h54m09s	+67°53.9'		UMa	24"	ottima / ottimo	debolissima, molto piccola e diffusa, appare in visione distolta a ridosso S di CGCG 311-21 — 450x.
MAC 0856+1101	gx	08h56m31s	+11°02.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 61-27**
MAC 0856+1325	gx	08h56m04s	+13°25.3'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza diffusa forse circolare con Ø di 20" o poco più; c'è una debole stellina quasi a ridosso SW e un'altra più evidente a 1' sempre verso SW — 450x.
MAC 0857+3920	gx	08h57m00s	+39°20.0'		Lyn	20"	m. buona / mediocre	molto debole, a tratti in visione distolta appare chiaramente orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' SSE — 360x.
MAC 0859+4909	gx	08h59m34s	+49°09.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' scarso SSW — 495x.
MAC 0900+1649	gx	09h00m01s	+16°49.5'		Cnc	24"	buona / ottimo	è un debolissimo alone molto piccolo che aggetta verso N dalla più occidentale di una coppia di stelline ravvicinate; non è comunque più estesa di 15" o 20" — 450x.
MAC 0900+4919	gx	09h00m51s	+49°19.3'		UMa	28"	m. buona / buono	è un tenuissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi che si diparte a N di una stellina — 495x.
MAC 0901+1428	gx	09h01m29s	+14°28.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, poco diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 450x.
MAC 0901+4918	gx	09h01m35s	+49°18.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è poco più di una stellina sfuocata, estesa sì e no 10", appare facilmente in visione distolta a 1' SE di MCG+8-17-15; c'è una stellina visibile a momenti subito a W — 495x.
MAC 0901+4921	gx	09h01m26s	+49°21.3'		UMa	28"	m. buona / buono	anche questa è debolissima e molto piccola, ma in visione distolta appare abbastanza facilmente orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MAC 0902+0336	gx	09h02m14s	+03°36.8'		Hya	24"	m. buona / buono	molto debole, ma soprattutto molto disturbata da due stelle brillanti distanti un paio di primi in mezzo alle quali si trova; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0902+1426	gx	09h02m53s	+14°26.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	baffo di luce molto tenue, di luminosità uniforme, esteso poco più di 20" e orientato da NE a SW; è facilmente osservabile in visione distolta a 450x.
MAC 0902+1656	gx	09h02m45s	+16°56.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	un altro un baffo di luce molto debole e di luminosità uniforme, esteso una 30" e orientato da NE a SW; appare solo in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 0902+2237	gx	09h02m34s	+22°37.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso S — 450x.
MAC 0903+1000	gx	09h03m17s	+10°00.9'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	è un nodulo diffuso appena percettibile che a 570x sembra a tratti aggettare a S di UGC 4748.
MAC 0903+1440	gx	09h03m27s	+14°40.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; poco meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 0903+1653	gx	09h03m15s	+16°53.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; allineata ed equidistante con due stelline a N — 450x.
MAC 0903+1739	gx	09h03m08s	+17°39.6'		Cnc	24"	buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una debole stellina quasi a ridosso NE.
MAC 0903+1741	gx	09h03m04s	+17°41.6'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola, a tratti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 0903+4632	gx	09h03m50s	+46°32.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato come la successiva (osservata per prima) — 495x.
MAC 0903+4636	gx	09h03m46s	+46°36.4'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce, a tratti appare orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; situata tra 2 stelline distanti 2.5' in direzione N-S — 495x.
MAC 0904+1337	gx	09h04m30s	+13°37.1'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x, piccola, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0904+4203	gx	09h04m41s	+42°03.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20.10. Forma una coppia ravvicinata con **KUG 901+422** situata subito a S — 495x.
MAC 0904+4633	gx	09h04m16s	+46°33.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una debole stellina a 1.5' SE — 495x.
MAC 0905+1812A	gx	09h05m16s	+18°12.1'		Cnc	24"	buona / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa 12"-15", poco disturbata da una coppia di stelline abbastanza brillanti a SE e SW — 450x.
MAC 0906+4121	gx	09h06m52s	+41°21.1'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola, diffusa e molto debole, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20" — 495x.
MAC 0907+4035	gx	09h07m18s	+40°35.8'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	piccola, molto debole e poco diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni di 20"×15" — 291x.
MAC 0909+1930	gx	09h09m35s	+19°30.5'		Cnc	24"	ottima / buono	debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MAC 0910+2033	gx	09h10m29s	+20°34.0'		Cnc	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 121-33** situata a ridosso S; a 340x tendono a prima vista a fondersi insieme in un unico oggetto orientato da N a S, mentre a 450x si riescono a separare abbastanza facilmente; le due galassiette sono molto piccole, estese < 20"; la MAC è stranamente più facile.
MAC 0912+4457	gx	09h12m20s	+44°57.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	è un elusivo nodulo che appare solo a momenti al bordo E di **NGC 2776** — 495x.
MAC 0913+1900	gx	09h13m44s	+19°00.8'		Cnc	24"	buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con due stelline a SE — 450x.
MAC 0914+0734	gx	09h14m28s	+07°34.5'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, solo a momenti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni approssim. 20"×10"; è comunque un po' disturbata da una stellina brillante situata 15' a NW — 450x.
MAC 0914+1902	gx	09h14m19s	+19°02.0'		Cnc	24"	buona / ottimo	piccola e debolissima, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0915+1008	gx	09h15m46s	+10°08.8'		Ari	24"	buona / buono	debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e condensata — 450x.
MAC 0915+1742	gx	09h15m41s	+17°42.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	è debole, ma facile da vedere, in quanto abbastanza compatta; orientata da N a S con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme (situata 7' a SE di CGCG 91-35) — 450x.
MAC 0915+2220	gx	09h15m06s	+22°20.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 340x.
MAC 0916+0017	gx	09h16m09s	+00°17.8'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
MAC 0916+0708	gx	09h16m02s	+07°08.2'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-15".
MAC 0916+1747	gx	09h16m20s	+17°47.6'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" (situata 4' a N di NGC 2797 osservata col 16" in altra data) — 450x.
MAC 0916+1955	gx	09h16m27s	+19°55.2'		Cnc	24"	ottima / buono	è un elusivo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; appare solo a momenti in visione distolta a ridosso N di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0916+4937	gx	09h16m10s	+49°37.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa < 40"; è osservabile solo a tratti in visione distolta subito a N di una stellina abbastanza brillante — 495x.
MAC 0916+4938	gx	09h16m18s	+49°38.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
MAC 0918+2017	gx	09h18m02s	+20°17.9'		Cnc	24"	ottima / buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni di 45"×30" — 450x.
MAC 0919+0057	gx	09h19m59s	+00°57.6'		Hya	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, visibile in visione distolta a 450x; a tratti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina subito a N.
MAC 0920+0809	gx	09h20m08s	+08°09.0'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	debole, ma più che altro disturbata dalla SAO 117594 di 8ª grandezza situata 3' a NW; è poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0920+2644	gx	09h20m01s	+26°44.4'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina debolmente sfuocata a 1' scarso SE di CGCG 151-61 — 450x.
MAC 0920+3918	gx	09h20m37s	+39°18.6'		Lyn	28"	m. buona / discreto	piccolo e debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 20-ina di secondi (situata poco più di 1' a WSW di NGC 2838) — 495x.
MAC 0920+3921	gx	09h20m52s	+39°21.3'		Lyn	28"	m. buona / discreto	baffo di luce molto tenue esteso < 30" e orientato da NW a SE; è disturbato da una stella brillante a ridosso S, mentre una più debole si trova subito a E — 495x.
MAC 0922+0844	gx	09h22m45s	+08°44.9'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa e con nucleo stellare appena percettibile; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
MAC 0922+2241	gx	09h22m56s	+22°41.2'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 450x.
MAC 0923+2219	gx	09h23m26s	+22°19.0'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e compatta, rotonda con Ø < 30" ed evidente condensazione centrale — 450x.
MAC 0923+2219A	gx	09h23m27s	+22°19.6'		Leo	24"	m. buona / buono	poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
MAC 0923+2241	gx	09h23m07s	+22°41.5'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0923+2426	gx	09h23m32s	+24°26.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 0923+2426A	gx	09h23m39s	+24°26.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	è un piccolo e debolissimo baffo di luce esteso sì e no 20" e orientato da N a S; si osserva in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 0923+2428A	gx	09h23m30s	+24°28.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 0924+2209	gx	09h24m49s	+22°09.0'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; situata tra due stelline abbastanza brillanti orientate nello stesso modo — 450x.
MAC 0924+2219	gx	09h24m04s	+22°19.5'		Leo	24"	m. buona / buono	a prima vista pare poco più evidente di CGCG 121-79, dalla quale dista 45" verso SE, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e piccola condensazione centrale — 450x.
MAC 0924+2500	gx	09h24m32s	+25°00.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, appare in visione distolta subito a W di una debole stellina — 450x.
MAC 0925+0214	gx	09h25m42s	+02°14.4'		Hya	24"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza uniforme orientata da N a S e di dimensioni grosso modo 30"×15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva NGC 2877 situata a poco più di 1' SE; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
MAC 0925+1118	gx	09h25m35s	+11°19.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0925+2222	gx	09h25m50s	+22°22.1'		Leo	24"	m. buona / buono	assieme alla successiva forma una coppia ravvicinata situata 3.5' a NE della coppia CGCG 121-87 -9; sono molto piccole e si sdoppiano con facilità anche a 340x; la 1ª è più evidente, relativamente compatta, orientata da NE a SW e con dimensioni 20"×10"; la 2ª è invece un debolissimo oggetto rotondo con Ø max di 15" e di luminosità uniforme — 570x.
MAC 0925+2222A	gx	09h25m51s	+22°22.2'		Leo	24"	m. buona / buono	v. **MAC 0925+2222**
MAC 0925+4920	gx	09h25m54s	+49°20.2'		UMa	24"	discreta / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 238-53 situata una 40-ina di secondi a SW e facilmente separabile a 450x — debole e diffusa, con nucleo stellare evidente, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la CGCG è orientata da WNW a ESE, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso SSW.
MAC 0925+4926	gx	09h25m54s	+49°26.0'		UMa	24"	discreta / m. buono	appare elusivamente a ridosso NW di CGCG 238-54, ma solo a momenti a 450x e con l'aspetto di una stellina sfuocata.
MAC 0926+1741	gx	09h26m43s	+17°41.2'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, appare elusivamente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso E (fa parte dell'ammasso **AGC 797**).
MAC 0926+4916	gx	09h26m13s	+49°16.1'		UMa	24"	discreta / m. buono	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta a 450x; dovrebbe essere molto piccola, ma non riesco a capire com'è fatta.
MAC 0927+2130	gx	09h27m33s	+21°31.1'		Leo	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.

MAC 0927+4433	gx	09h27m46s	+44°33.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto piccola e molto debole, relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 0928+1287	gx	09h28m37s	+12°27.5'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e relativamente compatta, molto disturbata dalla SAO 98594 di 6ª grandezza situata 4.5 a S e che si fatica a tenere fuori campo; è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0929+2126	gx	09h29m38s	+21°26.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccolo e debolissimo oggetto esteso sì e no una 10-ina di secondi; allineato verso N con 3 stelline ravvicinate — 450x.
MAC 0930+2123	gx	09h30m00s	+21°23.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0930+6742	gx	09h30m25s	+67°42.4'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza molto diffusa, grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 450x.
MAC 0930+7425	gx	09h30m47s	+74°26.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma non è più estesa di una decina di secondi (fa parte del terzetto di MCG+12-9-52) — 450x.
MAC 0935+2344	gx	09h35m43s	+23°44.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma; non dovrebbe comunque essere più estesa di 20" — 450x.
MAC 0937+4829	gx	09h37m09s	+48°29.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo baffo di luce che appare a tratti in visione distolta, orientato da NE a SW ed esteso una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 0938+4831	gx	09h38m28s	+48°31.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, salta fuori a fatica in visione distolta in una piccola zona depleta; non sembra più estesa di 20" — 495x.
MAC 0940+1130	gx	09h40m31s	+11°30.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è un tenuissimo nodulo di una decina di secondi di Ø appare a momenti in visione distolta a ridosso N di CGCG 63-31 — 450x.
MAC 0940+1647	gx	09h39m57s	+16°47.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 92-25**
MAC 0941+2349	gx	09h42m00s	+23°49.1'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole e piccola, leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0942+2339	gx	09h42m27s	+23°39.2'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x; c'è una stellina a 1' NE e una abbastanza brillante a 1.5' verso N.
MAC 0942+2554	gx	09h42m19s	+25°54.6'		Leo	24"	buona / buono	debolissima e molto piccola, solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S ed estesa una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0943+2244	gx	09h43m39s	+22°44.2'		Leo	24"	buona / m. buono	piccola e debolissima, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S — 450x.
MAC 0943+2246	gx	09h43m41s	+22°46.9'		Leo	24"	buona / m. buono	appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso S di CGCG 122-64, a tratti allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MAC 0943+3928	gx	09h43m42s	+39°28.1'		LMi	28"	m. buona / discreto	molto piccola e molto debole, estesa sì e no 10"-12" — 495x.
MAC 0943+3932	gx	09h43m17s	+39°32.8'		LMi	28"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole che aggetta a N di una stellina abbastanza brillante per una 40-ina di secondi — 495x.
MAC 0944+0249	gx	09h44m18s	+02°49.6'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina brillante a 1' SE; meglio evidente forzando a 580x.
MAC 0944+2434	gx	09h44m50s	+24°34.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
MAC 0945+0700	gx	09h45m20s	+07°00.0'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0946+0905	gx	09h46m06s	+09°05.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø con < 20" e una condensazione stellare evidente (situata 6' a SW di CGCG 63-61) — 450x.
MAC 0946+2129	gx	09h46m28s	+21°29.8'		Leo	24"	buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
MAC 0946+2135	gx	09h46m44s	+21°35.4'		Leo	24"	buona / buono	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 450x.
MAC 0947+2017	gx	09h47m53s	+20°17.1'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0947+2022	gx	09h47m56s	+20°22.3'		Leo	24"	buona / m. buono	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione NW-SE, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0947+3330	gx	09h47m01s	+33°30.7'		LMi	24"	buona / buono	debolissima, piccola e diffusa, salta in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0948+0045	gx	09h48m05s	+00°45.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e solo a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0948+2526	gx	09h48m53s	+25°26.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0948+2529	gx	09h48m44s	+25°29.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	appare solo come una stellina appena percettibile situata quasi a ridosso NW di CGCG 122-92 — 450x.
MAC 0952+0059	gx	09h52m33s	+00°59.0'		Sex	24"	buona / ottimo	debolissimo oggetto esteso per max 15", appare in visione distolta a 400x.
MAC 0953+1924	gx	09h53m05s	+19°24.8'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e poco diffusa, rotonda con Ø < 20"; appare facilmente in visione distolta a 1' WNW di una stellina — 450x.
MAC 0953+1926	gx	09h53m03s	+19°26.5'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; in visione distolta sembra interagire con NGC 3040 situata a ridosso verso SSE — 450x.
MAC 0953+2413	gx	09h53m30s	+24°13.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, estesa sì e no 12"-15"; salta fuori in visione distolta a 1' S di CGCG 123-2 — 450x.
MAC 0954+1036	gx	09h54m10s	+10°36.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è un oggetto diffuso molto piccolo orientato da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10"; appare facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 63-101 situata 1' a W — 450x.
MAC 0954+1627	gx	09h54m58s	+16°27.5'		Leo	24"	buona / ottimo	appare come una debolissima stellina nebulosa a ridosso NE di NGC 3048 — 450x.
MAC 0956+0345	gx	09h56m51s	+03°45.0'		Sex	24"	ottima / buono	debolissima e di forma indistinta, appare in visione distolta a 450x, ma non è comunque più estesa di 15"-20".
MAC 0956+1111	gx	09h56m42s	+11°11.7'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole, a tratti appare poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0957+0155	gx	09h57m20s	+01°55.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo lucore approssim. circolare, esteso una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; situata tra due stelline appena percettibili a NW e SE — 450x.
MAC 0958+1303	gx	09h59m00s	+13°03.1'		Leo	24"	buona / ottimo	molto debole, ma osservabile senza problemi in visione distolta a 570x; è rotonda con Ø simile alla precedente.
MAC 0959+1302	gx	09h59m03s	+13°02.3'		Leo	24"	buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo, con Ø di 10"-15"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 570x; c'è una stellina brillante a 1' Ne.
MAC 1000+0032	gx	10h00m32s	+00°32.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1001+0337	gx	10h01m34s	+03°37.5'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, debolissima e diffusa, appare senza grosse difficoltà in visione distolta a 1' scarso NW di CGCG 36-22; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 15"-20" — 450x.
MAC 1002+1314	gx	10h02m36s	+13°14.3'		Leo	24"	m. buona / buono	appare elusivamente subito a S di una stellina abbastanza brillante, ma non bisogna scendere sotto i 450x; forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1003+0027	gx	10h03m06s	+00°27.2'		Sex	24"	ottima / buono	molto debole, piccola e solo a momenti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma un piccolo triangolo con 2 stelline a NE — 450x.
MAC 1003+0225	gx	10h03m52s	+02°25.6'		Sex	24"	buona / ottimo	elusivo oggetto rotondo, molto piccolo, esteso 10" o 15" e che appare ogni tanto a ridosso verso S di una stellina.
MAC 1003+1315	gx	10h03m26s	+13°15.0'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta subito a SE di una debole stellina, poco diffusa, approssim. rotonda con di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1003+2215	gx	10h03m59s	+22°15.8'		Leo	16"	ottima / m. buono	è un debolissimo oggetto diffuso esteso 15"o 20" che appare a momenti a una 40-ina di secondi verso S di UGC 5420 — 270x.
MAC 1004+0147	gx	10h04m33s	+01°47.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
MAC 1004+1412	gx	10h04m05s	+14°12.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	è un elusivo baffo di luce che solo a momenti appare orientato da NW a SE ed esteso sì e no 30"; meglio comunque non scendere sotto i 450x.
MAC 1004+4643	gx	10h04m56s	+46°43.5'		UMa	28"	m. buona / buono	appare elusivamente a 1.5' E di CGCG 240-3, molto piccola, non più estesa di 15" — 495x.
MAC 1005+0037B	gx	10h05m46s	+00°38.0'		Sex	16"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con IC 590 situata a ridosso verso W; in visione distolta appaiono i 2 nuclei stellari ravvicinati immersi in un alone esteso ~ 40"; le singole galassie sembrano rotonde con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
MAC 1005+1142	gx	10h05m26s	+11°42.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	appare elusivamente a 1' SE di CGCG 64-53 ma non riesco a capirne la forma; non sembra comunque più estesa di 15" — 450x.
MAC 1006+1417	gx	10h06m44s	+14°17.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma si vede facilmente in visione distolta quando si osserva la CGCG 93-45 situata un paio di primi scarsi a NNE; è molto piccola e appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1007+1227	gx	10h07m51s	+12°27.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' SSW — 450x.
MAC 1008+1229	gx	10h08m14s	+12°29.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1009+1408	gx	10h09m21s	+14°08.2'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1010+2305	gx	10h10m50s	+23°05.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' W di una stellina, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; un'altra stellina appena percettibile si trova subito a S — 450x.
MAC 1011+0838	gx	10h11m19s	+08°38.8'		Leo	24"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione distolta quasi a ridosso W di una stellina — 450x.
MAC 1011+1120	gx	10h11m45s	+11°20.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1011+4311	gx	10h11m28s	+43°11.8'		UMa	28"	m. buona / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a un paio di primi verso W — 495x.
MAC 1012+0320	gx	10h12m03s	+03°20.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1012+2305	gx	10h12m06s	+23°05.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	è una sorta di piccolo "grumo" esteso 10"-15" che appare elusivamente e a tratti a ridosso NE di UGC 5498 — 450x.
MAC 1013+1121	gx	10h13m28s	+11°21.9'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma più che altro disturbata da una coppia di stelle brillanti situate 1.5' a SSW e 2' ESE; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MAC 1013+1236	gx	10h13m20s	+12°36.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente brillante e compatta, molto piccola, rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
MAC 1014+1234	gx	10h14m58s	+12°34.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	appare elusivamente come una stellina appena percettibile subito a NW di MAC 1015+1233 — 450x.
MAC 1014+4056	gx	10h14m27s	+40°56.7'		LMi	28"	m. buona / buono	debolissima chiazza estesa una 40-ina di secondi in direzione N-S, con una stellina quasi a ridosso NNE — 495x.
MAC 1015+1233	gx	10h15m01s	+12°33.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, estesa non più di 15"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina a ridosso W e una molto debole subito a S; una 3a stellina percettibile solo a momenti appare elusivamente a NW, ma questa è in realtà la MAC 1014+1234.
MAC 1015+1352	gx	10h15m36s	+13°52.5'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissimo baffo esteso sì e no 30" e orientato da NW a SE; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina quasi a ridosso NE — 450x.
MAC 1015+2115	gx	10h15m25s	+21°15.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	rimane di aspetto quasi stellare anche a 450x, di fatto estesa solo pochi secondi; non sembra gran che disturbata dalla SAO 81254 situata 1' più a S — 7' a NE di UGC 5529.
MAC 1015+3929	gx	10h15m06s	+39°29.9'		LMi	28"	m. buona / buono	piccola e debolissima chiazza che sembra aggettare a S di una brillante stella di 10a grandezza (questa stella ha una compagna della stessa luminosità a 1.5' NE); non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20"-25" — 495x.
MAC 1016+0335	gx	10h16m28s	+03°35.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	di aspetto simile a CGCG 36-78 — osservata subito prima e dalla quale dista 6' scarsi a SE — come dimensioni e luminosità; è tuttavia un po' disturbata dalla SAO 118193 di 8ª grandezza situata 4.5' a SW e che non si riesce a tenere fuori campo a 450x.
MAC 1016+4108	gx	10h16m23s	+41°08.5'		LMi	28"	m. buona / ottimo	appare come una stellina sfuocata molto debole, situata a ridosso N di una abbastanza brillante (che è la più occidentale di un piccolo triangolo formato da 4 componenti) — 495x.
MAC 1019+1315	gx	10h19m42s	+13°15.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; presenta un nucleo quasi stellare molto tenue, ma visibile solo a momenti (situata verso la zona SE di un gruppo di una decina di stelline brillanti che paiono un piccolo ammasso aperto molto disperso) — 450x.
MAC 1019+2117	gx	10h19m40s	+21°17.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' WNW (la componente più luminosa di un piccolo triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta a S) — 450x.
MAC 1020+2419	gx	10h20m38s	+24°19.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale molto tenue — 450x.
MAC 1020+4252	gx	10h20m48s	+42°52.0'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S, di luminosità uniforme e che in visione distolta appare estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso S — 495x.
MAC 1021+1300	gx	10h21m26s	+13°00.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø < 20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina brillante a 1' S.
MAC 1021+1547	gx	10h21m38s	+15°47.2'		Leo	24"	ottima / buono	debolissima, ma più che altro disturbata da una stella brillante situata subito a SW; in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MAC 1021+4253	gx	10h21m12s	+42°53.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e condensata, poco più di una stellina debolmente sfuocata, rotonda con Ø di 10"-12"; un po' disturbata da una stellina brillante a 1' verso E — 495x.
MAC 1022+1429	gx	10h22m06s	+14°29.3'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, a tratti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1022+1454	gx	10h22m32s	+14°54.2'		Leo	24"	m. buona / discreto	è un elusivo baffo esteso una 30-ina di secondi in direzione NE-SW; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1022+1456	gx	10h22m30s	+14°56.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola, debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1022+1456A	gx	10h22m37s	+14°56.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	galassietta molto piccola, relativamente compatta e condensata, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1022+1537	gx	10h22m25s	+15°37.7'		Leo	24"	ottima / buono	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi e orientata da NE a SW; appare a tratti in visione distolta subito a W di una coppia di deboli stelline, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 1022+1545	gx	10h22m29s	+15°45.2'		Leo	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con **CGCG 94-17** — 450x.
MAC 1022+1746A	gx	10h22m04s	+17°46.8'		Leo	24"	m. buona / buono	è un debolissimo baffo di luce che aggetta a SW di una stellina per una 30-ina di secondi; occorre tuttavia non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 1022+1947	gx	10h22m47s	+19°47.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 94-22 situata subito a W; è debolissima e di aspetto più uniforme della compagna forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1022+2034	gx	10h22m04s	+20°35.0'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola, debole e condensata, grosso modo rotonda con Ø di una decina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
MAC 1022+2414	gx	10h22m09s	+24°14.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa, approssim. rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1022+2436	gx	10h22m54s	+24°36.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare facilmente nonostante la vicinanza della SAO 81318 situata 3' a W, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1022+4343	gx	10h22m23s	+43°43.1'		UMa	28"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a poco più di 1' NW di una stellina, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MAC 1022+7412	gx	10h22m05s	+74°12.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare a momenti in visione distolta a 450x tra 2 stelline molto deboli orientate da NE a SW (quella a SW costituisce il vertice nord-orientale del piccolo rombo situato a ridosso N della 3183); probabilmente rotonda con Ø di 15"-20".
MAC 1023+1054	gx	10h23m04s	+10°54.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1023+1303	gx	10h23m23s	+13°03.3'		Leo	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono 3 deboli stelline allineate da N a S subito a W (quella più a S è appena percettibile) — 450x.
MAC 1023+1501	gx	10h23m17s	+15°01.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, forse circolare con Ø di 20" o poco più — 450x.
MAC 1023+1821	gx	10h23m11s	+18°21.2'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline a S e SE — 450x.
MAC 1023+2001	gx	10h23m22s	+20°01.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1023+2059	gx	10h23m50s	+20°59.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1023+5703	gx	10h23m58s	+57°03.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1024+1244	gx	10h24m04s	+12°44.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1024+1700	gx	10h24m18s	+17°00.0'		Leo	24"	ottima / buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1024+1713	gx	10h24m59s	+17°13.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 1' E di una stellina; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20" (situata 1' a W di CGCG 94-40) — 450x.
MAC 1025+0931	gx	10h25m05s	+09°32.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce estesa non più di 30" e orientata da N a S; appare solo a momenti in visione distolta, ma ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1025+7010	gx	10h25m19s	+70°10.3'		UMa	24"	buona / m. buono	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; ci sono 2 deboli stelline quasi a ridosso rispettivamente NE e SE (quest'ultima si vede solo a tratti) — 450x.
MAC 1026+0414	gx	10h26m03s	+04°14.8'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1026+1102A	gx	10h26m14s	+11°02.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1026+4535	gx	10h26m18s	+45°35.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccolo baffo molto tenue, orientato da NE a SW ed esteso una 20-ina di secondi; un nucleo stellare appare solo a momenti (presenza di chiarore lunare) — 495x.
MAC 1027+0956	gx	10h27m45s	+09°56.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1027+1657	gx	10h27m25s	+16°57.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina molto debole subito a SE — 450x.
MAC 1027+6826	gx	10h27m24s	+68°26.5'		UMa	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta a 450x; c'è una stellina una 40-ina di secondi a SW.
MAC 1027+7845	gx	10h20m35s	+78°45.4'		Dra	20"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, salta fuori a tratti in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1028+4021	gx	10h28m58s	+40°21.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, difficile perché situata in una piccola zona depleta, forse rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
MAC 1028+5715	gx	10h28m10s	+57°15.5'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo esteso una decina di primi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 1028+7349	gx	10h28m55s	+73°49.2'		Dra	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; è situata in mezzo a 2 stelline orientate da ENE a WSW e distanti 3' — 450x.
MAC 1029+0155	gx	10h29m41s	+01°55.9'		Sex	24"	m. buona / buono	debolissimo oggetto, molto piccolo e a tratti condensato; appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 5694 situata una 40-ina di secondi più a S — 450x.
MAC 1029+1518	gx	10h29m54s	+15°18.6'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, poco diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
MAC 1029+4020	gx	10h29m53s	+40°20.0'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 495x.
MAC 1029+4024A	gx	10h29m25s	+40°24.4'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di aspetto quasi stellare, non più estesa di 10"; c'è una stellina appena percettibile a 1' N — 495x.
MAC 1029+4028	gx	10h29m40s	+40°28.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccolo ed elusivo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi e orientato da NW a SE; salta fuori in visione distolta a poco più di 1' SW di CGCG 237-4 — 495x.
MAC 1031+0756	gx	10h31m22s	+07°56.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline a S e SE (una terza stellina più debole si trova tra le due) — 450x.
MAC 1031+4354	gx	10h31m43s	+43°55.0'		UMa	28"	m. buona / buono	è un piccolo baffo di luce molto debole e relativamente compatto, orientato da N a S ed esteso una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1031+4400	gx	10h31m14s	+44°00.0'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratti rotonda con Ø grosso modo di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1032+1152	gx	10h32m52s	+11°52.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-12"; purtroppo l'unico riferimento per scovarla è costituito da una stellina di 14-esima situata 2.5' a NW — 450x.
MAC 1032+1204	gx	10h32m54s	+12°04.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
MAC 1032+1205	gx	10h32m53s	+12°05.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	poco più facile della precedente, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
MAC 1032+1205A	gx	10h32m53s	+12°05.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente tra le due galassiette precedenti — con le quali forma un terzetto serrato orientato da N a S — ma è solo come una stellina debolmente sfuocata — 450x.
MAC 1032+1211	gx	10h32m44s	+12°11.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata 1.5' a NE di CGCG 65-50 — 450x.
MAC 1032+1948	gx	10h32m21s	+19°48.3'		Leo	24"	m. buona / buono	è un debolissimo baffo esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1032+1957	gx	10h32m36s	+19°57.5'		Leo	24"	ottima / buono	piccola chiazza molto stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelle a NE: quella più lontana è la SAO 81407 di 9ª grandezza che ne disturba l'osservazione — 450x.
MAC 1033+0747	gx	10h33m34s	+07°47.5'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, ma appare facilmente in visione distolta a 450x subito a S di CGCG 37-78, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1033+0754	gx	10h33m00s	+07°54.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; non è possibile osservarla a 450x poiché il campo è depleto — 340x.
MAC 1033+1152	gx	10h33m33s	+11°52.6'		Leo	24"	m. buona / buono	appare elusivamente come una stellina a ridosso N di IC 620, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1033+1201	gx	10h33m09s	+12°01.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata a poco più di 1' SW; non sembra più estesa di 10"-12" — 450x.
MAC 1033+1206	gx	10h33m02s	+12°06.2'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, molto piccola e relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 15"×10"
MAC 1033+1449	gx	10h33m47s	+14°49.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi; ci sono 2 stelline abbastanza brillanti a un paio di primi NE e SE — 450x.
MAC 1034+1103	gx	10h34m44s	+11°03.2'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina visibile solo a momenti a ridosso S; una coppia di stelline si trova subito a N (quella più vicina alla gx è più brillante) — 450x.
MAC 1034+1459	gx	10h34m26s	+14°59.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, solo a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; meglio evidente scalando a 340x.
MAC 1034+4012	gx	10h34m58s	+40°12.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline brillanti a 1' SW — 495x.
MAC 1034+6137A	gx	10h34m03s	+61°37.5'		UMa	16"	ottima / ottimo	assieme a MAC 1034+6137B forma una coppia oggetti molto piccoli ed elusivi, situati a 2' scarsi SW di CGCG 290-54; pur non riuscendosi a separare nemmeno a 380x appaiono a tratti in visione distolta a 380x come un unico oggetto di una 20-ina di secondi orientato da N a S.
MAC 1034+6137B	gx	10h34m03s	+61°37.3'		UMa	16"	ottima / ottimo	v. **MAC 1034+6137A**
MAC 1035+4047	gx	10h35m36s	+40°47.4'		UMa	28"	m. buona / buono	molto piccola e molto debole, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una debole stellina a 1' verso E — 495x.
MAC 1035+4445	gx	10h35m09s	+44°46.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a 1.5' verso W; è situata 1.5' a NE di CGCG 240-59 (presenza di chiarore lunare) — 495x.
MAC 1036+1319	gx	10h36m27s	+13°19.0'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, un po' disturbata da una stellina al bordo W; forzando a 580x appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10".
MAC 1036+1617	gx	10h36m38s	+16°17.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di 10"-12", situata a ridosso S di una stellina (la più meridionale di un piccolo triangolo molto aperto) — 450x.
MAC 1036+1618	gx	10h36m42s	+16°18.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente come una stellina debolmente sfuocata subito a E di una stellina — 450x.
MAC 1036+6028	gx	14h36m19s	+60°28.7'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa non più di 12"-15", salta fuori in visione distolta a una 40-ina di secondi NW di **MCG+10-21-18**; bisogna però stare attenti a non confonderla con la stellina appena percettibile situata a ridosso S — 495x.
MAC 1036+7238	gx	10h36m10s	+72°38.4'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a N — 450x.
MAC 1037+1118	gx	10h37m57s	+11°18.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø sì e no di 20" — 450x.
MAC 1037+1706	gx	10h37m13s	+17°06.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata in una zona localmente depleta: meglio scalare a 340x.
MAC 1037+3948	gx	10h37m48s	+39°48.8'		UMa	28"	m. buona / buono	è poco più evidente di MCG+7-22-32, dalla quale dista 8' a ENE, con Ø < 30" e una tenue condensazione centrale; c'è una coppia di stelline orientate da E a W subito a N. Un oggetto molto piccolo e debolissimo, esteso non più di 10" situato 1' a S è risultato essere la **2MASS 10374886+3947412** — 495x.
MAC 1037+3948	gx	10h37m48s	+39°48.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare abbastanza evidente; situata subito a S di una coppia di stelline orientate da E a W — 495x.
MAC 1037+4340	gx	10h37m39s	+43°40.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, appare elusivamente a ridosso di una coppia di stelline della stessa luminosità orientate da NW a SE; in visione distolta non sembra più estesa di 10"-12" (situata a 1.5' NE di CGCG 212-37) — 495x.
MAC 1038+1110	gx	10h38m51s	+11°10.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1038+3905	gx	10h38m25s	+39°05.5'		LMi	28"	ottima / ottimo	molto piccola e molto debole, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MAC 1038+3910	gx	10h38m31s	+39°10.0'		LMi	28"	ottima / ottimo	appare elusivamente in visione distolta, molto piccola, non più estesa di 10"-12" — 495x.
MAC 1038+4432	gx	10h37m55s	+44°32.6'		UMa	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 450x.
MAC 1038+4433	gx	10h38m28s	+44°33.6'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
MAC 1038+4722	gx	11h38m05s	+47°22.4'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1039+0512	gx	10h39m07s	+05°12.6'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte dell'ammasso **AGC 1066**) — 450x.
MAC 1039+1109	gx	10h39m09s	+11°09.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1039+4147	gx	10h39m58s	+41°47.5'		UMa	28"	m. buona / buono	debolissima, ma solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 495x.
MAC 1041+4010	gx	10h41m50s	+40°10.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	è un piccolo baffo di luce, molto debole ed esteso una 20-ina di secondi; salta fuori abbastanza facilmente tra due stelline orientate da NW a SE — 495x.
MAC 1042+1544	gx	10h42m02s	+15°44.2'		Leo	24"	m. buona / buono	debole, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MAC 1042+7655	gx	10h42m47s	+76°55.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MAC 1043+0645	gx	10h43m53s	+06°46.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con NGC 3349 situata subito a NW — 450x.
MAC 1043+1832	gx	10h43m50s	+18°32.7'		Leo	16"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, estesa non più di 20"-25", appare solo a momenti in visione distolta a 380x; c'è una stellina doppia con componenti sbilanciate un paio di primi a Se.
MAC 1044+0646	gx	10h44m18s	+06°46.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1044+1558	gx	10h44m14s	+15°58.3'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, diffusa e assai disturbata da una stellina brillante situatale a ridosso verso NW; probabilmente rotonda con Ø che in visione distolta non supera i 15" — 450x.
MAC 1044+3942	gx	10h44m18s	+39°42.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 1044+6024	gx	10h44m15s	+60°24.3'		UMa	24"	m. buona / buono	piccola e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1046+1313	gx	10h46m22s	+13°13.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; non dovrebbe comunque essere più estesa di 20"-30".
MAC 1046+3907	gx	10h46m08s	+39°07.9'		LMi	28"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a SW — 495x.
MAC 1048+0447	gx	10h48m38s	+04°47.9'		Sex	24"	m. buona / buono	elusiva, molto piccola, appare a tratti in visione distolta a 450x, ma non dovrebbe essere più estesa di 10"-15" — allineata ed equidistante con CGCG 38-17 e CGCG 38-19 entrambe a NW.
MAC 1048+1228A	gx	10h48m25s	+12°28.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 10-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso NE di una stellina — 450x.
MAC 1048+1254A	gx	10h48m29s	+12°54.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
MAC 1048+1444	gx	10h48m15s	+14°44.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MAC 1049+1550	gx	10h49m26s	+15°50.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, ma più che altro disturbata dalla SAO 99307 di 9a grandezza situata un paio di primi a NNW; in visione distolta appare come un'elusiva lama di luce orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MAC 1049+1616	gx	10h49m42s	+16°16.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	situata a ridosso NW di **CGCG 95-34**, è ancora più debole di quest'ultima, diffusa e di dimensione simile; c'è una stellina a 1' scarso NW — 450x.
MAC 1049+1617	gx	10h49m38s	+16°17.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
MAC 1050+0014	gx	10h50m23s	+00°14.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1050+0845	gx	10h50m26s	+08°45.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, appare a momenti in visione distolta tra CGCG 66-34 a WSW e CGCG 66-35 a ENE; ma solo spingendo a 580x si può vedere a tratti orientata da N a S ed estesa sì e no una 15-ina di secondi.
MAC 1050+0847	gx	10h50m36s	+08°48.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni poco meno di 30"×15" — 450x.
MAC 1051+0851	gx	10h51m58s	+08°51.3'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, più che altro disturbata da una coppia di stelle brillanti a E con le quali è allineata ed equidistante (quella più a E è la SAO 118547 di 8a grandezza); in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MAC 1051+0851A	gx	10h51m53s	+08°51.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare a tratti come una stellina leggermente sfuocata situata a ridosso SE di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 1051+1005	gx	10h51m54s	+10°06.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e relativamente compatta, salta fuori in visione distolta a 450x, ma solo a tratti appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10".
MAC 1051+1245	gx	10h51m19s	+12°45.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; è situata in mezzo a due stelline: una abbastanza brillante a 1' S, e l'altra appena percettibile subito a N — 450x.
MAC 1051+1516	gx	10h51m03s	+15°16.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina abbastanza brillante a SE (non sono riuscito a vedere l'elusiva UGC 5950 situata 4.5' a NW).
MAC 1051+1557	gx	10h51m19s	+15°57.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso E — 450x.
MAC 1051+1559	gx	10h51m53s	+15°59.8'		Leo	24"	m. buona / m. buono	anche questa è piccola e molto debole, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è situata a ridosso E dell'elusiva CGCG 95-49 e in visione distolta appare prima di quest'ultima — 450x.
MAC 1051+4349	gx	10h51m49s	+43°48.9'		UMa	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 20"×10" — 450x.
MAC 1051+4644	gx	10h51m48s	+46°44.5'		UMa	28"	m. buona / m. buono	piccolo e debolissimo baffo di luce orientato da N a S che in visione distolta appare esteso < 30" — 495x.
MAC 1051+4644A	gx	10h51m30s	+46°44.7'		UMa	28"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W — 495x.
MAC 1052+0840	gx	10h52m09s	+08°40.1'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è situata a ridosso S di una coppia di stelline abbastanza brillanti — 450x.
MAC 1052+0842	gx	10h52m10s	+08°42.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 1052+1008	gx	10h52m12s	+10°08.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, non riesco a capirne la forma, ma non comunque più estesa di 15" o 20"; appare solo a momenti in visione distolta subito a E di NGC 3433 — 450x.
MAC 1052+1009	gx	10h52m32s	+10°09.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a ridosso NE di una debole stellina, ma non sembra più estesa di 10"-12" — 450x.
MAC 1053+0643	gx	10h53m37s	+06°43.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare in visione distolta a 1.5' SE di una stellina; a tratti rotonda con Ø grosso modo di 20" — 450x.
MAC 1053+2655	gx	10h53m55s	+26°56.2'		LMi	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, di forma indistinta, appare in visione distolta a 1' SW di una stellina abbastanza brillante, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1054+1451	gx	10h54m54s	+14°51.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1054+1606	gx	10h54m22s	+16°06.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso W — 450x.
MAC 1054+1608	gx	10h54m50s	+16°08.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' W e una più debole alla stessa distanza SSE — 450x.
MAC 1054+1609	gx	10h54m51s	+16°09.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	situata 1' a N della precedente è anche questa molto debole e di luminosità uniforme; in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una doppia a poco più di 1' verso W — 450x.
MAC 1054+4727	gx	10h54m41s	+47°27.1'		UMa	20"	buona / buono	piccola e molto debole, forse rotonda con Ø di 10"-12"; appare facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 241-34 situata 1' a NNW — 360x.
MAC 1055+0547	gx	10h55m38s	+05°47.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; solo a momenti sembra di intravvedere una condensazione stellare.
MAC 1055+1736	gx	10h55m09s	+17°36.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, a 400x sembra aggettare verso SE dalla più settentrionale di una coppia serrata con componenti orientate da NE a SW; solo a 570x appare "staccata" dalla stellina e leggermente condensata (situata 5' scarsi a E di NGC 3457).
MAC 1055+4958	gx	10h55m29s	+49°58.8'		UMa	20"	buona / buono	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø < 20"; situata tra due stelline orientate da E a W; c'è un triangolo molto aperto di stelline abbastanza brillanti a N — 360x.
MAC 1057+1654	gx	10h57m57s	+16°54.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto molto diffuso, forse rotondo con Ø di una 20-ina di secondi (a 400x il campo è molto povero).
MAC 1058+0136B	gx	10h58m13s	+01°36.4'		Leo	24"	m. buona / ottimo	assieme a MAC 1058+0136D forma una coppia di galassiette molto deboli che anche a 450x paiono poco più di 2 stelline sfuocate; la 1ª è più debole ed è situata a ridosso di UGC 6057; la 2ª è evidente, ma non è comunque più estesa di 10" e si trova a una 40-ina di secondi NE della precedente.
MAC 1058+0136D	gx	10h58m15s	+01°36.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	v. **MAC 1058+0136B**

MAC 1058+0139B	gx	10h58m51s	+01°39.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere a 450x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, molto diffusa e con piccola condensazione centrale evidente (situata 11' scarsi a SSW di CGCG 10-54).
MAC 1058+0630	gx	10h58m31s	+06°31.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto deboIe, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; meglio evidente a 340x, poiché il campo è quasi depleto (c'è soltanto un piccolo triangolo di deboli stelline a 5' verso S).
MAC 1058+0640	gx	10h58m25s	+06°40.0'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 1058+0648	gx	10h58m39s	+06°49.1'		Leo	28"	ottima / buono	debolissimo baffo di luce, orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a N e una più brillante a E — 495x.
MAC 1058+0809	gx	10h58m02s	+08°09.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso W — 450x.
MAC 1059+0144	gx	10h59m31s	+01°44.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto deboIe, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 1059+0153	gx	10h59m08s	+01°53.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare filiforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MAC 1059+0612	gx	10h59m41s	+06°12.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto deboIe e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 1059+1023B	gx	10h59m58s	+10°23.2'		Leo	28"	ottima / buono	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' verso S — 495x.
MAC 1059+1027	gx	10h59m43s	+10°27.8'		Leo	28"	ottima / buono	molto deboIe e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare visibile a momenti — 495x.
MAC 1059+1030	gx	10h59m51s	+10°30.2'		Leo	28"	ottima / buono	debolissima e di aspetto praticamente stellare, con una debole stellina quasi a ridosso verso W — 495x.
MAC 1059+1738B	gx	10h59m44s	+17°38.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è una sorta di baffo filiforme esteso una 40-ina di secondi che aggetta a SW di UGC 6073 — 450x.
MAC 1059+2516	gx	10h59m52s	+25°16.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma più che altro molto disturbata dalla SAO 81610 di magnitudine 8.6 situata 1' a NW, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1100+0957	gx	11h00m26s	+09°57.2'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 400x.
MAC 1100+1644	gx	11h00m23s	+16°44.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, piccola e condensata, rotonda con Ø max di 20" — 570x.
MAC 1101+1017	gx	11h01m58s	+10°17.6'		Leo	28"	ottima / buono	molto piccola, ma appena più evidente di **CGCG 66-101** situata a ridosso SW, orientata da NW a SE, di dimensioni grosso modo 20"×10" e con nucleo stellare — 495x.
MAC 1101+2943	gx	11h01m05s	+29°43.8'		LMi	16"	ottima / ottimo	debolissima, estesa una 30-ina di secondi, diffusa e di luminosità uniforme; appare più evidente a 380x in mezzo a 2 stelline distanti 1.5' e orientate da NNW a SSE.
MAC 1101+4426	gx	11h01m51s	+44°27.0'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di 10"-12"; forma una coppia serrata con CGCG 241-60 situata a ridosso W — 450x.
MAC 1101+4448	gx	11h01m49s	+44°48.8'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' SW — 495x.
MAC 1102+0824	gx	11h02m13s	+08°24.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø < 20"; appare in visione distolta a ridosso E di una stellina — 450x.
MAC 1102+0832	gx	11h02m13s	+08°32.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima, osservabile in visione distolta a 450x, ma solo a momenti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina brillante a 1.5' verso S — 450x.
MAC 1102+0835	gx	11h02m14s	+08°35.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	appare solo elusivamente un paio di primi a N di MAC 1102+0832, immersa nel bagliore della SAO 118626 di magnitudo 8.8 situata ad appena 2' NE; sembra molto piccola, ma non riesco a capire com'è fatta — 450x.
MAC 1102+5040	gx	11h02m57s	+50°40.2'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare (situata a ridosso N di **UGC 6114**) — 495x.
MAC 1103+0651	gx	11h03m36s	+06°52.0'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, appare in visione distolta a 1.5' SW di una stellina, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1103+1914	gx	11h03m16s	+19°14.2'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola, diffusa, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a SW; si vede chiaramente a 570x (a 340x, se il seeing non è buono, potrebbero apparire a prima vista come una coppia di stelline).
MAC 1103+3158	gx	11h03m02s	+31°58.4'		LMi	16"	buona / ottimo	è una piccola chiazza appena percettibile e di forma indistinta che a 380x sembra staccarsi a momenti a E di CGCG 155-47.
MAC 1103+4500	gx	11h03m27s	+45°00.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole lama di luce di aspetto uniforme, orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE (presenza di chiarore lunare) — 495x.
MAC 1103+4510	gx	11h03m34s	+45°10.2'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola e molto debole, situata a ridosso SW di UGC 6125, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" (presenza di chiarore lunare) — 495x.
MAC 1104+0435	gx	11h04m35s	+04°35.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30"; appare in visione distolta subito a W di una stellina, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 1104+0501	gx	11h04m07s	+05°01.6'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1104+4332	gx	11h04m03s	+43°32.3'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è un piccolo triangolo equilatero di deboli stelline subito a NW — 450x.
MAC 1104+4609	gx	11h04m27s	+46°09.9'		UMa	28"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 495x.
MAC 1105+1947	gx	11h05m45s	+19°47.1'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola gx debole e condensata, rotonda con Ø max di 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a meno di 1' SE — 450x.
MAC 1105+1948	gx	11h05m44s	+19°48.6'		Leo	24"	m. buona / buono	relativamente facile e compatta, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1105+4606	gx	11h05m11s	+46°06.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, per essere una MAC, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e di luminosità pressoché uniforme — 495x.
MAC 1106+1412	gx	11h06m47s	+14°12.2'		Leo	28"	ottima / buono	debolissimo baffo di luce, esteso una 30-ina di secondi in direzione N-S; salta fuori in visione distolta subito a W di **CGCG 66-114** — 495x.
MAC 1106+1414	gx	11h06m52s	+14°14.0'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, molto debole e condensata, orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10"; appare facilmente in visione distolta 1.5' a N di CGCG 66-114 — 495x.
MAC 1107+0022	gx	11h07m59s	+00°23.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di 10" o 15" — 450x.
MAC 1107+0203	gx	11h07m46s	+02°03.5'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme, approssim. circolare e con Ø di una 40-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma occorre scalare a 200x.
MAC 1107+0719	gx	11h07m35s	+07°19.0'		Leo	28"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è un po' difficile da trovare per la mancanza di stelline di riferimento — 495x.
MAC 1107+1306	gx	11h07m42s	+13°06.3'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×10" (praticamente una edge-on) e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MAC 1107+1314	gx	11h07m54s	+13°14.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e tenue condensazione centrale visibile a tratti a 450x.
MAC 1107+3524	gx	11h07m50s	+35°24.2'		UMa	16"	m. buona / ottimo	debolissima, a 380x appare a tratti allungata da NE a SW (ossia poco ruotata in senso antiorario rispetto a UGC 6183 dalla quale dista 4' SSW), con dimensioni 40"×20".
MAC 1107+4549	gx	11h07m26s	+45°49.8'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; appare facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 6165 situata 4' a W — 450x.
MAC 1107+4620	gx	11h07m23s	+46°20.6'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-12"; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline, una a 1.5' NE e l'altra subito a N — 450x.
MAC 1108+0017	gx	11h08m40s	+00°17.0'		Leo	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente e solo in visione distolta 1' a N di CGCG 11-4, estesa non più di 15" — 450x.
MAC 1108+1308	gx	11h08m07s	+13°08.2'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, osservabile solo a momenti in visione distolta, ma bisogna scalare a 340x, forse rotonda con Ø di 20"-30".
MAC 1108+1309	gx	11h08m43s	+13°19.3'		Leo	24"	m. buona / buono	è una debolissima gx che a 450x salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a ~ 1' NE di una stellina brillante.
MAC 1108+1311	gx	11h08m23s	+13°11.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta a 450x, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15".
MAC 1108+1351	gx	11h08m48s	+13°11.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e piccola, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 20"×10" — 450x.
MAC 1110+0449	gx	11h10m24s	+04°49.2'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima galassietta rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a 270x.
MAC 1110+0937	gx	11h10m54s	+09°37.3'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccolissima, estesa forse una decina di secondi e appare solo forzando a 570x.
MAC 1110+2817	gx	11h10m18s	+28°17.2'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, situata a ridosso NE di una stellina abbastanza brillante; è estesa max 20" e si nota in visione distolta a 380x.
MAC 1110+4349	gx	11h10m25s	+43°49.7'		UMa	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1110+4350	gx	11h10m28s	+43°50.4'		UMa	28"	m. buona / m. buono	appena più evidente della precedente, dalla quale dista 1' scarso a NE, molto piccola con Ø di 12"-15" — 495x.
MAC 1111+2739	gx	11h11m07s	+27°39.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	è una debolissima lama di luce orientata da NE a SW, estesa una 40-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile; forma un piccolo triangolo equilatero con due deboli stelline a S e SW — 450x.
MAC 1111+4521	gx	11h11m40s	+45°21.0'		UMa	28"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW e una di luminosità simile un paio di primi verso N (presenza di chiarore lunare) — 495x.
MAC 1111+5630	gx	11h11m27s	+56°30.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" o poco più; c'è una stellina a 1' scarso verso W — 495x.
MAC 1112+0122	gx	11h12m54s	+01°22.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	elusivo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi e orientato da N a S; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1112+0123	gx	11h12m13s	+01°23.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10"; meglio visibile restando a 450x.
MAC 1112+0347	gx	11h12m29s	+03°47.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta quando di osserva CGCG 39-66, dalla quale dista un paio di primi a NE, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1112+1204	gx	11h12m35s	+12°04.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	assieme alle due successive fa parte di un trio di debolissime galassiette, allineate da N a S e molto difficili da vedere, in quanto non ci sono stelline di riferimento utili ed è quindi meglio scalare a 340x — questa è la più diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1112+1206	gx	11h12m37s	+12°06.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" e di luminosità uniforme — 340x.
MAC 1112+1207	gx	11h12m37s	+12°07.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è forse la più evidente del terzetto, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20".
MAC 1112+2728	gx	11h12m12s	+27°28.7'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1112+2729A	gx	11h12m53s	+27°29.6'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola chiazza tondeggiante molto debole e diffusa, con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1112+2730	gx	11h12m11s	+27°30.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, molto diffusa, appare in visione distolta quando si osserva la MAC 1112+2728 che si trova un paio di primi scarsi più a S — 450x.
MAC 1112+2737A	gx	11h12m03s	+27°37.8'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1112+2737B	gx	11h12m12s	+27°37.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
MAC 1112+2737C	gx	11h12m07s	+27°37.5'		Leo	24"	m. buona / discreto	appare elusivamente subito a SE di MAC 1112+2737B come una stellina sfuocata appena percettibile — 450x.
MAC 1112+2740	gx	11h12m10s	+27°40.3'		Leo	24"	m. buona / discreto	diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1112+5634	gx	11h11m17s	+56°35.0'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stella brillante un paio di primi a W — 495x.
MAC 1113+0004	gx	11h13m06s	+00°04.2'		Leo	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E — 450x.
MAC 1113+4722	gx	11h13m41s	+47°22.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e condensata, rotonda con Ø < 20"; equidistante e quasi allineata con 2 stelline a E — 495x.
MAC 1114+4133	gx	11h44m28s	+41°33.5'		UMa	24"	m. buona / buono	molto debole, rotonda con Ø < 30" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina brillante a 1.5' SE — 450x.
MAC 1114+5019	gx	11h14m50s	+50°19.5'		UMa	28"	ottima / m. buono	situata 1' a SW di CGCG 268-7, è molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme; allineata ed equidistante con 2 stelline a SW — 495x.
MAC 1114+6321	gx	11h14m47s	+63°21.1'		UMa	24"	m. buona / discreto	appare come una stellina molto debole e appena sfuocata situata a 1' SE di UGC 6265 — 450x.
MAC 1115+0006	gx	11h15m23s	+00°06.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 11-34 situato 30" a NNW: sono due debolissimi oggetti forse rotondi con Ø di una 20-ina di secondi e di aspetto simile; si separano facilmente a 450x.
MAC 1115+1728	gx	11h15m01s	+27°28.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20".
MAC 1116+2914	gx	11h16m35s	+29°15.7'		UMa	16"	m. buona / ottimo	assieme a MAC 1116+2915 forma una coppia di galassiette molto piccole, estese una 15-ina di secondi e distanti tra loro 20"; appaiono in visione distolta e si separano facilmente a 380x.
MAC 1116+2915	gx	11h16m35s	+29°15.3'		UMa	16"	m. buona / ottimo	v. **MAC 1116+2914**
MAC 1116+4106	gx	11h16m15s	+41°06.9'		UMa	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline orientate da E a W a 1.5' verso S — 495x.
MAC 1117+0231	gx	11h17m48s	+02°31.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale molto tenue — 450x.
MAC 1117+0232	gx	11h17m45s	+02°32.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, appare a tratti in visione distolta tra la galassietta precedente e una stellina situata un paio di primi a NNW; ma anche a 450x sembra solo una stellina sfuocata.
MAC 1117+0233	gx	11h17m51s	+02°33.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	è una debolissima chiazza che in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20", diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1117+0755	gx	11h17m11s	+07°55.2'		Leo	28"	ottima / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 1117+2637	gx	11h17m30s	+26°38.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare in visione distolta a ridosso S di una debole stellina; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 1117+2639	gx	11h17m21s	+26°39.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×15" — 450x.
MAC 1117+2643	gx	11h17m55s	+26°43.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1117+7509	gx	11h17m47s	+75°09.4'		Dra	28"	buona / buono	è un elusivo baffo di luce orientato da NE a SW ed esteso una 40-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta ma non bisogna scalare gli ingrandimenti — 388x.
MAC 1118+0232A	gx	11h18m19s	+02°32.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima e molto piccola, a tratti condensata; appare in visione distolta a 1' W di una stellina, ma non sembra più estesa di 10"-12" — 450x.
MAC 1118+0342	gx	11h18m45s	+03°42.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1118+0746	gx	11h18m10s	+07°46.9'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, ma relativamente compatta, a tratti in visione distolta appare orientata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con nucleo puntiforme — 450x.
MAC 1119+4645	gx	11h19m55s	+46°45.9'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e molto debole, forse rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina quasi a ridosso SE e una brillante a 1.5' verso W — 495x.
MAC 1119+5426	gx	11h19m03s	+54°26.9'		UMa	28"	ottima / m. buono	assieme alla successiva forma un coppia di galassiette distanti 1' in direzione N-S, molto deboli, ma relativamente compatte e facili da vedere, entrambe di dimensioni 20"×10": la 1ª è orientata da NE a SW, mentre la 2ª lo è da N a S *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MAC 1119+5427	gx	11h19m04s	+54°27.5'		UMa	28"	ottima / m. buono	v. **MAC 1119+5426**
MAC 1120+1937	gx	11h20m51s	+19°37.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, salta fuori facilmente in visione distolta a 1' SE di UGC 6362; è molto piccola e con nucleo stellare visibile a tratti; a tratti sembra chiaramente orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; meglio contrastata a 400x.
MAC 1120+3110	gx	11h20m46s	+31°11.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	visibile a tratti a 380x, compatta, con dimensioni max si 10" o 15".
MAC 1120+4710	gx	11h20m12s	+47°11.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (è difficile da osservare, perché il campo stellare attorno alla gx è praticamente depleto) — 495x.
MAC 1120+5650	gx	11h20m40s	+56°50.3'		UMa	28"	ottima / m. buono	piccolo baffo di luce molto tenue esteso una 20-ina di secondi e orientato da NE a SW; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW — 495x.
MAC 1121+0253	gx	11h21m39s	+02°53.5'		Leo	24"	m. buona / mediocre	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile — 450x.
MAC 1122+1258	gx	11h22m24s	+12°58.8'		Leo	24"	buona / buono	debolissima macchia rotonda con Ø non superiore a 30", diffusa e di luminosità uniforme — 340x.
MAC 1122+1638	gx	11h22m06s	+16°38.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	è la più difficile di un terzetto di piccole galassiette situate una 12-ina di primi a WNW di NGC 3655; appare elusivamente in visione distolta a 450x, ma non sembra più estesa di 10".
MAC 1122+1640	gx	11h22m04s	+16°40.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	fa parte di un terzetto di piccole galassiette situate una 12-ina di primi a WNW di NGC 3655; appare facilmente in visione distolta a poco più di 1' NW di PGC 1513899 (la componente più facile) e di dimensioni simili a quest'ultima — 450x.
MAC 1122+2742	gx	11h22m56s	+27°42.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di aspetto quasi stellare, meglio evidente a 450x.
MAC 1122+3423	gx	11h22m36s	+34°23.6'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo ed elusivo oggetto esteso 15"-20" che appare solo a momenti in visione distolta a 270x.
MAC 1122+5107	gx	11h22m51s	+51§07.8'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola e molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 495x.
MAC 1122+5115	gx	11h22m58s	+51°15.6'		UMa	28"	ottima / m. buono	anche questa è molto piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' verso W e una molto debole subito a N — 495x.
MAC 1122+5558	gx	11h22m37s	+55°58.3'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina a ridosso E — 495x.
MAC 1122+5647	gx	11h22m01s	+56°47.4'		UMa	28"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; allineata ed equidistante con 2 stelline a SW — 495x.
MAC 1123+0242	gx	11h23m49s	+02°42.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme rotonda con Ø > 30"; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 1123+1323	gx	11h23m17s	+13°23.5'		Leo	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con IC 2785 situata a ridosso verso W — molto piccola e debole, a tratti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 340x.
MAC 1123+5350	gx	11h23m53s	+53°50.9'		UMa	28"	ottima / m. buono	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta un paio di primi a E di NGC 3656, forse rotonda con Ø < 20" *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
MAC 1124+2738	gx	11h24m34s	+27°38.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	rimane pressoché stellare anche a 450x, situata 1' a E di CGCG 156-73.
MAC 1124+2742B	gx	11h24m24s	+27°42.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1124+5554	gx	11h24m46s	+55°54.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1126+3520C	gx	11h26m41s	+35°20.6'		UMa	16"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, diffusa, probabilmente rotonda con Ø max di 20" — 380x.
MAC 1126+4004	gx	11h26m32s	+40°04.9'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10"; disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a W — 495x.
MAC 1126+4007	gx	11h26m13s	+40°07.1'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; una stellina percettibile solo a momenti si trova a ridosso N, ma si tratta di **MAC 1126+4007A** — 495x.
MAC 1126+4007A	gx	11h26m13s	+40°07.4'		UMa	28"	m. buona / m. buono	appare solo a momenti come una stellina appena percettibile a ridosso N della precedente — 495x.
MAC 1127+1951	gx	11h27m29s	+19°51.2'		Leo	24"	m. buona / buono	relativamente facile e compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" e piccola condensazione centrale — 450x.
MAC 1127+2720	gx	11h27m55s	+27°20.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1127+2723C	gx	11h28m27s	+27°23.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1127+4004	gx	11h27m27s	+40°04.2'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con condensazione centrale molto tenue, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a S — 495x.
MAC 1128+2722	gx	11h28m57s	+27°22.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente, ma anche a 450x è soltanto una stellina appena percettibile — 450x.
MAC 1128+2723B	gx	11h28m54s	+27°22.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1128+2727	gx	11h28m56s	+27°27.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	è un elusivo baffo di luce orientato da NE a SW ed esteso una 30-ina di secondi; appare solo a momenti in visione distolta a ridosso N di una stellina — 450x.
MAC 1129-7301	gx	11h29m18s	+73°01.2'		Dra	20"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta a 1' a S di una stellina di 14-esima: questa si trova 1' a E di UGC 6473 (osservata subito prima) — 360x.
MAC 1129+4146	gx	11h29m16s	+41°46.6'		UMa	20"	buona / buono	appare elusivamente a ridosso E di UGC 6488, ma è molto piccola e di forma indistinta — 360x.
MAC 1129+4413	gx	11h29m48s	+44°13.8'		UMa	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile per essere una MAC, diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale evidente — 495x.
MAC 1129+5522	gx	11h29m43s	+55°22.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1129+5525	gx	11h29m32s	+55°25.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø max di 15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NE; un'altra stellina percettibile solo a momenti si trova alla stessa distanza verso SE, ma è in realtà la **PGC 2501052** — 495x.
MAC 1130+2619	gx	11h30m53s	+26°19.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce estesa per ~ 1' e orientata da NW a SE; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
MAC 1130+4407	gx	11h30m08s	+44°07.7'		UMa	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 495x.
MAC 1132+0507	gx	11h32m24s	+05°07.6'		Leo	24"	buona / discreto	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1132+4905	gx	11h32m50s	+49°06.0'		UMa	24"	m. buona / buono	molto debole, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1133+1543	gx	11h33m51s	+15°43.2'		Leo	24"	buona / m. buono	molto piccola e debolissima, ma più che altro disturbata da una stella brillante di 9ª grandezza situata a 2.5' SW; forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 1133+2341	gx	11h33m15s	+23°41.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø < 20" — 450x.
MAC 1133+4333	gx	11h33m13s	+43°33.6'		UMa	28"	m. buona / m. buono	è un piccolo ed elusivo baffo di luce orientato da E a W ed esteso < 30"; appare solo in visione distolta — 495x.
MAC 1133+4906A	gx	11h33m13s	+49°06.1'		UMa	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1133+4919	gx	11h33m56s	+49°19.9'		UMa	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima chiazza di forma indistinta estesa 15"-20" — 450x.
MAC 1134+4904B	gx	11h35m00s	+49°04.9'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso AGC 1314 — molto piccola e relativamente compatta (a 340x appare solo come una stellina sfuocata), situata 1.5' a E di IC 712 — 450x.
MAC 1134+4905B	gx	11h34m43s	+49°05.5'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — debole e molto piccola, estesa 10"-12"; appare in visione distolta a 1' NW di IC 712; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
MAC 1134+4906B	gx	11h34m33s	+49°06.1'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — molto debole e piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1134+4907B	gx	11h34m31s	+49°07.7'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — molto debole, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1135+4856	gx	11h35m32s	+48°56.6'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — appare elusivamente a ridosso NE di una stellina, ma non ne capisco la forma; non dovrebbe comunque essere più estesa di 12"-15" — 450x.
MAC 1135+4905B	gx	11h35m26s	+49°05.2'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — questa e la successiva sono una coppia di galassiette molto piccole e deboli, situate rispettivamente 1' SW e 1.5' SE di MCG+8-21-64; appaiono abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 1135+4905C	gx	11h35m40s	+49°05.9'		UMa	24"	m. buona / buono	v. **MAC 1135+4905B**
MAC 1135+4917	gx	11h35m09s	+49°17.3'		UMa	24"	m. buona / buono	molto debole, in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 20"×15", ma è meglio scalare a 340x perché è situata in una piccola zona depleta.
MAC 1137+2147	gx	11h37m53s	+21°48.0'		Leo	24"	buona / buono	relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 400x.
MAC 1137+2202	gx	11h37m39s	+22°02.4'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, anche a 450x è poco più di una stellina sfuocata.
MAC 1137+3922A	gx	11h37m25s	+39°22.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di piccole gx molto deboli situare a ridosso l'una dell'altra in direzione NE-SW; si separano a fatica; in visione distolta appaiono rotonde con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme; tuttavia, osservando attentamente, si nota che la prima è in realtà poco più grande e soprattutto più evidente; la coppia è quasi allineata ed equidistante con 2 stelline a E — 495x.
MAC 1137+3922B	gx	11h37m23s	+39°22.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	v. **MAC 1137+3922A**
MAC 1137+4544	gx	11h37m19s	+45°45.0'		UMa	24"	m. buona / m. buono	appare solo a momenti come una stellina appena percettibile a ridosso SE di CGCG 242-63 — 450x.
MAC 1138+1743	gx	11h38m09s	+17°43.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, situata a ridosso SW di una debole stellina; solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 1138+2150A	gx	11h38m08s	+21°50.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, ancorché molto disturbata dalla SAO 81915 di 7ª situata un paio di primi a NE; è piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale stellare (si trova a SSE del Settetto Copland) — 400x.
MAC 1138+2150C	gx	11h38m23s	+21°50.4'		Leo	24"	buona / buono	molto deboIe e diffusa, in visione distolta appare allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale visibile a tratti; è disturbata da una stellina brillante situata 1' SSE — 400x.
MAC 1138+4730	gx	11h38m15s	+47°30.3'		UMa	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
MAC 1139+1652	gx	11h39m20s	+16°52.1'		Leo	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di 10"-15"; appare facilmente in visione distolta subito a E di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 1140+1658	gx	11h40m58s	+16°58.3'		Leo	24"	buona / m. buono	molto piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una condensazione stellare evidente; disturbata da una stellina brillante situata 3' a NW — 450x.
MAC 1142+1957	gx	11h42m46s	+19°56.9'		Leo	24"	buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 97-62 — debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 400x, non più estesa di 15" o 20".
MAC 1142+2600	gx	11h42m21s	+26°00.5'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e piccola, diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1143+1956	gx	11h43m06s	+19°56.3'		Leo	24"	buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 97-62 — molto debole e leggermente condensata, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 30" NW — 400x.
MAC 1143+2012	gx	11h43m00s	+20°12.5'		Leo	24"	buona / ottimo	fa parte del gruppo di CGCG 97-62 — minuscola ed elusiva, forse rotonda con Ø di 10" o 15"; appare a tratti in visione distolta a 400x.
MAC 1143+2523	gx	11h43m31s	+25°23.9'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, piccola, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1144+0809	gx	11h44m30s	+08°09.0'		Vir	24"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare a tratti in visione distolta subito a SE di una stellina abbastanza brillante; non dovrebbe essere più estesa di 10"-15" — 450x.
MAC 1144+1045	gx	11h43m59s	+10°45.7'		Leo	24"	m. buona / buono	anche a 450x appare solo a momenti come un'elusiva stellina sfuocata, all'incirca a metà strada tra NGC 3839, dalla quale dista un paio di primi a SE, e una stellina abbastanza brillante.
MAC 1144+1633	gx	11h44m23s	+16°33.1'		Leo	24"	buona / ottimo	è un debole oggetto rotondo, poco diffuso e condensato, con Ø < 20" — 400x.
MAC 1144+1943	gx	11h44m57s	+19°44.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima macchiolina rotonda molto diffusa, di luminosità uniforme e Ø di 20"-25"; è situata quasi a ridosso verso E di una stellina — 380x.
MAC 1144+2530	gx	11h44m36s	+25°30.3'		Leo	24"	m. buona / buono	gx molto piccola, rotonda con Ø di 10"-15" e a tratti condensata — 450x.
MAC 1144+3322	gx	11h44m32s	+33°22.1'		UMa	16"	buona / buono	a 270x appariva soltanto come una stellina appena percettibile a 1.5' NE di NGC 3855.
MAC 1145+2017B	gx	11h45m28s	+20°17.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	debolissima, appare solo a momenti a SE di UGC 6945 come una stellina leggermente sfuocata di 10"-15" di Ø — 380x.
MAC 1145+2026	gx	11h45m59s	+20°26.8'		Leo	16"	m. buona / ottimo	appare elusivamente a ridosso N di IC 732, ma più che altro sembra una stellina appena percettibile — 380x.
MAC 1145+2040	gx	11h45m30s	+20°40.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	debolissima e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 1145+2652	gx	11h45m20s	+26°52.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso N — 400x.
MAC 1147+1240	gx	11h47m18s	+12°40.8'		Leo	24"	buona / m. buono	relativamente facile nonostante l'estrema vicinanza della SAO 99790 di 8ª grandezza situata ad appena 1' SW; è rotonda, con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
MAC 1148+1234	gx	11h48m01s	+12°35.1'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1150+0638A	gx	11h50m51s	+06°38.5'		Vir	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa, a tratti condensata e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20" scarsi — 450x
MAC 1150+1041	gx	11h50m36s	+10°41.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 1' scarso SE di una stellina, ma non ne capisco la forma; non dovrebbe comunque essere più estesa di 15" o 20" — 450x.
MAC 1151+0641	gx	11h51m14s	+06°41.0'		Vir	24"	buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta a 450x, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1151+2348	gx	11h51m56s	+23°48.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola, diffusa e con condensazione centrale stellare osservabile a 400x, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso N
MAC 1155+4841	gx	11h55m03s	+48°41.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" o poco più — 495x.
MAC 1155+4842	gx	11h55m18s	+48°42.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a a 3' scarsi ENE dalla precedente, forse rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
MAC 1157+3622	gx	11h57m57s	+36°23.0'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è quel debolissimo oggetto diffuso situato un paio di primi a SSE di CGCG 127-47; è molto piccola, di 15"-20" di Ø e appare solo a momenti a 380x.
MAC 1157+4246	gx	11h57m39s	+42°46.5'		UMa	24"	ottima / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1157+4252	gx	11h57m48s	+42°52.7'		UMa	24"	ottima / buono	assieme alla successiva forma una coppia di debolissime galassiette di aspetto simile, forse rotonde con Ø di una 15-ina di secondi al massimo; appaiono in visione distolta a 450x separate da ~ 1' in direzione NE-SW.
MAC 1157+4253	gx	11h57m55s	+42°53.5'		UMa	24"	ottima / buono	v. **MAC 1157+4252**
MAC 1158+5321	gx	11h58m55s	+53°21.2'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x a 1' N di una stellina brillante; probabilmente fa con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 1159+0616	gx	11h59m18s	+06°16.0'		Vir	24"	buona / discreto	debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi in direzione E-W; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
MAC 1159+5320	gx	11h59m30s	+53°20.9'		UMa	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, situata a ridosso verso N di una stellina; appare diffusa con dimensioni di 10"-15" — 450x.
MAC 1200+0655	gx	12h00m17s	+06°55.7'		Vir	24"	buona / discreto	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW — 450x.
MAC 1201+0155	gx	12h01m23s	+01°55.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima e purtroppo situata in un piccolo "vuoto" circondato da stelle brillanti in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1201+2024	gx	12h01m42s	+20°24.3'		Com	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva macchiolina, molto piccola, che salta fuori solo in visione distolta a 380x; a tratti appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15".
MAC 1201+7923	gx	12h01m50s	+79°23.8'		Cam	28"	buona / buono	piccola e debolissima, a tratti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 388x.
MAC 1203+1425	gx	12h04m00s	+14°25.8'		Com	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 1204+1604	gx	12h04m23s	+16°04.1'		Com	28"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione N-S; appare in visione distolta subito a SW di una stellina — 495x.
MAC 1204+2204	gx	12h04m32s	+22°04.1'		Com	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente a 450x, ed è molto piccola, estesa sì e no 12" o 15" — 450x.
MAC 1204+4832A	gx	12h04m49s	+48°32.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	v. **MAC 1204+4835A**
MAC 1204+4832B	gx	12h04m55s	+48°33.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	v. **MAC 1204+4835A**
MAC 1204+4833	gx	12h04m52s	+48°33.4'		UMa	28"	ottima / ottimo	v. **MAC 1204+4835A**
MAC 1204+4835A	gx	12h04m41s	+48°35.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	fa parte, assieme alle 3 precedenti di un quartetto di piccoli oggetti molto deboli situati nei dintorni di MCG+8-22-64A e che nondimeno appaiono facilmente in visione distolta; questa è la più evidente e si trova a 1' scarso S di una stellina abbastanza brillante; una stellina appena percettibile situata a NE è risultata essere la **2MASS 12044446+4835496**; **MAC 1204+4832A** è invece la più difficile, mentre le altre 2 sono di aspetto abbastanza simile; hanno tutte dimensioni non superiori a 10"-12" — 495x.
MAC 1204+4903	gx	12h04m58s	+49°03.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, molto allungata da E a W, di dimensioni < 30"×10" e con tenue condensazione stellare — 495x.
MAC 1204+4909	gx	12h04m48s	+49°09.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta 1' scarso a N di una debole stellina, forse rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
MAC 1205+4008	gx	12h05m53s	+40°08.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a ~ 1' SW di una stellina, ma si fatica un po' a capirne la forma; grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1205+4009	gx	12h05m57s	+40°09.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta subito a NW di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1206+4259	gx	12h06m55s	+42°59.8'		CVn	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, a tratti condensata, forse rotonda con Ø < 20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta quasi a ridosso E di NGC 4109 — 450x.
MAC 1207+2814	gx	12h07m18s	+28°14.8'		Com	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, forse rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
MAC 1209+4709	gx	12h09m33s	+47°09.4'		UMa	28"	ottima / m. buono	è un piccolo ed elusivo baffo di luce orientato da E a W ed esteso sì e no una 20-ina di secondi; salta fuori subito a W di una stellina — 495x.
MAC 1210+0523	gx	12h10m17s	+05°23.2'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; presenta un nucleo stellare visibile solo a momenti; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 1210+1901	gx	12h10m37s	+18°01.0'		Com	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MAC 1210+2008	gx	12h10m40s	+20°08.9'		Com	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1210+3632	gx	12h10m53s	+36°32.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissima gx rotonda di 30" di Ø e luminosità uniforme, situata quasi a ridosso SE di una stellina; è meglio contrastata a 270x.
MAC 1210+3918	gx	12h10m17s	+39°18.3'		CVn	24"	ottima / buono	molto piccola, piccola e relativamente compatta, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
MAC 1210+4326	gx	12h10m33s	+43°26.1'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto deboIe diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 495x.
MAC 1210+4710	gx	12h10m02s	+47°10.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola e molto debole, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 1211+1411	gx	12h11m48s	+14°12.1'		Com	24"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a W — 450x.
MAC 1211+1414A	gx	12h11m21s	+14°14.6'		Com	24"	buona / ottimo	molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1211+4039	gx	12h11m55s	+40°39.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con **CGCG 215-50** situata a ridosso W — sono entrambe piccole, poco diffuse, deboli e condensate: la CGCG appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10", mentre la compagna appare poco più evidente e "cicciotta", orientata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 495x.
MAC 1212+1418	gx	12h12m09s	+14°18.6'		Com	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
MAC 1212+1428	gx	12h12m58s	+14°28.4'		Com	24"	buona / ottimo	molto piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi a SSE — 495x.

MAC 1212+1522	gx	12h12m12s	+15°22.6'		Com	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e molto debole, in visione distolta non sembra più estesa di 10"-12"; c'è una stellina a 1' verso W — 495x.
MAC 1212+1525	gx	12h12m16s	+15°25.8'		Com	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x
MAC 1213+1422	gx	12h13m45s	+14°22.6'		Com	28"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo baffo orientato da N a S ed esteso una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW e una della stessa luminosità a 1' verso S — 495x.
MAC 1213+1428	gx	12h13m34s	+14°28.7'		Com	28"	m. buona / ottimo	appare come una stellina molto debole e appena sfuocata a ridosso SE di **IC 3049** — 495x.
MAC 1213+1428A	gx	12h13m09s	+14°28.5'		Com	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, anche questa di aspetto praticamente stellare — 495x.
MAC 1213+3635A	st?	12h13m48s	+36°35.1'		CVn	24"	ottima / buono	a dispetto della denominazione appare solo come una stellina situata 3' SSE di NGC 4190 rimane tale anche a 580x.
MAC 1214+1319B	gx	12h14m51s	+13°19.7'		Com	24"	buona / ottimo	molto piccola, non più estesa di 10" o 15", appare facilmente a 450x a ~ 1' E di CGCG 69-98 — 450x.
MAC 1214+1411A	gx	12h14m01s	+14°11.6'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa sì e no 15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x (una compagna situata a ridosso S non l'ho vista neppure spingendo 580x).
MAC 1214+1413	gx	12h14m06s	+14°12.9'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia sbilanciata di stelline a 1.5' W — 450x.
MAC 1214+1423	gx	12h14m28s	+14°23.8'		Com	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da N a S, dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE — 495x.
MAC 1214+4332	gx	12h14m19s	+43°32.1'		CVn	28"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 1215+1251	gx	12h15m16s	+12°51.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1215+2356	gx	12h15m25s	+23°56.9'		Leo	16"	m. buona / ottimo	è una piccola galassietta rotonda, condensata e debolissima don Ø di 10" o 15" — 380x.
MAC 1215+5428	gx	12h15m54s	+54°28.5'		UMa	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; a 450x sembra aggettare a E di una stellina.
MAC 1216+0854	gx	12h16m46s	+08°54.5'		Vir	28"	ottima / m. buono	è di aspetto a prima vista quasi stellare, molto debole ed estesa non più di 10"-12" — 495x.
MAC 1216+1229	gx	12h16m02s	+12°29.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, approssim. rotonda con Ø < 20"; ci sono 2 stelline appena percettibili a E e SE (quest'ultima va e viene) — 450x.
MAC 1216+1821	gx	12h16m46s	+18°21.0'		Com	24"	ottima / m. buono	piccola ed elusiva, di forma indistinta, non più estesa di 20"; appare a momenti quasi a ridosso SW di una stellina molto debole — 450x.
MAC 1216+3326A	gx	12h16m28s	+33°26.5'		CVn	24"	ottima / buono	appare come una stellina appena percettibile e debolmente sfuocata a poco più di 1' SW di UGC 7295 — 450x.
MAC 1217+0852	gx	12h17m23s	+08°52.4'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e a tratti condensata; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE — 495x.
MAC 1217+4638	gx	12h17m20s	+46°38.2'		CVn	28"	ottima / ottimo	piccola e relativamente facile, poco diffusa e condensata, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 495x.
MAC 1217+4759	gx	12h17m42s	+47°59.7'		CVn	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline situare rispettivamente a 1' S e 1.5' a SW — 450x.
MAC 1218+0514	gx	12h18m52s	+05°14.7'		Vir	24"	m. buona / buono	assieme a MAC 1218+0515, situata 1.5' a ENE, forma una coppia di macchioline molto deboli e rese difficili dal fatto che non ci sono stelline di riferimento; sono di luminosità uniforme e appaiono abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; la 1ª è poco più evidente ed estesa, rotonda con Ø < 20".
MAC 1218+0515	gx	12h18m52s	+05°14.8'		Vir	24"	m. buona / buono	v. **MAC 1218+0514**
MAC 1218+0532	gx	12h18m32s	+05°32.5'		Vir	24”	ottima / m. buono	anche forzando a 580x appare solo come una stellina appena percettibile debolmente sfuocata.
MAC 1219+0515	gx	12h19m52s	+05°15.3'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta, a 450x, a 1.5' N di una stellina abbastanza brillante; forse rotonda con Ø non superiore a 15" — 450x.
MAC 1219+0516	gx	12h19m16s	+05°16.2'		Vir	24"	m. buona / buono	appena più evidente di MAC 1219+0515, di Ø simile, salta fuori in visione distolta a 450x a 1' verso E di una debole stellina — 450x.
MAC 1220+0454	gx	12h20m11s	+04°54.4'		Vir	24”	ottima / m. buono	appare elusivamente quasi a ridosso E di una debole stellina; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 10" — 450x.
MAC 1220+3954	gx	12h20m27s	+39°54.1'		Cvn	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di 12”-15”; situata tra due stelline appena percettibili distanti ~ 1’ in direzione NW-SE — 450x.
MAC 1222+1037	gx	12h22m03s	+10°37.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1224+0921	gx	12h24m29s	+09°21.7'		Vir	16"	ottima / ottimo	è di aspetto e dimensione simili a CGCG 70-51 e solo appena più evidente; meglio spingere a 380x.
MAC 1224+2834	gx	12h24m58s	+28°35.0'		Com	16"	ottima / discreto	appare come stellina debolmente sfuocata, percettibile solo a momenti a 270x.
MAC 1224+4515	gx	12h24m51s	+45°15.7'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1225+0425	gx	12h25m43s	+04°25.1'		Vir	24"	discreta / buono	appare elusivamente in una piccola zona di cielo depleta; è comunque molto piccola e compatta, ma occorre dapprima localizzarla a 340x per poi aumentare a 450x; a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10".
MAC 1226+0907	gx	12h26m32s	+09°07.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1226+4524	gx	12h26m18s	+45°24.7'		CVn	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, in visione distolta appare rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a 1' scarso SSE — 450x.
MAC 1227+0902	gx	12h27m29s	+09°02.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, poco diffusa e a tratti condensata, grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1229+0231	gx	12h29m50s	+02°31.1'		Vir	24”	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, nonostante sia situata tra due stelle brillanti; poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1229+0825B	gx	12h30m00s	+08°25.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1229+0838	gx	12h29m01s	+08°38.6'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1229+0840	gx	12h29m03s	+08°40.4'		Vir	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, rotonda con Ø < 20".
MAC 1229+1045	gx	12h29m43s	+10°45.4'		Vir	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima gx rotonda con Ø di 10" o 15"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' NW (situata 3' a SE di IC 3416) — 450x.
MAC 1230+0909	gx	12h30m55s	+09°09.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso E — 450x.
MAC 1230+1048	gx	12h30m58s	+10°48.2'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1230+1221	gx	12h30m43s	+12°21.6'		Vir	24"	ottima / ottimo	v. **UGC 7652**
MAC 1232+0844	gx	12h32m51s	+08°44.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1232+0917	gx	12h32m57s	+09°17.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola. relativamente compatta, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata 7' a SW di IC 3487) — 450x.
MAC 1232+1642	gx	12h32m50s	+16°42.0'		Com	24”	m. buona / ottimo	piccola e debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata a S di un piccolo arco di 3 stelline brillanti — 450x.
MAC 1233+0551	gx	12h33m55s	+05°51.7'		Vir	24”	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con tenue condensazione centrale — 450x.
MAC 1233+4739	gx	12h33m53s	+47°39.4'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NW — 450x.
MAC 1233+4750	gx	12h33m02s	+47°50.9'		CVn	24"	m. buona / m. buono	è una lama di luce molto debole, orientata da N a S, estesa 1' scarso e con condensazione centrale molto tenue — 450x.
MAC 1234+4745A	gx	12h34m36s	+47°45.6'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1234+4745B	gx	12h34m18s	+47°46.0'		CVn	24"	m. buona / buono	appare come una stellina appena percettibile situata un paio di primi a NE di CGCG 244-29 — 450x.
MAC 1235+4743	gx	12h35m26s	+47°43.8'		CVn	24"	m. buona / buono	è molto piccola, ma più che altro appare il nucleo stellare; l'eventuale alone molto tenue è praticamente soverchiato dalla luce di una stellina brillante situata quasi a ridosso SW — 450x.
MAC 1236+4748	gx	12h36m16s	+47°48.4'		CVn	24"	m. buona / buono	appare elusivamente in visione distolta 1.5' a E di una stellina molto debole; non pare più estesa di 15" o 20" — 450x.
MAC 1236+4832	gx	12h36m34s	+48°32.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma facilmente osservabile anche in visione diretta a 380x, molto piccola rotonda e condensata, con Ø di ~ 20".
MAC 1237+1021	gx	12h37m58s	+10°21.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 1' NE di una debole stellina (situata 12' a SW di IC 3608) — 450x.
MAC 1238+2750	gx	12h38m34s	+27°51.0'		Com	24"	ottima / m. buono	debolissima, a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MAC 1239+2736	gx	12h39m20s	+27°36.3'		Com	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, poco diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' WSW — 450x.
MAC 1240+2631A	gx	12h40m25s	+26°31.5'		Com	24"	ottima / ottimo	appare facilmente in visione distolta quando si osserva la coppia IC 3644-5 situata 2.5' a E; molto piccola, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1241+1210	gx	12h41m24s	+12°10.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1242+0001	gx	12h42m50s	+00°01.5'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debolissima chiazza rotonda, molto diffusa, a tratti condensata e con Ø < 30"; poco meglio evidente a 340x.
MAC 1242+0123	gx	12h42m37s	+01°23.3'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1243+1112	gx	12h43m22s	+11°12.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; salta fuori facilmente in visione distolta a 1' SE di IC 3698 — 450x.
MAC 1243+5453	gx	12h43m01s	+54°53.8'		UMa	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1244+0902	gx	12h44m00s	+09°02.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1244+0943	gx	12h44m46s	+09°43.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare solo a momenti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 20"×10" — 450x.
MAC 1244+0947	gx	12h44m54s	+09°47.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1244+4041	gx	12h44m23s	+40°41.8'		CVn	28"	mediocre / ottimo	molto piccola e condensata, non più estesa di 10" — 388x.
MAC 1244+4055	gx	12h44m52s	+40°55.9'		CVn	28"	mediocre / ottimo	debolissima e molto piccola, tuttavia appare abbastanza facilmente in visione distolta a 388x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso W — 388x.
MAC 1244+4507	gx	12h44m03s	+45°07.8'		CVn	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare a tratti in visione distolta subito a N di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 1244+5443	gx	12h44m36s	+54°43.5'		UMa	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1245+0822	gx	12h45m26s	+08°22.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 1' ESE di una stellina, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1245+4049	gx	12h45m50s	+40°49.1'		CVn	28"	mediocre / ottimo	molto piccola, poco diffusa, forse rotonda con Ø max di 15" — 388x.
MAC 1246+0820	gx	12h46m13s	+08°20.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente a 1' scarso SW di IC 3754; non dovrebbe essere più estesa di 10" o 15" — 450x.
MAC 1246+4032	gx	12h46m58s	+40°32.5'		CVn	28"	m. buona / scarso	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 495x.
MAC 1247+0953	gx	12h47m40s	+09°53.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, soltanto a 450x appare effettivamente diffusa, anche se non dovrebbe essere più estesa di una decina di secondi (situata 1' a W di CGCG 71-42).
MAC 1248+0907	gx	12h48m46s	+09°07.1'		Vir	24”	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e con nucleo stellare, rotonda con Ø < 20” — 580x.
MAC 1248+4139	gx	12h48m47s	+41°39.3'		CVn	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso N — 495x.
MAC 1248+4142	gx	12h48m41s	+41°42.5'		CVn	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MAC 1248+5048	gx	12h47m20s	+50°48.7'		Cvn	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NNW — 450x.
MAC 1248+5049	gx	12h48m31s	+50°50.0'		Cvn	24"	buona / ottimo	molto debole in visione distolta appare poco diffusa, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1250+0457	st?	12h50m10s	+04°57.3'		Vir	24”	ottima / ottimo	nella posizione riportata sul Megastar si vede soltanto una doppia serrata, poco sbilanciata in luminosità, facilmente separabile anche a 340x, con le componenti orientate da WNW a ESE; anche spingendo a 580x non si nota traccia di nebulosità negli immediati dintorni. L'immagine di Aladin, successivamente controllata, ha confermato l'osservazione.
MAC 1250+5204	gx	12h50m31s	+52°04.0'		Cvn	28"	m. buona / buono	molto piccola e debole, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 3' S di UGC 7993, rotonda con Ø < 20" — 495x.
MAC 1254+5511	gx	12h54m17s	+55°11.9'		UMa	24"	buona / ottimo	assieme alla successiva, situata 2.5' a NW, forma una coppia di piccole e debolissime galassiette approssim. rotonde con Ø < 20" — 450x.
MAC 1254+5513	gx	12h54m07s	+55°13.8'		UMa	24"	buona / ottimo	v. **MAC 1254+5511**
MAC 1255+1014	gx	12h55m43s	+10°14.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 9.5' a WNW di UGC 8056) — 450x.
MAC 1255+5512	gx	12h55m30s	+55°12.6'		UMa	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
MAC 1255+7048	gx	12h55m33s	+70°48.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1’ W — 450x.
MAC 1256+1010	gx	12h56m04s	+10°10.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" (situata 4' a WSW di UGC 8056) — 450x.
MAC 1256+2703	gx	12h56m32s	+27°03.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, estesa grosso modo come la NGC 4821, con condensazione centrale visibile a tratti in visione distolta; mi è apparsa mentre da NGC 4819 spostavo lentamente il telescopio per arrivare a NGC 4827 (altresì denominata **LEDA 94037**) — 380x.
MAC 1256+2749	gx	12h56m27s	+27°49.8'		Com	16"	m. buona / ottimo	è di aspetto simile a CGCG 160-23, e di dimensioni analoghe — 380x.
MAC 1256+2750	gx	12h56m10s	+27°50.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	relativamente facile a 380x, rotonda, diffusa e con Ø di 30"35"; c'è una stellina a ~ 1' NNE (situata 6' a N di NGC 4816).
MAC 1256+3042	gx	12h56m59s	+30°42.1'		Com	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo appena condensato, con Ø di 15"-20"; appare in visione distolta a ~ 1' S di CGCG 160-36 — 380x.
MAC 1256+4818	gx	12h56m50s	+48°18.0'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	osservando a 270x sembra a momenti come divisa in due: e in effetti, da un controllo effettuato successivamente, forma una coppia serrata con NGC 4837 situata a ridosso di Se.
MAC 1256+7901	gx	12h56m24s	+79°01.8'		Cam	28"	buona / buono	appare solo a tratti come un piccolo ed elusivo oggetto diffuso situato a ridosso S di CGCG 352-48 — 388x.
MAC 1257+1328	gx	12h57m32s	+13°28.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 1258+0914	gx	12h58m40s	+09°14.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, a tratti condensata, in visione distolta sembra rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 1258+2936	gx	12h58m27s	+29°36.7'		Com	16"	ottima / ottimo	appare elusivamente solo in visione distolta a 380x, estesa forse una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N
MAC 1259+0858B	gx	12h59m17s	+08°58.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S — 450x.
MAC 1259+0959	gx	12h59m59s	+09°59.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta, forse rotonda con Ø max di 15" — 450x.
MAC 1300+0831A	gx	13h00m21s	+08°31.8'		Vir	24”	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; equidistante, ma non allineata, con 2 stelline abbastanza brillanti a W — 450x.
MAC 1300+0841C	gx	13h00m09s	+08°41.5'		Vir	24”	m. buona / ottimo	più debole e piccola di MAC 1300+0842A, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione distolta a ridosso SE di CGCG 71-93 — 450x.
MAC 1300+0842A	gx	13h00m08s	+08°42.4'		Vir	24”	m. buona / ottimo	situata a ridosso NNE di CGCG 71-93 appare facilmente in visione distolta a 450x, piccola rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare evidente.
MAC 1301+0622	gx	13h01m53s	+06°22.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1302+2756	gx	13h02m35s	+27°56.9'		Com	24"	ottima / ottimo	molto debole e poco contrastata sul fondo cielo, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 450x.
MAC 1302+5026	gx	13h02m23s	+50°26.0'		Cvn	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
MAC 1303+0243	gx	13h03m35s	+02°43.5'		Vir	24"	ottima / buono	è di aspetto praticamente uguale a MAC 1303-1137, sia come dimensioni, sia come orientamento — 450x.
MAC 1303+1450	gx	13h03m33s	+14°50.3'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1303+1454	gx	13h03m56s	+14°54.1'		Com	24"	m. buona / ottimo	appare quasi elusivamente a ridosso S della debolissima CGCG 100-26; è molto piccola, estesa una decina di secondi e con nucleo stellare — 450x.
MAC 1304+4736	gx	13h04m35s	+47°36.7'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 1305+3158	gx	13h05m13s	+30°58.3'		CVn	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo oggetto rotondo di max 20" di Ø che appare solo a momenti in visione distolta a 1.5' S di UGC 8179 — 380x.
MAC 1305+3601	gx	13h05m55s	+36°01.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile subito a NW e una più brillante a 1' SW — 450x.
MAC 1305+3603	gx	13h05m36s	+36°04.3'		CVn	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, si fatica un po' a vederla in una piccola zona di cielo depleta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina molto debole subito a SW — 450x.
MAC 1306+1555	gx	13h06m52s	+15°55.1'		Com	24"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce orientato da NW a SE ed esteso < 30"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1306+1614	gx	13h06m46s	+16°14.1'		Com	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, a tratti molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina a 1' N — 450x.
MAC 1306+1619	gx	13h06m38s	+16°19.1'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, forse rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x.
MAC 1306+4513	gx	13h06m51s	+45°13.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1307+5402	gx	13h07m27s	+54°02.3'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 1308+0422	gx	13h08m30s	+04°22.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 8217 e di fatto, pur essendo debole, delle due è la prima che appare e anche facilmente: è diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; UGC appare elusivamente in visione distolta a ridosso NW della MAC e non dovrebbe essere più estesa di 20" — 450x.
MAC 1308+4345	gx	13h08m34s	+43°45.8'		CVn	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1310+0840	gx	13h10m00s	+08°40.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza, forse circolare con Ø < 30"; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; c'è una stellina a 2.5' SW.
MAC 1310+4405	gx	13h10m52s	+44°05.6'		CVn	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente facile, compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1311+3859	gx	13h11m15s	+38°59.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1311+3916A	gx	13h11m24s	+39°16.7'		CVn	24"	m. buona / m. buono	assieme alle 3 successive fa parte del difficile ammasso AGC 1691 — sono debolissime, di aspetto a prima vista simile, rotonde con Ø di 10” o 12”; la 1ª forma una coppia serrata con MAC 1311+3916B situata a ridosso SE, che appare per prima come una stellina appena percettibile; la 3ª è appena più evidente delle altre, mentre la 4ª appare anch'essa come una debolissima stellina; purtroppo sono anche situate in una piccola zona virtualmente depleta, il che rende difficile scovarle a 450x (a 340x si scorgono con fatica ancora maggiore).
MAC 1311+3916B	gx	13h11m25s	+39°16.5'		CVn	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 1311+3916A**
MAC 1311+3917	gx	13h11m18s	+39°17.3'		CVn	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 1311+3916A**
MAC 1311+3919	gx	13h11m23s	+39°19.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 1311+3916A**
MAC 1311+3943	gx	13h11m19s	+39°13.7'		CVn	24"	m. buona / m. buono	appare come una stellina appena percettibile situata a 1.5' a E di MCG+7-27-39 — 450x.
MAC 1311+4023	gx	13h11m46s	+4023.9'		CVn	24"	m. buona / m. buono	piccola, debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1311+5322	gx	13h11m15s	+53°22.9'		Sex	24"	m. buona / buono	debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme (situata 16.5' a SE di NGC 5001) — 450x.
MAC 1312+1143	gx	13h12m23s	+11°43.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare a momenti quasi a ridosso NE di una doppia sbilanciata; non sembra più estesa di 15" — 450x.
MAC 1312+3423	gx	13h12m24s	+34°23.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma visibile senza difficoltà a 380x, rotonda con Ø di 30".
MAC 1312+4510	gx	13h12m09s	+45°10.7'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 495x.
MAC 1313+3407	gx	13h13m53s	+34°07.5'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
MAC 1313+3910	gx	13h13m14s	+39°10.6'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" (l'unico riferimento è una debole stellina di 15-esima situata 3' a NE) — 495x.
MAC 1313+5123	gx	13h13m39s	+51°23.9'		Cvn	24"	buona / ottimo	piccola e molto debole, a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scalare — 450x.
MAC 1314+3356	gx	13h14m01s	+33°56.2'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, di Ø max 30" e con condensazione centrale stallare abbastanza evidente a 380x.
MAC 1314+6926	gx	13h14m14s	+69°26.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette molto deboli, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi; questa è poco più evidente e appena più grande; c'è una stellina a 1’ N — 450x.
MAC 1314+6926A	gx	13h14m22s	+69°26.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	v. MAC 1314+6926
MAC 1315+0031	gx	13h15m30s	+00°31.4'		Vir	24”	m. buona / buono	molto piccola, appare elusivamente a 450x subito a E di una stellina, ma non sono riuscito a capirne la forma.
MAC 1315+1253	gx	13h15m24s	+12°53.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	più evidente di **CGCG 72-36** situata a 1' scarso NNW, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1316+0812	gx	13h16m22s	+08°12.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø < 20"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina appena percettibile subito a SW.
MAC 1316+5257	gx	13h16m29s	+52°57.6'		UMa	24"	buona / ottimo	appare a tratti come una debolissima stellina appena sfuocata; c'è una stellina a 1' NE; situata 1.5' a N di UGC 8347 — 450x.
MAC 1317+2041	gx	13h17m30s	+20°41.0'		Com	16"	m. buona / ottimo	è un elusivo oggetto rotondo molto piccolo e diffuso, di 10"-15" di Ø visibile a tratti in visione distolta a 380x (ma a questo ingrandimento il campo è depleto) — è sorta la Luna: ultima gx osservata.
MAC 1317+4224	gx	13h17m51s	+42°24.5'		CVn	28"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 495x.
MAC 1317+4226B	gx	13h17m51s	+42°26.2'		CVn	28"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a tratti a 1' N della precedente, ma è soltanto una stellina appena sfuocata — 495x.
MAC 1320+3305A	gx	13h20m13s	+33°05.5'		CVn	16"	buona / ottimo	è di aspetto simile a NGC 5098 (che vento!), appena più piccola e situatale quasi a ridosso verso E; presenta un Ø di 25" e una condensazione centrale evidente — 380x.
MAC 1321+1212	gx	13h21m06s	+12°12.7'		Vir	24"	buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 1324+3233	gx	13h24m40s	+32°32.8'		CVn	16"	ottima / ottimo	è di luminosità e dimensioni poco inferiori a CGCG 190-5, dalla quale dista 1.5' a NNW, con condensazione centrale stellare; non è purtroppo possibile spingere a 380x perché il campo è virtualmente depleto.
MAC 1324+4339	gx	13h24m46s	+43°39.7'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare elusivamente in visione distolta a 1’ SSW di CGCG 218-9 — 450x.
MAC 1324+4345	gx	13h24m34s	+43°45.1'		CVn	24"	m. buona / m. buono	è un baffo di luce molto debole che in visione distolta pare aggettare per una 30-ina di secondi a W di una debole stellina — 450x.
MAC 1325+4349	gx	13h25m40s	+43°49.0'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1326+0210	gx	13h26m34s	+02°10.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, appare a tratti a 450x a una 40-ina di secondi SW di una stellina, probabilmente rotonda con Ø max di 20".
MAC 1327+3421A	gx	13h27m57s	+34°22.0'		CVn	16"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta, con Ø di una 20-ina di secondi, abbastanza facile da vedere a 380x.
MAC 1328+1102	gx	13°28m49s	+11°02.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1328+1137	gx	13h28m43s	+11°37.5'		Vir	24"	buona / buono	v. **CGCG 72-79**
MAC 1329+1113	gx	13h29m04s	+11°14.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1329+1120	gx	13h29m21s	+11°20.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo equilatero con due stelline a W e NW — 450x.
MAC 1329+1127B	gx	13h29m39s	+11°27.6'		Vir	24"	buona / buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a1' E — 450x.
MAC 1329+1129A	gx	13h29m03s	+11°30.0'		Vir	24"	buona / buono	molto debole e assai disturbata dalla SAO 100590 di 8ª grandezza situata un paio di primi a SSE; in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una stellina appena percettibile si trova a 1' scarso E: quest'ultima appare diffusa a 450x e da un controllo successivamente effettuato, c'è di fatto la elusiva MAC 1329+1129B a ridosso E.
MAC 1329+1129B	gx	13h29m07s	+11°29.7'		Vir	24"	buona / buono	v. **MAC 1329+1129A**
MAC 1329+1138	gx	13h29m34s	+11°38.2'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (situata 1.5' a NE di NGC 5178) — 450x.
MAC 1329+1143	gx	13h29m25s	+11°43.6'		Vir	24"	buona / buono	molto piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x subito a SE di NGC 5171 — 450x.
MAC 1329+1637	gx	13h29m18s	+16°37.3'		Com	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare in visione distolta a ~ 1' S di una stellina appena percettibile, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1332+1246	gx	13h32m50s	+12°46.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare in visione distolta subito a SW di una stellina appena percettibile, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1332+1254	gx	13h32m56s	+12°54.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MAC 1334+0319	gx	13h34m05s	+03°19.8'		CVn	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima stellina appena sfuocata situata a ~ 1' S di CGCG 45-24 e che appare ogni tanto in visione distolta a 450x.
MAC 1334+1037	gx	13h34m46s	+10°37.0'		Vir	24"	ottima / buono	debolissima, è visibile in visione distolta a 450x, ma solo a tratti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15".
MAC 1334+3455	gx	13h34m17s	+34°55.8'		CVn	16"	m. buona / ottimo	più evidente di PGC 47817, dalla quale dista 4' verso N, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale visibile a 380x.
MAC 1334+4609	gx	13h34m25s	+46°09.5'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una coppia di deboli stelline subito a SW — 495x.
MAC 1335+4006	gx	13h35m35s	+40°06.7'		CVn	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1336+0316	gx	13h36m48s	+03°16.8'		Vir	24"	ottima / buono	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 1336+1552	gx	13h36m30s	+15°52.9'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a S (la più settentrionale di un piccolo triangolo rettangolo) — 450x.
MAC 1336+3329	gx	13h37m49s	+33°29.3'		CVn	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e di 20" di Ø, osservabile in visione distolta a 380x.
MAC 1337+0515	gx	13h37m51s	+05°15.1'		Vir	24"	ottima / buono	poco diffusa, orientata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione stellare appena percettibile — 450x.
MAC 1337+1603	gx	13h37m35s	+16°03.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15".
MAC 1339+0440	gx	13h39m52s	+04°40.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta quando si osserva la CGCG 45-65 situata un paio di primi a W — 450x.
MAC 1339+0610	gx	13h39m37s	+06°10.1'		Vir	24"	buona / buono	è di aspetto quasi stellare a 280x, mentre a 450x appare come un piccolo oggetto rotondo di una 15-ina di secondi di Ø.
MAC 1339+3059	gx	13h39m23s	+30°59.5'		CVn	16"	buona / buono	è una sorta di nodulo luminoso che a 380x appare a momenti a ridosso W di NGC 5259 (q 109).
MAC 1339+6129	gx	13h39m12s	+61°29.3'		UMa	24"	m. buona / ottimo	è un oggetto molto piccolo esteso sì e no 10”che appare in visione distolta a 1’ S di UGC 8649 — 450x.
MAC 1340+0445	gx	13h40m31s	+04°45.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1341+2706	gx	13h41m46s	+27°06.4'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, estesa non più di una 20-ina di secondi, relativamente compatta, appare in visione distolta a 380x.
MAC 1343+0350	gx	13h43m13s	+03°50.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1345+2315	gx	13h45m12s	+23°15.1'		Boo	16"	ottima / ottimo	(situata un paio di primi a NNW di IC 933) appare solo di sfuggita a 380x, compatta, orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare (altresì denominata **LEDA 214145**).
MAC 1345+3633	gx	13h45m54s	+36°33.9'		CVn	16"	buona / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale appena percettibile a 270x.
MAC 1346+1424	gx	13h46m51s	+14°24.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; situata 1' NNE di **CGCG 102-56**; c'è una stellina brillante a 1.5' verso W — 450x.
MAC 1346+1736	gx	13h46m35s	+17°36.4'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissima macchiolina visibile a ~ 1' NW di una stellina; è estesa non più di 15" o 20", ma a 380x sembra di aspetto irregolare.
MAC 1347+0337	gx	13h47m07s	+03°37.3'		Vir	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima macchiolina estesa 10"-12"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' S di CGCG 45-99, meglio a 450x.
MAC 1347+7157	gx	13h47m18s	+71°57.1'		UMi	24"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1348+1525	gx	13h48m15s	+15°25.8'		Boo	24"	ottima / buono	debolissima e stemperata sul fondo cielo, visibile a tratti a 270x e con Ø di ~ 30".
MAC 1349+3517A	gx	13h49m15s	+35°17.7'		CVn	16"	buona / buono	debole, ma relativamente facile, compatta, di 20" di Ø e con condensazione centrale quasi stellare — 380x.
MAC 1349+4003	gx	13h49m38s	+40°03.8'		CVn	24"	m. buona / mediocre	molto debole e piccola, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1349+7239	gx	13h49m00s	+42°39.2'		UMi	16"	ottima / buono	è un piccolo e debolissimo oggetto diffuso esteso max per una 20-ina di secondi che appare all'interno di un quadrilatero di stelline situato a SW di NGC 5340 — 188x.
MAC 1350+0213	gx	13h50m34s	+02°13.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1352+0749A	gx	13h52m53s	+07°49.1'		Boo	24"	buona / buono	molto piccola e debolissima, diffusa, forse rotonda con Ø 10"-15" — 450x.
MAC 1352+0755	gx	13h52m15s	+07°55.3'		Boo	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1352+0758	gx	13h52m18s	+07°58.1'		Boo	24"	buona / buono	debolissima e molto piccola, appare facilmente in visione distolta a 450x a 1' N di una debole stellina; è rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
MAC 1352+1429	gx	13h52m25s	+14°29.4'		Boo	24"	m. buona / ottimo	appare come un nodulo appena percettibile di aspetto quasi stellare situato al margine SW di IC 950 — 450x.
MAC 1352+2134	gx	13h52m36s	+21°34.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	appare facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 132-28 (situata 3' W); è poco più estesa, di dimensioni ~ 30" e con nucleo stellare — 380x.
MAC 1352+3741	gx	13h52m53s	+37°41.4'		CVn	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, compatta, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale molto tenue — 450x.
MAC 1353+0516	gx	13h53m39s	+05°16.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma poco più evidente di **MAC 1354+0517A** (osservata per prima), rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e a tratti condensata — 450x.
MAC 1353+1439	gx	13h53m09s	+14°39.7'		Boo	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta a ridosso N di CGCG 102-76; forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 1353+1440	gx	13h53m23s	+14°40.1'		Boo	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; poco disturbata dalla SAO 100750 di 8ª grandezza situata a 2.5' NW — 450x.
MAC 1353+1442A	gx	13h53m28s	+14°42.4'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole, non più estesa di 10" e relativamente compatta; anche questa è disturbata dalla SAO 100750 di 8ª grandezza situata 3.5' a E — 450x.
MAC 1353+1719	gx	13h53m08s	+17°19.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti subito a SW di CGCG 102-77; non ne capisco la forma, ma dovrebbe avere grosso modo le stesse dimensioni della compagna; è situata tra due stelline molto deboli, a NW e SE — 450x.
MAC 1353+3744	gx	13h53m36s	+37°44.1'		CVn	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso NW; meglio contrastata a 450x.
MAC 1354+0517A	gx	13h54m10s	+05°16.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare a momenti in visione distolta, ma è meglio spingere a 450x, forse rotonda con Ø di 20".
MAC 1354+0526	gx	13h54m29s	+05°26.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno — 450x.
MAC 1354+4412	gx	13h54m12s	+44°12.5'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10"; forma una coppia ravvicinata con **CGCG 219-24** situata a ridosso NW — 495x.
MAC 1355+0553	gx	13h55m36s	+05°53.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare, perché situata in una piccola zona depleta, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1355+1448	gx	13h55m30s	+14°48.2'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, appare elusivamente a 1' SW di una stellina brillante — 450x.
MAC 1356+0538	gx	13h56m58s	+05°38.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di max 15" — 450x.
MAC 1357+0724	gx	13h57m52s	+07°24.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; appare facilmente in visione distolta quando si osserva la CGCG 46-17 situata 1.5' a SW — 450x.
MAC 1358+1329	gx	13h58m27s	+13°29.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
MAC 1358+1727	gx	13h58m19s	+17°27.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø con Ø di 12"-15"; è situata in una piccola plaga depleta: meglio scalare a 340x.
MAC 1358+3729	gx	13h58m34s	+37°29.7'		CVn	24"	ottima / m. buono	debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, probabilmente rotonda con Ø non superiore a 15" o 20".
MAC 1359+1449	gx	13h59m24s	+14°49.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce che aggetta per una 30-ina di secondi a S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 1359+1452	gx	13h59m45s	+14°52.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1400+1205	gx	14h00m33s	+12°05.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
MAC 1400+1515	gx	14h00m08s	+15°15.5'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta con nucleo stellare visibile però solo a momenti; a tratti appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MAC 1400+4926	gx	14h00m24s	+49°26.6'		Boo	28"	m. buona / buono	piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta, ma solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MAC 1401+1029	gx	14h01m15s	+10°29.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso < 30" e orientato da NW a SE; appare in visione distolta a 1.5' W di UGC 8934, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1401+1032	gx	14h01m31s	+10°32.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, estesa sì e no 10"-12"; salta fuori in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x in quanto situata in una piccola zona depleta.
MAC 1404+0434	gx	14h04m06s	+04°34.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SW — 450x.
MAC 1404+1154	gx	14h04m49s	+11°54.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima ed estesa non più di 15"; è situata tra una stellina abbastanza brillante a 1' SW e una molto debole alla stessa distanza verso NE — 450x.
MAC 1404+1159	gx	14h04m16s	+11°59.9'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; appare facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 74-78 situata 1.5' a NE — 450x.

MAC 1406+0921	gx	14h06m12s	+09°21.7'		Boo	16"	m. buona / scarso	appare come una stellina debolmente sfuocata all'estremità NE di NGC 5463 e visibile con una certa difficoltà a 270x.
MAC 1409+7221	gx	14h09m15s	+72°21.6'		UMi	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, poco diffusa, rotonda con Ø < 20".
MAC 1412+0839	gx	14h12m41s	+08°39.2'		Boo	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-15" (situata 2.5' a E di CGCG 74-136 osservata col 16" in altra data).
MAC 1413+0812	gx	14h13m30s	+08°12.2'		Boo	24"	buona / buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di 15" o 20"; salta fuori con una certa difficoltà in visione distolta a 570x.
MAC 1413+0838	gx	14h13m22s	+08°38.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø di 10"-15" e un poco disturbata da una stellina brillante a 1.5' SSW (situata 4' scarsi a ENE di NGC 5511) — 450x.
MAC 1414+3608	gx	14h14m49s	+36°08.7'		Boo	24"	ottima / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e nucleo stellare; c'è una stellina brillante a < 1' verso S — 450x.
MAC 1415+2526	gx	14h15m16s	+25°26.8'		Boo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SW — 450x.
MAC 1415+3607	gx	14h15m09s	+36°07.5'		Boo	24"	ottima / m. buono	è una debolissima stellina sfuocata che appare a momenti in visione distolta a meno di 1' NW di una stellina abbastanza brillante; non sembra più estesa di 10" 0 12"; è stranamente meglio visibile scalando a 340x.
MAC 1415+3609	gx	14h15m13s	+36°10.1'		Boo	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente e solo a tratti a ridosso N di una stellina molto debole — 450x.
MAC 1416+1047B	gx	14h16m53s	+10°47.9'		Boo	16"	buona / m. buono	appare alla 1ª occhiata come una stellina abbastanza brillante situata a ridosso S di NGC 5532; tuttavia, osservata ad alti ingrandimenti e col seeing buono, come stasera, si vede chiaramente che si tratta di una macchiolina diffusa, estesa una 15-ina di secondi (riportata sull'Uranometria come **5532B**) — 270x.
MAC 1416+3612A	gx	14h16m14s	+36°12.6'		Boo	24"	ottima / m. buono	debole, piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1416+3612B	gx	14h16m19s	+36°12.7'		Boo	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso NW — appare come una debolissima stellina sfuocata che tuttavia si separa dalla compagna solo a 450x.
MAC 1416+3613A	gx	14h16m18s	+36°13.0'		Boo	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la precedente situata a ridosso SE — diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare visibile a momenti; la coppia appare meglio contrastata scalando a 340x, ma si riesce a sdoppiare solo a 450x.
MAC 1417+2506	gx	14h17m34s	+25°06.9'		Boo	24"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare solo a momenti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 30"×15" — 450x.
MAC 1417+5841	gx	14h17m59s	+58°41.3'		UMa	24"	m. buona / discreto	è una debolissima galassietta di luminosità uniforme che in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1418+1046	gx	14h18m48s	+10°30.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1419+0732	gx	14h19m40s	+07°32.3'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di 10"-15"; si trova subito a W di una stella brillante che disturba un po' l'osservazione — 450x.
MAC 1419+4554	gx	14h19m24s	+45°54.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, appare abbastanza facilmente in visione distolta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1424+0110	gx	14h24m37s	+01°10.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	baffo di luce molto debole, orientato da NW a SE, di luminosità uniforme e di dimensioni 30"×15"; la gx è disturbata da una debole stellina al bordo W — 450x.
MAC 1427+0250	gx	14h27m14s	+02°50.8'		Vir	24"	m. buona / mediocre	piccola e molto debole, con nucleo stellare visibile a momenti, diffusa ed estesa < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a una 40-ina di secondi SW.
MAC 1427+1611	gx	14h27m25s	+16°11.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20", ma è meglio scalare a 340x.
MAC 1427+1611A	gx	14h27m53s	+16°11.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata 1' scarso a SSW di IC 4433) — 450x.
MAC 1427+3311	gx	14h27m51s	+33°11.2'		Boo	16"	ottima / m. buono	debolissima chiazza diffusa, rotonda con Ø max 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso verso S — 380x.
MAC 1428+1133	gx	14h28m57s	+11°33.7'		Boo	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, a 450x, in visione distolta, appare soltanto come una stellina sfuocata.
MAC 1428+1349	gx	14h28m47s	+13°49.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, molto disturbata da una stella brillante a un paio di primi NW; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 15" — 450x.
MAC 1429+1349	gx	14h29m29s	+13°49.4'		Boo	24"	ottima / ottimo	molto piccola, debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione distolta a 450x, ma è disturbata da una stellina abbastanza brillante situata a 1' SW; una stellina debole si trova quasi a ridosso SE.
MAC 1429+0446	gx	14h29m09s	+04°46.1'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, a tratti condensata, orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
MAC 1429+0715	gx	14h29m46s	+07°15.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è uno di quei 2 oggetti diffusi molto piccoli che a 450x appaiono abbastanza facilmente 1' scarso a NE e a SE di CGCG 47-64: questo di NE è il più evidente, esteso forse una 15-ina di secondi; questo di NE è il più evidente, esteso forse una 15-ina di secondi; quello a SE è invece la PGC 1317214 — 450x.
MAC 1429+5349	gx	14h29m45s	+53°49.7'		Boo	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1430+0705	gx	14h30m23s	+07°05.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e piccola gx diffusa che tutto sommato appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, grosso modo rotonda con Ø < 30".
MAC 1430+2303	gx	14h30m16s	+23°03.7'		Boo	16"	ottima / ottimo	è un elusivo e minuscolo oggetto rotondo che a prima vista, a 380x, sembra una stellina leggermente sfuocata; appare in visione distolta a poco meno di 1' W di UGC 9322.
MAC 1430+4000	gx	14h30m24s	+40°00.5'		Boo	28"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, diffusa ed estesa sì e no 15"; appare a momenti in visione distolta a ridosso E di una coppia serrata di deboli stelline — 495x.
MAC 1430+5354	gx	14h30m51s	+53°54.5'		Boo	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1430+5403	gx	14h30m56s	+54°03.1'		Boo	24"	m. buona / discreto	debolissima e diffusa, di forma indistinta, forse circolare con Ø < 30" — 450x.
MAC 1431+0520	gx	14h31m02s	+05°20.4'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo esteso una 30-ina di secondi in direzione NW-SE; appare a tratti in visione distolta a 450x.
MAC 1431+1431	gx	14h31m11s	+14°31.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina a 1' N — 450x.
MAC 1431+1435	gx	14h31m24s	+14°35.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e molto debole, relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1431+2538	gx	14h31m07s	+25°38.0'		Boo	16"	ottima / ottimo	debolissima, molto piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta a 380x quando si osserva la stellina a ~ 2' verso SW.
MAC 1431+5358	gx	14h31m03s	+53°58.3'		Boo	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare circolare con Ø < 30" — 450x.
MAC 1431+5401	gx	14h31m24s	+54°01.5'		Boo	24"	m. buona / discreto	piccola, debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 1432+5620	gx	14h32m08s	+56°20.4'		Dra	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' SE — 495x.
MAC 1433+0341	gx	14h33m38s	+03°41.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccolo e debole oggetto rotondo di max 20" di Ø, diffuso e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
MAC 1433+5318	gx	14h33m01s	+53°18.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	debolissima, appare in visione distolta quasi a ridosso NE di una stellina; estesa una 20-ina di secondi, ma di forma indistinta — 450x.
MAC 1434+0036	gx	14h34m11s	+00°36.9'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a poco più di 1' E di CGCG 19-63, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1434+0320	gx	14h34m46s	+03°20.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	si "stacca" solo a momenti a ridosso SW di **CGCG 47-106**, ma appare come una stellina appena percettibile — 450x.
MAC 1434+0354	gx	14h34m08s	+03°54.1'		Vir	24"	buona / m. buono	piccola e molto debole, diffusa rotonda con Ø 10" o 15" (a bassi ingrandimenti potrebbe essere scambiata per una stellina sfocata); forma un piccolo triangolo equilatero con 2 deboli stelline a E e a S — 450x.
MAC 1435+2445A	gx	14h35m47s	+24°45.2'		Boo	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto molto piccolo e diffuso, probabilmente rotondo con Ø max 20" situato quasi a ridosso SE di una coppia serrata di stelline la cui distanza è pari alle dimensioni della gx — 380x.
MAC 1435+5512	gx	14h35m02s	+55°12.8'		Dra	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 495x.
MAC 1436+0551	gx	14h31m02s	+05°20.4'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, appare solo in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 1436+2150	gx	14h36m04s	+21°50.8'		Boo	16"	ottima / ottimo	salta fuori facilmente in visione distolta a 270x quando si osserva UGC 9401 situata 3.5' SSE — 380x.
MAC 1437+0551	gx	14h37m12s	+05°51.4'		Vir	24"	ottima / ottimo	anche questa è molto piccola e debolissima; appare elusivamente subito a SE di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 1437+5114	gx	14h38m00s	+51°14.9'		Boo	28"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ridosso NE; una stella brillante di 10ª grandezza si trova un paio di primi a W — 495x.
MAC 1438+0913	gx	14h38m21s	+09°13.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1438+5104	gx	14h38m58s	+51°04.7'		Boo	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" (situata 2.5' a S di UGC 9448) — 495x.
MAC 1439+4644	gx	14h39m08s	+46°44.8'		Boo	24"	m. buona / buono	molto piccola, rotonda con Ø di 10"-12" e debolmente condensata — 450x.
MAC 1440+1421	gx	14h40m44s	+14°21.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto tenue, orientato da N a S ed esteso una 40-ina di secondi; forma una coppia ravvicinata con MAC 1440+1421A, situata a ridosso W, ma quest'ultima appare solo elusivamente e a tratti come un piccolo baffo orientato nella stessa direzione ed esteso non più di 20" — 450x.
MAC 1440+1421A	gx	14h40m43s	+14°21.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	v. **MAC 1440+1421**
MAC 1442+0316	gx	14h42m21s	+03°16.3'		Vir	24"	ottima / buono	debolissima, appare in visione distolta a 450x, a tratti molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×10"; c'è una debole stellina a 1' scarso SE.
MAC 1442+0840	gx	14h42m29s	+08°40.9'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; forma una coppia ravvicinata con MAC 1442+0841 situata a ridosso N; quest'ultima è di aspetto, dimensioni e orientamento simili; ha una stellina a ridosso NE — 450x.
MAC 1442+0841	gx	14h42m29s	+08°41.7'		Boo	24"	buona / ottimo	v. **MAC 1442+0840**
MAC 1442+2221	gx	14h42m30s	+22°21.1'		Boo	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" con condensazione centrale stellare visibile a tratti a 380x (non sono riuscito a vedere la compagna al margine SW).
MAC 1443+4110	gx	14h43m27s	+41°10.2'		Boo	28"	m. buona / buono	piccola, relativamente facile e compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' verso N — 495x.
MAC 1444+1523	gx	14h44m14s	+15°23.2'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima, molto piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1444+1928	gx	14h44m31s	+19°28.2'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"; c'è una stellina molto debole a neppure 1' verso N; meglio tuttavia scalare a 270x.
MAC 1446+1031	gx	14h46m20s	+10°31.7'		Boo	24"	m. buona / ottimo	situata a ridosso N di CGCG 76-24, appare elusivamente come un baffo orientato da E a W esteso sì e no 20"; tuttavia, anche a 580x la gx si separa con gran difficoltà dalla principale e solo a momenti.
MAC 1446+1055	gx	14h46m36s	+10°55.4'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1446+2351	gx	14h46m26s	+23°51.2'		Boo	16"	discreta / ottimo	debolissimo oggetto rotondo esteso una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a 380x.
MAC 1448+1649	gx	14h48m51s	+16°49.9'		Boo	24"	ottima / buono	molto piccola, appare elusivamente a ridosso NW di una debole stellina, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 1448+4953	gx	14h48m52s	+49°53.2'		Boo	28"	m. buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 495x.
MAC 1448+5749	gx	14h48m36s	+57°49.8'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, più che altro disturbata da due stelline abbastanza brillanti in mezzo alle quali si trova; in visione distolta non sembra più estesa di 15" — 495x.
MAC 1449+1346	gx	14h49m39s	+13°46.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, salta fuori in visione distolta a ridosso E di una stellina appena percettibile — 450x.
MAC 1449+1650	gx	14h49m14s	+16°50.7'		Boo	24"	ottima / buono	debolissima, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata anche questa da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante a 1' W; la visione è poco disturbata dalla SAO 101231 di 9ª grandezza situata un paio di primi a SE — 450x.
MAC 1453+0425	gx	14h53m25s	+04°25.3'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole e molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1453+0001	gx	14h53m43s	+00°01.8'		Vir	24"	buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 20"×10" *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
MAC 1453+1804A	gx	14h53m40s	+18°04.2'		Boo	16"	buona / mediocre	alla prima occhiata pare poco più evidente di UGC 9577, dalla quale dista un paio di primi a SE, forse per il fatto di essere più piccola e compatta, con estensione 20"-25"; a tratti si vede una condensazione centrale puntiforme (altresì denominata **LEDA 84348**) — 270x.
MAC 1453+2202	gx	14h53m21s	+55°02.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; ci sono due stelline appena percettibili a 1' scarso N e a poco più di 1' SE — 495x.
MAC 1453+2213	gx	14h54m27s	+55°13.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 1453+5408	gx	14h53m05s	+54°08.9'		Boo	28"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, estesa una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' N e una terna di stelline arcuate a W (situata assieme alla successiva al margine SW dell'ammasso **AGC 1999**) — 495x.
MAC 1453+5408A	gx	14h53m21s	+54°08.2'		Boo	28"	m. buona / m. buono	altra debolissima galassietta estesa come la precedente e che appare a tratti in visione distolta; allineata ma non equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti a NE — 495x.
MAC 1453+5415	gx	14h53m41s	+54°15.8'		Boo	28"	m. buona / m. buono	appare solo a momenti in visione distolta, molto piccola, non più estesa di 15" — 495x.
MAC 1454+0317	gx	14h54m32s	+03°17.5'		Vir	24"	buona / buono	molto piccola e debolissima, appare facilmente in visione distolta quasi a ridosso N di CGCG 48-68, ma non bisogna scendere sotto i 450x; non sembra più estesa di una 10-ina di secondi.
MAC 1456+0535	gx	14h56m43s	+05°35.6'		Boo	24"	buona / ottimo	è un piccolo oggetto nebuloso molto tenue,condensato ed esteso una 20-ina di secondi che appare a 1' NW di UGC 9613 — 450x.
MAC 1456+0627	gx	14h56m40s	+06°27.6'		Boo	24"	ottima / ottimo	v. **CGCG 48-73**
MAC 1456+4843	gx	14h56m28s	+48°43.2'		Boo	28"	m. buona / discreto	a causa del seeing non proprio buono appare come una stellina molto debole situata a poco più di 1' SE della gx successiva — 495x.
MAC 1456+4844	gx	14h56m22s	+48°44.1'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina molto debole a ~ 1' SE, ma da un controllo successivo questa è in realtà la **MAC 1456+4843** — 495x.
MAC 1456+5858	gx	14h56m18s	+58°58.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
MAC 1457+2441	gx	14h57m02s	+24°41.2'		Boo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto di luminosità uniforme, probabilmente rotondo con Ø di 20"; appare in visione distolta a 45° N di una stellina — 380x.
MAC 1500+1601	gx	15h00m24s	+16°01.3'		Boo	24"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 450x.
MAC 1500+4320	gx	15h00m34s	+43°20.1'		Boo	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1500+4909	gx	15h00m50s	+49°09.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" (occupa il vertice meridionale di un piccolo triangolo isoscele rettangolo formato con una stella brillante a N e una più debole a NE — 450x.
MAC 1501+0153	gx	15h01m18s	+01°53.1'		Vir	24"	buona / ottimo	relativamente facile, molto piccola, compatta e condensata, rotonda con Ø di 10" o 15"; non sembra particolarmente disturbata dalla SAO 120'795 di 8ª grandezza situata ad appena un paio di primi a SW — 450x.
MAC 1503+4825	gx	15h03m56s	+48°25.9'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina a ridosso N — 495x.
MAC 1503+4841	gx	15h03m19s	+48°41.9'		Boo	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 1504+1026	gx	15h04m37s	+10°26.5'		Boo	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una stellina a 1' SSE (la gx è situata 2.5' a N di CGCG 76-143) — 450x.
MAC 1504+2821B	gx	15h04m46s	+28°21.2'		Boo	28"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi, appare a tratti in visione distolta — 495x.
MAC 1504+2825	gx	15h04m17s	+28°25.7'		Boo	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta subito a SW di una stellina, rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
MAC 1504+2826	gx	15h04m05s	+28°26.2'		Boo	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 495x.
MAC 1504+2829B	gx	15h04m18s	+28°29.7'		Boo	28"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme alle 7 successive, dell'ammasso **AGC 2022** — piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata a ridosso E di **CGCG 165-6** — 495x.
MAC 1504+2830A	gx	15h04m11s	+28°30.5'		Boo	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e condensata; situata in mezzo tra **CGCG 165-5** e **165-6** — 495x.
MAC 1504+2830B	gx	15h04m18s	+28°30.4'		Boo	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 1504+2834B	gx	15h04m16s	+28°34.2'		Boo	28"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NNW — 495x.
MAC 1504+4244	gx	15h04m51s	+42°44.1'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 495x.
MAC 1504+4836	gx	15h04m19s	+48°36.9'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 495x.
MAC 1504+5442	gx	15h04m33s	+54°42.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti subito a SW di **CGCG 274-11**, ma sembra molto piccola e comunque di forma indistinta — 495x.
MAC 1505+2542	gx	15h05m59s	+25°42.5'		Boo	16"	m. buona / buono	piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; salta fuori facilmente in visione distolta quando si fissa la stellina situata 1' SE; una stellina molto debole è a ridosso NW — 380x.
MAC 1505+2822	gx	15h05m01s	+28°23.1'		Boo	28"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, non ne capisco la forma, ma in visione distolta non sembra più estesa di 30" — 495x.
MAC 1505+5549	gx	15h05m16s	+55°49.7'		Dra	24"	m. buona / buono	debolissima, appare in visione distolta a 450x, ma occorre scalare a 340x, anche se ciò comporta avere un paio di stelle brillanti nel campo (le SAO 29400 e 29401 rispettivamente di 9ª e di 8ª grandezza), probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi. È riportata sull'Uranometria come **NGC 5866A** (situata 11' NW di NGC 5866) — 450x.
MAC 1505+8119	gx	15h05m14s	+81°19.2'		UMi	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1506+0939	gx	15h06m36s	+09°39.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1506+0939A	gx	15h06m20s	+09°39.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a 1' scarso SE — 450x.
MAC 1506+4040	gx	15h06m45s	+40°40.8'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 495x.
MAC 1507+1015	gx	15h07m57s	+10°15.9'		Boo	24"	ottima / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S — 450x.
MAC 1507+1019	gx	15h07m48s	+10°19.0'		Boo	24"	ottima / m. buono	debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta subito a S di una stellina — 450x.
MAC 1507+1023	gx	15h07m44s	+10°23.7'		Boo	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x.
MAC 1507+1023A	gx	15h07m28s	+10°23.9'		Boo	24"	ottima / m. buono	forma una coppia abbastanza ravvicinata con MAC 1507+1025 situata a poco più di 1' NNW; le due gx sono molto deboli e di aspetto simile, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NNE della prima (e a 1' SE della seconda) — 450x.
MAC 1507+1025	gx	15h07m27s	+10°25.1'		Boo	24"	ottima / m. buono	v. **MAC 1507+1023A**
MAC 1507+1041	gx	15h07m52s	+10°42.0'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima e diffusa, appare solo a momenti in visione distolta a 1' E di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 1508+1914	gx	15h08m43s	+19°14.6'		Boo	16"	m. buona / ottimo	elusivo oggetto probabilmente rotondo, con Ø di una 20-ina di secondi; salta fuori in visione distolta, a 380x, a ~ 1' N di una stellina.
MAC 1509+0733	gx	15h09m28s	+07°33.4'		Boo	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1509+0946	gx	15h09m25s	+09°46.3'		Boo	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1509+0948	gx	15h09m16s	+09°48.8'		Boo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
MAC 1509+4508	gx	15h09m38s	+45°08.1'		Boo	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1509+4623	gx	15h09m56s	+46°24.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza diffusa forse rotonda con Ø di 20"-25"; appare in visione distolta subito a SW di una stellina; ci sono 3 stelline abbastanza brillanti serrate e allineate in direzione ENE-WSW a un paio di primi NNW — 450x.
MAC 1510+0121	gx	15h10m02s	+01°21.7'		Vir	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e condensata; è estesa sì e no 10" ed è di aspetto quasi stellare a 210x; è situata a metà strada tra CGCG 49-20, dalla quale dista poco più di 1' a NE e una stellina brillante — 450x.
MAC 1510+0743	gx	15h10m23s	+07°43.0'		Boo	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensazione stellare appena percettibile — 450x.
MAC 1510+0941	gx	15h10m01s	+09°41.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1510+7105	gx	15h10m31s	+71°05.8'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-15"; c'è una stellina subito a NW e una stellina a 1' verso S — 450x.
MAC 1511+0146	gx	15h11m33s	+01°46.9'		Ser	24"	discreta / m. buono	appare in visione distolta a 450x come una debolissima stellina sfocata, in quanto non dovrebbe essere più estesa di 10".
MAC 1511+0517	gx	15h11m03s	+05°17.6'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; è disturbata da una stellina brillante a ridosso NW — 450x.
MAC 1511+0519	gx	15h11m07s	+05°19.0'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1511+0538	gx	15h11m55s	+05°38.3'		Ser	24"	ottima / buono	debolissima e diffusa, a tratti in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E — 450x.
MAC 1511+0610	gx	15h11m43s	+06°10.7'		Ser	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1511+0623	gx	15h11m16s	+06°23.9'		Ser	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1511+0729	gx	15h01m43s	+07°29.6'		Ser	24"	buona / m. buono	molto debole, allungata da N a S di dimensioni 20"×10", con piccola e tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso SW e un'altra abbastanza brillante a 1.5' NNW — 450x.
MAC 1511+0729A	gx	15h11m16s	+07°29.3'		Ser	24"	buona / m. buono	relativamente facile, piccola e con condensazione centrale stellare, rotonda con Ø di 15" o 20"; c'è una stella abbastanza luminosa a 2' scarsi NNW — 450x.
MAC 1511+0731	gx	15h11m57s	+07°31.1'		Ser	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di aspetto uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1.5' NE — 450x.
MAC 1511+1031	gx	15h12m00s	+10°31.0'		Ser	24"	buona / ottimo	debolissima, piccola, diffusa rotonda con Ø di 20" — 450x.
MAC 1511+1032	gx	15h11m07s	+10°32.7'		Ser	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1511+1032A	gx	15h11m09s	+10°32.2'		Ser	24"	buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta quasi a ridosso SE della compagna, molto piccola, forse rotonda con Ø < 15" — 450x.
MAC 1512+0131	gx	15h12m08s	+01°31.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente quasi a ridosso SE di una stellina brillante; non sembra più estesa di 10"-12" — 450x.
MAC 1512+0718	gx	15h12m24s	+07°18.5'		Ser	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e leggermente condensata, poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 450x.
MAC 1512+0726	gx	15h12m43s	+07°26.9'		Ser	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, leggermente condensata, rotonda con Ø di 15"-20" — 450x.
MAC 1512+0733	gx	15h12m44s	+07°33.6'		Ser	24"	buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e condensata, approssim. rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1512+1053	gx	15h12m01s	+10°53.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, ma solo a momenti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; è meglio tuttavia scalare a 340x.
MAC 1513+0427A	gx	15h13m12s	+04°27.0'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima, piccola e molto diffusa, salta fuori in visione distolta a ridosso N di una debole stellina, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1513+0437	gx	15h13m51s	+04°37.3'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1513+0443	gx	15h13m50s	+04°43.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, estesa sì e no una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a ENE — 450x.
MAC 1513+0726	gx	15h13m10s	+07°26.3'		Ser	24"	buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10"; a 450x sembra d'intravedere, seppur a tratti, un nucleo stellare.
MAC 1515+0500	gx	15h15m30s	+05°00.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta a 1' SW di una stellina; disturbata dalla 3 Ser di 5ª grandezza situata 6' a SW — 450x.
MAC 1515+1249	gx	15h15m37s	+12°49.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e piccola condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 1516+0653	gx	15h16m33s	+06°53.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1516+0714	gx	15h16m57s	+07°14.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente in visione distolta a ridosso NW di una stellina brillante (la quale fa parte di un piccolo triangolo isoscele molto aperto le cui componenti sono di luminosità simile) — 450x.
MAC 1516+0718	gx	15h16m33s	+07°18.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	è debolissima, molto piccola, ma relativamente compatta, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 15"×10"; c'è una stellina molto debole a 1' scarso verso S — 450x.
MAC 1516+2450	gx	15h16m19s	+24°50.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima, piccola e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' S di CGCG 135-39 — 450x.
MAC 1517+0515	gx	15h17m47s	+05°15.4'		Ser	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, estesa non più di 10" o 15"; salta fuori in visione distolta a 570x.
MAC 1518+0513	gx	15h18m45s	+05°13.3'		Ser	24"	ottima / ottimo	debolissima, ma anche a 570x appare solo come una stellina sfuocata; è situata a ridosso verso S si una stellina più brillante — 3' NW di CGCG 49-121.
MAC 1519+0515	gx	15h19m18s	+05°15.2'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 1519+4446	gx	15h19m12s	+44°46.9'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; allineata ed equidistante con una coppia sbilanciata di stelline a SE — 495x.
MAC 1520+1152	gx	15h20m08s	+11°52.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 77-75**
MAC 1520+4458	gx	15h20m29s	44°58.2'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina abbastanza brillante; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi a SW e una più debole alla stessa distanza verso SE — 495x.
MAC 1520+4543	gx	15h20m57s	+45°43.3'		Boo	24"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto diffuso estremamente tenue che in visione distolta appare a tratti a ridosso di CGCG 249-18 — 450x.
MAC 1520+7734	gx	15h20m20s	+73°44.3'		UMi	24"	m. buona / ottimo	appare a momenti come un'elusiva stellina a meno di 1' NE di CGCG 337-37 — 450x.
MAC 1521+0457	gx	15h21m26s	+04°57.7'		Ser	24"	m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto disturbata dalla SAO 120957 di magnitudo 8.6 situata 1.5' a WSW; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1521+0504	gx	15h21m22s	+05°04.0'		Ser	24"	m. buona / buono	poco più evidente ed estesa di MAC 1521+0457, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi NW — 450x.
MAC 1521+0821	gx	15h21m51s	+08°21.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1521+0824	gx	15h21m49s	+08°24.6'		Ser	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a tratti poco a S della congiungente tra IC 1116 e UGC 9821; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 10" o 12" — 450x.
MAC 1521+2547	gx	15h21m25s	+25°48.0'		CrB	24"	buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1521+2548	gx	15h21m40s	+25°48.2'		CrB	24"	buona / buono	di aspetto e dimensioni simili a CGCG 135-51, dalla quale dista 1.5' a S, con condensazione centrale appena più evidente — 450x.
MAC 1521+8207	gx	15h21m39s	+82°07.8'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione WNW-ESE; situata tra due stelline, una a SE e l'altra più debole a SW — 450x.
MAC 1522+2734	gx	15h22m28s	+27°34.4'		CrB	24"	m. buona / ottimo	(fa parte dell'ammasso **AGC 2065**) v. **MCG+5-36-20**
MAC 1522+2740	gx	15h22m44s	+27°40.0'		CrB	24"	m. buona / ottimo	(fa parte dell'ammasso **AGC 2065**) v. **MCG+5-36-20**
MAC 1522+2746A	gx	15h22m33s	+27°46.4'		CrB	24"	m. buona / ottimo	(fa parte dell'ammasso **AGC 2065**) v. **MCG+5-36-20**
MAC 1522+4607	gx	15h22m53s	+46°07.2'		Boo	28"	m. buona / discreto	è una debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso SE di una stellina — 495x.
MAC 1523+4608	gx	15h23m04s	+46°08.9'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 1524+1328	gx	15h24m42s	+13°28.6'		Ser	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MAC 1524+2039	gx	15h24m39s	+20°39.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza diffusa approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' S e una più debole alla stessa distanza verso NNE — 450x.
MAC 1524+2045	gx	15h24m26s	+20°45.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	appare in visione distolta come un piccolo e tenuissimo baffo esteso una 15-ina di secondi situato a ridosso NE di CGCG 135-55 — 450x.
MAC 1524+2045A	gx	15h24m31s	+20°45.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, disturbata da una stellina brillante situata a 1' scarso SW; in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1524+3000	gx	15h24m24s	+30°00.4'		CrB	28"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20", ma è un po' disturbata da una stellina brillante situata a 1' verso N — 495x.
MAC 1525+1339	gx	15h25m54s	+13°39.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo quasi stellare evidente; è situata sul lato orientale di un piccolo triangolo equilatero di stelline abbastanza brillanti — 450x.
MAC 1525+5921	gx	15h25m44s	+59°21.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di ~ 15"; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 495x.
MAC 1526+5913	gx	15h26m37s	+59°13.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 20"×15" e con nucleo stellare abbastanza evidente — 495x.
MAC 1527+2640	gx	15h27m18s	+26°40.5'		CrB	16"	buona / discreto	molto piccola, di dimensioni max 15"-20", visibile a tratti a 380x e poco diffusa; c'è una stellina a 1.5' verso W
MAC 1527+2900B	gx	15h27m53s	+29°00.5'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, con piccola e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso NE; una brillante a 1' verso N — 495x.
MAC 1527+4657	gx	15h27m58s	+46°57.0'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline abbastanza brillanti a 1' N e 2.5' a NW — 495x.
MAC 1527+8217	gx	15h27m46s	+82°17.5'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 1528+0715	gx	15h28m16s	+07°15.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1530+2703A	gx	15h30m34s	+27°03.2'		CrB	24"	m. buona / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma, forse rotonda con Ø < 20"; meglio comunque scalare a 340x.
MAC 1530+2704	gx	15h30m10s	+27°04.4'		CrB	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SSE — 450x.
MAC 1531+2514	gx	15h31m35s	+25°14.7'		Ser	24"	m. buona / ottimo	v. **CGCG 136-6**
MAC 1532+0446	gx	15h32m33s	+04°46.0'		Ser	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia ravvicinata con CGCG 50-19 situata una 30-ina di secondi a NE — è un piccolo oggetto elusivo che appare a momenti in visione distolta, ma non sembra più esteso di 10" o 15"; la CGCG è debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso verso NW (ossia sul prolungamento dell'asse); sono entrambe situate 3' a NW di UGC 9887 — 450x.
MAC 1532+4431	gx	15h32m29s	+44°31.6'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1532+4432	gx	15h32m58s	+44°32.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con condensazione centrale appena percettibile (situata a ridosso NE di CGCG 249-28) — 450x.
MAC 1533+0031	gx	15h33m03s	+00°31.2'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, solo a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10".
MAC 1533+3250	gx	15h33m44s	+32°50.9'		CrB	28"	m. buona / m. buono	è un piccolo e debolissimo baffo di luce che in visione distolta sembra relativamente compatto, esteso una 20-ina di secondi in direzione NW-SE; la visione è però disturbata da una stellina brillante situata subito a SE — 495x.
MAC 1535+2328	gx	15h35m05s	+23°28.8'		Ser	16"	buona / mediocre	è molto debole e piccola, estesa una 15-ina di secondi; potrebbe essere scambiata per una stellina a ingrandimenti più bassi e con scarso seeing; è utile il confronto con una stella molto debole situata 1' verso E — 270x.
MAC 1535+4642	gx	15h35m57s	+46°42.2'		Boo	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 495x.
MAC 1536+5755	gx	15h36m17s	+57°55.5'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con due stelline 1' a S e 1' a W — 495x.
MAC 1537+2609	gx	15h37m16s	+26°09.3'		CrB	24"	m. buona / ottimo	elusivo baffo di luce esteso sì e no 30"; appare solo a momenti in visione distolta a ridosso W di una debole stellina — 450x.
MAC 1537+5937B	gx	15h37m52s	+59°37.4'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni di 30"×10"; situata in mezzo a 2 stelline orientate a perpendicolo con la gx — 495x.
MAC 1538+5924B	gx	15h38m33s	+59°24.0'		Dra	24"	m. buona / mediocre	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 1539+2544	gx	15h39m28s	+25°44.2'		CrB	24"	buona / buono	molto piccola e debole, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W, di dimensioni grosso modo di 20"×10" e con nucleo stellare; c'è una stellina a 1' scarso NW — 450x.
MAC 1540+2154	gx	15h40m17s	+21°54.9'		Ser	24"	buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 2107** — molto piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una stellina a 1' N — 450x.
MAC 1540+5920	gx	15h40m20s	+59°20.9'		Dra	24"	m. buona / mediocre	debolissima e molto piccola, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare con la coda dell'occhio quando si osserva la stellina che si trova a 1.5' verso SE — 450x.
MAC 1541+2759	gx	15h41m45s	+27°59.3'		CrB	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare a momenti nei bagliori della SAO 83949 di 8ª grandezza situata un paio di primi a W; forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1541+2802	gx	15h41m36s	+28°03.0'		CrB	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina al bordo W e una coppia di stelline a ridosso E — 450x.
MAC 1541+2807	gx	15h41m55s	+28°07.3'		CrB	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma appare abbastanza facilmente in visione diretta a ridosso S di IC 4572; è molto piccola, diffusa, rotonda con Ø di ~ 15" — 450x.
MAC 1544+1702	gx	15h44m27s	+17°02.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e con nucleo stellare, diffusa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE — 450x.
MAC 1544+2244	gx	15h44m08s	+22°44.2'		Ser	16"	m. buona / buono	debolissimo e piccolissimo oggetto di luminosità uniforme, di dimensioni 20"×10" e orientato da N a S; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
MAC 1544+2723	gx	15h44m13s	+27°23.8'		CrB	24"	ottima / m. buono	baffo di luce molto tenue e relativamente compatto, orientato da N a S ed esteso una 40-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso NE — 450x.
MAC 1544+2741	gx	15h44m04s	+27°41.9'		CrB	24"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori a tratti in visione distolta a ridosso E di CGCG 166-45; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 12"-15" — 450x.
MAC 1546+1149	gx	15h46m28s	+11°49.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, salta fuori in visione distolta subito a S di una stellina brillante; non è più estesa di 10"-15" — 450x.
MAC 1547+1150	gx	15h47m47s	+11°50.3'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, più evidente di MAC 1546+1149 osservata subito prima, approssim. rotonda con Ø < 20" — 450x.

MAC 1549+0014	gx	15h49m28s	+00°14.1'		Ser	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 10046 situata a ridosso verso S a mo' di un "8"; è diffusa rotonda con Ø < 40" e con nucleo stellare; le gx si sdoppiano facilmente a 450x, ma la coppia è meglio osservabile a 570x a causa di una stella brillante situata a ridosso verso Ne.
MAC 1549+2519	gx	15h49m04s	+25°19.5'		Ser	16"	m. buona / buono	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta a 270x, ma non riesco a capire com'è orientata; non dovrebbe comunque essere più estesa di 20" o 25".
MAC 1551+1248	gx	15h51m00s	+12°48.1'		Ser	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e relativamente compatta, con nucleo stellare evidente, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
MAC 1551+2545	gx	15h51m52s	+25°45.1'		CrB	24"	ottima / m. buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
MAC 1553+1904	gx	15h53m41s	+19°04.7'		Ser	24"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1553+1904A	gx	15h53m52s	+19°04.2'		Ser	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **MAC 1553+1904B**; molto piccola e diffusa, forse rotonda con Ø di 12"-15"; la componente **B** ha dimensioni simili e presenta un nucleo stellare — 450x.
MAC 1553+1904B	gx	15h53m51s	+19°04.5'		Ser	24"	ottima / m. buono	v. **MAC 1553+1904A**
MAC 1555+1900	gx	15h55m18s	+19°00.1'		Ser	24"	ottima / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE — 450x.
MAC 1556+4144	gx	15h56m50s	+41°44.3'		Her	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1556+4757	gx	15h56m22s	+47°57.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissima, a tratti in visione distolta appare molto allungata da E-W con dimensioni grosso modo di 30"×10", ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina subito a NE — 450x.
MAC 1556+4759	gx	15h56m47s	+47°59.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso N e un'altra della stessa luminosità a 1' scarso SSE — 450x.
MAC 1557+0105	gx	15h57m08s	+01°05.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, a tratti in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MAC 1557+1622	gx	15h57m47s	+16°22.4'		Ser	24"	m. buona / discreto	molto debole e poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; appare facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 1558+1421	gx	15h58m29s	+14°21.6'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1558+1620A	gx	15h58m18s	+16°20.5'		Ser	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto piccola, rotonda con Ø di 10" o 15" e condensazione centrale stellare; si trova tra 2 stelline distanti un paio di primi e orientate da N a S — 450x.
MAC 1558+2734	gx	15h58m40s	+27°35.0'		CrB	16"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, estesa max 15" o 20"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 2.5' SE di CGCG 137-67 — 380x.
MAC 1559+0247	gx	15h59m10s	+02°48.0'		Ser	24"	buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; appare facilmente anche in visione diretta a 450x.
MAC 1559+1415	gx	15h59m42s	+14°15.9'		Ser	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso < 30"; è situata subito a E di una stellina — 450x.
MAC 1559+4442A	gx	15h59m54s	+44°42.5'		Her	28"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale abbastanza evidente — 495x.
MAC 1600+1531	gx	16h00m56s	+15°31.5'		Ser	24"	ottima / buono	poco diffusa, condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1' verso N — 340x.
MAC 1600+1624	gx	16h00m13s	+16°24.7'		Ser	24”	m. buona / ottimo	molto debole e di aspetto un po' confuso approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1600+1625	gx	16h00m18s	+16°25.5'		Ser	24”	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1601+1541	gx	16h01m14s	+15°41.3'		Her	24"	ottima / buono	è una debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da E a W e con nucleo stellare visibile a tratti; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 340x.
MAC 1601+1545	gx	16h01m12s	+15°45.4'		Her	24"	ottima / buono	anche questa è debolissima, addirittura un poco più difficile di MAC 1600+1541 e di luminosità uniforme; a tratti appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×10"; è situata 7' scarsi N di IC 1161 e, rispetto a quest'ultima, allineata ed equidistante con MAC 1600+1541 — 340x.
MAC 1601+1547	gx	06h01m52s	+15°47.5'		Her	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MAC 1601+1549A	gx	16h01m32s	+15°49.8'		Her	24”	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e condensata, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1601+1549B	gx	16h01m47s	+15°49.3'		Her	24”	m. buona / ottimo	situata 3.5' a E della precedente, è molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, anche questa allungata da E a W e di dimensioni analoghe — 450x.
MAC 1601+1553	gx	16h01m46s	+15°53.4'		Her	24”	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1601+1600A	gx	16h01m39s	+16°00.9'		Her	24”	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1601+1609	gx	16h01m47s	+16°09.4'		Her	24"	ottima / ottimo	situata al bordo settentrionale dell'ammasso AGC 2147 — molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' W di una stellina brillante, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 1601+1609A	gx	16h01m49s	+16°09.9'		Her	24"	ottima / ottimo	situata al bordo settentrionale dell'ammasso AGC 2147 — molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' SE e una debole alla stessa distanza verso N — 450x.
MAC 1601+1614	gx	16h01m51s	+16°14.2'		Her	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 20"×10"; tuttavia è meglio osservabile scalando a 340x.
MAC 1601+1618	gx	16h01m39s	+16°18.7'		Her	24”	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso S e una poco più distante a NW — 450x.
MAC 1601+1627	gx	16h01m55s	+16°27.3'		Her	16"	buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; forma una coppia con CGCG 108-66 situata un paio di primi SE; quest'ultima appare a momenti orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; entrambe si osservano in visione distolta a 380x fissando la stellina che si trova nel mezzo.
MAC 1601+1647	gx	16h01m10s	+16°47.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; a tratti appare un tenuissimo nucleo stellare (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 570x.
MAC 1601+1733	gx	16h01m20s	+17°33.4'		Her	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta a ridosso S di una stellina, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1601+2025A	gx	16h01m44s	+20°25.4'		Her	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1601+2025B	gx	16h01m26s	+20°25.7'		Her	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
MAC 1601+2028B	gx	16h01m29s	+20°28.1'		Her	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, situata a ridosso S di una stellina brillante, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MAC 1601+2231	gx	16h01m08s	+22°31.8'		Her	16"	buona / buono	è un elusiva galassietta, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare con gran difficoltà a ~ 1' SE di una stellina; la visione migliore si ottiene scalando a 188x.
MAC 1601+4524	gx	16h01m29s	+45°24.4'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da NW a SE; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1601+7131	gx	16h01m01s	+71°31.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare in visione distolta quando si osserva CGCG 338-38 situata un paio di primi a S; non è più estesa di 15"-20" — 450x.
MAC 1602+1225	gx	16h02m52s	+12°25.2'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debolissima, solo a momenti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
MAC 1602+1227	gx	16h02m17s	+12°27.7'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1602+1545B	gx	16h02m40s	+15°45.4'		Her	24"	buona / buono	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e leggermente condensata; c'è una stella brillante a ridosso NE — 450x.
MAC 1602+1550	gx	16h02m28s	+15°50.7'		Her	24”	m. buona / ottimo	debolissima, salta fuori a momenti subito a NE di una stellina; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1602+1552	gx	16h02m21s	+15°52.7'		Her	24”	m. buona / ottimo	appare elusivamente nei bagliori della SAO 101886 di 9ª grandezza situata 1' NE; sembra molto piccola, estesa meno di 20”, ma non ne capisco la forma — 450x.
MAC 1602+1554	gx	16h02m13s	+15°54.5'		Her	16"	buona / ottimo	rotonda, di luminosità uniforme, poco diffusa e con Ø di 40" — fa parte del terzetto di UGC 10143 dalla quale dista 4' SSW — 380x.
MAC 1602+1555A	gx	16h02m12s	+15°55.1'		Her	16"	buona / ottimo	debole oggetto poco diffuso, di luminosità uniforme e Ø non superiore a 15" o 20" che si diparte verso E da una stellina — 380x.
MAC 1602+1555B	gx	16h02m34s	+15°55.5'		Her	24”	m. buona / ottimo	debolissima, appare a momenti a ridosso E di una stellina abbastanza brillante che ne disturba l'osservazione; non riesco a capire com'è fatta, ma non sembra più estesa di 20” (situata 5' a E della precedente osservata in data differente) — 450x.
MAC 1602+1607	gx	16h02m49s	+16°07.1'		Her	24"	ottima / ottimo	situata verso il margine NE dell'ammasso AGC 2147 — debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' SE e un'altra appena percettibile quasi a ridosso W — 450x.
MAC 1602+1614	gx	16h02m45s	+16°14.9'		Her	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a SE — 450x.
MAC 1602+1617	gx	16h02m44s	+16°17.1'		Her	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1602+1631	gx	16h02m03s	+16°31.7'		Her	24”	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luminosità uniforme che aggetta a SE di una stellina abbastanza brillante; è esteso una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1603+1357	gx	16h03m46s	+13°57.1'		Ser	24"	ottima / ottimo	molto piccola, relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
MAC 1603+1450	gx	16h03m40s	+14°51.0'		Ser	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' SSW — 380x.
MAC 1603+1457	gx	16h03m56s	+14°57.4'		Ser	16"	ottima / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
MAC 1603+1556	gx	16h03m50s	+15°56.7'		Her	24"	buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1603+1559	gx	16h03m37s	+15°59.4'		Her	24"	buona / buono	molto piccola (a bassi ingrandimenti potrebbe addirittura essere scambiata per una stellina), relativamente compatta e con Ø di una decina di secondi; è facilmente visibile anche in visione diretta a 450x.
MAC 1603+1605	gx	16h03m01s	+16°05.8'		Her	24"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2147** e forma una coppia con MAC 1603+1607A situata a 1' verso N — molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1603+1607A	gx	16h03m01s	+16°05.8'		Her	24"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso AGC 2147 e forma una coppia con MAC 1603+1605 situata a 1' verso N — piccola e più debole della precedente; in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1603+1628	gx	16h03m42s	+16°28.5'		Her	24”	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1603+4712	gx	16h03m13s	+47°13.0'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso NNW — 450x.
MAC 1604+1113	gx	16h04m22s	+11°13.7'		Ser	24"	buona / ottimo	è un piccolo ed elusivo baffo orientato da E a W ed esteso 20"-25"; appare solo a momenti in visione distolta a 450x; c'è una stellina quasi a ridosso NE.
MAC 1604+1627	gx	16h04m16s	+16°27.6'		Her	24"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1604+1638	gx	16h04m40s	+16°38.2'		Her	24"	ottima / buono	a 340x appare come un'elusiva stellina sfuocata; forma un piccolo triangolo con 2 stelline: una subito a E e l'altra poco più distante a S.
MAC 1604+1639C	gx	16h04m42s	+16°39.0'		Her	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
MAC 1604+1750	gx	16h04m38s	+17°50.1'		Boo	16"	discreta / m. buono	compatta, rotonda, con Ø di 20", con condensazione centrale visibile anche in visione diretta (fa parte di AGC 2151) — 270x.
MAC 1604+2448	gx	16h04m16s	+24°48.7'		Ser	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1604+3439	gx	16h04m41s	+34°39.9'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto piccola e compatta, allungata da NW a SW, di dimensioni 20"×15 e con nucleo stellare — 380x.
MAC 1605+1421	gx	16h05m19s	+14°21.8'		Ser	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 79-44** situata a ridosso S — anche a 580x le 2 gx si separano a fatica; questa appare più che altro come una sorta di rigonfiamento della CGCG (v. voce corrispondente).
MAC 1605+1542	gx	16h05m53s	+15°42.5'		Her	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
MAC 1605+1545B	gx	16h05m58s	+15°45.6'		Her	16"	ottima / m. buono	piccola, debolissima e appena condensata, diffusa con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
MAC 1605+1606	gx	16h05m21s	+16°06.2'		Her	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a E (situata al bordo meridionale dell'ammasso **AGC 2152**) — 450x.
MAC 1605+1610	gx	16h05m24s	+16°10.5'		Her	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" (situata verso il bordo meridionale dell'ammasso **AGC 2152**) — 450x.
MAC 1605+1611C	gx	16h05m53s	+16°12.0'		Her	24"	ottima / ottimo	appare a tratti in visione distolta come un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE (ossia come le 2 stelline brillanti situate a NE ed E che disturbano alquanto l'osservazione); situata verso il bordo SE dell'ammasso **AGC 2152** — 450x.
MAC 1605+1615	gx	16h05m44s	+16°15.5'		Her	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (fa parte dell'ammasso **AGC 2152**) — 450x.
MAC 1605+1620A	gx	16h05m54s	+16°20.2'		Her	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, rotonda con Ø sì e no di 15"; situata tra 2 stelline brillanti orientate da NNE a SSW e distanti 3.5'. A 1.5' NE appare un oggetto diffuso, allineato ed equidistante con 2 stelline a NW e che sembra addirittura più evidente: da un controllo effettuato c'è effettivamente la MAC 1605+1620B che ha una stellina di 16-esima al bordo S, ma la cosa è alquanto strana (fa parte dell'ammasso **AGC 2152**) — 450x.
MAC 1605+1632	gx	16h05m05s	+16°32.7'		Her	24"	ottima / buono	assieme a **MAC 1605+1632** forma una coppia di oggetti molto deboli, ma relativamente compatti e condensati che appaiono facilmente in visione distolta a N e a SSW di una stellina brillante — 340x.
MAC 1605+1635	gx	16h05m07s	+16°35.7'		Her	24"	ottima / buono	v. **MAC 1605+1635**
MAC 1605+2032	gx	16h05m12s	+20°32.5'	q 155	Her	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata e forse interagente con NGC 6052 — non si riescono a separare neppure a 570x, ma anche a 450x si riesce comunque a notare la differenza di luminosità e dimensioni; la NGC è diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; la MAC è invece chiaramente più debole e pure di luminosità uniforme, orientata anch'essa da N a S con dimensioni 25"×15"; c'è una debole stellina subito a W.
MAC 1606+0212	gx	16h06m23s	+02°12.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	baffo di luce molto tenue, esteso per una 30-ina di secondi che si diparte a NW di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 1606+1536	gx	16h06m30s	+15°36.2'		Her	16"	ottima / m. buono	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta, estesa non più di 30"-35" — 380x.
MAC 1606+1540	gx	16h06m55s	+15°40.4'		Her	16"	ottima / m. buono	debolissima, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" e appena condensata — 380x.
MAC 1606+1541	gx	16h06m38s	+15°41.9'		Her	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø forse < 30"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline, a NNE e a ESE — 380x.
MAC 1606+1543A	gx	16h06m57s	+15°43.3'		Her	16"	ottima / m. buono	elusiva e molto piccola, appare a tratti a meno di 1' SE di una stellina — 380x.
MAC 1606+1547	gx	16h06m09s	+15°47.2'		Her	16"	ottima / m. buono	elusivo oggetto rotondo di una 2°-ina di secondi di Ø che appare solo a momenti in visione distolta a 45" NW di una stellina — 380x.
MAC 1606+1602	gx	16h06m06s	+16°02.3'		Her	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1606+1610A	gx	16h06m03s	+16°10.5'		Her	24"	ottima / ottimo	piccola chiazza molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e situata a ridosso E di una stellina abbastanza brillante (situata al bordo SE dell'ammasso **AGC 2152**) — 450x.
MAC 1606+1618	gx	16h06m17s	+16°18.8'		Her	24"	ottima / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di deboli galassiette distanti 1' scarso in direzione NW-SE e a tratti condensate; la 1ª è poco più evidente, orientata da NE a SW e di dimensioni 20"×10"; c'è una doppia stretta e sbilanciata subito a S; la 2ª appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situate verso il margine SE dell'ammasso **AGC 2152**) — 450x.
MAC 1606+1619	gx	16h06m14s	+16°19.4'		Her	24"	ottima / ottimo	v. **MAC 1606+1618**
MAC 1606+1743	gx	16h06m36s	+17°43.3'		Her	24"	ottima / m. buono	situata verso il bordo orientale dell'ammasso **AGC 2151** — molto debole, piccola, e relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; appare in visione distolta a 1' NE di IC 1193 — 450x.
MAC 1606+1746	gx	16h06m39s	+17°47.0'		Her	24"	ottima / m. buono	situata verso il bordo orientale dell'ammasso **AGC 2151** — molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (altresì denominata **LEDA 84742**) — 450x.
MAC 1607+1214	gx	16h07m38s	+12°14.3'		Ser	24”	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, appare facilmente in visione distolta quando si fissa la stellina subito a S, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1607+3908	gx	16h07m05s	+39°08.7'		CrB	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, diffusa; in visione distolta appare a tratti rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
MAC 1608+6425	gx	16h08m59s	+64°25.1'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto piccola debolissima, ma relativamente compatta; in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1609+2541	gx	16h09m52s	+25°41.2'		CrB	16"	m. buona / buono	debolissimo oggetto rotondo, diffuso e con Ø di una 20-ina di secondi, osservabile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; c'è una stellina brillante a 1' verso N
MAC 1610+0047	gx	16h10m12s	+00°47.0'		Ser	16"	m. buona / ottimo	fa parte assieme a CGCG 23-18 di una coppia di debolissime galassiette, molto piccole situate 5' NE di NGC 6070 — è poco più evidente ed estesa della compagna e appare facilmente in visione distolta osservando la stellina situata a 1' SE — 380x.
MAC 1610+5226	gx	16h10m48s	+52°26.8'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, diffusa e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 1610+5556	gx	16h10m48s	+55°57.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola diffusa forse rotonda con Ø < 20; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1611+2927B	gx	16h11m57s	+29°27.3'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda, diffusa, appena più brillante all'interno e con Ø di una 30-ina di secondi; si trova tra 2 stelline distanti 3' in direzione WNW-ESE — 380x.
MAC 1611+2949	gx	16h11m55s	+29°49.8'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto piccola, rotonda con Ø 15" o 20" — 380x.
MAC 1611+5556	gx	16h11m43s	+55°56.1'		Dra	24"	m. buona / m. buono	altra galassietta molto piccola e debolissima, di aspetto simile a MAC 1610+5556 — 450x.
MAC 1611+6035	gx	16h11m44s	+60°35.1'		Dra	24"	ottima / m. buono	appare come un nodulo di aspetto quasi stellare e appena percettibile situato a ridosso NW di UGC 10279 — 450x.
MAC 1612+0436	gx	16h12m21s	+04°36.2'		Her	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia ravvicinata con CGCG 51-61 situata a ridosso verso N; si sdoppiano facilmente a 450x; sono entrambe molto piccole, con Ø di una 20-ina di secondi; la compagna è appena più evidente; c'è una stellina subito a N, praticamente allineata con la coppia.
MAC 1612+1107	gx	16h12m54s	+11°07.4'		Her	24”	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare stranamente meglio definita a 450x (a 340x tende ancora a stemperarsi sul fondo cielo).
MAC 1612+2934	gx	16h12m11s	+29°34.4'		CrB	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e Ø max 20"; salta fuori in visione distolta a 380x a ridosso NW di una stellina (che è il vertice nord-orientale di un piccolo triangolo rettangolo).
MAC 1612+2938A	gx	16h12m39s	+29°38.6'		CrB	16"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 380x.
MAC 1612+6110	gx	16h12m02s	+61°10.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	appare facilmente anche in visione diretta quasi a ridosso SE di UGC 10284, ma è solo una stellina debolmente sfocata — 450x.
MAC 1614+0400	gx	16h14m19s	+04°00.1'		Her	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 51-71 situata a 45" SW — rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, ma più debole della compagna e di luminosità uniforme; ho dovuto spingere a 570x per tener fuori campo la SAO 121440 di 8ª grandezza situata a meno di 4' NW della coppia.
MAC 1615+5556	gx	16h15m18s	+55°56.1'		Dra	28"	m. buona / m. buono	debolissima, molto difficile da scovare a quasi 500x, perché situata in una piccola zona depleta; solo a momenti appare molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 388x.
MAC 1615+5558	gx	16h15m43s	+55°58.7'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
MAC 1615+5558A	gx	16h15m36s	+55°58.8'		Dra	28"	m. buona / m. buono	è un debolissimo oggetto diffuso molto piccolo che appare a tratti in visione distolta a 1' W della galassietta precedente — 495x.
MAC 1615+6148	gx	16h15m27s	+61°48.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 1616+4223	gx	16h16m11s	+42°24.0'		Her	28"	m. buona / buono	appare solo a momenti come una sorta di "sbavatura" molto tenue a ridosso W di **CGCG 223-53**, ma le due galassiette non si riescono a separare — 495x.
MAC 1616+5103	gx	16h16m25s	+51°03.2'		Dra	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1620+0030	gx	16h20m43s	+00°31.0'		Ser	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 24-6 situata 45" a NNE — sono entrambe debolissime e di luminosità uniforme; la MAC, poco più evidente, appare a tratti da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15"; la CGCG è invece orientata da NE a SW e di dimensioni analoghe — 450x.
MAC 1620+1722	gx	16h20m21s	+17°23.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente tra 2 deboli stelline orientate da NW a SE e distanti una 40-ina di secondi; forse rotonda con Ø di 12"-15"; per scovarla ho dovuto forzare a 580x; la visione è un po' disturbata da una stellina brillante situata 1.5' verso W.
MAC 1620+3951	gx	16h20m56s	+39°51.6'		Her	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 495x.
MAC 1620+3957	gx	16h20m55s	+39°57.4'		Her	28"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente facile e compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a S — 495x.
MAC 1620+5127	gx	16h20m59s	+51°27.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 20"; molto disturbata dalla θ Dra di 7ª grandezza situata un paio di primi a NE; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 450x.
MAC 1620+5711	gx	16h20m38s	+57°11.6'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso W — 450x.
MAC 1620+5740	gx	16h20m19s	+57°40.5'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e a tratti condensata — 450x.
MAC 1620+5744	gx	16h20m51s	+57°44.1'		Dra	24"	ottima / m. buono	debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1621+5132	gx	16h21m21s	+51°32.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1623+0628	gx	16h23m28s	+06°28.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una coppia di deboli stelline a S — 450x.
MAC 1623+0751	gx	16h23m39s	+07°51.2'		Her	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1623+3458	gx	16h23m20s	+35°48.2'		CrB	28"	ottima / m. buono	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare; c'è una stellina una stellina a 1' verso E e una coppia di stelline appena percettibili a ridosso W — 495x.
MAC 1623+3547	gx	16h23m28s	+35°47.6'		CrB	28"	ottima / m. buono	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione E-W; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso SW — 495x.
MAC 1623+3913	gx	16h23m32s	+39°13.0'		CrB	28"	m. buona / buono	debole, diffusa allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena evidente — 495x.
MAC 1623+5056	gx	16h23m19s	+50°26.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 30"×15".
MAC 1624+1343	gx	16h24m03s	+13°43.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	appare come una sorta di debolissimo "pendaglio" molto piccolo situato a ridosso S di CGCG 80-22 — 450x.
MAC 1624+5600	gx	16h24m25s	+56°00.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una15-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1.5' NW di CGCG 276-17 — 450x.
MAC 1625+3018	gx	16h25m26s	+30°18.6'		Her	28"	ottima / m. buono	galassietta elusiva e molto piccola, estesa sì e no 15" e che appare solo a tratti in visione distolta — 495x.
MAC 1625+4101	gx	16h25m41s	+41°01.7'		Her	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
MAC 1626+3904	gx	16h26m29s	+39°04.9'		Her	28"	m. buona / ottimo	piccola, poco diffusa, debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è un piccolo quartetto di stelline piuttosto deboli a ridosso N (situata verso la parte sud-occidentale dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
MAC 1626+3910	gx	16h26m37s	+39°10.9'		Her	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 10-ina di secondi; c'è una stellina a 1-5' SW (situata verso la parte sud-occidentale dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
MAC 1626+3923	gx	16h26m19s	+39°23.3'		Her	28"	m. buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta come un baffo di luce orientato da N a S, esteso una 30-ina di secondi e con una stellina al bordo N — 495x.
MAC 1626+4120	gx	16h26m07s	+41°20.3'		Her	28"	m. buona / discreto	debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 30" — 495x.
MAC 1627+0304	gx	16h27m15s	+03°04.9'		Oph	24"	buona / ottimo	relativamente compatta, molto piccola e condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
MAC 1627+1128	gx	16h27m22s	+11°28.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	anche questa è relativamente compatta, ma di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1627+3907	gx	16h27m37s	+39°08.2'		Her	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata verso la parte sud-occidentale dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
MAC 1627+3908	gx	16h27m18s	+39°08.6'		Her	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata verso la parte sud-occidentale dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
MAC 1627+3915	gx	16h27m20s	+39°15.5'		Her	28"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (o poco meno) — 495x.
MAC 1627+3916A	gx	16h27m37s	+39°16.2'		Her	28"	m. buona / discreto	debolissimo baffo di luce esteso < 30" e orientato da N a S — 495x.
MAC 1627+3916B	gx	16h27m56s	+39°16.9'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25" (è situata tra MCG+7-34-45 a N e la coppia MCG+7-34-43/44 a S) — 495x.
MAC 1627+3918A	gx	16h27m11s	+39°18.3'		Her	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 495x.
MAC 1627+3922	gx	16h27m16s	+39°23.1'		Her	28"	m. buona / discreto	è un elusivo baffo di luce esteso sì e no una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare solo a momenti in visione distolta subito a N di una coppia larga di stelline orientate da NE a SW e distanti 45" — 495x.
MAC 1627+3923	gx	16h27m41s	+39°23.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — appare elusivamente come una stellina subito a N di NGC 6158 (meglio non scalare gli ingrandimenti) — 450x.
MAC 1627+4029	gx	16h27m59s	+40°29.8'		Her	28"	ottima / buono	debole, relativamente compatta, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con tenue bulge diffuso evidente; c'è una stellina a 1' SW — 495x.
MAC 1627+4040	gx	16h27m24s	+40°40.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	esclusa MAC 1628+2533, fa parte, assieme alle 11 successive, del nutrito ammasso **AGC 2197** — molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1627+4048	gx	16h27m01s	+40°48.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 1627+4052	gx	16h27m41s	+40°52.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1627+4056	gx	16h27m50s	+40°56.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
MAC 1627+4057B	gx	16h27m59s	+40°58.1'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' NE — 450x.
MAC 1627+4104B	gx	16h27m46s	+41°04.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a 1' SSW e una appena percettibile al bordo N — 450x.
MAC 1627+4118	gx	16h27m43s	+41°18.9'		Her	28"	m. buona / discreto	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma; non dovrebbe comunque essere più estesa di 20"; c'è una stellina a 1' SE; una doppia serrata e irrisolta dalle componenti molto deboli e situata 2.5' a NW dava l'impressione di un piccolo oggetto diffuso di circa 20"×10" — 495x.
MAC 1628+2533	gx	16h28m34s	+35°33.9'		Her	16"	ottima / ottimo	elusiva lama di luce che appare solo a momenti a 285x (l'utilizzo del SP 6.4mm era mirato a tenere fuori campo la SAO 84399 di 9ª a 4.5' SW) ed estesa una 40-ina di secondi e orientata da E a W; è situata tra 2 stelline orientate nello stesso modo e distanti 2.5' (situata 11' a SW di UGC 10410).
MAC 1628+3901	gx	16h28m58s	+39°01.5'		Her	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" (fa parte dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
MAC 1628+3919	gx	16h28m58s	+39°19.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto debole, ma appare facilmente in visione distolta, pur con pochi riferimenti stellari, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 1628+3931	gx	16h28m39s	+39°21.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — debole, diffusa rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1628+3932A	gx	16h28m34s	+39°32.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto piccola e debole, estesa una 10-ina di secondi, situata a ridosso W di NGC 6166 — 450x.
MAC 1628+3932B	gx	16h28m36s	+39°32.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — è di aspetto simile alla precedente, ma poco più grande, Ø 12"-15", situata quasi a ridosso S di NGC 6166 — 450x.
MAC 1628+3941	gx	16h28m37s	+39°41.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; è grosso modo rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
MAC 1628+3948	gx	16h28m59s	+39°48.2'		Her	28"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; tutto sommato appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso SE di una stellina — 495x.
MAC 1628+4024	gx	16h28m03s	+40°24.4'		Her	28"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso S — 495x.
MAC 1628+4029	gx	16h28m36s	+40°29.8'		Her	28"	m. buona / discreto	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso N — 495x.
MAC 1628+4040	gx	16h28m36s	+40°41.1'		Her	28"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 495x.
MAC 1628+4041	gx	16h28m10s	+40°41.7'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1' scarso verso E — 495x.
MAC 1628+4043	gx	16h28m29s	+40°43.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1628+4051	gx	16h28m25s	+40°51.5'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 495x.
MAC 1628+4054	gx	16h28m22s	+40°54.9'		Her	28"	m. buona / discreto	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 495x.
MAC 1628+4058	gx	16h28m18s	+40°58.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione stellare — 450x.
MAC 1628+4115	gx	16h28m59s	+41°15.3'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 495x.
MAC 1629+3908	gx	16h29m08s	+39°08.9'		Her	28"	m. buona / discreto	molto debole e di aspetto simile a MAC 1628+3901 — osservata subito prima — orientata nello stesso modo e grosso modo con le stesse dimensioni (fa parte dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
MAC 1629+3943	gx	16h28m31s	+39°43.6'		Her	28"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W — 495x.
MAC 1629+3949	gx	16h29m21s	+39°49.2'		Her	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×10" e con piccolo bulge evidente — 495x.
MAC 1629+4029	gx	16h29m01s	+40°29.7'		Her	28"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni poco inferiori a 30"×20"; c'è una stellina brillante subito a SE che ne disturba un po' l'osservazione — 495x.
MAC 1629+4036	gx	16h29m03s	+40°36.3'		Her	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta a 1' NW di PGC 58316, non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 10"-12"; c'è una stellina brillante a 1' NW — 495x.
MAC 1629+4037A	gx	16h29m05s	+40°37.0'		Her	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare molto tenue; c'è una stellina brillante a 1' verso W — 495x.
MAC 1629+4039	gx	16h29m08s	+40°39.9'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale molto tenue — 495x.
MAC 1629+4043	gx	16h29m27s	+40°43.3'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due deboli stelline a S — 495x.
MAC 1629+4108	gx	16h29m13s	+41°09.0'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e un nucleo stellare appena percettibile; è situata tra due stelline orientate da E a W — 495x.
MAC 1630+4052	gx	16h30m07s	+40°52.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1632+5022	gx	16h32m06s	+50°22.8'		Her	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1633+3913	gx	16h33m16s	+39°13.9'		Her	28"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a tratti, non ne capisco la forma, ma in visione distolta non sembra più estesa di 20" — 495x.
MAC 1633+3915	gx	16h33m39s	+39°15.9'		Her	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso W — 495x.
MAC 1633+4009	gx	16h33m42s	+40°09.2'		Her	28"	ottima / buono	piccola, molto debole e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW — 495x.
MAC 1635+1300	gx	16h35m14s	+13°00.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di 12"-15"; situata 1.5' SW di una doppia larga — 450x.
MAC 1636+4920	gx	16h36m34s	+49°20.6'		Her	28"	ottima / buono	chiazza molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e a tratti condensata; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N — 495x.
MAC 1636+6605	gx	16h37m00s	+66°06.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SE — 450x.
MAC 1637+5531	gx	16h37m53s	+55°31.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1638+5528	gx	16h38m33s	+55°28.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto piccola, debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di max 15" — 450x.
MAC 1639+3232	gx	16h39m34s	+32°32.7'		Her	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 495x.
MAC 1639+3705	gx	16h39m46s	+37°05.3'		CrB	16"	ottima / m. buono	debolissima, ma osservabile senza problemi a 380x; è allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme.
MAC 1639+4908	gx	16h39m11s	+49°08.1'		Her	28"	ottima / buono	piccola e molto debole, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 495x.
MAC 1639+5347	gx	16h39m52s	+53°47.7'		Dra	28"	ottima / buono	debolissima chiazza estesa sì e no 20", ma di forma indistinta; c'è una stellina a 1' E e una più brillante a 1.5' verso WNW — 495x.
MAC 1640+3913	gx	16h40m37s	+39°13.3'		Her	28"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 495x.
MAC 1640+4903A	gx	16h40m12s	+49°03.8'		Her	28"	ottima / buono	piccola, molto debole poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 1642+5128	gx	16h42m44s	+51°28.7'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina a 1' verso N — 495x.
MAC 1646+3558	gx	16h46m35s	+35°58.2'		Her	28"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, oltre tutto disturbata dalla SAO 65547 di magnitudo 9.5 situata 1.5' a W; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni di ~ 20"×15" — 495x.
MAC 1646+5228	gx	16h46m36s	+52°28.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
MAC 1646+6529	gx	16h46m32s	+65°29.3'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
MAC 1646+8125	gx	16h46m20s	+81°25.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a ridosso N (fa parte dell'ammasso **AGC 2247**) — 450x.
MAC 1647+5235	gx	16h47m38s	+52°35.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	baffo di luce molto debole, esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW orientato da NE a SW; c'è una stellina subito a SW — 450x.
MAC 1648+5355	gx	16h48m38s	+53°55.2'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 20" o poco più; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 495x.
MAC 1648+8136	gx	16h48m45s	+81°36.6'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente (fa parte dell'ammasso **AGC 2247**) — 450x.
MAC 1649+5329	gx	16h49m17s	+53°29.4'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare — 450x.
MAC 1650+3041	gx	16h50m47s	+30°41.5'		Her	28"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratti grosso modo rotonda con Ø con dimensioni di una 20-ina di secondi — 495x.

MAC 1650+4640	gx	16h50m55s	+46°40.7'		Her	28"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1650+8134	gx	16h50m54s	+81°34.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente in visione distolta a ridosso S di PGC 59122, ma anche a 450x rimane di aspetto stellare (fa parte dell'ammasso **AGC 2247**).
MAC 1651+8130	gx	16h51m59s	+81°30.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; allineata ed equidistante con due stelline a NE; c'è una debole stellina subito a NE (fa parte dell'ammasso AGC 2247) — 450x.
MAC 1652+5443	gx	16h52m05s	+54°43.3'		Dra	28"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a poco più di 1' SE — 495x.
MAC 1653+4120	gx	16h53m57s	+41°20.2'		Her	28"	m. buona / ottimo	è un debole baffo di luminosità uniforme, orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina un paio di primi a S — 495x.
MAC 1654+3443	gx	16h54m55s	+34°43.2'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, molto diffusa, rotonda con Ø < 30" e con tenue condensazione centrale; c'è una coppia sbilanciata di stelline a 1' verso S — 495x.
MAC 1654+3443A	gx	16h54m43s	+34°43.7'		Her	28"	ottima / m. buono	molto debole e di aspetto quasi stellare, estesa una 10-ina di secondi (o poco più); c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE — 495x.
MAC 1654+5843	gx	16h54m32s	+58°43.6'		Dra	28"	ottima / buono	molto piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE — 495x.
MAC 1655+3452	gx	16h55m25s	+34°52.1'		Her	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 1655+4304	gx	16h55m08s	+43°04.4'		Her	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; situata 1.5' NE della coppia UGC 10610 / MCG+7-35-5 — 495x.
MAC 1657+2809	gx	16h57m38s	+28°09.9'		Her	28"	ottima / m. buono	molto piccola, appare elusivamente a ridosso SW di una stellina; non sembra più estesa di 15" — 495x.
MAC 1657+2810	gx	16h57m42s	+28°10.7'		Her	28"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione E-W; c'è una stellina brillante a ridosso E — 495x.
MAC 1657+7703	gx	16h57m38s	+77°03.8'		UMi	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con la successiva — sono due piccoli e deboli oggetti orientati da NNE a SSW, rotondi con Ø di 10"-12"; si separano solo a momenti a 450x; in visione distolta paiono immersi in una tenue chiazza lattescente.
MAC 1657+7704	gx	16h57m40s	+77°03.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	v. **MAC1657+7703**
MAC 1658+2811	gx	16h58m24s	+28°11.3'		Her	28"	ottima / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; disturbata da 2 stelle molto brillanti, la SAO 84731 di 8ª grandezza un paio di primi a N e la SAO 84734 di 9ª grandezza alla stessa distanza verso E — 495x.
MAC 1700+2801B	gx	17h00m44s	+28°01.5'		Her	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con UGC 10658 situata a meno di 2' verso E — sono 2 debolissime gx rotonde molto piccole e condensate, di aspetto simile, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi; appaiono abbastanza facilmente, ma occorre spingere a 380x.
MAC 1700+3931	gx	17h00m42s	+39°31.6'		Her	28"	ottima / m. buono	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NW e una debole a 1.5' SW; disturbata dalla SAO 65725 di 8ª grandezza situata 2.5' a ENE — 495x.
MAC 1700+5606	gx	17h00m08s	+56°06.6'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile subito a W — 495x.
MAC 1702+4451	gx	17h02m39s	+44°51.8'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, molto piccola e poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 1703+2456	gx	17h03m14s	+24°56.4'		Her	16"	buona / buono	debolissimo oggetto, molto piccolo, esteso 15" o 20" e con condensazione stellare visibile a tratti a 380x.
MAC 1703+4617	gx	17h03m30s	+46°17.8'		Her	28"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, grosso modo rotonda con Ø di ~ 20" — 495x.
MAC 1703+6127	gx	17h03m10s	+61°27.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, ma appare facilmente in visione distolta una 40-ina di secondi a NW di CGCG 299-48; non sembra più estesa di 10"-15"; c'è una coppia di deboli stelline a 1' verso N — 450x.
MAC 1703+7837	gx	17h03m30s	+78°37.9'		UMi	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con NGC 6331, situata a ridosso SE — appare solo come una debole stellina sfuocata ed estesa forse una decina di secondi — 450x
MAC 1704+2410	gx	17h04m02s	+24°10.3'		Her	16"	buona / buono	debolissimo oggetto esteso una 15-ina di secondi che appare a tratti in visione distolta a 380x quasi a ridosso di UGC 10678 verso SE (ossia in direzione della stellina situata a 2.5' di distanza).
MAC 1704+4152	gx	17h05m13s	+41°52.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione stellare — 450x.
MAC 1704+4153	gx	17h04m50s	+41°53.2'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; situata a poco più di 1' N di UGC 10693 — 450x.
MAC 1704+4157	gx	17h04m42s	+41°57.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola relativamente compatta e condensata, allungata da N a S con dimensioni 15"×10"; c'è una stellina al bordo SE e un'altra appena più evidente a ridosso S — 450x.
MAC 1705+4302	gx	17h05m43s	+43°02.6'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" (o poco più); c'è una stellina a 1' verso S — 495x
MAC 1706+1410	gx	17h06m18s	+14°10.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1706+5206	gx	17h06m25s	+52°06.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; c'è una stellina a 1' verso N — 495x.
MAC 1706+5214	gx	17h06m28s	+52°14.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SSE — 495x.
MAC 1709+5541	gx	17h09m26s	+55°41.3'		Dra	28"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, appare a tratti a ~ 1' NW di una stellina brillante, ma non ne capisco la forma; non sembra comunque più estesa di 15" — 495x.
MAC 1710+5541	gx	17h10m00s	+55°41.4'		Dra	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale visibile solo a momenti — 495x.
MAC 1711+4634	gx	17h11m01s	+46°34.7'		Her	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, diffusa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1711+5551	gx	17h11m29s	+55°51.1'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1711+5656	gx	17h11m44s	+56°56.6'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole e molto piccola, poco diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
MAC 1711+7225A	gx	17h11m53s	+72°25.3'		Dra	24"	buona / ottimo	piccola e debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1711+7225B	gx	17h11m54s	+72°25.7'		Dra	24"	buona / ottimo	appare solo a momenti in visione distolta a 450x, ma non è altro che una debolissima stellina sfuocata.
MAC 1711+7234	gx	17h11m57s	+72°34.9'		Dra	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1711+7236	gx	17h11m20s	+72°36.6'		Dra	24"	buona / ottimo	nella posizione indicata si trova una stellina; il piccolo e tenuissimo alone che si nota a tratti in visione distolta potrebbe tuttavia essere solo un effetto di diffusione (quest'ultimo, tuttavia, da un controllo effettuato successivamente risulta essere reale) — 450x.
MAC 1712+3945	gx	17h12m53s	+39°45.1'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 495x.
MAC 1712+4406	gx	17h12m52s	+44°06.2'		Her	28"	m. buona / discreto	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1712+7219	gx	17h12m34s	+72°19.8'		Dra	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e rotonda, con Ø di una 15-ina di secondi, situata tra 2 stelline di cui una quasi a ridosso verso SE — 450x.
MAC 1712+7228	gx	17h12m54s	+72°28.5'		Dra	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø max di 15"; c'è una stellina a ridosso verso Se.
MAC 1713+4059	gx	17h13m33s	+40°59.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N — 450x.
MAC 1713+4102	gx	17h13m41s	+41°02.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1713+7219	gx	17h13m03s	+72°19.5'		Dra	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1713+7220	gx	17h13m17s	+72°20.3'		Dra	24"	buona / ottimo	più debole di MAC 1713-7119, dalla quale dista poco più di 1' a NE, diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1713+7238	gx	17h13m36s	+72°38.7'		Dra	24"	buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1714+0604	gx	17h14m18s	+06°05.0'		Oph	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1714+4324	gx	17h14m42s	+43°24.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 450x.
MAC 1714+4334	gx	17h14m14s	+43°34.5'		Her	28"	ottima / ottimo	fa parte assieme alle due successive di un triangolo di deboli galassiette — diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
MAC 1714+4335	gx	17h14m28s	+43°35.1'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta, poco allungata da E a W, di dimensioni 20"×15" e con nucleo stellare; forma un piccolo triangolo isoscele molto aperto con due stelline a NE e a N — 495x.
MAC 1714+4336	gx	17h14m17s	+43°36.2'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 20" — 495x.
MAC 1714+4544	gx	17h14m11s	+45°44.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta a 1' W di CGCG 252-29, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1714+5718	gx	17h14m37s	+57°18.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile per essere una MAC, poco diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" c'è una stellina molto debole a ridosso SE (che fa parte di un piccolo triangolo equilatero con la gx presso il vertice meridionale) — 495x.
MAC 1714+5722	gx	17h14m01s	+57°22.5'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1714+5724	gx	17h14m29s	+57°25.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina appena percettibile subito a NE — 495x.
MAC 1715+4246	gx	17h15m13s	+42°46.8'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×10" o poco più; c'è una stella subito a S (fa parte di un piccolo asterismo di 7 stelline abbastanza brillanti e di forma vagamente triangolare — 495x.
MAC 1715+4350	gx	17h15m35s	+43°50.4'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
MAC 1715+4353	gx	17h16m00s	+43°53.8'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola e relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina brillante quasi a ridosso N — 495x.
MAC 1715+5718	gx	17h15m47s	+57°18.2'		Dra	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di deboli stelline a 1' scarso N e una 3ª della stessa luminosità e distanza a SW — 495x.
MAC 1715+5730	gx	17h15m31s	+57°30.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole e poco diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×15" — 495x.
MAC 1716+5725	gx	17h16m24s	+57°25.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	è un piccolo e debole lucore molto diffuso esteso una 20-ina di secondi che aggetta a N di una stellina — 495x.
MAC 1717+3927	gx	17h17m39s	+39°27.2'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 15"×10" — 495x.
MAC 1717+5729	gx	17h16m58s	+57°28.8'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S — 495x.
MAC 1720+5158	gx	17h20m20s	+51°58.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MAC 1721+5904	gx	17h21m45s	+59°05.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	piccolo baffo molto tenue esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW; appare facilmente in visione distolta, ma è meglio restare a 450x; c'è una stellina subito a S.
MAC 1722+7421	gx	17h22m22s	+74°21.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta a 450x, molto piccola e non più estesa di 10"-12".
MAC 1723+4152	gx	17h23m21s	+41°52.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MAC 1723+4318	gx	17h23m32s	+43°18.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 1725+4603	gx	17h25m02s	+46°03.9'		Her	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; meglio evidente di PGC 60245 dalla quale dista 2.5' verso NE — 450x.
MAC 1725+5652	gx	17h25m07s	+56°52.7'		Dra	28"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NE — 495x.
MAC 1725+5845	gx	17h25m08s	+58°45.9'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a NW — 450x.
MAC 1726+4422	gx	17h26m59s	+44°22.4'		Her	24"	buona / buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1726+4428	gx	17h26m19s	+45°28.8'		Her	24"	buona / buono	piccola, debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata al vertice più acuto di un piccolo triangolo isoscele formato con una stellina abbastanza brillante a 1.5' S e una più debole alla stessa distanza SE — 450x.
MAC 1727+5936	gx	17h27m10s	+59°36.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso verso N — 495x.
MAC 1728+0619	gx	17h28m58s	+06°19.0'		Oph	24"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W, situato a ridosso N di una stellina appena percettibile — 450x.
MAC 1730+4334	gx	17h30m15s	+43°34.6'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1731+2335	gx	17h31m15s	+23°35.0'		Her	24"	m. buona / ottimo	è un debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E; la gx è però molto disturbata dalla SAO 85174 di 8ª grandezza situata 2.5' a NNE — 450x.
MAC 1732+7123	gx	17h32m36s	+71°23.7'		Dra	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MCG+12-16-46 situata a ridosso NNW — sono due macchioline molto piccole di aspetto a prima vista simili; in realtà la MAC è poco più evidente, mentre la MCG mostra a momenti una condensazione stellare — 450x.
MAC 1732+7126	gx	17h32m46s	+71°26.5'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-15"; salta fuori a ridosso SE di una stellina brillante — 450x.
MAC 1733+4031	gx	17h03m20s	+40°31.6'		Her	28"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di 2 piccoli baffi di luce molto tenui e di aspetto simile, orientati rispettivamente da N a S e da E a W (la 2ª sembra a tratti appena più evidente) — 495x.
MAC 1733+4031A	gx	17h03m17s	+40°31.7'		Her	28"	m. buona / ottimo	v. **MAC 1733+4031**
MAC 1733+4411	gx	17h33m08s	+44°11.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
MAC 1734+6702	gx	17h34m39s	+67°02.1'		Dra	28"	m. buona / discreto	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina appena percettibile subito a S (allineata con altre 2 più evidenti a SW) — 495x.
MAC 1734+6704	gx	17h34m17s	+67°04.4'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole e molto piccola, relativamente compatta, in visione distolta appare chiaramente orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1735+6800	gx	11h35m49s	+68°00.3'		Dra	24"	ottima / m. buono	debolissima, salta fuori a momenti in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1735+6801	gx	17h35m15s	+68°01.0'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30.15 — 450x.
MAC 1736+6758	gx	17h36m23s	+67°59.0'		Dra	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta e molto debole, con condensazione centrale appena percettibile, appare facilmente in visione distolta a 1' scarso NW di una stellina, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1736+6804	gx	17h36m48s	+68°04.0'		Dra	24"	ottima / m. buono	debolissima e praticamente persa nei bagliori della SAO 17574 di magnitudo 8.5; è osservabile solo 450x, ma è molto piccola con dimensioni di max 15".
MAC 1737+2241	gx	17h37m45s	+22°42.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente a ridosso SW di una stellina; non ne capisco la forma, ma è comunque molto piccola, estesa sì e no 10"-12" — 450x.
MAC 1737+2242	gx	17h37m51s	+22°41.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina brillante a 1' scarso NE — 450x.
MAC 1737+4618	gx	17h37m50s	+46°18.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	elusivo baffo di luce che in visione distolta sembra dipartirsi verso E da una stellina molto debole per una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1738+5920	gx	17h38m56s	+59°21.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; situata tra due stelline: una a SE e l'altra più debole a NW.
MAC 1739+4825	gx	17h39m45s	+48°25.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 1740+4318	gx	17h40m07s	+43°18.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline fortemente sbilanciate subito a SE — 450x.
MAC 1741+3903	gx	17h41m48s	+39°03.2'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina subito a SE e una più evidente alla stessa distanza verso NE — 495x.
MAC 1741+6728	gx	17h42m41s	+67°28.7'		Dra	28"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 495x.
MAC 1742+3907	gx	17h42m33s	+39°07.9'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra 2 stelline orientate da NNE a SSW (quest'ultima è più debole); poco disturbata da una stella brillante di magnitudo 9.6 1.5' a W — 495x.
MAC 1742+6724	gx	17h42m38s	+67°24.7'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto piccola, debole, diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso N e una debole subito a SW — 495x.
MAC 1742+6735	gx	17h42m14s	+67°35.5'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme — 495x.
MAC 1742+6736	gx	17h42m32s	+67°36.6'		Dra	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NNE — 495x.
MAC 1743+3905	gx	17h43m05s	+39°05.5'		Her	28"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso N e una più debole subito a SW — 495x.
MAC 1744+6735	gx	17h44m19s	+67°35.5'		Dra	28"	m. buona / discreto	piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SSE (situata a ridosso E di NGC 6470). E' erroneamente riportata sulla Prima Edizione dell'Uranometria come NGC 6471, un oggetto che in realtà non esiste perché è un duplicato della 6470 — 495x.
MAC 1744+6736	gx	17h44m30s	+67°36.6'		Dra	28"	m. buona / discreto	debolissima e piccola, appare elusivamente a 1.5' SE di NGC 6472, non è più estesa di 12"-15" — 495x.
MAC 1745+3931	gx	17h45m44s	+39°31.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1746+4017	gx	17h46m59s	+40°17.0'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole e molto disturbata da una stellina brillante a ridosso E; in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina subito a S (la quale ha una compagna percettibile solo a momenti a ridosso SW) — 495x.
MAC 1746+4018	gx	17h46m10s	+40°18.6'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1747+4502	gx	17h47m22s	+45°02.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1747+6140	gx	17h47m47s	+61°40.2'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, a tratti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' SSE — 450x.
MAC 1747+6140A	gx	17h47m34s	+61°40.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	è di aspetto quasi stellare a 450x, allineata ed equidistante con due stelline a NW — 450x.
MAC 1748+5512	gx	17h48m59s	+55°12.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, salta fuori a tratti in visione distolta, ma non riesco a capirne la forma, anche perché è disturbata dalla SAO 30590 di 10ª grandezza situata un paio di primi a WNW — 495x.
MAC 1749+6012	gx	17h49m50s	+60°12.1'		Dra	28"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo E — 495x.
MAC 1751+6249	gx	17h51m04s	+62°49.3'		Dra	28"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 300-88**, situata a ridosso W e dalla quale si separa con difficoltà; entrambe le gx sono molto piccole, estese sì e no 15", ma è difficile capirne l'eventuale orientamento; solo la CGCG mostra a tratti un tenue nucleo quasi stellare — 495x.
MAC 1752+4458	gx	17h53m0s	+44°58.7'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a W — 495x.
MAC 1756+6512	gx	17h56m46s	+65°12.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare elusivamente a 1.5' ESE di CGCG 322-23, forse rotonda con Ø di una decina di secondi — 450x.
MAC 1757+4507	gx	17h57m42s	+45°07.9'		Her	28"	ottima / ottimo	forma una coppia serrata con **CGCG 254-5** situata a ridosso N — molto debole come la compagna, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo puntiforme — 495x.
MAC 1758+7039	gx	17h58m15s	+70°39.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	v. **CGCG 340-30**
MAC 1800+4812	gx	18h00m32s	+48°12.9'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, di aspetto uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1801+4428	gx	18h02m46s	+44°28.7'		Her	28"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' NE — 495x.
MAC 1801+4831	gx	18h01m11s	+48°31.4'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccolo nucleo puntiforme visibile solo a momenti; situata tra due stelline a ridosso NW e SE — 450x.
MAC 1801+6521	gx	18h01m18s	+65°21.1'		Dra	24"	ottima / m. buono	debolissima e molto piccola, relativamente compatta, appare in visione distolta, ma è meglio spingere a 580x; non sembra più estesa di una 10-ina di secondi; forma un minuscolo triangolo equilatero con CGCG 322-29 a NE e una stellina a SE.
MAC 1802+4241	gx	18h02m21s	+42°41.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N (fa parte di una coppia della stessa luminosità) che ne confonde un po' la forma — 450x.
MAC 1802+4247	gx	18h02m39s	+42°47.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 227-16 dalla quale si separa facilmente anche a 340x; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1802+5540	gx	18h02m13s	+55°40.9'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NE e una debole a 1' verso SE — 450x.
MAC 1803+6030	gx	18h03m59s	+60°30.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensata; situata 1.5' a N di CGCG 301-12 — 495x.
MAC 1804+4527	gx	18h04m59s	+46°27.9'		Her	28"	ottima / ottimo	v. **CGCG 254-14**
MAC 1804+5657	gx	18h04m28s	+56°57.6'		Dra	28"	ottima / m. buono	appare come una stellina appena percettibile a metà strada tra CGCG 301-13 e una stellina situata un paio di primi a N.
MAC 1804+6954	gx	18h04m23s	+69°54.4'		Dra	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, appare facilmente in visione distolta a 1.5' N di una stellina brillante, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 1807+4646	gx	18h07m45s	+46°46.3'		Her	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' scarso SW — 450x.
MAC 1810+4956	gx	18h10m23s	+49°56.9'		Her	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, appare a tratti in visione distolta, approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
MAC 1812+4222	gx	18h12m29s	+42°22.8'		Her	28"	ottima / ottimo	è debole, ma relativamente facile per questa categoria di oggetti, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e poco più brillante all'interno; c'è una coppia di stelline un poco sbilanciate in luminosità a 1' verso S — 495x.
MAC 1813+5700	gx	18h13m15s	+57°00.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 495x.
MAC 1813+5703	gx	18h13m17s	+57°03.7'		Dra	28"	m. buona / ottimo	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione N-S; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 495x.
MAC 1813+5704	gx	18h13m48s	+57°04.1'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 495x.
MAC 1813+5706	gx	18h13m16s	+57°06.4'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di max 15"; allineata ed equidistante con 2 stelline brillanti a S — 495x.
MAC 1817+4103	gx	18h17m19s	+41°03.1'		Lyr	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1820+4754	gx	18h20m26s	+47°54.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	piccolo ed elusivo baffo di luce esteso < 30" e orientato da NW a SE; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1821+4823	gx	18h21m09s	+48°23.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, a tratti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 1822+4838	gx	18h22m43s	+48°38.4'		Dra	28"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa e molto disturbata dalla SAO 47446 di 8ª grandezza situata un paio di primi a N, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
MAC 1823+6408	gx	18h23m25s	+64°08.6'		Dra	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa, molto allungata da NW a SE, e dimensioni 30"×10" e con tenue condensazione centrale — 495x.
MAC 1831+3400	gx	18h31m50s	+34°00.8'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme e poco contrastata sul fondo cielo; in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 1831+3403A	gx	18h31m55s	+34°04.0'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
MAC 1831+3407	gx	18h31m56s	+34°07.2'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, ma osservabile abbastanza facilmente in visione distolta alternando gli occhi, diffusa ed estesa 10" o 15" — 450x.
MAC 1833+5953	gx	18h33m34s	+59°53.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole, ma che nondimeno appare facilmente in visione distolta a 450x; è estesa una 40-ina di secondi ed è orientata da NE a SW; a tratti si separa facilmente da NGC 6670 situata a ridosso NE.
MAC 1834+3826	gx	18h34m27s	+38°27.1'		Lyr	24"	m. buona / buono	piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MAC 1835+5133	gx	18h35m47s	+51°34.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	piccolo e debolissima, a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1835+5135	gx	18h35m51s	+51°35.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto piccola, appare elusivamente in visione distolta a 450x quando si osserva la precedente, situata 1.5' a N; forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 1836+5131	gx	18h36m52s	+51°31.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme, situata tra due stelline orientate da NW a SE e distanti 1' — 450x.
MAC 1838+3251	gx	18h38m47s	+32°51.3'		Lyr	24"	m. buona / buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
MAC 1850+5545	gx	18h50m55s	+55°45.5'		Dra	28"	ottima / m. buono	è situata quasi a ridosso SW di **CGCG 280-6**, ma è debolissima, molto piccola, estesa sì e no 10" e appare solo a tratti in visione distolta — 495x.
MAC 1854+6822	gx	18h54m06s	+68°23.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; situata tra una doppia stretta abbastanza brillante a ridosso W e una debole stellina dalla parte opposta (fa parte dell'ammasso AGC 2312) — 450x.
MAC 1903+6353	gx	19h03m07s	+63°53.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta subito a S di una stellina, ma solo spingendo a 580x si riesce, seppure a fatica, a capirne l'orientamento da N a S e le dimensioni di ~ 20"×10".
MAC 1904+5039	gx	19h04m51s	+50°39.7'		Dra	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente orientata da N a S, con dimensioni 30"×20"; situata tra 2 stelline distanti un paio di primi in direzione NE-SW (quella a NE è più brillante) — 495x.
MAC 1908+5055	gx	19h08m32s	+50°55.1'		Cyg	24"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso W — 450x.
MAC 1908+5100	gx	19h08m31s	+50°59.9'		Cyg	24"	m. buona / discreto	debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 450x.
MAC 1909+4257	gx	19h09m01s	+42°57.2'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE — 450x.
MAC 1909+5054	gx	19h09m39s	+50°55.1'		Cyg	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
MAC 1909+5249	gx	19h09m48s	+52°49.3'		Cyg	28"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 495x.
MAC 1911+7753	gx	19h11m33s	+77°53.7'		Dra	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1912+4510	gx	19h12m32s	+45°10.7'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×10"; c'è una coppia di stelline fortemente sbilanciate in luminosità a ridosso SW — 495x.
MAC 1913+4515	gx	19h13m23s	+45°15.2'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	è un piccolo baffo di luce relativamente facile esteso una 30-ina di secondi in direzione N-S e con un nucleo stellare evidente; c'è una stellina a ridosso NNW — 495x.
MAC 1916+4604	gx	19h16m52s	+46°04.2'		Cyg	16"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente facile da vedere, compatta, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare visibile a tratti; stellina a ~ 40" SE — 380x.
MAC 1917+4237	gx	19h17m40s	+42°37.0'		Lyr	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra due stelline orientate da NW a SE — 450x.
MAC 1918+5222	gx	19h18m35s	+52°22.2'		Cyg	28"	ottima / m. buono	piccola, debole, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NW — 495x.
MAC 1919+4411	gx	19h19m23s	+44°11.1'		Cyg	28"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, relativamente compatta, in visione distolta si vede chiaramente allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a NW — 495x.
MAC 1919+4412	ss?	19h19m00s	+44°12.2'		Cyg	28"	ottima / ottimo	nella posizione riportata sul Megastar si nota soltanto una probabile doppia irrisolta che dà l'impressione di un oggetto estremamente piccolo e compatto orientato da E a W — 495x.
MAC 1919+4413	gx	19h19m03s	+44°13.9'		Cyg	28"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a ridosso NW (situata 1' scarso a E di CGCG 230-1) — 495x.
MAC 1921+4314	gx	19h21m35s	+43°14.1'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole chiazza diffusa, estesa < 30" e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a ridosso SW e una debole a ridosso E — 450x.
MAC 1921+4357	gx	19h21m07s	+43°56.9'		Cyg	28"	ottima / ottimo	appare solo a momenti come una stellina appena percettibile situata a ridosso W o NW di **CGCG 230-7** — 495x.
MAC 1922+4303	gx	19h22m13s	+43°03.2'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; meglio non scalare gli ingrandimenti; allineata ed equidistante con due stelline a E — 450x.
MAC 1924+5941	gx	19h24m38s	+59°41.7'		Dra	28"	ottima / m. buono	piccola, debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a N; forma una coppia ravvicinata con **CGCG 302-13** situata 1' a WNW — 495x.
MAC 1928+5634	gx	19h28m21s	+56°34.9'		Cyg	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina appena percettibile ridosso SE — 450x.
MAC 1929+7721	gx	19h29m25s	+77°21.8'		Dra	24"	buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E — 450x.
MAC 1931+4154	gx	19h31m26s	+41°54.0'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 230-21** situata quasi a ridosso NE; molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1941+5026	gx	19h41m19s	+50°27.1'		Cyg	28"	buona / ottimo	debolissima lama di luce orientata grosso modo da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una coppia serrata di stelline a 1' W — 495x.
MAC 1941+5149	gx	19h41m16s	+51°49.1'		Cyg	28"	buona / ottimo	appare elusivamente e solo a tratti a ridosso S di una debole stellina; non è più estesa di 10"-12" — 495x.
MAC 1943+5026	gx	19h43m07s	+50°26.8'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale abbastanza brillante evidente — 450x.
MAC 1943+7821	gx	19h43m37s	+78°21.6'		Dra	24"	buona / buono	appare elusivamente in visione distolta, meglio a 340x, di forma indistinta, ma comunque non più estesa di 15".
MAC 1944+5254	gx	19h44m30s	+52°54.3'		Cyg	28"	buona / ottimo	piccola e molto debole, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" ; c'è una stellina a ridosso S — 495x.
MAC 1944+5255	gx	19h44m27s	+52°55.0'		Cyg	28"	buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 495x.
MAC 1944+5629	gx	19h44m04s	+56°29.1'		Cyg	28"	buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" e un nucleo puntiforme; quasi allineata ed equidistante con una coppia di stelline a N — 495x.
MAC 1947+5655	gx	19h47m11s	+56°55.7'		Cyg	28"	buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare appena percettibile — 495x.
MAC 1954+6221	gx	19h54m36s	+62°21.1'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
MAC 1958+5257	gx	19h58m24s	+52°57.0'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; situata tra due stelline: una al bordo SE e l'altra più debole a quello NW — 450x.
MAC 2004+0708	gx	20h04m09s	+07°08.7'		Aql	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
MAC 2004+0710	gx	20h04m18s	+07°10.1'		Aql	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina molto debole a una 40-ina di secondi verso W — 450x.
MAC 2032+0952	gx	20h32m59s	+09°52.9'		Del	24"	ottima / buono	si separa senza difficoltà da NGC 6930 situata a ridosso S; è piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2033+0241	gx	20h33m39s	+02°41.0'		Del	24"	ottima / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina a 1' NNE — 450x.
MAC 2033+0951	gx	20h33m05s	+09°51.6'		Del	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensata; c'è una debole stellina subito a W — 450x.
MAC 2034+0242	gx	20h34m09s	+02°42.8'		Del	24"	ottima / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1.5' N — 450x.
MAC 2034+8748	gx	20h34m54s	+87°48.9'		UMi	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; è situata sul lato orientale di un piccolo triangolo di deboli stelline: una di queste si trova a ridosso NW della gx — 450x.
MAC 2047+0026	gx	20h47m03s	+00°26.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, non più estesa di 20" e di luminosità uniforme; appare facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 2048+1620	gx	20h48m21s	+16°20.3'		Del	24"	ottima / ottimo	è un elusivo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
MAC 2048+1643	gx	20h48m17s	+16°43.3'		Del	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima chiazza approssim. circolare, estesa una 20-ina di secondi situata a ridosso S di UGC 11634; c'è una stellina abbastanza brillante situata a ridosso NW confonde un po' la visione; si separa dalla UGC, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 2049+1638	gx	20h49m38s	+16°38.9'		Del	24"	ottima / ottimo	altra piccola e debolissima chiazza rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 2055+1530	gx	20h55m28s	+15°30.3'		Del	24"	ottima / m. buono	debole, molto piccola, compatta e condensata, rotonda con Ø max di 15" — 450x.
MAC 2104+1315	gx	21h04m07s	+13°15.2'		Del	24"	buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 2104+1605	gx	21h04m28s	+16°05.1'		Del	16"	buona / ottimo	quando si osserva UGC 11672 sembra di vedere, seppure elusivamente, un 2º nucleo quasi a ridosso verso W; questo apparterrebbe effettivamente alla MAC con la quale la compagna forma una coppia serrata; la visione è meglio contrastata spingendo a 380x.
MAC 2110+1519	gx	21h10m25s	+15°19.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MAC 2110+1519A	gx	21h10m36s	+15°19.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' S — 450x.
MAC 2113+0034	gx	21h13m44s	+00°34.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 2115+0708	gx	21h15m10s	+07°08.5'		Equ	24"	ottima / ottimo	v. **CGCG 401-10**
MAC 2115+0711	gx	21h15m04s	+07°11.3'		Equ	24"	ottima / ottimo	debolissima, visibile in visione distolta a 450x, ma solo a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15".
MAC 2127+1515	gx	21h27m10s	+15°15.8'		Peg	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia stretta con la CGCG 426-56 situata a ridosso verso E; a causa del seeing si sdoppiano tuttavia solo a tratti; la gx è debolissima, ma più compatta della compagna; è orientata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a 1' SE e un'altra appena percettibile subito a S; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 2132+0239	gx	21h32m16s	+02°39.6'		Peg	24"	buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, ma la forma è compromessa da una debole stellina al bordo SW; non è comunque più estesa di 20" — 450x.
MAC 2134+0835	gx	21h34m00s	+08°35.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da N a S; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina subito a S — 450x.

MAC 2135+0136	gx	21h35m05s	+01°36.0'		Aqr	24"	ottima / buono	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 2139+1021	gx	21h39m38s	+10°21.4'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo con Ø di 15"-20" e di luminosità uniforme; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva una stellina a 1' scarso verso NNE — 450x.
MAC 2140+0117	gx	21h40m51s	+01°17.0'		Aqr	16"	m. buona / buono	è una debolissima macchiolina molto piccola che salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quando si fissa la stellina situata poco più di 1' SE (4' a SW di UGC 11789) — 380x.
MAC 2147+0427	gx	21h47m03s	+04°27.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto deboIe, ma relativamente compatta in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso verso NE — 450x.
MAC 2150+0055	gx	21h50m40s	+00°55.3'		Aqr	24"	buona / buono	è un piccolo oggetto diffuso appena percettibile a 450x e che appare in visione distolta una 30-ina di secondi a NW di UGC 11825.
MAC 2153+1533	gx	21h53m12s	+15°33.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma è piccolissima, a tratti allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 2154+1502	gx	21h54m08s	+15°02.1'		Peg	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e condensata, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
MAC 2154+1503	gx	21h54m02s	+15°03.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2156+0554	gx	21h56m01s	+05°54.6'		Peg	24"	m. buona / mediocre	è la compagna di UGC 11851 situata subito a SW — è molto piccola e pur essendo debolissima appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 20"×10".
MAC 2156+0632	gx	21h56m09s	+06°32.1'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø non superiore a 20" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 2159+1325	gx	21h59m07s	+13°25.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e con nucleo stellare, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso E; la visione è disturbata dalla SAO 107559 situata a 3' scarsi SW — 450x — 14' SW di CGCG 428-10.
MAC 2200+0623	gx	22h00m45s	+06°23.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola chiazza circolare molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso NW e un'altra molto debole poco più distante a SW; una coppia di stelline abbastanza stretta di trova un paio di primi verso N — 450x.
MAC 2207+0706	gx	22h07m11s	+07°06.7'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 2207+1014	gx	22h07m02s	+10°14.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo baffo diffuso e sfilacciato che si diparte verso N da NGC 7212 — 450x.
MAC 2209+4112	gx	22h09m45s	+41°12.3'		Lac	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a N — 450x.
MAC 2210+4101	gx	22h10m06s	+41°01.7'		Lac	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e a tratti condensata, orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; situata quasi a ridosso NW di NGC 7223 — 450x.
MAC 2211+0222	gx	22h11m41s	+02°22.9'		Aqr	24"	buona / buono	debolissima, appare in visione distolta, a tratti allungata da E a W con dimensioni 20"×10", ma occorre scalare a 340x.
MAC 2211+0229	gx	22h11m40s	+02°29.3'		Aqr	24"	m. buona / buono	molto debole, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni analoghe a quelle di CGCG 377-38 dalla quale dista 4' verso NW; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
MAC 2212+3834	gx	22h12m46s	+38°34.1'		Lac	24"	ottima / molto buono	piccola, debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø < 20; molto disturbata da una stella brillante di 9a grandezza situata a 1' W (la quale fa parte di un arco di 4 componenti brillanti) — 450x.
MAC 2212+3841	gx	22h12m57s	+38°41.4'		Lac	24"	ottima / molto buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2212+3841A	gx	22h12m32s	+38°42.0'		Lac	24"	ottima / molto buono	è un tenuissimo baffo di luce esteso < 30" e orientato da N a S; si trova subito a N delle stellina brillante situata a ridosso NE di UGC 11950 — 450x.
MAC 2213+3711	gx	22h13m27s	+37°11.1'		Lac	24"	ottima / molto buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso SW — 450x.
MAC 2213+3712	gx	22h13m44s	+37°12.8'		Lac	24"	ottima / molto buono	piccola, molto debole e a tratti condensata; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a S — 450x.
MAC 2213+3837	gx	22h13m25s	+38°37.6'		Lac	24"	ottima / molto buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MAC 2214+0504	gx	22h14m41s	+05°04.7'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 2214+3153	gx	22h14m13s	+31°53.5'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una doppia debole a 1' scarso SW e un'altra appena più evidente subito a SE — 450x.
MAC 2217+3531	gx	22h17m04s	+35°31.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	è quella piccola e debolissima galassietta situata 4' SW di UGC 11975; si vede a tratti a 380x, ma in visione diretta è di aspetto stellare; in visione distolta appare effettivamente diffusa, anche se è estesa solo pochi secondi (altresì denominata **LEDA 214815**).
MAC 2219+1850	gx	22h19m42s	+18°50.2'		Peg	24"	ottima / mediocre	debolissima, appare in visione distolta a 450x; è molto piccola e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 20"×10".
MAC 2221+1853	gx	22h21m05s	+18°53.3'		Peg	24"	ottima / mediocre	molto piccola e debole, ma relativamente facile da vedere, orientata da E a W con dimensioni 15"×10" e condensata.
MAC 2222+0244	gx	22h22m26s	+02°44.1'		Peg	24"	m. buona / buono	debole, approssim. rotonda con Ø > 20" e di luminosità uniforme; è situata tra 2 stelline brillanti distanti 4' e orientate da NNE a SSW: quella a NNE, più luminosa, si trova a SW della CGCG 378-2 — 450x.
MAC 2222+0513	gx	22h22m22s	+05°13.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lama di luce che in visione distolta sembra a prima vista aggettare a W di una stellina per una 30-ina di secondi; prolungando l'osservazione a 450x appare tuttavia decisamente separata.
MAC 2222+2941	gx	23h22m42s	+29°41.7'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; è un po' disturbata dalla componente più meridionale di un asterismo di 3 stelline brillanti orientato da N a S — 450x.
MAC 2222+3542	gx	22h22m08s	+35°42.8'		Lac	24"	ottima / molto buono	debolissimo baffo di luce orientato da NW a SE ed esteso una 30-ina di secondi; è disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a N — 450x.
MAC 2222+3613	gx	22h22m17s	+36°13.9'		Lac	16"	ottima / buono	piccola, debole, allungata da NE a SW di dimensioni 40"×20", con una debole stellina a ridosso verso N; salta fuori facilmente in visione distolta a 380x (altresì denominata **LEDA 214824**).
MAC 2222+3613A	gx	22h22m41s	+36°13.8'		Lac	16"	ottima / ottimo	molto debole, ma osservabile senza tanti problemi a 380x; è allungata da E a W, con dimensioni 30"×15 e con nucleo stellare visibile a tratti (altresì denominata **LEDA 214825**).
MAC 2224+0239	gx	22h24m24s	+02°39.8'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, disturbata da una stellina abbastanza brillante a ridosso E; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 2225+0309	gx	22h05m07s	+03°09.0'		Peg	24"	ottima / buono	debolissima, appare in visione distolta al vertice SW di un piccolo triangolo rettangolo formato con 2 stelline a N e NE; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2225+0313	gx	22h25m26s	+03°13.0'		Peg	24"	ottima / buono	altra galassietta debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2225+0327	gx	22h25m59s	+03°27.6'		Peg	24"	ottima / buono	ancora una debolissima galassietta molto diffusa, salta fuori abbastanza brillante in visione distolta a ridosso W di una stellina; solo a momenti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 2226+3458	gx	22h26m43s	+34°58.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso sì e no 30" e orientato da NW a SE; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 2227+0045	gx	22h27m04s	+00°45.3'		Aqr	24"	ottima / buono	anche questa è debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; un poco disturbata dalla SAO 12753 di 10ª grandezza situata 4' scarsi a SW — 450x.
MAC 2228+3402	gx	22h28m49s	+34°02.8'		Peg	24"	ottima / molto buono	appare elusivamente subito a S di PGC 68965, ma rimane di aspetto stellare anche a 450x.
MAC 2229+0155	gx	22h29m03s	+01°55.8'		Aqr	16"	m. buona / discreto	debolissimo oggetto forse rotondo di max 30" di Ø; appare in visione distolta a 270x a 1.5' NNW di una stellina.
MAC 2231+3426	gx	22h31m22s	+34°26.8'		Peg	24"	ottima / buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi, orientato da E a W e che sembra aggettare a E di una stellina brillante che disturba la visione — 450x.
MAC 2231+3444	gx	22h31m16s	+34°44.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di 12"-15"; situata quasi a ridosso S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 2231+3922A	gx	22h31m21s	+39°22.1'		Lac	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata quasi a ridosso N di **UGC 12064** — 450x.
MAC 2231+3922B	gx	22h31m13s	+39°22.0'		Lac	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi, orientato da E a W e situato tra due stelline orientate da NNE a SSW — 450x.
MAC 2231+3929	gx	22h31m11s	+39°29.4'		Lac	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza che che aggetta per una 20-ina di secondi a S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 2234+0155	gx	22h34m03s	+01°55.0'		Aqr	24"	ottima / buono	è un elusivo baffo di luce che appare solo a momenti in visione distolta a 450x, orientato da N a S ed esteso sì e no una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline molto deboli a S e SE — 450x.
MAC 2234+2041	gx	22h34m21s	+20°41.8'		Peg	24"	ottima / mediocre	piccola e molto debole, appare facilmente in visione distolta, approssim. rotonda con Ø di 20" — 450x.
MAC 2236+3347	gx	22h36m32s	+33°47.8'		Peg	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 20"×10".
MAC 2236+3347	gx	22h36m32s	+33°47.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi (situata 12' a SE del Quintetto Stephan) — 450x.
MAC 2236+3524	gx	22h37m55s	+35°24.2'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto piccola, debolissima e relativamente compatta, più che altro offuscata dal bagliore della SAO 72552 di 9a grandezza situata subito a W; è importante non scendere sotto i 450x.
MAC 2236+3527	gx	22h36m58s	+35°27.8'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata tra una stellina a SE e una più debole a NW — 450x.
MAC 2236+3853	gx	22h36m49s	+38°53.3'		Lac	24"	ottima / m. buono	piccola e debolissima, non più estesa di 15"; è situata a ridosso W di una stellina — 450x.
MAC 2237+3831	gx	22h37m21s	+38°31.9'		Lac	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 2238+3522B	gx	22h38m27s	+35°22.4'		Peg	24"	ottima / molto buono	appare come una sorta di debolissimo nodulo esteso 10"-12" e situato a ridosso N di MCG+6-49-56 — 450x.
MAC 2238+3523	gx	22h38m34s	+35°23.5'		Peg	24"	ottima / molto buono	piccola, debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una doppia stretta a ridosso SE; non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 2238+3525	gx	22h38m35s	+35°25.6'		Peg	24"	ottima / molto buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
MAC 2238+3538	gx	22h38m39s	+35°38.9'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina subito a E e una appena percettibile a ridosso W — 450x.
MAC 2239+0311	gx	22h39m59s	+03°11.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa una 30-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta a 450x.
MAC 2240+0312	gx	22h40m05s	+03°12.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	salta fuori elusivamente a 1' SE di una debole stellina, ma non riesco a capirne la forma; non bisogna comunque scendere sotto i 450x.
MAC 2241+0316A	gx	22h41m10s	+03°16.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2241+2016	gx	22h41m59s	+20°16.3'		Peg	16"	m. ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, appare a tratti in visione distolta a NW di una stellina molto debole; non è più estesa di una 15-ina di secondi — 380x.
MAC 2242+1941	gx	22h42m16s	+19°41.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, relativamente compatta e a tratti condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 2246+1029	gx	22h46m15s	+10°29.8'		Peg	24"	buona / ottimo	è debolissima, ma in visione distolta appare abbastanza facilmente orientata da NE a SW, di dimensioni grosso modo 30"×15" e con nucleo stellare visibile a tratti; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
MAC 2249+1111	gx	22h49m05s	+11°11.0'		Peg	24"	buona / ottimo	appare abbastanza facilmente in visione distolta come una debolissima stellina sfocata — 450x.
MAC 2249+1129	gx	22h49m22s	+11°29.7'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 1' S di una stellina, orientata grosso modo da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
MAC 2249+1135	gx	22h49m25s	+11°35.6'		Peg	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di 20"; c'è una stellina a ridosso verso SW — 450x.
MAC 2252+0106	gx	22h52m22s	+01°07.0'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola e relativamente facile, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, diffusa e leggermente condensata — 450x.
MAC 2253+1231	gx	22h53m22s	+12°31.8'		Peg	24"	buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce estesa forse una 30-ina di secondi che appare come tale spingendo a 570x; appare in visione distolta a poco più di 1' N di una stellina appena percettibile.
MAC 2253+3209	gx	22h53m36s	+32°09.4'		Peg	24"	ottima / molto buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (situata 3.5' a NE di NGC 7407) — 450x.
MAC 2253+3222	gx	22h53m46s	+32°22.8'		Peg	24"	ottima / molto buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; è situata tra due stelline abbastanza brillanti orientate da E a W e distanti un paio di primi — 450x.
MAC 2254+3211	gx	22h54m45s	+32°11.9'		Peg	24"	ottima / molto buono	debolissimo baffo di luce, appare in visione distolta subito a S di MCG+5-54-12; è orientato da N a S ed esteso non più di 20" — 450x.
MAC 2254+3222	gx	22h54m58s	+32°22.0'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta allineata ed equidistante con due stelline a E — 450x.
MAC 2255+0207	gx	22h55m50s	+02°07.0'		Psc	24"	m. buona / buono	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 2255+1255	gx	22h55m26s	+12°55.7'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stella brillante a 1.5' SE; una doppia stretta si trova un paio di primi a W — 450x.
MAC 2255+3118	gx	22h55m04s	+31°19.0'		Peg	24"	ottima / molto buono	debolissima e molto piccola, appare facilmente in visione distolta a 450x a 1' NW di CGCG 496-19, ma non è più estesa di 10"-12".
MAC 2255+3152	gx	22h55m47s	+31°52.9'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccolo e debolissimo baffo di luce esteso poco più di 20" e orientato da E a W; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 2257+1300	gx	22h57m27s	+13°00.1'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 2257+2601	gx	22h57m01s	+26°01.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 2257+2606C	gx	22h57m57s	+26°06.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 2258+2439	gx	22h58m39s	+24°39.2'		Peg	24"	ottima / buono	debolissimo oggetto rotondo relativamente compatto, esteso non più di 15", appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x a metà strada tra UGC 12280 e una stellina.
MAC 2259+0700	gx	23h00m00s	+07°00.1'		Psc	24"	buona / ottimo	appare in visione distolta come una stellina appena percettibile e debolmente sfocata, situata una 30-ina di secondi a SE di una stellina brillante — 450x.
MAC 2259+2554	gx	22h59m19s	+25°54.8'		Peg	16"	buona / ottimo	piccolo e debole oggetto grosso modo rotondo di luminosità uniforme, diffuso e con Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
MAC 2259+2633	gx	22h59m10s	+26°33.0'		Peg	24"	ottima / buono	debolissima, probabilmente rotonda con Ø < 30"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' N di una stellina — 450x.
MAC 2259+2857	gx	22h59m33s	+28°57.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata sul vettore NW di un piccolo asterismo foggiato a "T" — 450x.
MAC 2259+3905	gx	22h59m14s	+39°05.4'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
MAC 2300+0648	gx	23h00m57s	+06°48.9'		Psc	24"	buona / ottimo	debole e molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare chiaramente orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a N — 450x.
MAC 2300+0653	gx	23h00m31s	+06°53.4'		Psc	24"	buona / ottimo	debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2300+0703	gx	23h00m46s	+07°03.6'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, estesa 10" o 15", appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 2300+0705	gx	23h00m47s	+07°05.9'		Psc	24"	buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W ed estesa una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2300+0706	gx	23h00m54s	+07°06.2'		Psc	24"	buona / ottimo	poco più evidente, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 2300+1310	gx	23h00m53s	+13°10.7'		Peg	24"	buona / ottimo	elusiva lama di luce che appare come tale solo a momenti in visione distolta, ma occorre scalare a 340x; è orientata da N a S ed estesa sì e no una 40-ina di secondi.
MAC 2301+0646	gx	23h01m10s	+06°46.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (presenza residua di chiarore lunare)
MAC 2302+0107	gx	23h02m53s	+01°07.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi e orientata da NW a SE; appare a momenti in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 2303+1955	gx	23h03m41s	+19°55.4'		Peg	24"	buona / buono	diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 2303+1955A	gx	23h03m51s	+19°55.2'		Peg	24"	buona / buono	debole, diffusa, a tratti poco più brillante all'interno, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 2303+1958	gx	23h03m41s	+19°58.7'		Peg	24"	m. buona / buono	molto debole, ma facilmente osservabile anche in visione diretta, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2303+2015	gx	23h03m41s	+20°15.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2303+2015A	gx	23h03m42s	+20°15.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo esteso sì e no 20" e orientato da N a S; appare a momenti in visione distolta a ridosso S della precedente, ma non bisogna scendere sotto i 450x; poco meglio evidente spingendo a 580x.
MAC 2304+1935A	gx	23h04m47s	+19°35.8'		Peg	24"	buona / buono	molto piccola e condensata, facilmente visibile a 450x, rotonda con Ø di 10"-15".
MAC 2304+4409	gx	23h04m19s	+44°09.9'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 2307+1525	gx	23h07m57s	+15°25.5'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2308+1247A	gx	23h08m20s	+12°48.2'		Peg	24"	buona / m. buono	piccola e debolissima, ma relativamente compatta, probabilmente rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2308+1301	gx	23h08m12s	+13°02.0'		Peg	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale stellare appena percettibile — 450x.
MAC 2308+1718	gx	23h08m52s	+17°18.9'		Peg	16"	buona / ottimo	galassietta elusiva che appare solo a momenti in visione distolta, ma bisogna scalare a 270x; non riesco a capire com'è orientata, né com'è fatta, ma non dovrebbe essere comunque più estesa di 30".
MAC 2309+0535	gx	23h09m35s	+05°35.2'		Psc	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' SSE — 450x.
MAC 2309+0538	gx	23h09m29s	+05°38.5'		Psc	24"	buona / buono	debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1.5' NW di una coppia di deboli stelline orientate da N a S; non riesco a capire com'è fatta, ma non è comunque più estesa di 20" — 450x.
MAC 2309+0720	gx	23h09m59s	+07°20.5'		Psc	24"	buona / ottimo	appare facilmente nei bagliori della SAO 128008 di magnitudo 7.6 situata un paio di primi a NE; è molto piccola e condensata — 450x.
MAC 2309+0729	gx	23h09m53s	+07°29.5'		Psc	24"	buona / ottimo	piccola e molto debole, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10".
MAC 2309+0731	gx	23h09m04s	+07°31.1'		Psc	24"	buona / ottimo	è debolissima, ma in visione distolta appare a momenti molto allungata da NW a SE con dimensioni di 30"×10" — 450x.
MAC 2310+0723	gx	23h10m41s	+07°23.3'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di 10"-15"; è allineata con MCG+1-59-6, situata a 4' WNW, e una stellina abbastanza brillante che si trova quasi nel mezzo — 450x.
MAC 2310+0732	gx	23h10m18s	+07°32.7'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; si fatica un po' a vederla, anche in visione distolta, perché a 450x il campo è depleto.
MAC 2310+0734A	gx	23h10m25s	+07°34.7'		Psc	24"	buona / ottimo	assieme a MAC 2310+0735C e MAC 2310+0736 forma un terzetto di galassiette debolissime e molto piccole, tra loro equidistanti e poste ad arco in direzione N-S, tra NGC 7499 ed NGC 7501 osservate col 16" il altra data; la 3ª è quella che salta fuori per prima; la 1ª si vede un po' a fatica subito a E della 7499, mentre l'ultima delle 3 appare solo elusivamente in mezzo alle due NGC — 450x.
MAC 2310+0735	gx	23h10m48s	+07°35.2'		Psc	24"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare solo a momenti, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2310+0735C	gx	23h10m27s	+07°35.4'		Psc	24"	buona / ottimo	v. **MAC 2310+0734A**
MAC 2310+0736A	gx	23h10m27s	+07°36.0'		Psc	24"	buona / ottimo	v. **MAC 2310+0734A**
MAC 2310+0739A	gx	23h10m59s	+07°39.6'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2310+0814	gx	23h10m57s	+08°14.6'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso verso SE — 450x.
MAC 2310+0815	gx	23h10m50s	+08°15.4'		Peg	24"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola, solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 2310+0817	gx	23h10m42s	+08°17.8'		Peg	24"	buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, molto piccola, diffuso e di luminosità uniforme, appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso E di una stellina — 450x.
MAC 2310+0909	gx	23h10m51s	+09°09.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 406-13 situata 30" SW: è solo leggermente più debole di quest'ultima; la coppia appare un po' meglio contrastata scalando a 270x.
MAC 2311+0605	gx	23h11m37s	+06°05.9'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è tuttavia meglio visibile scalando a 340x.
MAC 2311+0612	gx	23h11m01s	+06°12.8'		Psc	24"	buona / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale poco evidente.
MAC 2311+0742	gx	23h11m07s	+07°42.0'		Psc	24"	buona / ottimo	molto debole e disturbata da una stellina brillante situata 1.5' verso N; è molto piccola e in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 20"×10" — 450x.
MAC 2311+0748	gx	23h11m30s	+07°48.4'		Psc	24"	buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 2311+4228	gx	23h11m06s	+42°28.8'		And	24"	m. buona / buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi, orientato in direzione NE-SW e che appare solo in visione distolta a 450x; c'è una stellina brillante subito a NW (in realtà si tratta di una doppia stretta molto sbilanciata).
MAC 2312+0620	gx	23h12m05s	+06°20.2'		Psc	24"	buona / ottimo	è una piccola e debolissima chiazza orientata da E a W, stranamente osservabile scalando a 340x, anche se appare solo a momenti; non sembra comunque più estesa di 30".
MAC 2313+1042	gx	23h13m15s	+10°42.4'		Peg	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, con nucleo stellare abbastanza evidente, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 2314+0123	gx	23h14m50s	+01°23.4'		Psc	24"	buona / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso W; altra stellina poco più evidente a 1.5' NNW — 450x.
MAC 2314+0516	gx	23h14m11s	+05°16.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce estesa forse 1' e orientata da N a S; è un poco disturbata da una stellina abbastanza brillante situata 1.5' a ENE, ma soprattutto dalla SAO 128049 di 9ª grandezza che trovandosi a 5' verso W si fatica a tenere fuori campo — 450x.
MAC 2314+0956A	gx	23h14m19s	+09°56.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole, a 450x appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20"; è situata all'interno di un piccolo triangolo allungato e irregolare di stelline brillanti.
MAC 2314+2850	gx	23h14m27s	+28°51.0'		Peg	24"	ottima / ottimo	assieme a MAC 2314+2850A forma una coppia di galassiette molto deboli e diffuse, di luminosità uniforme; la 1ª è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la 2a, molto piccola, appare a tratti orientata da N a S con dimensioni di 20"×10", ma è disturbata da una stellina abbastanza brillante a ridosso verso E.
MAC 2314+2850A	gx	23h14m31s	+28°50.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	v. **MAC 2314+2850**
MAC 2315+0637	gx	23h15m59s	+06°37.8'		Psc	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2315+0651	gx	23h15m07s	+06°51.3'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima, diffusa, e molto piccola, a tratti appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 2315+1006	gx	23h15m47s	+10°06.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con piccolo bulge abbastanza evidente — 450x.
MAC 2315+1009	gx	23h15m40s	+10°09.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10"; c'è una debole stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 2315+1310	gx	23h15m08s	+13°10.3'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 2315+1528	gx	23h15m51s	+15°28.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; la visione è un po' disturbata da una coppia di stelline brillanti situate a SE e a SSW della gx — 450x.
MAC 2315+2816	gx	23h15m05s	+28°17.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, sembra a prima vista aggettare verso SW da una stellina; a 450x appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15".
MAC 2316+0554	gx	23h16m59s	+05°54.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SE — 450x.
MAC 2316+0940	gx	23h16m09s	+09°40.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissimo ovale di 30"×20", orientato da N a S e di luminosità uniforme; appare poco più contrastato a 270x.
MAC 2317+0559	gx	23h17m49s	+05°59.2'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una tripletta stellare molto serrata e sbilanciata a 1' SW — 450x.
MAC 2317+0725	gx	23h17m58s	+07°25.9'		Psc	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme; a 450x appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10".
MAC 2317+0729	gx	23h17m44s	+07°29.3'		Psc	24"	ottima / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×10", ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 2317+1832	gx	23h17m31s	+18°32.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina subito a SW — 450x.
MAC 2317+2905	gx	23h17m04s	+29°05.2'		Peg	16"	m. buona / ottimo	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta a 380x, molto piccola con dimensioni max di 15"-20".
MAC 2318+0657	gx	23h18m26s	+06°57.9'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata come UGC 12494, dalla quale dista 8' a NW, ed estesa ~ 45" — 450x.
MAC 2318+0923	gx	23h18m43s	+09°23.3'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 2319+0100	gx	23h19m29s	+01°01.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	assieme a MAC 2319+0100A forma una coppia di galassiette debolissime, relativamente compatte, molto piccole e di luminosità uniforme; è molto difficile "tirarle fuori", in quanto situate in una piccola plaga depleta; in visione distolta appaiono simili e poste ortogonalmente tra di loro, con dimensioni grosso modo 20"×10" — 450x.
MAC 2319+0100A	gx	23h19m15s	+01°00.4'		Psc	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 2319+0100**
MAC 2319+0104	gx	23h19m50s	+01°04.2'		Psc	24"	buona / buono	è un'elusiva lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta a 1' E di una debole stellina, meglio a 450x.
MAC 2319+0129	gx	23h19m36s	+01°29.6'		Psc	16"	ottima / ottimo	è un piccolo oggetto diffuso osservabile a 380x a ~ 1' verso N di UGC 12508.
MAC 2319+1854	gx	23h19m13s	+18°54.7'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2319+1937	gx	23h19m57s	+19°37.5'		Peg	24"	buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, allungata da NE a SW, dimensioni 30"×10" e con tenue condensazione centrale evidente — 450x.
MAC 2319+4255	gx	23h19m27s	+42°55.5'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
MAC 2319+4258A	gx	23h19m30s	+42°58.6'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile, allungata da E a W, dimensioni 30"×15" e con tenue bulge diffuso abbastanza evidente — 450x.
MAC 2320+0244	gx	23h20m16s	+02°44.8'		Psc	24"	ottima / m. buono	debolissima, piccola e condensata, con Ø max di 15"; appare abbastanza facilmente a 450x un paio di primi a S di una stella brillante.
MAC 2320+0823	gx	23h20m38s	+08°23.6'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MAC 2320+0934	gx	23h20m40s	+09°34.5'		Peg	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 2320+0935 situata 45" a NNW — molto piccola e debole, relativamente compatta; a 450x appare abbastanza chiaramente orientata da N a S con dimensioni 20"×10".
MAC 2320+0935	gx	23h20m39s	+09°35.1'		Peg	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con MAC 2320+0934 situata 45" a SSE — molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35" — 450x.
MAC 2320+1859	gx	23h20m30s	+18°59.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva la MCG+3-59-39 dalla quale dista 1' a SSE; è tuttavia di forma indistinta ed estesa < 20" — 450x.
MAC 2320+1910	gx	23h20m41s	+19°10.6'		Peg	16"	m. ottima / ottimo	debolissima, di luminosità uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline molto deboli — 380x.
MAC 2320+4246	gx	23h20m58s	+42°46.3'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce che in visione distolta appare esteso almeno 45" in direzione E-W; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW — 450x.
MAC 2320+4302	gx	23h20m07s	+43°02.5'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina subito a S — 450x.
MAC 2321+0024	gx	23h21m08s	+00°24.5'		Psc	24"	buona / buono	appare come una stellina appena percettibile a una 30-ina di secondi NE di CGCG 380-38 (ossia poco meno della distanza che separa la gx principale dalla stellina brillante a SE); occorre tuttavia non scendere sotto i 450x.
MAC 2321+0810A	gx	23h21m06s	+08°10.4'		Psc	16"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø < 30" — 380x.
MAC 2322+1842	ss?	23h22m45s	+18°42.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	nella posizione riportata non si vede alcuna gx, ma soltanto una doppia stretta con componenti brillanti, seppure sbilanciate in luminosità, separate da una decina di secondi in direzione NE-SW; il tenue alone che si nota attorno a esse è quasi sicuramente dovuto a un effetto di diffusione — 450x.
MAC 2323+1437	gx	23h23m33s	+14°37.2'		Peg	24"	m. buona / mediocre	fa parte, assieme a svariate gx che seguono, dell'ammasso denominato **AGC 2593** — debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso E — 450x.
MAC 2323+1443	gx	23h23m58s	+14°43.8'		Peg	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 30" e tenue condensazione centrale — 450x.
MAC 2323+1448	gx	23h23m55s	+14°47.7'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso SE — 450x.
MAC 2323+1649	gx	23h23m43s	+16°49.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10".
MAC 2323+1736	gx	23h23m32s	+17°36.2'		Peg	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; è situata all'interno di un piccolo asterismo di 4 stelline brillanti che ne offuscano un po' la visione — 450x.
MAC 2323+1937	gx	23h23m47s	+19°37.2'		Peg	24"	m. buona / buono	debolissima, diffusa, e molto piccola, a tratti appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 2324+0949	gx	23h24m43s	+09°49.7'		Peg	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2324+1357B	gx	23h24m26s	+13°58.0'		Peg	16"	buona / ottimo	a 380x appare come un nodulo situato a ridosso S di NGC 7651.
MAC 2324+1434B	gx	23h24m37s	+14°35.0'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" (ossia poco più piccola di MAC 2324+1437A (osservata per prima) — 450x.
MAC 2324+1437A	gx	23h24m12s	+14°37.1'		Peg	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, diffusa e poco più brillante all'interno — 450x.
MAC 2324+1437B	gx	23h24m41s	+14°37.9'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debole, ma relativamente facile, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; ci sono due stelline a ridosso della gx: una a S e l'altra appena più distante verso E — 450x.
MAC 2324+1438A	gx	23h24m32s	+14°38.3'		Peg	24"	m. buona / mediocre	assieme a MAC 2324+1438B forma una coppia di gx distanti 1' in direzione E-W, di aspetto simile, diffuse e di luminosità uniforme; entrambe rotonde con Ø di 20"-25"; la 1ª delle due ha una stellina subito a SE; sono situate rispettivamente 3' e 4' a E di NGC 7649 — 450x.
MAC 2324+1438B	gx	23h24m37s	+14°38.6'		Peg	24"	m. buona / mediocre	v. **MAC 2324+1438A**
MAC 2324+1439B	gx	23h24m23s	+14°39.5'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2324+1440B	gx	23h24m38s	+14°40.1'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 2324+1440C	gx	23h24m40s	+14°40.0'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debolissima, si separa solo a momenti in visione distolta da MAC 2324+1440B.
MAC 2324+1442	gx	23h24m24s	+14°42.4'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2324+1443A	gx	23h24m11s	+14°43.7'		Peg	24"	m. buona / mediocre	molto debole e piccola, a 450x appare condensata, ma non sembra più estesa di 10" o 15".
MAC 2324+1443B	gx	23h24m17s	+14°43.2'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, forse rotonda con Ø non superiore a 15" — 450x.
MAC 2324+1450	gx	23h24m07s	+14°50.1'		Peg	24"	m. buona / mediocre	piccola e debolissima, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2324+1519	gx	23h24m55s	+15°19.3'		Peg	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 2324+1640	gx	23h24m09s	+16°40.2'		Peg	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, estesa 10"-15"; salta fuori in visione distolta a 450x quando si osserva la PGC 71340 dalla quale dista 1' a ENE.
MAC 2325+0001	gx	23h25m04s	+00°01.1'		Psc	24"	m. buona / buono	piccolo oggetto rotondo molto debole, con Ø di 10"-15" e condensazione centrale puntiforme visibile a tratti; c'è una stellina a una 30-ina di secondi verso E e un'altra appena percettibile alla stessa distanza verso NW — 450x.
MAC 2325+1445	gx	23h25m25s	+14°45.4'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NNE — 450x.
MAC 2325+1447	gx	23h25m17s	+14°47.3'		Peg	24"	m. buona / mediocre	debolissima, molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×10"; appare con difficoltà in visione distolta anche perché c'è una stellina brillante un paio di primi a NE che disturba; nonostante questo appare meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 2325+1512	gx	23h25m21s	+15°12.8'		Peg	24"	m. buona / discreto	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
MAC 2325+1514	gx	23h25m14s	+15°14.7'		Peg	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale stellare — 450x.
MAC 2326+0150	gx	23h26m27s	+01°50.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-15"; appare in visione distolta a 1' NW di una debole stellina, ma è disturbata da un'altra stellina brillante situata un paio di primi a SW.
MAC 2326+1459	gx	23h26m54s	+14°59.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" e con una stellina a ridosso verso SW.
MAC 2326+1503	gx	23h26m39s	+15°03.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	anche a 450x appare solo come una stellina sfocata molto debole situata a ~ 1' W di una stellina evidente — 8' WNW di UGC 12601.
MAC 2326+2542	gx	23h26m04s	+25°42.2'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, disturbata dalla SAO 91261 di magnitudo 8.5 situata un paio di primi a S; in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 580x.
MAC 2327+0841	gx	23h27m37s	+08°41.0'		Peg	24"	m. buona / discreto	in visione diretta si vede solo il nucleo stellare molto tenue, mentre in visione distolta appare anche un debolissimo alone orientato da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW e un'altra poco più distante a NW — 450x.
MAC 2327+0845	gx	23h27m43s	+08°45.5'		Peg	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 2327+1506	gx	23h27m50s	+15°07.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole e più diffusa di MAC 2327+1507 (osservata per prima), di luminosità pressoché uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina a 1.5 N; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 2327+1507	gx	23h27m31s	+15°07.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, estesa una 20-ina di secondi e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una debole stellina a 1.5' verso E — 450x.
MAC 2328+0932A	gx	23h28m43s	+09°32.5'		Peg	24"	m. buona / buono	debolissima, ma relativamente compatta, a 450x appare poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15".
MAC 2328+0936	gx	23h28m49s	+09°36.9'		Peg	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, solo a momenti leggermente condensata.
MAC 2328+0941	gx	23h28m51s	+09°41.4'		Peg	24"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 30"×20" — 450x.
MAC 2328+3221	gx	23h28m23s	+32°21.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e poco diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con tenue nucleo stellare visibile solo a momenti — 450x.
MAC 2329+0934	gx	23h29m26s	+09°34.1'		Peg	24"	m. buona / buono	elusiva e molto piccola, appare a tratti in visione distolta 1' a E di una stellina appena percettibile — 450x.
MAC 2329+0947	gx	23h29m24s	+09°47.1'		Peg	24"	m. buona / buono	è più evidente di CGCG 409-119, dalla quale dista un paio di primi verso N, relativamente compatta, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2330+1415	gx	23h30m30s	+14°15.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	è un debolissimo baffo che emerge con gran difficoltà verso E dall'alone di una stella brillante per una 30-ina di secondi; si stenta un po' a coglierla anche spingendo a 580x.
MAC 2331+0220	gx	23h31m49s	+02°20.3'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; equidistante con 2 stelline a SW con le quali forma un piccolo arco; una stellina più brillante si trova invece a 1.5' NW — 450x.
MAC 2332+0550	gx	23h32m27s	+05°51.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	v. **CGCG 407-3**
MAC 2332+0551	gx	23h32m36s	+05°52.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE; appare a momenti in visione distolta a 450x.

MAC 2332+2857	gx	23h32m11s	+28°57.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, diffusa; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' S — 450x.
MAC 2333+0425	gx	23h33m32s	+04°25.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø >20" — 450x.
MAC 2333+1236	gx	23h33m50s	+12°36.4'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale stellare appena percettibile — 450x.
MAC 2333+2608	gx	23h34m00s	+26°08.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 450x a 1' S di una stellina.
MAC 2334+0453	gx	23h34m54s	+04°53.3'		Psc	24"	m. buona / buono	piccolo oggetto rotondo di luminosità uniforme e Ø max di 20"; c'è una debole stellina subito a SE — 450x.
MAC 2334+0501	gx	23h34m26s	+05°01.6'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente facile, rotonda con Ø > 20" e tenue condensazione centrale — 450x.
MAC 2334+0508	gx	23h34m01s	+05°08.7'		Psc	24"	m. buona / buono	piccola e debole, rotonda con Ø < 20"; è disturbata da una coppia di stelle brillanti a S e SW con le quali forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele — 450x.
MAC 2334+1446	gx	23h34m14s	+14°46.2'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 2334+1450	gx	23h34m42s	+14°50.8'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 2334+2142	gx	23h34m51s	+21°42.6'		Peg	16"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto molto debole, forse rotondo, di 15"-20" di Ø situato 1' SW di una stellina — 380x.
MAC 2335+1643	gx	23h35m22s	+16°43.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima, appare in visione distolta tra 2 stelline, ma è di aspetto confuso; ad ogni modo non è più estesa di 15" — 450x.
MAC 2335+2110	gx	23h35m41s	+21°10.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; una stellina percettibile solo a momenti si trova subito a N — 450x.
MAC 2335+2257	gx	23h35m48s	+22°57.6'		Peg	16"	m. ottima / ottimo	è ancora più debole di MAC 2335+2257ª (osservata per prima), di luminosità uniforme, a tratti allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 380x.
MAC 2335+2257A	gx	23h35m55s	+22°57.1'		Peg	16"	m. ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e di 20"-25" di Ø, visibile con relativa facilità in visione distolta a 1' NNE di una stellina — 380x.
MAC 2335+2439	gx	23h35m09s	+24°39.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima macchiolina circolare estesa < 20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; c'è una stellina a 1' Ne.
MAC 2335+2608	gx	23h35m51s	+26°08.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2335+2644	gx	23h35m16s	+26°44.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, relativamente compatta, grosso modo circolare con Ø di una 15-ina di secondi e con nucleo puntiforme; c'è una stellina subito a W e una brillante a 1' verso ESE — 450x.
MAC 2336+2059	gx	23h36m12s	+20°59.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a N — 450x.
MAC 2336+2104	gx	23h36m19s	+21°04.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente un paio di primi a S della coppia MAC 2336+2105A/B e a 1.5' NNE di una stellina molto debole; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 10" o 15" (fa parte dell'ammasso AGC 2626) — 450x.
MAC 2336+2105A	gx	23h36m19s	+21°06.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso SE; in visione distolta appaiono debolissime e di aspetto simile, forse rotonde con Ø < 20" (fanno parte dell'ammasso AGC 2626) — 450x.
MAC 2336+2105B	gx	23h36m20s	+21°05.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 2336+2105A**
MAC 2336+2106	gx	23h36m40s	+21°06.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a SE (fa parte dell'ammasso AGC 2626) — 450x.
MAC 2336+2114	gx	23h36m57s	+21°14.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
MAC 2337+2626	gx	23h37m46s	+26°26.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	è un piccolo e debolissimo baffo di luminosità uniforme che in visione distolta appare solo a momenti orientato da N a S ed esteso una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2337+2657	gx	23h37m09s	+26°58.0'		Peg	24"	buona / ottimo	piccola, debolissima, ma relativamente compatta, forzando a 580x appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10".
MAC 2337+2658	gx	23h37m47s	+26°58.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco disturbata da una stellina brillante situata 1' scarso a S; approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2337+3138	gx	23h37m32s	+31°38.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di ~ 20" e un nucleo stellare appena percettibile; situata a ridosso W di un piccolo asterismo di 4 stelline foggiato a "Y" — 450x.
MAC 2338+0425	gx	23h38m50s	+04°25.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole e relativamente compatta, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SE — 450x.
MAC 2338+2629	gx	23h38m12s	+26°29.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 20"×15" e con condensazione stellare evidente — 450x.
MAC 2338+2651	gx	23h38m44s	+26°51.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 2338+2655	gx	23h38m17s	+26°55.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, situata a ridosso S di una stellina, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2338+2700	gx	23h38m51s	+27°01.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima chiazza forse circolare con Ø di una 15-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 2338+2701A	gx	23h38m36s	+27°01.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso W — 450x.
MAC 2338+2702A	gx	23h38m21s	+27°03.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e condensata, forse rotonda con Ø di una decina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline appena percettibili a S (quella più meridionale, da un controllo successivamente effettuato è risultata essere la PGC 85561) — 450x.
MAC 2338+2702B	gx	23h38m33s	+27°02.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una decina di secondi e con condensazione stellare appena percettibile; situata a ridosso NE di una stellina molto debole — 450x.
MAC 2338+2704	gx	23h38m39s	+27°04.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a ~ 1' W di una debole stellina; non sembra più estesa di 10"-15" — 450x.
MAC 2338+2705	gx	23h38m27s	+27°05.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 2338+2707	gx	23h38m49s	+27°07.4'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme e dimensioni max di 10" — 450x.
MAC 2339+2650	gx	23h39m18s	+26°50.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, estesa sì e no 10"; appare in visione distolta a 450x subito a N di una stellina.
MAC 2339+2706	gx	23h39m03s	+27°06.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, disturbata da una stellina brillante a ridosso S; in visione distolta appare rotonda con Ø < 20" (fa parte del gruppo di CGCG 476-96) — 450x.
MAC 2339+2713	gx	23h39m02s	+27°13.4'		Peg	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva macchiolina rotonda che appare solo a momenti in visione distolta a 1' SW di una stellina (fa parte del gruppo di CGCG 476-96) — 380x.
MAC 2339+2732	gx	23h39m13s	+27°32.9'		Peg	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 2340+0613	gx	23h40m01s	+06°13.6'		Psc	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2340+2649B	gx	23h40m50s	+26°49.8'		Peg	16"	m. buona / ottimo	anche a 380x appare soltanto come una stellina appena sfocata a 1' scarso E di UGC 12193.
MAC 2340+2740	gx	23h40m45s	+27°40.3'		Peg	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, un po' disturbata da una stellina brillante situata a poco più di 1' N; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso NW e un'altra più brillante a 1' scarso verso W — 450x.
MAC 2340+4315	gx	23h40m32s	+43°15.2'		And	24"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce orientato da NNE a SSW ed esteso una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 2341+0312	gx	23h41m49s	+03°12.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme; anche in visione diretta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 2341+1505	gx	23h41m37s	+15°05.1'		Peg	24"	discreta / buono	è poco più evidente di PGC 72146, dalla quale dista 4' a NW, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 2341+2322	gx	23h41m21s	+20°22.5'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole poco diffusa e di luminosità uniforme, di forma un po' irregolare, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; un tenue nucleo stellare visibile a momenti sembra decentrato verso E; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S e una poco più brillante subito a SW — 450x.
MAC 2341+2325	gx	23h41m11s	+20°25.2'		Peg	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a SW; non riesco a capirne la forma, ma non sembra più estesa di 20"-25" — 450x.
MAC 2341+2706	gx	23h41m53s	+27°06.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina debolmente sfuocata e appena percettibile al bordo meridionale di MAC 2341+2707.
MAC 2341+2707	gx	23h41m52s	+27°07.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	è debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x quasi a ridosso S di una stellina, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile al bordo S (in realtà, da un controllo effettuato successivamente questa è risultata essere la MAC 2341-2706).
MAC 2342+2707	gx	23h42m41s	+27°07.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, salta fuori in visione distolta a 450x, allungata da E a W con dimensioni 20"×10".
MAC 2343+0433	gx	23h43m18s	+04°33.3'		Psc	24"	buona / ottimo	assieme a PGC 3098572 è una delle 2 galassiette situate a ridosso di CGCG 407-46 osservata in altra data e in condizioni di visibilità simili — appaiono elusivamente a 450x, appena meglio a 570x: la MAC è difficilissima e non sembra altro che una stellina sfocata al bordo NE della gx principale, anche se si "stacca" solo a momenti; la PGC è appena più evidente e poco più distante, estesa 10"-15" ed è situata subito a E — 450x.
MAC 2343+0538	gx	23h44m00s	+05°38.4'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 2343+0859	gx	23h43m42s	+08°59.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima chiazza probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2343+0916	gx	23h43m58s	+09°16.4'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto piccola, rotonda con Ø < 15" — 450x.
MAC 2343+0920	gx	23h43m37s	+09°20.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente a 450x (a 340x perde contrasto), molto piccola, forse rotonda con Ø non superiore a 15".
MAC 2343+2730	gx	23h43m46s	+27°30.7'		Peg	16"	m. ottima / ottimo	debolissima, rotonda e di luminosità uniforme; appare in visione distolta con un Ø di una 20-ina di secondi, ma il campo è molto povero a 380x.
MAC 2343+2730	gx	23h43m46s	+27°30.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2344+0005	gx	23h44m22s	+00°05.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2344+0902A	gx	23h44m16s	+09°02.9'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, rotonda, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue condensazione centrale — 450x.
MAC 2344+0903	gx	23h44m23s	+09°03.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 2344+0907A	gx	23h44m31s	+09°07.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto molto piccolo, diffuso e di luminosità uniforme, probabilmente rotondo con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 2344+0907B	gx	23h44m56s	+09°07.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, diffusa, di luminosità uniforme e dimensioni < 15" — 450x.
MAC 2344+0909B	gx	23h44m27s	+09°09.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola e relativamente facile da osservare a 450x, rotonda, poco diffusa e con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 2344+0912B	gx	23h44m57s	+09°12.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2344+0913	gx	23h44m44s	+09°12.9'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2344+0915	gx	23h44m46s	+09°15.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, debolissima e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2344+1241	gx	23h44m32s	+12°41.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	v. **CGCG 432-25**
MAC 2345+0543	gx	23h45m13s	+05°43.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare solo a momenti orientata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 2345+0902	gx	23h45m02s	+09°02.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente solo a momenti in visione distolta, molto piccola con dimensioni di 10" o 15" — 450x.
MAC 2345+0903A	gx	23h45m07s	+09°03.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15", con piccola e tenue condensazione centrale — 450x.
MAC 2345+0903B	gx	23h45m51s	+09°03.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, poco allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale stellare — 450x.
MAC 2345+0910	gx	23h45m02s	+09°10.4'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso S — 450x.
MAC 2345+0911	gx	23h45m00s	+09°11.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2345+0912B	gx	23h45m31s	+09°12.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2345+0914	gx	23h45m40s	+09°14.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, è di luminosità uniforme e di Ø < 20".
MAC 2345+0916B	gx	23h45m17s	+09°16.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 2346+0900	gx	23h46m02s	+09°01.0'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2346+0922	gx	23h46m06s	+09°22.4'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, è osservabile in visione distolta a 450x, molto piccola, forse rotonda con Ø max di 30".
MAC 2348+0811	gx	23h48m53s	+08°11.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; purtroppo disturbata da una stellina brillante a 1' SE — 450x.
MAC 2349+0609	gx	23h49m03s	+06°09.8'		Psc	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, salta fuori a momenti in visione distolta, non più estesa di 15" — 450x.
MAC 2349+0612	gx	23h49m12s	+06°13.0'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 2349+3107	gx	23h49m59s	+31°07.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
MAC 2350+0207	gx	23h50m14s	+02°07.9'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima, molto piccola e con condensazione centrale visibile a tratti a 450x; salta fuori abbastanza facilmente fissando la stellina situata a 1' verso S — 450x.
MAC 2350+0606	gx	23h50m17s	+06°06.4'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, relativamente compatta e leggermente condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 340x.
MAC 2350+0610	gx	23h50m13s	+06°10.9'		Psc	24"	m. buona / buono	poco più evidente di MAC 2350+0606, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MAC 2350+2434A	gx	23h50m39s	+24°34.5'		Peg	24"	buona / buono	è molto debole, ma appare facilmente in visione distolta quando si osserva UGC 12804, dalla quale dista poco più di 1' verso NNE; molto piccola, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2350+8048	gx	23h50m58s	+80°48.9'		Cep	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 2351+0602	gx	23h51m42s	+06°02.3'		Psc	24"	m. buona / buono	è più facile di CGCG 407-66 situata 1' più a E, rotonda con Ø anch'essa di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare; a ingrandimenti inferiori pare una debole stellina sfocata — 450x.
MAC 2351+2437	gx	23h51m29s	+24°37.6'		Peg	24"	buona / buono	debolissima, con nucleo stellare ed estesa non più di 10"-15" — 450x; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso NE; in visione diretta sembra in effetti di vedere una semplice coppia di stelline.
MAC 2352+0716	gx	23h52m34s	+07°16.4'		Psc	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, forse rotonda con Ø < 30".
MAC 2352+1128	gx	23h52m12s	+11°28.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	appare come un nodulo, o una stellina debolmente sfuocata verso il bordo orientale di NGC 7774; questa compagna dà effettivamente l'impressione che la gx principale sia allungata da E a W, mentre invece dovrebbe essere circolare — 380x.
MAC 2352+2005	gx	23h52m20s	+20°05.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" e di luminosità uniforme; c'è una doppia dalle componenti brillanti a 1' W che interferisce un po' con l'osservazione — 450x.
MAC 2352+2845	gx	23h52m51s	+28°45.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente — 450x.
MAC 2353+2818	gx	23h53m17s	+28°18.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme; non dovrebbe essere più estesa di 10"; appare in visione distolta a 1' SW di una coppia di stelline — 450x.
MAC 2353+2820	gx	23h53m22s	+28°20.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	poco più evidente e più estesa della precedente, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 12"-15"; appare facilmente in visione distolta ~ 40" a S di una stellina — 450x.
MAC 2353+2826	gx	23h53m56s	+28°26.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×15"; è disturbata da una stella brillante di 10a grandezza situata quasi a ridosso verso E — 450x.
MAC 2353+2826A	gx	23h53m10s	+28°26.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 2353+2915	gx	23h53m22s	+29°15.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
MAC 2353+2920	gx	23h53m36s	+29°20.00'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 450x.
MAC 2354+0734	gx	23h54m04s	+07°34.2'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10".
MAC 2354+2825	gx	23h54m17s	+28°25.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 2354+2827	gx	23h54m09s	+28°27.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso E — 450x.
MAC 2354+3426	gx	23h54m46s	+34°26.2'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una stellina brillante situata subito a S disturba un po' l'osservazione — 495x.
MAC 2355+3153	gx	23h55m27s	+31°53.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta subito a NE di una debole stellina, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2357+2930	gx	23h57m50s	+29°30.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o poco più; forma un triangolo equilatero con 2 stelline brillanti, a S e a ESE — 450x.
MAC 2357+3245	gx	23h57m33s	+32°45.5'		And	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 2358+2709	gx	23h58m39s	+27°09.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 2358+3343	gx	23h58m10s	+33°43.3'		And	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, condensata, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
MAC 2359+2601	gx	23h59m11s	+26°01.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta subito a NW di una stellina appena percettibile, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2359+2817	gx	23h59m59s	+28°17.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 2359+4650	gx	23h59m41s	+46°50.6'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0000-0137	gx	00h00m22s	−01°37.8'		Psc	24"	buona / buono	piccola e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" e nucleo stellare; c'è una stellina molto debole a una 40-ina di secondi SW — 450x.
MAC 0001-0425	gx	00h01m19s	−04°25.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0001-2733	gx	00h01m38s	−27°33.9'		Scl	24"	ottima / mediocre	molto piccola e debole, situata subito a NE della successiva, estesa non più di 10"-12" — 340x.
MAC 0001-2734	gx	00h01m36s	−27°34.6'		Scl	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30" — 340x.
MAC 0001-2736	gx	00h01m14s	−27°36.3'		Scl	24"	ottima / mediocre	debolissima e molto spampanata, appare elusivamente in visione distolta a 1' SW di una stellina brillante — 340x.
MAC 0004-0140	gx	00h04m46s	−01°40.2'		Psc	24"	m. buona / buono	piccolo oggetto forse rotondo con Ø di una 15-ina di secondi e a tratti condensato — 450x.
MAC 0004-0141	gx	00h04m57s	−01°41.1'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10"; si trova in mezzo a 2 stelline: una a 1' NNE e l'altra appena percettibile alla stessa distanza SSW — 450x.
MAC 0004-0802A	gx	00h04m37s	−08°02.2'		Cet	16"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa, di luminosità pressoché uniforme e Ø max di 30"; si vede abbastanza facilmente a 380x.
MAC 0007-0347	gx	00h07m13s	−03°47.6'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MAC 0009-0127	gx	00h09m56s	−01°28.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima, a tratti molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×10", ma occorre non scendere sotto i 450x.
MAC 0010-2550A	gx	00h10m43s	−25°05.8'		Scl	24"	ottima / buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15".
MAC 0010-2550B	gx	00h10m48s	−25°05.5'		Scl	24"	ottima / buono	appare elusivamente a ~ 1" E della precedente; è molto piccola, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0012-0646	gx	00h12m59s	−06°46.4'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissima, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø di una 20-ina di secondi — 380x.
MAC 0012-2709	gx	00h12m10s	−27°09.6'		Scl	24"	ottima / mediocre	molto piccola e debole, rotonda con Ø < 20"; in visione distolta appare prima di ESO 472-18 dalla quale dista un paio di primi a NNW — 340x.
MAC 0013-0435	gx	00h13m22s	−04°35.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, ma tuttavia appare abbastanza facilmente in visione distolta subito a S di una stellina appena percettibile, forse rotonda con Ø non superiore a 15" — 450x.
MAC 0014-0421	gx	00h14m02s	−04°21.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza osservabile in visione distolta a 450x, diffusa, forse rotonda con Ø < 20".
MAC 0014-0711	gx	00h14m52s	−07°11.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0014-2307	gx	00h14m11s	−23°07.5'		Cet	24"	ottima / buono	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 0014-2320	gx	00h14m14s	−23°20.8'		Cet	24"	ottima / buono	altra debolissima galassietta, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" e di luminosità uniforme; poco meglio evidente scalando a 340x.
MAC 0017-0308	gx	00h17m13s	−03°08.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0017-0312	gx	00h17m39s	−03°12.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, a tratti condensata, estesa non più di 15" o 20" — 450x.
MAC 0018-0310	gx	00h18m21s	−03°10.2'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0019-0408	gx	00h19m16s	−04°08.8'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e con condensazione centrale stellare, approssim. rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0020-0405	gx	00h20m23s	−04°05.4'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 0020-0425	gx	00h20m10s	−04°25.0'		Psc	16"	ottima / buono	debolissimo oggetto rotondo, piccolo, di luminosità uniforme e con Ø di 20"-25"; si trova al vertice più acuto di un triangolo isoscele formato con 2 stelle: una abbastanza brillante a 2.5' W e l'altra più debole grosso modo alla stessa distanza verso SW — 380x.
MAC 0020-1317	gx	00h20m37s	−13°17.3'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; solo a momenti appare leggermente condensata — 450x.
MAC 0023-0351	gx	00h23m48s	−03°51.3'		Psc	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; forma un piccolo triangolo rettangolo con una coppia di stelline brillanti a SW — 450x.
MAC 0025-0227	gx	00h25m52s	−02°27.5'		Psc	24"	buona / ottimo	debolissima, è visibile in visione distolta a ~ 1' S di una stellina appena percettibile, ma solo a tratti appare orientata da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi; meglio comunque scalare a 340x.
MAC 0030-0237	gx	00h30m39s	−02°37.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E e una stella brillante a 2.5' ESE — 450x.
MAC 0031-0239	gx	00h31m05s	−02°39.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0032-0819	gx	00h32m59s	−08°19.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare solo in visione distolta a 450x.
MAC 0033-0206	gx	00h33m58s	−02°06.8'		Cet	24"	buona / buono	debolissima e molto piccola, compatta e condensata, a tratti allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0034-0215	gx	00h34m14s	−02°15.8'		Cet	24"	buona / buono	anche questa è debolissima, ma appare un po' prima di MAC 0034-0216ª (che si trova ~ 3' più a W), estesa non più di 10"-15" — 450x.
MAC 0034-0216A	gx	00h34m03s	−02°16.5'		Cet	24"	buona / buono	altra galassietta debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta una 40-ina di secondi a W di una stellina — 450x.
MAC 0034-0250	gx	00h34m59s	−02°50.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un condensazione centrale evidente — 450x.
MAC 0034-0252	gx	00h34m49s	−02°52.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
MAC 0034-0729	gx	00h34m28s	−07°29.2'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole e piccola, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0036-0107	gx	00h36m54s	−01°07.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima, ma nondimeno appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, di luminosità uniforme, forse rotonda e con Ø simile a quello di PGC 2213 dalla quale dista 3' scarsi verso NW.
MAC 0037-1358	gx	00h37m27s	−13°58.7'		Cet	24"	m. buona / mediocre	appare elusivamente a ridosso NW di una debole stellina; non sembra più estesa di 20" — 450x.
MAC 0038-1351	gx	00h38m50s	−13°51.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" e tenue condensazione centrale stellare visibile solo a momenti; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S — 450x.
MAC 0038-1757	gx	00h38m22s	−17°57.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0039-1410	gx	00h39m40s	−14°10.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0041-0915	gx	00h41m30s	−09°15.8'		Cet	24"	buona / ottimo	relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una coppia di stelline a poco più di 1' verso SW — 400x.
MAC 0041-0925	gx	00h41m50s	−09°25.8'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima e appena più evidente di MCG-2-2-84, dalla quale dista un paio di primi ENE, rotonda con Ø max di 20" — 400x.
MAC 0041-1044	gx	00h41m36s	−10°44.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0041-1358	gx	00h41m01s	−13°58.2'		Cet	24"	buona / ottimo	piccola e relativamente facile, a tratti condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 400x.
MAC 0042-1112	gx	00h42m39s	−11°13.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, a 450x appare poco più che una stellina sfuocata, 2' scarsi a W di una stella.
MAC 0043-1107	gx	00h43m08s	−11°07.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
MAC 0043-1115	gx	00h43m24s	−11°15.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0043-2215	gx	00h43m00s	−22°15.7'		Cet	24"	m. buona / scarso	appare solo a momenti come un'evanescente stellina subito a SW di IC 1574 — 340x.
MAC 0044-0402	gx	00h44m05s	−04°02.6'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e piuttosto disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso S; è allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MAC 0045-1224	gx	00h45m17s	−12°24.6'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 0048-0131	gx	00h48m03s	−01°31.2'		Cet	24"	buona / buono	piccola, debole e relativamente compatta, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare percettibile solo a momenti — 450x.
MAC 0050-0142	gx	00h50m07s	−01°42.2'		Cet	24"	m. buona / buono	debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi ed evidente condensazione centrale — 450x.
MAC 0053-0048	gx	00h53m13s	−00°48.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0054-0437	gx	00h54m53s	−04°37.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e a tratti condensata, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0055-0118B	gx	00h55m41s	−01°18.7'		Cet	24"	buona / buono	situata esattamente a metà strada tra CGCG 384-28 e CGCG 384-32 e facente parte dell'ammasso **AGC 119** — debole, ma relativamente compatta e facile da vedere a 450x, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme.
MAC 0055-0718	gx	00h55m51s	−07°18.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; disturbata dalla SAO 129032 di 6ª grandezza situata ad appena 3' SW — 12' a E di NGC 298.
MAC 0055-0722	gx	00h55m28s	−07°22.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 15"; forma un triangolo isoscele molto schiacciato con 2 stelline: una a meno di 1' WSW e l'altra a poco più di 1' verso SW; non sembra particolarmente disturbata dalla SAO 129032 di 6ª grandezza a soli 4' Ne.
MAC 0055-1032	gx	00h55m20s	−10°32.4'		Cet	24"	buona / ottimo	piccola e debolissima, salta fuori abbastanza abbastanza facilmente in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0056-0049	gx	00h56m03s	−00°49.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e con condensazione centrale appena percettibile, un visione distolta appare chiaramente allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ~ 1' verso W — 450x.
MAC 0056-1045	gx	00h56m37s	−10°45.3'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stella brillante a 1' verso S — 450x.
MAC 0057-0024	gx	00h57m45s	−00°24.7'		Cet	24"	buona / discreto	forma una coppia serrata con UGC 599; si separano facilmente a 450x; la MAC è debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; UGC è invece relativamente facile, rotonda con Ø di, poco diffusa, con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza contrastato; .
MAC 0057-0028	gx	00h57m28s	−00°28.3'		Cet	24"	buona / discreto	relativamente facile, poco diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare evidente.
MAC 0057-0031	gx	00h57m26s	−00°31.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto piccola e con nucleo stellare evidente (in visione diretta sembra di fatto una stellina); è circondata da un alone circolare non più esteso di 10" o 20"; allineata ed equidistante con due deboli stelline a NW — 450x.
MAC 0057-0034	gx	00h57m46s	−00°34.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-15"; c'è una stellina quasi a ridosso N — 450x.
MAC 0057-0035	gx	00h57m40s	−00°35.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 450x.
MAC 0057-0049	gx	00h57m00s	−00°49.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0057-0957	gx	00h57m10s	−09°58.0'	q 262	Cet	16"	ottima / buono	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, a 380x, a ~ 1' ENE di una stellina (è situata 7.5' a SE di NGC 309 ed è riportata sull'Uranometria come **309A**).
MAC 0057-1512	gx	00h57m44s	−15°12.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e con bulge quasi stellare abbastanza evidente, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0058-0017A	gx	00h58m00s	−00°17.5'		Cet	24"	buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di di con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0058-0149	gx	00h58m25s	−01°49.6'		Cet	24"	m. buona / buono	è debolissima, ma appare senza problemi in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 0058-0202A	gx	00h58m02s	−02°02.3'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, leggermente condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×15".
MAC 0058-0202B	gx	00h58m59s	−02°02.6'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori a tratti in visione distolta a 450x, estesa non più di 15" o 20" — 450x.
MAC 0058-1517	gx	00h58m30s	−15°17.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso SW — 450x.
MAC 0058-1616	gx	00h58m11s	−16°16.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 450x a poco più di 3' N di una doppia stretta; forse rotonda con Ø < 20".
MAC 0058-1621	gx	00h58m41s	−16°21.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta quando si osserva la stellina situata 3' verso E — 450x.
MAC 0058-1623	gx	00h58m29s	−16°23.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	anche questa tutto sommato appare facilmente a 450x, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme.
MAC 0059-0153	gx	00h59m10s	−01°53.9'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, ma relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi SE — 450x.
MAC 0059-1042	gx	01h59m58s	−10°42.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza osservabile in visione distolta; non ne capisco la forma, ma dovrebbe essere estesa una 30-ina di secondi; meglio evidente scalando a 340x; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso E.
MAC 0059-1054	gx	00h59m30s	−10°54.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, debole, ma facile da vedere a 450x, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e appena più brillante verso l'interno *(presenza di debole chiarore lunare)*.
MAC 0059-1353C	gx	00h59m38s	−13°53.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stella brillante a 1.5' verso NW(presenza di debole chiarore lunare) — 450x.
MAC 0100-0148	gx	01h00m22s	−01°48.5'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima, piccola e poco diffusa, forse rotonda con Ø < 20"; è osservabile in visione distolta a 450x.
MAC 0100-1511	gx	01h00m36s	−15°11.9'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 0101-0643	gx	01h01m42s	−06°42.9'		Cet	16"	ottima / buono	fa parte assieme a MAC 0101-0648 del gruppo di NGC 345 — è di dimensioni simili a NGC 347, dalla quale dista 2' verso NE, ma ancora più debole; si osserva in visione distolta a 380x.
MAC 0101-0648	gx	01h01m29s	−06°48.6'		Cet	16"	ottima / buono	molto debole e parecchio disturbata dalla SAO 129088 di 7ª grandezza dalla quale dista appena 1.5' a SW; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 380x.
MAC 0101-1515	gx	01h01m09s	−15°15.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
MAC 0102-0135	gx	01h02m57s	−01°35.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, estesa sì e no una decina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 450x subito a NW di una debole stellina.
MAC 0102-0613	gx	01h02m18s	−06°13.6'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, relativamente compatta ed estesa 10"-15" — 450x.
MAC 0102-0626	gx	01h02m52s	−06°26.4'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0103-0132	gx	01h03m16s	−01°32.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; appare facilmente anche in visione diretta a 450x.
MAC 0103-0330	gx	01h03m12s	−03°30.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x subito a E di una debole stellina; è rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 0103-0334	gx	01h03m28s	−03°34.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0104-0057	gx	01h04m41s	−00°57.4'		Cet	24"	buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' scarso; si apprezza meglio scalando a 340x.
MAC 0104-0058	gx	01h04m07s	−00°58.2'		Cet	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso E o SE — 450x.
MAC 0104-0528	gx	01h04m22s	−05°28.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a N — 450x.
MAC 0105-0649	gx	01h05m23s	−06°49.1'		Cet	16"	ottima / buono	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e di ~ 30" di Ø; appare senza problemi in visione distolta a 2.5' N di una stellina — 380x.
MAC 0105-1148	gx	01h05m23s	−11°48.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 1' E di una stellina abbastanza brillante, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0105-1742	gx	01h05m25s	−17°42.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a SE(presenza di debole chiarore lunare) — 450x.
MAC 0106-0008	gx	01h06m33s	−00°08.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta a 1' S di una stellina brillante, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; una debole stellina si trova a 1' SW — 450x.
MAC 0106-0609A	gx	01h06m01s	−06°09.5'		Cet	24"	buona / scarso	debolissima e di forma indistinta, appare in visione distolta a 1' NE di una debole stellina; non sembra più estesa di 20"-25" — 340x.
MAC 0106-0612	gx	01h06m02s	−06°12.6'		Cet	24"	buona / scarso	piccola, molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.

MAC 0108-1526B	gx	01h08m48s	−15°26.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccolo e debolissima galassietta forse rotonda con Ø < 20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x un paio di primi a S di IC 80 (presenza di debole chiarore lunare).
MAC 0110-1357	gx	01h10m51s	−13°57.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0111-0318	gx	01h11m19s	−03°18.7'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 0111-0549	gx	01h11m43s	−05°49.0'		Cet	24”	ottima / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è situata a ridosso S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 0111-1402	gx	01h11m28s	−17°21.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, a tratti condensata, orientata nello stesso modo di MCG-2-4-11 dalla quale dista poco più di 1' a W — 450x.
MAC 0111-1721	gx	01h11m35s	−17°21.3'		Cet	24"	buona / scarso	debolissima, appare solo in visione distolta un paio di primi scarsi a ENE della precedente, ma non riesco a capirne la forma; non sembra comunque più estesa di 20" o 30" — 340x.
MAC 0111-1721A	gx	01h11m28s	−17°21.9'		Cet	24"	buona / scarso	molto diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 340x.
MAC 0112-1720	gx	01h12m42s	−17°20.6'		Cet	24"	buona / scarso	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni ~ 20"×10" — 340x.
MAC 0114-0029	gx	01h14m34s	−00°29.1'		Cet	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, appare con relativa facilità in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a poco più di 1' verso N
MAC 0114-0029A	gx	01h14m50s	−00°29.7'		Cet	24"	m. buona / buono	è una tenuissima protrusione orientale di UGC 793 notata, seppure a momenti, dapprima a 450x e poi confermata a 570x.
MAC 0114-1425	gx	01h14m25s	−14°25.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	assieme a MAC 0114-1430 e MAC 0114-1433 forma un terzetto di piccole galassiette allineate in direzione NNE-SSW e di aspetto simile; diffuse, di luminosità uniforme, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi; la 1ª, quella più a N, è la più difficile, forse perché situata a ridosso N di una stellina che tende a mascherarne un po' la forma; la 3ª è invece la più evidente — 450x.
MAC 0114-1430	gx	01h14m19s	−14°30.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 0114-1425**
MAC 0114-1433	gx	01h14m15s	−14°33.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 0114-1425**
MAC 0115-1431	gx	01h15m43s	−14°31.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 40" — 450x.
MAC 0115-1554	gx	01h15m51s	−15°54.3'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola, diffusa ed estesa 10" o 15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 0116-1550	gx	01h16m14s	−15°50.4'		Cet	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, compatta e condensata, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0116-1555	gx	01h16m30s	−15°55.1'		Cet	24"	buona / ottimo	anche questa molto piccola e debolissima, relativamente compatta, probabilmente rotonda con Ø 10"-15".
MAC 0116-1559	gx	01h16m23s	−15°59.6'		Cet	24"	buona / ottimo	pure molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0118-0104	gx	01h18m13s	−01°04.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, molto piccola e condensata, forse rotonda con Ø di 10" o 15" — 450x.
MAC 0119-0006	gx	01h19m17s	−00°06.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, relativamente compatta e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0119-0108	gx	01h19m13s	−01°08.7'		Cet	24"	buona / discreto	più facile di UGC 837, dalla quale dista 11' a ENE, pur restando una gx molto debole; è di luminosità uniforme, di dimensioni analoghe ma orientata da E a W — 450x.
MAC 0120-0004	gx	01h20m23s	−00°04.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a SW — 450x.
MAC 0120-1353	gx	01h20m21s	−13°53.4'		Cet	24"	buona / buono	molto debole e assai disturbata dalla SAO 147750 di magnitudo 6.7 situata 5' a E; è relativamente compatta, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10" 450x.
MAC 0121-0234	gx	01h21m57s	−02°34.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è la più facile di un terzetto situato 3' a SW di PGC 4994, cui appartengono MAC 0122-0236 e PGC 144075 — appare facilmente in visione distolta a 450x, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 0121-0335	gx	01h21m37s	−03°35.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, appare a tratti in visione distolta 1' a N di una stellina appena percettibile; non è più estesa di 30", ma occorre comunque scalare a 340x.
MAC 0121-1345	gx	01h21m22s	−13°45.8'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, ma relativamente compatta e a tratti condensata, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0122-0236	gx	01h22m06s	−02°36.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è la più difficile di un terzetto situato 3' a SW di PGC 4994, cui appartengono MAC 0121-0234 e PGC 144075 — debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, ma non sembra più estesa di 10" o 12".
MAC 0123-0031	gx	01h23m29s	−00°32.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30; c'è una stellina brillante a 1' SW che disturba un po' l'osservazione — 450x.
MAC 0123-0137	gx	01h23m54s	−01°37.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare in visione distolta a 1' NNW di CGCG 385-99, molto piccola e debole (a 340x è come una stellina appena sfuocata) — 450x.
MAC 0123-0711	gx	01h23m33s	−07°11.4'		Cet	24"	buona / buono	è più elusiva di MCG-1-4-34, dalla quale dista 4' a SE, appare in visione distolta quando si osserva quest'ultima; forse rotonda con Ø poco inferiore — 450x.
MAC 0124-0138	gx	01h24m02s	−01°39.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso W — 450x.
MAC 0125-0111	gx	01h25m24s	−01°11.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	di aspetto simile a MAC 0125-0122ª (osservata per prima), diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0125-0122A	gx	01h25m24s	−01°22.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0125-0352	gx	01h25m31s	−03°52.4'		Cet	24"	buona / buono	piccola, debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a SE — 450x.
MAC 0125-1321	gx	01h25m58s	−13°21.7'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissimo oggetto molto piccolo che tuttavia appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; non sembra più esteso di 10" o 15".
MAC 0126-0333	gx	01h26m08s	−03°33.1'		Cet	24"	buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0126-1321	gx	01h26m29s	−13°22.0'		Cet	24"	m. buona / buono	appare elusivamente in una piccola plaga virtualmente depleta a un paio di primi SSW di una stellina appena percettibile — 450x.
MAC 0127-0107	gx	01h27m06s	−01°07.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0127-0115A	gx	01h27m24s	−01°15.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare a tratti in visione distolta, estesa non più di 15" o 20" — 450x.
MAC 0128-0004	gx	01h28m37s	−00°04.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, di aspetto quasi stellare a 340x, molto difficile da scovare a 450x in quanto situata in una piccola zona di cielo depleta.
MAC 0128-1341	gx	01h28m10s	−13°41.7'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, molto piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; stranamente meglio visibile scalando a 340x.
MAC 0130-0206	gx	01h30m02s	−02°06.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MAC 0130-1200	gx	01h30m21s	−12°00.6'		Cet	24"	buona / buono	debolissima e in parte disturbata da una stellina brillante situata a < 1' verso NW; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15", ma occorre restare a 450x (a 340x sembra più confusa).
MAC 0130-1629	gx	01h30m55s	−16°29.9'		Cet	24"	buona / buono	debolissima lama di luce estesa per una 40-ina di secondi e orientata da N a S; appare con relativa facilità in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0133-0946	gx	01h33m07s	−09°47.0'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0134-0107	gx	01h34m13s	−01°07.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e tenue condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 0136-0123	gx	01h36m38s	−01°23.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare in visione distolta come un'appendice a ridosso SW di UGC 1151, debolissima e molto piccola — 450x.
MAC 0136-0500	gx	01h36m56s	−05°00.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare facilmente in visione distolta a 450x quando si fissa la MCG-1-5-9, dalla quale dista 1' scarso a NW; è molto piccola, compatta e condensata, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10".
MAC 0136-1404	gx	01h36m34s	−14°05.0'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0137-0851	gx	01h37m42s	−08°51.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma facilmente osservabile in visione distolta a 1' SE di una stellina; piccola con dimensioni max di 20".
MAC 0137-0855	gx	01h37m25s	−08°55.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, osservabile in visione distolta a 400x ed estesa meno di 20".
MAC 0137-0858	gx	01h37m50s	−08°58.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	assieme a MAC 0137-0900 e MAC 0137-0903 forma un terzetto di galassiette molto deboli poste a triangolo rettangolo e angolarmente vicine; saltano fuori facilmente in visione distolta a 400x — la 1ª, quella più a N, è maggiormente diffusa e a tratti appare allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15"; la 2ª è estesa una 20-ina di secondi e presenta un'evidente nucleo stellare; la 3ª è di dimensioni simili e appare a tratti leggermente condensata.
MAC 0137-0900	gx	01h38m00s	−09°00.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 0137-0858**
MAC 0137-0903	gx	01h37m50s	−09°03.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 0137-0858**
MAC 0138-0500	gx	01h38m07s	−05°00.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0139-0504	gx	01h39m51s	−05°04.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta; a 450x, in visione distolta, appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 20"×10".
MAC 0140-0502	gx	01h40m29s	−05°02.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente orientata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
MAC 0140-0506	gx	01h40m07s	−05°06.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente in visione distolta a 1.5' SW di una coppia larga di deboli stelline; non sembra più estesa di 10" o 15" — 450x.
MAC 0141-0415	gx	01h41m58s	−04°15.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	appare elusivamente ~ 1' a S di una stellina brillante; non riesco a capirne la forma, ma non sembra più estesa di 15” o 20” — 450x.
MAC 0142-0208	gx	01h42m17s	−02°08.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di debolissima "coda" o "aggetto" che si estende per una 15-ina di secondi a SW di CGCG 386-31, poco meglio evidente forzando a 580x.
MAC 0143-0056	gx	01h43m23s	−00°56.8'		Cet	24"	m. buona / discreto	piccola, debolissima, relativamente compatta e di luminosità uniforme; a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline abbastanza brillanti a E e SSE — 450x.
MAC 0143-0447	gx	01h43m23s	−04°47.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	debolissima, forse rotonda con Ø sì e no di 20” (occorre ovviamente cercare di tenere fuori campo la SAO 129477 di 6ª grandezza e di un bel colore arancione chiaro situata 8' a E) — 450x.
MAC 0143-0451	gx	01h43m11s	−04°51.2'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0145-0414	gx	01h45m54s	−04°14.8'		Cet	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; molto disturbata dalla SAO 129489 di 8ª grandezza situata 1.5' a NE — 450x.
MAC 0145-0419A	gx	01h45m41s	−04°19.1'		Cet	24"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, estesa 10"-15", appare in visione distolta a 1' scarso S di una stellina — 450x.
MAC 0145-0422	gx	01h45m20s	−04°23.0'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 20"-25" e di luminosità uniforme (fra le MAC presenti in zona è la meno difficile) — 450x.
MAC 0145-0422A	gx	01h45m47s	−04°22.8'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0145-0424	gx	01h45m10s	−04°24.4'		Cet	24"	ottima / buono	piccola e debolissima, salta fuori a tratti in visione distolta, ma non sembra più estesa di 10" — 450x.
MAC 0145-0426	gx	01h45m27s	−04°27.0'		Cet	24"	ottima / buono	debolissima, non più estesa di 20", appare in visione distolta allineata verso SE con due stelline di diversa luminosità — 450x.
MAC 0145-0445	gx	01h45m41s	−04°45.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e osservabile con una certa difficoltà, in quanto a 450x il campo nei dintorni è quasi depleto; a tratti appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15".
MAC 0146-1429	gx	01h46m42s	−14°29.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 400x; a tratti appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20".
MAC 0146-1508	gx	01h46m17s	−15°08.1'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima, appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; è approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi.
MAC 0147-1423	gx	01h47m05s	−14°23.2'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima, molto piccola e diffusa, estesa una 20-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile — 400x.
MAC 0147-1510	gx	01h47m25s	−15°10.6'		Cet	24"	m. buona / buono	è una debolissima chiazza diffusa e stemperata sul fondo cielo, forse rotonda con Ø di 30" o poco più — 450x.
MAC 0147-1512	gx	01h47m16s	−15°12.7'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, solo a momenti appare poco più brillante all'interno; è orientata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
MAC 0147-1514	gx	01h47m19s	−15°14.3'		Cet	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta a un paio di primi SSE di MAC 0147-1512, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0148-0420	gx	01h48m39s	−04°20.5'		Cet	24"	ottima / buono	molto piccola e debolissima, poco diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' scarso NW — 450x.
MAC 0148-0422	gx	01h48m28s	−04°22.9'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0148-0424	gx	01h48m44s	−04°26.4'		Cet	24"	ottima / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0149-1333A	gx	01h49m32s	−13°33.6'		Cet	24"	buona / buono	assieme a MAC 0149-1334 forma una coppia di debolissimi oggetti con Ø di una 15-ina di secondi che appaiono abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; il 2º è poco più debole, ma sembra più condensato, mentre il 1º è più uniforme.
MAC 0149-1334	gx	01h49m27s	−13°35.0'		Cet	24"	buona / buono	v. **MAC 0149-1333A**
MAC 0150-0354	gx	01h50m57s	−03°54.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta, orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (sembra a prima vista una copia di MAC 0151-0353, seppure molto più debole) — 450x.
MAC 0150-0831	gx	01h50m42s	−08°31.5'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a N — 340x.
MAC 0150-1226	gx	01h50m46s	−12°26.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a meno d 1' SW di una stellina; molto diffusa e non più estesa di una 20-ina di secondi — 400x.
MAC 0150-1240	gx	01h50m39s	−12°40.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile da vedere, nonostante un residuo di chiarore lunare; piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, diffusa e con evidente condensazione centrale di aspetto quasi stellare — 450x.
MAC 0151-0249	gx	01h51m29s	−02°49.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare facilmente in visione distolta quando si osserva a coppia di stelline situata un paio di primi a S; rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0151-0254	gx	01h51m47s	−02°54.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	stranamente facile, rotonda, diffusa con Ø di una 30-ina di secondi ed evidente condensazione centrale — 450x.
MAC 0151-0353	gx	01h51m32s	−03°53.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e con nucleo molto tenue visibile a tratti, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0151-0402	gx	01h51m08s	−04°02.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, molto piccola, rotonda con Ø di 15"-20" e a tratti leggermente condensata — 450x.
MAC 0151-0403	gx	01h51m25s	−04°03.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, molto piccola, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0151-0522	gx	01h51m22s	−05°22.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0151-0530	gx	01h51m54s	−05°30.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di debolissima chiazza estesa in direzione N-S per quasi 1°, ma di forma indistinta; salta fuori solo a momenti in visione distolta quando si osserva una delle due gx del trio: MCG-1-5-45 situata 1' NW ed MCG-1-5-46 un paio di primi a E — 340x.
MAC 0151-0834	gx	01h51m26s	−08°34.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima e molto diffusa, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
MAC 0151-0835	gx	01h51m03s	−08°35.1'		Cet	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 340x.
MAC 0152-0100	gx	01h52m49s	−01°00.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0152-0210	gx	01h52m01s	−02°10.8'		Cet	16"	m. buona / ottimo	elusivo oggetto non più esteso di 20" che appare solo a momenti in visione distolta a 380x.
MAC 0153-0058	gx	01h53m43s	−00°58.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni ~ 30"×15" — 450x.
MAC 0153-1350	gx	01h53m56s	−13°50.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0154-0234	gx	01h54m23s	−02°34.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 10" o 15" — 450x.
MAC 0154-0241	gx	01h54m44s	−02°41.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare evidente — 450x.
MAC 0154-0243	gx	01h54m23s	−02°43.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale evidente — 450x.
MAC 0154-0450	gx	01h54m44s	−04°50.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 30-ina di secondi; situata in mezzo a due stelline orientate da E a W e distanti un paio di primi — 450x.
MAC 0154-0940	gx	01h54m48s	−09°40.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata in una piccola zona depleta; appare in visione distolta a poco più di 1' NE di una stellina — 450x.
MAC 0154-1354	gx	01h54m05s	−13°54.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, a tratti molto allungata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MAC 0156-0010	gx	01h56m33s	−00°10.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
MAC 0157-0016	gx	01h57m01s	−00°16.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, condensata, forse rotonda con Ø di 10”-15”; la visione era un po' disturbata sia dalla SAO 129575 di 9ª grandezza situata a 2.5' SE, sia dalla presenza della Luna di età 5 giorni a una 20-ina di gradi di distanza — 450x.
MAC 0157-0835	gx	01h57m48s	−08°35.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a un paio di primi S di MCG-2-6-8; forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 0158-0242	gx	01h58m19s	−02°42.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta, forse rotonda con Ø < 20” (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
MAC 0159-0249	gx	01h59m35s	−02°19.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
MAC 0200-0054	gx	02h00m46s	−00°54.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×10"; c'è una coppia di stelline appena percettibili a 1' E e SE — 450x.
MAC 0200-0120	gx	02h00m30s	−01°20.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata tra una stellina a 1' SW e un'altra molto debole alla stessa distanza NE (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
MAC 0200-0054	gx	02h00m46s	−00°54.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 40"×10"; c'è una coppia di stelline appena percettibili a 1' E e SE — 450x.
MAC 0200-0131	gx	02h00m45s	−01°31.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso N (la più settentrionale di 3 stelline della stessa luminosità allineate da N a S) — 450x.
MAC 0200-0137	gx	02h00m16s	−01°37.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	appare facilmente anche in visione diretta nonostante si trovi a ridosso N di una stella brillante di 8ª grandezza, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata — 450x.
MAC 0200-0141	gx	02h00m44s	−01°41.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S e una debole appena sfuocata situata subito a SE: quest'ultima, di fatto, è risultata essere la PGC 1112400 — 450x.
MAC 0200-0143	gx	02h00m01s	−01°43.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale visibile a momenti — 450x.
MAC 0201-0104	gx	02h01m43s	−01°04.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0201-0107	gx	02h01m38s	−01°08.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole e molto piccola, relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0201-0107A	gx	02h01m57s	−01°07.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 450x, ma non riesco a capirne la forma; non sembra comunque più estesa di 15".
MAC 0201-0119	gx	02h01m47s	−01°19.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente in visione distolta tra CGCG 387-26 e MAC 0201-0120B; è molto piccola, non più estesa di 10”-12” (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
MAC 0201-0120B	gx	02h01m45s	−01°20.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (presenza della Luna di età 5 giorni a ~ 20 gradi di distanza) — 450x.
MAC 0201-0126	gx	02h01m24s	−01°26.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 0202-0106	gx	02h02m20s	−01°06.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con tenue condensazione centrale; poco disturbata dalla SAO 129642 di magnitudo 10.6 situata 1' a SE — 450x.
MAC 0202-0115	gx	02h02m45s	−01°05.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 0202-0409	gx	02h02m39s	−04°09.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
MAC 0202-0612	gx	02h02m18s	−06°12.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N — 450x.
MAC 0203-0618	gx	02h03m19s	−06°18.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 0203-0806	gx	02h03m42s	−08°06.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta a un paio di primi NW di MCG-1-6-37; è approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0204-0807A	gx	02h04m06s	−08°07.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	è una lama di luce molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, orientata da E a W ed estesa per almeno 1' — 450x.
MAC 0205-0233	gx	02h05m20s	−02°33.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	a 450x appaiono come 2 tenuissimi baffi di luce che si dipartono a NE e a SW di una stellina (a meno che non si tratti del nucleo stellare particolarmente marcato!); quello a NE sembra leggermente più esteso.
MAC 0209-1647	gx	02h09m38s	−16°47.4'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e molto disturbata da una stellina brillante quasi a ridosso verso N; è molto piccola, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 20"×10", ma ho dovuto spingere a 580x.
MAC 0210-0626	gx	02h10m53s	−06°26.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0212-0221	gx	02h12m43s	−02°21.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, quasi immersa nell'alone della coppia SAO 129751-2 di magnitudini rispettivamente 7.7 e 5.7 situata ad appena 2.5' SSE (questa coppia è interessante per il contrasto cromatico: la più brillante è giallo-oro, mentre l'altra ha una tonalità violacea); allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0212-0223	gx	02h12m27s	−02°23.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo con Ø < 20" poco diffuso e condensato, facilmente osservabile nonostante si trovi ad appena 5' a W della coppia di stelle brillanti di cui alla descrizione precedente.
MAC 0213-0212	gx	02h13m27s	−02°12.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0214-1241	gx	02h14m42s	−12°41.7'		Cet	24"	ottima / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva — sono due piccoli oggetti circolari con Ø di max 15", molto deboli ma relativamente compatti che si riescono a separare a 450x; la difficoltà dell'osservazione sta nel fatto che sono situati in una piccola zona depleta (l'unico riferimento è una stellina di 15-esima a 3' NE); la prima sembra leggermente più facile.
MAC 0214-1242	gx	02h14m40s	−12°42.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	v. **MAC 0214-1241**
MAC 0216-1355	gx	02h16m07s	−13°55.5'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
MAC 0217-0310	gx	02h17m01s	−03°10.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina subito a S — 450x.
MAC 0221-0527	gx	02h21m23s	−05°27.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' scarso verso E — 450x.
MAC 0223-0447	gx	02h23m55s	−04°47.6'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e solo a tratti condensata, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0224-0436	gx	02h24m30s	−04°36.2'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0224-0448	gx	02h24m04s	−04°48.2'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e alquanto spampanata, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a 1' SW e una appena percettibile a 1' verso E — 450x.
MAC 0224-2444	gx	02h24m30s	−24°44.7'		For	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola, ma relativamente compatta in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0227-0354	gx	02h27m17s	−03°54.0'		Cet	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0229-0419	gx	02h29m51s	−04°19.8'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, difficile da vedere in quanto non vi sono stelline di riferimento nelle vicinanze; salta fuori spazzolando il campo in visione distolta a 450x.
MAC 0229-1046	gx	02h29m23s	−10°46.1'		Cet	24"	buona / ottimo	debolissima, ma molto piccola e relativamente compatta, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-15".
MAC 0229-1325	gx	02h29m55s	−13°25.5'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, molto piccola e solo a momenti condensata, appare in visione distolta a ~ 1' S di una stellina brillante; probabilmente rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0229-1538	gx	02h29m22s	−15°38.7'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, appare in visione distolta a 1.5' SE di una stellina brillante, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0230-0253	gx	02h30m32s	−02°53.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a momenti come una piccola chiazza di forma indistinta estesa una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0231-0002	gx	02h31m41s	−00°02.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa, di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni grosso modo 20"×15" — 450x.
MAC 0231-0009	gx	02h31m19s	−00°10.0'		Cet	24"	ottima / m. buono	anche questa è piccola e molto debole, diffusa, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina a ridosso NE visibile solo a momenti — 450x.
MAC 0231-0016	gx	02h31m52s	−00°16.8'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0231-0106	gx	02h31m07s	−01°06.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, forse rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x.
MAC 0231-0256	gx	02h31m12s	−02°56.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, compatta e condensata, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0231-0306	gx	02h31m28s	−03°06.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0231-1735	gx	02h31m30s	−17°35.9'		Cet	24"	buona / mediocre	è un debolissimo e minuscolo oggetto rotondo con Ø di max 10" che appare solo a momenti in visione distolta — 450x.
MAC 0231-1738	gx	02h31m31s	−17°38.1'		Cet	24"	buona / mediocre	molto debole e poco diffusa, a momenti appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0231-1741	gx	02h31m15s	−17°41.2'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissima, appare in visione distolta, probabilmente rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0231-1743	gx	02h31m04s	−17°43.0'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissima, salta fuori in visione distolta, solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15", ma si fatica un poco a spingere a 450x per via del seeing.
MAC 0231-1747	gx	02h31m03s	−17°47.8'		Cet	24"	buona / mediocre	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0232-1100	gx	02h32m49s	−11°00.5'		Cet	24"	buona / mediocre	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a ridosso W e un'altra appena percettibile a 1' verso S — 450x.
MAC 0232-1327	gx	02h32m18s	−13°27.5'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, appare in visione distolta poco più di 1' a S di una stellina, orientata da N a S con dimensioni 30"×20" 450x.
MAC 0232-1327A	gx	02h32m27s	−13°27.5'		Cet	24"	buona / buono	pure debolissima, diffusa e con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è un piccolo arco di 4 stelle a pochi primi verso N — 450x.
MAC 0232-1512	gx	02h32m46s	−15°12.1'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; la σ Ceti di magnitudo 4.7 si trova a 10' WSW, ma si riesce a tenere fuori campo a 450x.
MAC 0234-0107	gx	02h34m39s	−01°07.9'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e a tratti condensata, forse rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso SW — 450x.
MAC 0234-1102	gx	02h34m07s	−11°02.4'		Cet	24"	buona / mediocre	relativamente facile, diffusa e poco più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0236-0912	gx	02h36m39s	−09°12.0'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissima e molto diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
MAC 0236-0919	gx	02h36m11s	−09°19.0'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissima e molto piccola, poco più di una stellina sfocata, appare solo in visione distolta a ridosso SW di MCG-2-7-42 — 450x.
MAC 0236-1213	gx	02h36m00s	−12°13.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; si trova in mezzo a 2 stelline abbastanza brillanti distanti un paio di primi — 570x.
MAC 0240-1603	gx	02h40m42s	−16°03.9'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0241-0948	gx	02h41m44s	−09°48.7'		Cet	24"	buona / mediocre	debolissimo oggetto diffuso, non più esteso di 15" che in visione distolta sembra a momenti aggettare a SE dalla più debole di una coppia di stelline distanti una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0241-0958	gx	02h41m07s	−09°58.5'		Cet	24"	buona / mediocre	appare elusivamente a 340x a circa il doppio della distanza che separa MCG-2-7-66 da una stellina situata a < 2' verso NE — 3.5' a SW di MCG-2-7-66.
MAC 0242-1503	gx	02h42m01s	−15°03.4'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0242-1513	gx	02h42m38s	−15°13.0'		Cet	24"	buona / buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0243-0806A	gx	02h43m27s	−08°06.5'		Cet	24"	buona / ottimo	poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0243-0806B	gx	02h43m42s	−08°06.1'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta a 450x e con dimensione simile.
MAC 0243-0807	gx	02h43m14s	−08°07.5'		Cet	24"	buona / ottimo	facile da vedere, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a E; un piccolo triangolo di stelline brillanti si trova a NW della galassia — 450x.
MAC 0244-0758	gx	02h44m02s	−07°58.5'		Cet	24"	buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso E; disturbata dalla SAO 130086 di magnitudo 6.5 situata 4' a NNE e che si fatica a tenere fuori campo anche a 450x.
MAC 0235-0535	gx	02h45m53s	−05°35.3'		Cet	24"	ottima / m. buono	baffo molto tenue e di luminosità uniforme che in visione distolta appare orientato da NW a SE ed esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 450x.
MAC 0245-1504	gx	02h45m46s	−15°04.9'		Eri	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0245-1507	gx	02h45m43s	−15°07.3'		Eri	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, rotonda con Ø < 20" e diffusa; c'è una stellina brillante quasi a ridosso NE e una debole a ridosso verso S — 450x.
MAC 0247-0045	gx	02h47m58s	−00°45.0'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, solo a momenti appare poco allungata da E a W con dimensioni grosso modo 20"×15" — 450x.
MAC 0247-0849	gx	02h47m48s	−08°49.8'		Eri	24"	m. buona / scarso	molto piccola e debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 20"×10" e con condensazione centrale puntiforme visibile a tratti — 340x.
MAC 0249-0033	gx	02h49m41s	−00°36.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW — 450x.
MAC 0249-0034	gx	02h49m29s	−00°34.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	di aspetto abbastanza simile alla precedente, anch'essa di luminosità uniforme ed estesa una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0249-0035	gx	02h49m34s	−00°35.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e condensata, relativamente compatta con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0249-0038	gx	02h49m40s	−00°38.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
MAC 0250-1318	gx	02h50m44s	−13°18.9'		Eri	24"	m. buona / scarso	è una debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi e orientata da NW a SE; appare solo a momenti in visione distolta a 340x.
MAC 0251-0050	gx	02h51m13s	−00°50.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa rotonda con Ø < 30" e una condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso N — 450x.
MAC 0254-0116	gx	02h54m07s	−01°16.1'		Eri	24"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, ma in visione distolta appare, seppur a momenti, orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 0254-0119	gx	02h54m45s	−01°19.1'		Eri	24"	buona / discreto	anche questa è debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, ma non sembra più estesa di 15" (situata 3' a NNW di CGCG 389-43).
MAC 0255-1033	gx	02h55m07s	−10°33.6'		Eri	24"	m. buona / scarso	piccola, molto debole, ma relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 340x.
MAC 0255-1408	gx	02h55m27s	−14°08.3'		Eri	24"	buona / mediocre	appare elusivamente e solo a momenti in visione distolta; a 340x non sembra comunque maggiore di 10"-12"; allineata ed equidistante con la coppia IC 268-9 situata a N.
MAC 0256-0957	gx	02h56m08s	−09°57.7'		Eri	24"	m. buona / scarso	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di 15" e condensazione centrale puntiforme — 340x.
MAC 0256-1347	gx	02h56m34s	−13°48.0'		Eri	24"	buona / buono	molto debole e piccola, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
MAC 0257-0443	gx	02h57m47s	−04°43.4'		Eri	24"	buona / buono	debolissima e molto piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" disturbata dalla SAO 130219 situata 2.5' a E — 3.5' WNW di MCG-1-8-21.
MAC 0258-0452	gx	02h58m30s	−04°52.6'		Eri	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0258-0458	gx	02h58m30s	−04°58.3'		Eri	24"	buona / buono	piccola e molto debole, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni minori di 30"×15" — 450x.
MAC 0259-1048	gx	02h59m57s	−10°48.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
MAC 0300-1043	gx	03h00m58s	−10°43.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) debolissima, ma a tratti, in visione distolta, appare poco allungata da N a S con dimensioni 25"×20" e senza condensazione — 450x.
MAC 0300-1044A	gx	03h00m27s	−10°44.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, solo a momenti appare leggermente condensata, forse rotonda con Ø di ~ 15".
MAC 0300-1048	gx	03h00m15s	−10°48.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) molto debole e piccola, con condensazione centrale stellare appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0300-1048A	gx	03h00m37s	−10°48.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) molto debole, piccola rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0300-1052	gx	03h00m42s	−10°52.8'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) debole e diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0300-1053	gx	03h00m26s	−10°54.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø > 20" — 450x.
MAC 0300-1053A	gx	03h00m25s	−10°53.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a una 30-ina di secondi NW di MAC 0300-1053, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0300-1519	gx	03h00m17s	−15°19.8'		Eri	24"	buona / buono	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0301-1017	gx	03h01m51s	−10°17.2'		Eri	24"	m. buona / scarso	appare elusivamente solo a momenti al vertice rettangolo di un piccolo triangolo il cui ipotenusa è costituito da 2 stelline orientate da NW a SE (quella a NW è più debole); nei rari istanti in cui salta fuori sembra estesa almeno 40"-45"; scalando a 210x la situazione non migliora (forse perché il fondo cielo è troppo chiaro).
MAC 0301-1044	gx	03h01m06s	−10°44.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) poco più evidente di MAC 0300-1044, ma di aspetto più confuso, non più estesa di 15" o 20" — 450x.
MAC 0301-1053	gx	03h01m16s	−10°53.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) debolissima, diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0301-1054	gx	03h01m41s	−10°54.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	(fa parte del gruppo di MCG-2-8-38) molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.
MAC 0301-1517	gx	03h01m24s	−15°17.7'		Eri	24"	m. buona / scarso	debolissima, molto piccola, ma relativamente compatta, forse rotonda con Ø di 10" o 15"; è disturbata da una stellina brillante situata 1.5' a SW — 8.5' a SSE di MCG-3-8-58.
MAC 0304-0007	gx	03h04m41s	−00°07.2'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0304-1204	gx	03h04m58s	−12°04.2'		Eri	24"	m. buona / mediocre	facile, relativamente compatta e con condensazione centrale stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; non sembra disturbata da una stella brillante situata un paio di primi a E — 450x.

MAC 0305-0014	gx	03h05m23s	−00°14.6'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0305-0020	gx	03h05m20s	−00°20.7'		Cet	24"	buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0305-0539	gx	03h05m07s	−05°39.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	piccola, poco diffusa e con condensazione stellare evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' NW — 450x.
MAC 0305-0552A	gx	03h05m34s	−05°53.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x subito a W di una stellina; forse rotonda con Ø di 10"-15".
MAC 0305-2725	gx	03h05m36s	−27°26.0'		For	24"	ottima / discreto	debolissima, piccola e molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0306-0546	gx	03h06m24s	−05°46.9'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, molto allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×10" e con piccolo nucleo appena percettibile — 450x.
MAC 0306-0551	gx	03h06m02s	−05°51.9'		Eri	24"	m. buona / m. buono	assieme a MAC 0306-0553, situata 1.5' più a S, forma una coppia di deboli galassiette di aspetto a prima vista simile; la prima, tuttavia, è più uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; la seconda è poco più piccola, sempre con rapporto di assi 3:1 e con nucleo puntiforme visibile a tratti — 450x.
MAC 0306-0553	gx	03h06m05s	−05°53.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 0306-0551**
MAC 0307-0048	gx	03h07m45s	−00°48.8'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 0307-0415	gx	03h07m48s	−04°15.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a meno di 1' SW — 450x.
MAC 0307-0419	gx	03h07m44s	−04°19.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' W — 450x.
MAC 0307-0423	gx	03h07m47s	−04°23.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	assieme a MAC 0307-0424, situata 1' a SE, forma una coppia di debolissimi oggetti molto piccoli; il primo appare a tratti in visione distolta orientato da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10"; il secondo è forse rotondo con Ø di una decina di secondi — 450x.
MAC 0307-0424	gx	03h07m49s	−04°24.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 0307-0423**
MAC 0308-0424	gx	03h08m07s	−04°24.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, poco più di una stellina sfuocata, appare a tratti in visione distolta subito a E di una stellina (quella situata 1' a S di IC 1886) — 450x.
MAC 0308-0428	gx	03h08m16s	−04°28.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0308-0433	gx	03h08m03s	−04°33.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 20"×15" — 450x.
MAC 0308-1554	gx	03h09m48s	−15°54.5'		Eri	24"	buona / buono	appare elusivamente e solo a momenti; non ne capisco la forma; estesa forse una 30-ina di secondi; meglio tuttavia non scendere sotto i 450x.
MAC 0309-0200	gx	03h09m28s	−02°00.0'		Eri	24"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 390-11 dalla quale dista 1.5' a NW; forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 0309-0220	gx	03h09m31s	−02°20.6'		Eri	24"	buona / ottimo	chiazza approssim. circolare molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme e Ø di una 40-ina di secondi; presenta un nodulo quasi stellare a ridosso NE osservabile a tratti in visione distolta a 450x: quest'ultimo, da un controllo successivamente effettuato, è poi risultato essere la MAC 0309-0220A.
MAC 0309-0220A	gx	03h09m33s	−02°20.4'		Eri	24"	buona / ottimo	v. **MAC 0309-0220**
MAC 0309-0221	gx	03h09m21s	−02°21.0'		Eri	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0309-0223	gx	03h09m47s	−02°23.4'		Eri	24"	buona / ottimo	più debole e piccola di MAC 0309-0221 — osservata subito prima — orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE; è situata in una piccola zona depleta, ma appare facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 0309-0229	gx	03h09m40s	−02°29.4'		Eri	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è visibile in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 0309-1732	gx	03h09m52s	−17°32.4'		Eri	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, appare in visione distolta a 1' W di una coppia stretta e sbilanciata di stelline; è grosso modo rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0310-0237	gx	03h10m25s	−02°37.6'		Eri	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, orientata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con nucleo puntiforme abbastanza evidente — 450x.
MAC 0310-1040	gx	03h10m29s	−10°40.7'		Eri	24"	buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 0310-2425	gx	03h10m01s	−24°25.2'		For	24"	discreta / mediocre	molto piccola e debolissima, estesa 10"-12"; salta fuori in visione distolta un paio di primi scarsi a NW di una stellina — 340x.
MAC 0311-0230	gx	03h11m48s	−02°30.2'		Eri	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile da vedere a patto di tenere fuori campo la SAO 130342 di 8ª grandezza situata a 5.5' NE; poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0311-0232	gx	03h11m13s	−02°32.4'		Eri	24"	m. buona / ottimo	di aspetto e dimensioni simili a MAC 0311-0230, ma orientata da E a W e a tratti leggermente condensata — 450x.
MAC 0311-1041	gx	03h11m23s	−10°41.1'		Eri	24"	buona / buono	relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0311-1659	gx	03h11m56s	−17°00.0'		Eri	24"	buona / buono	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso W; un'altra stellina si trova poco più distante verso E — 450x.
MAC 0311-1701	gx	03h11m48s	−17°01.3'		Eri	24"	buona / buono	tenuissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W; appare in visione distolta quasi a ridosso NW di una debole stellina — 450x.
MAC 0312-0010	gx	03h12m12s	−00°10.8'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissima, ma relativamente compatta, molto piccola, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; la visione è tuttavia un po' disturbata dalla SAO 130344 di 8ª grandezza situata 4' a S — un paio di primi a W di CGCG 390-22.
MAC 0312-0254	st?	03h12m44s	−02°54.1'		Eri	16"	ottima / buono	si trova a ridosso N della SAO 130354 di 7ª grandezza, ma ha tutta la parvenza di una stella (anche se il Megastar la riporta effettivamente come una piccola gx di 16-esima); è situata 2.5' a W di **MCG-1-9-15** — 380x.
MAC 0313-0115	gx	03h13m47s	−01°16.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; situata a S di un asterismo irregolare di 7 stelline esteso 5' o 6' — 450x.
MAC 0313-0254	gx	03h13m10s	−02°54.2'		Eri	16"	ottima / buono	più debole e più piccola di MCG-1-9-15, dalla quale dista 4' a E, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare; è meglio apprezzabile a 270x.
MAC 0315-0715	gx	03h15m10s	−07°15.2'		Eri	24"	buona / buono	appare prima di PGC 12090, situata subito a SE; si tratta di un tenuissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW — 450x.
MAC 0318-1343	gx	03h18m56s	−13°43.9'		Eri	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e relativamente compatta, a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 0318-1348	gx	03h18m01s	−13°48.1'		Eri	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x a causa delle SAO 148893 e 148894 rispettivamente di 8ª e 10ª grandezza con le quali è praticamente allineata e che disturbano la visione; solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20".
MAC 0318-1614	gx	03h18m48s	−16°14.3'		Eri	24"	buona / buono	è un tenuissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; salta fuori in visione distolta a ridosso E di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0318-2545	gx	03h18m41s	−25°45.5'		For	24"	discreta / mediocre	debolissima, appare elusivamente in visione distolta subito a N di una stellina; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 20" — 340x.
MAC 0319-1344	gx	03h19m18s	−13°44.9'		Eri	24"	buona / buono	debolissima, piccola e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0321-1545	gx	03h21m42s	−15°45.1'		Eri	24"	buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta a W di una debole stellina; a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15" — 450x.
MAC 0322-1541	gx	03h22m22s	−15°41.3'		Eri	24"	buona / buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare solo a momenti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0322-1708	gx	03h22m22s	−17°08.6'		Eri	24"	buona / buono	anche questa è debolissima, molto piccola, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 0323-1030	gx	03h23m44s	−10°30.6'		Eri	24"	buona / buono	appare elusivamente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 20"-30".
MAC 0324-0555	gx	03h24m02s	−05°55.5'		Eri	24"	ottima / buono	debolissimo baffo di luce esteso 20"-25" in direzione N-S e situato a ridosso N di KUG 321-61; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x; una debole stellina si trova a 1' scarso N.
MAC 0327-0457	gx	03h27m44s	−04°57.8'		Eri	24"	discreta / buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' verso S — 450x.
MAC 0327-1348	gx	03h27m15s	−13°48.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, rotonda con Ø < 20".
MAC 0328-0407	gx	03h28m39s	−04°07.5'		Eri	24"	discreta / buono	debolissima e molto difficile da vedere, in quanto situata in una piccola plaga depleta; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0328-0413	gx	03h28m48s	−04°13.1'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole, appare facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x; approssim. circolare con Ø < 30" e con nucleo stellare percettibile solo a momenti.
MAC 0328-0415	gx	03h28m46s	−04°15.6'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0330-0309	gx	03h30m42s	−03°09.8'		Eri	24"	discreta / buono	debole e molto diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W, di dimensioni 45"×30" e con tenue bulge leggermente allungato — 450x.
MAC 0330-1421	gx	03h30m21s	−14°21.0'		Eri	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente in visione distolta a 450x, ma non riesco a capirne la forma; non è comunque più estesa di 10" o 20".
MAC 0330-1425	gx	03h30m42s	−14°25.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 1' E di IC 326 — 450x.
MAC 0332-0109	gx	03h32m45s	−01°09.2'		Tau	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e relativamente compatta, a tratti appare allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0332-1752	gx	03h32m10s	−17°52.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 10' scarsi SSW di UGCA 77) — 450x.
MAC 0333-1344	gx	03h33m36s	−13°44.5'		Eri	16"	ottima / ottimo	debolissima chiazza diffusa, visibile solo a momenti in visione distolta a 380x ed estesa una 30-ina di secondi.
MAC 0334-0424	gx	03h34m44s	−04°24.0'		Eri	24"	discreta / buono	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' scarso NW — 450x.
MAC 0335-0252	gx	03h35m57s	−02°52.2'		Eri	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata con MCG-1-10-8 situata a ridosso di NW: è più piccola di quest'ultima, di luminosità uniforme e palesemente più debole; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E — 450x.
MAC 0336-0148	gx	03h36m08s	−01°48.5'		Eri	24"	buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0338-0608	gx	03h38m08s	−06°08.5'		Eri	24"	buona / m. buono	relativamente compatta e con condensazione centrale stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' NW — 400x.
MAC 0339-0201	gx	03h39m26s	−02°01.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0339-0207A	gx	03h39m16s	−02°07.2'		Eri	24"	m. buona / m. buono	poco più evidente di MAC 0339-0201 e di Ø poco inferiore — 450x.
MAC 0339-1436	gx	03h39m07s	−14°36.7'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, con nucleo stellare appena percettibile, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 40-ina di secondi, ma non bisogna scendere sotto i 450x; situata al vertice rettangolo di un piccolo triangolo rettangolo formate con due stelline: una abbastanza brillante a 1' S e una più debole a 2' E.
MAC 0339-1530	gx	03h39m04s	−15°30.0'		Eri	24"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0340-0229	gx	03h40m29s	−02°29.8'		Eri	24"	discreta / buono	debolissima e molto piccola, relativamente compatta ed estesa non più di 10" o 15" — 450x.
MAC 0340-0233	gx	03h40m31s	−02°33.1'		Eri	24"	discreta / buono	piccola e debolissima, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0340-0234	gx	03h40m45s	−02°34.4'		Eri	24"	discreta / buono	assieme alla successiva MAC 0340-0235 forma una coppia di debolissime galassiette distanti una 40-ina di secondi in direzione NE-SW; in visione distolta sembrano di aspetto simile, grosso modo rotonde con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0340-0235	gx	03h40m42s	−02°35.0'		Eri	24"	discreta / buono	v. **MAC 0340-0234**
MAC 0340-0240	gx	03h40m44s	−02°40.3'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0340-0350	gx	03h40m19s	−03°50.1'		Eri	24"	discreta / buono	presenta un nucleo stellare marcato circonfuso da un tenue alone circolare con Ø < 30" — 450x.
MAC 0341-0205	gx	03h41m26s	−02°05.5'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0341-0231	gx	03h41m09s	−02°31.7'		Eri	24"	discreta / buono	debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0343-0104	gx	03h43m19s	−01°04.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima galassietta molto piccola e diffusa; appare in visione distolta subito a SW di una stellina, ma non riesco a capire com'è fatta — 450x.
MAC 0344-0912	gx	03h44m49s	−09°12.0'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20" o poco più; forma un triangolo isoscele molto schiacciato con 2 stelline abbastanza brillanti a S e a NE — 450x.
MAC 0344-1422	gx	03h44m14s	−14°22.7'		Eri	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, molto piccola e a tratti condensato, rotonda con Ø max di 15"-20"; appare solo a 380x a 1.5' N di una stellina (è sorta la Luna).
MAC 0345-0723	gx	03h45m32s	−07°23.8'		Eri	24"	ottima / ottimo	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una doppia dalle componenti abbastanza brillanti a 1.5' verso W — 450x.
MAC 0345-0728	gx	03h45m36s	−07°28.1'		Eri	24"	ottima / ottimo	v. **MCG-1-10-28**
MAC 0345-0728A	gx	03h45m27s	−07°28.7'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una piccola condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
MAC 0345-0730	gx	03h45m41s	−07°30.1'		Eri	24"	ottima / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; salta fuori prima di MCG-1-10-30 situata quasi a ridosso S — 450x.
MAC 0345-0731A	gx	03h45m48s	−07°31.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0345-0914	gx	03h45m30s	−09°14.1'		Eri	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa < 40"; salta fuori in visione distolta a 450x quando si osserva NGC 1450 situata 1.5' a E.
MAC 0345-0914A	gx	03h45m17s	−09°14.2'		Eri	24"	ottima / ottimo	più facile di MAC 0345-0914, in visione distolta appare prima, molto piccola, condensata ed estesa non più di 15" — 450x.
MAC 0346-0314	gx	03h46m18s	−03°14.3'		Eri	24"	discreta / buono	è un piccolo e tenuissimo baffo orientato da E a W ed esteso non più di 20"; appare in visione distolta a 450x quasi a ridosso E di una stellina.
MAC 0346-0358	gx	03h46m11s	−03°58.1'		Eri	16"	m. buona / discreto	debolissima, molto diffusa e con condensazione centrale appena percettibile a 270x; solo a momenti appare allungata da NE a SW — come NGC 1453, dalla quale dista 4' verso W — con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso S.
MAC 0346-0938	gx	03h46m19s	−09°38.8'		Eri	24"	ottima / ottimo	piccola, relativamente facile e compatta, allungata da E a W, di dimensioni 20"×10" e con tenue condensazione centrale — 450x.
MAC 0347-0202	gx	03h47m52s	−02°02.9'		Eri	24"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' SE e un'altra più debole alla stessa distanza verso NE — 450x.
MAC 0349-1355	gx	03h49m48s	−13°55.9'		Eri	24"	ottima / ottimo	è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione N-S; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; la visione è un poco disturbata dalla SAO 149192 di 9ªª grandezza situata 3' a NNW.
MAC 0350-0409	gx	03h50m27s	−04°09.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
MAC 0350-0701	gx	03h50m48s	−07°01.7'		Eri	24"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0351-0748	gx	03h51m21s	−07°48.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, relativamente facile e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stella a 1' verso W — 450x.
MAC 0351-0827A	gx	03h51m43s	−08°27.9'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø max di 15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SW.
MAC 0351-0834	gx	03h51m44s	−08°34.0'		Eri	24"	ottima / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0351-0837	gx	03h51m05s	−08°37.6'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø <20"; disturbata dalla SAO 130771 di 10ª grandezza un paio di primi a NW; c'è una coppia serrata di stelline brillanti a 1' verso S — 450x.
MAC 0352-0830	gx	03h52m12s	−08°30.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0355-0934	gx	03h55m44s	−09°34.6'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole e diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente; c'è una stellina a 1' scarso NE — 450x.
MAC 0355-1717	gx	03h55m13s	−17°17.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; si trova al vertice rettangolo di un minuscolo triangolo formato con 2 deboli stelline, a N e a SE — 450x.
MAC 0356-0933	gx	03h56m04s	−09°33.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0402-0915	gx	04h02m21s	−09°15.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	forma una coppia con MAC 0402-0915A situata 2.5' a ESE — sono debolissime e molto piccole, approssim. rotonde con Ø < 20"; la 2ª è più spampanata — 450x.
MAC 0402-0915A	gx	04h02m11s	−09°15.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	v. **MAC 0402-0915**
MAC 0402-0920	gx	04h02m05s	−09°20.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso SE — 450x.
MAC 0402-0920A	gx	04h02m25s	−09°20.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	è un elusivo baffo di luce orientato da N a S ed esteso < 20"; appare con molta fatica a ridosso E di una stellina brillante — 450x.
MAC 0403-0920	gx	04h03m23s	−09°20.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0403-0922	gx	04h03m13s	−09°22.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0405-1511	gx	04h05m36s	−15°11.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
MAC 0414-1340	gx	04h17m30s	−13°40.7'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima, piccola e diffusa, appare in visione distolta quasi a ridosso E di una stellina; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0415-0057	gx	04h15m38s	−00°57.8'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima e molto piccola, appare solo a momenti in visione distolta, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0415-1328	gx	04h15m45s	−13°28.8'		Eri	24"	m. buona / discreto	appare una stellina appena percettibile al bordo N di MCG-2-11-28 — 450x.
MAC 0416-1115	gx	04h16m30s	−11°15.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	appare solo come un tenuissimo alone attorno a una stellina brillante (il seeing non mi permette di spingere a 570x); se non si tratta effettivamente di una stella, la gx non dovrebbe essere più estesa di 10"-12" — 450x.
MAC 0416-1209	gx	04h16m58s	−12°09.0'		Eri	16"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a meno di 1' N di una stellina; è estesa non più di una 20-ina di secondi — 380x.
MAC 0416-1222	gx	04h17m00s	−12°22.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima, molto piccola, ma relativamente compatta, solo a momenti in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso N; la visione è un poco disturbata da una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso WSW — 450x.
MAC 0416-1340	gx	04h16m43s	−13°40.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0416-1349	gx	04h16m37s	−13°49.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; situata tra una doppia larga e sbilanciata a N e una stellina a S — 450x.
MAC 0417-1215	gx	04h17m45s	−12°15.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso verso NE — 450x.
MAC 0418-1405	gx	04h18m38s	−14°05.2'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima, appare a momenti in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 0420-0056	gx	04h20m19s	−00°56.0'		Eri	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0420-0940	gx	04h20m56s	−09°41.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta come una stellina sfocata — 450x.
MAC 0420-0942	gx	04h20m56s	−09°42.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 0420-0943A	gx	04h20m31s	−09°43.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, tuttavia in visione distolta sembra abbastanza compatta, di luminosità uniforme e a momenti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 20"×10" — 450x.
MAC 0421-0208	gx	04h21m25s	−02°08.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un tenue nucleo stellare appena evidente — 450x.
MAC 0421-0209	gx	04h21m44s	−02°09.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a una 40-ina di secondi W — 450x.
MAC 0421-0221	gx	04h21m11s	−02°21.3'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a una 40-ina di secondi verso W — 450x.
MAC 0421-0223	gx	04h21m40s	−02°23.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' SW — 450x.
MAC 0421-0244	gx	04h21m29s	−02°44.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a ridosso S di una stellina; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0421-1012	gx	04h21m58s	−10°12.1'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quasi a ridosso NE di una debole stellina; a tratti appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0422-1138	gx	04h22m54s	−11°38.3'		Eri	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; completa un piccolo arco formato con 3 stelline (quella a SE è in realtà una doppia larga) — 450x.
MAC 0422-1539	gx	04h22m40s	−15°39.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una debole quasi a ridosso verso SE e un'altra appena percettibile a SW — 450x.
MAC 0423-0013	gx	04h23m44s	−00°13.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20" — 450x.
MAC 0423-0339	gx	04h23m44s	−03°39.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, quasi immersa nei bagliori della ξ Eridani di 5ª grandezza, rotonda con Ø di una 20ina di secondi — 450x.
MAC 0423-1151A	gx	04h23m42s	−11°51.6'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni analoghe a MAC 0423-1138 e con nucleo stellare percettibile — 450x.
MAC 0425-0332	gx	04h25m53s	−03°32.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; è situata a ridosso S di una doppia abbastanza larga dalle componenti sbilanciate: quella più brillante a N e l'altra a NW — 450x.
MAC 0425-1037	gx	04h25m51s	−10°37.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina subito a N — 450x.
MAC 0425-1624	gx	04h25m13s	−16°24.1'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo SW — 450x.
MAC 0426-0611	gx	04h26m12s	−06°11.3'		Eri	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare (situata 13' a W di MCG-1-12-8) — 450x.
MAC 0426-0612	gx	04h26m21s	−06°13.0'		Eri	24"	m. buona / buono	debole, molto piccola e condensata, rotonda con Ø < 15" — 450x.
MAC 0426-0838	gx	04h26m03s	−08°28.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0426-1158	gx	04h26m46s	−11°58.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissimo oggetto probabilmente rotondo, molto piccolo ed esteso sì e no una decina di secondi — 450x.
MAC 0427-0928	gx	04h27m15s	−09°28.2'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima, appare a tratti in visione distolta, molto diffusa, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0427-1239	gx	04h27m35s	−12°39.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 30"×10"; è praticamente orientata come la coppia di stelle brillanti situata a 1' NW che ne offusca gravemente la visione (la più luminosa è la SAO 149646 di 7ª grandezza) — 450x.
MAC 0428-0350	gx	04h28m56s	−03°50.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione stellare; quasi allineata ed equidistante con 2 stelline a SSE molto sbilanciate in luminosità — 450x.
MAC 0428-0617	gx	04h28m27s	−06°17.8'		Eri	24"	m. buona / discreto	appare come un nodulo molto piccolo ed elusivo che si separa a momenti verso E da MCG-1-12-12 — 450x.
MAC 0428-0929	gx	04h28m32s	−09°29.3'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma non sembra più estesa di 15"-20".
MAC 0428-1042	gx	04h28m26s	−10°42.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 0429-0048	gx	04h29m02s	−00°48.4'		Eri	24"	ottima / discreto	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" (situata 13.5' a WSW di CGCG 393-26) — 450x.
MAC 0429-0437	gx	04h29m18s	−04°37.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale appena percettibile e meglio evidente scalando a 340x.
MAC 0429-1037	gx	04h29m22s	−10°37.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	elusivo baffo di luce orientato da NW a SE ed esteso una 30-ina di secondi che appare solo a momenti in visione distolta a 450x tra una coppia di stelline a E e un'altra stellina a NW — 450x.
MAC 0429-1208	gx	04h29m45s	−12°08.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0430-1145	gx	04h30m59s	−11°45.2'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima lama di luce orientata da E a W ed estesa una 30-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a 450x, anche se l'apparizione non è immediata.
MAC 0430-1148	gx	04h30m41s	−11°48.5'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima galassietta molto piccola, forse rotonda con Ø non superiore a 15"; appare solo a momenti in visione distolta a 450x.
MAC 0430-1232	gx	04h30m44s	−12°32.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme, esteso non più di 15" e osservabile in visione distolta a 450x.
MAC 0430-1237	gx	04h30m45s	−12°37.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0431-1118	gx	04h31m06s	−11°18.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima, mi appare solo a momenti in visione distolta, ma non riesco a capire com'è fatta; non sembra comunque più estesa di 20" — 450x.
MAC 0431-1150	gx	04h31m54s	−11°50.0'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; situata tra una stella luminosa 2.5' a NE e una coppia di stelline brillanti a SW — 450x.
MAC 0431-1225	gx	04h31m14s	−12°26.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale quasi stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi 450x.
MAC 0431-1226	gx	04h31m31s	−12°26.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole e molto piccola, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; è un poco disturbata da una stellina quasi a ridosso verso NNE — 450x.
MAC 0431-1226A	gx	04h31m31s	−12°27.8'		Eri	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø < 30" e tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
MAC 0431-1231	gx	04h31m22s	−12°31.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissimo oggetto rotondo, a momenti condensato ed esteso 10"-15"; c'è una coppia di deboli stelline a 1' verso S — 450x.
MAC 0431-1258	gx	04h31m03s	−12°58.4'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 0432-0522	gx	04h32m12s	−05°22.7'		Eri	16"	ottima / m. buono	è un piccolo oggetto ovale di dimensioni 20"×15", allungato da E a W, situato a ridosso SE di una stellina brillante — 380x.
MAC 0432-0553	gx	04h32m44s	−05°53.4'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con nucleo stellare abbastanza evidente; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline: 1' a E e 1' a SSE — 450x.
MAC 0434-1756	gx	04h34m45s	−17°56.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e a tratti condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 0438-0203	gx	04h38m03s	−02°03.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima galassietta, molto piccola e condensata, che tutto sommato appare facilmente in visione distolta a 450x a ridosso S di CGCG 393-52.
MAC 0438-1047	gx	04h38m11s	−10°47.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, estesa 10"-12"; salta fuori in visione distolta a ridosso W di MCG-2-12-50 — 450x.
MAC 0438-1047A	gx	04h38m19s	−10°47.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	appare solo a momenti quasi a ridosso NW di una stellina molto debole; anche questa è molto piccola, estesa sì e no una 10-ina di secondi — 450x.
MAC 0439-1314	gx	04h39m40s	−13°15.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' E — 450x.
MAC 0445-1609	gx	04h45m56s	−16°09.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0445-1707	gx	04h45m25s	−17°07.8'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 0446-0443	gx	04h46m03s	−04°43.0'		Eri	16"	ottima / scarso	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo puntiforme; c'è una stellina a 1' verso SE — 270x.
MAC 0447-0215	gx	04h47m48s	−02°15.0'		Ori	24"	buona / scarso	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma a causa del seeing è a mala pena distinguibile da una stellina — 340x.
MAC 0447-1531	gx	04h47m48s	−15°31.9'		Eri	24"	ottima / ottimo	minuscolo oggetto relativamente compatto, facilmente visibile a 450x, non più esteso di 10".
MAC 0447-1538	gx	04h47m54s	−15°38.2'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole e relativamente compatta, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con tenue bulge diffuso appena percettibile; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
MAC 0447-1555B	gx	04h47m13s	−15°55.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, a tratti condensata, rotonda con Ø di max 15"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a S (fa parte di un piccolo terzetto, ma non sono riuscito a vedere le altre 2 componenti) — 450x.
MAC 0447-1623	gx	04h47m11s	−16°23.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto piccola e relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina al bordo NE — 450x.
MAC 0447-1720	gx	04h47m04s	−17°20.9'		Eri	24"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori a momenti in visione distolta, tutto sommato meglio a 450x; non riesco a capirne la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 20".
MAC 0448-0134	gx	04h48m03s	−01°34.2'		Ori	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata tra 2 stelline relativamente brillanti distanti poco più di 2' e orientate da N a S (situata 7' a WSW di CGCG 394-15) — 450x.
MAC 0448-0515	gx	04h48m21s	−05°15.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0448-0629	gx	04h48m21s	−06°29.4'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 20"×15" e con piccolo nucleo poco contrastato abbastanza evidente.
MAC 0448-1339	gx	04h48m05s	−13°39.9'		Eri	16"	ottima / buono	è un debolissimo oggetto esteso max 15" o 20" con condensazione centrale puntiforme che appare abbastanza facilmente a 380x.
MAC 0449-0324	gx	04h49m52s	−03°24.4'		Ori	24"	buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0450-1720	gx	04h50m55s	−17°20.6'		Eri	24"	ottima / ottimo	assieme a MAC 0451-1719 e a MAC 0451-1722 costituisce un terzetto di debolissime galassiette, molto piccole e di luminosità uniforme; la 1ª è più diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; la 2ª è disturbata da una stellina brillante a S e ha un Ø <20"; la 3a, infine, è elusiva, appare solo a momenti in visione distolta, ma non dovrebbe essere più estesa di 10" o 15" — 450x.
MAC 0451-0235	gx	04h51m53s	−02°35.8'		Ori	24"	ottima / discreto	molto piccola, debole e diffusa, approssim. circolare con Ø < 20" e nucleo stellare appena percettibile (situata 2.5' a NE di NGC 1678) — 450x.
MAC 0451-0339	gx	04h51m07s	−03°39.1'		Ori	24"	buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø > 20" e nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
MAC 0451-0350	gx	04h51m42s	−03°50.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0451-0352	gx	04h51m28s	−03°52.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	di aspetto simile a MAC 0451-0350, ma più compatta, orientata da NW a SE con dimensioni analoghe — 450x.
MAC 0451-0355	gx	04h51m56s	−03°55.8'		Eri	24"	m. buona / discreto	relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0451-1430	gx	04h51m56s	−14°30.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso N e una visibile solo a momenti quasi a ridosso SE — 450x.
MAC 0451-1436	gx	04h51m32s	−14°36.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	appare elusivamente fra i bagliori della SAO 149938 di 8ª grandezza situata a 1' NE; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20 — 450x.
MAC 0451-1719	gx	04h51m00s	−17°19.9'		Eri	24"	ottima / ottimo	v. **MAC 0451-1720**
MAC 0451-1722	gx	04h51m04s	−17°22.4'		Eri	24"	ottima / ottimo	v. **MAC 0451-1720**
MAC 0451-1728	gx	04h51m29s	−17°28.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 0452-0304	gx	04h52m55s	−03°04.5'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, allineata ed equidistante con 2 stelline a SE; è situata tra NGC 1684 ed MCG-1-13-33.
MAC 0452-1724	gx	04h52m12s	−17°24.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso verso W — 450x.
MAC 0453-0421	gx	04h53m16s	−04°21.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina al bordo orientale — 450x.
MAC 0453-0429	gx	04h53m48s	−04°29.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda, anche questa con Ø di ~ 20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di NW — 450x.
MAC 0453-1742	gx	04h53m03s	−17°42.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW — 450x.
MAC 0454-0123	gx	04h54m30s	−01°23.1'		Ori	24"	ottima / ottimo	debolissima, piccola e a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' scarso N di una stellina — 450x.
MAC 0455-0128	gx	04h55m22s	−01°28.2'		Ori	24"	ottima / ottimo	debolissima e situata a ridosso NW di una stellina che per quanto debole ne confonde un po' la forma; spingendo a 580x appare diffusa e a tratti orientata da E a W per una 30-ina di secondi.
MAC 0455-1736	gx	04h55m05s	−17°36.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la visione è un po' disturbata da una stellina brillante situata un paio di primi a E.
MAC 0456-0049	gx	04h56m42s	−00°49.6'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0457-0051	gx	04h57m35s	−00°51.6'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 0457-1727	gx	04h57m18s	−17°27.2'		Lep	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' verso S e una coppia di deboli stelline a un paio di primi NW — 450x.
MAC 0458-0017	gx	04h58m38s	−00°17.5'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
MAC 0458-0103	gx	04h58m49s	−01°03.2'		Ori	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso S — 450x.
MAC 0459-0006	gx	04h59m14s	−00°06.1'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare in visione distolta a 450x, non più estesa di 20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S; sempre a S, ma a poco meno di 1' di distanza, ce n'è un'altra brillante.
MAC 0459-0009	gx	04h59m39s	−00°09.3'		Ori	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda diffusa con Ø di una 20-ina di secondi, situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele il cui vertice più acuto punta a NE; c'è una stella brillante a 1' NW — 450x.
MAC 0459-0025	gx	04h59m17s	−00°25.3'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debolissima e a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ~ 45" SW di una stellina — 450x.
MAC 0459-0030	gx	04h59m21s	−00°30.4'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola e condensata, estesa < 20"; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline a W — 450x.
MAC 0459-0109	gx	04h59m36s	−01°09.5'		Ori	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 30-ina di secondi in direzione E-W; appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si fa correre lo sguardo tra le due deboli stelline situate 1.5' a S e SE — 450x.
MAC 0459-1112	gx	04h59m42s	−11°12.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo orientato da NE a SW ed esteso una 30-ina di secondi; appare in visione distolta subito a S di una stellina, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
MAC 0500-1728	gx	05h00m06s	−17°29.0'		Lep	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, estesa una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile al bordo NW — 450x.
MAC 0501-0413	gx	05h01m38s	−04°13.4'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di max 15" — 450x.
MAC 0502-1225	gx	05h02m28s	−12°25.7'		Lep	24"	m. buona / discreto	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta; in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0503-0111	gx	05h03m29s	−01°11.5'		Ori	24"	ottima / discreto	appare elusivamente in visione distolta, di forma indistinta ma comunque non più estesa di 15" o 20" — 450x.
MAC 0504-1545	gx	05h04m38s	−15°45.4'		Lep	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente a meno di 1' N si MCG-3-13-62, non più estesa di 10" o 15" — 450x.

MAC 0509-0026	gx	05h09m56s	−00°26.7'		Ori	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
MAC 0510-0025	gx	05h10m14s	−00°25.0'		Ori	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0510-0043	gx	05h10m09s	−00°43.0'		Ori	24"	ottima / discreto	debolissima e molto piccola, a 450x appare a ridosso NW di MCG+0-14-8.
MAC 0510-0047	gx	05h10m11s	−00°47.0'		Ori	24"	ottima / discreto	debolissima, appare in visione distolta, ma è poco meglio evidente scalando a 340x, molto diffusa, forse rotonda con Ø < 30" (situata 4' a S di MCG+0-14-8).
MAC 0510-0300	gx	05h10m47s	−03°00.6'		Ori	24"	m. buona / buono	piccola e relativamente brillante, con nucleo stellare marcato (ma potrebbe anche trattarsi di una stellina sovrapposta), allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (situata 14' a W di MCG-1-14-4) — 450x.
MAC 0514-0325	gx	05h14m24s	−03°25.5'		Ori	24"	ottima / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x
MAC 0514-0330	gx	05h14m53s	−03°30.1'		Ori	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina situata quasi a ridosso verso SW (situata 12.5' a WSW di MCG-1-14-7) — 450x.
MAC 0515-0357	gx	05h15m44s	−03°57.7'		Ori	24"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, a 580x appare rotonda con Ø < 20"; c'è una coppia serrata quasi irrisolta di deboli stelline a ridosso S; una stellina più brillante si trova subito a N.
MAC 0515-1327	gx	05h15m38s	−13°27.4'		Lep	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, estesa sì e no 15", appare elusivamente subito a NE di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0516-0344	gx	05h16m24s	−03°44.2'		Lep	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina al bordo SE (altre stelline poco più brillanti si trovano nei dintorni della gx verso E) — 450x.
MAC 0519-1728	gx	05h19m08s	−17°28.7'		Lep	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
MAC 0523-1717	gx	05h23m03s	−17°17.1'		Lep	24"	m. buona / buono	debolissima e di luminosità uniforme, solo a momenti appare orientata da NE a SW, con dimensioni grosso modo di 30"×15", ma non bisogna scendere sotto i 450x (anche per via della SAO 150391 di 8ª grandezza situata 4' a N.
MAC 0536-1514	gx	05h36m12s	−15°14.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 80"×20" — 450x.
MAC 0540-1137	gx	05h40m29s	−11°37.5'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0823-1501	gx	08h23m52s	−15°01.3'		Pup	24"	m. buona / scarso	molto debole e piccola, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE, di dimensioni 20"×15" e con condensazione centrale stellare — 340x.
MAC 0823-1502	gx	08h23m27s	−15°02.2'		Pup	24"	m. buona / scarso	piccola debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è un minuscolo piccolo triangolo isoscele ottusangolo a ridosso di NE — 340x.
MAC 0827-0103	gx	08h27m13s	−01°03.4'		Hya	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente in visione distolta come una stellina appena percettibile situata a meno di 1' di NE di CGCG 4-27 — 450x.
MAC 0828-0704	gx	08h28m48s	−07°04.5'		Hya	16"	ottima / m. buono	è un'elusiva macchiolina estesa, sì e no 10" o 15", che appare solo in visione distolta a 380x subito a NE di una debole stellina; solo a momenti appare un nucleo stellare.
MAC 0831-0407	gx	08h31m46s	−04°07.1'		Hya	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina a 1' NE — 280x.
MAC 0832-0312	gx	08h32m27s	−03°12.3'		Hya	24"	ottima / m. buono	appare facilmente anche in visione diretta a ridosso NE di CGCG 4-47; è una piccola lama di luce orientata a perpendicolo con la compagna ed estesa una 30-ina di secondi; è purtroppo disturbata dalla SAO 136018 di 7ª grandezza situata 3' a NE — 450x.
MAC 0834-0504	gx	08h34m55s	−05°04.7'		Hya	16"	ottima / m. buono	elusiva macchiolina rotonda di max 30" di Ø; appare solo a momenti in visione distolta a 380x a ridosso NW di una stellina.
MAC 0836-0310	gx	08h36m02s	−03°10.7'		Hya	24"	ottima / m. buono	è una piccola lama di luce, molto debole, ma osservabile abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, orientata da NE a SW ed estesa una 40-ina di secondi.
MAC 0839-1434	gx	08h39m16s	−14°34.6'		Hya	24"	m. buona / scarso	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso di NE — 340x.
MAC 0851-1459	gx	08h51m42s	−14°59.1'		Hya	24"	ottima / ottimo	baffo di luce molto tenue, orientato da NE a SW ed esteso una 40-ina di secondi — 450x.
MAC 0852-1457	gx	08h52m08s	−14°57.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0853-0138	gx	08h53m08s	−01°38.8'		Hya	24"	m. buona / ottimo	appare solo a momenti come un tenuissimo nodulo al bordo W di CGCG 5-22, come se la galassia principale, che è rotonda, tentasse di allungarsi in quella direzione — 450x e 580x.
MAC 0853-0138A	gx	08h53m15s	−01°38.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	salta fuori solo a momenti in visione distolta tra due stelline appena percettibili, ma non ne capisco la forma; non sembra comunque più estesa di 10" — 580x.
MAC 0854-0702	gx	08h54m21s	−07°02.8'		Hya	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0854-0712	gx	08h54m01s	−07°12.9'		Hya	24"	m. buona / buono	piccolo oggetto rotondo, debole e relativamente compatto con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 0855-0329	gx	08h55m53s	−03°29.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da N a S, dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; c'è una doppia stretta e sbilanciata a 1' NW; una stellina appena percettibile appare elusivamente e solo a momenti a ridosso W — 450x.
MAC 0900-0714	gx	09h00m09s	−07°14.0'		Hya	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 0900-0716	gx	09h00m39s	−07°16.6'		Hya	24"	m. buona / discreto	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di 20" di Ø che appare in visione distolta a una 30-ina di secondi SW di una debole stellina — 450x.
MAC 0906-0919	gx	09h06m20s	−09°19.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata tra una debole stellina a S e una più evidente più o meno alla stessa distanza verso N — 450x.
MAC 0906-1000	gx	09h06m41s	−10°00.5'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, meglio contrastata scalando a 340x; in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 60"×30"; c'è una debole stellina subito a E.
MAC 0907-0722	gx	09h07m38s	−07°22.5'		Hya	16"	ottima / m. buono	debolissima, piccola e molto diffusa; a tratti appare poco allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 380x.
MAC 0908-0938B	gx	09h08m31s	−09°38.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 75** — molto piccola e debole, rotonda con Ø < 20 e nucleo puntiforme visibile a momenti — 450x.
MAC 0908-0949	gx	09h08m40s	−09°49.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	fa parte dell'ammasso AGC 75 — piccola e debolissima, poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso E; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a SW — 450x.
MAC 0915-0909	gx	09h15m35s	−09°09.6'		Hya	24"	m. buona / discreto	debolissima e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata in mezzo a 2 stelline orientate da NW a SE e distanti 3'; appare facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 0917-0745	gx	09h17m48s	−07°45.9'		Hya	24"	m. buona / discreto	debolissima, piccola e condensata, approssim. rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina molto debole a una 30-ina di secondi SE — 450x.
MAC 0917-1430	gx	09h17m12s	−14°30.0'		Hya	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; situata tra una stellina a W e una doppia sbilanciata a E; molto disturbata dalla SAO 155060 di 6ª grandezza situata 4.5' verso S — 450x.
MAC 0918-1255	gx	09h18m17s	−12°55.9'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina subito a SW e una doppia stretta a 1.5' NW — 450x.
MAC 0919-1214	gx	09h19m47s	−12°14.0'		Hya	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente come una stellina appena sfuocata a ridosso NNW di MCG-2-24-11 — 450x
MAC 0920-1214A	gx	09h20m24s	−12°14.3'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa, a tratti allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MAC 0925-1159	gx	09h25m54s	−11°59.5'	q 278	Hya	24"	m. buona / buono	forma una coppia interagente con NGC 2881, dalla quale però si separa solo parzialmente; sono entrambe orientate da NE a SW, di luminosità uniforme e hanno entrambe una stellina alle estremità meridionale (quella della NGC è più evidente); visualmente appare più cicciotta della NGC, con dimensioni di 30"×20" — 450x.
MAC 0929-0637	gx	09h29m55s	−06°37.4'		Hya	24"	ottima / buono	piccola e debolissima, poco diffusa, estesa < 20" anche se non riesco a capirne la forma; appare in visione distolta a 1' NW di MCG-1-24-18 — 340x.
MAC 0932-0540	gx	09h32m32s	−05°41.0'		Hya	24"	m. buona / buono	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; è allineata con 2 stelle: una brillante e l'altra, verso la gx, molto debole — 400x.
MAC 0935-0445	gx	09h35m27s	−04°45.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
MAC 0935-0446A	gx	09h35m10s	−04°46.3'		Hya	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso E — è un debolissimo lucore di forma vagamente circolare ed esteso ~ 20" (come la compagna); meglio tuttavia non scendere sotto i 450x.
MAC 0935-0446B	gx	09h35m12s	−03°46.3'		Hya	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la precedente situata a ridosso W — presenta un nucleo stellare marcato circonfuso da un tenue alone rotondo con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0935-0447A	gx	09h35m05s	−04°47.3'		Hya	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente in visione distolta come una stellina sfuocata percettibile solo a momenti — 450x.
MAC 0935-1722	gx	09h35m46s	−17°22.4'		Hya	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 0935-1723	gx	09h35m45s	−17°23.2'		Hya	24"	m. buona / buono	debolissima e oltretutto disturbata da una stellina brillante che si trova a meno di 1' verso S; non sembra comunque più estesa di 15" o 20" — 450x.
MAC 0937-0502A	gx	09h37m05s	−05°02.6'		Hya	24"	buona / discreto	debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0937-0502B	gx	09h37m10s	−05°02.5'		Hya	24"	buona / discreto	forma una coppia serrata con MCG-1-25-7 situata a ridosso verso W; appaiono ancora "impastate" a 340x, mentre è possibile sdoppiarle, seppure con difficoltà, a 450x; sono entrambe rotonde e di luminosità uniforme, ma la MCG è poco più estesa, con Ø > 20".
MAC 0938-1747	gx	09h38m56s	−17°47.9'		Hya	24"	ottima / buono	molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina quasi a ridosso SW — 450x.
MAC 0939-0014	gx	09h39m40s	−00°14.1'		Hya	24"	m. buona / ottimo	è un piccolo oggetto diffuso e condensato che aggetta a W di NGC 2951; non dovrebbe essere più esteso di 10"-12" — 450x.
MAC 0947-1453	gx	09h47m01s	−14°53.9'		Hya	24"	m. buona / buono	piccola, debole e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 0948-0629	gx	09h48m12s	−06°29.3'		Sex	24"	m. buona / buono	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 0952-1558	gx	09h52m29s	−15°58.9'		Hya	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 0952-1600	gx	09h52m36s	−16°00.6'		Hya	24"	m. buona / mediocre	più debole di MAC 0952-1558, di Ø simile, ma di luminosità più uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
MAC 0953-1228	gx	09h53m35s	−12°28.7'		Hya	24"	m. buona / m. buono	si trova a ridosso NW e praticamente a contatto con NGC 3058, ma si separa facilmente da quest'ultima a 450x; è relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme.
MAC 0953-1602	gx	09h53m03s	−16°02.3'		Hya	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, con una stellina brillante al bordo N, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×15", con tenue bulge diffuso e poco contrastato — 450x.
MAC 0953-1839	gx	09h53m32s	−18°39.5'		Hya	24"	buona / buono	appare solo a momenti in visione distolta come una piccola chiazza elusiva di forma indistinta che aggetta verso E da una stellina brillante; non dovrebbe essere più estesa di 20".
MAC 0954-0649	gx	09h54m02s	−06°49.6'		Sex	24"	m. buona / mediocre	piccola, relativamente compatta e con condensazione centrale stellare, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 0954-0650	gx	09h54m33s	−06°50.2'		Sex	24"	m. buona / mediocre	minuscolo e debolissimo oggetto esteso una decina di secondi e che salta fuori a momenti in visione distolta a ~ 45" W di una stellina.
MAC 0955-1353	gx	09h55m08s	−13°54.0'		Hya	24"	m. buona / mediocre	debolissima, ma molto piccola e relativamente compatta, in visione distolta appare a momenti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 20"×10" 450x.
MAC 0956-1341	gx	09h56m41s	−13°41.5'		Hya	24"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso verso N — 450x.
MAC 0956-1344	gx	09h56m42s	−13°45.0'		Hya	24"	m. buona / mediocre	debolissima, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; salta fuori in visione distolta quando si fissa la IC 579 (osservata in altra data) situata 1.5' a SSW — 450x.
MAC 0957-0253	gx	09h57m36s	−02°53.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 0959-0253	gx	10h00m00s	−02°53.0'		Sex	24"	ottima / buono	appare elusivamente solo ogni tanto a ridosso W di una stellina, ma occorre non scendere sotto i 450x; dovrebbe essere estesa 25" o 30".
MAC 1000-0253	gx	10h00m14s	−02°53.4'		Sex	24"	ottima / buono	anche questa appare elusivamente in visione distolta a 450x, molto piccola ed estesa sì e no una decina di secondi.
MAC 1000-0259A	gx	10h00m15s	−02°59.4'		Sex	24"	ottima / buono	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø < 20".
MAC 1000-0302B	gx	10h00m49s	−03°02.4'		Sex	24"	ottima / buono	molto debole e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1000-0305	gx	10h00m10s	−03°05.4'		Sex	24"	ottima / buono	debolissima e di luminosità uniforme, appare in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 1000-1448	gx	10h00m29s	−14°48.9'		Hya	24"	m. buona / mediocre	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø < 20".
MAC 1001-0605	gx	10h01m45s	−06°05.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata 1.5' a SW — 450x.
MAC 1002-1508	gx	10h02m24s	−15°08.5'		Hya	24"	m. buona / mediocre	debolissima, ma più che altro molto disturbata dalla SAO 155678 di 9ª grandezza situata ad appena 1' NE, rotonda, poco diffusa con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1002-1518	gx	10h02m37s	−15°18.4'		Hya	24"	mediocre / ottimo	assieme a MAC 1002-1518 forma una coppia di debolissime galassiette situate rispettivamente una 40-ina di secondi a S e a SW di una stellina abbastanza brillante; la 1ª è molto diffusa ed estesa una 15-ina di secondi; la 2ª sembra più compatta con Ø non superiore a 10" — 450x.
MAC 1002-1518A	gx	10h02m34s	−15°18.0'		Hya	24"	mediocre / ottimo	v. **MAC 1002-1518**
MAC 1002-1529	gx	10h02m52s	−15°29.3'		Hya	24"	mediocre / ottimo	molto piccola, debolissima e di forma indistinta, osservabile solo a momenti in visione distolta a 450x.
MAC 1002-1531	gx	10h02m46s	−15°32.0'		Hya	24"	mediocre / ottimo	debolissima, ma diversamente di MAC 1002-1529 appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MAC 1003-0602	gx	10h03m01s	−06°02.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1003-1524	gx	10h03m08s	−15°24.7'		Hya	24"	mediocre / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; si trova tra una coppia di stelle brillanti a SE e una doppia serrata a NW — 450x.
MAC 1003-1527	gx	10h03m34s	−15°27.6'		Hya	24"	mediocre / ottimo	debolissima e molto diffusa, estesa meno di 30"; sembra aggettare verso N dalla più orientale di una coppia di deboli stelline orientate da E a W e separate da una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1003-1530	gx	10h03m29s	−15°30.0'		Hya	24"	mediocre / ottimo	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso E — 450x.
MAC 1004-0003	gx	10h04m53s	−00°03.5'		Sex	24"	ottima / buono	è un'elusiva lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per ~ 1' che appare in visione distolta a 450x.
MAC 1005-0631	gx	10h05m02s	−06°31.5'		Sex	24"	m. buona / mediocre	molto debole, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; è poco visibile a 340x, mentre diventa relativamente facile a 450x.
MAC 1006-0123	gx	10h06m20s	−01°23.7'		Sex	24"	ottima / buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1006-0132	gx	10h06m12s	−01°32.8'		Sex	24"	ottima / buono	debolissima ed estesa sì e no una 20-ina di secondi; si riesce tuttavia a separare da UGC 5447, situata a ridosso verso S, solo in visione distolta a 450x.
MAC 1007-0009	gx	10h07m53s	−00°09.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata tra due stelline abbastanza brillanti orientate ~ da N a S e distanti 3' — 450x.
MAC 1009-0020	gx	10h09m30s	−00°20.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso S — 450x.
MAC 1011-0010	gx	10h11m21s	−00°10.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25"; meglio contrastata scalando a 340x.
MAC 1012-0239	gx	10h12m11s	−02°39.6'		Sex	24"	buona / discreto	a 200x sembra a prima vista una stellina sfuocata; a 400x è un oggetto rotondo molto piccolo e condensato con Ø max di 10" o 15".
MAC 1013-0232	gx	10h13m28s	−02°32.0'		Sex	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1013-0809	gx	10h13m45s	−09°09.3'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 340x.
MAC 1014-0113	gx	10h14m29s	−01°13.8'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, estesa < 30"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; situata all'interno di un piccolo triangolo equilatero di stelline: quella più a S è molto debole.
MAC 1014-0117	gx	10h14m28s	−01°17.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata a ridosso verso N; sono di aspetto simile, ma si separano con difficoltà a 450x; molto piccole e in visione distolta appaiono praticamente a contatto; forse rotonde con Ø non superiore a 10".
MAC 1014-0117A	gx	10h14m28s	−01°17.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	v. **MAC 1014-0117**
MAC 1015-0126	gx	10h15m18s	−01°26.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S; appare a tratti in visione distolta subito a S di una debole stellina — 450x.
MAC 1017-0219	gx	10h17m20s	−02°19.8'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1018-0610	gx	10h18m59s	−06°10.8'		Sex	24"	mediocre / ottimo	debolissima, molto piccola e condensata, di aspetto quasi stellare anche a 340x, salta fuori in visione distolta a ~ 1' NW di una debole stellina — 450x.
MAC 1018-1307	gx	10h18m10s	−13°07.1'		Hya	24"	m. buona / mediocre	debole, diffusa e di aspetto uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
MAC 1019-0319	gx	10h19m30s	−03°19.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; forma una coppia ravvicinata con CGCG 9-1 situata una 40-ina di secondi a SE — 450x.
MAC 1019-0743	gx	10h19m55s	−07°43.3'		Sex	24"	m. buona / scarso	molto piccola e debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, ma non dovrebbe essere più estesa di 15" — 340x.
MAC 1019-0746A	gx	10h19m33s	−07°46.6'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima e diffusa, solo a momenti in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una debole stellina a 1' verso E — 340x.
MAC 1019-1757	gx	10h19m28s	−17°57.3'		Hya	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 1020-0443	gx	10h20m31s	−04°43.7'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1020-0444B	gx	10h20m34s	−04°45.0'		Sex	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, molto diffusa, non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 20" — 450x.
MAC 1020-0444C	gx	10h20m47s	−04°44.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1.5' verso NW — 450x.
MAC 1020-0449	gx	10h20m57s	−04°49.6'		Sex	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente in visione distolta, meglio a 450x, forse rotonda con Ø di 20" o 25" — 450x.
MAC 1020-0457B	gx	10h20m58s	−04°57.0'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
MAC 1020-0459	gx	10h20m23s	−04°59.1'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1020-0500B	gx	10h20m22s	−05°00.0'		Sex	24"	m. buona / ottimo	situata 1' a SSW della precedente, è un elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S — 450x.
MAC 1020-0530	gx	10h20m06s	−05°30.9'		Sex	16"	m. buona / m. buono	pur essendo debolissima salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme.
MAC 1020-0630A	gx	10h20m19s	−06°30.1'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima e molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione distolta quando si fissa MCG-1-27-2 dalla quale dista poco più di 2' a NW — 340x.
MAC 1020-0631B	gx	10h20m44s	−06°32.0'		Sex	24"	m. buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 25"×20" — 340x.
MAC 1020-0642B	gx	10h20m56s	−06°42.9'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima e molto diffusa, non più estesa di 20"; salta fuori abbastanza facilmente una 30-ina di secondi a NW di una stellina — 340x.
MAC 1020-0648B	gx	10h20m38s	−06°48.4'		Sex	24"	m. buona / scarso	assieme a MAC 1020-0649B e MAC 1020-0649C forma un terzetto di galassiette molto difficili; questa è piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 340x.
MAC 1020-0649B	gx	10h20m44s	−06°49.2'		Sex	24"	m. buona / scarso	è di aspetto simile a MAC 1020-0648B, dalla quale dista 1.5' verso SE, ma ancora più debole — 340x.
MAC 1020-0649C	gx	10h20m49s	−06°49.4'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 340x.
MAC 1020-0653B	gx	10h20m23s	−06°53.2'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima e di aspetto più uniforme di MAC 1020-0654, con Ø simile — 340x.
MAC 1020-0653C	gx	10h20m38s	−06°53.3'		Sex	24"	m. buona / scarso	molto debole e con tenue bulge diffuso, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 340x.
MAC 1020-0654	gx	10h20m16s	−06°54.2'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima, con condensazione centrale stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
MAC 1020-0657	gx	10h20m20s	−06°57.3'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima e in parte disturbata da una stella brillante situata quasi a ridosso verso SW; appare a momenti poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 340x.
MAC 1020-0658	gx	10h20m51s	−06°58.6'		Sex	24"	m. buona / scarso	piccola, debolissima e diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina a ridosso verso W — 340x.
MAC 1020-0744	gx	10h20m35s	−07°44.6'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione distolta a ~ 1' W di una stellina — 340x — si trova al limite N dell'ammasso AGC 979: situata 10' NNE di MCG-1-27-1.
MAC 1020-0750	gx	10h20m11s	−07°50.9'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima, molto piccola e condensata, probabilmente rotonda con Ø di 10"-15" (a bassi ingrandimenti potrebbe essere scambiata per una stellina) — 340x — fa parte dell'ammasso **AGC 979**: situata 3.5' NW di MCG-1-27-1.
MAC 1020-0751B	gx	10h20m49s	−07°51.7'		Sex	24"	m. buona / scarso	altra galassietta debolissima e diffusa, molto piccola, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 340x — fa parte dell'ammasso AGC 979: situata 7.5' ENE di MCG-1-27-1.
MAC 1020-0753A	gx	10h20m14s	−07°53.2'		Sex	24"	m. buona / scarso	pure debolissima e molto piccola, alta fuori in visione distolta quando si osserva MCG-1-27-1 dalla quale dista 1' verso W — 340x.
MAC 1020-0803	gx	10h20m21s	−08°03.3'		Sex	24"	m. buona / scarso	anche questa è debolissima, approssim. rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a meno di 1' NE — 340x.
MAC 1021-0450B	gx	10h21m53s	−04°50.3'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile subito a NE (fa parte dell'ammasso AGC 993) — 450x.
MAC 1021-0451	gx	10h21m56s	−04°51.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	situata 1.5' a N di MCG-1-27-5, è debolissima e molto piccola, appare a tratti in visione distolta tra due deboli stelline, una a NNE e l'altra a WSW (fa parte dell'ammasso **AGC 993**) — 450x.
MAC 1021-0453	gx	10h21m22s	−04°53.1'		Sex	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1021-0454B	gx	10h21m37s	−04°54.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima e anche difficile da localizzare, perché situata in una piccola zona depleta; in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte dell'ammasso AGC 993) — 450x.
MAC 1021-0457A	gx	10h21m30s	−04°57.5'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 30"×15"; è situata tra due stelline appena percettibili, una subito a W e l'altra a ridosso E; quest'ultima, tuttavia, da un controllo successivo, è risultata essere la MAC 1021-0457B che il Megastar riporta di magnitudo 17 (fanno parte dell'ammasso AGC 993) — 450x.
MAC 1021-0457B	gx	10h21m31s	−04°57.5'		Sex	24"	m. buona / ottimo	v. **MAC 1021-0457A**
MAC 1021-0459	gx	10h21m51s	−04°59.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	fa parte, assieme alle due successive, di un trio di galassiette molto deboli, molto diffuse, di luminosità uniforme e con Ø grosso modo simile attorno ai 30"; la più evidente è MAC 1021-0500A che in visione distolta sembra aggettare a SW di una debole stellina (fanno parte dell'ammasso AGC 993) — 450x.
MAC 1021-0500A	gx	10h21m45s	−05°00.5'		Sex	24"	m. buona / ottimo	v. **MAC 1021-0459**
MAC 1021-0500B	gx	10h21m53s	−05°00.0'		Sex	24"	m. buona / ottimo	v. **MAC 1021-0459**
MAC 1021-0638A	gx	10h21m13s	−06°38.3'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima, molto piccola e a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 340x.
MAC 1021-0643	gx	10h21m28s	−06°43.6'		Sex	24"	m. buona / scarso	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 340x.
MAC 1022-0450B	gx	10h22m24s	−04°50.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (situata appena all'esterno dell'ammasso **AGC 993**) — 450x.
MAC 1022-0454D	gx	10h22m25s	−04°54.4'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni 30"×15"; un piccolissimo oggetto diffuso appare solo a momenti quasi a ridosso N, ma potrebbe trattarsi di una doppia stretta e irrisolta (fa parte dell'ammasso AGC 993) — 450x.
MAC 1022-0454E	gx	10h22m39s	−04°54.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente a E di una debole stellina, molto piccola, forse rotonda con Ø di 12"-15" (situata appena all'esterno dell'ammasso **AGC 993**) — 450x.
MAC 1024-1725	gx	10h24m59s	−17°25.6'		Hya	24"	m. buona / discreto	assieme a MAC 1024-1726 forma una coppia di debolissime galassiette situate rispettivamente a ridosso NE e SW di MCG-3-27-10; anche a 450x appaiono tuttavia come 2 stelline appena percettibili.
MAC 1024-1726	gx	10h24m56s	−17°26.6'		Hya	24"	m. buona / discreto	v. **MAC 1024-1725**
MAC 1025-0247	gx	10h25m58s	−02°47.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma non riesco a capirne la forma.
MAC 1025-0330	gx	10h25m42s	−03°30.1'		Sex	24"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø < 20"; si trova in una piccola zona depleta, per cui è un po' difficile isolarla, soprattutto a 450x.
MAC 1026-0246	gx	10h26m06s	−02°46.5'		Sex	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale stellare — 450x.
MAC 1026-0315	gx	10h26m52s	−03°15.6'		Sex	24"	m. buona / buono	è un elusivo baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina appena percettibile subito a NE.
MAC 1027-0324	gx	10h27m27s	−03°24.5'		Sex	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta subito a N di una stellina — 450x.
MAC 1028-0357	gx	10h28m51s	−03°57.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare — 450x.
MAC 1029-0315	gx	10h28m57s	−03°15.0'		Sex	24"	buona / m. buono	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 570x.
MAC 1029-0354	gx	10h29m02s	−03°54.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e leggermente condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a 1' verso N — 450x.
MAC 1031-0242	gx	10h31m50s	−02°42.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 1032-0130	gx	10h32m09s	−01°30.1'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, appare in visione distolta a 1' SE di UGC 5723, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
MAC 1032-0134	gx	10h32m11s	−01°34.6'		Sex	24"	m. buona / buono	appare a tratti come una debolissima stellina appena sfuocata, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 1032-1751	gx	10h32m16s	−17°51.1'		Sex	24"	mediocre / ottimo	è un'elusiva macchiolina rotonda con Ø < 20" che appare solo a momenti in visione distolta a 450x.
MAC 1036-1721	gx	10h36m07s	−17°21.6'		Sex	24"	mediocre / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; la visione è però disturbata dalla SAO 156089 di 9ª grandezza che si trova a 5' W — 450x.
MAC 1037-0249	gx	10h37m41s	−02°49.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1037-0712	gx	10h37m54s	−07°12.3'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1037-0726	gx	10h37m36s	−07°26.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	è un elusivo baffo di luce, orientato da N a S ed esteso una 30-ina di secondi; appare solo a momenti in visione distolta a ridosso E di una stellina molto debole, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1038-0709	gx	10h38m06s	−07°09.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1039-0214	gx	10h39m56s	−02°14.2'		Sex	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e condensata, orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; stelline percettibili solo a momenti a ridosso S — 450x.
MAC 1039-0530	gx	10h39m08s	−05°30.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una coppia stretta di stelline a 1' NW — 450x.
MAC 1039-0834A	gx	10h39m44s	−08°35.0'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debolissima e molto piccola, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; disturbata da una stellina brillante a un paio di primi SW, nonché dalla SAO 137710 di magnitudo 9.5 a 4' SW — 450x.
MAC 1039-0838	gx	10h40m00s	−08°38.5'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debolissima e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 15"-20".
MAC 1040-0214	gx	10h40m03s	−02°14.3'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola, compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1040-0227	gx	10h40m37s	−02°27.2'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1040-0847	gx	10h40m43s	−08°47.2'		Sex	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×40" — 450x.
MAC 1040-0850A	gx	10h40m25s	−08°50.2'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debolissima e diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1040-0853C	gx	10h40m54s	−08°53.3'		Sex	24"	m. buona / mediocre	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; disturbata dalla SAO 137724 di 9ª grandezza situata 4' a NE a sua volta accompagnata da una stella di 12-esima a una 40-ina di secondi SW — 450x.
MAC 1041-0255	gx	10h41m17s	−02°55.3'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1044-0232	gx	10h44m09s	−02°32.7'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1047-0219	gx	10h47m12s	−02°20.0'		Sex	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta, ma non dovrebbe essere più estesa di 10" — 450x.
MAC 1047-0220	gx	10h47m04s	−02°20.3'		Sex	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso N — 450x.
MAC 1047-0226	gx	10h47m15s	−02°26.9'		Sex	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, a 450x, a 1' SW di una stellina abbastanza brillante, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
MAC 1050-1450	gx	10h50m17s	−14°50.1'		Hya	24"	ottima / buono	debolissima lama di luce estesa ~ 45" e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E.
MAC 1052-1032	gx	10h52m55s	−10°32.9'		Crt	24"	mediocre / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta e condensata, molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1052-1036	gx	10h52m43s	−10°36.7'		Crt	24"	mediocre / ottimo	forma una coppia ravvicinata con PGC 975978, un'altra debolissima galassietta situata 1' a W; sono entrambe rotonde con Ø di max 20"; appaiono un po' a fatica in visione distolta a 450x.
MAC 1057-0617	gx	10h57m37s	−06°17.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (l'unico valido riferimento è una coppia di deboli stelline situate 2.5' a NW — 450x.
MAC 1100-0634	gx	11h00m45s	−06°34.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da E a W, di dimensioni 45"×15" e con nucleo stellare; c'è una stellina subito a S — 450x.
MAC 1101-0639	gx	11h01m12s	−06°39.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 1102-0132	gx	11h03m00s	−01°32.8'		Leo	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, a tratti condensata, estesa per max 15"; c'è una stella brillante a poco più di 1' SSE — 450x.
MAC 1102-0340	gx	11h02m08s	−03°40.5'		Leo	24"	ottima / ottimo	piccola. debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' WNW che disturba la visione — 450x.
MAC 1103-0132	gx	11h03m27s	−01°32.4'		Leo	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce, di luminosità uniforme, estesa per 30"-40", appare in visione distolta a 1' W di una stellina brillante — 450x.
MAC 1103-0132A	gx	11h03m23s	−01°32.0'		Leo	24"	ottima / ottimo	debole, in visione distolta appare più facilmente di MAC 1103-0132, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1103-0624	gx	11h03m57s	−06°24.7'		Leo	24"	m. buona / mediocre	piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; è allineata ed equidistante con una stellina a 1' SE e con la SAO 137972 di 9ª grandezza — 450x.
MAC 1103-1509	gx	11h03m57s	−15°09.9'		Crt	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' scarso SW — 450x.
MAC 1103-1519	gx	11h03m31s	−15°19.1'		Crt	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente in visione distolta a ridosso NE di una stellina molto debole; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 10"-15" — 450x.
MAC 1105-0952	gx	11h05m50s	−09°52.2'		Crt	24"	m. buona / ottimo	molto debole, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' NW e una coppia di stelline deboli alla stessa distanza verso E — 450x.
MAC 1105-0955	gx	11h05m49s	−09°55.8'		Crt	24"	m. buona / ottimo	sorta di elusiva protuberanza che in visione distolta appare a S di **MCG-2-28-48**, meglio visibile a 450x.
MAC 1105-1521	gx	11h05m09s	−15°21.0'		Crt	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a SW; una brillante si trova a 1' verso NE — 450x.
MAC 1109-0006	gx	11h09m20s	−00°06.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	elusiva e molto piccola, estesa non più di 15" o 20"; salta fuori a tratti in visione distolta a 400x.
MAC 1110-1002	gx	11h10m59s	−10°02.8'		Crt	16"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' W — 270x.
MAC 1113-1447	gx	11h13m36s	−14°47.6'		Crt	16"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza rotonda di luminosità uniforme e di ~ 30" di Ø; appare in visione distolta a 1' E di una stellina — 380x.
MAC 1115-0345	gx	11h15m49s	−03°45.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, diffusa e a tratti condensata, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1115-0349	gx	11h15m26s	−03°49.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con tenue condensazione stellare — 450x.
MAC 1115-0351	gx	11h15m52s	−03°51.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	un'altra galassietta debolissima e molto piccola, relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1115-0355	gx	11h15m34s	−03°55.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta a 450x, ma non riesco a capire com'è fatta; non sembra comunque più estesa di 15" o 20".
MAC 1116-0608	gx	11h16m27s	−06°08.5'		Crt	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, in visione distolta appare a tratti poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina subito a SW e un'altra a 1.5' NNW — 450x.
MAC 1117-0608	gx	11h17m07s	−06°08.4'		Crt	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare — 450x.
MAC 1119-1009	gx	11h19m50s	−10°09.3'		Crt	24"	m. buona / mediocre	debolissima e diffusa, appare in visione distolta, ma solo a momenti si capisce che è orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15" — 450x.
MAC 1120-0303	gx	11h20m44s	−03°03.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1120-0312	gx	11h21m00s	−03°12.1'		Leo	24"	m. buona / buono	appare elusivamente a ~ 1' W di CGCG 11-74, ma non sapendolo potrebbe essere scambiata per una stellina appena percettibile — 450x.
MAC 1120-0349A	gx	11h20m33s	−03°49.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è una piccola e debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa meno di 30"; appare in visione distolta, a 450x, a una 40-ina di secondi NE di una stellina abbastanza brillante.
MAC 1120-0410	gx	11h20m06s	+04°10.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta a 340x (a 450x il campo centrato sulla gx è virtualmente depleto), ma è poco più di una stellina sfuocata (e comunque non sembra più estesa di 10").
MAC 1120-0440	gx	11h20m13s	−04°41.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1120-0444	gx	11h20m19s	−04°40.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo orientato da NW a SE ed esteso una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' W di una stellina brillante — 450x.
MAC 1120-0453	gx	11h20m41s	−04°53.7'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 1120-0532	gx	11h20m52s	−05°32.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole estesa 1' scarso e orientata da NW a SE — 450x.
MAC 1120-0537	gx	11h20m26s	−05°37.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	elusivo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi e orientato da N a S; salta fuori solo a momenti a ~ 1' S di una stellina appena percettibile — 450x.
MAC 1120-0539	gx	11h20m52s	−05°39.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare a tratti in visione distolta a 1' S di una debole stellina; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 15"-20" — 450x.

MAC 1120-0542	gx	11h20m07s	−05°42.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso NE — 450x.
MAC 1120-0544	gx	11h20m32s	−05°44.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
MAC 1120-1012	gx	11h20m30s	−10°12.6'		Crt	24"	m. buona / mediocre	piccola, compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1121-0443	gx	11h21m21s	−04°43.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	assieme a NGC 3647 e CGCG 39-141 forma un terzetto ravvicinato di galassie molto deboli poste a triangolo isoscele molto schiacciato — delle tre è quella più piccola e compatta, con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1121-0445	gx	11h21m07s	−04°46.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1121-0539A	gx	11h21m33s	−05°40.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1121-0541	gx	11h21m05s	−05°41.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1122-0735	gx	11h22m51s	−07°35.3'		Crt	24"	m. buona / mediocre	rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, poco diffusa e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1122-0737	gx	11h22m40s	−07°37.5'		Crt	24"	m. buona / mediocre	piccola e molto debole, rotonda con Ø < 20"; appare in visione distolta quando si osserva MCG-1-29-15 situata a 3' SSE; c'è una stellina appena percettibile a ~ 1' verso S — 450x.
MAC 1123-0947	gx	11h23m40s	−09°47.7'		Crt	24"	m. buona / buono	facile, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20" (è situata a ridosso verso W di una losanga molto allungata e ricurva di 4 stelline) — 450x.
MAC 1125-1145	gx	11h25m51s	−11°45.9'		Crt	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; equidistante ma non esattamente allineata con 2 stelline a N e NNE — 450x.
MAC 1127-0612	gx	11h27m15s	−06°12.9'		Crt	24"	m. buona / buono	debolissima, ma relativamente compatta, molto piccola, orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1130-0849A	gx	11h30m48s	−08°49.2'		Crt	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 1130-0852	gx	11h30m53s	−08°52.6'		Crt	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a NE — 450x.
MAC 1130-0900	gx	11h30m19s	−09°00.5'		Crt	24"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; (più facile da individuare a 340x, perché a 450x il campo è quasi depleto).
MAC 1131-0938	gx	11h31m26s	−09°38.7'		Crt	24"	m. buona / scarso	molto debole e poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 340x.
MAC 1131-0939	gx	11h31m26s	−09°39.9'		Crt	24"	m. buona / scarso	è un'elusiva lama di luce che appare solo a momenti in visione distolta, orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi — 340x.
MAC 1131-0939A	gx	11h31m53s	−09°39.8'		Crt	24"	m. buona / scarso	assieme a MAC 1131-0939B forma una coppia di piccole e debolissime galassie distanti una 30-ina di secondi in direzione NE-SW; appaiono in visione distolta, ma si fatica un po' a separarle a 340x (il seeing non permette di spingere oltre); sono di aspetto simile ed estesi max 15" — situati 4' a N di IC 2910.
MAC 1131-0939B	gx	11h31m55s	−09°39.5'		Crt	24"	m. buona / scarso	v. **MAC 1131-0939A**
MAC 1131-0940A	gx	11h31m46s	−09°40.4'		Crt	24"	m. buona / scarso	debole, ma relativamente facile da vedere, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e nucleo stellare abbastanza marcato; forma una coppia serrata con MAC 1131-0940B — 340x — sono situate 4' a NW di IC 2910.
MAC 1131-0940B	gx	11h31m44s	−09°40.5'		Crt	24"	m. buona / scarso	è situata a ridosso di SW di MAC 1131-0940A, molto piccola e debole, forse rotonda con Ø < 20" — 340x — sono situate 4' a NW di IC 2910.
MAC 1131-0947	gx	11h31m01s	−09°47.5'		Crt	24"	m. buona / scarso	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta, forse rotonda, ma non più estesa di 20" — 340x.
MAC 1131-0958B	gx	11h31m52s	−09°58.1'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1132-1631	gx	11h32m07s	−16°31.2'		Crt	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1132-1635	gx	11h32m38s	−16°35.2'		Crt	24"	m. buona / buono	relativamente facile, diffusa e con condensazione centrale quasi stellare abbastanza contrastata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1133-0324	gx	11h33m15s	−03°24.0'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima, ma relativamente compatta, purtroppo disturbata da una stellina brillante situata a ridosso verso E; non più estesa di 15" 0 20" — 450x.
MAC 1133-1004	gx	11h33m29s	−10°04.4'		Crt	24"	m. buona / m. buono	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta a 450x, ma non riesco a capire com'è orientata; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1133-1017	gx	11h33m40s	−10°17.3'		Crt	24"	m. buona / buono	appare elusivamente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; non dovrebbe essere più estesa di 20".
MAC 1134-0929A	gx	11h34m25s	−09°29.7'		Crt	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una decina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 1134-0930	gx	11h34m43s	−09°30.5'		Crt	24"	m. buona / m. buono	forma, assieme a MAC 1134-0931 e MAC 1134-0932, un piccolo triangolo rettangolo di deboli gx coi cateti paralleli alle direzioni cardinali — molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta quando si osserva la compagna situata 1.5' a S — 450x.
MAC 1134-0931	gx	11h34m43s	−09°32.0'		Crt	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30".
MAC 1134-0932	gx	11h34m32s	−09°32.0'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto debole, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a SW — 450x.
MAC 1134-0944B	gx	11h34m26s	−09°44.3'		Crt	24"	m. buona / m. buono	è un tenue baffo di dimensioni 30"×20" e di luminosità uniforme che si diparte verso N da una stellina abbastanza brillante; un'altra stellina più debole si trova subito a W — 450x.
MAC 1134-1551	gx	11h34m45s	−15°51.1'		Crt	24"	buona / ottimo	debolissima e molto difficile da vedere, in quanto il campo nei dintorni è virtualmente depleto; solo a momenti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina a ~ 1' verso W — 450x.
MAC 1135-1537	gx	11h35m34s	−15°37.3'		Crt	24"	m. buona / scarso	debolissima e molto piccola, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' verso S e un'altra a distanza doppia a S — 450x.
MAC 1136-0929	gx	11h36m07s	−09°29.5'		Crt	24"	m. buona / scarso	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 340x.
MAC 1137-1027	gx	11h37m43s	−10°28.0'		Crt	24"	m. buona / buono	assieme a MAC 1137-1029 forma una coppia di gx molto deboli, di aspetto e dimensioni a prima vista simili, orientate da NW a SE e distanti un paio di primi in direzione NW-SE; la 1ª è tuttavia più debole e più sottile, con dimensioni grosso modo 30"×15", mentre la 2ª è più "cicciotta" ed è di 30"×20" — 450x.
MAC 1137-1029	gx	11h37m49s	−10°29.3'		Crt	24"	m. buona / buono	v. **MAC 1137-1027**
MAC 1138-0604	gx	11h38m18s	−06°04.4'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori solo a momenti in visione distolta a poco più di 1' ENE di una stellina abbastanza brillante; non sembra comunque più estesa di 10" o 15" — 450x.
MAC 1138-0608	gx	11h38m25s	−06°08.0'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1139-1008	gx	11h39m35s	−10°08.6'		Crt	24"	m. buona / scarso	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 340x.
MAC 1139-1039	gx	11h39m01s	−10°39.5'		Crt	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1140-0331	gx	11h40m12s	−03°31.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, salvo una condensazione stellare visibile però solo a momenti, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (simile a quella di CGCG 12-51 situata 4.5' a W) — 450x.
MAC 1142-1044	gx	11h42m45s	−10°44.0'		Crt	24"	m. buona / scarso	è un'elusiva lama di luce orientata da NW a SE che appare solo a momenti in visione distolta; non sembra più estesa di 30"; allineata ed equidistante con 2 stelline a N — 340x.
MAC 1142-1048	gx	11h42m14s	−10°48.8'		Crt	24"	m. buona / scarso	molto debole, rotonda con Ø poco superiore a 20" e tenue condensazione centrale stellare.
MAC 1142-1139	gx	11h42m23s	−11°39.5'		Crt	24"	buona / ottimo	assieme a MAC 1142-1141 forma una coppia di galassiette molto deboli, poco diffuse e di aspetto simile distanti un paio di primi in direzione N-S; la 1ª ha Ø di una 20-ina di secondi e sembra più uniforme; la 2ª è poco più estesa e presenta una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 1142-1141	gx	11h42m21s	−11°41.5'		Crt	24"	buona / ottimo	v. **MAC 1142-1139**
MAC 1142-1141A	gx	11h43m00s	−11°41.3'		Crt	24"	buona / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1147-1151	gx	11h47m57s	−11°51.1'		Crt	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a una 30-ina di secondi NW (la più meridionale di un piccolo triangolo isoscele di stelline piuttosto deboli).
MAC 1148-1138	gx	11h48m09s	−11°38.9'		Crt	24"	buona / ottimo	debolissima, molto piccola e di forma indistinta, non più estesa di 20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S — 450x.
MAC 1149-0324	gx	11h49m26s	−03°24.8'		Vir	24"	buona / m. buono	situata all'estremità N del gruppo di CGCG 12-97 — debolissima, anche a 450x è poco più di una stellina sfuocata; si trova in mezzo a 2 stelline orientate da NNW a SSE: quella a SSE è brillante, mentre l'altra è molto debole — 450x.
MAC 1149-0337	gx	11h49m36s	−03°37.6'		Vir	24"	buona / m. buono	fa parte del gruppo di CGCG 12-91 — debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x a ridosso E di una stellina, ma non riesco a capirne la forma.
MAC 1149-0337A	gx	11h49m10s	−03°37.1'		Vir	24"	buona / m. buono	è debolissima, ma in visione distolta appare chiaramente allungata da N a S, con dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1150-0605	gx	11h50m55s	−06°05.3'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1150-1251	gx	11h50m46s	−12°51.3'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e condensata, rotonda con Ø di 10" o 15", purtroppo molto disturbata dalla SAO 156930 di magnitudo 7.3 situata ad appena 1.5' SW — poco più di 7' a S di MCG-2-30-34.
MAC 1151-0600	gx	11h51m13s	−06°00.4'		Crt	24"	m. buona / m. buono	poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 1152-0504	gx	11h12m43s	−05°04.7'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme; solo a 570x si riesce a capire che è orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo 30"×20".
MAC 1157-1435	gx	11h57m43s	−14°35.2'		Crv	24"	m. buona / buono	piccola, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1158-0210	gx	11h58m01s	−02°10.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, ma occorre non scendere sotto i 450x, molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1203-1438	gx	12h03m13s	−14°38.6'		Crv	24"	m. buona / m. buono	incredibilmente facile, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20", con piccolo bulge marcato e nucleo stellare appena percettibile — 450x.
MAC 1207-1105	gx	12h07m17s	−11°05.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
MAC 1207-1505	gx	12h07m07s	−15°05.1'		Crv	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina a meno di 1' E — 450x.
MAC 1217-0048	gx	12h17m31s	−00°48.6'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1220-0651	gx	12h20m22s	−06°51.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce che appare con un certa difficoltà in visione distolta a 450x, orientata da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi.
MAC 1221-0538	gx	12h21m34s	−05°38.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	è una sorta di nodulo diffuso e appena percettibile che si "stacca" a SW di MCG-1-32-5 — 450x.
MAC 1233-0839	gx	12h33m40s	−08°39.4'		Vir	24"	ottima / buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso NE di una stellina; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1234-0832	gx	12h34m09s	−08°32.7'		Vir	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare visibile a tratti — 450x.
MAC 1234-0850	gx	12h34m00s	−08°51.0'		Vir	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con la successiva — sono due galassiette molto piccole e deboli che a fatica si separano a 450x; la 2ª è più facile, poco diffusa allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; la 1ª è molto piccola, estesa sì e no 12"-15" e salta fuori a momenti a ridosso NW della compagna.
MAC 1234-0851	gx	12h34m01s	−08°51.2'		Vir	24"	ottima / buono	v. **MAC 1234-0850**
MAC 1237-0121	gx	12h37m46s	−01°21.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva forma una coppia di debolissime galassiette, molto piccole ed estese una 15-ina di secondi; appaiono in visione distolta quando si osserva CGCG 14-80 situata 1.5' a NE; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 1237-0121A	gx	12h37m42s	−01°21.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	v. **MAC 1237-0121**
MAC 1238-0444	gx	12h38m42s	−04°44.5'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; è situata un paio di primi a NW di una doppia abbastanza stretta — 450x.
MAC 1238-0456	gx	12h38m35s	−04°56.3'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa ~ 40"; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
MAC 1240-0021	gx	12h40m09s	−00°21.0'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, a tratti in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15" — 450x.
MAC 1240-0521	gx	12h40m15s	−05°21.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1240-0523	gx	12h40m15s	−05°23.5'		Vir	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1240-0641	gx	12h40m57s	−06°41.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (situata 2' a SSW di PGC 42529 osservata subito prima) — 450x.
MAC 1241-0513	gx	12h41m04s	−05°13.3'		Vir	24"	buona / m. buono	piccola, debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 1241-1228	gx	12h41m37s	−12°28.9'		Crv	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a SW — 450x.
MAC 1241-1239	gx	12h41m28s	−12°39.8'		Crv	24"	m. buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30", con condensazione centrale visibile, ma poco contrastata — 450x.
MAC 1242-0547	gx	12h42m18s	−05°47.1'		Vir	24"	m. buona / buono	appare come una debole stellina leggermente sfocata situata tra MCG-1-32-38 ed MCG-1-32-39 — 400x
MAC 1242-1722	gx	12h42m05s	−17°22.1'		Crv	24"	m. buona / buono	appare elusivamente a 450x quasi a ridosso verso S di una stellina abbastanza brillante; non dovrebbe essere più estesa di 20".
MAC 1246-0403	gx	12h46m22s	−04°03.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina appena percettibile a 1' W — 450x.
MAC 1247-0410	gx	12h47m17s	−04°10.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente e solo a tratti a 1' NE di una stellina abbastanza brillante; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 30" — 450x.
MAC 1249-1010	gx	12h49m07s	−10°10.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	mappare elusivamente e solo a tratti in visione distolta a 450x; sembra molto piccola, estesa sì e no 15".
MAC 1249-1048	gx	12h49m13s	−10°48.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, di luminosità uniforme, poco diffusa, molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 1249-1053	gx	12h49m30s	−10°53.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1249-1123	gx	12h49m49s	−11°23.2'		Vir	24"	m. buona / mediocre	debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme appare abbastanza facilmente in visione distolta, orientata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
MAC 1250-0740	gx	12h50m17s	−07°40.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; è disturbata dalla SAO 138996 di 7ª grandezza situata a 3.5' NW — 450x.
MAC 1251-1046	gx	12h51m26s	−10°46.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10"; c'è una stellina a 1' verso NE; meglio tuttavia scalare a 340x.
MAC 1254-0839	gx	12h54m03s	−08°39.2'		Vir	16"	m. buona / discreto	debolissima, molto diffusa e di forma indistinta, estesa non più di 20"; appare solo in visione distolta un paio di primi a S di NGC 4780 (riportata sull'Uranometria come 4780A) — 270x.
MAC 1254-1245	gx	12h54m52s	−12°45.8'		Crv	24"	ottima / buono	piccola e debolissima, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso W — 450x.
MAC 1254-1301	gx	12h54m19s	−13°01.7'		Crv	24"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta, a tratti orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1254-1303	gx	12h54m19s	−13°03.5'		Crv	24"	ottima / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 1255-0804	gx	12h50m17s	−07°40.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente compatta, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
MAC 1255-0807	gx	12h40m57s	−06°41.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1255-0847	gx	12h55m37s	−08°47.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1255-0851	gx	12h55m10s	−08°51.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	brillante, poco diffusa e con alto gradiente di luce, allungata da E a W con dimensioni 60"×40" — 450x.
MAC 1255-1132	gx	12h55m46s	−11°32.5'		Vir	24"	ottima / buono	poco più evidente di MCG-2-33-62, dalla quale dista 1.5'a NW, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale — 450x.
MAC 1256-0807	gx	12h50m17s	−07°40.1'		Vir	24"	ottima / m. buono	baffo luminoso di dimensioni 30"×15", poco diffuso e di luminosità uniforme che aggetta verso W da una stellina brillante — 450x.
MAC 1257-1502	gx	12h57m44s	−15°02.4'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1259-1514	gx	12h59m33s	−15°14.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	appare solo a momenti a 450x come una sorta di debolissima stellina appena sfuocata a ridosso E di CGCG 71-91.
MAC 1300-1418	gx	13h00m30s	−14°18.3'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10" — 450x.
MAC 1301-1554	gx	13h02m00s	−15°54.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima, appare in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1302-1130	gx	13h02m52s	−11°30.0'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1302-1545	gx	13h02m00s	−15°54.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima, molto piccola e condensata (a 340x sembra una stellina appena sfuocata), estesa 10" o 15".
MAC 1303-1128	gx	13h03m33s	−11°28.2'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; pare di vedere, ma solo a momenti, una condensazione stellare appena accennata — 450x.
MAC 1303-1135	gx	13h03m40s	−11°35.7'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole e assai disturbata dalla SAO 157687 di 8a grandezza situata ad appena 1' NW; è molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1303-1137	gx	13h03m46s	−11°37.2'		Vir	24"	m. buona / mediocre	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15" — 450x.
MAC 1303-1141	gx	13h03m28s	−11°41.3'		Vir	24"	m. buona / mediocre	è di aspetto praticamente uguale alla precedente, sia come dimensioni, sia come orientamento — 450x.
MAC 1304-1629	gx	13h04m42s	−16°29.5'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1305-0632	gx	13h05m51s	−06°32.3'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare visibile solo a momenti; si fatica un poco a scorgerla a 450x in quanto si trova in una piccola zona depleta — 450x.
MAC 1306-0804	gx	13h06m09s	−08°04.0'		Vir	24"	buona / ottimo	è un'elusiva macchiolina rotonda, piccola e diffusa, con Ø < 20"; appare solo a momenti in visione distolta 1.5' a S di una stellina — 450x.
MAC 1309-0103	gx	13h09m27s	−01°03.7'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo, condensato ed esteso non più di 10" o 15" osservabile a 450x (appare con molta difficoltà a 340x).
MAC 1309-0652	gx	13h09m18s	−06°52.4'		Vir	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, rotonda con Ø < 40" e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare visibile solo a momenti — 450x.
MAC 1309-1637	gx	13h09m32s	−16°37.4'		Vir	24"	buona / ottimo	piccola chiazza molto tenue, estesa una 30-ina di secondi che in visione distolta aggetta a W di una stellina brillante; forse poco più evidente spingendo a 570x.
MAC 1314-0336	gx	13h14m44s	−03°36.8'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissima, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1314-0415	gx	13h14m43s	−04°15.9'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1314-0416	gx	13h14m47s	−04°16.6'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
MAC 1314-1622	gx	13h14m31s	−16°22.8'		Vir	24"	buona / ottimo	(fa parte, assieme a MAC 1314-1626 e MAC 1314-1629, del gruppo di NGC 5044 osservato col 16" in altra data) debolissima, appare a momenti in visione distolta a 1' S di una stellina, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1314-1626	gx	13h14m17s	−16°26.3'		Vir	24"	buona / ottimo	anche questa è debolissima, molto piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
MAC 1314-1629	gx	13h14m35s	−16°29.5'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima e di aspetto simile a MAC 1315-1623 — 450x.
MAC 1315-0314	gx	13h15m54s	−03°44.4'		Vir	24"	m. buona / buono	v. **CGCG 16-35**
MAC 1315-0341	gx	13h15m57s	−03°39.3'		Vir	24"	m. buona / buono	appare elusivamente in visione distolta a 1.5' S di CGCG 16-36, molto piccola, come una stellina appena sfuocata — 450x.
MAC 1315-0409	gx	13h15m44s	−04°09.8'		Vir	24"	m. buona / buono	molto debole e a tratti appena più brillante all'interno, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
MAC 1315-1614	gx	13h15m10s	−16°14.3'		Vir	24"	buona / ottimo	fa parte, assieme a MAC 1315-1623, del gruppo di NGC 5044 osservato col 16" in altra data — molto debole, poco diffusa e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; poco disturbata da una stella molto brillante situata a 1' SW (situata 9.5' a NNW di NGC 5044 — 450x.
MAC 1315-1623	gx	13h15m04s	−16°23.6'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima, piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1317-1544	gx	13h17m41s	−15°44.7'		Vir	24"	mediocre / ottimo	è un'elusiva lama di luce orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MAC 1317-1632	gx	13h17m36s	−16°32.4'		Vir	24"	m. buona / buono	appare solo elusivamente in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x; a tratti appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15".
MAC 1318-1503	gx	13h18m40s	−15°03.8'		Vir	24"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce estesa ~ 1' e orientata da N a S; appare a tratti in visione distolta, meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 1319-1513	gx	13h19m59s	−15°13.6'		Vir	24"	m. buona / discreto	elusiva e molto piccola, estesa sì e no una 15-ina di secondi; appare soltanto a momenti in visione distolta a ridosso NW di una stellina molto debole — 450x.
MAC 1320-1304	gx	13h20m11s	−13°04.5'		Vir	24"	m. buona / discreto	debolissima, salta fuori in visione distolta subito a N di una debole stellina; solo a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15"; meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
MAC 1320-1413	gx	13h20m47s	−14°13.4'		Vir	24"	m. buona / discreto	lama di luce molto debole, orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MAC 1321-1405	gx	13h21m42s	−14°05.3'		Vir	24"	m. buona / discreto	debolissima, appare in visione distolta a 1.5' NW di MCG-2-34-38, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×20"; un'elusiva stellina appare a momenti a ridosso E — 450x.
MAC 1321-1712	gx	13h21m51s	−17°12.1'		Vir	24"	mediocre / ottimo	elusiva, appare solo a momenti in visione distolta, ma non riesco a capire com'è orientata; non dovrebbe comunque essere più estesa di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1321-1721	gx	13h21m54s	−17°21.6'		Vir	24"	mediocre / ottimo	debolissima e di forma indistinta, appare solo a momenti in visione distolta a 1.5' SSE di MCG-3-34-61 — 450x.
MAC 1322-1632	gx	13h22m23s	−16°33.0'		Vir	24"	m. buona / discreto	debolissima, in visione distolta appare a tratti grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1322-1636	gx	13h22m50s	−16°36.1'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; quasi allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a S — 450x.
MAC 1322-1722	gx	13h22m07s	−17°22.6'		Vir	24"	mediocre / ottimo	appare solo a momenti come una debolissima stellina sfuocata quasi a ridosso verso S di una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 1323-1638A	gx	13h23m08s	−16°38.8'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto debole, appare in visione distolta a ridosso E di un piccolo triangolo rettangolo di stelline, approssim. rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1324-1013	gx	13h24m41s	−10°13.7'		Vir	24"	m. buona / discreto	debolissima, appare a momenti in visione distolta a 1' W di una stellina, non più estesa di 30" (meglio non scalare gli ingrandimenti) — 450x.
MAC 1325-1204	gx	13h25m31s	−12°04.3'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline a SE e SSE — 450x.
MAC 1325-1216	gx	13h25m47s	−12°16.1'		Vir	24"	m. buona / discreto	debolissima, in visione distolta appare a tratti rotonda con Ø < 30"; equidistante con 2 stelline brillanti a E e NE — 450x.
MAC 1326-1212	gx	13h26m22s	−12°13.6'		Vir	24"	m. buona / discreto	è una sorta di elusiva protuberanza che a tratti aggetta verso N dalla successiva — 450x.
MAC 1326-1213	gx	13h26m21s	−12°13.0'		Vir	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; una sorta di elusiva protuberanza che a tratti aggetta verso N è costituita dalla **MAC 1326-1212** — 450x.
MAC 1328-0019	gx	13h28m54s	−00°21.3'		Vir	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20"; un nucleo stellare è visibile solo a momenti — 450x.
MAC 1332-0301	gx	13h32m55s	−03°01.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di piccolo e debolissimo nodulo che appare a ridosso W di CGCG 17-18; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 1333-1614	gx	13h33m02s	−16°14.7'		Vir	24"	mediocre / ottimo	molto debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1336-0202	gx	13h36m46s	−02°02.5'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, probabilmente rotonda con Ø < 20".
MAC 1339-0738	gx	13h39m51s	−07°38.5'		Vir	24"	buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa e con condensazione centrale stellare, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1339-1046	gx	13h39m30s	−10°46.5'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1348-0704	gx	13h48m50s	−07°04.4'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima e molto difficile da cogliere a 450x, in quanto il campo è praticamente depleto; solo a momenti appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 1348-0724	gx	13h48m37s	−07°24.4'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina un paio di primi a SE — 450x.
MAC 1348-3032	gx	13h48m06s	−30°32.2'		Cen	24"	buona / buono	debolissima e praticamente inglobata nel piccolo alone di CGCG 102-61 situata a ridosso S; più che altro è visibile il nucleo di aspetto stellare — 450x.
MAC 1351-0602	gx	13h51m51s	−06°02.6'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola, solo a momenti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10"; la visione è disturbata da una coppia di stelline brillanti situate subito a N — 450x.
MAC 1400-0254	gx	14h00m38s	−02°54.4'		Vir	24"	ottima / m. buono	forma una coppia molto serrata con IC 968.
MAC 1401-1134	gx	14h01m46s	−11°34.5'		Vir	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta quando si osserva MCG-2-36-2 situata un paio di primi a SW — 450x.
MAC 1401-1139	gx	14h01m32s	−11°39.4'		Vir	24"	buona / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1402-1129	gx	14h02m33s	−11°29.8'		Vir	24"	buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni 20"×10" e nucleo stellare — 450x.
MAC 1402-1134	gx	14h02m16s	−11°34.2'		Vir	24"	buona / buono	debolissima, appare in visione distolta subito a N di una stellina; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1403-0559	gx	14h03m02s	−06°00.0'		Vir	24"	buona / ottimo	debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a meno di 1' verso N — 450x.
MAC 1403-0953	gx	14h03m29s	−09°53.8'		Vir	24"	buona / buono	debolissima e diffusa, probabilmente rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina brillante un paio di primi a E — 450x.
MAC 1404-0955	gx	14h04m44s	−09°55.5'		Vir	24"	buona / buono	debolissima, ma relativamente compatta e molto piccola; in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 1404-0957	gx	14h04m47s	−09°57.7'		Vir	24"	buona / buono	poco allungata da NE a SW con dimensioni 45"×30" e di luminosità uniforme; è allineata ed equidistante con una stellina molto debole a NE e una doppia stretta nella stessa direzione — 450x.
MAC 1408-1754	gx	14h08m37s	−17°54.5'		Vir	24"	m. buona / mediocre	debolissima, forse rotonda con Ø < 20", appare solo a momenti in visione distolta a 450x.
MAC 1409-1747	gx	14h09m55s	−17°47.4'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; salta fuori facilmente in visione distolta quasi a ridosso SE di una stellina — 450x.
MAC 1410-0402	gx	14h10m48s	−04°02.2'		Vir	24"	discreta / m. buono	relativamente facile, rotonda e leggermente condensata, con Ø > 20"; c'è una stella brillante a ~ 45" SW (presenza di chiarore lunare) — 450x.
MAC 1411-0404	gx	14h11m24s	−04°04.8'		Vir	24"	discreta / m. buono	debolissima (ho dovuto attendere il tramonto del falcetto di Luna), in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 30" — 450x.
MAC 1411-1014	gx	14h11m54s	−10°14.5'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
MAC 1415-0301	gx	14h15m32s	−03°01.0'		Vir	24"	discreta / m. buono	oggetto rotondo molto debole, poco diffuso e con condensazione centrale puntiforme; appare in visione distolta a 1' E di una stella; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SE — 450x.
MAC 1420-0424	gx	14h20m19s	−04°25.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e compatta, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" e nucleo stellare; c'è una stellina a ridosso verso SW — 450x.
MAC 1420-0427	gx	14h20m00s	−04°27.2'		Vir	24"	buona / ottimo	è una piccolo oggetto nebuloso esteso una 20-ina di secondi che sembra aggettare verso E da IC 997 e che conferisce a quest'ultima un aspetto un po' irregolare — 450x.
MAC 1428-0319	gx	14h28m29s	−03°19.5'		Vir	24"	discreta / m. buono	relativamente facile (di fatto appare prima di CGCG 19-40, dalla quale dista un paio di primi a W), relativamente compatta e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso SE — 450x.
MAC 1447-1724	gx	14h47m39s	−17°24.9'		Vir	24"	mediocre / ottimo	è un elusivo oggetto molto piccolo e condensato che appare solo in visione distolta a 450x.
MAC 1452-0446	gx	14h52m43s	−04°46.0'		Lib	24"	buona / buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 450x.
MAC 1455-0602	gx	14h55m22s	−06°02.6'		Lib	24"	buona / ottimo	è un piccolo e debolissimo oggetto grosso modo rotondo con Ø di una 20-ina di secondi e a tratti condensato; appare in visione distolta a 1' verso E di MCG-1-38-8 — 450x.
MAC 1458-0640	gx	14h58m57s	−06°40.1'		Lib	24"	buona / ottimo	relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale stellare — 450x.
MAC 1510-1051	gx	15h10m02s	−10°51.0'		Lib	24"	mediocre / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E; un'altra stellina, appena più evidente, si trova poco più distante sempre verso E — 450x.
MAC 1521-0731	gx	15h21m41s	−07°31.9'		Lib	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, orientata grosso modo da N a S, di dimensioni 45"×30" e con nucleo stellare visibile a momenti — 450x.
MAC 1530-0216	gx	15h30m31s	−02°16.5'		Ser	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 21-104 situata a ridosso di NW — è orientata da NW a SE con dimensioni poco inferiori alla compagne e anch'essa di luminosità uniforme — 450x.
MAC 1551-0726	gx	15h51m04s	−07°26.6'		Lib	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" con piccola condensazione centrale appena percettibile — 450x.
MAC 1559-0000	gx	15h59m53s	−00°00.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
MAC 1601-0017	gx	16h01m30s	−00°17.2'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appena più evidente di MAC 1559-0000 (osservata subito prima), molto diffusa rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' verso S — 450x.
MAC 1609-0435	gx	16h09m10s	−04°35.5'		Oph	24"	m. buona / ottimo	lama di luce molto debole, orientata da NE a SW ed estesa per ~ 1'; c'è una stellina a ridosso N (la più occidentale di una coppia orientata da E a W) — 450x.
MAC 1643-0038	gx	16h43m06s	−00°38.8'		Oph	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 25-1 situata a ridosso S — debolissimo lucore grosso modo rotondo, esteso una 20-ina di secondi e che in visione distolta sembra aggettare a SW di una stellina (la più occidentale di un piccolo triangolo isoscele rettangolo) — 450x.
MAC 1647-0013	gx	16h47m17s	−00°13.6'		Oph	24"	buona / ottimo	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 1721-0050	gx	17h21m59s	−00°50.8'		Oph	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 2006-0144	gx	20h06m38s	−01°44.0'		Aql	24"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo baffo che in visione distolta sembra aggettare a SW di una stellina per una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2008-1736	gx	20h08m22s	−17°36.6'		Cap	24"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 1.5' N di una stellina, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2022-1645	gx	20h22m20s	−16°45.3'		Cap	24"	buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 20-ina di secondi che appare in visione distolta in mezzo a 2 stelline: una a W e l'altra appena percettibile a E — 450x.
MAC 2029-0344	gx	20h29m59s	−03°44.4'		Aql	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10" — 450x.
MAC 2045-1106	gx	20h45m01s	−11°06.3'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di debolissimo baffo esteso una 40-ina di secondi che aggetta a SW da NGC 6985A; si nota facilmente in visione distolta, meglio a 450x.
MAC 2046-1538	gx	20h46m52s	−15°38.8'		Cap	24"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, estesa non più di 15" o 20"; appare in visione distolta a 450x.
MAC 2047-1258	gx	20h47m57s	−12°58.9'		Aqr	24"	buona / discreto	debolissima e poco diffusa, appare in visione distolta a 450x, probabilmente rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
MAC 2055-0400	gx	20h55m58s	−04°00.0'		Aqr	16"	ottima / ottimo	baffo di dimensioni 40"×30" che si diparte verso SE da una stella brillante; è relativamente facile a 380x.
MAC 2056-1424	gx	20h56m26s	−14°24.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x.
MAC 2056-1629	gx	20h56m58s	−16°29.5'		Cap	16"	ottima / buono	debolissimo oggetto relativamente compatto con Ø di 15"-20" che appare in visione distolta a 380x senza grandi difficoltà.
MAC 2101-1352	gx	21h01m02s	−13°52.7'		Aqr	24"	buona / m. buono	molto debole e molto piccola, allungata da N a S, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare — 450x.
MAC 2101-1355	gx	21h01m37s	−13°55.7'		Aqr	24"	buona / m. buono	piccola, debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2101-1524	gx	21h01m01s	−15°24.2'		Cap	24"	buona / discreto	debolissima e diffusa, in visione distolta appare a tratti allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
MAC 2102-1352	gx	21h02m53s	−13°52.1'		Aqr	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare a momenti in visione distolta a 450x; non dovrebbe essere più estesa di 10"-15".
MAC 2103-1351	gx	21h03m08s	−13°51.6'		Aqr	24"	buona / m. buono	debole, ma relativamente facile e compatta, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile subito a S — 450x.
MAC 2105-1036	gx	21h05m13s	−10°36.3'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, immersa nei bagliori della SAO 164133 di magnitudo 8.5, poco allungata da NE a SW con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 2105-1037	gx	21h05m56s	−10°37.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2105-1427	gx	21h05m50s	−14°27.9'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima, poco diffusa e con condensazione centrale stellare visibile solo a momenti; appare abbastanza facilmente in visione distolta, a 450x, a N di una stellina.
MAC 2109-0158	gx	21h09m24s	−01°58.1'		Aqr	24"	buona / buono	poco diffusa e condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 450x.
MAC 2111-0122	gx	21h11m46s	−01°22.3'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, piccola e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
MAC 2112-0015	gx	21h12m11s	−00°15.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, allungata da N a S con condensazione centrale osservabile solo a momenti — 450x.
MAC 2116-0634	gx	21h16m36s	−06°34.9'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare a momenti allungata da N a S con dimensioni 30"×20", ma è meglio scalare a 450x.
MAC 2120-0447	gx	21h20m43s	−04°47.8'		Aqr	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto elusivo esteso non più di 15"-20" che appare solo a momenti in visione distolta a 380x presenza di chiarore lunare.
MAC 2129-1127	gx	21h29m49s	−11°28.0'		Cap	24"	discreta / buono	piccola chiazza molto tenue, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi che aggetta a W da una stellina abbastanza brillante — 450x.
MAC 2131-0538	gx	21h31m55s	−05°38.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, malgrado la vicinanza con la β Aquarii di 3ª grandezza situata 7' a NW; è compatta e condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 2142-0652	gx	21h42m49s	−06°52.1'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; ci sono due deboli stelline a NW e NE (assieme a MCG-1-55-4 sono le componenti più brillanti dell'ammasso **AGC 2366**) — 450x.
MAC 2142-1654	gx	21h42m01s	−16°54.2'		Cap	24"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, estesa < 20"; appare in visione distolta subito a E di una stellina.
MAC 2144-0632	gx	21h44m28s	−06°32.4'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" (o poco meno) — 450x.
MAC 2144-0711	gx	21h44m23s	−07°11.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso; salta fuori in visione distolta a ridosso SW di una stellina, ma la visione è compromessa dalla forte luce della SAO 145624 di magnitudo 6.6 ad appena 3' NW — 450x.
MAC 2147-0621	gx	21h47m39s	−06°21.8'		Aqr	24"	buona / mediocre	più facile di MCG-1-55-10, dalla quale dista 5.5' verso N, diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N — 400x.
MAC 2153-1317	gx	21h53m42s	−13°17.6'		Cap	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e appena più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
MAC 2157-0747A	gx	21h57m29s	−07°47.7'		Aqr	24"	discreta / buono	assieme alla successiva forma una coppia abbastanza ravvicinata di piccole e deboli macchioline di luce grosso modo rotonde con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte dell'ammasso **AGC 2399**) — 450x.
MAC 2157-0747C	gx	21h57m33s	−07°47.6'		Aqr	24"	discreta / buono	v. **MAC 2157-0747A**

MAC 2157-0750	gx	21h57m02s	−07°50.4'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (fa parte dell'ammasso **AGC 2399**) — 340x.
MAC 2158-0750A	gx	21h58m06s	−07°50.7'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 40"×20" ; meglio evidente a 340x (fa parte dell'ammasso **AGC 2399**).
MAC 2159-1217	gx	21h59m50s	−12°17.2'		Aqr	24"	buona / mediocre	piccola e debolissima, appare in visione distolta, a 400x, a 1' N di una stellina; forse rotonda con Ø < 30".
MAC 2159-1344	gx	21h59m53s	−13°44.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 15-ina di secondi, relativamente compatto e di luminosità uniforme (ho tentato di osservare anche la MAC 2200-1342, 6' più a ENE, ma sono riuscito a vedere solo quella stellina appena percettibile situata a 1' SSW) — 450x.
MAC 2202-0917	gx	22h02m33s	−09°17.5'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; solo a momenti appare leggermente condensata; c'è una stellina a 1' NE — 450x.
MAC 2202-1008	gx	22h02m07s	−10°08.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare senza gran difficoltà in visione distolta a 450x; non dovrebbe essere più estesa di 10"-15".
MAC 2216-0446	gx	22h16m58s	−04°46.0'		Aqr	16"	m. buona / discreto	poco più debole e più piccola di MCG-1-56-3, dalla quale dista 4' a SE, e di aspetto più diffuso; è rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
MAC 2217-0445	gx	22h17m19s	−04°45.5'		Aqr	16"	m. buona / discreto	molto debole e molto piccola, a 380x appare allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con piccolo bulge evidente.
MAC 2232-0927	gx	22h32m42s	−09°27.8'		Aqr	24"	discreta / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; una debole stellina si trova un paio di primi a SW — 340x.
MAC 2253-1009	gx	22h53m52s	−10°09.8'		Aqr	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, di luminosità uniforme, diffusa, rotonda con Ø < 20"; appare facilmente in visione distolta a 450x.
MAC 2254-1514	gx	22h54m07s	−15°14.2'		Aqr	24"	discreta / buono	appare solo a momenti come una stellina a ridosso W di **Arp 110** — 340x.
MAC 2257-0857	gx	22h57m17s	−08°57.8'		Psc	24"	m. buona / buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
MAC 2258-0357	gx	22h58m09s	−03°57.6'		Aqr	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, situata a ridosso SE di una stellina abbastanza brillante; è allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
MAC 2300-1447	gx	23h00m37s	−14°47.4'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole e molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; situata un paio di primi a E di una stella brillante — 3' a NNE di MCG-3-58-17.
MAC 2303-0712	gx	23h03m33s	−07°12.2'		Aqr	16"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto diffuso molto debole, rotondo con Ø max d 20" e condensazione centrale stellare; poco più evidente a 380x.
MAC 2305-0834	gx	23h05m30s	−08°34.8'		Aqr	24"	buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e con nucleo stellare visibile a tratti a 400x, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15".
MAC 2315-0120	gx	23h15m46s	−01°20.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta e facilmente osservabile in visione distolta a 450x, molto piccola, orientata da N a S con dimensioni 20"×10".
MAC 2330-0227	gx	23h30m13s	−02°27.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	appare in visione distolta come una stellina appena percettibile situata a ridosso verso W di MCG-1-59-26 — 450x.
MAC 2331-0057	gx	23h31m51s	−00°57.8'		Psc	24"	buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; la visione è disturbata dalla SAO 146756 di 6ª grandezza situata 7.5' a SSE che si fatica a tenere fuori campo a 450x.
MAC 2332-0050	gx	23h32m25s	−00°50.8'		Psc	24"	buona / discreto	molto debole e diffusa, di forma indistinta, estesa una 20-ina di secondi; appare in visione distolta a 450x un paio di primi a S di una stellina brillante.
MAC 2336-0931	gx	23h36m34s	−09°31.5'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
MAC 2337-0028	gx	23h37m52s	−00°28.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto disturbata da una stellina brillante situata a ~ 1' SW, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
MAC 2338-0027	gx	23h38m11s	−00°27.7'		Psc	24"	m. buona / ottimo	è un'elusiva macchiolina forse rotonda ed estesa una 20-ina di secondi; salta fuori in visione distolta a 450x in una piccola plaga quasi depleta.
MAC 2340-0807	gx	23h40m52s	−08°07.5'		Aqr	24"	ottima / ottimo	è debolissima, ma molto piccola e appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10" o 15".
MAC 2340-1148	gx	23h40m10s	−11°48.6'		Aqr	16"	ottima / ottimo	è un'elusiva macchiolina rotonda visibile a tratti nel mezzo di 2 stelline distanti 6' in direzione NNW-SSE (quella meridionale è molto debole); non è più estesa d 25"-30"; meglio osservabile a 270x.
MAC 2341-0331	gx	23h41m29s	−03°31.4'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	è un elusivo oggetto che appare solo a momenti in visione distolta quando si osserva IC 1505; è comunque molto piccola ed estesa non più di una 15-ina di secondi — 380x
MAC 2341-0629	gx	23h41m10s	−06°29.6'		Aqr	24"	ottima / ottimo	salta fuori con molta difficoltà nei bagliori di una stella brillante di magnitudo 8.6 situata appena 1' a N; meglio spingere a 570x; appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme.
MAC 2341-0644	gx	23h41m45s	−06°44.1'		Aqr	24"	ottima / ottimo	più piccola di MAC 2341-0629, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
MAC 2342-0334	gx	23h42m04s	−03°34.9'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	debolissima, ma appare in visione distolta senza difficoltà a 380x, estesa max una 20-ina di secondi.
MAC 2344-0206	gx	23h44m48s	−02°06.9'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10" — 450x.
MAC 2344-0803	gx	23h44m19s	−08°03.8'		Aqr	24"	discreta / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
MAC 2345-0144	gx	23h45m40s	+01°44.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; purtroppo è disturbata dalla SAO 128368 di magnitudo 8.5' che anche a 450x non si riesce a tenere fuori campo.
MAC 2345-0703	gx	23h45m57s	−07°03.9'		Aqr	24"	buona / buono	fa parte del gruppo di MCG-1-60-29 — debolissima e molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 400x.
MAC 2345-2549	gx	23h45m10s	−25°49.4'		Scl	24"	ottima / mediocre	salta fuori a momenti in visione distolta a 1.5' NW di ESO 537-5, ma appare solo come una stellina debolmente sfuocata — 340x.
MAC 2346-0701	gx	23h46m21s	−07°01.9'		Aqr	24"	buona / buono	fa parte del gruppo di MCG-1-60-29 — è forse la più facile delle 7 osservate: appare molto piccola, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 400x.
MAC 2346-0704	gx	23h46m08s	−07°04.1'		Aqr	24"	buona / buono	fa parte del gruppo di MCG-1-60-29 — di dimensioni simili a MAC 2345-0703, ma ancora più debole, appare solo a momenti in visione distolta a 1' S di una stellina appena percettibile — 400x.
MAC 2348-0208	gx	23h48m32s	−02°08.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; tutto sommato è meglio restare a 450x, anche se la gx tende ad apparire solo in visione distolta.
MAC 2348-0221	gx	23h48m40s	−02°21.7'		Psc	16"	ottima / scarso	è un elusivo oggetto rotondo di 20"-25" di Ø che appare solo a momenti in visione distolta, meglio a 380x, malgrado il seeing scarso.
MAC 2349-0216	gx	23h49m20s	−02°16.7'		Psc	16"	ottima / scarso	molto debole, ma si vede più facilmente di MCG-1-60-43, dalla quale dista 5' verso E; è in pratica una piccola lama di luce orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; presenta un nucleo puntiforme visibile a tratti a 270x.
MAC 2349-1942	gx	23h49m43s	−19°42.2'		Aqr	24"	ottima / mediocre	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, appare in visione distolta un paio di primi a W di una stellina brillante; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MAC 2350-2756	gx	23h50m25s	−27°56.4'		Scl	24"	ottima / mediocre	è un elusivo baffo di luce orientato da N a S ed esteso sì e no 30"; appare solo a momenti in visione distolta a 340x.
MAC 2353-2521	gx	23h53m20s	−25°21.1'		Scl	24"	ottima / mediocre	debolissima e molto diffusa, in visione distolta è approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
MAC 2354-0345	gx	23h54m52s	−03°45.8'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce che appare come tale solo a momenti in visione distolta, orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi — 450x.
MAC 2355-0938	gx	23h55m38s	−09°38.0'		Aqr	24"	ottima / ottimo	è piccolo oggetto diffuso esteso una 20-ina di secondi e osservabile in visione distolta a 450x; situata 1.5' a NE di MCG-2-1-1.
MAC 2356-0017	gx	23h56m25s	−00°17.7'		Psc	24"	m. buona / discreto	appare elusivamente in visione distolta a ~ 1.5' NE di IC 1517, ma anche a 450x è null'altro che una stellina sfocata — 450x.
MAC 2358-2143	gx	23h58m46s	−21°43.8'		Cet	24"	ottima / mediocre	piccola e molto debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NNE — 340x.
PGC 1	gx	23h59m59s	+00°42.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×15"; a tratti appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se trattasi del nucleo o di una stellina sovrapposta — 450x.
PGC 184	gx	00h02m46s	−03°33.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto piccola e compatta, a 450x appare rotonda con Ø di 10"-12" (riportata sul Megastar come **8ZW 1**).
PGC 368	gx	00h05m19s	+32°58.6'		And	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con **PGC 369** situata a ridosso SW (v. descrizione successiva) — è riportata sul Megastar come **Kaz 14** — 580x.
PGC 369	gx	00h05m18s	+32°58.5'		And	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con PGC 368 situata a ridosso NW — appaiono ancora "impastate" a 450x e si riescono a separare soltanto spingendo a 580x; sono due piccole galassiette molto deboli, di aspetto simile ed estese sì e no 10"-12"; la 1a è appena più evidente.
PGC 475	gx	00h07m17s	−13°26.9'		Cet	24"	buona / buono	debolissima e molto diffusa, non più estesa di 30"; solo a tratti osservando a 400x appare leggermente condensata.
PGC 656	gx	00h09m01s	−01°00.8'		Psc	24"	m. buona / discreto	piccolo e debolissimo oggetto forse circolare con Ø non superiore a 15"; a 450x appare senza grandi difficoltà in visione distolta a 1.5' WNW di una stellina abbastanza brillante (riportata sul Megastar come **UM 206**).
PGC 761	gx	00h10m39s	+11°00.6'		Psc	24"	discreta / buono	piccola e molto debole, situata in una zona di cielo depleta; si fatica un poco a vederla a 450x; c'è un piccolo triangolo di stelle brillanti a 7' WNW.
PGC 1022	gx	00h15m17s	−06°20.7'		Cet	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo con Ø di 20", piccolo, relativamente compatto; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline: una a SW e l'altra a NW (riportata sul Megastar come **8ZW 12**).
PGC 1159	gx	00h17m54s	+33°43.1'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (o poco meno); è riportata sul Megastar come **Kaz 22** — 450x.
PGC 1220	gx	00h18m55s	+30°30.8'		And	28"	m. buona / m. buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (o poco più) — 495x.
PGC 1250	gx	00h19m15s	+04°07.9'		Psc	24"	buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 408-47 a N — sono due macchioline rotonde molto deboli, di aspetto a prima vista simili, situate a ridosso rispettivamente SW e NW di una stellina abbastanza brillante; la compagna è poco poco più estesa e più distante dalla stella; sono entrambe di luminosità uniforme con dimensioni rispettivamente di 15" e 20".
PGC 1280	gx	00h20m00s	+44°15.5'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina a ridosso S (riportata sul Megastar come **5ZW 13**) — 450x.
PGC 1579	gx	00h25m11s	−13°18.3'		Cet	16"	m. buona / m. buono	è un elusivo oggetto forse rotondo di dimensioni max 20"; appare a tratti in visione distolta a 380x (riportata sul Megastar come **8ZW 22**).
PGC 1623	gx	00h26m02s	−02°26.0'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, ma soprattutto molto difficile da vedere a 450x in quanto situata in una zona di cielo depleta: meglio dunque scalare a 340x; è molto piccola e compatta, forse rotonda con Ø di una decina di secondi (riportata sul Megastar come **UM 242**).
PGC 1830	gx	00h29m56s	+03°21.3'		Peg	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia di stelline brillanti un paio di primi a N (riportata sul Megastar come **UM 41**) — 450x.
PGC 1930	gx	00h31m64s	−02°09.3'		Cet	24"	buona / ottimo	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 10"-15"; forma un piccolo triangolo isoscele aperto con 2 deboli stelline subito a N (riportata sul Megastar come **UM 254**) — 450x.
PGC 2065	gx	00h34m30s	+30°23.9'		And	28"	m. buona / discreto	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una coppia di stelline a 1' verso W — 495x.
PGC 2207	gx	00h37m01s	+03°26.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	è un'elusiva lama di luce estesa ~ 1' e orientata da E a W; è osservabile in visione distolta a 450x (a 340x appare solo a momenti); è riportata sul Megastar come **UM 51**.
PGC 2213	gx	00h37m04s	−01°09.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso W — 450x.
PGC 2271	gx	00h37m58s	+29°34.7'		And	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; situata nel mezzo tra una stellina a 1' SE e una appena percettibile a NW (si trova praticamente al centro dell'ammasso **AGC 71**) — 495x.
PGC 2293	gx	00h38m27s	+04°02.5'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" (riportata sul Megastar come **UM 54**) — 450x.
PGC 2303	gx	00h38m34s	−09°06.8'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente compatta, molto piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme (riportata sul Megastar come **8ZW 32**) — 380x.
PGC 2410	gx	00h40m04s	+05°13.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	anche questa è relativamente compatta, pur essendo molto debole; in visione distolta appare allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e di luminosità uniforme (riportata sul Megastar come **UM 58**) — 450x.
PGC 2549	gx	00h42m37s	−10°49.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	anche spingendo a 570x appare elusivamente in visione distolta come una stellina appena sfuocata (riportata come **Kaz 366** sul Megastar).
PGC 2801	gx	00h47m47s	−01°48.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata quasi a ridosso SE di una stellina abbastanza brillante (riportata sul Megastar come **UM 277**) — 450x.
PGC 2849	gx	00h48m38s	+01°24.3'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, salta fuori in visione distolta a 450x, probabilmente rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
PGC 2859	gx	00h48m50s	+01°22.3'		Cet	24"	m. buona / buono	appare senza difficoltà in visione distolta in mezzo a 2 stelline che tendono in qualche modo a delimitare il campo oculare (distanti una decina di primi), poco diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 2972	gx	00h50m47s	−12°54.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debolissima stellina a 1' SE e un'altra poco più brillante e più distante a NW (riportata sul Megastar come **Kaz 376**) — 450x.
PGC 3291	gx	00h55m45s	+00°38.3'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima, appare quasi a ridosso SW di PGC 3291, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 3294	gx	00h55m46s	+00°38.7'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
PGC 3305	gx	00h55m56s	−01°14.8'		Cet	24"	buona / buono	fa parte assieme a PGC 3319 dell'ammasso **AGC 119** — relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
PGC 3319	gx	00h56m07s	+26°17.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	appare in visione distolta come una stellina sfuocata appena percettibile subito a SE di CGCG 480-22, allineata ed equidistante con altre 2 stelline più brillanti — 450x.
PGC 3350	gx	00h56m21s	−01°10.6'		Cet	24"	buona / buono	debole, molto piccola e poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a E — 450x.
PGC 3415	gx	00h57m14s	−00°38.8'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta a 1.5' NNW di MCG+0-3-40 — 450x.
PGC 3492	gx	00h58m25s	−01°23.7'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta, meglio a 450x (a 340x il maggior campo oculare ne facilita la ricerca, ma la gx tende a stemperarsi), probabilmente rotonda con Ø < 20".
PGC 3938	gx	01h06m45s	+06°38.0'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; disturbata dalla SAO 109680 di magnitudo 8.6 situata un paio di primi a N (riportata sul Megastar come **UM 85**) — 450x.
PGC 4011	gx	01h07m49s	+41°59.7'		And	24"	buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; disturbata da una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso S; riportata sul Megastar come **5ZW 51** — 450x.
PGC 4088	gx	01h08m53s	+13°20.2'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la visione è un po' disturbata dalla SAO 92278 di 8ª grandezza situata 4.5' a E — 450x.
PGC 4109	gx	01h09m11s	−15°29.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso E; meglio definita scalando a 340x, nonostante la presenza di debole chiarore lunare.
PGC 4193	gx	01h10m39s	+17°31.1'		Psc	24"	buona / m. buono	piccola macchiolina rotonda, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, non più estesa di 15"; situata a ridosso NW di una stellina — 450x.
PGC 4205	gx	01h10m43s	+17°41.0'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 4209	gx	01h10m46s	+17°59.4'		Psc	24"	buona / m. buono	debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione centrale appena accennata — 450x.
PGC 4229	gx	01h11m03s	+17°39.7'		Psc	24"	buona / m. buono	molto debole, rotonda con dimensioni analoghe a IC 1634.
PGC 4242	gx	01h11m09s	+17°51.0'		Psc	24"	buona / m. buono	debolissima e diffusa, a 450x in visione distolta sembra rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
PGC 4277	gx	01h11m31s	+17°36.6'		Psc	24"	buona / m. buono	anche questa è debolissima, molto piccola e con dimensioni inferiori a PGC 4229 ; è visibile in distolta a 450x.
PGC 4310	gx	01h12m02s	+49°28.6'		Cas	28"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo di stelline: brillante quella a N, molto deboli le due a W e SE — 495x.
PGC 4510	gx	01h15m06s	+00°19.3'		Cet	24"	buona / discreto	è un piccolo e debolissimo oggetto rotondo esteso non più di 15" — 450x.
PGC 4513	gx	01h15m07s	+00°27.9'		Cet	24"	buona / discreto	è molto debole, ma appare abbastanza facilmente a 450x in visione distolta subito a N di una stellina brillante.
PGC 4521	gx	01h15m13s	+00°20.5'		Cet	24"	buona / discreto	debolissima e molto piccola, estesa sì e no una decina di primi (a 340x appare di fatto come una stellina appena percettibile); situata a ridosso SW di una stellina molto debole dalla quale si separa facilmente spingendo a 580x.
PGC 4858	gx	01h20m48s	−03°39.2'		Cet	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa, con piccola condensazione centrale evidente, poco allungata da NW a SE con dimensioni 40"×30" — 450x.
PGC 4984	gx	01h22m10s	−02°33.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi o poco più; meglio contrastata scalando a 340x.
PGC 4990	gx	01h22m21s	+19°35.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 4999	gx	01h22m32s	−02°24.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" (quasi una edge-on) e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW — 450x.
PGC 5025	gx	01h22m49s	+00°02.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a S: quella più vicina alla gx è appena percettibile — 450x.
PGC 5100	gx	01h23m42s	+33°12.1'		Psc	28"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata con 2 stelline abbastanza brillanti a NE (nel campo sono presenti numerose altre gx osservate col 24" in altra data) — 495x.
PGC 5156	gx	01h24m24s	+01°38.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte di un gruppo appartenente all'ammasso **AGC 189** osservato a suo tempo col 16") — 450x.
PGC 5176	gx	01h24m26s	−01°24.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 194** le cui componenti principali erano già state osservate col 16" in altra data — molto debole e diffusa, in visione distolta appare a tratti allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
PGC 5235	gx	01h24m59s	+01°33.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta come "incastrata" tra 2 stelline brillanti distanti ~ 1' in direzione NNE-SSW; a tratti appare allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
PGC 5306	gx	01h25m48s	−01°29.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso **AGC 194** le cui componenti principali erano già state osservate col 16" in altra data — molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
PGC 5384	gx	01h26m46s	−00°38.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma più che altro situata in una piccola plaga depleta a 450x; è molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" (riportata sul Megastar come **UM 323**).
PGC 5531	gx	01h28m48s	+40°19.1'		And	28"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina subito a W (è riportata sul Megastar come **5ZW 71**) — 495x.
PGC 5935	gx	01h35m55s	−05°29.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza approssim. circolare estesa < 30" e uniforme; una doppia irrisolta dalle componenti molto deboli si trova a 1' a SW e dà palesemente l'impressione di un piccolo oggetto diffuso — 450x.
PGC 5996	gx	01h37m07s	−09°09.0'		Cet	16"	ottima / m. buono	fa parte del quartetto di MCG-2-5-20 — debolissimo oggetto rotondo, diffuso, di una 20-ina di secondi con Ø e con condensazione centrale visibile a tratti 380x.
PGC 6056	gx	01h38m23s	+02°56.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (riportata sul Megastar come **UM 350**) — 450x.
PGC 6273	gx	01h42m11s	+29°35.1'		Tri	28"	m. buona / buono	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a N e una poco più distante a SE (riportata sul Megastar come **5ZW 90**) — 495x.
PGC 6487	gx	01h46m08s	+28°46.2'		Tri	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata a ridosso SE di una stellina: quest'ultima fa parte di un piccolo triangolo isoscele rettangolo (riportata sul Megastar come **5ZW 103**) — 450x.
PGC 6509	gx	01h46m28s	+06°04.9'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, condensata, rotonda con Ø di una decina di secondi; appare abbastanza facilmente anche in visione diretta a 1.5' SE di una stellina brillante (riportata sul Megastar come **UM 138**) — 450x.
PGC 6510	gx	01h49m18s	+85°15.7'		Cep	16"	ottima / ottimo	è una macchia di aspetto un po' irregolare, poco allungata da E a W con dimensioni 45"×30", diffusa e con nucleo stellare visibile abbastanza facilmente — 380x.
PGC 6658	gx	01h49m17s	+33°05.3'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE e una più debole alla stessa distanza SSE (riportata sul Megastar come **5ZW 112**) — 495x.
PGC 6974	gx	01h52m59s	+36°06.5'		And	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
PGC 7162	gx	01h55m20s	+37°18.4'		And	28"	m. buona / ottimo	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata (riportata sul Megastar come **5ZW 141**) — 495x.
PGC 7297	gx	01h56m44s	+02°17.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, diffusa rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (riportata sul Megastar come **UM 149**) — 450x.
PGC 7346	gx	01h57m17s	+32°15.2'		Tri	28"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva formano una coppia ravvicinata di deboli galassiette molto piccole e relativamente compatte e rotonde situate a ridosso l'una dell'altra in direzione N-S; la 1ª è appena più estesa con Ø di una 15-ina di secondi, mentre la 2ª non supera i 10"; fanno parte dell'ammasso **AGC 278**) — 495x.
PGC 7349	gx	01h57m16s	+32°14.8'		Tri	28"	m. buona / ottimo	v. **PGC 7346**
PGC 7493	gx	01h58m59s	+18°57.7'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, a tratti allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare appena percettibile (situata 5.5' a SW di NGC 772 osservata in altra data) — 450x.
PGC 7678	gx	02h01m26s	+28°44.0'		Tri	24"	m. buona / m. buono	situata 6.5' SSE di NGC 784 — relativamente facile e compatta, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30 (riportata sul Megastar come **5ZW 166**) — 450x.
PGC 8072	gx	02h06m57s	+01°41.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, più che altro disturbata da una stella di 11-esima situata ad appena 1.5' SW (quest'ultima fa parte di un asterismo brillante di 5 componenti); forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme (riportata sul Megastar come **UM 395**) — 450x.
PGC 8285	gx	02h10m15s	+35°00.1'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e condensata (poco più di una debole stellina leggermente sfuocata), non più estesa di 10"-12"; c'è una stellina subito a N che (fa parte di una terna equidistante orientata da E a W). È riportata sull'Uranometria come **6ZW 178** — 495x.
PGC 8357	gx	02h11m09s	+35°04.6'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante subito a NW (è riportata sul Megastar come **6ZW 181**) — 495x.
PGC 8359	gx	02h11m02s	−06°32.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	v. **MCG-1-6-64**
PGC 8467	gx	02h12m47s	+39°14.7'		And	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con PGC 8468 situata 1' scarso a W — sono due piccole galassiette rotonde molto deboli e di luminosità uniforme; questa è la più evidente; sono situate tra 2 stelline orientate E-W e distanti 3' — 450x.
PGC 8468	gx	02h12m51s	+39°14.8'		And	24"	ottima / m. buono	v. **PGC 8468**
PGC 8613	gx	02h15m04s	+30°45.0'		Tri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
PGC 8669	gx	02h16m11s	+25°14.2'		Ari	24"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (riportata sul Megastar come **5ZW 206**) — 450x.
PGC 8680	gx	02h16m20s	+36°17.5'		Tri	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N; una più brillante si trova a 1' verso W — 495x.
PGC 9060	gx	02h23m11s	+41°22.1'		And	24"	m. buona / m. buono	diffusa e con alto gradiente di luce, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una doppia abbastanza stretta subito a W; questa gx è riportata sul Megastar come **Anon 0220+41A** e forma una coppia ravvicinata con UGC 1840 situata a ridosso W; la coppia è altresì nota come **Arp 145**.
PGC 9081	gx	02h23m37s	+02°31.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è un nodulo appena percettibile che appare a momenti all'estremità SE di UGC 1847; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso NE — 450x.
PGC 9103	gx	02h23m51s	−04°37.0'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole diffusa, orientata da NE a SW, di dimensioni 30"×15" e con piccola condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
PGC 9107	gx	02h24m00s	−04°41.8'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto piccola, appare piuttosto elusivamente a ridosso NE di una stellina (quella situata a WSW di Arp 54); non sembra più estesa di 10"-12" — 450x.
PGC 9494	gx	02h29m39s	+28°59.2'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina al bordo E — 495x.
PGC 9775	gx	02h33m58s	+31°57.3'		Tri	28"	m. buona / buono	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15", ma la forma è a prima vista un po' confusa per via di una stellina situata al bordo W (riportata sul Megastar come **5ZW 255**) — 495x.
PGC 9856	gx	02h35m37s	−05°25.1'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare chiaramente orientata da NNE a SSW con dimensioni 60"×15" — 450x.
PGC 9914	gx	02h36m49s	+45°23.3'		And	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW (riportata sul Megastar come **5ZW 262**) — 450x.
PGC 10213	gx	02h41m50s	−07°55.3'		Cet	16"	buona / ottimo	piccola ed elusiva chiazza di aspetto indistinto che appare solo a tratti in visione distolta a N di una debolissima stellina — 380x.
PGC 10728	gx	02h49m35s	+45°57.1'		Per	24"	ottima / m. buono	forma una coppia con PGC 10737 situata 1' a E — sono due piccoli oggetti molto deboli situati 1.5' a SW di IC 257; la 2a è più evidente e ha una stellina a ridosso S — 450x.
PGC 10460	gx	02h45m53s	+42°44.8'		Per	28"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 495x.
PGC 10628	gx	02h48m36s	+12h00.5'		Ari	24"	buona / buono	piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 10737	gx	02h49m40s	+46°57.3'		Per	24"	ottima / m. buono	v. **PGC 10728**
PGC 10880	gx	02h52m17s	+46°54.8'		Per	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole a ridosso SW (riportata sull'Uranometria come **5ZW 285**) — 450x.
PGC 10883	gx	02h52m39s	+41°34.7'		Per	28"	m. buona / m. buono	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con piccolo nucleo quasi stellare abbastanza evidente; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W — 495x.
PGC 10931	gx	02h53m50s	+41°27.3'		Per	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e appena più evidente all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole a ridosso W e una percettibile solo a tratti a ridosso SW; una doppia stretta e sbilanciata si trova a 1' scarso NW. Un piccolo oggetto poco diffuso, molto debole ed esteso 10"-12" si trova a 1' W: si tratta della galassietta **PGC 197758** — 495x.
PGC 10937	gx	02h53m51s	+41°43.6'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a E — 450x.
PGC 10949	gx	02h54m15s	+41°23.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale evidente; c'è una stellina brillante subito a E e una appena percettibile a ridosso verso S — 495x.
PGC 10962	gx	02h54m27s	+41°39.3'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 40"×10" (praticamente una edge-on) — 495x.
PGC 10970	gx	02h54m40s	+41°34.5'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi: c'è una debole stellina a 1' scarso verso S — 495x.
PGC 10982	gx	02h54m48s	+41°24.6'		Per	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da NNE a SSW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente; situata tra 2 deboli stelline a perpendicolo con l'asse della gx — 495x.
PGC 10999	gx	02h55m05s	+36°13.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a E (riportata sul Megastar come **5ZW 287**) — 495x.
PGC 11045	gx	02h55m38s	+36°04.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con la successiva — sono due galassiette molto piccole, deboli, ma facilmente visibili, rotonde con Ø di max 15" e separate da una 30-ina di secondi in direzione E-W; quella a E presenta una condensazione stellare più evidente — 495x.
PGC 11054	gx	02h55m41s	+36°04.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	v. **PGC 11045**
PGC 11072	gx	02h55m55s	+41°35.0'		Per	28"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (riportata sul Megastar come **5ZW 291**) — 495x.
PGC 11073	gx	02h55m24s	+41°44.6'		Per	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; disturbata dalla SAO 38446 di 8ª grandezza situata 4' scarsi a N — 495x.
PGC 11159	gx	02h57m19s	−10°59.2'		Eri	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile e compatta, appena più brillante all'interno rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 11160	gx	02h57m18s	+05°58.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
PGC 11168	gx	02h57m23s	+05°56.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
PGC 11171	gx	02h57m24s	+05°58.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	di aspetto simile a PGC 11168, ma poco più debole, orientata all'incirca nello stesso modo e di dimensioni analoghe — 450x.
PGC 11187	gx	02h57m39s	−10°28.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare evidente — 450x.
PGC 11191	gx	02h57m43s	+05°51.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è un debole baffo relativamente compatto, esteso < 30" che aggetta verso W da una stellina molto debole — 450x.
PGC 11193	gx	02h57m51s	+06°03.1'		Cet	16"	ottima / ottimo	piccolissimo oggetto relativamente compatto, di dimensioni max 10"15" visibile abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
PGC 11194	gx	02h57m45s	+05°49.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
PGC 11195	gx	02h57m46s	+05°58.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	assieme alla successiva forma una coppia di galassiette molto deboli, piccole e di aspetto simile; la 1ª è poco più evidente, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; la 2a, appena più piccola, si trova a ridosso SW di una stellina brillante che confonde un po' la visione — 450x.
PGC 11196	gx	02h57m47s	+05°59.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	v. **PGC 11195**
PGC 11234	gx	02h58m14s	+05°54.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, molto allungata da NW a SE con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso SE — 450x.
PGC 11238	gx	02h58m14s	+05°58.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi con tenue condensazione stellare appena percettibile — 450x.
PGC 11239	gx	02h58m15s	+05°55.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
PGC 11315	gx	02h59m29s	−10°36.6'		Eri	24"	m. buona / scarso	poco diffusa e con piccola condensazione centrale abbastanza evidente, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata dalla SAO 148701 di 8ª grandezza situata 4' a S — 340x.
PGC 11353	gx	03h00m16s	−10°31.7'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina brillante a 1.5' SSE e una appena percettibile subito a N — 450x.
PGC 11358	gx	03h00m22s	−10°25.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	elusiva lama di luce orientata da N a S ed estesa < 40", appare a momenti in visione distolta subito a NE di una debole stellina — 450x.
PGC 11366	gx	03h00m30s	−09°30.0'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, salvo una condensazione centrale molto tenue visibile solo a momenti; in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
PGC 11380	gx	03h00m44s	−10°49.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, molto diffusa e poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
PGC 11391	gx	03h00m59s	−10°22.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
PGC 11393	gx	03h01m00s	−09°47.2'		Eri	24"	m. buona / scarso	debolissima e diffusa, appare a momenti in visione distolta, ma non sembra più estesa di 15" o 20".
PGC 11394	gx	03h02m01s	−09°38.3'		Eri	24"	m. buona / scarso	appare solo elusivamente un paio di primi a S di una stellina brillante, ma a causa del seeing era praticamente indistinguibile da stellina appena percettibile — 340x.
PGC 11402	gx	03h01m12s	−10°54.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
PGC 11416	gx	03h01m34s	−09°41.9'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina abbastanza brillante un paio di primi a N — 450x.
PGC 11417	gx	03h01m35s	+41°29.2'		Per	24"	buona / buono	molto piccola e debolissima, appare anche in visione diretta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina subito a NW — 450x.
PGC 11418	gx	03h01m35s	−09°54.7'		Eri	24"	m. buona / mediocre	relativamente facile, nonostante la riverberazione della SAO 148721 di 6ª grandezza situata 6' a SE e che si fatica a tenere fuori campo anche a 450x; è rotonda con Ø < 30" e gradatamente più brillante verso l'interno — 450x.
PGC 11433	gx	03h01m49s	−10°33.2'		Eri	24"	m. buona / scarso	molto debole e piccola, relativamente compatta e, rotonda con Ø di 10"-15" e nucleo stellare — 340x.
PGC 11448	gx	03h02m06s	−10°36.0'		Eri	24"	m. buona / scarso	appare in visione distolta a 340x come una debolissima stellina appena sfocata.
PGC 11451	gx	03h02m08s	−10°08.7'		Eri	24"	m. buona / scarso	debolissima, ma tutto sommato relativamente compatta, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 340x; a tratti appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15".
PGC 11458	gx	03h02m13s	+43°42.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di deboli stelline a ridosso SE e un'altra altrettanto debole subito a SW — 495x.
PGC 11510	gx	03h03m28s	−09°57.9'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa per ~ 1'; appare abbastanza facilmente in visione distolta a NW di una stellina appena percettibile, meglio a 450x.
PGC 11618	gx	03h05m30s	−02°35.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma solo a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 60"×30"; è situata tra 2 stelline brillanti che quasi delimitano il campo oculare; non ho notato un miglioramento scalando a 340x.
PGC 11645	gx	03h06m09s	−08°51.1'		Eri	24"	m. buona / mediocre	debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, in visione distolta appare abbastanza chiaramente orientata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
PGC 11646	gx	03h06m06s	+42°21.8'		Per	24"	m. buona / ottimo	è un debole nodulo esteso una 20-ina di secondi situato a ridosso SW di IC 284, simile a una stellina appena sfuocata; altresì nota come 5ZW 319 — 450x.
PGC 11704	gx	03h07m34s	−11°54.6'		Eri	24"	m. buona / scarso	molto debole, poco diffusa, a tratti condensata, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" (è in realtà costituita da 2 galassiette ravvicinate che non sono però riuscito a separare).
PGC 11876	gx	03h11m02s	−02°25.6'		Eri	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile per una gx di questo catalogo, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 45"×15".
PGC 12018	gx	03h13m52s	+41°14.7'		Per	24"	buona / buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x, estesa 12"-15"; situata a ridosso W di una doppia molto stretta e sbilanciata (riportata sul Megastar come **5ZW 330** — 450x.
PGC 12028	gx	03h13m58s	+41°15.4'		Per	24"	buona / buono	debole, piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline quasi a ridosso E e NE (riportata sul Megastar come **5ZW 331** — 450x.
PGC 12090	gx	03h15m13s	−07°16.2'		Eri	24"	buona / buono	debolissima lama di luce estesa almeno 1' e orientata da NW a SE; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 12103	gx	03h15m30s	+41°15.1'		Per	28"	ottima / discreto	relativamente facile, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi, diffusa, con piccola ed evidente condensazione centrale — 388x.
PGC 12126	gx	03h15m58s	+41°13.0'		Per	28"	ottima / discreto	debole lucore molto diffuso e di luminosità pressoché uniforme, rotondo con Ø di una 30-ina di secondi che aggetta a S di una stellina abbastanza brillante; un'altra stellina appena più debole si trova a 1' scarso SE — 388x.
PGC 12166	gx	03h16m34s	+41°02.8'		Per	28"	ottima / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una debole stellina a 1' verso S e un'altra più debole subito a W — 388x.
PGC 12203	gx	03h17m12s	+41°39.1'		Per	28"	ottima / discreto	debole, molto diffusa e con basso gradiente di luce, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 50"×25"; c'è una stellina appena percettibile decentrata verso W — 388x.

PGC 12205	gx	03h17m12s	+41°39.1'		Per	16"	buona / ottimo	in visione distolta è un'ovale regolare, poco diffuso, di 40"×20" e orientato da E a W; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 270x.
PGC 12206	gx	03h17m14s	+41°26.1'		Per	28"	ottima / discreto	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' W e una debole a 1' verso E — 388x.
PGC 12223	gx	03h17m28s	+41°29.3'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline brillanti un paio di primi a SE — 388x.
PGC 12224	gx	03h17m28s	+41°36.8'		Per	28"	ottima / discreto	è un piccolo e debole lucore rotondo con Ø di una 20-ina di secondi con una stellina al bordo SW e con un nucleo stellare visibile a tratti — 388x.
PGC 12225	gx	03h17m29s	+41°22.6'		Per	28"	ottima / discreto	poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina al bordo W; un piccolo triangolo aperto di stelline abbastanza brillanti si trova a 1' W — 388x.
PGC 12230	gx	03h17m32s	+41°24.7'		Per	28"	ottima / discreto	debolissima, situata subito a ENE di NGC 1260; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni di 30"×20" scarsi; solo a momenti salta fuori un nucleo stellare — 388x.
PGC 12236	gx	03h17m33s	+41°17.8'		Per	28"	ottima / discreto	piccola e molto debole, poco diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 388x.
PGC 12263	gx	03h17m58s	+41°29.9'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; situata poco più di 1' a S di NGC 1264 — 388x.
PGC 12267	gx	03h17m58s	+41°54.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a ridosso NE — 495x.
PGC 12271	gx	03h18m02s	+41°35.5'		Per	28"	ottima / discreto	piccolo e debolissimo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi che aggetta a SE di una stellina abbastanza brillante — 388x.
PGC 12288	gx	03h18m16s	+41°44.1'		Per	28"	ottima / discreto	poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina al bordo N — 388x.
PGC 12290	gx	03h18m18s	+41°40.5'		Per	28"	ottima / discreto	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso N e una debole alla stessa distanza verso E — 388x.
PGC 12292	gx	03h18m19s	+41°28.1'		Per	28"	ottima / discreto	molto piccola e debole, appare più facilmente della successiva — situata a ridosso SE — molto piccola, rotonda con Ø < 15" e di luminosità uniforme — 388x.
PGC 12293	gx	03h18m19s	+41°51.3'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme; si trova subito all'esterno verso E del tenue alone di NGC 1265 — 495x.
PGC 12294	gx	03h18m21s	+41°27.8'		Per	28"	ottima / discreto	baffo di luce orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi, molto difficile da vedere, perché situato a ridosso S di una stellina brillante; una coppia di deboli stelline si trova a ridosso S — 388x.
PGC 12296	gx	03h18m23s	+41°16.1'		Per	28"	ottima / discreto	molto piccola e debolissima, situata tra una stellina brillante subito a NW e una debole a ridosso SE; malgrado il seeing ho dovuto spingere a 495x per catturarla.
PGC 12307	gx	03h18m32s	+41°16.4'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' verso S — 388x.
PGC 12315	gx	03h18m35s	+41°40.0'		Per	28"	ottima / discreto	forma una coppia ravvicinata con la successiva situata subito a E — poco diffusa, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; la PGC 12319 è più debole e più piccola, orientata da E a W con dimensioni di 20"×10"; una stellina appare solo a momenti tra le 2 galassiette — 388x.
PGC 12319	gx	03h18m39s	+41°40.1'		Per	28"	ottima / discreto	v. **PGC 12315**
PGC 12320	gx	03h18m39s	+41°59.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso sì e no una 30-ina di secondi e orientato da E a W; c'è una stellina appena percettibile subito a N (altresì denominata **PGC 12321**) — 495x.
PGC 12336	gx	03h18m51s	+41°23.5'		Per	28"	ottima / discreto	debolissima e molto piccola, appare a tratti in visione distolta a 1.5' ESE di una coppia di stelline orientate nello stesso modo — 388x.
PGC 12337	gx	03h18m47s	+41°25.7'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina subito a S — 388x.
PGC 12349	gx	03h18m58s	+41°42.1'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, appena più evidente verso l'interno, allungata da N a S, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso SE (riportata anche come **PGC 12352**) — 388x.
PGC 12354	gx	03h19m02s	+41°33.1'		Per	28"	ottima / discreto	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi in direzione N-S; c'è una doppia serrata e molto sbilanciata in luminosità a 1' verso E (è altresì riportata sul Megastar come **PGC 12353**) — 388x.
PGC 12355	gx	03h19m03s	+41°58.5'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, ma poco più evidente di PGC 12267 — osservata subito prima — diffusa rotonda con Ø < 20" e a tratti condensata; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SE — 495x.
PGC 12356	gx	03h19m04s	+41°13.9'		Per	28"	ottima / discreto	molto piccola e a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 388x.
PGC 12358	gx	03h19m05s	+41°28.1'		Per	28"	ottima / discreto	piccola, debole e poco diffusa, estesa una 20-ina di secondi; un nodulo abbastanza brillante o una stellina sovrapposta (non si distingue) si trova praticamente nel mezzo, mentre un stellina molto debole appare a ridosso N di questa sorta di nucleo; la gx si trova 1' a E di NGC 1270 — 388x.
PGC 12360	gx	03h19m07s	+41°41.4'		Per	28"	ottima / discreto	debolissima, appare in visione distolta come una stellina appena sfuocata; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline a 1' W e 2' scarsi a NW — 388x.
PGC 12361	gx	03h09m06s	+41°04.9'		Per	28"	ottima / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N e una più debole al bordo S — 388x.
PGC 12371	gx	03h19m12s	+41°05.3'		Per	28"	ottima / discreto	più piccola della precedente — dalla quale dista 1' a ENE — diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e piccola condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso NE, e una appena percettibile debole a ridosso SW — 388x.
PGC 12380	gx	03h19m18s	+41°39.6'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
PGC 12381	gx	03h19m14s	+41°08.5'		Per	28"	ottima / discreto	debole, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40"; ci sono 3 stelline serrate e quasi allineate a ridosso S; un'altra stellina invece abbastanza brillante si trova subito a W e una appena percettibile a ridosso N — 388x.
PGC 12386	gx	03h19m22s	+41°25.8'		Per	28"	ottima / discreto	debole lama di luce orientata da N a S, estesa una 40-ina di secondi e con nucleo stellare evidente — 388x.
PGC 12408	gx	03h19m36s	+41°09.0'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 388x.
PGC 12409	gx	03h19m37s	+41°29.1'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta sembra rotonda con Ø < 20"; allineata ed equidistante con 2 stelline a N — 388x.
PGC 12411	gx	03h19m40s	+41°19.7'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; forma una losanga orientata da NE a SW con 3 stelline abbastanza brillanti — 388x.
PGC 12414	gx	03h19m42s	+41°30.0'		Per	28"	ottima / discreto	debolissima e molto piccola, praticamente indistinguibile da una stellina leggermente sfuocata; appare elusivamente in visione distolta a 1' SE di NGC 1275 — 388x.
PGC 12416	gx	03h19m43s	+41°36.1'		Per	28"	ottima / discreto	molto piccola e debolissima, praticamente simile a una stellina sfuocata, forse rotonda con Ø di una 10-ina di secondi; situata quasi a ridosso NE di una stellina abbastanza brillante — 388x.
PGC 12417	gx	03h19m37s	+41°38.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" scarse; c'è una doppia stretta subito a NW — 495x.
PGC 12423	gx	03h19m45s	+41°26.8'		Per	28"	ottima / discreto	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta subito a S di MAC 0319+4127, in visione distolta non sembra più estesa di 10"-12" — 388x.
PGC 12428	gx	03h19m47s	+41°16.2'		Per	28"	ottima / discreto	molto piccola e debolissima, appare a tratti a ridosso S di una stellina brillante; non è più estesa di 10"-12" — 388x.
PGC 12430	gx	03h19m48s	+41°35.8'		Per	28"	ottima / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con tenue nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W (fa parte di una coppia orientata da NW a SE e formata da 2 stelline della stessa luminosità) — 388x.
PGC 12433	gx	03h19m51s	+41°32.1'		Per	28"	ottima / discreto	appare elusivamente in mezzo alle due gx NGC 1275 e 1278, ma è pressoché indistinguibile da una debolissima stellina — 388x.
PGC 12437	gx	03h19m53s	+41°18.1'		Per	28"	ottima / discreto	poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso NW — 388x.
PGC 12439	gx	03h19m54s	−03°35.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	è una lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1.5'; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una stellina a poco più di 1' verso W.
PGC 12441	gx	03h19m55s	+41°31.4'		Per	28"	ottima / discreto	piccola, molto debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NE — 388x.
PGC 12448	gx	03h19m59s	+41°28.8'		Per	28"	ottima / discreto	molto diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con bulge abbastanza evidente, ma poco contrastato — 388x.
PGC 12451	gx	03h20m01s	+41°33.2'		Per	28"	ottima / discreto	piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; quasi allineata ed equidistante con due stelline a NE (quella più vicina è la più debole); è riportata sul Megastar come **5ZW 339** — 388x.
PGC 12459	gx	03h20m07s	+41°50.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a 1' verso W — 495x.
PGC 12469	gx	03h20m10s	+41°21.1'		Per	28"	ottima / discreto	lama di luce molto debole, estesa una 40-ina di secondi e orientata da N a S; la visione è un po' disturbata da una stellina abbastanza brillante situata quasi a ridosso SW; la gx si trova 1' a S di NGC 1282 — 388x.
PGC 12474	gx	03h20m13s	+41°17.2'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 388x.
PGC 12487	gx	03h20m17s	+41°20.9'		Per	28"	ottima / discreto	piccola, molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; ci sono 2 stelline a ridosso NW e NE — 388x.
PGC 12497	gx	03h20m21s	+41°22.6'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20"; c'è una stellina brillante subito a E; situata 1.5' a E di NGC 1282 — 388x.
PGC 12505	gx	03h20m29s	+41°29.4'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, salvo un nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø di 20"-25" (altresì denominata **PGC 12506**) — 495x.
PGC 12507	gx	03h20m29s	+41°30.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø < 20"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso NW della 12511 (altresì denominata **PGC 12509**) — 495x.
PGC 12511	gx	03h20m31s	+41°30.5'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; sembra a prima vista aggettare da una stellina al bordo W (altresì denominata **PGC 12512**) — 495x.
PGC 12513	gx	03h20m32s	+41°45.5'		Per	28"	m. buona / ottimo	assieme a **PGC 12520** e **PGC 12541** forma un trio di galassiette molto difficili — questa è la più evidente, piccola, diffusa, di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 12519	gx	03h20m33s	+41°34.5'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline abbastanza brillanti a 1' E e SE; una stellina più debole e più vicina alla gx si trova subito a WSW — 495x.
PGC 12520	gx	03h20m33s	+41°43.9'		Per	28"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce che in visione distolta appare estesa una 40-ina di secondi in direzione NW-SE; situata ~ 1' a E di una stellina brillante che ne rende ancora più difficoltosa la visione; una stellina appena percettibile si trova a ridosso NE — 495x.
PGC 12528	gx	03h20m42s	+41°24.4'		Per	28"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×15"; c'è una stellina al bordo E — 388x.
PGC 12541	gx	03h20m46s	+41°44.1'		Per	28"	m. buona / ottimo	altra debolissima galassietta che in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×10"; situata tra 2 deboli stelline orientate da NE a SW e distanti 1' — 495x.
PGC 12544	gx	03h20m49s	+41°22.2'		Per	28"	ottima / discreto	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi con tenue nucleo stellare; ci sono 3 stelline arcuate orientate da N a S a ridosso E — 388x.
PGC 12547	gx	03h20m51s	+41°36.0'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e con piccola condensazione centrale molto evidente; c'è una stellina brillante a 1' S e una coppia sbilanciata di stelline deboli a ridosso NW (altresì denominata **PGC 12546**) — 495x.
PGC 12557	gx	03h20m48s	+41°30.4'		Per	28"	m. buona / ottimo	relativamente facile, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con piccolo bulge evidente; c'è una stellina appena percettibile subito a N (altresì denominata **PGC 12556**) — 495x.
PGC 12562	gx	03h21m00s	+41°33.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole e diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con condensazione stellare evidente; c'è una stellina a ridosso SE; una coppia di stelline brillanti si trova 1.5' a ENE (altresì denominata **PGC 12563**) — 495x.
PGC 12565	gx	03h21m02s	+41°24.6'		Per	28"	ottima / discreto	poco più debole e più piccola di PGC 12497 — dalla quale dista 3' a NE — rotonda con Ø < 30 — 388x.
PGC 12568	gx	03h21m04s	+41°33.3'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina quasi a ridosso S — 495x.
PGC 12570	gx	03h21m09s	+41°15.2'		Per	28"	ottima / discreto	piccola e molto debole, poco diffusa, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 388x.
PGC 12590	gx	03h21m29s	+41°32.2'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina molto debole a 1' N (altresì denominata **PGC 12588**) — 495x.
PGC 12635	gx	03h22m19s	+41°26.7'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×15"; c'è una stellina a ridosso W — 495x.
PGC 12640	gx	03h22m24s	+41°28.8'		Per	28"	m. buona / ottimo	debole, diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con piccola condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso NW e una più debole a ridosso NW (altresì denominata **PGC 12641**) — 495x.
PGC 12716	gx	03h24m02s	−03°45.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e con piccolo bulge abbastanza contrastato, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
PGC 12948	gx	03h28m43s	+16°13.0'		Tau	24"	ottima / ottimo	debole chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina molto debole a 1' SW — 450x.
PGC 12992	gx	03h29m51s	+40°01.8'		Per	28"	m. buona / m. buono	lama di luce molto debole, orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; c'è un piccolo triangolo aperto di deboli stelline a 1' NW (*ultima gx osservata nella notte: è sorta la Luna*) — 495x.
PGC 14696	gx	04h13m43s	+01°46.6'		Tau	24"	m. buona / ottimo	è un nodulo luminoso molto debole di aspetto stellare che a tratti si separa a SW di UGC 2992; data la bontà del seeing l'effetto è più evidenziato a 570x.
PGC 14791	gx	04h16m55s	−07°28.8'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissima lama di luce ~ 1' e orientata da E a W; meglio evidente scalando a 340x.
PGC 14864	gx	04h18m57s	+75°35.4'		Cam	24"	buona / m. buono	piccola e molto debole, disturbata da una stellina brillante a ridosso NW; la galassietta è poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a ridosso E — 450x.
PGC 15164	gx	04h27m51s	+10°44.0'		Tau	24"	ottima / discreto	piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 15216	gx	04h28m47s	−03°46.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10" — 450x.
PGC 15259	gx	04h29m22s	−04°45.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima lama di luce estesa 1', orientata da E a W e di aspetto molto uniforme; è situata tra due stelline brillanti distanti 3.5' che offuscano un po' la visione — 450x.
PGC 15364	gx	04h31m05s	−03°24.7'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' verso S — 450x.
PGC 15418	gx	04h31m45s	−12°45.6'		Eri	24"	m. buona / buono	debolissimo e piccolo oggetto rotondo con Ø di una decina di secondi; appare solo in visione distolta a 450x come una stellina debolmente sfuocata.
PGC 15426	gx	04h31m52s	−05°45.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di 35"-40" — 450x.
PGC 15431	gx	04h31m58s	−12°49.1'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stella brillante a 1.5' N — 450x.
PGC 15459	gx	04h32m16s	+66°18.4'		Cam	16"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa, con piccola condensazione centrale appena evidente, rotonda con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a 1' verso NE; una brillante stella di 8ª si trova a soli 6' SE, ma a 380x si riesce a tenere fuori campo (è riportata sul Megastar come **7ZW 17**) — 380x.
PGC 15463	gx	04h32m24s	−12°46.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso NW di una stellina; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 15489	gx	04h32m51s	−12°54.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, allungata da NE a SW, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
PGC 15658	gx	04h37m14s	−03°01.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	è una sorta di tenuissimo alone esteso 15" o 20" che circonda una stellina brillante — 450x.
PGC 15779	gx	04h40m14s	−04°52.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
PGC 15923	gx	04h44m51s	−08°09.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza di luminosità uniforme, rotonda con Ø di ~ 1', appare facilmente in visione distolta, ma è meglio scalare a 450x.
PGC 16089	gx	04h49m15s	+56°42.4'		Cam	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza diffusa grosso modo circolare con Ø di 40"-45"; ci sono tre stelline allineate in direzione NE-SW a E della gx; una 4a stellina, quella subito a E della componente più vicina alla gx, è appena percettibile — 450x.
PGC 16772	gx	05h07m32s	−11°39.2'		Lep	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva lama di luce estesa per oltre 1' e orientata da N a S; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 16941	gx	05h13m42s	−07°38.7'		Ori	24"	m. buona / buono	assieme alla successiva PGC 16942 forma una coppia di gx chiaramente interagenti; la 2ª è più estesa, molto diffusa, orientata da N a S, di dimensioni 45"×30" e con condensazione centrale appena accennata; la 1ª è di aspetto più uniforme e sembra aggettare a SE della 2a; è allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; la visione è tuttavia più interessante scalando a 340x.
PGC 16942	gx	05h13m40s	−07°38.4'		Ori	24"	m. buona / buono	v. **PGC 16941**
PGC 16954	gx	05h14m10s	−06°08.9'		Ori	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; sembra aggettare da una stellina situata a ridosso E — 450x.
PGC 16993	gx	05h15m43s	+19°21.7'		Tau	16"	ottima / ottimo	appare come un debolissimo e piccolo alone asimmetrico che aggetta verso E da una stellina (e non può trattarsi di un'impressione visiva: a 1' ESE ce n'è un'altra appena più brillante la quale ne è priva) — 380x.
PGC 17034	gx	05h16m46s	+79°40.2'		Cam	24"	m. buona / discreto	piccolo oggetto rotondo con Ø di 10"-15", molto debole e di luminosità uniforme; c'è una stellina brillante a 1' verso S; 2 deboli stelline si trovano rispettivamente a 1' E e 40" NE (riportata sul Megastar come **7ZW 31**) — 450x.
PGC 17090	gx	05h19m17s	+01°19.5'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta a 450x (a 340x la visione è un po' confusa) quasi a ridosso SW di UGC 3287; è a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×15".
PGC 17210	gx	05h22m54s	+72°57.8'		Cam	24"	buona / m. buono	relativamente compatta e con condensazione stellare, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (più facile di CGCG 329-3 situata 1' a E) — 450x.
PGC 17621	gx	05h41m56s	−12°33.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza di forma indistinta che solo a momenti appare fra i bagliori di una stellina brillante situata subito a S; tutto sommato sembra meglio visibile scalando a 340x.
PGC 18095	gx	05h55m32s	−15°40.7'		Lep	24"	m. buona / m. buono	altra debolissima chiazza diffusa e di forma indistinta, estesa 40"-45"; appare in visione distolta subito a SW di una debole stellina, ma è meglio scalare a 340x.
PGC 18390	gx	06h05m42s	+82°47.5'		Cam	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 15" (riportata sull'Uranometria come **7ZW 54**) — 450x.
PGC 18534	gx	06h09m54s	+76°40.1'		Cam	24"	buona / ottimo	piccolo oggetto rotondo molto debole e relativamente compatto con Ø di una 15-ina di secondi; situato quasi a ridosso SE di una debole stellina (riportata sull'Uranometria come 7ZW 59) — 450x.
PGC 19342	gx	06h38m04s	+69°49.8'		Cam	16"	ottima / m. buono	è un debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo e diffuso con Ø max di 30"; si riesce a catturare con relativa facilità solo a 380x; c'è una debole stellina a 1' verso N.
PGC 19389	gx	06h39m43s	−32°35.6'		CMa	24"	buona / buono	appare elusivamente a 450x alternando gli occhi un paio di primi a W di una stellina abbastanza brillante; non ne capisco la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 20". Riportata sul Megastar come **Fair 1141**.
PGC 19980	gx	06h59m45s	+68°37.7'		Cam	16"	ottima / m. buono	altra galassietta molto piccola e debolissima, di dimensioni analoghe a PGC 19342, ma forse un poco più diffusa — 380x.
PGC 20018	gx	07h01m29s	+23°13.4'		Gem	24"	ottima / discreto	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; forse rotonda con Ø max di 15".
PGC 21559	gx	07h40m43s	+23°37.6'		Gem	24"	ottima / discreto	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una tenue condensazione stellare; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
PGC 22236	gx	07h55m40s	+45°56.6'		Lyn	20"	m. buona / m. buono	debolissimo e piccolo lucore che aggetta per non più di 20" a NW di una stellina; appare solo a momenti in visione distolta — 360x.
PGC 22986	gx	08h12m08s	+57°54.5'		Lyn	28"	buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; forma un piccolo triangolo rettangolo con due stelline a S e a ESE — 495x.
PGC 23083	gx	08h14m15s	+58°12.0'		Lyn	28"	buona / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso NE (fa parte dell'ammasso **AGC 634** ed è riportata sul Megastar come **SBS 810+583A**) — 495x.
PGC 23114	gx	08h14m43s	+57°57.4'		Lyn	16"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, poco allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×30" e con nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso NE (questa stellina è in realtà poco definita, nel senso che potrebbe trattarsi in realtà di una doppia irrisolta dalle componenti sbilanciate) — 380x.
PGC 23115	gx	08h14m46s	+57°57.6'		Lyn	28"	buona / ottimo	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata a ridosso NE della precedente (riportata sul Megastar come **7ZW 220** — 495x.
PGC 23168	gx	08h15m59s	+58°20.7'		Lyn	28"	buona / ottimo	molto piccola e debole, appare abbastanza facilmente a ridosso N di **MCG+10-12-126**; non è comunque più estesa di 10"-12" — 495x.
PGC 23233	gx	08h17m26s	−07°30.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima chiazza diffusa e molto stemperata sul fondo cielo, di forma indistinta, estesa 1' scarso e di luminosità uniforme; tutto sommato è meglio restare a 450x per smorzare la luce di alcune stelline fra cui un paio abbastanza brillanti situate a W della gx.
PGC 23406	gx	08h20m39s	+21°04.7'		Cnc	16"	ottima / ottimo	piccolissima e molto debole, con dimensioni di una decina di secondi; salta fuori in visione distolta a 380x quando si osserva NGC 2563 dalla quale dista 1' verso NE; è poco più debole della stellina situata 1' SE.
PGC 23677	gx	08h26m21s	+55°56.5'		Lyn	28"	buona / ottimo	molto piccola, debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 495x.
PGC 24140	gx	08h35m40s	+46°29.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con **Markarian 92** situata a ridosso N — molto piccola, relativamente compatta e condensata, forse rotonda con Ø di 15" — 495x.
PGC 24340	gx	08h39m16s	+28°50.7'		Cnc	16"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, estesa una 40-ina di secondi; è visibile in visione distolta a 270x; c'è una stellina a 1' verso SW.
PGC 25550	gx	09h06m26s	−09°55.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata subito a S di un piccolo triangolo rettangolo di stelline coi cateti disposti secondo le direzioni cardinali — 450x.
PGC 25554	gx	09h06m33s	−09°21.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con tenue condensazione centrale poco contrastata — 450x.
PGC 25601	gx	09h07m13s	−09°37.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	fa parte, assieme alle 29 seguenti dell'ammasso **AGC 754** — molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
PGC 25605	gx	09h07m15s	+16°37.4'		Cnc	24"	ottima / discreto	appare solo a momenti in visione distolta come una debolissima stellina sfocata a ridosso W di una stellina abbastanza brillante (fa parte dell'ammasso **AGC 744**) — 450x.
PGC 25614	gx	09h07m18s	+16°44.3'		Cnc	24"	ottima / discreto	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S (fa parte dell'ammasso AGC 744) — 450x.
PGC 25619	gx	09h07m20s	+16°39.1'		Cnc	24"	ottima / discreto	poco più debole e più piccola della precedente, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una debole stellina a 1' scarso NE (situata al centro dell'ammasso **AGC 744**) — 450x.
PGC 25628	gx	09h07m22s	−09°34.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta subito a NW di una debole stellina, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 25632	gx	09h07m25s	−09°29.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø a 20"; equidistante, anche se non proprio allineata, con due stelline molto deboli a S — 450x.
PGC 25635	gx	09h07m29s	+16°38.7'		Cnc	24"	ottima / discreto	appare elusivamente in visione distolta a 450x, molto piccola, estesa appena 10"-15"; la visione è comunque un po' disturbata dalla SAO 98373 di 9ª grandezza situata un paio di primi a S (fa parte dell'ammasso **AGC 744**) — 450x.
PGC 25643	gx	09h07m35s	−09°42.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, molto diffusa, forse rotonda con Ø di 20" — 450x.
PGC 25661	gx	09h07m50s	−10°06.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a poco più di 1' verso N — 450x.
PGC 25667	gx	09h07m57s	−10°01.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 450x.
PGC 25672	gx	09h08m02s	−09°59.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una debole stellina a 1' scarso N — 450x.
PGC 25680	gx	09h08m11s	−10°00.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da NE a SW; appare facilmente in visione distolta a 450x a ridosso E di una stellina abbastanza brillante.
PGC 25686	gx	09h08m15s	−09°30.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con 3 stelline: 2 a NW e l'altra a SE — 450x.
PGC 25688	gx	09h08m17s	−09°33.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	anche questa è debolissima e molto piccola, appare a tratti in visione distolta allineata e quasi equidistante con due stelline a SW; forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 25689	gx	09h08m17s	−09°43.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	pure molto piccola e debolissima, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 25695	gx	09h08m21s	−09°31.2'		Hya	24"	ottima / ottimo	è una sorta di piccolo e debolissimo alone che aggetta a NE di una stellina; in visione distolta non sembra più esteso di 10"-15" — 450x.
PGC 25706	gx	09h08m26s	−09°28.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 25712	gx	09h08m32s	−09°37.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, poco più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 60"×40"; c'è una stellina a 1' SE — 450x.
PGC 25721	gx	09h08m39s	−09°37.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø < 20" e di aspetto uniforme — 450x.
PGC 25727	gx	09h08m43s	−09°30.9'		Hya	24"	ottima / ottimo	v. **PGC 25728**
PGC 25728	gx	09h08m44s	−09°30.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a 1' scarso S: tra la componente più a E e la gx appare elusivamente, e solo a tratti, una stellina debolmente sfuocata che in realtà è risultata essere la PGC 25727 — 450x.
PGC 25740	gx	09h08m52s	−09°31.9'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, estesa sì e no 10"; ci sono due deboli stelline a ridosso, una W e l'altra a NE: la prima è appena più evidente ed è fissando lo sguardo su questa che salta fuori la galassietta — 450x.
PGC 25744	gx	09h08m54s	−09°27.9'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima lama di luce estesa una 40-ina di secondi e orientata da NW a SE che in visione distolta sembra aggettare a NW di una stellina; poco disturbata da una stellina brillante di 10ª grandezza situata 1' a S — 450x.
PGC 25746	gx	09h08m55s	−09°40.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
PGC 25747	gx	09h08m56s	−09°35.9'		Hya	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente subito a W di PGC 25752, ma a 450x appare solo come una stellina debolmente sfuocata — 450x.
PGC 25752	gx	09h08m58s	−09°36.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S — 450x.
PGC 25758	gx	09h09m13s	−10°15.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata all'interno di un piccolo triangolo isoscele formato con stelline appena percettibili: a E, S e una appena più evidente a NW — 450x.
PGC 25775	gx	09h09m17s	−09°34.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo esteso una 30-ina di secondi e orientato da N a S — 450x.
PGC 25777	gx	09h09m19s	−09°42.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta sembra rotonda con Ø di 20" o poco più; c'è una stellina subito a SE — 450x.
PGC 25790	gx	09h09m26s	−09°22.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una tenue condensazione centrale; c'è una stellina a 1.5' SSE — 450x.
PGC 25792	gx	09h09m27s	−09°37.9'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; salta fuori in visione distolta subito a N di una stellina appena percettibile — 450x.
PGC 25796	gx	09h09m29s	−09°37.2'		Hya	24"	ottima / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti a NE della precedente, estesa sì e no una 10-ina di secondi — 450x.
PGC 25808	gx	09h09m35s	−09°45.1'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, appare in visione distolta a 1' scarso N di PGC 25810, forse rotonda con Ø simile — 450x.
PGC 25809	gx	09h09m35s	−09°42.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto piccola, appare elusivamente in visione distolta a 450x, ma non sembra più estesa di 10".
PGC 25810	gx	09h09m35s	−09°46.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di 10"-15" e una tenue condensazione centrale visibile a momenti — 450x.
PGC 25819	gx	09h09m39s	−09°43.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
PGC 25824	gx	09h09m44s	−09°44.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
PGC 25839	gx	09h09m59s	−09°38.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 25860	gx	09h10m17s	−09°37.1'		Hya	24"	ottima / ottimo	diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NNE — 450x.
PGC 25848	gx	09h10m10s	+50°02.8'		Per	16"	m. buona / m. buono	appare in visione distolta come una stellina sfuocata a ~ 1/3 della distanza tra UGC 4812 e una stellina brillante situata 3' SE — 270x.
PGC 25891	gx	09h11m01s	−09°09.4'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NW a SE con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' W e una appena più debole alla stessa distanza verso S — 450x.
PGC 25901	gx	09h11m19s	−09°46.1'		Hya	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con nucleo puntiforme — 450x.
PGC 25913	gx	09h11m37s	−09°44.6'		Hya	24"	ottima / ottimo	è un debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi in direzione N-S; appare in visione distolta a metà del cateto maggiore di un minuscolo triangolo rettangolo formato con 3 stelline — 450x.
PGC 26466	gx	09h21m16s	+10°17.7'		Cnc	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (riportata sul Megastar come **8ZW 45**) — 450x.
PGC 27915	gx	09h44m47s	+14°53.4'		CrB	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con PGC 1469714 situata 45" a NW — molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di aspetto più uniforme della compagna — 450x.
PGC 28614	gx	09h55m18s	+68°37.1'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 28725	gx	09h56m59s	+03°46.7'		Sex	24"	ottima / buono	relativamente compatta e brillante, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare (situata 2' a S di CGCG 36-6).
PGC 28731	gx	09h55m33s	+68°35.9'		UMa	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza rotonda con Ø < 20" situata subito a S di una debole stellina; appare abbastanza facilmente in visione distolta 1.5' a E di PGC 28614, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 29345	gx	10h06m14s	−12°21.2'		Hya	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva chiazza orientata da E a W ed estesa 30" o 40"; appare solo a momenti visione distolta alternando gli occhi, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 29757	gx	10h12m59s	−00°53.5'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, situata in una piccola zona depleta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte, assieme alle 7 successive dell'ammasso **AGC 957**) — 450x.
PGC 29785	gx	10h13m24s	−00°50.5'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima, piccola, rotonda con Ø < 20"; situata tra una stellina abbastanza brillante a 1.5' NNW e una più debole alla stessa distanza verso S — 450x.
PGC 29799	gx	10h13m32s	−00°59.9'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, forse rotonda con Ø < 20", c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
PGC 29819	gx	10h13m46s	−00°57.0'		Sex	24"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce esteso una 20-ina di secondi e orientato da N a S; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 29833	gx	10h13m56s	−00°53.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, appare a tratti in visione distolta orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; una stellina appena percettibile salta fuori a 1' scarso NW, ma si tratta in realtà di PGC 82627 — 450x.
PGC 29868	gx	10h14m26s	−00°52.3'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, ma è la più facile delle PGC presenti nell'ammasso AGC 957; è diffusa, appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 40"; c'è una stellina subito a W — 450x.
PGC 29869	gx	10h14m28s	−00°54.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e solo a tratti condensata, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a SE — 450x.
PGC 29880	gx	10h14m34s	−00°50.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, appare in visione distolta quando si osserva UGC 5528 situata 1' verso E; è di aspetto quasi stellare a 340x, mentre a 450x presenta dimensioni sì e no di 10" o 12".
PGC 30366	gx	10h22m26s	+21°32.5'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, senza condensazione apprezzabile, rotonda con Ø di 10"-15"; allineata ed equidistante con 2 stelline a SE; riportata sul Megastar come **2ZW 45** — 450x.
PGC 31143	gx	10h32m35s	−06°30.5'		Sex	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e Ø max di 25"-30"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 380x.
PGC 31250	gx	10h34m02s	+34°52.2'		LMi	16"	ottima / ottimo	relativamente facile, rotonda con Ø max di 20", appena condensata e compatta — 380x.
PGC 31711	gx	10h39m39s	+05°10.5'		Sex	24"	m. buona / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; è disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata 1' a N (fa parte dell'ammasso **AGC 1066**) — 450x.
PGC 31767	gx	10h40m28s	+13°37.3'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa rotonda con Ø < 40" e una condensazione stellare molto tenue; è situata tra due stelline brillanti orientate da N a S (quella a S è più luminosa); una debole stellina si trova a poco più di 1' verso S — 450x.
PGC 32158	gx	10h46m17s	+29°21.6'		LMi	16"	ottima / ottimo	elusiva macchiolina di max 15"-20" con Ø situata a ridosso N di una stellina sufficientemente brillante da offuscarla — 380x.
PGC 32340	gx	10h48m52s	+00°51.2'		Sex	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
PGC 32352	gx	10h48m58s	−04°45.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 1' scarso — 450x.
PGC 32358	gx	10h49m05s	−00°40.1'		Sex	16"	m. buona / ottimo	è un'altra elusiva macchiolina estesa 10" o 15" che appare solo a tratti in visione distolta a S di una stellina — 380x.
PGC 32387	gx	10h49m24s	+00°13.9'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø > 20" — 450x.
PGC 32445	gx	10h50m03s	+01°09.5'		Sex	24"	m. buona / buono	piccolo e debolissimo oggetto rotondo con Ø di 10"-15"; appare facilmente in visione distolta a 450x.
PGC 32572	gx	10h51m37s	−17°07.5'		Crt	24"	m. buona / discreto	molto debole e stemperata sul fondo cielo; a 340x, in visione distolta, appare allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo 60"×30"; presenta un nucleo stellare appena percettibile.
PGC 32593	gx	10h51m50s	+18°44.7'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; sembra a prima vista aggettare a E di una debole stellina; un'altra stellina più brillante si trova subito a W; la visione è comunque un po' disturbata dalla SAO 99329 di magnitudo 8.5 situata ad appena 1.5' SSE — 450x.
PGC 32713	gx	10h53m50s	+16°51.0'		Leo	16"	buona / ottimo	debole, ma facilmente visibile in visione distolta, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30"; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline brillanti a 2.5' SSE — 270x.
PGC 32970	gx	10h57m58s	+10°54.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 450x.
PGC 33072	gx	10h59m07s	+10°00.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; è situata a ridosso N di una stellina (che è la più occidentale di una stringa di 6 componenti di luminosità diseguale) — 450x.
PGC 33106	gx	10h59m31s	+11°11.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina brillante a 1' scarso verso N — 450x.
PGC 33115	gx	10h59m42s	+10°50.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debole, molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" e appena più brillante all'interno — 450x.
PGC 33129	gx	10h59m55s	+10°05.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è debole, ma relativamente facile, molto piccola e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 33134	gx	10h59m57s	+09°59.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, appare a 450x in visione distolta a ridosso NW di una stellina abbastanza brillante; forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi.
PGC 33145	gx	11h00m05s	−16°06.4'		Crt	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni 60"×20" — 450x.
PGC 33185	gx	11h00m39s	+10°53.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30" scarsi — 450x.
PGC 33202	gx	11h00m52s	+11°00.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
PGC 33284	gx	11h01m58s	−14°44.2'		Crt	24"	m. buona / m. buono	è un'elusiva chiazza di forma indistinta che appare a momenti in visione distolta a ~ 1' S di una stellina; meglio tuttavia scalare a 340x.
PGC 33453	gx	11h04m28s	+38°12.7'		UMa	16"	mediocre / ottimo	è una sorta di protrusione appena percettibile che a 380x appare a NE di UGC 6132; la visione è non sembra gran che compromessa dalla 51 UMa di 6ª grandezza situata 2' a NNE della gx.
PGC 33468	gx	11h04m44s	−15°17.6'		Crt	24"	m. buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce estesa 1' scarso e orientata da N a S; appare solo a momenti in visione distolta subito a SW di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x.

PGC 33742	gx	11h08m20s	−11°48.2'		Crt	24"	m. buona / buono	relativamente facile da vedere, piccola, compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 33753	gx	11h08m27s	−10°15.6'		Crt	24"	m. buona / mediocre	forma una coppia ravvicinata con NGC 3537A con la quale sembra interagire verso S; è una sorta di protrusione o baffo che in visione distolta appare estesa una 20-ina di secondi e di cui si riesce a notare la tonalità più pallida — 450x.
PGC 34046	gx	11h11m38s	−15°09.5'		Crt	24"	m. buona / buono	debole, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
PGC 34275	gx	11h14m50s	−10°41.6'		Crt	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 60"×30"; in questo caso è decisamente meglio scalare a 340x.
PGC 34365	gx	11h16m04s	+24°41.1'		Leo	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto visibile con gran difficoltà a 270x, esteso sì e no una 30-ina di secondi.
PGC 34728	gx	11h20m38s	−07°18.3'		Crt	24"	m. buona / m. buono	stranamente facile nel suo genere, rotonda con Ø di 45"; poco diffusa e con nucleo quasi stellare; c'è una stellina a 1' W e un'altra di luminosità simile a un paio di primi scarsi verso S; una debolissima stellina leggermente sfuocata in visione distolta appare a momenti a 1' S, ma da un controllo successivamente effettuato, quest'ultima è risultata essere la piccola 2MASS 11203926-0719279 di magnitudo 15.4 — 450x.
PGC 34910	gx	11h22m50s	+56°46.1'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø < 30" (riportata sul Megastar come **7ZW 395**) — 495x.
PGC 35152	gx	11h25m58s	−11°47.0'		Crt	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 450x.
PGC 35230	gx	11h27m09s	−06°08.3'		Crt	24"	m. buona / buono	debole e diffusa, con tenue condensazione centrale visibile solo a momenti, orientata da E a W con dimensioni 45"×30" — 450x.
PGC 35844	gx	11h35m41s	+48°18.2'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debolissima e difficile da osservare, in quanto situata in una piccola zona virtualmente depleta; in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 30"; una stellina appena percettibile si vede a momenti subito a SW — 495x.
PGC 35849	gx	11h35m44s	+49°10.0'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte dell'ammasso **AGC 1314** — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata 1' a N di MCG+8-21-66 — 450x.
PGC 37365	gx	11h54m40s	+25°56.6'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto indistinto che salta fuori solo a 380x fissando lo sguardo sulla stellina situata 2.5' a S (praticamente l'unica visibile nel campo!).
PGC 37414	gx	11h55m20s	−18°50.6'		Crt	16"	m. buona / m. buono	salta fuori facilmente in visione distolta; è di luminosità uniforme, di forma indistinta ed estesa per max 15"-20" (riportata sul Megastar come 1SZ 18) — 270x.
PGC 37801	gx	11h59m49s	+27°51.3'		Leo	16"	m. buona / ottimo	debolissima, rotonda con Ø di ~ 30"; qualche lievissima discrepanza di luce all'interno appare ogni tanto a 380x.
PGC 38401	gx	12h06m34s	+22°15.6'		Com	16"	ottima / ottimo	molto debole, appena più contrastata del fondo cielo, rotonda con Ø di ~ 40" e di luminosità uniforme — 380x.
PGC 38453	gx	12h07m09s	+25°38.4'		Com	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo con Ø max di 20" e solo a tratti condensato a 380x.
PGC 38612	gx	12h09m14s	+26°52.6'		Com	16"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo di una 30-ina di secondi con Ø visibile con difficoltà a 270x.
PGC 39080	gx	12h14m14s	+13°32.6'		Com	24"	m. buona / ottimo	debolissima, forse rotonda con Ø sì e no di 30"; appare in visione distolta a poco più di 1' N di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x (è riportata sul Megastar come **VCC 109**).
PGC 39200	gx	12h15m26s	+15°14.8'		Com	28"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' scarso SSE (riportata sul Megastar come **VCC 148**) — 495x.
PGC 39369	gx	12h17m07s	+69°23.7'		Dra	24"	buona / m. buona	a 450x appare come una debole stellina leggermente sfuocata a ridosso SSE di NGC 4236 (riportata sul Megastar come **7ZW 446**).
PGC 39467	gx	12h17m53s	+13°10.6'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, estesa sì e no 20"; appare a tratti in visione distolta a 1' SE di una stellina (è riportata sul Megastar come **VCC 261**) — 450x.
PGC 40059	gx	12h22m15s	+07°10.0'		Vir	16"	ottima / ottimo	è un elusivo oggetto molto piccolo, esteso 15" o 20" e che salta fuori a tratti a 380x quando si osserva NGC 4309 dalla quale dista 1.5' NNE; riportata sul Megastar come **VCC 538**.
PGC 40246	gx	12h23m50s	+08°43.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1.5' ENE — 450x.
PGC 40556	gx	12h25m39s	+12°18.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' SW di una stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x (altresì riportata sul Megastar come **VCC 823**) — 450x.
PGC 40670	gx	12h26m19s	+08°21.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma soprattutto molto difficile da vedere in quanto situata in una plaga depleta (gli unici riferimenti sono NGC 4415 situata 7' a NE e una coppia di stelline alla stessa distanza verso S); solo a momenti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 30"×20" (riportata sul Megastar come **VCC 888**) — 340x.
PGC 40759	gx	12h26m55s	+10°40.0'		Vir	28"	ottima / m. buono	molto debole e stemperata sul fondo cielo, di luminosità uniforme, a tratti in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×30"; c'è una stellina appena percettibile subito a S; è situata in una piccola plaga quasi priva di riferimenti che ne rende difficile l'esame (riportata sul Megastar come **VCC 949**) — 495x.
PGC 40835	gx	12h27m20s	+16°25.8'		Com	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza forse circolare con Ø < 30"; appare in visione distolta ma non bisogna scendere sotto i 450x. (altresì riportata sul Megastar come VCC 994) — 450x.
PGC 41027	gx	12h28m30s	+07°19.5'		Vir	28"	ottima / m. buono	è una chiazza estremamente debole di forma vagamente circolare con Ø di 30"-35"; c'è una stellina a 1' NE (riportata sul Megastar come **VCC 1107**) — 495x.
PGC 41143	gx	12h29m18s	+09°56.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (riportata su Megastar come **VCC 1174**) — 450x.
PGC 41185	gx	12h29m37s	+07°56.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente in visione distolta a 450x, molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; riportata sul Megastar come **VCC 1203**. È situata a ridosso SW di M49 (presenza di chiarore lunare).
PGC 41210	gx	12h29m33s	+11°13.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø > 20"; 2 stelle brillanti rispettivamente a 3' NW e 5' SSW delimitano quasi il campo dell'oculare da 4.8 mm — 570x. Riportata sul Megastar come **8ZW 188**.
PGC 41264	gx	12h30m05s	+08°04.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; riportata sul Megastar come **VCC 1254**. È situata 6' a NE di M49(presenza di chiarore lunare) — 450x.
PGC 41726	gx	12h33m38s	+07°52.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15"; appare in visione distolta a 450x, ma occorre tenere fuori campo la SAO 119465 di magnitudo 7.5 situata 5.5' a NW; c'è una stellina a 1' scarso verso E (riportata sul Megastar come **VCC 1514**).
PGC 41831	gx	12h34m32s	+16°02.0'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata da una stellina brillante situata 1' a NE (riportata sul Megastar come **VCC 1570**) — 450x.
PGC 41845	gx	12h34m38s	+15°36.2'		Com	24"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza approssim. circolare con Ø di una 30-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x (riportata sul Megastar come **VCC 1577**) .
PGC 42052	gx	12h36m28s	+12°24.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' NNE (riportata sul Megastar come **VCC 1665**) — 450x.
PGC 42212	gx	12h38m18s	+10°04.4'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con un nucleo stellare appena percettibile (è riportata sul Megastar come **VCC 1746**) — 450x.
PGC 42221	gx	12h38m17s	−04°46.5'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa, in visione distolta appare allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con bulge molto tenue visibile a tratti — 450x.
PGC 42344	gx	12h39m23s	−04°52.0'		Vir	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 450x.
PGC 42481	gx	12h40m41s	−05°05.5'		Vir	24"	buona / m. buono	debolissima, visibile a tratti in visione distolta a 450x, non più estesa di 20".
PGC 42529	gx	12h41m01s	−06°39.8'		Vir	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con tenue condensazione centrale poco contrastata; c'è una stellina brillante a poco più di 1' NW — 450x.
PGC 42600	gx	12h41m51s	−07°10.2'		Vir	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; meglio contrastata scalando a 340x.
PGC 42878	gx	12h44m09s	+11°10.6'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima, ma salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, probabilmente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; riportata sul Megastar come **VCC 1991** — 450x.
PGC 42890	gx	12h44m17s	+12°01.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	a 580x appare solo elusivamente quasi a ridosso N di una stellina brillante; non sembra più estesa di 15"-20"; riportata sul Megastar come **VCC 1995**.
PGC 42898	gx	12h44m19s	−05°32.2'		Vir	24"	m. buona / buono	lama di luce molto debole, ma facilmente visibile in visione distolta a 400x, orientata da NE a SW ed estesa 1.5'.
PGC 43079	gx	12h46m22s	+26°27.3'		Com	16"	m. buona / ottimo	è un piccolo ed elusivo oggetto rotondo di una 20-ina di secondi con Ø situato a ridosso verso N di un asterismo di 8 stelline: quella abbastanza brillante a NE è una doppia stretta con componenti di eguale luminosità — 380x.
PGC 43104	gx	12h46m37s	−04°04.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è una chiazza elusiva estesa una 30-ina di secondi e di forma indistinta; appare a tratti in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
PGC 43119	gx	12h46m55s	+10°11.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è un'elusiva lama di luce che appare come tale solo a tratti in visione distolta, ma occorre spingere a 570x; orientata da E a W per una 30-ina di secondi; riportata sia sull'Uranometria, sia sul Megastar come **VCC 2045**.
PGC 43237	gx	12h48m06s	−10°10.6'		Vir	24"	m. buona / mediocre	elusiva, appare solo a momenti a 450x, forse rotonda e comunque non più estesa di 30".
PGC 43876	gx	12h54m06s	−16°05.0'		Crv	24"	ottima / m. buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da E a W ed estesa per oltre 1'; c'è una stellina a ridosso W — 340x.
PGC 43923	gx	12h54m34s	−14°47.3'		Crv	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, occorre spingere a 580x (a 340x di fatto non l'ho vista e a 450x s'intravvede appena), forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione distolta subito a N di una stellina.
PGC 43966	gx	12h54m49s	−16°03.1'		Crv	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza molto diffusa e di luminosità uniforme; in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 45"×30", ma occorre scalare a 340x.
PGC 44021	gx	12h55m20s	−14°57.1'		Crv	24"	ottima / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
PGC 44062	gx	12h55m34s	−14°54.2'		Crv	24"	ottima / m. buono	è una debolissima chiazza molto diffusa che appare solo a momenti in visione distolta a ~ SW di una stellina, forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (situata 4.5'a NE della precedente) — 450x.
PGC 44302	gx	12h57m27s	−12°06.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente e solo a tratti a W di una stellina; la visione è purtroppo funestata dalla SAO 157618 di magnitudo 6.5 situata 4' a NW — 450x.
PGC 44303	gx	12h57m30s	−12°07.4'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza circolare estesa una 40-ina di secondi e situata quasi a ridosso S di una stellina; è meglio definita scalando a 340x, ma così non si riesce a tenere fuori campo la SAO 157618 di magnitudo 6.5 situata 5' a NW (situata 1' a SE della precedente).
PGC 44643	gx	12h59m40s	+27°34.6'		Com	16"	buona / buono	è una piccola gx elusiva estesa una 20-ina di secondi che si riesce a catturare solo a tratti in visione distolta a 380x di modo da separarla da una stellina situata a neppure 1' verso W; c'è una stellina percettibile solo a tratti subito a N.
PGC 44733	gx	13h00m17s	−03°04.0'		Vir	24"	ottima / ottimo	debolissima, salta fuori in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; solo a momenti appare orientata da N a S ed estesa 40"-45".
PGC 44776	gx	13h00m29s	−13°38.7'		Vir	24"	ottima / m. buono	è una debolissima chiazza visibile in visione distolta a 1.5' S di una coppia di stelline di luminosità diseguale; solo a momenti appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30", ma occorre scalare a 340x.
PGC 44792	gx	13h00m39s	+28°00.8'		Com	24"	ottima / ottimo	debole, piccola e diffusa, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 20"×10"; una debole stellina appena sfuocata situata a ridosso N è in realtà la **PGC 44794** — 450x.
PGC 44794	gx	13h00m39s	+28°01.2'		Com	24"	ottima / ottimo	anche a 450x rimane praticamente di aspetto quasi stellare; è situata a ridosso N di **PGC 44792** — 450x.
PGC 44809	gx	13h00m43s	+27°57.8'		Com	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x a ridosso S di IC 4042.
PGC 44821	gx	13h00m47s	+27°55.3'		Com	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" (situata 1.5' a E di NGC 4906) — 450x.
PGC 45134	gx	13h03m51s	−16°33.2'		Vir	24"	ottima / buono	lama di luce molto debole e di luminosità uniforme, orientata da ENE a WSW e che in visione distolta pare estesa per oltre 1'; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NW — 450x.
PGC 45300	gx	13h05m34s	−15°45.0'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima e spampanata, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di ~ 1'; c'è una stellina a 1' verso S e un'altra appena percettibile alla stessa distanza verso N; meglio contrastata scalando a 340x.
PGC 45518	gx	13h08m06s	−14°46.5'		Vir	24"	m. buona / discreto	elusiva, appare solo a momenti a 1' E di una stellina abbastanza brillante; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 40"-45"; è comunque meglio non scalare gli ingrandimenti — 450x.
PGC 45594	gx	13h09m09s	+53°56.6'		UMa	28"	m. buona / buono	relativamente facile, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" o poco meno (riportata sul Megastar come **1ZW 52**) — 495x.
PGC 45653	gx	13h09m46s	−04°10.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni 60"×20" — 450x.
PGC 45681	gx	13h10m05s	−15°46.2'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (riportata sul Megastar come Anon 1307-15) — 450x.
PGC 46205	gx	13h16m27s	+12°57.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente facile e compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15", ma senza una condensazione vera e propria (riportata sul Megastar come **8ZW 275**) — 450x.
PGC 46412	gx	13h19m05s	+07°31.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	appare di aspetto quasi stellare anche a 400x; a 570x si vede chiaramente diffusa e condensata, molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; riportata sull'Uranometria come 8ZW 288 — 570x.
PGC 46448	gx	13h19m22s	−15°09.4'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20"; situata subito a E di MCG-2-34-24 (riportata sul Megastar come **2SZ 34**) — 450x.
PGC 46494	gx	13h19m55s	−17°18.8'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debolissimo lucore molto diffuso, appare in visione distolta, ma occorre scalare a 340x, grosso modo rotondo con Ø di 1'.
PGC 46537	gx	13h20m18s	−13°05.9'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e con condensazione centrale molto tenue (riportata sul Megastar come **2SZ 36**) — 450x.
PGC 46603	gx	13h20m58s	+08°59.1'		Vir	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, appare in visione distolta a ridosso NW di NGC 5100, dalla quale è però decisamente "staccata", approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi. Riportata sull'Uranometria come **8ZW 295** — 450x.
PGC 46625	gx	13h18m08s	+42°29.8'		CVn	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, appare elusivamente e solo a momenti a 1' E di una stellina abbastanza brillante — 495x.
PGC 46733	gx	13h22m51s	−11°22.3'		Vir	24"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" (riportata sul Megastar come **2SZ 40**) — 450x.
PGC 46777	gx	13h23m18s	−11°21.5'		Vir	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a ridosso W (riportata sul Megastar come **2SZ 41**) — 450x.
PGC 46929	gx	13h25m19s	+06°32.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è un piccolo oggetto relativamente compatto esteso non più di 15" o 20" e con nucleo stellare; c'è una stellina abbastanza luminosa a 1.5' verso E; riportata sull'Uranometria come 8ZW 309 — 570x.
PGC 47350	gx	13h29m28s	−11°08.5'		Vir	24"	buona / ottimo	è un'elusiva chiazza probabilmente circolare estesa per ~ 1'; appare a momenti in visione distolta, ma occorre scalare a 340x.
PGC 47817	gx	13h34m19s	+34°51.8'		CVn	16"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, rotonda, di luminosità pressoché uniforme e Ø di 30" — 380x.
PGC 49266	gx	13h52m16s	+02°06.5'		Vir	24"	buona / m. buono	più compatta di NGC 5331 (con la quale forma una coppia serrata) e orientata a perpendicolo a quest'ultima, di luminosità uniforme e dimensioni 30"×20" — 450x.
PGC 50053	gx	14h03m12s	+11°43.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata e quasi equidistante con due stelline a ENE (quella più vicina alla gx è molto debole). Riportata sul Megastar come **8ZW 351** — 450x.
PGC 50598	gx	14h10m23s	−04°08.1'		Vir	24"	discreta / m. buono	molto debole e diffusa, non più estesa di 15" o 20" e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente a 450x malgrado un debole chiarore lunare.
PGC 50851	gx	14h14m18s	+12°20.6'		Boo	24"	ottima / ottimo	appare come un tenue rinforzo di luce situato verso l'estremità N di UGC 9109; c'è una stellina di magnitudo 14.8 ben visibile a ridosso NE — 580x.
PGC 51259	gx	14h20m50s	+05°26.5'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensazione stellare appena percettibile; riportata sul Megastar come **8ZW 401** — 450x.
PGC 52124	gx	14h35m02s	+55°11.8'		Dra	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con la successiva, ma le due galassiette si sdoppiano a fatica; questa è poco più di una debolissima stellina a ridosso E di **PGC 52126** — 495x.
PGC 52126	gx	14h35m04s	+55°11.8'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, forma una coppia serrata con la precedente, in visione distolta non pare più estesa di 15" — 495x.
PGC 52133	gx	14h35m09s	+55°05.1'		Dra	28"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 52136	gx	14h35m11s	+55°35.2'		Dra	28"	m. buona / m. buono	di aspetto simile alla precedente, ma ancora più evanescente, estesa anche questa ~ 20" — 495x.
PGC 52143	gx	14h35m25s	+55°04.6'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 495x.
PGC 52152	gx	14h35m28s	+55°07.9'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 52943	gx	14h49m35s	−10°04.8'		Lib	24"	mediocre / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta e condensata, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso di SE — 450x.
PGC 52958	gx	14h49m57s	+16°48.5'		Per	24"	ottima / buono	forma una coppia ravvicinata con PGC 52960 situata mezzo primo più a E — sono molto deboli, ma appaiono facilmente a 450x, rotonde con Ø di una 20-ina di secondi, poco diffuse e di luminosità uniforme; la 1ª è più evidente e si trova a ridosso di una stellina abbastanza brillante situata a NW.
PGC 52960	gx	14h49m59s	+16°48.6'		Boo	24"	ottima / buono	v. **PGC 52958**
PGC 53047	gx	14h51m24s	+06°48.0'		Boo	24"	ottima / ottimo	è una sorta di debole protuberanza molto diffusa situata a SE di CGCG 48-28 — 450x.
PGC 53304	gx	14h54m42s	+16°30.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta a SW di una debole stellina; forse rotonda con Ø di una decina di secondi — 450x.
PGC 53356	gx	14h55m30s	+16°27.8'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, appare facilmente in visione distolta a 450x, ma anche questa non sembra più estesa di di 10"-12".
PGC 53545	gx	14h59m21s	+42°16.2'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' NW — 495x.
PGC 54209	gx	15h11m26s	+06°20.9'		Ser	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata e forse interagente con UGC 9756 situata a ridosso NE; molto diffusa rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; la coppia appare comunque meglio definita scalando a 340x; le due gx sono situate al centro dell'ammasso AGC 2033.
PGC 54479	gx	15h16m04s	+06°50.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
PGC 54489	gx	15h16m11s	+06°46.7'		Ser	24"	m. buona / m. buono	debolissima, piccola e molto diffusa, forse rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 54502	gx	15h16m26s	+07°12.9'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-12"; situata a ridosso E di una debole stellina — 450x.
PGC 54513	gx	15h16m36s	+07°05.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	anche questa è debolissima, molto piccola e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (fa parte dell'ammasso **AGC 2052**) — 450x.
PGC 54514	gx	15h16m37s	+07°07.8'		Ser	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente all'interno di un piccolo triangolo rettangolo di stelline appena percettibili; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W ed estesa una 20-ina di secondi (fa parte dell'ammasso AGC 2052) — 450x.
PGC 54524	gx	15h16m44s	+07°05.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	altra galassietta debolissima, diffusa e molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (fa parte dell'ammasso **AGC 2052**) — 450x.
PGC 54533	gx	15h16m54s	+06°56.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	fa parte dell'ammasso AGC 2052 — relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
PGC 54546	gx	15h17m03s	+07°08.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10", situata a ridosso NW di una stellina brillante che tende a offuscarla (fa parte dell'ammasso **AGC 2052**) — 450x.
PGC 54552	gx	15h17m11s	+07°12.5'		Ser	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø max di 15"; c'è una stellina a 1' scarso NW — 450x.
PGC 54554	gx	15h17m11s	+06°56.5'		Ser	16"	buona / ottimo	a prima vista sembra di aspetto stellare; a 380x è un minuscolo oggetto rotondo di 10"-15" con Ø con una stellina a ridosso verso SE.
PGC 54558	gx	15h17m13s	+07°14.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 54559	gx	15h17m14s	+21°35.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, poco diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 54560	gx	15h17m14s	+07°11.1'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto diffusa, grosso modo rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 54563	gx	15h17m16s	+07°06.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	un'altra piccola galassietta debolissima e molto diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a S: quella più meridionale fa parte di un piccolo triangolo di stelline brillanti (appartiene all'ammasso AGC 2052) — 450x.
PGC 54587	gx	15h17m36s	+07°02.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma relativamente compatta, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; ci sono due deboli stelline a 1' scarso W e SW (situata a ridosso E dell'ammasso AGC 2052) — 450x.
PGC 54757	gx	15h20m48s	+49°07.6'		Boo	28"	m. buona / discreto	piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una stellina subito a N — 495x.
PGC 54881	gx	15h22m29s	+27°42.7'		CrB	24"	m. buona / ottimo	(fa parte dell'ammasso **AGC 2065**) v. **MCG+5-36-20**
PGC 54883	gx	15h22m29s	+27°42.5'		CrB	24"	m. buona / ottimo	(fa parte dell'ammasso **AGC 2065**) v. **MCG+5-36-20**
PGC 54894	gx	15h22m44s	+27°37.1'		CrB	24"	m. buona / ottimo	(fa parte dell'ammasso **AGC 2065**) v. **MCG+5-36-20**
PGC 55004	gx	15h24m25s	+26°25.6'		CrB	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con CGCG 165-50 situata a ridosso E — è di aspetto e dimensione simili, solo poco più debole e con tenue condensazione stellare — 450x.
PGC 55124	gx	15h27m13s	+28°43.5'		CrB	28"	m. buona / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
PGC 55126	gx	15h27m13s	+28°45.9'		CrB	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×15" — 495x.
PGC 55136	gx	15h27m34s	+28°51.0'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stella brillante a un paio di primi verso S (situata al margine W dell'ammasso **AGC 2079**) — 495x.
PGC 55139	gx	15h27m28s	+28°42.0'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' NW e una debole subito a SE — 495x.
PGC 55142	gx	15h27m31s	+28°52.7'		CrB	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, in visione distolta è rotonda con Ø di 12"-15" (fa parte assieme alla successiva dell'ammasso **AGC 2079**) — 495x.
PGC 55143	gx	15h27m33s	+28°51.1'		CrB	28"	m. buona / m. buono	situata 1.5' a S della precedente appare del tutto simile anche se appena più evidente; le 2 galassiette sono equidistanti con una debole stellina a S di questa — 495x.
PGC 55149	gx	15h27m44s	+28°55.1'		CrB	28"	m. buona / m. buono	piccola, debole, diffusa e con tenue condensazione stellare, rotonda con Ø 20"-25"; forma una coppia ravvicinata con **UGC 9861** nel cui alone sembra a prima vista immersa — 495x.
PGC 55167	gx	15h28m02s	+28°56.6'		CrB	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E (fa parte assieme alla successiva di **AGC 2079**) — 495x.
PGC 55172	gx	15h28m06s	+29°00.6'		CrB	28"	m. buona / m. buono	poco più evidente di **MCG+5-36-34**, dalla quale dista 1' a NE, molto piccola, rotonda con Ø di ~ 15" (situata al margine N dell'ammasso **AGC 2079**) — 495x.
PGC 55174	gx	15h28m10s	+28°20.5'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
PGC 55192	gx	15h28m32s	+28°57.9'		CrB	28"	m. buona / m. buono	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' SW (situata al margine NE dell'ammasso **AGC 2079**) — 495x.
PGC 55193	gx	15h28m33s	+29°00.1'		CrB	28"	m. buona / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (il Megastar la colloca subito all'esterno verso NE dell'ammasso **AGC 2079**) — 495x.
PGC 55585	gx	15h36m31s	+54°34.4'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa e condensata, poco allungata da E a W con dimensioni 20"×15" — 495x.
PGC 55599	gx	15h36m42s	+54°31.3'		Dra	28"	m. buona / m. buono	appare in visione distolta come una stellina appena percettibile a 1.5' NW di una stellina di 15-esima; il Magastar la riporta addirittura di magnitudo 17.8 ! — 495x.
PGC 56460	gx	15h57m08s	+63°54.6'		Dra	24"	ottima / m. buono	è un piccolo e debolissimo batuffolo rotondo situato a ridosso S di UGC 10115, esteso 10"-12" e di aspetto uniforme (riportato sul Megastar come **Kaz 50**).
PGC 56496	gx	15h57m45s	+41°42.6'		Her	24"	m. buona / discreto	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 12"-15" (è riportata sul Megastar come **1ZW 131**) — 450x.
PGC 56622	gx	15h59m57s	+69°59.7'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata sul lato superiore di un piccolo trapezio formato da 4 stelline: la componente più a N è appena percettibile (riportata sul Megastar come **Kaz 55**) — 450x.
PGC 56880	gx	16h03m35s	+15°52.5'		Her	24"	m. buona / discreto	debolissima, salta fuori in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 56888	gx	16h03m44s	+15°47.4'		Her	24"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, facilmente osservabile in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; si trova tra 2 stelle distanti 2.5' e orientate da N a S.
PGC 56920	gx	16h04m07s	+40°34.3'		Her	24"	buona / ottimo	molto debole, minuscola e relativamente compatta; in visione distolta, a 570x, appare abbastanza chiaramente orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
PGC 57055	gx	16h05m23s	+17°51.3'		Her	16"	discreta / m. buono	debolissimo oggetto quasi elusivo, esteso 20" o 30"; si vede a tratti in visione distolta a ~ 1' S di una stellina (fa parte dell'ammasso **AGC 2151**) — 270x.
PGC 57112	gx	16h05m53s	+17°18.5'		Her	24"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una stellina brillante a 1' NNW — 450x.
PGC 57136	gx	16h06m12s	+17°18.1'		Her	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da WNW a ESE con dimensioni 30"×15" — 450x.
PGC 57158	gx	16h06m34s	+17°17.8'		Her	24"	ottima / m. buono	molto debole, in visione distolta appare a tratti orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 30"×20" e di luminosità uniforme; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
PGC 57214	gx	16h07m24s	+17°39.7'		Her	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, piccola, estesa non più di 30" o 35"; a 380x appare a tratti una condensazione centrale molto tenue.
PGC 57282	gx	16h08m26s	+86°02.7'		UMi	24"	ottima / m. buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" (riportata sul Megastar come **7ZW 644**) — 450x.
PGC 57594	gx	16h14m42s	+68°38.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e appena più brillante all'interno; c'è una coppia di deboli stelline a S della gx (riportata sul Megastar come **Kaz 64**) — 450x.
PGC 57663	gx	16h16m06s	+50°55.0'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia di deboli stelline a 1' SW orientata nella stessa direzione (riportata sul Megastar come **1ZW 138**) — 495x.
PGC 57680	gx	16h16m22s	+65°21.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
PGC 57737	gx	16h17m36s	+35°08.1'		CrB	16"	buona / m. buono	debole, ma facilmente visibile in visione distolta, di luminosità uniforme, allungata da ENE a WSW con dimensioni 20"×10" — 270x.
PGC 58064	gx	16h24m51s	+17°44.2'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una doppia a 1' verso E. Riportata sul Megastar come **Kaz 425** — 450x.
PGC 58158	gx	16h27m00s	+39°19.2'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" (o poco più); assieme a un corteggio di deboli gx limitrofe è situata grosso modo a metà strada verso SW dal centro dell'ammasso **AGC 2199** — 495x.
PGC 58191	gx	16h27m40s	+40°54.8'		Her	28"	m. buona / discreto	è una sorta di debolissimo "foruncolo" molto piccolo situato a ridosso S di NGC 6160 — 495x.
PGC 58192	gx	16h27m32s	+39°34.2'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
PGC 58195	gx	16h27m42s	+39°22.6'		Her	28"	m. buona / discreto	appare a momenti come una debolissima stellina sfuocata a ridosso SE di NGC 6158 (fa parte dell'ammasso AGC 2199) — 495x.
PGC 58200	gx	16h27m44s	+39°32.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto debole, relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e di luminosità pressoché uniforme — 450x.
PGC 58212	gx	16h27m59s	+39°36.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una stellina a 1' NW — 450x.
PGC 58213	gx	16h27m56s	+39°34.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare; c'è una stellina a 1' scarso verso E — 450x.
PGC 58220	gx	16h28m14s	+39°32.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto piccola e debolissima, grosso modo rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
PGC 58231	gx	16h28m17s	+32°48.8'		Her	24"	m. buona / m. buono	altresì denominata **Hickson 82D**, è molto piccola e debole, relativamente compatta, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; appare facilmente in visione diretta a 450x.
PGC 58233	gx	16h28m11s	+39°33.6'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — appare solo come una debolissima stellina visibile solo a momenti — 450x.
PGC 58242	gx	16h28m25s	+39°44.5'		Her	28"	m. buona / discreto	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina brillante subito a S; poco disturbata dalla SAO 65324 di 9ª grandezza situata 2.5' a NE (fa parte dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
PGC 58255	gx	16h28m34s	+39°25.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto debole e diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
PGC 58301	gx	16h28m57s	+39°42.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 58307	gx	16h29m01s	+40°32.1'		Her	28"	m. buona / discreto	molto diffusa, allungata da NE a SW, di dimensioni 40"×20", con nucleo stellare evidente, ma poco contrastato (fa parte dell'ammasso **AGC 2197** ed è riportata sul Megastar come **3ZW 80**) — 495x.
PGC 58309	gx	16h29m00s	+39°41.0'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — situata 1.5' a S della precedente, è piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 58316	gx	16h29m07s	+40°35.9'		Her	28"	m. buona / discreto	relativamente facile, diffusa e con basso gradiente di luce, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×20" (fa parte dell'ammasso **AGC 2197**) — 495x.
PGC 58319	gx	16h29m09s	+40°59.3'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte, assieme alle 3 successive, del nutrito ammasso **AGC 2197** — relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e con condensazione stellare appena percettibile — 450x.
PGC 58324	gx	16h29m20s	+39°25.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NE — 450x.
PGC 58325	gx	16h29m16s	+39°34.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con nucleo stellare evidente — 450x.
PGC 58350	gx	16h29m46s	+40°52.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, rotonda con Ø di 10" o 12"; forma una coppia ravvicinata con **NGC 6174** situata a ridosso SE — 450x.
PGC 58358	gx	16h29m52s	+40°49.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	è situata 1.5' a NE di NGC 6173, molto piccola e condensata, di aspetto quasi stellare a 340x, rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
PGC 58367	gx	16h30m06s	+40°47.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare poco allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×15"; c'è una stellina a ridosso S e una più brillante e poco più distante a NNW — 450x.
PGC 58674	gx	16h38m14s	+41°55.8'		Her	28"	ottima / buono	è situata a ridosso S di **UGC 10491**, molto piccola (a prima vista è di aspetto stellare), compatta e condensata, con dimensioni di 10"-12" (riportata sul Megastar come **Anon 1636+42A**)— 495x.
PGC 58708	gx	16h39m32s	+53°46.7'		Dra	28"	ottima / buono	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 495x.
PGC 58858	gx	16h44m05s	+75°38.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; ci sono tre stelline leggermente arcuate a S; riportata sul Megastar come **Kaz 89** — 450x.
PGC 59062	gx	16h49m26s	+45°27.5'		Her	28"	m. buona / m. buono	è un piccolo e debolissimo "foruncolo" esteso sì e no 10" che aggetta a SW di **Arp 103** — 495x.
PGC 59120	gx	16h51m07s	+81°35.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	v. **PGC 59122**
PGC 59122	gx	16h50m59s	+81°37.5'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 30"-35"; forma una coppia ravvicinata con PGC 59120 situata a ridosso NE; quest'ultima si separa facilmente in visione distolta, ma è più piccola e più debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte dell'ammasso AGC 2247) — 450x.
PGC 59174	gx	16h52m47s	+81°38.0'		UMi	24"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W (fa parte dell'ammasso AGC 2247) — 450x.
PGC 59375	gx	16h59m03s	+77°02.9'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile (fa parte dell'ammasso **AGC 2248**) — 450x.
PGC 59387	gx	16h59m38s	+68°26.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di 30" scarsi; c'è una stellina molto debole a ridosso N e un'altra percettibile solo a momenti a NE, ma quest'ultima è risultata essere la **2MASS 16594209+6826353** (la PGC è riportata sul Megastar come **7ZW 672**) — 450x.
PGC 59466	gx	17h02m08s	+60°57.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola e condensata, appare facilmente in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-15" (siglata sul Megastar come **7ZW 674**).
PGC 59588	gx	17h05m26s	+69°09.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso N (riportata sul Megastar come **7ZW 679**) — 450x.
PGC 59705	gx	17h09m15s	+72°18.4'		Dra	24"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15" — 450x.
PGC 59760	gx	17h10m56s	+39°41.5'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø non superiore a 15"; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a SW (la gx è situata quasi al centro dell'ammasso **AGC 2250**) — 495x.
PGC 59844	gx	17h12m47s	+72°29.5'		Dra	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è riportata sul Megastar come **Kaz 124** — 450x.
PGC 59896	gx	17h14m20s	+53°10.5'		Dra	28"	ottima / buono	debole, molto piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; riportata sul Megastar come **IRAS 17132+5313** — 495x.
PGC 60146	gx	17h22m24s	+02°00.4'		Oph	24"	m. buona / m. buono	è un elusivo baffo di luce orientato da NW a SE ed esteso sì e no una 30-ina di secondi; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; situato 1' SE di UGC 10824.
PGC 60245	gx	17h24m49s	+46°02.5'		Her	24"	buona / buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; meglio visibile restando a 450x; riportata sul Megastar come **1ZW 183**.
PGC 60268	gx	17h25m36s	+45°38.1'		Her	24"	buona / buono	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una decina di secondi; riportata sul Megastar come **1ZW 184** — 450x.
PGC 60360	gx	17h28m41s	+45°32.1'		Her	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una decina di secondi; c'è una stellina a 1' W (riportata sul Megastar come **1ZW 188**) — 450x.
PGC 60491	gx	17h33m24s	+68°33.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso NW (riportata sul Megastar come **Kaz 145** o **7ZW 723**) — 450x.
PGC 60671	gx	17h40m25s	+47°44.0'		Her	24"	m. buona / discreto	debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una debole stellina subito a NW (riportata sul Megastar come **1ZW 191**)
PGC 60715	gx	17h41m59s	+66°31.7'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" (riportata sul Megastar come **Kaz 269**) — 495x.
PGC 60736	gx	17h42m46s	+39°00.3'		Her	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina abbastanza brillante subito a E — 495x.
PGC 60887	gx	17h48m18s	+17°56.8'		Her	16"	ottima / m. buono	appare solo come una stellina appena percettibile situata a ridosso W di UGC 10987 — 380x.
PGC 61031	gx	17h52m46s	+45°58.8'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso N circa della stessa luminosità della gx (riportata sul Megastar come **1ZW 202**) — 450x.
PGC 61046	gx	17h53m00s	+47°45.0'		Her	28"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, estesa sì e no 12"-15"; è situata sul "manico" di un piccolo asterismo foggiato a …battipanni; riportata sul Megastar come **1ZW 203** — 495x.
PGC 61083	gx	17h54m37s	+68°03.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a ridosso verso S — 450x.
PGC 61122	gx	17h56m02s	+65°20.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata tra una stellina a E e una doppia stretta a W — 450x.

PGC 61395	gx	18h05m40s	+59°46.0'		Dra	24"	m. buona / m. buono	anche a 450x rimane un oggetto di aspetto curiosamente stellare; una stellina si trova a 1' SE e un'altra molto debole alla stessa distanza ESE (riportata sull'Uranometria come 7ZW 765).
PGC 61511	gx	18h11m06s	+50°10.1'		Her	28"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina a 1' W — 495x.
PGC 61572	gx	18h12m45s	+49°51.7'		Her	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline subito a S e una molto serrata a 1' verso N — 450x.
PGC 61738	gx	18h19m43s	+68°56.9'		Dra	28"	m. buona / discreto	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, disturbata da una stellina brillante 40" a N — 495x.
PGC 61748	gx	18h20m06s	+63°40.7'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, compatta e condensata, rotonda con Ø di 10"-15" (riportata sul Megastar come **Kaz 480**) — 450x.
PGC 61820	gx	18h23m23s	+47°54.4'		Dra	24"	ottima / ottimo	piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW (è riportata sul Megastar come **KAZ 482**) — 450x.
PGC 61881	gx	18h26m43s	+34°19.9'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare facilmente anche in visione diretta subito a a NE di una stellina (riportata sul Megastar come **1ZW 206**) — 450x.
PGC 62010	gx	18h32m40s	+54°32.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e relativamente compatta, approssim. circolare con Ø di 10"-12" (riportata sul Megastar come **1ZW 208**) — 450x.
PGC 62332	gx	18h44m02s	+45°33.5'		Lyr	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" — 495x.
PGC 63061	gx	19h19m16s	+44°10.0'		Cyg	28"	ottima / ottimo	piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e condensata — 495x.
PGC 63078	gx	19h20m18s	+44°02.7'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
PGC 63080	gx	19h20m20s	+43°58.5'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, appare elusivamente tra una stellina a W e una doppia debole e serrata a E (fa parte assieme alla successiva dell'ammasso **AGC 2319**) — 495x.
PGC 63089	gx	19h20m37s	+44°06.7'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, in visione distolta appare anche questa grosso modo rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso S e una coppia di stelline deboli a N — 495x.
PGC 63091	gx	19h20m42s	+43°56.6'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa 12"-15"; appare in visione distolta subito a S di una stellina — 495x.
PGC 63093	gx	19h20m44s	+73°09.3'		Dra	24"	buona / buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20"; c'è una stellina brillante una 30-ina di secondi a N e una molto debole più o meno alla stessa distanza verso E (riportata sul Megastar come **Kaz 504**) — 450x.
PGC 63094	gx	19h20m45s	+44°00.6'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, di dimensioni simili a PGC 63091, situata subito a N di una debole stellina (fa parte dell'ammasso **AGC 2319**) — 495x.
PGC 63104	gx	19h21m11s	+43°54.5'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, debolissima e diffusa, appare in visione distolta a ridosso NE di una stellina abbastanza brillante, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (assieme alle due successive fa parte dell'ammasso **AGC 2319**) — 495x.
PGC 63105	gx	19h21m11s	+43°50.0'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una coppia di deboli stelline a ridosso W (situata subito all'esterno a SSE dell'ammasso **AGC 2319**) — 495x.
PGC 63107	gx	19h21m14s	+48°06.3'		Cyg	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente a 450x a ridosso E di 3 stelline serrate leggermente arcuate e orientate da E a W; non ne capisco la forma, ma non sembra più estesa di 15" — 450x.
PGC 63110	gx	19h21m16s	+43°54.9'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, appare elusivamente in mezzo a 2 stelline orientate da NE a SW distanti 1' scarso — 495x.
PGC 63112	gx	19h21m19s	+43°55.5'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	debolissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 20-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso N di una stellina — 495x.
PGC 63115	gx	19h21m23s	+43°40.6'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; situata tra una stellina a W e una coppia stretta e sbilanciata a NE.
PGC 63116	gx	19h21m26s	+43°53.3'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta a SE di una stellina molto debole e sfuocata che è risultata essere la **2MASS 19212557+4353167** (c'è un piccolo errore di posizione riportata dal Megastar) — 495x.
PGC 63118	gx	19h21m28s	+43°35.3'		Lyr	24"	m. buona / m. buono	poco più evidente di PGC 63115, dalla quale dista 5' verso S, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 63120	gx	19h21m33s	+43°54.6'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (situata subito a E dell'ammasso **AGC 2319**) — 495x.
PGC 63126	gx	19h21m42s	+43°57.8'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW ((situata a E dell'ammasso **AGC 2319**) — 495x.
PGC 63136	gx	19h22m15s	+43°48.3'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale appena percettibile; c'è una stellina subito a NW — 495x.
PGC 63142	gx	19h22m32s	+44°03.6'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa rotonda con Ø < 30" e con tenue condensazione stellare; c'è una stellina a ridosso W — 495x.
PGC 63473	gx	19h39m41s	+74°38.0'		Dra	24"	buona / buono	molto debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; disturbata da una stellina brillante a 1.5' SSE (riportata sul Megastar come **Kaz 506**) — 450x.
PGC 63532	gx	19h41m45s	+50°37.2'		Cyg	28"	buona / ottimo	piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; situata subito a S di UGC 11465, già precedentemente osservata col 24" — 495x.
PGC 63689	gx	19h48m49s	+71°32.4'		Dra	28"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, in visione distolta sembra aggettare a S di una stellina; una appena percettibile si trova subito a NE (riportata sul Megastar come **7ZW 918**) — 495x.
PGC 63699	gx	19h49m13s	+66°12.3'		Dra	28"	m. buona / discreto	è formata da 2 noduli ravvicinati in direzione E-W, molto tenui ed estesi non più di 15" — 495x.
PGC 63778	gx	19h52m55s	+63°02.7'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a ridosso N e una poco più distante a NW; un'altra stellina si trova 1' scarso a SE — 495x.
PGC 63804	gx	19h54m40s	+62°22.0'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole, molto piccola e diffusa, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 15"; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline a 1.5' verso W (riportata sul Megastar come **7ZW 921**) — 495x.
PGC 63907	gx	19h58m30s	+61°13.3'		Dra	28"	m. buona / discreto	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S (riportata sul Megastar come **7ZW 923**) — 495x.
PGC 64155	gx	20h08m21s	+62°33.5'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e di luminosità uniforme, anche questa sembra rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso N (riportata sul Megastar come **7ZW 926**) — 495x.
PGC 65752	gx	20h56m36s	−03°20.9'		Aqr	16"	m. buona / buono	debole, ma relativamente facile da vedere, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme — 380x.
PGC 65753	gx	20h56m36s	−03°22.4'		Aqr	16"	m. buona / buono	situata 1.5' a S della PGC 65752, è molto difficile e salta fuori in visione distolta a 380x; non riesco tuttavia a capire com'è orientata; c'è una stellina debolissima a ridosso verso SW — 380x.
PGC 66091	gx	21h06m03s	−12°41.2'		Aqr	24"	discreta / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, a tratti appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20"; situata tra due deboli stelline orientate come la gx (riportata sul Megastar come **Kaz 515**) — 450x.
PGC 66835	gx	21h28m58s	+11°22.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto debolissimo che tuttavia appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' scarso SE di una stellina; è condensata ed estesa 15" o 20" — 380x.
PGC 66982	gx	21h34m21s	+13°26.6'		Peg	24"	ottima / ottimo	debolissima, ma facilmente visibile in visione distolta, poco diffusa, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; c'è una stellina a 1' W; riportata sul Megastar come **Kaz 529** — 450x.
PGC 67282	gx	21h44m39s	−06°41.4'		Aqr	24"	discreta / buono	debolissima lama di luce, appare solo a momenti in visione distolta, meglio a 450x, orientata da N a S ed estesa ~ 1'.
PGC 67459	gx	21h50m44s	+02°49.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	appare come stellina appena percettibile e debolmente sfuocata, situata a 1' a NW di PGC 66835 — 450x.
PGC 67462	gx	21h50m48s	+02°49.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e condensazione centrale visibile a tratti; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso SW; un'altra stellina appena percettibile si trova alla stessa distanza verso NW; tuttavia, da un controllo successivamente effettuato questa è risultata essere la PGC 67459 — 450x.
PGC 67522	gx	21h52m09s	+08°24.5'		Peg	24"	buona / m. buono	piccolo oggetto diffuso e rotondo con Ø di una 15-ina di secondi che appare in visione distolta quando si osserva la debolissima CGCG 402-24 dalla quale dista 1.5' a NW — 450x.
PGC 68062	gx	22h07m04s	+17°17.6'		Peg	24"	ottima / mediocre	elusiva, appare in visione distolta a meno di 1' NE di una stellina molto debole; non pare comunque più estesa di 20" o 25" — 450x.
PGC 68965	gx	22h28m48s	+34°02.8'		Peg	24"	ottima / molto buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina al bordo E (riportata sul Megastar come **Kaz 292**) — 450x.
PGC 69218	gx	22h34m56s	+33°55.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola, debolissima e diffusa, di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø < 20"; è riportata sul Megastar come **Kaz 295** (situata 13' a W del Quintetto Stephan) — 450x.
PGC 69282	gx	22h36m28s	+21°35.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e a momenti condensata, orientata da E a W con dimensioni 20"×15" (riportata sul Megastar come **Kaz 227**) — 450x.
PGC 69291	gx	22h36m34s	+34°30.1'		Peg	24"	m. buona / buono	è difficile da osservare in quanto aggetta molto debolmente a E di una stellina brillante che ne offusca la visione; non dovrebbe essere comunque più estesa di 15"-20"; la visione non sembra migliorare neppure spingendo a 580x.
PGC 70088	gx	22h57m03s	−08°56.9'		Aqr	24"	ottima / ottimo	piccolissimo oggetto rotondo molto debole, con Ø di 10"-15", situato a 1' NE di una stellina brillante; poco meglio evidente spingendo a 570x.
PGC 70504	gx	23h07m03s	+04°33.0'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, a tratti condensata, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata con due stelline a S: quella più vicina alla gx è la più brillante — 450x.
PGC 70508	gx	23h07m10s	+15°00.6'		Peg	24"	m. buona / ottimo	debolissima, ma osservabile senza problemi in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
PGC 70768	gx	23h14m13s	+05°21.2'		Psc	24"	m. buona / discreto	forma una coppia ravvicinata, e forse interagente, con UGC 12436, la quale aggetta verso SSW a guisa di una debolissima lama di luce estesa per ~ 1'; la PGC è debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e presenta una tenue condensazione stellare — 450x.
PGC 70822	gx	23h15m11s	+09°40.0'		Peg	16"	m. buona / ottimo	a 380x, in visione distolta, appare come una debolissima stellina sfuocata sul prolungamento dell'asse maggiore di UGC 12454 verso SE.
PGC 70967	gx	23h17m41s	+06°00.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
PGC 71041	gx	23h19m00s	+00°14.1'		Psc	16"	buona / ottimo	debolissima, appare a tratti a 1' SE di NGC 7603 come un oggetto rotondo con Ø max di 15" — 380x.
PGC 71141	gx	23h20m44s	+09°47.5'		Peg	24"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso; appare in visione distolta, meglio a 450x (a 340x si vede solo a momenti).
PGC 71299	gx	23h23m29s	+16°51.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e condensata, estesa per 10"-15" — 450x.
PGC 71317	gx	23h23m48s	+16°46.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 71319	gx	23h23m51s	+16°53.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto piccola, diffusa e debolmente condensata, rotonda con Ø di una decina di secondi — 450x.
PGC 71320	gx	23h23m53s	+16°52.8'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccola, poco diffusa e condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
PGC 71322	gx	23h23m54s	+16°40.8'		Peg	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 71324	gx	23h23m56s	+16°55.0'		Peg	24"	ottima / ottimo	galassietta evidente, molto piccola e appena condensata, rotonda con Ø, orientata da NW a SE con dimensioni 15"×10" — 450x.
PGC 71326	gx	23h23m57s	+16°45.0'		Peg	24"	ottima / ottimo	diffusa e condensata, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" e con una stellina quasi a ridosso verso NW — 450x.
PGC 71331	gx	23h23m59s	+16°48.7'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole, diffusa, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 450x.
PGC 71332	gx	23h24m00s	+16°52.2'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di 10"-15"; c'è una stellina a ridosso verso W — 450x.
PGC 71337	gx	23h24m06s	+16°47.5'		Peg	24"	ottima / ottimo	molto piccola, debole e diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 450x.
PGC 71340	gx	23h24m05s	+16°39.7'		Peg	24"	m. buona / discreto	debolissima e in parte disturbata da una stellina abbastanza brillante situata subito a SW (la quale fa parte di un piccolo triangolo equilatero); in visione distolta a 450x appare orientata da N a S con dimensioni 20"×10" (ho notato che si fatica molto a vederla a 340x).
PGC 71358	gx	23h24m32s	+12°19.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (riportata sul Megastar come **KAZ 563**) — 450x.
PGC 71429	gx	23h26m18s	+32°57.0'		Peg	16"	ottima / ottimo	si riesce a vedere facilmente a 380x; è una macchiolina rotonda di una 30-ina di secondi con Ø, poco diffusa e appena più brillante all'interno (riportata sul Megastar come **4ZW 148**).
PGC 71682	gx	23h32m00s	−00°48.3'		Psc	24"	buona / discreto	debolissima e molto piccola poco più evidente di PGC 71710 osservata successivamente e situata 15' a SE; è estesa 10" o 12"; riportata sul Megastar come UM 165 — 450x.
PGC 71706	gx	23h32m49s	+27°03.9'		Peg	24"	ottima / ottimo	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e un nucleo stellare abbastanza evidente (riportata sul Megastar come **Kaz 342**) — 450x.
PGC 71710	gx	23h32m45s	−00°58.8'		Psc	24"	buona / discreto	debolissima, ancora più difficile di PGC 71682 situata 15' a NW; appare elusivamente in visione distolta a 1.5' SE di una stellina; riportata sul Megastar come **UM 166** — 450x.
PGC 71732	gx	23h33m13s	+12°15.1'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissimo oggetto rotondo, diffuso, di max 20" con Ø e di luminosità uniforme; si riesce a catturare in visione distolta, ma bisogna spingere a 380x; riportata sul Megastar come **3ZW 110**.
PGC 71765	gx	23h34m07s	+14°57.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un piccolo alone molto tenue esteso sì e no una 20-ina di secondi. È riportata sul Megastar come **3ZW 111** — 450x.
PGC 71807	gx	23h35m02s	+27°22.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
PGC 71996	gx	23h38m41s	+09°03.5'		Peg	24"	buona / m. buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme; meglio contrastata scalando a 340x, ma a 450x salta fuori più facilmente una stellina appena percettibile e debolmente sfocata al bordo E: quest'ultima, da un controllo successivamente effettuato, è risultata essere la compagna PGC 71997.
PGC 71997	gx	23h38m42s	+09°03.4'		Peg	24"	buona / m. buono	a 450x è come una stellina appena percettibile e debolmente sfocata al bordo orientale di PGC 71996: alla prima occhiata è anzi la prima ad apparire — 450x.
PGC 72000	gx	23h38m50s	+24°12.9'		Peg	16"	ottima / ottimo	molto debole, abbastanza compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (fa parte del gruppo di CGCG 476-96) — 380x.
PGC 72018	gx	23h39m10s	+21°03.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, di luminosità uniforme, appare facilmente in visione distolta a 1.5' W di una stellina abbastanza brillante — 450x.
PGC 72027	gx	23h39m19s	+27°14.7'		Peg	16"	ottima / ottimo	debolissima e molto stemperata sul fondo cielo, estesa una 30-ina di secondi; appare in visione distolta ma bisogna scalare a 270x (fa parte dello stesso gruppo cui appartiene PGC 72000).
PGC 72136	gx	23h41m43s	+15°04.0'		Peg	24"	discreta / buono	debolissima, appare a momenti in visione distolta a 1' NE di una stellina; non sembra più estesa di 10" o 15" — 450x.
PGC 72146	gx	23h41m50s	+15°02.6'		Peg	24"	discreta / buono	piccola e molto debole, relativamente compatta, forse rotonda con Ø di 15"-20" — 450x.
PGC 72184	gx	23h43m11s	+20°46.0'		Peg	24"	ottima / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo con Ø di una 15-ina di secondi; è osservabile in visione distolta a 450x (riportata sul Megastar come **Kaz 345**).
PGC 72313	gx	23h45m15s	+01°45.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" (riportata sul Megastar come **UM 176**).
PGC 72393	gx	23h47m12s	−27°55.8'		Scl	24"	ottima / mediocre	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta subito a S di una stellina (è situata al limite N dell'ammasso **AGC 4038**) — 340x.
PGC 72403	gx	23h47m17s	−28°07.4'		Scl	24"	ottima / mediocre	anche questa fa parte, assieme alle 6 successive, dell'ammasso **AGC 4038** — molto piccola e debole, ma appare facilmente in visione distolta quando si fissa la stellina situata 1.5' a SSW; è rotonda con Ø di 10"-12" — 340x.
PGC 72423	gx	23h47m32s	−28°06.4'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — è un debolissimo oggetto molto piccolo che salta fuori in visione distolta a ridosso E di IC 5353; non sembra più esteso di 15" — 340x.
PGC 72436	gx	23h47m43s	−28°10.3'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — piccola e debolissima, appare in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 340x.
PGC 72437	gx	23h47m43s	−28°08.6'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — è un piccolo e debolissimo nodulo diffuso che appare ogni tanto al bordo SW di IC 5358 — 340x.
PGC 72466	gx	23h48m21s	−28°13.9'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 340x.
PGC 72469	gx	23h48m21s	−28°07.0'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — debolissima, appare in visione distolta, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×20"; c'è una stellina a poco più di 1' verso E — 340x.
PGC 72471	gx	23h48m23s	−28°04.5'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N — 340x.
PGC 72509	gx	23h49m06s	−16°34.7'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, poco diffusa, in visione distolta appare molto allungata da E a W con dimensioni 45"×15" — 450x.
PGC 72617	gx	23h51m06s	+06°56.6'		Psc	24"	discreta / buono	molto piccola e debole, poco diffusa, estesa 10" o 15"; c'è una stella brillante a 1' NNE — 450x (riportata sul Megastar come **UM 9**).
PGC 72708	gx	23h52m33s	+33°24.4'		And	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, di aspetto praticamente stellare anche a 495x, situata tra una stellina abbastanza brillante a 1' verso E e una più debole e più vicina dall'altra parte.
PGC 72717	gx	23h52m45s	+33°19.8'		And	28"	m. buona / m. buono	diffusa, rotonda con Ø < 30" e con nucleo stellare evidente; c'è una stellina a 1' NW e una molto debole alla stessa distanza verso E — 495x.
PGC 72726	gx	23h52m46s	+47°28.8'		And	28"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante al bordo NW, la più orientale di un piccolo triangolo molto aperto di stelline (riportata sul Megastar come **5ZW 435**) — 495x.
PGC 72729	gx	23h52m51s	+17°45.1'		Peg	24"	discreta / buono	piccola e debolissima, ma più che altro disturbata dalla SAO 108881 di magnitudo 9.6 situata a poco più di 1' verso E; non sembra comunque più estesa di 15" — 450x.
PGC 73199	gx	00h00m04s	+26°00.8'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è un elusivo baffo di luce orientato da E a W ed esteso sì e no 30"; appare a tratti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 73646	gx	01h08m39s	+33°33.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, appare elusivamente a 450x in visione distolta a 1' scarso N di CGCG 501-97.
PGC 82274	gx	09h06m25s	−09°53.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di 10"-15"; c'è una stellina appena percettibile subito a SW — 450x.
PGC 82627	gx	10h13m53s	−00°52.6'		Sex	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente a 1' scarso NW di PGC 29833 come una stellina appena percettibile — 450x.
PGC 83765	gx	13h02m32s	+27°56.2'		Com	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina leggermente diffusa e appena percettibile situata 1' a SW di MAC 1302-2756 — 450x.
PGC 85561	gx	23h38m19s	+27°02.1'		Peg	24"	m. buona / m. buono	appare come una stellina appena percettibile quasi a ridosso S di un'altra stellina di luminosità simile: sul prolungamento di queste verso N si trova, alla stessa distanza, la MAC 2338+2702A — 450x.
PGC 85589	gx	23h38m52s	+26°56.4'		Peg	24"	buona / ottimo	assieme a PGC 85593 e PGC 85595 forma un trio di debolissime galassiette allineate in direzione NE-SW, fra loro equidistanti, nonché di dimensioni analoghe; sono poste a perpendicolo con 3 stelline, anch'esse allineate ed equidistanti, che si dipartono verso SE dalla 1a gx; questa appare in visione distolta a una 40-ina di secondi NW di una stellina; a 580x non sembra più estesa di 10"; la 2a la più difficile delle tre e anche la più piccola; appare solo a momenti di aspetto stellare, come se di fatto mostrasse solo il nucleo; la 3a, infine, è la meno difficile e quella che in visione distolta appare per prima; estesa anch'essa una decina di secondi; una stellina appena percettibile salta fuori ogni tanto subito a SE — 580x (il trio è situato 8' a SE di NGC 7720).
PGC 85593	gx	23h38m56s	+26°56.9'		Peg	24"	buona / ottimo	v. **PGC 85589**
PGC 85595	gx	23h39m02s	+26°57.5'		Peg	24"	buona / ottimo	v. **PGC 85589**
PGC 85751	gx	23h47m14s	−28°11.6'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — appare solo come una stellina molto debole (il seeing di fatto non permette di capire se è puntiforme o meno) — 340x.
PGC 87158	gx	02h43m27s	+16°39.8'		Ari	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30"; è riportata sul Megastar come **VV 278C**; forma una coppia ravvicinata con CGCG 462-49 a ridosso N (v. voce corrispondente) — 450x.
PGC 90169	gx	12h45m21s	−05°58.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	debole e molto diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 45"×30" e con tenue nucleo stellare — 450x.
PGC 90370	gx	20h43m27s	−10°01.9'		Aqr	24"	buona / discreto	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, a 450x appare poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso verso W.
PGC 90723	gx	04h45m24s	−16°10.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	elusivo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W; appare solo a momenti in visione distolta a 1' W di una coppia di stelline orientate come la gx e separate all'incirca dalla stessa distanza — 450x.
PGC 93078	gx	00h48m31s	+01°21.3'		Cet	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con UGC 496 situata a ridosso verso W — a 340x sembra di vedere, a prima vista, un unico oggetto orientato da E a W; a 450x si notano abbastanza distintamente 2 deboli oggetti diffusi, leggermente condensati e di aspetto simile, rotondi con Ø < 30"; il nucleo della PGC è poco più evidente.
PGC 93468	gx	15h16m19s	+06°48.2'		Ser	24"	m. buona / m. buono	appare come una stellina molto debole a 1' scarso NE di CGCG 49-81 — 450x.
PGC 93940	gx	10h25m58s	+12°41.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S ed estesa una 40-ina di secondi; poco meglio definita scalando a 340x.
PGC 94320	gx	01h46m40s	−03°48.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente tra due deboli stelline distanti 1.5' e orientate da NNE a SSW; non sembra più estesa di 10"-12" — 450x.
PGC 95489	gx	00h01m52s	−27°36.9'		Scl	24"	ottima / mediocre	appare come una stellina appena percettibile situata a 1' NW di ESO 409-3 — 340x.
PGC 95527	gx	04h45m22s	−15°47.5'		Eri	24"	ottima / m. buono	piccola, diffusa e relativamente facile, rotonda con Ø < 20" e a tratti condensata; c'è una stellina subito a S — 450x.
PGC 97456	gx	22h31m43s	−08°24.5'		Aqr	24"	discreta / buono	chiazza circolare con Ø di una 40-ina di secondi, molto diffusa e condensata; è praticamente l'unica componente visibile dell'ammasso **AGC 2448** — 340x.
PGC 99897	gx	15h12m17s	+40°25.8'		Boo	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 113119	gx	10h19m24s	−03°23.4'		Sex	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
PGC 115018	gx	11h39m57s	−03°33.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e a tratti condensata; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' W — 450x.
PGC 135145	gx	04h42m17s	−17°24.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 135736	gx	09h59m40s	+00°35.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; a tratti appare qualcosa di puntiforme, ma non capisco se trattasi del nucleo o di una stellina sovrapposta — 450x.
PGC 143672	gx	00h40m27s	+01°37.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	rappresenta la componente più occidentale leggermente diffusa di quel piccolo asterismo di 4 stelle foggiato a "L" situato 3.5' a S di CGCG 383-65 — 450x.
PGC 144075	gx	01h21m59s	−02°35.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è la più diffusa di un terzetto situato 3' a SW di PGC 4994, cui appartengono MAC 0121-0234 e MAC 0122-0236 — molto piccola e con nucleo stellare (in effetti appare dapprima come una stellina appena sfuocata), rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 146303	gx	04h27m18s	−12°06.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	tenuissimo baffo di luce orientato da N a S ed esteso una 30"-40", ma appare come tale solo a momenti in visione distolta a 450x.
PGC 146312	gx	04h27m33s	−12°09.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, diffusa, allungata da E a W, di dimensioni 30"×20" e con nucleo stellare — 450x.
PGC 146443	gx	04h39m59s	−13°14.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	è molto piccola e debolissima, ma a 450x si riesce capire, seppure a momenti, che è orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" (a 340x è ancora di forma indistinta).
PGC 146742	gx	04h56m43s	−01°09.5'		Ori	24"	ottima / discreto	debolissima, ma molto piccola e compatta, in visione distolta appare facilmente una 30-ina di secondi a N di una stellina; è orientata da N a S con dimensioni 20"×10" — 450x.
PGC 147050	gx	05h09m56s	−00°28.8'		Ori	24"	ottima / ottimo	debole, ma relativamente facile, gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
PGC 152310	gx	08h23m04s	−08°09.0'		Hya	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, poco più evidente di PGC 180713 — osservata subito prima — di luminosità uniforme, rotonda con Ø anche questa di ~ 20"; è situata a ridosso W di un piccolo triangolo allungato e irregolare — 450x.
PGC 152538	gx	08h28m14s	+00°42.7'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, diffusa, forse rotonda con Ø di 10"-15"; allineata ed equidistante con due stelline a SE; altre due stelline più brillanti si trovano a NW e SW — 580x.
PGC 154925	gx	10h12m55s	−02°46.0'		Sex	24"	m. buona / discreto	piccola, rotonda, poco diffusa e con Ø di una 20-ina di secondi (situata 6.5' a S del terzetto di CGCG 8-70).
PGC 156604	gx	11h27m21s	−06°12.6'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, ma appare facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø < 30" e a tratti condensata.
PGC 157051	gx	11h51m36s	+00°00.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	è un debolissimo lucore di forma indistinta, esteso meno di 30"; appare solo a momenti in visione distolta a ridosso verso W di una debole stellina; meglio contrastato scalando a 340x.
PGC 158646	gx	13h17m02s	+01°48.3'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima lama di luce che in visione distolta appare a tratti ben definita, orientata da E a W ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina subito a E — 450x.
PGC 159774	gx	14h21m49s	+02°01.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma in visione distolta pare relativamente compatta, a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×10"; forma una coppia ravvicinata con CGCG 19-6 situata quasi a ridosso verso E (il Megastar sigla questa gx col nome della compagna) — 450x.
PGC 160230	gx	14h53m37s	+00°00.3'		Vir	24"	buona / buono	debolissima, appare a momenti come una stellina sfuocata a ridosso SE di **CGCG 20-30** *(presenza di debole chiarore lunare) — 450x.*
PGC 165124	gx	12h23m20s	+14°18.2'		Com	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, appare a tratti molto allungata da NE a SW con dimensioni 30"×10"; stellina appena percettibile a ridosso SW — 450x.
PGC 165213	gx	12h32m18s	+11°15.7'		Vir	24"	buona / m. buono	a poco più di 1' W di IC 3470 appare, in visione distolta, un debolissimo e minuscolo oggetto rotondo con Ø di una 10-ina di secondi; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x; è praticamente equidistante con una stellina a W.
PGC 165558	gx	10h32m10s	+73°46.3'		Dra	24"	m. buona / m. buono	salta fuori facilmente in visione distolta a 1.5' SE della SAO 7156 di magnitudo 8.4; è relativamente compatta, rotonda con Ø di una dozzina di secondi — 450x.
PGC 165780	gx	18h43m57s	+45°38.7'		Lyr	28"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme; situata tra due stelline abbastanza brillanti distanti poco più di 1' in direzione E-W — 495x.
PGC 169921	gx	14h05m38s	+08°59.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e condensata, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 170058	gx	03h51m00s	−08°23.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	assieme a PGC 176681 situata 3' più a S forma una coppia di galassiette rotonde abbastanza facili da vedere, poco diffuse, con Ø < 30" e con nucleo stellare; la 1ª è poco più evidente — 450x.
PGC 170122	gx	11h14m24s	−03°53.6'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale d aspetto stellare — 450x.
PGC 170409	gx	23h37m24s	−16°36.1'		Aqr	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, appare facilmente a 450x a ridosso NE di una debole stellina; un'altra stellina di luminosità simile si trova una 30-ina di secondi a N.
PGC 173823	gx	01h25m25s	+01°43.4'		Cet	24"	m. buona / buono	molto piccola e condensata, rotonda con Ø di 15" (situata 2.5' SW di NGC 533) — 450x.
PGC 176681	gx	03h50m57s	−08°26.3'		Eri	24"	ottima / ottimo	v. **PGC 170058**
PGC 177382	gx	04h30m57s	−12°32.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissimo oggetto rotondo esteso < 20" osservabile in visione distolta a 450x; c'è una doppia stretta a poco più di 1' SW e una stellina molto debole a 1' verso S.
PGC 180710	gx	08h22m44s	−08°18.3'		Hya	24"	ottima / ottimo	debolissima, piccola e a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 15"-20"; situata tra due stelline molto deboli orientate da NE a SW e distanti 1.5' — 450x.
PGC 180713	gx	08h22m48s	−08°14.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
PGC 182555	gx	11h17m01s	−06°13.3'		Crt	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, estesa sì e no 15", appare facilmente in visione distolta tra MCG-1-29-6 situata 1' a W e una stellina a E — 450x.
PGC 183374	gx	12h52m24s	−02°05.5'		Vir	24"	ottima / ottimo	appare come stellina appena percettibile situata sul lato meridionale di un piccolo asterismo di forma triangolare a 7' E di CGCG 15-28 — 450x.
PGC 184662	gx	14h30m47s	+00°12.8'		Vir	24"	discreta / m. buono	è poco più facile della coppia UGC 9326-7, situata un paio di primi a N; appare diffusa, rotonda con Ø < 20" e condensata (v. disegno) — 450x.
PGC 185091	gx	15h33m11s	+00°29.4'		Ser	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente a 340x come una stellina debolmente sfuocata.
PGC 185156	gx	15h50m33s	−07°28.5'		Lib	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola e diffusa, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma non è più estesa di 10" o 15" — 450x.
PGC 197222	gx	23h55m47s	−01°27.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	assieme a PGC 197252, PGC 1117153 e PGC 1118297 fa parte di un quartetto di debolissime galassiette, molto piccole situate nei pressi di MCG+0-1-3 e osservabili in visione distolta a 450x; tutte e 4 non sono più estese di una decina di secondi; PGC 197222 presenta una stellina appena percettibile a ridosso S; PGC 197252 salta fuori elusivamente quando si osserva la precedente dalla quale dista 1' verso E; molto difficile è pure PGC 1117153 che appare ogni tanto fissando lo sguardo sulla stellina abbastanza brillante 1' a S; infine c'è PGC 1118297, la più evidente del quartetto di cui si intuisce la forma circolare.
PGC 197252	gx	23h55m58s	−01°26.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	v. **PGC 0197222**
PGC 197570	gx	01h07m18s	+32°25.9'		Psc	28"	m. buona / mediocre	appare come un piccolo oggetto molto debole situato 1.5' a NW di NGC 383, ma purtroppo il seeing non permetteva di distinguerlo bene da una stellina — 291x.
PGC 197725	gx	02h51m29s	+40°44.5'		Per	24"	ottima / m. buono	piccola, debole e diffusa, appena più brillante all'interno; rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina visibile solo a momenti a ridosso SE; situata 1' a NW della coppia UGC 2334 / MCG+7-6-79 — 450x.
PGC 197737	gx	02h52m17s	+41°23.7'		Per	28"	m. buona / m. buono	appare come una stellina molto debole a ridosso di **MAC 0252+4123** — 495x.
PGC 197758	gx	02h53m44s	+41°27.3'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, poco diffusa e molto debole, rotonda con Ø di 10"-12"; appare in visione distolta a 1' W di **PGC 10931** — 495x.
PGC 197790	gx	02h55m18s	+41°34.8'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, in visione distolta è poco più di una stellina sfuocata; c'è una stellina abbastanza brillante subito a W (riportata erroneamente sul Megastar come MCG+7-7-9) — 495x.
PGC 197792	gx	02h55m24s	+41°36.3'		Per	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW (la più occidentale di un piccolo asterismo formato da 5 stelline a forma di trapezio) — 495x.
PGC 200268	gx	11h16m25s	+41°04.5'		UMa	28"	m. buona / m. buono	appare una stellina appena percettibile e debolmente sfuocata situata subito a W di **UGC 6293** — 495x.
PGC 200296	gx	13h18m00s	−00°17.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è un piccolo oggetto diffuso e condensato che a ingrandimenti più bassi pare una debole stellina sfuocata; appare facilmente in visione distolta a 450x quando si osserva U 8357 situata 1' a S.
PGC 212455	gx	00h03m35s	+22°04.9'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso SW — 450x.
PGC 212703	gx	01h19m09s	+44°17.4'		And	24"	ottima / m. buono	appare in visione distolta come una debolissima stellina appena sfuocata a 1.5' E di UGC 836 — 450x.
PGC 212910	gx	02h05m20s	+13°15.5'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 212926	gx	02h10m16s	+07°48.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare in visione distolta a 2.5' S di NGC 840 — 450x.
PGC 212955	gx	02h20m38s	+40°49.6'		And	28"	m. buona / buono	piccola e debolissima, appare in visione distolta, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 212982	gx	02h26m18s	+28°28.0'		Tri	24"	ottima / ottimo	di aspetto simile come dimensione a PGC 1836782, dalla quale dista 1.5' verso E, ma poco più debole — 450x.
PGC 213142	gx	03h02m48s	+74°40.3'		Cas	24"	buona / buono	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø max di 15" (ultima gx osservata: è sorta una falcetta di luna e comincia ad albeggiare) — 450x.
PGC 213257	gx	03h54m22s	+17°33.4'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' NE e una più evidente a 1.5' verso S (situata un paio di primi a SSE di UGC 2895) — 495x.
PGC 213357	gx	06h55m54s	+47°55.1'		Aur	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, poco più di una stellina sfuocata, estesa non più di 10"; c'è una stellina a ridosso SW — 495x.
PGC 213399	gx	07h32m00s	+18°18.5'		Gem	16"	ottima / m. buono	situata un paio di primi a SW di CGCG 87.5, appare anzi più facilmente di quest'ultima; è molto piccola, poco diffusa e con Ø di una 15-ina di secondi — 380x.
PGC 213414	gx	07h40m53s	+55°26.6'		Lyn	28"	buona / buono	appare come una stellina molto debole che in visione distolta sembra leggermente sfuocata — 495x.
PGC 213436	gx	07h56m45s	+07°28.8'		CMi	24"	ottima / buono	è un debolissimo oggetto che anche a 450x rimane di aspetto pressoché stellare; appare in visione distolta tra NGC 2485 e una stellina situata 1' scarso verso E.
PGC 213458	gx	08h17m16s	+73°21.0'		Cam	20"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, relativamente compatta e condensata, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; situata 2.5' a NW di NGC 2523C — 360x.
PGC 213501	gx	08h32m59s	+25°59.4'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 213529	gx	08h46m39s	+48°22.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	debolissima e a tratti condensata, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 213816	gx	11h20m38s	−01°29.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; appare facilmente in visione distolta quasi a ridosso NE di UGC 6359 — 450x.
PGC 213878	gx	11h46m00s	+13°47.5'		Leo	16"	ottima / ottimo	anche a 380x appare solo a momenti come una debolissima stellina situata 2.5' a NE di NGC 3872.
PGC 214363	gx	15h12m29s	+20°39.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina appena percettibile e di aspetto nebuloso al margine SE di UGC 9765.
PGC 214384	gx	15h32m28s	+04°40.9'		Ser	24"	buona / buono	debolissima, molto piccola e condensata, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata 1' scarso a W di UGC 9886) — 450x.
PGC 214550	gx	16h52m53s	+51°03.9'		Her	28"	ottima / buono	appare come una stellina sfuocata appena percettibile situata quasi a ridosso NE di **UGC 10594** — 495x.
PGC 214690	gx	18h34m10s	+49°19.0'		Dra	28"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a N (fa parte di una losanga molto allungata in direzione N-S) — 495x.
PGC 214854	gx	22h37m03s	+50°11.9'		Lac	28"	buona / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia di stelline a N — 495x.
PGC 215016	gx	23h58m45s	+27°10.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una debole stellina subito a N — 450x.
PGC 876086	gx	09h39m29s	−17°52.4'		Hya	24"	ottima / buono	molto debole, piccola, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
PGC 887285	gx	13h18m00s	−00°17.7'		Hya	24"	m. buona / buono	piccola chiazza rotonda e uniforme, con Ø di una 20-ina di secondi che appare abbastanza facilmente a ridosso SE di una stellina — 450x.
PGC 890566	gx	21h42m30s	−16°59.2'		Cap	24"	buona / discreto	molto debole e piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; forma un piccolo triangolo equilatero con 2 stelline a NNW e a NE: la prima delle 2 è poco più brillante — 450x.
PGC 893932	gx	03h22m10s	−16°45.6'		Eri	24"	buona / buono	debolissima, appare in visione distolta subito a NE di una debole stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x; sembra approssim. rotonda con Ø < 20".
PGC 895615	gx	01h14m23s	−16°38.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare più facilmente di MCG-3-4-32 dalla quale dista poco più di 2' a NE.
PGC 896826	gx	09h31m18s	−16°32.4'		Hya	24"	ottima / buono	è un elusivo baffo di luce orientato da N a S ed esteso sì e no 20"; c'è una doppia stretta a 1' verso E — 450x.
PGC 898153	gx	04h46m56s	−16°26.2'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una decina di secondi (a prima vista potrebbe essere scambiata per una stellina, anche se debolmente sfuocata) — 450x.
PGC 904264	gx	09h52m56s	−15°57.5'		Hya	24"	m. buona / mediocre	facile, poco diffusa e leggermente condensata, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
PGC 919208	gx	10h53m50s	−11°43.5'		Hya	24"	m. buona / discreto	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 929212	gx	01h47m30s	−14°05.0'		Cet	24"	buona / m. buono	debolissima, molto piccola e diffusa, estesa sì e no 10"; c'è una stellina brillante a una 30-ina di secondi SW (situata 3.5' a SW di MCG-2-5-48) — 570x.
PGC 933109	gx	01h20m05s	−13°47.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissimo oggetto rotondo molto piccolo e relativamente compatto, esteso 10"-15"; appare facilmente in visione distolta a 450x.
PGC 937578	gx	20h55m30s	−13°28.2'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	è un debolissimo oggetto rotondo, molto piccolo, esteso una decina di secondi; appare in visione distolta a una 30-ina di secondi SW di una coppia di stelline orientate da NW a SE e allineate a SE con un'altra stellina brillante, a circa il doppio della distanza — 450x.

PGC 941284	gx	04h12m17s	−13°12.3'		Eri	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, con nucleo stellare, non più estesa di 15"; molto disturbata dalla SAO 148448 di 7ª grandezza che si trova ad appena 3' SW — 450x.
PGC 950453	gx	21h05m57s	−12°36.2'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S; meglio contrastata scalando a 340x.
PGC 962161	gx	02h24m35s	−11°45.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo, condensato e con Ø di 15" che salta fuori in visione distolta a 570x.
PGC 969318	gx	13h29m38s	−11°09.2'		Vir	24"	buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, ma non è più estesa di 15" o 20".
PGC 975978	gx	10h52m38s	−10°37.0'		Crt	24"	mediocre / ottimo	forma una coppia con MAC 1052-1036, un'altra debolissima galassietta situata 1' a E; sono entrambe rotonde con Ø di max 20" e appaiono un po' a fatica in visione distolta a 450x.
PGC 992440	gx	04h02m41s	−09°19.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	appare a tratti come una stellina appena percettibile situata a 1' E di NGC 1505 — 450x.
PGC 998832	gx	02h06m16s	−08°48.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	a 3.5' NNW di MCG-2-6-27 si trova una minuscola galassietta debole, poco diffusa rotonda con Ø di ~ 10" — 450x.
PGC 1010646	gx	12h35m53s	−07°56.4'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 1013321	gx	12h35m07s	−07°46.2'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente facile da vedere, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 25"×15" e con piccolo nucleo stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso S — 450x.
PGC 1018005	gx	09h14m49s	−07°29.8'		Hya	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata a ridosso W di una stellina abbastanza brillante (la galassietta si trova a 1' scarso NW di MCG-1-24-2) — 450x.
PGC 1020086	gx	01h26m56s	−07°22.4'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, ma facilmente visibile, compatta e condensata, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a una 40-ina di secondi NW — 340x.
PGC 1028685	gx	21h42m37s	−06°47.3'		Aqr	24"	discreta / buono	molto piccola e debolissima, allungata da NE a SW, di dimensioni 20"×10" e con una stellina a ridosso NW; è situata al vertice SE di un piccolo triangolo equilatero formato con due stelline che disturbano un po' l'osservazione (situata verso il margine NW dell'ammasso **AGC 2366**) — 450x.
PGC 1042049	gx	01h12m43s	−05°39.1'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, ma molto facile da individuare, piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE (la quale fa parte di un piccolo triangolo irregolare con componenti si luminosità simile) — 450x.
PGC 1060261	gx	02h24m55s	−04°17.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, salta fuori in visione distolta a 450x, ma è molto disturbata da una doppia stretta brillante situata un paio di primi a NW, forse rotonda con Ø < 20".
PGC 1062484	gx	08h31m22s	−04°07.6'		Hya	24"	buona / buono	piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 30" — 400x — 5.5' S di MCG-1-22-17.
PGC 1066269	gx	10h28m45s	−03°50.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa, leggermente condensata ed estesa max 15"; 570x per tener fuori campo la SAO 137591 di 6ª grandezza situata ad appena 5.5' verso N.
PGC 1068507	gx	15h25m44s	−03°39.2'		Ser	24"	m. buona / m. buono	appare a tratti come un nodulo appena percettibile situato a ridosso N di IC 1119 — 450x.
PGC 1068636	gx	11h09m44s	−03°38.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente subito a NE di CGCG 11-12; è comunque molto piccola, estesa 10"-12" — 450x.
PGC 1069594	gx	11h39m55s	−03°33.9'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, a 450x è poco più di una stellina appena sfuocata; una stellina abbastanza brillante si trova subito a W; è situata quasi a ridosso W di PGC 115018.
PGC 1073640	gx	08h37m24s	−03°16.3'		Hya	24"	ottima / m. buono	molto piccola, debolissima, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' scarso SW — 450x.
PGC 1080361	gx	02h30m45s	−02°53.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare come una stellina molto debole situata una 30-ina di secondi NE di una di 14-esima; la galassietta si trova un paio di primi a N di NGC 958 — 340x.
PGC 1093672	gx	00h00m18s	−02°22.9'		Psc	24"	m. buona / discreto	debole chiazza circolare, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
PGC 1093688	gx	03h11m03s	−02°24.0'		Eri	24"	m. buona / ottimo	piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi, poco diffusa e condensata; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline abbastanza brillanti — 450x.
PGC 1094035	gx	10h17m45s	−02°22.2'		Sex	24"	m. buona / ottimo	appare solo a momenti come una stellina percettibile solo a momenti a ridosso di CGCG 8-86 — 450x.
PGC 1095139	gx	08h38m53s	−02°19.7'		Hya	24"	ottima / m. buono	piccola, debolissima, relativamente compatta, appare in visione distolta, ma non riesco a valutarne le dimensioni; non sembra comunque più estesa di 10"-12" — 450x.
PGC 1096235	gx	00h34m29s	−02°17.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	a 4' scarsi verso S della elusiva MCG+0-2-77 c'è un debolissimo oggetto che a 340x in visione diretta pare di aspetto stellare; in visione distolta a 450x è invece chiaramente diffuso, seppure molto piccolo, con Ø di una decina di secondi.
PGC 1097712	gx	04h35m45s	−02°14.5'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 45" NE — 580x.
PGC 1097924	gx	11h41m46s	−02°14.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø non superiore a 10" — 450x.
PGC 1098603	gx	04h36m02s	−02°12.6'		Eri	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debolissima, ma più che altro disturbata dalla SAO 131343 di magnitudo 6.4 situata ad appena 1' verso S, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 580x.
PGC 1109911	gx	20h43m31s	−01°47.6'		Aqr	24"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, in visione distolta appare a ridosso SW di una stellina appena percettibile; forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; un'altra stellina molto debole si trova a una 40-ina di secondi NW — 450x.
PGC 1112400	gx	02h00m47s	−01°42.0'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare come una debole stellina appena sfuocata subito a SE di MAC 0200-0141 — 450x.
PGC 1117153	gx	23h55m55s	−01°30.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	v. **PGC 0197222**
PGC 1118297	gx	23h55m52s	−01°27.2'		Psc	24"	m. buona / m. buono	v. **PGC 197222**
PGC 1129333	gx	23h22m52s	−01°00.0'		Psc	24"	buona / buono	poco più evidente di CGCG 380-47, dalla quale dista 3.5 a ESE; diffusa, rotonda con Ø di di una 30-ina di secondi e una condensazione centrale appena percettibile — 450x.
PGC 1135989	gx	11h14m00s	−00°44.2'		Leo	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 11-29 situata a ridosso SW — debolissima e molto piccola, a 450x appare come una stellina sfuocata.
PGC 1138730	gx	01h54m20s	−00°37.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	una debole stellina a poco più di 30" NW di CGCG 386-52; purtroppo la visione è un po' disturbata da una brillante stella di 10ª situata quasi a ridosso verso SE — 450x.
PGC 1143708	gx	01h04m07s	−00°25.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20 e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
PGC 1148871	gx	21h11m59s	−00°13.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
PGC 1149117	gx	02h31m29s	−00°12.6'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 1150588	gx	02h56m22s	−00°09.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, compatta, approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NW — 450x.
PGC 1151085	gx	01h37m35s	−00°08.1'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta in una zona di cielo depleta, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 1152334	gx	11h20m57s	−00°05.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	in visione distolta appare di aspetto simile a CGCG 11-72 situata 1' scarso a S — 450x.
PGC 1160999	gx	04h46m32s	+00°15.0'		Ori	24"	buona / scarso	debolissima e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; è praticamente in mezzo a 2 stelline distanti 1.5' e orientate da NW a SE — 340x.
PGC 1164019	gx	15h27m15s	+00°21.8'		Ser	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, forse rotonda con Ø < 20"; è situata tra una stellina brillante a SE e una debole doppia abbastanza stretta a NW — 450x.
PGC 1165117	gx	10h22m10s	+00°24.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente tra due stelline orientate da N a S; è molto piccola, estesa sì e no 10"-12" — 450x.
PGC 1169468	gx	15h55m53s	+00°34.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	appare solo a momenti come una macchiolina non più estesa di 10" situata 1' a S di CGCG 23-2 — 450x.
PGC 1169684	gx	14h50m02s	+00°34.7'		Vir	24"	buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; è evidente quasi come CGCG 20-21 situata 1.5' a SW *(presenza di debole chiarore lunare)* — 450x.
PGC 1180583	gx	09h52m21s	+00°58.2'		Hya	24"	buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di ~ 20"; si trova tra 2 stelline orientate da N a S e distanti un paio di primi — 400x.
PGC 1185275	gx	09h36m52s	+01°07.4'		Hya	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø una 20-ina di secondi; c'è una stellina a meno di 1' verso W — 570x.
PGC 1185370	gx	02h41m41s	+01°07.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto rotondo, poco diffuso e con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 1189544	gx	21h28m51s	+01°15.9'		Aqr	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, estesa una decina di secondi; appare in visione distolta a ridosso N di CGCG 375-43 — 450x.
PGC 1193897	gx	08h38m51s	+01°24.3'		Hya	24"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con CGCG 4-98 situata a ridosso SE — debolissima, ma relativamente compatta, orientata da N a S con dimensioni grosso modo 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso S — 450x.
PGC 1196659	gx	23h59m37s	+01°29.7'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta a 450x, forse rotonda con Ø di 10"-15".
PGC 1206240	gx	13h42m15s	+01°48.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, appare a momenti in visione distolta tra due stelline distanti 1.5' in direzione E-W: quella a W è molto debole — 450x.
PGC 1207472	gx	09h56m33s	+01°50.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	appare come una debolissima stellina a ridosso N di una relativamente brillante; questa coppia abbastanza stretta ed estremamente sbilanciata è situata a 1' S di CGCG 8-3 — 450x.
PGC 1223174	gx	10h37m22s	+02°19.4'		Sex	24"	m. buona / buono	appare come una stellina appena percettibile a 1' NW di CGCG 37-94 — 450x.
PGC 1228078	gx	02h40m25s	+02°28.3'		Cet	24"	m. buona / discreto	appare solo in visione distolta come una stellina appena percettibile situata a 1' SW di IC 246 — 450x.
PGC 1230962	gx	03h11m19s	+02°34.0'		Cet	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente in visione distolta a ridosso SE di MCG+0-9-14 come una stellina appena sfuocata — 450x.
PGC 1236768	gx	23h44m07s	+02°45.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø max di 15" — 450x.
PGC 1253401	gx	09h02m07s	+03°29.9'		Hya	24"	m. buona / buono	debolissima, salta fuori in visione distolta quando si osserva CGCG 33-47 (dalla quale dista 1' W) e si presenta come un debolissimo oggetto rotondo con Ø di una decina di secondi — 450x.
PGC 1273333	gx	11h10m23s	+04°47.4'		Leo	24"	buona / m. buono	molto debole, facilmente visibile in visione distolta a 570x, estesa ~ 15" e con una stellina a una 30-ina di secondi verso W.
PGC 1273698	gx	13h40m36s	+04°49.0'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; si vede facilmente restando a 450x.
PGC 1282539	gx	12h54m09s	+05°22.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme; appare facilmente in visione distolta a 450x.
PGC 1308683	gx	13h13m43s	+06°50.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente a 1' SW di CGCG 44-32, forse rotonda con Ø max di 12" o 15" — 450x.
PGC 1310913	gx	10h15m52s	+06°57.5'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è un piccolo oggetto diffuso molto debole, ma separato da CGCG 37-74, dalla quale si trova a ridosso SW; anche a 580x non sembra più estesa di 10".
PGC 1316184	gx	14h07m46s	+07°12.2'		Vir	24"	m. buona / ottimo	appare solo a momenti come una stellina a 1' scarso SE di CGCG 46-54 — 450x.
PGC 1317214	gx	14h29m46s	+07°14.8'		Vir	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, estesa una decina di secondi; appare in visione distolta quasi a ridosso verso E di una debole stellina (situata 1' scarso a SE di CGCG 47-64) — 450x.
PGC 1330809	gx	13h18m53s	+07°47.0'		Vir	24"	m. buona / ottimo	appare a momenti come una stellina situata a 1' scarso SW di IC 4223 — 450x.
PGC 1335526	gx	11h16m24s	+07°57.8'		Leo	28"	ottima / buono	piccola e debolissima, appare con difficoltà in visione distolta a causa della mancanza di riferimenti stellari, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
PGC 1339763	gx	14h34m08s	+08°08.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; meglio evidente a 340x, perché situata in una piccola zona di cielo con pochi riferimenti stellari.
PGC 1344462	gx	01h53m24s	+08°19.3'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 1344523	gx	01h53m16s	+08°19.5'		Psc	24"	ottima / ottimo	è di aspetto simile a PGC 1344462, dalla quale dista 2' verso W, ma in visione distolta appare poco più diffusa e più debole — 450x.
PGC 1345581	gx	21h02m43s	+08°22.6'		Equ	24"	discreta / m. buono	debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 1345780	gx	00h07m09s	+08°23.0'		Psc	24"	ottima / buono	debolissima, molto diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 340x.
PGC 1347472	gx	17h15m28s	+08°28.0'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø < 20" e di luminosità uniforme — 450x.
PGC 1356023	gx	15h49m00s	+08°54.6'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, anche a 450x non sembra più estesa di 10"; forma un piccolo triangolo rettangolo con 2 stelline brillanti: una a NW e l'altra a 1' verso W — 450x.
PGC 1366929	gx	21h00m16s	+09°34.0'		Equ	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, ma salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 400-17 dalla quale dista una 40-ina di secondi a SW; non sembra più estesa di 10" — 450x.
PGC 1376016	gx	02h28m58s	+10°11.8'		Cet	24"	buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 1390020	gx	09h59m24s	+11°11.3'		Leo	24"	buona / discreto	molto debole e piccola, più facilmente visibile a 450x, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 1.5' a SW di CGCG 64-18).
PGC 1395486	gx	00h58m26s	+11°33.8'		Psc	24"	buona / m. buono	appare come un elusivo nodulo diffuso e appena percettibile situato a ridosso NE di UGC 603 — 340x.
PGC 1403183	gx	13h58m47s	+12°03.9'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco più di una stellina sfuocata (Ø sì e no di 10"); c'è una coppia di deboli stelline a 1' W; un'altra stellina appena percettibile si trova un paio di primi a ESE — 450x.
PGC 1405923	gx	11h00m56s	+12°13.8'		Leo	24"	m. buona / buono	a 7' NE di NGC 3491 ci sono 2 galassiette deboli, ma facilmente visibili a 450x, distanti 1' in direzione E-W; quella più a W, ossia la gx in questione, è poco più evidente, rotonda con Ø di 25" e più brillante all'interno; l'altra è la 2MASS 11005967+1213498, pure rotonda con Ø di 20" e tenue condensazione centrale; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' scarso verso N.
PGC 1406866	gx	10h13m26s	+12°17.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 deboli stelline a NNE — 450x.
PGC 1407984	gx	14h52m53s	+12°21.2'		Boo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a S e un'altra appena più brillante a 1' verso NNW — 450x.
PGC 1409108	gx	14h52m54s	+12°24.8'		Boo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, appare come una stellina sfuocata; allineata ed equidistante con due stelline a E, ma quella più vicina alla gx è appena percettibile (situata 3.5' a N di PGC 1407984) — 450x.
PGC 1424727	gx	08h59m52s	+13°10.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, forse rotonda con Ø di 10"-12"; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x a ridosso SW di CGCG 61-36.
PGC 1425670	gx	10h46m08s	+13°13.2'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; situata al vertice rettangolo di un piccolo triangolo formato con 2 stelline a N ed E — 450x.
PGC 1426504	gx	07h53m52s	+13°15.4'		Gem	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, molto allungata da N a S, di dimensioni 30"×10" e con condensazione centrale visibile solo a momenti — 450x.
PGC 1427906	gx	10h36m36s	+13°18.8'		Leo	24"	ottima / m. buono	appare come una stellina appena percettibile al bordo NE di CGCG 65-65; allineata ed equidistante con due stelline a W — 450x.
PGC 1430630	gx	14h59m10s	+13°25.3'		Boo	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente e solo a momenti a ridosso W di UGC 9636, ma è estesa sì e no una decina di secondi — 450x.
PGC 1448685	gx	17h53m51s	+14°04.7'		Oph	24"	buona / m. buono	appare elusivamente subito a S di una debole stellina (una brillante situata a 1' N disturba un po' la visione); sembra molto piccola, estesa 10"-15" — 450x.
PGC 1457711	gx	10h22m00s	+14°25.4'		Leo	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 1468498	gx	09h43m57s	+14°50.5'		Leo	24"	m. buona / buono	appare come una stellina sfuocata molto debole, con Ø probabilmente non superiore a 10"; anche forzando a 580x l'impressione non cambia.
PGC 1469714	gx	09h44m48s	+14°52.7'		CrB	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con PGC 27915 situata 45" a SE — molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una condensazione stellare abbastanza evidente — 450x.
PGC 1470443	gx	10h22m16s	+14°55.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	appare come un piccolo e debolissimo oggetto diffuso situato quasi a ridosso NNW di CGCG 94-15 — 450x.
PGC 1472211	gx	08h07m12s	+14°59.1'		Peg	24"	discreta / buono	è minuscola, ma a 450x appare chiaramente diffusa, con Ø di una dozzina di secondi; forma una coppia molto l con una stellina a W.
PGC 1473231	gx	23h42m07s	+15°01.4'		Peg	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 1479727	gx	22h06m37s	+15°15.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia stretta con UGC 11879, 2 galassiette elusive visibili con una certa difficoltà in visione distolta a 450x; la a è appena più evidente: di fatto, ciò che si nota a prima vista è un piccolo triangolo isoscele di debolissime stelline col vertice più acuto che punta a NE; la PGC appare come un baffo orientato da N a S ed esteso < 30"; UGC salta fuori a tratti a ridosso S della stellina più meridionale del piccolo triangolo, ma non riesco a capirne l'orientamento — 450x.
PGC 1497460	gx	08h58m08s	+15°57.9'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e diffusa, approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una condensazione stellare evidente (situata 1' a NW di IC 581) — 450x.
PGC 1500524	gx	10h54m30s	+16°05.6'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 12"-15"; appare abbastanza facilmente in visione distolta subito a E di una debole stellina — 450x.
PGC 1501649	gx	16h03m10s	+16°08.3'		Her	24"	ottima / ottimo	situata al bordo NE dell'ammasso **AGC 2147** (ma non so se ne fa parte) — piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 1505194	gx	14h47m12s	+16°17.1'		Boo	24"	ottima / ottimo	appare solo a momenti come una stellina percettibile a ridosso E di MCG+3-38-12 — 450x.
PGC 1508315	gx	15h05m07s	+16°25.1'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
PGC 1511072	gx	14h55m10s	+16°32.0'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, a 340x è come una stellina appena sfuocata; a 450x in visione distolta appare rotonda con Ø di 10"-12".
PGC 1513899	gx	11h22m08s	+16°39.4'		Leo	24"	m. buona / m. buono	è la più evidente di un terzetto di piccole galassiette situate una 12-ina di primi a WNW di NGC 3655; è compatta, rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
PGC 1515338	gx	09h23m23s	+16°43.1'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, poco diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso S e un'altra poco più distante a SE — 450x.
PGC 1518294	gx	16h01m07s	+16°50.4'		Cnc	24"	buona / buono	debolissima, diffusa, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è osservabile in visione distolta, ma ho dovuto spingere a 570x; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline brillanti: il vertice più acuto punta a NW.
PGC 1521686	gx	08h12m18s	+16°58.8'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	situata una 40-ina di secondi a W di una stellina brillante, è una galassietta molto debole, diffusa, rotonda con Ø < 30" e un tenue nucleo stellare; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
PGC 1528944	gx	08h26m27s	+17°16.7'		Crt	24"	m. buona / buono	debolissimo oggetto diffuso, probabilmente rotondo con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta a 450x.
PGC 1535640	gx	10h27m49s	+17°33.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	appare come una stellina appena percettibile a ridosso NE di CGCG 94-66, il membro più cospicuo dell'ammasso **AGC 1018** — 450x.
PGC 1547106	gx	09h24m35s	+17°59.2'		Leo	24"	buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 1549025	gx	10h27m12s	+18°03.6'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, salta fuori a tratti nel bagliore della doppia stretta SAO 99129-30; non è più estesa di 10"-12" — 450x.
PGC 1549176	gx	10h27m16s	+18°03.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e molto debole, relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 1549235	gx	23h17m05s	+18°04.0'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola, relativamente compatta e luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 1549361	gx	00h08m47s	+18°04.3'		Peg	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, diffusa, disturbata da una stellina abbastanza brillante a ridosso NE, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 1558760	gx	07h52m40s	+18°24.5'		Gem	24"	m. buona / discreto	appare come una stellina sfuocata molto debole; situata a ridosso E di un piccolo asterismo di 5 stelline abbastanza brillanti — 450x.
PGC 1561989	gx	07h48m18s	+18°31.3'		Gem	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare evidente; è allineata verso SE con la coppia CGCG 87-39 / -40 — 450x.
PGC 1562131	gx	07h48m10s	+18°31.6'		Gem	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x, estesa 10"-12".
PGC 1564141	gx	07h48m19s	+18°35.6'		Gem	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole (poco più di una stellina sfuocata), forse rotonda con Ø di una decina di secondi — 450x.
PGC 1576212	gx	23h19m16s	+18°58.1'		Peg	24"	buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 1591014	gx	09h09m16s	+19°24.1'		Cnc	24"	ottima / buono	è una minuscola galassietta che appare come una stellina appena percettibile a 1' scarso ESE di CGCG 91-6 — 450x.
PGC 1591289	gx	08h33m38s	+19°24.6'		Cnc	24"	m. buona / buono	molto piccola e molto debole, appare in visione distolta subito a W di CGCG 89-42, della quale ha all'incirca le stesse dimensioni — 450x.
PGC 1601260	gx	07h37m37s	+19°40.3'		Peg	24"	ottima / ottimo	diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
PGC 1620267	gx	23h30m30s	+20°13.0'		Tau	24"	buona / buono	piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile a meno di 1' verso N — 450x.
PGC 1624016	gx	04h00m26s	+20°20.7'		Tau	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 1640006	gx	23h35m54s	+20°58.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola e a tratti condensata, forse rotonda con Ø di una 10-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso E — 450x.
PGC 1642253	gx	23h35m39s	+21°04.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso N; poco meglio evidente a scalando a 340x.
PGC 1645509	gx	23h36m54s	+21°13.5'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; salta fuori facilmente a 1' SW di MAC 2336+2114 — 450x.
PGC 1651421	gx	02h04m56s	+21°30.5'		Ari	24"	ottima / molto buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø max di 15" e una condensazione stellare visibile a momenti — 450x.
PGC 1666240	gx	10h29m30s	+22°14.5'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 1668682	gx	01h05m10s	+22°22.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debole e molto piccola, rotonda con Ø di una dozzina di secondi e un nucleo puntiforme abbastanza evidente; c'è una doppia dalle componenti molto deboli a W e stellina debole subito a SSE; un'altra stellina appena percettibile si trova a 1' scarso verso N — 450x.
PGC 1679856	gx	23h22m21s	+23°00.7'		Peg	24"	m. buona / discreto	poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×15" e con tenue condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
PGC 1682236	gx	07h00m39s	+23°08.7'		Gem	24"	ottima / discreto	debole, piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 1690876	gx	11h33m56s	+23°38.1'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccolo e debolissimo oggetto diffuso, forse rotondo con Ø di 10"-12" che appare in visione distolta a ridosso S di UGC 6548 — 450x.
PGC 1691546	gx	10h21m54s	+23°42.1'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, estesa sì e no una 10-ina di secondi; situata un paio di primi a N di CGCG 124-10 — 450x.
PGC 1711521	gx	23h48m37s	+24°36.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 1731874	gx	08h37m52s	+25°18.1'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto piccola, appare elusivamente in visione distolta subito a S di un minuscolo triangolo isoscele formato da 3 stelline di luminosità simile — 450x.
PGC 1744451	gx	15h20m43s	+25°39.1'		CrB	24"	buona / buono	molto debole, piccola diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 1746863	gx	15h20m16s	+25°42.8'		CrB	24"	buona / buono	appare come una stellina molto debole a 1' SE di CGCG 135-47 — 450x.
PGC 1749521	gx	15h21m12s	+25°46.7'		CrB	24"	buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW (la più occidentale di 3 stelline allineate in direzione WNW-ESE) — 450x.
PGC 1753534	gx	07h57m21s	+25°52.9'		Gem	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima chiazza forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina quasi a ridosso NNW; forma una coppia ravvicinata con MAC 0757+2553 situata 1' scarso a N di aspetto simile, poco meno estesa e appena più evidente; la coppia è tutto sommato meglio osservabile scalando a 340x.
PGC 1761049	gx	23h59m01s	+26°03.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	appare elusivamente di aspetto stellare a prima vista; solo a tratti spingendo a 580x si nota che è in realtà appena diffusa, anche se non dovrebbe essere più estesa di qualche secondo.
PGC 1769594	gx	08h12m14s	+26°16.0'		Cnc	24"	m. buona / discreto	molto debole, piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20"; è poco disturbata da 2 stelline brillanti situate 1.5' a S e NW — 450x.
PGC 1779069	gx	08h03m50s	+26°30.7'		Cnc	24"	ottima / buono	v. **IC 491**
PGC 1788978	gx	00h58m10s	+26°48.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	anche a 450x appare solo come una stellina appena percettibile situata quasi a ridosso N di MAC 0058+2647.
PGC 1795819	gx	23h59m24s	+27°02.0'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a N — 450x.
PGC 1811119	gx	04h06m39s	+27°32.4'		Dra	24"	ottima / m. buono	a 570x appare come un debolissimo e piccolo oggetto sfuocato non più esteso di 10", al vertice rettangolo di un piccolo triangolo isoscele formato con 2 stelle brillanti distanti un paio di primi in direzione E-W; è situato all'interno dello ammasso aperto Dolidze 14 (vedi).
PGC 1827954	gx	02h28m06s	+28°09.5'		Tri	28"	m. buona / buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di 10"-12"; è situata a ridosso SSE di **IC 227** — 495x.
PGC 1827998	gx	02h27m54s	+28°09.6'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole, diffusa e a tratti condensata, in visione distolta appare rotonda con Ø con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E — 495x.
PGC 1835044	gx	02h44m54s	+28°24.8'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e nucleo stellare; c'è una coppia di stelline abbastanza brillanti a 1' SSW — 495x.
PGC 1836782	gx	02h26m11s	+28°28.3'		Tri	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una coppia serrata di debolissime stelline a ridosso E che danno l'impressione di un minuscolo oggetto diffuso; l'effetto non migliora spingendo a 580x.
PGC 1837688	gx	23h54m03s	+28°30.2'		Peg	24"	m. buona / m. buono	a 450x appare come una stellina molto debole e appena sfuocata situata tra una stellina abbastanza brillante e la UGC 12835.
PGC 1845699	gx	15h10m53s	+61°08.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	appare solo come una stellina appena percettibile a ridosso S di **MCG+10-22-2** — 450x.
PGC 1881700	gx	15h24m09s	+29°52.9'		CrB	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, relativamente compatta, estesa sì e no 15". Forma una coppia ravvicinata con **2MASS 15240742+2953202** — appena più debole — situata una 20-ina di secondi a NNW; i due oggetti si sdoppiano abbastanza facilmente a 495x.
PGC 1888920	gx	00h25m55s	+30°04.0'		And	24"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, approssim. circolare con Ø < 20"; c'è una doppia stretta quasi a ridosso verso N — 450x.
PGC 1888936	gx	00h25m23s	+30°04.1'		And	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e a tratti condensata — 450x.
PGC 1892754	gx	07h26m59s	+30°09.8'		Gem	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, diffusa e a tratti condensata, estesa una 10-ina di secondi, ma osservabile solo a 450x a 1' NW di CGCG 147-24; è utile come confronto la stellina situata subito a E più evidente e ovviamente puntiforme.
PGC 1897867	gx	23h55m12s	+30°17.4'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, appare in visione distolta a S di una coppia di stelline, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
PGC 1899007	gx	16h25m18s	+30°19.0'		Her	28"	ottima / m. buono	appare come una stellina percettibile solo a momenti subito a SE di CGCG 168-8 — 495x.
PGC 1911292	gx	02h32m08s	+30°37.7'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 1931241	gx	01h09m14s	+31°05.5'		Psc	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto diffusa, in visione distolta appare grosso modo circolare con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina molto debole subito a SW — 450x.
PGC 1938901	gx	00h27m26s	+31°15.6'		And	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, molto debole e relativamente compatta, situata a ridosso SW di una stellina; non è più estesa di 10"-12" — 450x.
PGC 1939214	gx	00h27m44s	+31°16.0'		And	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20" scarsi — 450x.
PGC 1943269	gx	02h44m22s	+31°21.3'		Tri	24"	ottima / buono	appena più debole e poco più diffusa di PGC 1943774 (osservata subito prima e situata poco più di 1' a NW), condensata e di dimensione simile — 450x.
PGC 1943774	gx	02h44m16s	+31°22.0'		Tri	24"	ottima / buono	debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 1948309	gx	02h44m20s	+31°27.7'		Tri	24"	ottima / buono	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni 30"×20" — 450x.
PGC 1958190	gx	08h29m35s	+31°39.9'		Cnc	24"	m. buona / m. buono	molto debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
PGC 1985685	gx	01h57m23s	+32°12.3'		Tri	28"	m. buona / ottimo	appare solo a momenti come una stellina appena percettibile a S di **PGC 1986618** (pur trovandosi leggermente più a E di quest'ultima) — 495x.
PGC 1986040	gx	01h57m28s	+32°12.7'		Tri	28"	m. buona / ottimo	assieme alla successiva sono una coppia di galassiette molto piccole e debolissime distanti 1' in direzione E-W (potrebbero di fatto essere scambiate per due stelline appena percettibili); fanno parte dell'ammasso **AGC 278**) — 495x.
PGC 1986218	gx	01h57m22s	+32°12.9'		Tri	28"	m. buona / ottimo	v. **PGC 1986040**
PGC 2001716	gx	17h43m08s	+67°32.5'		Dra	28"	m. buona / discreto	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline abbastanza brillanti a N (fanno parte di un arco di 4 componenti che formano un settore circolare di 120° con al centro la NGC 6463) — 495x.
PGC 2021308	gx	02h07m25s	+33°02.0'		Tri	24"	ottima / mediocre	piccolo oggetto diffuso e di luminosità uniforme, rotondo con Ø di una 15-ina di secondi; è situata tra due deboli stelline orientate da N a S — 450x.
PGC 2022981	gx	01h48m56s	+33°07.1'		Tri	28"	m. buona / buono	appare solo come una stellina appena percettibile situata a 1' SE di **CGCG 503-25** — 495x.
PGC 2045360	gx	01h56m34s	+34°11.7'		Tri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e diffusa, approssim. circolare con Ø di una 15-ina di secondi; situata subito a NE di una coppia di stelline sbilanciate in luminosità; appare facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 2047927	gx	22h31m55s	+34°21.4'		Peg	24"	ottima / buono	debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; situata tra 2 stelline distanti 1' in direzione NW-SE (quella a SE è più brillante); una 3ª stellina più brillante ancora si trova 1' a N — 450x.
PGC 2050768	gx	02h35m05s	+34°32.6'		Tri	28"	m. buona / ottimo	debole, molto diffusa e condensata, rotonda con Ø di 20"-25"; c'è una stellina a ridosso N — 495x.
PGC 2051580	gx	00h00m23s	+34°35.6'		And	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, estesa 12"-15", situata subito a N di una stellina brillante — 450x.
PGC 2058348	gx	02h46m25s	+35°01.9'		Per	24"	ottima / buono	debolissimo oggetto molto piccolo e diffuso situato a ridosso NW di una stellina; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 2067976	gx	17h40m31s	+35°39.5'		Her	24"	m. buona / buono	appare elusivamente e solo a momenti come una stellina subito a NW della coppia **MCG+6-39-9 / 10** — 450x.
PGC 2077166	gx	02h16m20s	+36°16.9'		Tri	28"	ottima / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è un minuscolo triangolo rettangolo di stelline appena percettibili a ridosso W — 495x.
PGC 2078222	gx	16h03m02s	+65°31.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' W — 450x.
PGC 2080629	gx	02h53m29s	+36°26.3'		Per	24"	ottima / buono	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a SE — 450x.
PGC 2117292	gx	02h28m46s	+38°04.7'		And	24"	ottima / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 30" — 450x.
PGC 2141493	gx	10h29m45s	+39°00.4'		LMi	28"	m. buona / buono	appare elusivamente a ridosso W di **UGC 5693**, ma soltanto come una stellina appena percettibile — 495x.
PGC 2142366	gx	16h36m04s	+39°03.0'		Her	24"	m. buona / m. buono	debolissimo baffo di luce esteso una 30-ina di secondi e orientato da E a W; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una debole stellina a ridosso W e un'altra della stessa luminosità a 1' scarso verso S; situata all'interno di un triangolo isoscele di stelline abbastanza brillanti col vertice più acuto che punta a SW.
PGC 2143387	gx	16h27m43s	+39°06.3'		Her	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e molto debole, estesa sì e no una 10-ina di secondi; ci sono 2 stelle brillanti a 1.5' E e 2' SE (situata verso la parte sud-occidentale dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
PGC 2146028	gx	16h13m02s	+39°14.2'		CrB	28"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 223-51** situata a ridosso W — è stranamente più brillante della compagna, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una evidente condensazione centrale; la CGCG è anch'essa rotonda, ma più piccola, con Ø di 15" (temo tuttavia che il Megastar abbia invertito le coordinate delle due componenti) — 495x.
PGC 2148910	gx	16h28m43s	+39°23.3'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — (erroneamente riportata sul Megastar come MCG+7-34-67) debolissima e molto piccola, estesa sì e no 10"; c'è una stellina subito a NE — 450x.
PGC 2150566	gx	16h27m35s	+39°29.0'		Her	24"	m. buona / ottimo	fa parte dell'ammasso **AGC 2199** — debolissima chiazza molto spampanata estesa < 30"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 2152734	gx	10h34m27s	+39°26.3'		UMa	28"	m. buona / buono	appare elusivamente come una stellina appena percettibile situata 1' scarso a SE di **CGCG 212-24** — 495x.
PGC 2153794	gx	02h33m23s	+39°40.2'		And	28"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole, relativamente compatta e condensata, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina al bordo E (fa parte di un piccolo asterismo di 5 componenti); forma una coppia ravvicinata con **CGCG 523-59** situata a ridosso NNW — 495x.
PGC 2154101	gx	10h44m22s	+39°41.3"		UMa	28"	ottima / ottimo	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta subito a SE di **MAC 1044+3942**, non più estesa di 10"-12" — 495x.
PGC 2154197	gx	12h21m26s	+39°41.8'		CVn	28"	ottima / m. buono	chiazza molto debole e spampanata, approssim. rotonda con Ø < 30", disturbata da una stellina brillante situata a 1.5' verso S — 495x.
PGC 2157508	gx	19h07m25s	+39°54.1'		Lyr	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, poco più di una stellina sfuocata, estesa sì e no una decina di secondi — 495x.
PGC 2160170	gx	02h39m29s	+40°04.5'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, in visione distolta non sembra più estesa di 10"-12"; appare subito a NW di una stellina — 495x.
PGC 2161119	gx	10h41m54s	+40°08.0'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto piccola e molto debole, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
PGC 2163143	gx	17h55m58s	+40°15.5'		Her	28"	ottima / ottimo	relativamente facile, piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare evidente — 495x.
PGC 2165233	gx	10h28m59s	+40°23.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, diffusa, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata a ridosso SW di una tripletta molto serrata e irrisolta di debolissime stelline — 495x.
PGC 2165375	gx	17h46m05s	+40°24.6'		Her	28"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina brillante a ridosso SW — 495x.
PGC 2171108	gx	17h16m49s	+40°48.0'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
PGC 2172078	gx	10h35m31s	+40°51.8'		UMa	28"	m. buona / buono	è poco più di una stellina appena percettibile situata 1.5' a W di una tripletta abbastanza serrata di stelline orientata da E a W — 495x.
PGC 2172368	gx	06h51m03s	+40°52.9'		Aur	28"	m. buona / discreto	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
PGC 2173741	gx	18h19m29s	+40°58.3'		Lyr	24"	ottima / ottimo	appare abbastanza facilmente a 450x come una stellina debolmente sfuocata a ridosso E di **CGCG 228-3**.
PGC 2180213	gx	09h06m35s	+41°22.8'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di max 15" — 495x.
PGC 2184951	gx	10h23m54s	+41°40.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	piccola, debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20" — 495x.
PGC 2186282	gx	10h23m24s	+41°45.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
PGC 2189154	gx	10h23m41s	+41°55.2'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a 1' SE — 495x.
PGC 2190301	gx	15h48m24s	+41°59.0'		Boo	28"	m. buona / buono	appare soltanto come una stellina appena percettibile situata a ridosso W di **MCG+7-32-53** — 495x.
PGC 2191802	gx	08h55m45s	+42°04.0'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' verso S — 495x.
PGC 2192838	gx	17h25m38s	+42°07.5'		Her	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, più che altro immersa nel tenue alone di una stellina abbastanza brillante a ridosso SE; non sembra più estesa di 15" — 450x.
PGC 2199315	gx	18h11m28s	+42°27.5'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, salta fuori facilmente in visione distolta all'interno di un piccolo trapezio di stelline; una stellina più debole si trova a ridosso N della galassietta — 495x.
PGC 2199341	gx	11h16m50s	+42°27.6'		UMa	28"	ottima / m. buono	assieme a **2MASS 11165439+4227020** forma una coppia di minuscoli oggetti situati 3' ESE di CGCG 213-40 — la 1ª è più evidente e appare senza problemi, estesa sì e no 10"-12"; la 2ª è ancora più piccola e salta fuori solo a momenti 1' a SE della precedente — 495x.
PGC 2209136	gx	10h20m57s	+42°55.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è una minuscola galassietta di aspetto quasi stellare che si osserva facilmente a 1' SE di NGC 3205 — 495x.
PGC 2215851	gx	02h19m26s	+43°13.6'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola lama di luce molto debole, orientata da NW a SE ed estesa una 30-ina di secondi; si trova al vertice orientale di un piccolo triangolo equilatero formato con due stelline a NW e SW (situata 4.5' a SE di MCG+7-5-36) — 495x.
PGC 2216069	gx	13h09m29s	+43°14.2'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, rotonda con Ø < 15", allineata ed equidistante con PGC 2216788 e una stellina a NNE — 495x.
PGC 2216205	gx	15h34m08s	+43°14.6'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.

PGC 2216788	gx	13h09m35s	+43°16.1'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a un paio di primi NNE — 495x.
PGC 2218965	gx	13h09m17s	+43°21.8'		CVn	28"	m. buona / ottimo	appare solo come una stellina appena percettibile situata 1.5' a NNE di CGCG 217-14 — 495x.
PGC 2219353	gx	19h08m51s	+43°22.7'		Lyr	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa una 15-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile subito a N — 450x.
PGC 2219502	gx	16h31m37s	+43°23.1'		Her	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e molto debole, grosso modo rotonda con Ø di 12"-15"; allineata e quasi equidistante con 2 stelline a SSW — 495x.
PGC 2220335	gx	10h30m02s	+43°25.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	molto piccola e molto debole, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (presenza di chiarore lunare) — 495x.
PGC 2223395	gx	13h39m06s	+43°32.9'		Cvn	28"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto che salta fuori abbastanza facilmente a 1' SE di CGCG 219-31 — 495x.
PGC 2224903	gx	10h37m06s	+43°36.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, in visione distolta non sembra più estesa di 10"-12"; allineata ed equidistante con una stellina abbastanza brillante a poco più di 1' NW e una stella brillante di 10ª grandezza — 495x.
PGC 2225924	gx	13h09m19s	+43°39.3'		CVn	24"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 2226745	gx	17h30m03s	+43°41.4'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; è molto disturbata dalla SAO 46749 di 9ª grandezza situata a 1' verso W — 495x.
PGC 2227272	gx	17h33m09s	+43°42.6'		Her	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, di aspetto a prima vista quasi stellare; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
PGC 2229112	gx	17h15m32s	+43°47.2'		Her	28"	ottima / ottimo	piccola e relativamente facile, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso NE — 495x.
PGC 2236365	gx	10h55m32s	+44°05.4'		UMa	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di 10"-12" — 495x.
PGC 2239013	gx	13h12m05s	+44°12.2'		CVn	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è un piccolo triangolo serrato di stelline a un paio di primi SSE; quest'ultimo è accompagnato da una stellina di luminosità simile a 1.5' W — 450x.
PGC 2240527	gx	01h06m54s	+44°16.3'		And	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti come una stellina quasi a ridosso S di **CGCG 536-18** — 450x.
PGC 2243476	gx	17h27m11s	+44°23.9'		Her	24"	buona / buono	molto piccola e debole, a 450x appare abbastanza facilmente a ridosso SE di CGCG 226-18, approssim. rotonda con Ø di 12"-15".
PGC 2245863	gx	17h54m22s	+44°30.6'		Her	24"	buona / m. buono	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø di una decina di secondi; situata 1.5' a S di MCG+7-37-2 — 450x.
PGC 2253155	gx	10h35m19s	+44°50.3'		UMa	28"	ottima / ottimo	è una piccola lama di luce molto tenue, di aspetto uniforme, orientata da E a W ed esteso una 30-ina di secondi (presenza di chiarore lunare) — 495x.
PGC 2254858	gx	23h11m35s	+44°54.7'		And	24"	m. buona / ottimo	piccolo baffo di luce molto tenue, ma più che altro disturbato da una coppia di stelline abbastanza brillanti a ridosso S, orientato da NW a SE ed esteso una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 2258601	gx	13h11m48s	+45°05.3'		CVn	28"	ottima / ottimo	molto piccola, debole e relativamente compatta, appare facilmente in visione distolta nonostante una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E (o ESE); non sembra comunque più estesa di 10" o 12" — 495x.
PGC 2267391	gx	18h44m32s	+45°35.3'		Lyr	28"	ottima / ottimo	forma una coppia con **PGC 2267634** situata 1' scarso a NNE — molto piccola e debolissima, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
PGC 2267622	gx	18h43m43s	+45°36.1'		Lyr	28"	ottima / ottimo	elusivo baffo di luce esteso sì e no 20" e situato a ridosso SW di una stellina — 495x.
PGC 2267634	gx	18h44m33s	+45°36.2'		Lyr	28"	ottima / ottimo	molto piccola, appare praticamente come una debolissima stellina, probabilmente non più estesa di 10"-12" e poco meno evidente **PGC 2267391** situata 1' scarso a SSW — 495x.
PGC 2267716	gx	12h12m17s	+45°36.4'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e molto debole, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 495x.
PGC 2275996	gx	11h48m15s	+46°08.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente compatta, debole e condensata (in realtà è poco più di una stellina appena sfuocata), estesa una 10-ina di secondi; poco disturbata dalla SAO 43900 di 8ª grandezza situata 3' a E — 495x.
PGC 2279380	gx	15h06m07s	+46°20.1'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debolissima, appare in visione distolta a ridosso NW di una stellina; non dovrebbe essere più estesa di 10" — 495x.
PGC 2284608	gx	09h01m56s	+46°38.4'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 2284621	gx	02h50m57s	+46°38.5'		Per	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
PGC 2288073	gx	18h08m50s	+46°50.5'		Her	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, estesa sì e no 10"; appare facilmente a 450x subito a NE di CGCG 254-19.
PGC 2288150	gx	18h49m51s	+46°50.9'		Lyr	28"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, che rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' scarso NNE — 495x.
PGC 2290046	gx	15h27m56s	+46°57.6'		Boo	28"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, estesa sì e no 10", salta fuori in visione distolta quasi a ridosso S di una stellina abbastanza brillante — 495x.
PGC 2293004	gx	02h47m57s	+47°08.3'		Per	24"	ottima / m. buono	piccola, molto debole e diffusa, a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
PGC 2296107	gx	11h53m34s	+47°19.1'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø max di 15" — 495x.
PGC 2303113	gx	18h19m18s	+47°43.0'		Dra	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 2303878	gx	18h19m33s	+47°45.5'		Dra	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, a tratti condensata; c'è una stellina a ridosso NE — 450x.
PGC 2307668	gx	15h56m28s	+47°57.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso NW — 450x.
PGC 2308585	gx	01h54m35s	+48°00.1'		Per	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20"; disturbata da una stellina brillante a ridosso NE — 450x.
PGC 2309484	gx	15h56m43s	+48°02.9'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente facile, allungata da E a W, di dimensioni 20"×10" e con nucleo stellare evidente — 450x.
PGC 2309599	gx	08h34m14s	+48°03.2'		UMa	28"	m. buona / buono	molto piccola e molto debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' SE — 495x.
PGC 2309701	gx	13h01m18s	+48°03.5'		CVn	24"	m. buona / buono	appare come una debole stellina al bordo orientale di CGCG 245-12 — 450x.
PGC 2310225	gx	11h10m43s	+48°05.2'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, appare a ridosso SE di una stellina; non sembra più estesa di 12"-15" — 495x.
PGC 2317019	gx	14h59m18s	+48°25.0'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 2317696	gx	08h46m31s	+48°26.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	appare come una stellina appena percettibile situata 1' a N di UGC 4580 — 495x.
PGC 2318086	gx	15h25m22s	+48°27.9'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto debole e molto piccola, di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una coppia di deboli stelline subito a W — 495x.
PGC 2319357	gx	15h41m53s	+48°31.3'		Boo	28"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è estesa sì e no 10" — 495x.
PGC 2319821	gx	07h08m37s	+48°32.5'		Lyn	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con nucleo stellare evidente — 495x.
PGC 2320905	gx	15h42m06s	+48°35.2'		Boo	28"	m. buona / buono	molto piccola e debole, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
PGC 2321551	gx	15h41m57s	+48°36.8'		Boo	28"	m. buona / buono	di aspetto e dimensione simile alla precedente, solo appena più evidente — 495x.
PGC 2322025	gx	18h22m55s	+48°38.1'		Dra	28"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×10"; la visione è disturbata dalla SAO 47446 di 8ª grandezza situata quasi 3' a NW — 495x.
PGC 2322328	gx	15h20m56s	+48°30.8'		Boo	28"	m. buona / discreto	è un debolissimo baffo di luce molto piccolo esteso sì e no 20" che appare a momenti in visione distolta a ridosso E di una debole stellina — 495x.
PGC 2322501	gx	15h20m45s	+48°39.4'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, a tratti condensata, forse rotonda con Ø 10"-12"; situata tra la MCG+8-28-20 e una coppia di stelline appena percettibili — 495x.
PGC 2322814	gx	15h20m58s	+48°40.2'		Boo	28"	m. buona / discreto	di aspetto simile alla precedente, ma più debole, appare in visione distolta a 1' SE di **MCG+8-28-20** — 495x.
PGC 2323400	gx	07h09m40s	+48°11.7'		Lyn	28"	m. buona / discreto	appare come una stellina appena percettibile situata subito a W di **CGCG 234-78** — 495x.
PGC 2327525	gx	12h18m42s	+48°51.9'		CVn	24"	m. buona / m. buono	appare in visione distolta come una stellina appena percettibile subito a S di MCG+8-22-102 — 450x.
PGC 2333123	gx	11h31m44s	+49°05.2'		UMa	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20"; c'è una coppia di stelline brillanti a 1' NW — 495x.
PGC 2333719	gx	15h20m24s	+49°06.5'		Boo	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata un paio di primi a NNW — 495x.
PGC 2339470	gx	16h25m44s	+49°18.8'		Her	28"	m. buona / m. buono	piccola e debole, poco diffusa e solo a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 495x.
PGC 2345334	gx	16h27m07s	+49°31.0'		Her	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, estesa non più di 10"-12"; situata a poco più di 1' SE di CGCG 251-19 — 495x.
PGC 2348266	gx	09h07m54s	+49°36.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e molto debole, rotonda con Ø di appena 10"-12"; è situata a 1' NW della coppia **MCG+8-17-34/35** — 495x.
PGC 2349019	gx	09h07m36s	+49°38.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e relativamente facile, allungata da E a W, di dimensioni 20"×10" e con condensazione centrale evidente — 495x.
PGC 2354919	gx	00h09m43s	+49°50.1'		And	24"	buona / discreto	forma una coppia ravvicinata con CGCG 549-23 situata a ridosso N — è più debole della compagna, rotonda e con Ø simile — 450x.
PGC 2360189	gx	01h22m26s	+50°00.7'		And	28"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø < 20" (situata un paio di primi a SE di MCG+8-3-17) — 495x.
PGC 2363519	gx	18h10m52s	+50°07.4'		Her	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, ma appare abbastanza facilmente anche in visione diretta forse rotonda con Ø di una decina di secondi; c'è una coppia serrata di stelline subito a N — 495x.
PGC 2370469	gx	18h35m54s	+50°21.2'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima, molto piccola e diffusa, forse rotonda con Ø di 10"-15"; c'è una stellina subito a S — 450x.
PGC 2371774	gx	16h33m01s	+50°23.7'		Her	24"	m. buona / discreto	appare come una stellina molto debole di aspetto diffuso situata quasi a ridosso SE di CGCG 251-25.
PGC 2379188	gx	19h17m22s	+50°39.9'		Cyg	28"	ottima / m. buono	relativamente facile, molto piccola e con marcato nucleo stellare, rotonda con Ø di 10" o 12" al massimo; c'è una stellina molto debole quasi a ridosso E e una più evidente e poco più distante a SW — 495x.
PGC 2383238	gx	02h43m03s	+36°35.2'		Per	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile; c'è una coppia di stelline subito a E — 495x.
PGC 2389082	gx	19h26m48s	+51°08.6'		Cyg	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, una sorta di stellina appena percettibile; c'è una stellina abbastanza brillante subito a SW — 495x.
PGC 2402514	gx	17h20m50s	+51°54.7'		Dra	28"	m. buona / ottimo	è un oggetto molto piccolo e debolissimo che appare in visione distolta un paio di primi a NE di **CGCG 277-37** — 495x.
PGC 2412003	gx	16h02m14s	+52°19.1'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima chiazza diffusa e di luminosità uniforme, estesa una 20-ina di secondi; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; c'è una stellina appena percettibile a 1' verso S — 450x.
PGC 2413286	gx	12h31m31s	+52°22.3'		UMa	28"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 495x.
PGC 2415197	gx	16h11m42s	+52°26.8'		Dra	28"	m. buona / m. buono	appare come una stellina percettibile solo a momenti subito a S di NGC 6090 — 495x.
PGC 2430892	gx	15h55m19s	+53°03.8'		Dra	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stella brillante (in realtà una doppia serrata) a 1.5' verso S — 495x.
PGC 2456695	gx	14h29m49s	+53°59.6'		Boo	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debolissima, ma appare facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di 10" o 12".
PGC 2464501	gx	14h54m03s	+54°15.9'		Boo	28"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme (situata al centro dell'ammasso **AGC 1999**) — 495x.
PGC 2464877	gx	14h53m54s	+54°16.7'		Boo	28"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, estesa sì e no 15"; appare in visione distolta a poco più di 1' NW della precedente — 495x.
PGC 2467693	gx	14h50m08s	+54°22.4'		Boo	24"	ottima / ottimo	v. **PGC 3087106**
PGC 2473625	gx	07h48m48s	+54°34.3'		Lyn	28"	buona / buono	appare in visione distolta come una stellina molto debole e appena sfuocata; forse non è più estesa di 10" — 495x.
PGC 2492449	gx	14h54m16s	+55°09.6'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, appare in visione distolta tra due deboli stelline orientate da NNW a SSE ma non sembra più estesa di 10" — 495x.
PGC 2498373	gx	16h38m28s	+55°19.9'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima, piccola e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 2501052	gx	11h29m65s	+55°24.6'		UMa	28"	m. buona / ottimo	appare a tratti come una stellina a 1' SE di MAC 1129+5525 — 495x.
PGC 2510196	gx	16h37m08s	+55°39.9'		Dra	28"	ottima / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 2511525	gx	17h44m48s	+55°42.3'		Dra	28"	ottima / m. buono	appare come una debolissima stellina a ~ 1' verso W di **NGC 6454** — 495x.
PGC 2514643	gx	17h10m50s	+55°47.7'		Dra	28"	ottima / buono	appare come una stellina appena percettibile situata a 1' N di **MCG+8-28-24** — 495x.
PGC 2540250	gx	08h19m07s	+56°32.8'		Lyn	28"	buona / buono	molto piccola e molto debole, poco più di una stellina sfuocata, appare in visione distolta quando si osserva MAC 0819+5632 dalla quale dista 45" verso N — 495x.
PGC 2542516	gx	08h01m18s	+56°37.3'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' NNE — 495x.
PGC 2542965	gx	13h10m54s	+56°38.0'		UMa	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina appena percettibile quasi a ridosso N di MCG+10-19-49 — 450x.
PGC 2552631	gx	18h05m00s	+56°56.7'		Dra	28"	ottima / m. buono	poco più evidente ed estesa di MAC 1804+5657 osservata subito prima (la galassietta situata 1' a N di CGCG 301-13), forse rotonda con Ø di 10"-12"; forma un minuscolo triangolo con due stelline a ridosso W e S — 495x.
PGC 2555923	gx	18h13m54s	+57°03.5'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debolissima, appare solo a momenti in visione distolta subito a SE di MAC 1813+5704 — 495x.
PGC 2559124	gx	14h53m50s	+54°04.6'		Boo	28"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, appare a tratti in visione distolta, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a ENE (situata al margine S dell'ammasso **AGC 1999**) — 495x.
PGC 2563604	gx	17h15m29s	+57°21.0'		Dra	28"	m. buona / ottimo	appare come una stellina molto debole e leggermente sfuocata situata a 1' verso E di NGC 6345 — 495x.
PGC 2566860	gx	17h12m06s	+57°30.2'		Dra	28"	ottima / buono	debole e molto piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 15" — 495x.
PGC 2577180	gx	17h47m37s	+58°18.7'		Dra	28"	ottima / m. buono	relativamente facile, piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
PGC 2578017	gx	18h10m06s	+58°22.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole, molto piccola e condensata, estesa 10"-12", situata tra due stelline orientate da ENE a WSW — 495x.
PGC 2584437	gx	16h54m39s	+58°55.9'		Dra	28"	ottima / buono	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta solo come una stellina sfuocata — 495x.
PGC 2593785	gx	16h58m18s	+59°44.6'		Dra	28"	ottima / buono	appare come una stellina appena percettibile che, assieme a una componente appena più evidente a E, forma una coppia situata 1.5' a W di UGC 10658 — 495x.
PGC 2597969	gx	17h49m24s	+60°04.3'		Dra	28"	ottima / m. buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con due stelline a S (fanno parte di un curioso asterismo di 6 componenti che fanno venire in mente una farfalla in volo o addirittura un "pipistrello"). La gx è erroneamente riportata sul Megastar come NGC 6489 che in realtà si trova quasi 5' più a E — 495x.
PGC 2598039	gx	13h09m31s	+60°06.2'		UMa	24"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 2603156	gx	18h05m31s	+60°30.7'		Dra	28"	m. buona / ottimo	appare solamente il nucleo stellare della galassietta situata a 1' NW di **MCG+10-26-9** — 495x.
PGC 2606842	gx	16h14m02s	+60°47.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, orientata da NW a SE, di dimensioni 20"×15" e con nucleo puntiforme appena percettibile; c'è una debole stellina subito a N — 450x.
PGC 2611617	gx	15h51m17s	+61°04.8'		Dra	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina appena percettibile situata a una 40-ina di secondi verso W di **CGCG 298-1** — 450x.
PGC 2644303	gx	17h51m03s	+62°49.9'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto debole, piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di 10"-12"; situata una 40-ina di secondi a N della coppia CGCG 300-88 / MAC 1751+6249 — 495x.
PGC 2646862	gx	18h22m30s	+62°57.5'		Dra	28"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata un paio di primi a W di MCG+10-26-35 — 495x.
PGC 2665766	gx	17h54m19s	+64°13.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a S — 450x.
PGC 2676180	gx	16h15m58s	+65°17.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso NE; un'altra stellina più brillante si trova a 1.5' nella stessa direzione — 450x.
PGC 2676489	gx	17h55m49s	+65°19.7'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una doppia stretta subito a N (riportata sul Megastar come **7ZW 754**) — 450x.
PGC 2701283	gx	17h41m58s	+67°31.0'		Dra	28"	m. buona / discreto	appena più evidente di PGC 2701676 — dalla quale dista poco più di 1' verso S — ma per il resto è di aspetto del tutto simile come dimensioni — 495x.
PGC 2701676	gx	17h42m00s	+67°32.4'		Dra	28"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, forse rotonda con Ø < 15"; appare elusivamente, allineata ed equidistante con due stelline appena percettibili a NW — 495x.
PGC 2710852	gx	17h36m41s	+68°02.8'		Dra	24"	m. buona / m. buono	piccola e relativamente compatta, facile da vedere a 450x, rotonda con Ø non superiore a 15".
PGC 2715461	gx	10h10m00s	+68°17.3'		UMa	24"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima chiazza diffusa di forma indistinta, ma non più estesa di 15"-20"; appare in visione distolta, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso N — 450x.
PGC 2725327	gx	14h45m50s	+68°54.5'		UMi	24"	m. buona / ottimo	appare soltanto come una debolissima stellina a ~ 1.5' S di UGC 9529 — 450x.
PGC 2730583	gx	07h46m06s	+69°28.6'		Cam	24"	ottima / ottimo	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1' scarso NE, mentre una stellina abbastanza brillante, utile come riferimento, si trova 2.5' verso W — 450x.
PGC 2733453	gx	16h06m47s	+69°59.6'		UMi	24"	m. buona / ottimo	molto debole poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 2744454	gx	11h07m20s	+71°36.5'		UMa	24"	buona / buono	molto piccola e debolissima, estesa 10"-12" con una stellina appena percettibile a ridosso NW; forma un piccolo triangolo equilatero con due stelline abbastanza brillanti a 1' verso S e SE — 450x.
PGC 2757182	gx	10h34m36s	+73°40.0'		Cep	24"	buona / ottimo	debolissima e di aspetto stellare, se osservata a 340x in visione diretta; a 450x, in visione indiretta, appare invece leggermente diffusa e condensata.
PGC 2758352	gx	06h40m45s	+73°50.8'		Cam	24"	buona / ottimo	molto piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta quando si osserva la debole stellina situata a 1' S; forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 2762427	gx	17h22m37s	+74°27.4'		Dra	24"	buona / ottimo	piccola, debole e relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a NE — 450x.
PGC 2767647	gx	13h02m34s	+75°22.5'		Dra	24"	m. buona / buono	fa parte assieme alle due successive di un trio di gx molto piccole e debolissime situate negli immediati dintorni di NGC 4954 — debolissima e diffusa, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 450x.
PGC 2767690	gx	13h02m26s	+75°23.4'		Dra	24"	m. buona / buono	questa è la più evidente, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni di 20"×10" — 450x.
PGC 2767790	gx	13h02m00s	+75°24.7'		Dra	24"	m. buona / buono	quest'altra è invece la più difficile e mostra un nucleo stellare visibile a momenti — 450x.
PGC 2768363	gx	04h19m21s	+75°34.0'		Cam	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a ridosso SW di una debole stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x; forse rotonda con Ø di una decina di secondi.
PGC 2773026	gx	10h42m01s	+77°08.2'		Dra	24"	m. buona / buono	relativamente compatta, allungata da E a W, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare visibile a momenti; c'è una stellina a 1' N; altre 2 stelline allineate e distanti 1' si trovano a S — 450x.
PGC 2773857	gx	23h19m00s	+77°28.0'		Cep	24"	buona / buono	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi, ma occorre non scendere sotto i 450x.
PGC 2790096	gx	07h16m03s	+85°46.5'		Aqr	24"	buona / mediocre	debolissima e molto piccola, appare solo a momenti in visione distolta, ma non può essere più estesa di 10" o 15"; c'è una stellina a 1' scarso verso N — 450x.
PGC 2790800	gx	11h50m18s	+88°12.3'		UMi	24"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto diffuso e molto debole, rotondo con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso S; c'è una doppia stretta dalle componenti molto deboli a un paio di primi W — 450x.
PGC 2800918	gx	21h43m49s	−08°04.4'		Aqr	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile e diffusa, con tenue condensazione centrale, rotonda con Ø < 30" — 400x.
PGC 2800959	gx	10h33m54s	+57°03.9'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è un piccolo oggetto diffuso, rotondo con Ø di 10"-12" situato tra CGCG 290-51 e una stellina abbastanza brillante — 495x.
PGC 2800988	gx	14h28m20s	+15°25.3'		Boo	24"	ottima / ottimo	appare come un tenue rinforzo di luce situato verso l'estremità N di UGC 9109; c'è una stellina di magnitudo 14.8 ben visibile a ridosso NE — 580x.
PGC 2800991	gx	14h47m06s	+13°39.9'		Boo	24"	m. buona / ottimo	piccolo oggetto poco diffuso e condensato esteso non più di 10"-15" e situato quasi a ridosso E di NGC 5758 — 450x.
PGC 2800995	gx	14h59m17s	+24°01.1'		Boo	16"	buona / buono	forma una coppia abbastanza ravvicinata con CGCG 134-61 situata a 1' SSE: sono due debolissime chiazze di aspetto a prima vista simile e di luminosità uniforme; la PGC sembra un poco più evidente, rotonda con Ø < 30", mentre la CGCG appare a tratti orientata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; sono distanti ~ 1' in direzione N-S; c'è una stellina quasi a ridosso E della coppia — 380x.
PGC 2801001	gx	17h47m30s	+45°41.8'		Her	24"	m. buona / discreto	molto piccola, debolissima e a tratti condensata; in visione distolta appare rotonda con Ø di una decina di secondi; c'è una stellina subito a N — 450x.
PGC 2801003	gx	19h38m23s	+61°35.8'		Dra	24"	m. buona / discreto	appare con un debolissimo nodulo esteso non più di 15" a ridosso SE di UGC 11463 — 450x.
PGC 2817416	gx	10h07m37s	+14°37.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	appare come una debole stellina appena sfuocata, estesa sì e no una decina di secondi situata 1' NE di CGCG 93-51 — 450x.
PGC 3080587	gx	04h15m20s	−13°26.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a un paio di primi verso E — 450x.
PGC 3081939	gx	11h58m09s	−02°04.0'		Vir	24"	buona / buono	minuscola galassietta rotonda, molto debole e relativamente compatta, estesa 10"-15"; appare facilmente in visione distolta a 450x.
PGC 3086694	gx	08h05m01s	+60°59.7'		Cam	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, molto diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile — 450x.
PGC 3086862	gx	13h10m01s	+57°45.7'		UMa	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 495x.
PGC 3086865	gx	13h20m54s	+58°34.3'		UMa	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, a tratti condensata, rotonda con Ø max di 15" — 450x.
PGC 3087034	gx	12h56m18s	+55°11.4'		UMa	24"	buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una coppia abbastanza serrata di deboli stelline a NE — 450x.
PGC 3087106	gx	14h50m04s	+54°22.0'		Boo	24"	ottima / ottimo	assieme a PGC 2467693, situata 30"-40" a NE, fa parte di una coppia di piccoli e oggetti molto deboli; il 1° è più facile, rotondo con Ø di una 20-ina di secondi e a tratti condensato; l'altro, più piccolo, è più elusivo e salta fuori solo a momenti — 450x.
PGC 3087115	gx	18h11m04s	+54°23.2'		Dra	24"	m. buona / m. buono	appare come una stellina molto debole situata in mezzo ad altre due di luminosità simile orientate da E a W e distanti ~ 1'; si trova 1.5' a E di MCG+9-30-3 — 450x.
PGC 3087200	gx	13h41m10s	+52°06.8'		UMa	24"	buona / m. buono	a 340x è come una stellina sfuocata molto debole, mentre a 450x appare effettivamente come un piccolo oggetto rotondeggiante con Ø di 10"-12".
PGC 3087482	gx	02h24m43s	+47°57.8'		And	24"	m. buona / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una tripletta serrata di stelline appena percettibili subito a N — 450x.
PGC 3087509	gx	12h09m57s	+47°05.7'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø < 15" — 495x.
PGC 3087648	gx	12h12m36s	+45°37.5'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' verso E che presenta una piccola "eco" luminosa molto tenue a ridosso N: si tratta in effetti di **2MASS 12124511+4538063** che non sembra più estesa di 10" — 495x.
PGC 3088054	gx	17h45m04s	+40°26.9'		Her	28"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 3088100	gx	08h21m12s	+39°15.6'		Lyn	20"	buona / buono	è un piccolo oggetto molto debole ed esteso sì e no 10"-12" che appare facilmente a ridosso SE di CGCG 207-58 — 360x.
PGC 3088689	gx	16h54m50s	+34°43.6'		Her	28"	ottima / m. buono	debole, molto piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' SW — 495x.
PGC 3088831	gx	17h40m02s	+33°47.5'		Her	24"	m. buona / buono	molto piccola e condensata, rotonda con Ø di 10"-12"; situata tra 2 stelline molto deboli orientate da ENE a WSW — 450x.
PGC 3089159	gx	15h37m04s	+29°20.5'		CrB	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con **CGCG 166-22** situata a ridosso SE — molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
PGC 3089200	gx	01h46m33s	+28°43.4'		Tri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
PGC 3089267	gx	23h05m12s	+28°34.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e diffusa, solo a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
PGC 3089269	gx	23h16m51s	+28°45.6'		Peg	24"	m. buona / m. buono	piccola chiazza molto debole, oblunga e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa una 20-ina di secondi; c'è una doppia stretta appena percettibile a ridosso SW — 450x.
PGC 3089494	gx	09h28m29s	+25°34.0'		Leo	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debolissima, appare subito a NW di CGCG 122-3, forse rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso W — 450x.
PGC 3089945	gx	02h25m33s	+20°23.9'		Ari	24"	m. buona / buono	appare come stellina molto debole e a tratti leggermente sfuocata situata a poco più di 1' E di IC 1797 — 450x.
PGC 3090048	gx	01h22m29s	+19°33.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	è molto debole, ma compatta, appare facilmente in visione distolta a 450x, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
PGC 3090206	gx	10h57m16s	+18°12.1'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di 15"-20" — 450x.
PGC 3090398	gx	16h52m54s	+17°26.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debolissima, poco più che una stellina sfuocata, appare in visione distolta quasi a ridosso E di CGCG 110-5 — 450x.
PGC 3091040	gx	21h02m49s	+13°08.2'		Del	24"	m. buona / m. buono	situata 4.5' a SW di UGC 11669 e addirittura più facile di questa, piccola rotonda, e relativamente compatta, con Ø di una 20-ina di secondi — 400x.
PGC 3091184	gx	16h32m55s	+11°42.6'		Her	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima galassietta molto piccola, forse rotonda con Ø di max 10" e che a 340x è ancora di aspetto quasi stellare; è situata 1' a SW di CGCG 80-46 — 580x.
PGC 3091262	gx	09h52m31s	+09°53.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	appare in visione distolta come una debole stellina sfuocata a 1' W di CGCG 63-92 — 450x.
PGC 3091317	gx	14h06m56s	+10°24.8'		Vir	24"	discreta / ottimo	molto piccola e debole, ma relativamente compatta, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
PGC 3091635	gx	17h22m30s	+08°22.8'		Oph	24"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e solo a momenti condensata; appare facilmente in visione distolta quando si osserva CGCG 54-26 dalla quale dista 1.5' a NNW — 450x.
PGC 3091640	gx	21h02m41s	+08°19.8'		Equ	24"	ottima / ottimo	molto debole e piccola, estesa non più di 10" o 15", con una stellina a ridosso NE (situata 1.5' a NE di CGCG 400-21) — 570x.
PGC 3091716	gx	09h44m47s	+07°13.9'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta subito a W di una debole stellina — 450x.
PGC 3091819	gx	03h49m56s	+06°53.1'		Tau	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e a tratti condensata — 450x.
PGC 3091940	gx	02h33m38s	+06°12.1'		Cet	24"	buona / buono	appare elusivamente e solo a tratti a ~ 1' SW di una debole stellina, ma rimane di aspetto pressoché stellare anche a 450x.
PGC 3091985	gx	10h26m02s	+05°27.9'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 15-ina di secondi; appare facilmente in visione distolta tra una stellina a S e la CGCG 37-34 a N — 450x.
PGC 3091998	gx	12h19m32s	+05°04.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	debolissima, molto piccola e a tratti condensata, in visione distolta appare rotonda con Ø < 20" — 450x.
PGC 3092016	gx	15h11m19s	+05°14.3'		Ser	24"	buona / ottimo	debole e piccola, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare evidente; c'è una debole stellina a ridosso S e un'altra di luminosità simile subito a SE — 450x
PGC 3092071	gx	23h44m18s	+05°35.3'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e condensata, rotonda con Ø < 20"; si trova al vertice occidentale di un minuscolo triangolo formato con 2 stelline molto deboli — 450x.
PGC 3092243	gx	00h27m43s	+04°08.9'		Psc	24"	discreta / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20" — 450x.
PGC 3092488	gx	09h59m38s	+00°30.7'		Sex	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e debole, praticamente di aspetto stellare anche a 340x; solo a 450x appare grosso modo rotonda con Ø di max 10".
PGC 3093752	gx	13h01m05s	−14°17.3'		Vir	24"	ottima / buono	piccola, debole, diffusa, rotonda con Ø < 20" e una condensazione centrale evidente — 450x.
PGC 3094664	gx	18h53m40s	+68°23.5'		Dra	24"	m. buona / discreto	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta quasi a ridosso SE di una stellina; forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (fa parte dell'ammasso AGC 2312) — 450x.
PGC 3094685	gx	04h18m48s	+02°21.7'		Tau	24"	m. buona / ottimo	è come una stellina appena percettibile e debolmente sfuocata situata a ridosso NW di MCG+0-11-50; in visione distolta pare immersa in un alone comune — 450x.
PGC 3094719	gx	11h29m25s	+55°18.8'		UMa	28"	m. buona / ottimo	appare solo a momenti come una stellina sfuocata al bordo SE di MCG+9-19-89 — 495x.
PGC 3097120	gx	04h03m02s	+30°50.7'		Tau	24"	ottima / m. buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" — 450x.
PGC 3097524	gx	12h12m10s	+45°40.6'		CVn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con nucleo stellare appena percettibile — 495x.
PGC 3098105	gx	23h47m42s	−28°07.5'		Scl	24"	ottima / mediocre	fa parte dell'ammasso **AGC 4038** — appare solo come una stellina appena percettibile a ridosso N di IC 5358 — 340x.
PGC 3098317	gx	14h44m19s	+00°02.5'		Vir	24"	buona / buono	molto piccola e debole, estesa una 15-ina di secondi e con condensazione stellare; situata a ridosso SE di CGCG 20-7, dalla quale tuttavia si separa con difficoltà *(presenza di deboli chiarore lunare)* — 450x.
PGC 3098572	gx	23h43m19s	+04°33.1'		Psc	24"	m. buona / discreto	assieme a MAC 2343+0433 è una delle 2 galassiette situate a ridosso di CGCG 407-46 osservata in altra data e in condizioni di visibilità simili — la MAC è difficilissima e non sembra altro che una stellina sfuocata al bordo NE della gx principale, anche se si "stacca" solo a momenti; la PGC è appena più evidente e poco più distante, estesa una decina di secondi e situata subito a E — 450x.
PGC 3099155	gx	04h45m04s	−15°49.3'		Eri	24"	ottima / m. buono	molto piccola e diffusa, con nucleo stellare, situata a ridosso E di una debole stellina — 450x.
PGC 3099156	gx	04h45m14s	−15°53.3'		Eri	24"	ottima / m. buono	anche questa appare molto piccola e diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso N — 450x.
PGC 3191397	gx	02h54m55s	+09°16.3'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina subito a W e un'altra appena percettibile a 1' verso E; una stellina abbastanza brillante si trova a 1.5' NW — 450x.
0054+144	qso	00h57m10s	+14°46.2'		Psc	24"	m. buona / buono	situato 8.5' a S di UGC 590 è visibile come una stellina molto debole — 400x.
0205+024	qso	02h07m50s	+02°42.9'		Cet	24"	m. buona / m. buono	appare come una debole stellina di 15-esima situata un paio di primi a N di UGC 1621 — 450x.
0851+202	qso	08h54m49s	+20°06.5'		Cnc	24"	buona / buono	oggetto **BL Lac** — è una debole stellina allineata ed equidistante con due stelline poco più brillanti a SE; da un confronto con queste ne ho stimato una magnitudine superiore alla 14-esima — 450x.
0856+468	qso	08h59m24s	+46°37.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	è una stellina appena percettibile, ma per una continuità della visione è meglio alternare gli occhi (il Megastar la riporta di 17-esima grandezza) — 495x.
0923+201	qso	09h25m55s	+19°54.1'		Leo	24"	buona / m. buono	si vede facilmente (il Megastar lo riporta, penso erroneamente, di 16-esima); forma un piccolo triangolo rettangolo isoscele con una stellina abbastanza brillante a 2' NE e una a 3' scarsi verso E; una stellina molto debole si trova a 1' SE della quasar — 450x.
0957+561	qso	10h01m21s	+55°53.8'		UMa	28"	ottima / ottimo	appare a prima vista come un minuscolo trattino orientato da N a S, ma prolungando l'osservazione si nota dapprima la componente a N (appena più brillante) e in seguito anche la compagna. La separazione angolare è di 5" o 6", quindi nulla di trascendentale in sé; l'unica difficoltà sta nel fatto che tali componenti sono molto deboli: il Megastar le dà di 17-esima, ma le stimerei invece più realisticamente di 16-esima — 495x.
1700+518	qso	17h01m25s	+51°49.3'		Dra	28"	m. buona / ottimo	facilmente visibile, di luminosità appena inferiore a quella della componente più debole della doppia sbilanciata situata 3' a N; 3 stelline allineate e abbastanza brillanti si protendono verso SSE — 495x.
3C 120	qso	04h33m11s	+05°21.3'		Tau	24"	ottima / buono	stellina relativamente brillante situata al centro di quel debole lucore circolare rappresentato da **UGC 3087** — 450x.
A 29	knot				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — poco più evidente ed esteso di C 259 (osservato subito prima), di forma irregolare, Ø 40"-45" e di luminosità pressoché uniforme — 380x.
A 40	knot	00h44m41s	+41°26.5'		And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — debolissimo nucleo molto diffuso e stemperato che si estende verso S da una stellina brillante — 380x.
A 41	knot				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — è una bolla molto tenue di luminosità uniforme e con Ø di ~ 1' con una stellina a ridosso verso S — 380x.
A 49	knot	00h45m34s	+41°46.8'		And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — debolissima chiazza di luce di luminosità uniforme ed estesa per quasi 1.5' — 380x.
A 54	knot	00h44m35s	+41°52.4'		And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — altra chiazza debolissima e molto estesa (direi almeno 3') a mala pena distinguibile dalle regioni estreme di Andromeda; una stellina brillante è situata a ridosso del margine orientale; meglio osservabile a 270x.
A 67	knot				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — chiazza debole e irregolare di luminosità uniforme e con Ø di ~ 40"; è situata in una delle bande scure di M31; meglio osservare a 380x perché troppo a ridosso della galassia.
ADS 13292	aa?	20h02m24s	+35°18.6'		Cyg	24"	buona / discreto	è un piccolo gruppo serrato, esteso sì e no una 40-ina di secondi, e di forma a prima vista rettangolare con una "coda" di 3 stelline deboli che si protende verso SW; delle 4 stelle principali la più brillante, di magnitudo 7.4, è la SAO 69299; l'oggetto contiene nel complesso una decina di stelle, ma alcune altre componenti molto deboli o appena percettibili potrebbero altresì far parte del sistema — 210x.
AGC 1689	gx	13h11m30s	−01°20.6'		Vir	24"	buona / buono	(le coordinate si riferiscono alla zona più visibile dell'ammasso) — è di aspetto irregolare; una debolissima chiazza diffusa e irrisolta appare a ridosso SW di una stellina molto debole; un'altra macchia con alcuni noduli stellari salta fuori subito a NE della stellina; un altro nodulo appena percettibile si trova a una 40-ina di secondi a E; tuttavia quando si ha a che fare con osservazioni al limite della visibilità è difficile dirimere se una stellina è tale o se si tratta di un minuscolo oggetto diffuso; anche forzando a 580x non si riesce a distinguere tra i due; a 340x e in visione distolta questa zona sembra come immersa in una tenuissima chiazza lattiginosa [alla data dell'osservazione Giove si trovava a poco più di 5° SW].
Arp 3	gx	22h36m35s	−02°54.4'	q 257	Aqr	16"	ottima / ottimo	è un'estesa chiazza lattescente di luminosità uniforme che a 270x appare grosso modo circolare con Ø pari alla distanza delle 2 stelline situate rispettivamente a N e NE, ossia un paio di primi (riportata sull'Uranometria come D 214).
Arp 54	gx	02h24m03s	−04°41.6'		Cet	24"	ottima / m. buono	debole, diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da E a W con dimensioni 50"×30"; c'è una stellina a poco più di 1' WSW — 450x.
Arp 57	gx	13h16m47s	+14°25.7'		Com	24"	buona / buono	molto debole e diffusa, appena più brillante all'interno, grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
Arp 103	gx	16h49m28s	+45°27.7'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e una condensazione centrale abbastanza evidente — 495x.
Arp 110	gx	22h54m09s	−15°14.1'		Aqr	24"	discreta / buono	molto debole e diffusa, rotonda con Ø di 30"-35" e a tratti condensata; c'è una stellina subito a S e una percettibile solo a momenti a ridosso W, ma quest'ultima è in realtà la **MAC 2254-1514** — 340x.
Arp 121	gx	00h59m26s	−04°47.7'		Cet	24"	buona / buono	forma una coppia ravvicinata, forse interagente, con MCG-1-3-52 situata a ridosso NE — è molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità pressoché uniforme; la MCG è diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; ha una stellina brillante al bordo NNE — 450x.
Arp 131	gx	02h47m20s	−14°48.1'		Eri	24"	buona / mediocre	relativamente facile, diffusa, poco allungata da E a W, di dimensioni 40"×30" e con piccola condensazione centrale osservabile a 340x; a ridosso verso NE appare, seppure a momenti, un piccolo e debolissimo oggetto diffuso leggermente condensato, esteso sì e no 20": da un controllo effettuato successivamente è risultato essere la MCG-3-8-26.
Arp 148	gx	11h03m54s	+40°51.0'		UMa	28"	ottima / m. buono	galassietta molto piccola e relativamente compatta, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 495x.
Arp 179	gx	03h01m41s	−04°40.3'		Eri	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare in visione distolta subito a NW di una stellina, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
Arp 180	gx	04h53m24s	−04°47.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e con tenue condensazione centrale, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 450x.

Arp 187	gx	05h04m53s	−10°14.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15" — 450x.
Arp 221	gx	09h36m28s	−11°19.8'		Hya	16"	m. buona / scarso	poco diffusa, rotonda con Ø di 30", leggermente più brillante all'interno; c'è una stellina quasi a ridosso verso NW — 270x.
Arp 256	gx	00h18m50s	−10°21.7'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole e diffusa, di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 45"×15" (ossia 1.5 volte la distanza delle 2 stelline a N che sono orientate nello stesso modo); forma una coppia ravvicinata con MCG-2-1-51 situata a 1' scarso verso S — 380x.
Arp 295	gx	23h41m47s	−03°40.1'		Aqr	16"	m. buona / ottimo	debolissima lama di luce di luminosità uniforme che in visione distolta appare estesa ~ 1' e orientata da NE a SW — 270x.
Arp 296	gx	11h28m46s	+58°35.6'		UMa	16"	ottima / ottimo	si vede abbastanza facilmente anche in visione diretta come una debole stellina sfuocata di 15" o 20" con Ø (situata 2.5' a NE della celebre coppia interagente NGC 3690 / IC 694) — 270x.
Arp 312	gx	16h49m46s	+46°49.8'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; situata 1' scarso a SW della coppia MCG+8-31-5 / 6 — 495x.
Arp 314	gx	22h58m02s	−03°46.2'		Aqr	16"	ottima / ottimo	più estesa e poco più brillante di MCG-1-58-10 (dalla quale dista un paio di primi scarsi verso NW), di luminosità uniforme, poco allungata ~ da N a S con dimensioni 60"×45" — 270x.
Arp 321	gx	09h38m53s	−04°50.9'		Hya	24"	buona / m. buono	fa parte di un quartetto serrato di galassiette — relativamente compatta, gradatamente più brillante verso l'interno, con nucleo stellare visibile a tratti a 400x e Ø di una 30-ina di secondi; a tratti appare un piccolissimo oggetto diffuso e rotondo a ridosso NW che non sembra una stella.
Barnard 33	nebo	05h41m02s	−02°27.7'	q 226	Ori	24"	buona / buono	**Horsehead Nebula** — dopo vari esperimenti effettuati con diversi oculari, filtri e aperture ho ottenuto la visione migliore col mio 24" a 123x (Nagler 22 mm) e un filtro H-β da 2 pollici; la Testa di Cavallo appariva ovvia, con la sua tipica forma ben definita, seppure su un fondo grigio molto scuro; a 110x con filtro deepsky il campo era palesemente più brillante, ma la nebulosa era di aspetto confuso, come sfocata.
Barnard 68	nebo	17h22m38s	−23°50.2'	q 338	Oph	10"	ottima / discreto	assieme a Barnard 69 e 70 sono 3 noduli scuri posti ad arco e che si estendono per una 20-ina di primi da NW a SE in una zona molto ricca della Via Lattea; il 1º è il più evidente dei 3 ed è facilmente visibile; il 2º richiede già un esame più accurato della zona, mentre il 3°, elusivo, è osservabile solo a momenti in visione laterale.
Barnard 69	nebo	17h22m57s	−23°57.9'	q 338	Oph	10"	ottima / discreto	v. **Barnard 68**
Barnard 70	nebo	17h23m36s	−24°03.0'	q 338	Oph	10"	ottima / discreto	v. **Barnard 68**
Barnard 72	nebo	17h23m50s	−23°41.8'	q 338	Oph	10"	ottima / discreto	**The Snake** — è una "biscia" scura che per le condizioni molto buone del cielo s'intravedeva a 60x; ha una larghezza molto irregolare e nell'ansa meridionale, la parte più facile da vedere, raggiunge probabilmente i 2'; tende ad assottigliarsi verso NW. L'oggetto era facilmente riconoscibile nel 25×125 di R. Parisio.
Barnard 86	nebo	18h02m59s	−27°52.0'	q 339	Sgr	10"	ottima / discreto	è una zona scura larga almeno 4' che oltre a risaltare facilmente in uno dei campi più ricchi di stelle (siamo vicino al centro della Galassia) contrasta in modo netto col vicinissimo NGC 6520 che è molto compatto, poco allungato da N a S con dimensioni 4'×3' e brulicante di stelline.
Barnard 103	nebo	18h39m21s	−06°37.8'	q 295	Sct	10"	m. buona / buono	è un'ampia zona scura fatta a "matraccio" o "bottiglione" situata a W dell'ammasso aperto **NGC 6683** e che è più facilmente osservabile in un 20×80 essendo estesa per oltre 1 grado.
Barnard 139	nebo	19h17m51s	−01°25.7'	q 251	Aql	24"	m. buona / ottimo	ampia zona scura quasi totalmente priva di stelle, estesa in lunghezza una 15-ina di primi e larga mediamente 5' (rapporto di dimensioni stimato circa 3:1); è più netta verso SE e meno contrastata dalla parte opposta — 110x.
Barnard 142-143	nebo	19h41m06s	+10°54.3'	q 207	Aql	2"	m. buona / buono	si apprezza abbastanza bene nel 12×50 con campo di circa 5°; è estesa ~ 1°; il ramo più settentrionale è maggiormente confuso e tende a fondersi con una chiazza scura situata più a E; è altresì denominato Barnard E ed è situato a poco più di 1º W di γ Aql.
Barnard 147	nebo	20h06m42s	+35°22.6'		Aql	24"	m. buona / ottimo	estesa striscia scura orientata da E a W che si staglia abbastanza facilmente sul fondo cielo, spessa sì e no 1' e lunga una decina di primi, non proprio rettilinea — 210x.
Barnard 353	nebo	20h57m00s	+45°32.0'	q 85	Cyg	16"	m. buona / m. buono	appare come una "O" allungata da N a S che verso E appare molto pronunciata quando si osserva col filtro O III: dalla parte opposta è invece molto più sottile; a N è delimitata da 2 stelline brillanti distanti 3', mentre 2 stelline più deboli orientate nello stesso modo e distanti un paio di primi si trovano all'estremità opposta. L'anello scuro è perfettamente visibile anche senza filtro, ma in questo modo il campo oculare è molto ricco di stelle facendo perdere contrasto. Circonda l'ammasso NGC 6996 — 75x.
Barnard 362	nebo	21h24m00s	+50°09.5'		Aql	24"	m. buona / ottimo	estesa zona scura poco contrastata, orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo 12'×6' (110x); un'altra piccola chiazza scura si nota più a S e a ridosso verso E di un quadrilatero allungato e irregolare di stelline brillanti; quest'ultima è più evidente verso N, ma si nota meglio aumentando a 210x.
Barnard 889	nebo	20h27m00s	+40°06.0'		Cyg	3"	buona / buono	è quell'evidente canale scuro che sembra dividere in 2 la parte più cospicua di IC 1318 situata 1º a E di γ Cyg. L'osservazione è stata effettuata col binocolo 20×80.
Basel 1	aa	18h48m06s	−05°51.0'	q 295	Sct	10"	m. buona / m. buono	relativamente compatto, di forma irregolare ed esteso 5' o 6'; si contano una dozzina di componenti a 178x; un piccolo "grumo" irrisolto si trova verso SE; è situato sul lato nord-orientale di un triangolo isoscele molto acuminato formato con tre stelle brillanti di 7ª, esteso oltre 20' e il cui vertice più acuto punta a SE.
Basel 4	aa	05h48m54s	+30°11.1'	q 98	Aur	10"	ottima / buono	molto piccolo, con dimensioni di qualche primo, molto allungato da N a S, ma questa è, sostanzialmente, la distribuzione delle 5 stelline più brillanti che sono riuscito a contare *(presenza di chiarore lunare)*.
Basel 7	aa	06h36m19s	+08°20.4'	q 182	Mon	10"	discreta / discreto	gruppo di stelle allungato costituito da una dozzina di componenti di luminosità assai diseguale; a 63x sembra una punta di lancia col vertice rivolto verso S; una stellina brillante si trova verso il bordo orientale; una stella gialla luminosa di 10ª grandezza si trova all'esterno, subito a NE.
Basel 10	aa	02h19m28s	+58°18.0'	q 37	Per	10"	ottima / buono	oggetto abbastanza compatto, molto allungato da NW a SE; a 118x si contano 6 stelle su un fondo lattescente; subito a NE ci sono altre 3 coppie simili alla coppia delle 2 stelle più brillanti appartenenti all'ammasso *(presenza di chiarore lunare)*.
Basel 11	aa	07h17m08s	−13°58.4'	q 274	CMa	10"	ottima / buono	abbastanza serrato, di forma vagamente triangolare, col vertice più acuto che sembra puntare verso un piccolo arco di di 4 stelline a NE; una "V" di stelline deboli di luminosità uniforme concentrate nella parte occidentale dell'ammasso si trovano attorno alla stella più brillante.
Bergeron1	ss	23h04m46s	+60°04.6'		Cep	16"	buona / m. buono	è costituito da 6 stelline, delle quali una appena percettibile, irregolarmente disposte in direzione E-W su una piccolissima zona che non eccede 1'; non si vede traccia di nebulosità all'interno osservando a 380x.
Berkeley 4	aa	00h45m13s	+64°23.5'	q 16	Cas	10"	m. buona / buono	gruppo disperso di stelle brillanti; risalta all'occhio una strana configurazione a forma di "H".
Berkeley 10	aa	03h39m37s	+66°30.5'	q 18	Cam	10"	m. buona / buono	molto debole, alquanto esteso e di forma indistinta; c'è un piccolo triangolo rettangolo di stelline brillante subito a S.
Berkeley 20	aa	05h32m37s	+00°11.3'		Ori	24"	m. buona / ottimo	a 210x appare come una piccola e debole macchia estesa poco più di 1' e situata a ridosso WSW di una stellina brillante; a 450x saltano fuori 5 o 6 stelline che si stagliano un po' a fatica su un fondo lattescente; a 580x, tuttavia, quest'effetto scompare.
Berkeley 28	aa	06h52m07s	+02°55.0'	q 228	Mon	24"	m. buona / discreto	relativamente compatto e fatto a "Y", con una stellina brillante sul rebbio occidentale; un piccolo arco di 4 deboli stelline (una sorta di svirgola) si diparte dall'estremità W; esteso 3' e delimitato a S da una stellina abbastanza brillante. Altresì noto come Biurakan 10 — 200x.
Berkeley 50	aa	20h10m01s	+34°58.2'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	piccolo gruppo relativamente compatto e irregolare di una decina di stelline deboli (più altre irrisolte), con una componente brillante al centro; esteso ~ 3' — 200x.
Berkeley 51	aa	20h11m53s	+34°24.3'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	a 200x appare come un piccolo e debole polverio di stelle di forma vagamente triangolare; se ne contano una dozzina sparse su un'area estesa un paio di primi; come nel caso di Berkeley 50 c'è una stellina abbastanza brillante grosso modo nel mezzo.
Berkeley 58	aa	00h00m12s	+60°56.5'	q 15	Cas	16"	buona / m. buono	debole gruppo rado di una 15-ina di stelle deboli, allungato da NE a SW e con dimensioni grosso modo 5'×3'; sembra diviso in 2 parti; a 270x si notano più facilmente all'interno 3 coppie serrate di stelline.
Berkeley 59	aa	00h02m10s	+67°25.2'	q 15	Cas	24"	m. buona / m. buono	gruppo povero e irregolare di una 20-ina di componenti su un'area che a prima vista pare orientata da E a W ed estesa 7' od 8'; è dominato da 2 stelline brillanti al centro distanti ~ 1' in direzione N-S; a ridosso S di quella più meridionale si nota una coppia serrata di stelline molto deboli; una piccola zona separata contenente 8 stelline si trova 4' più a N, ma è difficile stabilire se appartiene o meno all'ammasso — 200x.
Berkeley 62	aa	01h01m12s	+63°56.5'	q 16	Cas	10"	m. buona / buono	gruppo abbastanza compatto e piuttosto povero (ho contato una decina di componenti a 60x); è costituito da due allineamenti leggermente convergenti.
Berkeley 63	aa	02h12m27s	+63°43.3'		Cas	16"	m. buona / m. buono	piccolo gruppo molto povero nel quale si contano una dozzina di componenti a 270x; saltano facilmente all'occhio un paio di coppie: quella più a W è sbilanciata e comprende la stella più luminosa dell'ammasso.
Berkeley 76	aa	07h06m40s	−11°44.0'		CMa	24"	buona / buono	una dozzina di stelle isolate che visualmente non sembrano fra loro correlate; c'è una doppia stretta a NE che appare tale a 110x, mentre a 340x appare una 3ª componente, praticamente allineata con le altre 2, molto debole.
Berkeley 87	aa	20h21m36s	+37°22.0'	q 120	Cyg	10"	non registrati	gruppo assai disperso di una 15-ina di stelle abbastanza brillanti sparse su un'area estesa una decina di primi; risalta con una certa facilità solo a 60x.
Berkeley 94	aa	22h22m54s	+55°52.4'		Cep	10"	foschia	piccolo gruppo di stelle compatto e molto povero situato presso il confine settentrionale della Lacerta. Risaltano facilmente 2 piccole stringhe arcuate poste a "V" stretta.
Berkeley 98	aa	22h42m41s	+52°24.9'		Lac	28"	m. buona / m. buono	gruppo di una 15-ina di stelle di luminosità eterogenea, molto allungato da NE a SW per 5' e che in visione distolta appare immerso in una chiazza lattescente; una sorta di "gruccia" orientata da E a W formata da 6 stelline abbastanza brillanti si trova a 6' o 7' a N dell'ammasso — 179x.
Beta Mon	ss	06h28m49s	−07°02.0'		Mon	16"	ottima / m. buono	è un sistema molto bello osservato a 270x, costituito da 3 stelle azzurre; una coppia molto serrata, con componenti separate da 2" o 3" in direzione WNW-ESE, di luminosità uguale e una terza appena più brillante a meno di 10" verso NW.
Biurakan 1	aa	20h07m30s	+35°41.0'	q 119	Cyg	24"	buona / buono	assieme a Biurakan 2 forma una coppia di oggetti che non si distinguono dal fondo cielo; più interessante, al limite, il secondo: al centro c'è una coppia stretta e molto brillante accompagnata verso S da un piccolo gruppo di 7 stelline di cui 3 allineate; alla estremità occidentale dell'ammasso si nota un pentagono irregolare la cui componente più a E è la più luminosa. Sono situati rispettivamente a 20' ESE e a poco più di 40' SE di NGC 6871.
Biurakan 2	aa	20h09m12s	+35°29.0'	q 119	Cyg	24"	buona / buono	v. **Biurakan 1**
Biurakan 9	aa	06h57m46s	+03°13.7'	q 228	Mon	24"	m. buona / discreto	piccolo gruppo relativamente serrato di una 15-ina di stelle deboli; una sola componente brillante si trova a N: da questa si dipartono 3 deboli stelline allineate ed equidistanti — 200x.
Blanco 1	aa	00h04m12s	−29°56.0'		Scl	16"	ottima / ottimo	gruppo disperso di una 15-ina di stelle di luminosità molto diseguale, sparse su un'area estesa ~ 1.5°; nel cercatore 10×50 salta facilmente all'occhio un asterismo foggiato a "V" stretta — 132x.
Bochum 1	aa	06h25m30s	+19°46.0'	q 137	Gem	10"	buona / discreto	gruppo molto disperso e irregolare di una 15-ina di stelle di luminosità assai diseguale; le più brillanti sono 8 e fra queste ve ne sono un paio che sembrano allungare l'ammasso verso W.
Bochum 2	aa	06h48m50s	+00°22.6'	q 228	Mon	10"	ottima / buono	piccolo gruppo di stelle povero e compatto nel quale si contano 5 o 6 componenti orientate da NW a SE — 36x.
Bochum 6	aa	07h31m48s	−19°26.6'	q 319	Pup	6"	ottima / buono	debolissimo, rimane nebuloso anche 86x; è approssim. circolare con Ø di un paio di primi (ma cos'è esattamente?).
Bochum 14	aa	18h01m59s	−23°41.8'	q 339	Sgr	10"	buona / buono	piccolo gruppo molto povero esteso poco più di 1' contenente solo poche stelle che paiono a prima vista immerse in una debole chiazza lattescente; tra queste ne spiccano un paio brillanti distanti una 30-ina di secondi e orientate da E a W; (sembra situato poco più a S della posizione riportata dall'Uranometria).
C 102	knot				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — assieme al successivo forma una coppia di minuscoli oggetti leggermente diffusi e distanti una 15-ina di secondi in direzione N-S; il 2° è di aspetto più stellare e, forse per questo, pare più brillante — 380x.
C 103	knot				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — v. **C 102**
C 107	knot				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — debole, diffuso, leggermente concentrato, con Ø di 15" (ossia 2/3 della distanza delle 2 stelline situate ~ 40" verso N — 380x.
C 205	knot	00h40m57s	+41°03.2'		And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — molto debole, allungato da NE a SW, di dimensioni 40"×20"; dovrebbe esserci una stellina al margine NE — 380x.
C 259	knot				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — debolissimo e diffuso, appare a tratti in visione distolta quasi a ridosso di una stellina brillante; è esteso forse una 30-ina di secondi — 380x.
C 275	knot				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — molto debole e diffuso, ma visibile senza difficoltà in visione distolta; è di forma un po' irregolare ed esteso per ~ 1' — 380x.
C 410	knot	00h44m25s	+41°20.8'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — un oggetto diffuso grosso modo rotondo con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità un po' irregolare; è situato a 1' SW di G 280 — 450x.
Cederblad 33	neb	04h27m00s	+26°07.0'		Tau	28"	m. buona / ottimo	debolissima chiazza oblunga di forma indistinta, orientata da NW a SE ed estesa circa 2.5'; c'è una stellina verso la parte meridionale; la nebulosa si trova tra una stellina brillante a SE e una coppia di stelline abbastanza brillanti distanti 1' scarso a NW: queste 3 stelle sono tra loro allineate — 179x con filtro deepsky.
Cederblad 59	neb	05h45m24s	+09°04.0'	q 181	Ori	24"	buona / m. buono	è un piccolo alone diffuso attorno a una stella brillante di 9ª grandezza; in visione distolta sembra a tratti aggettare maggiormente verso N — 400x.
Cederblad 90	neb	07h05m15s	−12°20.0'	q 273	CMa	24"	buona / buono	bolla diafana, diffusa e abbastanza regolare con Ø di 3' situata poco eccentricamente verso W rispetto a una stella brillante; 3 stelline allineate molto deboli ne lambiscono il margine NE; una 4ª si trova invece a quello NW; altre 4 stelline, più brillanti, spiccano a ridosso verso S: la 2ª da W è una doppia molto stretta; meglio osservabile a 200x con filtro deepsky (la nebulosa era visibile, come un debole appannamento dell'oculare, anche in un 10").
Cederblad 214	neb	00h03m27s	+67°13.0'	q 15	Cep	24"	m. buona / m. buono	è visibile solo la parte più brillante come una sorta di alone rotondeggiante con Ø di 6' o 7' che circonda una stella abbastanza brillante; in visione distolta appaiono a tratti deboli sfilacciature attorno a questo, ma più che altro verso la parte orientale (altresì nota come SH2-171) — 110x con filtro UHC.
Collinder 21	aa	01h50m12s	+27°04.8'	q 128	Tri	24"	m. buona / buono	gruppo disperso e irregolare di 14 stelle di cui una dozzina brillanti, vagamente disposte in semicerchio, già visibile nel cercatore 12x60; è esteso ~ 5' ed è delimitato a S dalla SAO 74965, che è la più brillante e a N da una stella giallo-arancia poco più debole; a NW c'è una doppia abbastanza larga, con componenti distanti una 20-ina di secondi in direzione N-S.
Collinder 32	aa	02h51m11s	+50°24.1'		Mon	24"	m. buona / discreto	gruppo disperso di una 15-ina di stelline brillanti più molte altre deboli sparse una superficie di ~ 10'×15' orientata da E a W; le due stelle più luminose si trovano all'estremità occidentale dell'ammasso e sono distanti un paio di primi in direzione NW-SE; queste ultime sono immerse in 2 "spruzzatine" di stelline deboli: in quella a NW ce ne sono 7, mentre in quella a SE, ce ne sono una decina e più disperse (questa coppia dovrebbe, assieme alle relative "spruzzatine", dovrebbero far parte di IC 1848); c'è una doppia abbastanza stretta a NW e una bisciola di 4 stelline equidistanti all'estremità E — 110x.
Collinder 34	aa	02h59m26s	+60°33.7'	q 38	Cas	24"	m. buona / discreto	ci sono 2 stelle brillanti orientate da N a S attorno alle quali sono irregolarmente poste 7 componenti più deboli (anche se in realtà, a 340x, se ne contano di più); scalando a 110x si ha l'impressione di vedere 3 filari 3 filari di stelle poste a "T" coi 2 tratti perpendicolari posti secondo le direzioni cardinali; le stelline più a E non dovrebbero tuttavia appartenere all'ammasso.
Collinder 62	aa	05h22m30s	+41°00.0'	q 66	Aur	10"	ottima / buono	gruppo disperso di stelle fatto ad abete o a punta di lancia; la brillante stella bianca di 6ª centrata sull'ammasso non fa probabilmente parte dell'oggetto (presenza di chiarore lunare).
Collinder 91	aa	06h21m33s	+02°20.3'	q 319	Mon	6"	m. buona / buono	gruppo disperso di 8 stelle di cui una molto brillante verso S e alcune altre molto deboli visibili solo a 86x.
Collinder 96	aa	06h30m18s	+02°52.0'	q 319	Mom	6"	m. buona / buono	piccolo gruppo disperso di una decina di stelle di luminosità molto varia; fra queste c'è una doppia stretta verso W.
Collinder 104	aa	06h36m30s	+04°50.0'		Mon	6"	discreta / buono	nella posizione segnata si vede uno strano oggetto fusiforme allineato quasi perfettamente in direzione N-S.
Collinder 121	aa	06h56m23s	−24°43.4'		CMa	6"	m. buona / buono	gruppo molto disperso e molto esteso (Ø ~ 1°) con stelle di luminosità assai diseguale; se ne contano almeno 20 di cui 4 brillanti disposte ad arco. È una zona di maggior concentrazione in un campo già ricco di stelle; questo è l'unico criterio che permette di distinguerlo dal background.
Collinder 135	aa	07h17m20s	−36°50.0'	q 361	CMa	10"	discreta / m. buono	gruppo disperso di una 15-ina di stelle di cui 4 brillanti poste a triangolo (compresa la π Puppis di 3ª grandezza al vertice meridionale); le 2 componenti costituenti il vertice orientale sono due stelle di 5ª separate da 4' in direzione E-W — 60x.
Collinder 140	aa	07h24m23s	−31°51.8'	q 361	CMa	6"	m. buona / ottimo	gruppo molto esteso e disperso di una 15-ina di stelle di cui 8 molto brillanti con la stringa principale orientata da ENE a WSW; fra queste ultime 2 formano una coppia serrata; è facilmente visibile anche nel piccolo binocolo 7×22.
Collinder 332	aa	17h30m48s	−37°04.0'	q 376	Sco	10"	ottima / discreto	è un gruppo molto povero e disperso nel quale a 60x si contano al massimo 5 o 6 stelline.
Collinder 394	aa	18h52m20s	−20°17.5'	q 340	Sgr	10"	buona / buono	gruppo assai disperso di forma irregolare, esteso una 15-ina di primi nel quale si contano una dozzina di stelle brillanti; poco evidente sul fondo cielo anche a 60x (non è riportato sul Megastar).
Collinder 401	aa	19h38m21s	+00°20.7'	q 252	Aql	24"	m. buona / ottimo	si estende da NE a SW ed è costituito da 6 stelline di luminosità simile, fra cui una doppia stretta a SW, dominate dalla SAO 124878 di 7ª grandezza — 340x.
Collinder 427	aa	21h00m37s	+68°09.5'	q 33	Cep	24"	m. buona / ottimo	è un oggetto insignificante nel quale sono a mala pena visibili 5 o 6 stelline situate a ridosso della nebulosa NGC 7023.
Collinder 428	aa	21h03m12s	+44°35.0'	q 85	Sgr	16"	m. buona / m. buono	costituisce un addensamento del fondo stellare ed è formato da una 15-ina di componenti a basso range di luminosità che si estende a SE di una stella brillante; ha un'estensione di ~ 6' — 132x.
Collinder 463	aa	01h47m36s	+71°46.0'	q 16	Cas	6"	buona / ottimo	oggetto assai disperso, esteso 45', poco evidente nel Comet-Tracker e meglio distinguibile nel 12×50, nel quale si nota un debole "getto" di stelle oriento da N a S.
Collinder 465	aa	07h07m00s	−10°34.0'	q 273	Mon	6"	m. buona / scarso	chiazza luminescente, debole, di aspetto granulato, facilmente riconoscibile a 30x ed estesa sì e no una decina di primi; è riportata sull'Uranometria subito a N di Collinder 466.
Collinder 466	aa	07h06m56s	−10°42.9'	q 273	Mon	24"	buona / buono	si presenta irregolarmente allungato da N a S con dimensioni grosso modo 5'×3' ed è costituito da una 15-ina di stelle piuttosto deboli; c'è una coppia stretta relativamente brillante verso il centro; un filare leggermente arcuato di 6 stelline di diparte da NW e si dirige verso N — 110x.
Conus	nebo	05h41m15s	+09°23.0'	q 183	Mon	24"	m. buona / ottimo	è visibile in condizioni di buona trasparenza, anche se continuo a prediligere l'osservazione senza filtro in quanto appare più distintamente la tenue nebulosità circostante con la quale contrasta debolmente; a 210x si nota un'ampia zona più scura di forma grosso modo triangolare, orientata da N a S ed estesa 5' o 6' che sembra divergere dalla SAO 114264 di 7ª grandezza; un tenue nodulo appena percettibile si trova all'estremità settentrionale della formazione scura.
Czernik 13	aa	02h44m27s	+62°19.5'	q 17	Cas	10"	buona / discreto	gruppo povero e disperso di una decina di stelle molto deboli sparse su un'area di ~ 10' quadrati (le dimensioni lineari sono poco più di 3') e di forma irregolare; c'è una stella brillante poco più a S.
Czernik 18	aa	04h27m48s	+30°57.0'		Tau	16"	buona / m. buono	gruppo irregolare e abbastanza povero di una 20-ina di stelle le più brillanti delle quali formano una sorta di "M" schiacciata; le stelle sono disperse su un Ø di 7' od 8'; la visione è più interessante a 132x. Avevo osservato l'oggetto per cercare di individuare UGC 3050 che però non sono riuscito a vedere; a 40" SW dalla posizione indicata c'è invece una debolissima stella doppia che in visione distolta dà effettivamente l'impressione di un oggetto diffuso — 270x.
Czernik 19	aa	04h56m56s	+28°47.6'	q 96	Aur	16"	m. buona / m. buono	anche ad appena 100x è praticamente indistinguibile dalle stelle di campo; spicca un piccolo triangolo isoscele col vertice più acuto che punta a SW.
Czernik 20	aa	05h20m06s	+39°28.0'	q 66	Aur	10"	ottima / discreto	gruppo esteso una 15-ina di primi e praticamente indistinguibile dal background stellare, la cui propaggine meridionale è costituita dall'ammasso NGC 1857.
Czernik 29	aa	07h28m24s	−15°23.7'	q 274	CMa	24"	m. buona / ottimo	gruppo di forma irregolare contenente una 15-ina di stelle, le cui 9 principali formano un "3"; l'ammasso non è tuttavia ben definito sul fondo cielo — 450x.
Czernik 40	aa	19h32m39s	+21°09.2'		Vul	24"	m. buona / buono	gruppo disperso e alquanto insignificante di stelle piuttosto deboli; salta all'occhio una conformazione triangolare, col vertice più acuto che punta a N, costituito da 8 o 9 componenti; una di queste, poco a S del vertice più acuto è in realtà un piccolo raggruppamento serrato di 4 stelline che si fatica a risolvere a 400x; un piccolo asterismo di 6 stelline fatto a "T" è situato subito a NE e sembra puntare verso l'ammasso (non riportato sull'Uranometria).
Czernik 43	aa	23h25m48s	+61°18.0'	q 15	Cas	6"	buona / ottimo	gruppo disperso di una 15-ina di stelle le più brillanti delle quali sembrano poste a ventaglio; le dimensioni sono di poco inferiori a quelle del vicino M52 situato a 15 NNW.
Dolidze 13	aa	00h50m00s	+64°08.0'	q 16	Cas	10"	m. buona / buono	è un gruppo disperso non molto esteso di una 20-ina di stelle piuttosto deboli.
Dolidze 14	aa	04h06m41s	+27°34.2'	q 133	Tau	24"	buona / buono	già osservabile nel cercatore 12x60 come un piccolo gruppo serrato di 4 stelline fatto a "L", la più brillante delle quali è la 41 Tauri di 5ª grandezza; a 200x si contano una 15-ina di stelle di luminosità molto varia su un'area estesa una dozzina di primi; fra queste ne spiccano 3 brillanti allineate da E a W; le 2 più occidentali sono distanti un paio di primi e mostrano chiaramente una differenza di tonalità: quella a W è bianca, mentre quella a E è dorata. Se consideriamo queste 2 stelle come l'ipotenusa di un piccolo triangolo rettangolo isoscele, al vertice rettangolo appare a tratti, seppur elusivamente, un piccolo oggetto sfocato non più esteso di 10": da un controllo effettuato successivamente è risultato essere la PGC 1811119 (vedi) — 570x.
Dolidze 16	aa	05h14m36s	+32°43.0'	q 97	Aur	24"	m. buona / m. buono	gruppo molto disperso e di aspetto insignificante formato da una dozzina di stelle di cui 6 o 7 brillanti; è disperso su un'area estesa oltre 10'; verso il margine NW si trovano tre galassiette fantasma, la prima delle quali è MCG+5-13-1 (v. voce corrispondente) — 210x.
Dolidze 17	aa	05h22m15s	+07°06.0'	q 180	Ori	10"	ottima / buono	è sostanzialmente costituito da quel piccolo raggruppamento apparentemente casuale di 5 stelle brillanti riportate al q 180 dell'Uranometria.
Dolidze 19	aa	05h23m42s	+08°10.0'	q 180	Ori	10"	ottima / buono	gruppo irregolare formato da una decina di stelle brillanti disposte da E a W su un'estensione di oltre 20'.
Dolidze 21	aa	05h27m24s	+07°04.0'	q 180	Ori	10"	m. buona / buono	gruppo molto disperso di una 15-ina di stelle ed esteso una decina di primi; altresì noto come Collinder 458.
Dolidze 22	aa	06h23m18s	+04°39.0'	q 227	Mon	6"	m. buona / buono	è un piccolo gruppo insignificante nel quale si contano 5 stelle di cui 3 brillanti (esclusa la 8 Mon).
Dolidze 23	aa	06h43m06s	+00°00.0'	q 227	Mon	6"	m. buona / buono	altro gruppo disperso di una decina di stelle di luminosità assai diseguale di cui 2 brillanti disposte all'incirca da N a S.
Dolidze 26	aa	07h30m02s	+11°57.0'	q 184	CMi	24"	m. buona / buono	gruppo molto disperso e irregolare dominato dalla brillante SAO 96952, arancione di magnitudo 4.5 e situata verso NW, nonché da un'altra stella di 9ª situata una decina di primi a SSE; tra queste 2 s'incunea una sorta di freccia ricurva che punta a WSW; a E della 2ª stella c'è un gruppetto relativamente serrato di una dozzina di componenti più deboli — 110x.
Dolidze 27	aa	16h36m30s	−08°56.0'	q 291	Oph	24"	m. buona / m. buono	gruppo disperso di una 15-ina di stelle brillanti di cui 3 molto luminose; è costituito da filari di stelle a gruppi di 2, 3 e 4 tutti allineati in direzione WNW-ESE; l'oggetto è esteso poco meno di 30' per cui è meglio scalare a 110x.
Dolidze 39	aa	20h16m12s	+37°55.6'	q 119	Cyg	10"	non registrati	ancora un gruppo disperso di una 15-ina di stelle di una dozzina di primi con Ø; 8 di queste stelle sono poste a semicerchio dalla parte NW.
Dolidze 40	aa	20h18m12s	+37°51.0'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	è un ovale irregolare di stelle le cui 10 o 12 principali sembrano sistemate lungo il perimetro, mentre la parte centrale è depleta; fra queste se ne notano 3 quasi allineate verso la 34 Cygni; non è comunque facile distinguere l'ammasso dal fondo stellare, neppure a soli 110x.
Dolidze 41	aa	20h19m12s	+37°45.0'	q 119	Cyg	10"	non registrati	un altro altro gruppo disperso di stelle relativamente brillanti che pur a ingrandimenti molto bassi (nesto usando 63) si stacca a fatica da un fondo cielo densamente popolato.
DoDz 1	aa	02h47m31s	+17°15.3'	q 130	Ari	24"	m. buona / ottimo	gruppo irregolare di una decina di stelle di cui 6 brillanti; si estende per ~ 8' in azimut e 6' in altezza; è già facilmente riconoscibile nel cercatore 12x60.
DoDz 7	aa	05h33m30s	+26°31.0'	q 202	Her	24"	buona / ottimo	è un piccolo gruppo disperso esteso una decina di primi nel quale spicca un piccolo asterismo di 6 stelle brillanti che ricordano un'incudine allungata e orientata all'incirca da N a S; una 7ª stella brillante si trova a SW dell'asterismo, ma probabilmente non ne fa parte; poco interessante a 340x.
ESO 409-1	gx	00h01m19s	−27°25.2'		Scl	24"	ottima / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da E a W con dimensioni 45"×30" — 340x.
ESO 409-3	gx	00h01m56s	−27°37.6'		Scl	24"	ottima / mediocre	relativamente facile, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 1'; c'è una stellina percettibile solo a momenti a 1' NW; quest'ultima, tuttavia, è poi risultata essere la **PGC 95489** — 340x.
ESO 410-24	gx	00h36m27s	−27°47.1'		Scl	24"	ottima / buono	debole, allungata da E a W, di dimensioni 50"×25" e con nucleo quasi stellare abbastanza evidente — 450x.
ESO 410-25	gx	00h36m37s	−27°47.3'		Scl	24"	ottima / buono	molto debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20" — 450x.
ESO 410-26	gx	00h36m42s	−27°49.1'		Scl	24"	ottima / buono	debolissima lama di luce orientata all'incirca da N a S ed estesa 1' scarso; salta fuori a momenti in visione distolta quando si osserva la gx precedente — 450x.
ESO 417-15	gx	03h05m08s	−27°20.3'		For	16"	ottima / mediocre	debole, ma relativamente facile a 380x, molto allungata da NNE a SSW con dimensioni 60"×20" e con un piccolo bulge di aspetto quasi stellare; c'è una stellina abbastanza brillante a 2' scarsi verso NW — 270x.
ESO 443-66	gx	13h06m11s	−29°43.6'		Hya	16"	buona / buono	debolissimo oggetto rotondo con Ø max di 20"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 270x.
ESO 444-31	gx	13h25m43s	−29°32.7'		Hya	16"	buona / buono	piccola ed elusiva chiazza estesa una 20-ina di secondi che appare solo a tratti in visione distolta a 270x; c'è una stellina a un paio di primi W.
ESO 445-35	gx	13h48m11s	−30°27.1'		Cen	16"	buona / buono	debolissima, poco allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; è situata all'interno di un piccolo asterismo facilmente riconoscibile — 270x.
ESO 445-44	gx	13h49m01s	−30°35.5'		Cen	16"	buona / buono	si vede facilmente, ma è molto piccola, rotonda con Ø di 20"; presenta una nucleo stellare abbastanza marcata — 270x.
ESO 445-70	gx	13h53m15s	−28°25.7'		Hya	16"	m. buona / m. buono	è un debolissimo oggetto di luminosità uniforme che in visione distolta appare a tratti orientato da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 270x.
ESO 464-16	gx	21h02m24s	−28°10.5'		Mic	24"	m. buona / discreto	debolissima lama di luce orientata da NE a SW ed estesa 1' scarso; è visibile in visione distolta a 450x (a 340x è di aspetto più confuso) a 1' SE di una stellina brillante.
ESO 471-18	gx	23h47m35s	−27°29.2'		Scl	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; è situata tra due stelline: una a 1.5' W e l'altra più debole alla stessa distanza dalla parte opposta — 340x.
ESO 471-24	gx	23h49m51s	−27°57.0'		Scl	24"	ottima / mediocre	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 60"×15"; c'è una stellina a ridosso N e un'altra più debole a 1' verso W — 340x.
ESO 472-6	gx	23h54m04s	−25°27.3'		Scl	24"	ottima / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" — 340x.
ESO 472-10	gx	23h55m15s	−23°50.0'		Aqr	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 90"×30"; c'è una stellina al bordo NE — 340x.
ESO 472-18	gx	00h12m14s	−27°11.3'		Scl	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità pressoché uniforme,in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso S — 340x.
ESO 473-2	gx	00h14m55s	−24°05.6'		Cet	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 340x.
ESO 473-4	gx	00h15m08s	−24°02.7'		Cet	24"	ottima / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30" — 340x.
ESO 473-5	gx	00h15m11s	−23°52.9'		Cet	24"	ottima / mediocre	è un debolissimo lucore di forma indistinta, che in visione distolta aggetta a a NE di una stella brillante (la SAO 166147 di magnitudo 9.5) — 340x.
ESO 473-6	gx	00h15m22s	−24°03.6'		Cet	24"	ottima / mediocre	molto debole, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con tenue bulge appena percettibile (tra questa gx e la ESO 473-4 c'è una debole stellina) — 340x.
ESO 473-12	gx	00h19m14s	−22°46.8'		Cet	24"	m. buona / scarso	debole, poco diffusa e appena più brillante verso l'interno, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina appena percettibile subito a NE — 340x.
ESO 473-14	gx	00h19m22s	−22°44.8'		Cet	24"	m. buona / scarso	debolissima, appare in visione distolta quando si osserva la precedente; solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15" — 340x.
ESO 473-16	gx	00h20m42s	−23°17.0'		Cet	24"	m. buona / scarso	relativamente facile, diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a ridosso W — 340x.
ESO 473-25	gx	00h31m49s	−26°43.2'		Scl	24"	m. buona / scarso	è una lama di luce molto debole estesa almeno 1' in direzione E-W e che sembra aggettare a W di una stellina abbastanza brillante — 340x.
ESO 474-26	gx	00h47m08s	−24°22.2'		Cet	24"	m. buona / scarso	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 45"; c'è una stellina percettibile solo a momenti quasi a ridosso verso W — 340x.
ESO 479-2	gx	02h25m58s	−24°42.5'		For	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una coppia di stelline a 2' N — 450x.
ESO 481-4	gx	03h11m10s	−25°19.2'		For	24"	discreta / mediocre	assieme alla successiva, situata una dozzina di primi a N, forma una coppia di gx di aspetto simile, molto deboli, diffuse e di luminosità uniforme, orientate da ENE a WSW con dimensioni grosso modo di 40"×20" — 340x.
ESO 481-5	gx	03h11m19s	−25°06.5'		For	24"	discreta / mediocre	v. **ESO 481-4**
ESO 481-17	gx	03h17m04s	−22°51.9'		Eri	24"	discreta / mediocre	relativamente facile, molto diffusa e con basso gradiente di luce, rotonda con Ø di 80" — 340x.
ESO 481-22	gx	03h20m40s	−22°55.9'		Eri	24"	discreta / mediocre	debole e diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e appena più brillante all'interno; c'è una stellina a 1.5' SE e una a 2.5' SW — 450x.
ESO 484-26	gx	04h29m42s	−26°46.3'		Eri	16"	m. buona / discreto	appare solo a momenti in visione distolta come una debolissima lama di luce estesa per oltre 1' in direzione NW-SE — 270x.
ESO 484-28	gx	04h30m00s	−26°50.2'		Eri	16"	m. buona / discreto	debole, rotonda, relativamente compatta con Ø di 20"; forma un piccolo arco con due stelline situate a S — 270x.
ESO 489-28	gx	06h16m06s	−26°48.3'		CMa	16"	m. buona / discreto	piccolo oggetto debole e diffuso, esteso una 30-ina di secondi che appare con relativa facilità in visione distolta — 270x.
ESO 490-37	gx	06h44m22s	−26°06.5'		CMa	24"	m. buona / discreto	facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 60"×45"; c'è una stellina evidente a ridosso S e un'altra debole subito a SW — 340x (non è stranamente riportata sull'Uranometria).
ESO 495-1	gx	08h18m30s	−25°24.7'		Pup	16"	ottima / discreto	molto debole, osservabile in visione distolta ed estesa per una 30-ina di secondi — 270x.
ESO 495-17	gx	08h32m58s	−22°54.1'		Pyx	24"	buona / ottimo	è una galassietta elusiva che salta fuori in visione distolta a 450x; è molto disturbata dalla SAO 176054 di magnitudo 8.5 ad appena 1' NW; solo a momenti appare orientata grosso modo come NGC 2613 — situata 7' a SE — e con dimensioni 30"×20"; allineata ed equidistante con 2 stelline a E.
ESO 499-32	gx	09h59m29s	−26°51.9'		Hya	24"	buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NNW a SSE con dimensioni 90"×45"; c'è una stella brillante a un paio di primi verso NW; poco meglio contrastata scalando a 340x.
ESO 508-10	gx	13h07m38s	−23°34.8'		Hya	16"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta spostando leggermente il telescopio, ma bisogna cercare di tenere fuori campo una stella luminosa che brilla 7' verso E — 270x.
ESO 514-3	gx	15h18m36s	−24°07.2'		Lib	16"	m. buona / m. buono	è la più debole di un terzetto (di cui fanno parte NGC 5898 ed NGC 5903), allungata da NW a SE, dimensioni 40"×20" e con nucleo brillante quasi stellare — 270x.
ESO 537-5	gx	23h45m16s	−25°50.1'		Scl	24"	ottima / mediocre	molto debole e diffusa, in visione distolta è poco allungata da N a S, di dimensioni 40"×30" e con piccolo nucleo abbastanza evidente; una debolissima stellina appena sfuocata appare a momenti a 1.5' verso NW, ma si tratta in realtà di **MAC 2345-2549** — 340x.
ESO 538-10	gx	23h57m40s	−21°34.7'		Cet	24"	ottima / mediocre	debole e poco diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e appena più brillante all'interno; una stellina molto debole appare a 1' SE, ma questa è in realtà la **2MASS 23574356-2135208** — 340x.
ESO 539-2	gx	00h14m05s	−19°39.7'		Cet	24"	ottima / mediocre	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 340x.
ESO 539-3	gx	00h14m27s	−19°41.3'		Cet	24"	ottima / mediocre	è un elusivo baffo di luce orientato da NE a SW ed esteso 1' scarso; appare in visione distolta, ma in questo caso è meglio spingere a 450x.
ESO 539-5	gx	00h17m10s	−19°18.0'		Cet	24"	m. buona / scarso	facile, diffusa, poco allungata da NE a SW, di dimensioni 80"×60" e con basso gradiente di luce; c'è un asterismo di 5 stelle (di cui 3 brillanti) subito a E della gx — 340x.
ESO 540-1	gx	00h37m13s	−21°26.3'		Cet	24"	buona / buono	fa parte di un gruppo abbastanza compatto di 5 elementi — relativamente facile, molto diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; il bulge centrale appare poco allungato da NW a SE con dimensioni 30"×20"; un nucleo stellare è visibile a tratti. Altresì denominata Hickson 4A — 340x.
ESO 540-2	gx	00h34m14s	−21°28.2'		Cet	24"	buona / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15". Altresì denominata **Hickson 4B** — 340x.
ESO 540-3	gx	00h35m40s	−20°07.5'		Cet	24"	ottima / buono	molto diffusa, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 80"×30", con tenue bulge poco contrastato, ma abbastanza evidente; è un po' disturbata da una stellina brillante al bordo W — 450x.
ESO 540-5	gx	00h37m09s	−17°57.6'		Cet	24"	m. buona / m. buono	è una debolissima lama di luce relativamente compatta, e di luminosità uniforme orientata da NW a SE ed estesa ~ 1' che in visione distolta sembra aggettare a SE di una stellina — 450x.
ESO 540-9	gx	00h39m21s	−18°55.0'		Cet	24"	m. buona / scarso	debole, molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, allungata da N a S con dimensioni 45"×30" — 340x.
ESO 540-16	gx	00h42m15s	−18°09.6'		Cet	24"	m. buona / scarso	è una debole lama di luce estesa un paio di primi in direzione E-W con un bulge abbastanza brillante e diffuso — 340x.
ESO 540-19	gx	00h45m58s	−20°36.5'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza diffusa di luminosità uniforme ed estesa forse una 40-ina di secondi, visibile a tratti a 270x (a 380x tende a stemperarsi eccessivamente sul fondo cielo).
ESO 540-23	gx	00h47m35s	−20°25.7'		Cet	16"	m. buona / m. buono	molto debole e molto allungata all'incirca da N a S con dimensioni 60"×20" e di luminosità uniforme; meglio osservabile a 380x; c'è una stellina subito a N.
ESO 540-25	gx	00h47m38s	−20°31.1'		Cet	16"	m. buona / m. buono	debolissima, ma poco più evidente di ESO 540-19 e meno diffusa, rotonda con Ø di 35"-40" e di luminosità uniforme; meglio visibile a 380x.
ESO 540-27	gx	00h47m41s	−21°29.5'		Cet	24"	m. buona / scarso	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a 1' W — 340x.
ESO 541-25	gx	01h12m32s	−17°27.6'		Cet	24"	buona / scarso	debolissima chiazza circolare con Ø di una 40-ina di secondi e una tenue condensazione centrale visibile solo a momenti; c'è una stellina a 1.5' verso SE — 340x.
ESO 545-28	gx	02h31m26s	−17°39.2'		Cet	24"	buona / mediocre	diffusa e con tenue condensazione centrale, approssim. rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso NNE — meglio definita scalando a 340x.
ESO 545-33	gx	02h56m12s	−19°39.1'		Eri	24"	discreta / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20" — 340x.
ESO 545-38	gx	02h36m04s	−17°15.9'		Cet	24"	buona / mediocre	debole, molto diffusa, con piccola e tenue condensazione centrale, poco allungata da N a S con dimensioni 40"×30" — 340x.
ESO 546-5	gx	02h53m25s	−17°36.1'		Cet	24"	m. buona / mediocre	molto debole, diffusa e di aspetto confuso, con nucleo stellare evidente, a momenti appare orientata da E a W con dimensioni 30"×20"; meglio a 450x.
ESO 546-20	gx	02h47m24s	−22°16.0'		Eri	16"	ottima / mediocre	debolissima, ma si riesce a vedere, sia pur a tratti, in visione distolta, piccola con Ø di 20"-25" — 270x.
ESO 546-28	gx	02h53m25s	−17°36.1'		Eri	24"	buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×20" — 450x.
ESO 547-11	gx	03h09m30s	−17°25.0'		Eri	24"	buona / buono	elusiva chiazza di forma indistinta situata a ridosso S di una debole stellina; appare solo a momenti in visione distolta, ma è meglio scalare a 340x.
ESO 547-20	gx	03h12m58s	−17°55.8'		Eri	24"	m. buona / scarso	è una debolissima chiazza di forma indistinta, estesa 1' scarso, ma appare con una certa difficoltà in visione distolta a 340x.
ESO 547-33	gx	03h20m53s	−17°53.2'		Eri	24"	buona / buono	debolissima chiazza diffusa grosso modo circolare con Ø di una 40-ina di secondi; situata a ridosso S di un piccolo asterismo di 4 stelline orientato da E a W; non ho notato miglioramenti scalando a 340x.
ESO 548-12	gx	03h25m21s	−17°40.3'		Eri	16"	buona / ottimo	debolissima, appare solo a tratti in visione distolta allungata da NW a SE per 45"; è disturbata dalla luce di una stella di 8ª che si trova 3' SE — 270x.
ESO 548-14	gx	03h26m00s	−17°39.5'		Eri	16"	buona / ottimo	è un debole baffo esteso per ~ 1' in direzione E-W, molto offuscato dalla luce di una stellina praticamente sovrapposta al centro — 270x.
ESO 548-28	gx	03h30m36s	−17°56.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina a 1' verso NE e un'altra appena percettibile a 2' NW; meglio contrastata scalando a 340x.
ESO 548-36	gx	03h33m27s	−21°33.9'		Eri	16"	ottima / mediocre	facile, rotonda, abbastanza compatta, con Ø di 40"; c'è una stellina a 1.5' verso N; è immersa nei bagliori della Tau-5 Eridani di 4ª grandezza dalla quale dista 6' a NW — 270x.
ESO 548-40	gx	03h33m51s	−21°27.3'		Eri	16"	ottima / mediocre	appare debolissima e diffusa, estesa non più di 40"; è disturbata dalla luce della Tau5 Eri che brilla a una decina di primi verso S — 270x.
ESO 548-75	gx	03h41m23s	−17°45.5'		Eri	24"	m. buona / discreto	relativamente facile, ma con gradiente di luce molto basso, diffusa, rotonda con Ø di 1' — 450x.

ESO 549-30	gx	03h53m54s	−17°35.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 50"×25" c'è una stellina a ridosso SE (fa parte di un asterismo di 4 stelle che ricorda la pausa musicale di 1/8) — 450x.
ESO 549-36	gx	03h55m09s	−17°28.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S, di dimensioni 50"×40" e con nucleo stellare 450x.
ESO 549-53	gx	04h04m30s	−17°54.2'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da NW a SE con dimensioni di 30"×10" (ossia poco inferiori a quelle di ESO 550-2 osservata per prima) — 450x.
ESO 550-2	gx	04h03m30s	−17°59.1'		Eri	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 45"×15" e con tenue nucleo stellare abbastanza evidente — 450x.
ESO 550-20	gx	04h19m22s	−17°36.8'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x.
ESO 551-15	gx	04h34m26s	−17°59.0'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima e disturbata da una stellina brillante situata 1' a N; appare con difficoltà in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; è una sorta di elusivo baffo di luce orientato da NE a SW ed esteso una 40-ina di secondi.
ESO 551-30	gx	04h42m27s	−17°27.3'		Eri	24"	m. buona / discreto	è debolissima, ma appare senza problemi in visione distolta a 340x, approssim. circolare con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso SW.
ESO 552-4	gx	04h47m31s	−17°35.9'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di ~ 45"; c'è una stellina al bordo NE e un'altra più brillante a 1' SSW — 340x.
ESO 552-5	gx	04h47m38s	−17°26.0'		Eri	24"	ottima / ottimo	facile, poco diffusa e con condensazione centrale evidente, rotonda con Ø poco superiore a 30" — 450x.
ESO 552-18	gx	04h53m09s	−17°42.4'		Eri	24"	m. buona / discreto	debolissima, salta fuori in visione distolta subito a W di una debole stellina, ma non bisogna scendere sotto i 450x; a tratti appare allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 40"×20"; 4 stelle brillanti a S della galassia formano un ampio asterismo foggiato a "y" orientato da NW a SE.
ESO 552-19	gx	04h53m34s	−17°55.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; una debole stellina sfuocata situata a ridosso E è risultata essere MCG-3-13-21 — 450x.
ESO 552-24	gx	04h56m15s	−17°25.5'		Lep	24"	m. buona / discreto	debolissima chiazza assai stemperata sul fondo cielo, approssim. rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
ESO 552-25	gx	04h56m19s	−17°59.8'		Lep	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da NE a SW con dimensioni 45"×15"; ci sono due stelline appena percettibili a NE e SE — 450x.
ESO 552-27	gx	04h56m30s	−17°40.1'		Eri	24"	m. buona / discreto	debole, ma relativamente compatta, con condensazione centrale appena percettibile, rotonda con Ø di 30" o poco più — 450x.
ESO 552-42	gx	04h59m33s	−17°27.4'		Lep	24"	ottima / ottimo	fa parte assieme a ESO 552-45 ed ESO 552-47 di un terzetto di oggetti quasi allineati in direzione E-W — poco diffusa e appena più brillante all'interno, allungata da E a W con dimensioni 45"×30"; c'è una stellina a ridosso SW (che in realtà è doppia, in quanto presenta una compagna molto debole più a SW) — 450x.
ESO 552-45	gx	04h59m59s	−17°27.6'		Lep	24"	ottima / ottimo	fa parte assieme a ESO 552-42 ed ESO 552-47 di un terzetto di oggetti quasi allineati in direzione E-W — diffusa, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 60"×30"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso verso E — 450x.
ESO 552-47	gx	05h00m29s	−17°26.0'		Lep	24"	ottima / ottimo	fa parte assieme a ESO 552-42 ed ESO 552-45 di un terzetto di oggetti quasi allineati in direzione E-W — debole e molto diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
ESO 553-2	gx	05h06m33s	−17°35.1'		Lep	16"	m. buona / ottimo	è un ovale relativamente brillante con marcata condensazione centrale, diffuso, orientato da NE a SW e di dimensioni 60"×40" — 270x.
ESO 553-3	gx	05h06m38s	−17°33.2'		Lep	16"	m. buona / ottimo	più debole di ESO 553-2 e più diffusa; in visione distolta appare allungata da NW a SE, di dimensioni ~ 2'×1' e con bassissimo gradiente; è situata un paio di primi NE di ESO 553-2 — 270x.
ESO 553-13	gx	05h09m08s	−17°48.9'		Lep	24"	m. buona / buono	debole lama di luce relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da N a S ed estesa 1' scarso; c'è una stellina brillante a 1' S — 450x.
ESO 553-21	gx	05h11m46s	−17°50.3'		Lep	24"	m. buona / buono	debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20" — 450x.
ESO 553-27	gx	05h13m35s	−14°38.9'		Lep	24"	m. buona / buono	debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una coppia stretta di deboli stelline a ridosso S — 450x.
ESO 553-32	gx	05h18m53s	−17°31.0'		Lep	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 40"×20"; la visione è disturbata dalla SAO 150325 di 8ª grandezza situata 4' scarsi a SSW — 450x.
ESO 554-12	gx	05h34m49s	−17°51.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 45"×30"; oltre tutto è anche un poco disturbata da una stellina abbastanza brillante situata a ridosso verso W — 450x.
ESO 554-16	gx	05h35m49s	−17°46.7'		Lep	24"	m. buona / m. buono	anche questa è debolissima, diffusa, forse rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; meglio contrastata scalando a 340x; c'è una debole stellina a ridosso W; altresì allineata con 2 stelline a NNW: quella più vicina alla gx è più brillante.
ESO 555-24	gx	06h01m55s	−17°56.5'		Lep	24"	m. buona / m. buono	debole, e molto diffusa, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi e un tenue nucleo quasi stellare; ci sono 2 stelline di luminosità simile a ridosso N ed E — 450x.
ESO 555-25	gx	06h01m58s	−17°52.6'		Lep	24"	m. buona / m. buono	poco più debole della precedente, dalla quale dista 4' scarsi verso N; è allungata da E a W con dimensioni 40"×20" — 450x.
ESO 561-20	gx	08h09m42s	−17°45.1'		Lep	24"	ottima / ottimo	debolissima e di luminosità uniforme, disturbata dalle numerose stelle di campo, alcune delle quali molto brillanti; è approssim. rotonda con Ø < 40"; c'è una debole stellina a ridosso verso SE e un'altra appena percettibile al bordo NW — 450x.
ESO 563-31	gx	08h52m18s	−17°44.6'		Hya	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da NW a SE con dimensioni 50"×40"; c'è una stellina abbastanza brillante al bordo SW — 450x.
ESO 566-4	gx	09h44m06s	−21°17.2'		Hya	24"	buona / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 60"×20"; c'è una stellina a ridosso verso E — 450x.
ESO 566-25	gx	09h53m43s	−18°39.8'		Hya	24"	buona / buono	debolissima chiazza di forma indistinta osservabile elusivamente in visione distolta; estesa forse attorno a 1'; nonostante sia così spampanata appare solo a 450x.
ESO 566-28	gx	09h55m02s	−18°43.9'		Hya	24"	buona / buono	altra gx debolissima che appare solo in visione distolta, ma occorre spingere a 450x; solo a momenti appare orientata da N a S ed estesa per una 40-ina di secondi.
ESO 567-12	gx	10h05m26s	−17°48.0'		Hya	24"	m. buona / mediocre	debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 50"×25" — 450x.
ESO 567-46	gx	10h19m08s	−17°55.9'		Hya	24"	m. buona / buono	debolissima, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina subito a N — 450x.
ESO 568-14	gx	10h31m39s	−17°51.1'		Hya	24"	mediocre / ottimo	debolissima, in visione distolta appare orientata da WNW a ESE (ossia poco ruotata in senso antiorario rispetto alla congiungente di 2 stelline a SE con le quali è allineata ed equidistante), con dimensioni 40"×20" — 450x.
ESO 571-12	gx	11h38m58s	−17°58.1'		Crv	24"	m. buona / buono	poco diffusa, allungata da NW a SE con dimensioni 60"×30" e gradatamente più brillante verso l'interno; quasi allineata ed equidistante con 2 stelle brillanti a N — 450x.
ESO 572-23	gx	11h56m58s	−19°51.3'		Crv	24"	buona / mediocre	facile, relativamente brillante, rotonda con Ø di 1' e gradatamente più brillante verso l'interno; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso verso SW — 340x.
ESO 572-24	gx	11h57m00s	−19°59.2'		Crv	24"	buona / mediocre	debolissima, appare in visione distolta a 340x, solo a momenti molto allungata da E a W con dimensioni grosso modo 45"×15".
ESO 573-13	gx	12h21m14s	−17°56.4'		Crv	24"	m. buona / m. buono	debole e diffusa, molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×20" e con tenue condensazione centrale debolmente contrastata; c'è una stellina brillante a 1' NW — 450x.
ESO 573-15	gx	12h22m16s	−17°59.5'		Crv	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 45"×30" — 450x.
ESO 578-29	gx	14h09m27s	−17°51.8'		Vir	24"	m. buona / mediocre	poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e tenue nucleo quasi stellare; c'è una stellina quasi a ridosso verso NE — 450x.
ESO 578-32	gx	14h10m15s	−17°50.2'		Vir	24"	m. buona / mediocre	molto debole, ma in visione distolta appare distintamente molto allungata da E a W, di dimensioni 60"×15" e con nucleo stellare appena percettibile — 450x.
ESO 595-15	gx	20h08m16s	−17°39.6'		Cap	24"	buona / discreto	appare elusivamente a ridosso SW di una debole stellina; è molto spampanata e non se ne capisce la forma, ma non dovrebbe essere più estesa di 40"-45"; meglio scalare a 340x, anche se il fondo cielo è palesemente più chiaro.
ESO 606-8	gx	23h47m32s	−18°33.4'		Aqr	24"	ottima / mediocre	debolissimo lucore indistinto esteso per una 40-ina di secondi e situata a ridosso S di una stellina — 340x.
ESO 606-11	gx	23h49m01s	−19°41.6'		Aqr	24"	ottima / mediocre	debole e molto diffusa, rotonda con Ø di 45"; c'è una debole stellina a 1' NW e una molto brillante a 2.5' verso S — 340x.
Eridanus Cluster	ag	04h24m44s	−21°11.2'		Eri	24"	buona / buono	è una debolissima chiazza di forma indistinta estesa una 40-ina di secondi; appare in visione distolta in mezzo a due deboli stelline distanti un paio di primi in direzione E-W; solo a momenti salta fuori una stellina appena percettibile, anche se è difficile localizzarla nella macchia; la visione è inoltre un po' compromessa dalla SAO 169422 di 9ª grandezza situata 4' a SE; è meglio comunque non scendere sotto i 450x.
Espin 202	ss	20h02m24s	+35°18.5'		Cyg	16"	m. buona / m. buono	è un sistema multiplo costituito da una decina di componenti, la più brillante delle quali è la SAO 69299 (HD 227247) di 9ª grandezza; a 380x dà l'impressione di un piccolo ammasso aperto molto compatto.
Frolov 1	aa	23h57m26s	+61°37.4'	q 15	Cas	16"	buona / m. buono	si vede esattamente come l'avevo osservato anni prima nel 10", salvo il fatto che nel 16" a 270x appare ovviamente qualche altra stellina molto debole sempre situata sui due tratti della "V" o del "tickmark".
Frosty Leo	neb	09h39m54s	+11°58.9'		Leo	24"	m. buona / m. buono	nebulosa protoplanetaria — molto brillante e relativamente compatta, rotonda a prima vista, leggermente ovale prolungandone l'osservazione, orientata da NW a SE con dimensioni 20"×15"; appare finemente screziata a 570x.
G 1	ag	00h32m46s	+39°34.7'		And	24"	buono / discreto	in **M31** — relativamente brillante, presenta un nucleo stellare, circonfuso da un piccolo e alone del Ø di una 15-ina di secondi che lambisce 2 stelline situate simmetricamente a ridosso di NW e SW (il globulare era già stato precedentemente osservato col 16" a 380x in ottime condizioni di visibilità assieme ai seguenti dell'elenco — 450x.
G 29	ag	00h39m09s	+40°34.4'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — relativamente brillante e di aspetto quasi stellare, di luminosità simile alla stellina situata 1 a S; una stellina appena percettibile si trova subito a N — 450x.
G 33	ag	00h39m34s	+40°31.2'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole e condensato, in visione distolta appare diffuso; c'è una stellina a ridosso E — 450x.
G 35	ag	00h39m40s	+40°56.9'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — molto debole, di aspetto quasi stellare; c'è una stellina a 1' W — 450x.
G 52	ag	00h40m20s	+40°44.0'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole e appena nebuloso, allineata ed equidistante con 2 stelline abbastanza brillanti a SSW — 450x.
G 58	ag	00h40m27s	+41°27.5'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — molto debole, poco diffuso e condensato, di aspetto quasi stellare — 450x.
G 64	ag	00h40m32s	+41°21.7'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — abbastanza evidente, poco diffuso e condensato — 450x.
G 70	ag	00h40m48s	+41°12.1'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — molto debole, appare tra una stellina brillante a NE e una debole dalla parte opposta — 450x.
G 72	ag	00h40m52s	+41°18.9'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — relativamente brillante e di aspetto stellare — 450x.
G 73	ag	00h40m55s	+41°41.4'		And	24"	m. buona / ottimo	in **NGC 205** — relativamente facile, poco diffuso e condensato; c'è una stellina brillante a 1' SSW — 450x.
G 76	ag	00h41m00s	+40°35.8'		And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — quasi stellare; è appena più diffuso della stellina di egual magnitudo situata 25" SE — 380x.
G 78	ag	00h41m01s	+41°13.8'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — brillante, è un dischetto compatto e condensato con Ø di una dozzina di primi — 450x.
G 87	ag	00h41m15s	+40°55.8'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole, diffuso e a tratti condensato — 450x.
G 96	ag	00h41m28s	+40°53.8'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — relativamente facile, palesemente diffuso con Ø di una decina di secondi — 450x.
G 101	ag	00h41m38s	+41°20.8'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — molto debole e leggermente diffuso — 450x.
G 108	ag	00h41m43s	+41°34.3'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — molto debole, appare poco diffuso in visione distolta — 450x.
G 119	ag	00h41m54s	+40°47.2'		And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — debole, ma relativamente facile, compatto con Ø di 5" — 380x.
G 124	ag	00h42m01s	+41°29.1'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — molto debole e di aspetto stellare — 450x.
G 130	ag	00h42m03s	+40°58.8'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — appare elusivamente e solo a tratti a 1' SW del successivo — 450x.
G 134	ag	00h42m07s	+40°59.4'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole e di aspetto stellare; c'è una stellina di luminosità grosso modo simile subito a S — 450x.
G 144	ag	00h42m16s	+41°01.2'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole, diffuso in visione distolta, con una stellina a ridosso N — 450x.
G 150	ag	00h42m21s	+41°32.2'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole, poco diffuso e condensato (situata quasi nel mezzo di 2 stelle brillanti orientate da E a W e distanti 3') — 450x.
G 156	ag	00h42m25s	+40°57.3'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole, diffuso e condensato, situato in mezzo a 2 debole stelline orientate da NE a SW e distanti 1.5'; una stella brillante si trova a 1' verso E — 450x.
G 172	ag	00h42m33s	+41°03.5'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole, di aspetto stellare; forma un minuscolo triangolo con 2 stelline a W e SW — 450x.
G 213	ag	00h43m15s	+41°07.4'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — relativamente brillante, compatto e condensato; c'è una stellina brillante a 1' verso E — 450x.
G 222	ag	00h43m26s	+41°15.6'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole, diffuso e immerso nell'alone della galassia; allineata ed equidistante con 2 stelline a NW — 450x.
G 226	ag				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — di luminosità simile a G 244, ma leggermente più nebuloso — 380x.
G 229	ag	00h43m31s	+41°21.4'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — di aspetto quasi stellare (immerso nel disco della galassia che tende a smorzarne il contrasto) — 450x.
G 231	ag	00h43m32s	+41°07.8'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — situato 1' a NE del successivo — molto debole, in visione distolta appare appena diffuso; poco disturbato da una stellina brillante a poco più di 1' verso N — 450x.
G 233	ag	00h43m37s	+41°08.3'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — diffuso e condensato; c'è una stellina brillante a 1' NW — 450x.
G 244	ag	00h43m45s	+41°37.0'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — debole, diffuso e poco condensato, in visione distolta appare con un Ø di una 15-ina di secondi; ci sono 3 stelline allineate 1' a N e orientate da NE a SW — 450x.
G 254	ag				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — molto debole, visibile a tratti, di aspetto stellare — 380x.
G 256	ag	00h43m58s	+41°24.6'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — molto debole e poco diffuso in visione distolta — 450x.
G 257	ag	00h44m00s	+41°30.3'		And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — abbastanza facile, non proprio puntiforme — 380x.
G 272	ag	00h44m14s	+41°19.3'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — relativamente brillante, diffuso con Ø di una decina di secondi — 450x.
G 279	ag	00h44m27s	+41°28.8'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — molto debole e diffuso, con Ø di 12"-15", situato in mezzo a due stelline abbastanza brillanti — 450x.
G 280	ag	00h44m29s	+41°21.6'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — abbastanza brillante e di aspetto stellare: c'è una stellina della stessa luminosità a 1' scarso SE; un oggetto diffuso grosso modo rotondo con Ø di una 30-ina di secondi si trova a 1' SW: dovrebbe trattarsi o di un'associazione stellare, o di una regione H II — 450x.
G 286	ag				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — molto debole, visibile a tratti, di aspetto stellare — 380x.
G 287	ag				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — debolissimo, poco diffuso, con Ø di una decina di secondi — 380x.
G 289	ag	00h44m46s	+41°17.1'		And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — facile, brillante, ma indistinguibile da una stella (ma sarà davvero un ammasso globulare?) — 380x.
G 295	ag	00h44m52s	+41°25.1'		And	24"	m. buona / ottimo	in **M31** — anche a 580x appare solo come una stellina molto brillante.
G 302	ag				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — compatto, con Ø di 5" o 6" senza condensazione; c'è una stellina a una 40-ina di secondi verso E — 380x.
G 305	ag				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — molto debole e diffuso, con Ø di almeno 15" o 20"; c'è una stellina a ~ 1' verso SE — 380x.
G 315	ag				And	16"	ottima / ottimo	in **M31** — molto debole e poco diffuso, con Ø max di 10" — 380x.
Haffner 6	aa	07h20m01s	−13°09.5'	q 274	CMa	24"	m. buona / ottimo	piccolo gruppo abbastanza insignificante di una decina di stelline, 9 delle quali ricordano un cuore — 450x.
Haffner 8	aa	07h23m03s	−12°17.8'	q 274	CMa	10"	discreta / ottimo	oggetto peculiare, fatto a settore circolare di ampiezza pari a 30° circa, orientato da N a S ed esteso 4', con 2 stelle abbastanza brillanti distanti una 40-ina di secondi e situate verso il vertice acuto dello spicchio.
Haffner 10	aa	07h28m36s	−15°21.9'	q 274	Pup	24"	m. buona / ottimo	piccolo gruppo di deboli stelline, non completamente risolto neppure a 450x; se ne contano 6 o 7 su un'area circolare estesa 1.5'; visualmente costituisce la propaggine NE di Czernik 29.
Haffner 13	aa	07h40m26s	−30°04.8'	q 362	Pup	6"	m. buona / buono	gruppo assai disperso di una dozzina di stelle di cui 4 molto brillanti disposte grosso modo da NE a SW.
Haffner 16	aa	07h50m21s	−25°27.1'	q 320	Pup	6"	m. buona / ottimo	debole, rimane un piccolo oggetto nebuloso anche a 86x, salvo una stellina brillante decentrata verso W.
Haffner 18	aa	07h52m44s	−26°22.7'		Pup	24"	m. buona / ottimo	costituisce una sorta di vago addensamento nella parte NE di NGC 2467; è formato da una dozzina di stelle distribuite in maniera disomogenea; fra queste spicca, verso SW, una stringa di 4 componenti estesa 3' e orientata da NW a SE; la componente più a SW, situata praticamente al bordo meridionale dell'ammasso, presenta un piccolo aggetto di una 30-ina di secondi verso NW: si tratta di un addensamento della nebulosa SH2-311 che si trova subito a SW — 450x.
Haffner 19	aa	07h52m46s	−26°16.7'	q 320	Pup	24"	m. buona / ottimo	si nota un piccolo asterismo formato da 4 stelline brillanti, 2 delle quali formano una coppia stretta, immerse in una chiazza lattescente molto tenue, rotonda con Ø di un paio di primi; alcune altre debolissime stelline appaiono sparpagliate negli immediati dintorni; una stellina brillante si trova al bordo SW, mentre un'altra luminosa situata a più d 1' verso E è probabilmente esterna all'ammasso — 200x con filtro deepsky.
Haffner 23	aa	07h09m30s	−16°56.0'	q 273	CMa	24"	m. buona / ottimo	gruppo disperso nel quale si contano una decina di stelle brillanti (la più luminosa delle quali si trova praticamente al centro) e molte altre più deboli sparse su un'area grosso modo circolare con Ø di una dozzina di primi; abbastanza ben definito verso S per la presenza di un'ampia zona depleta allungata da E a W — 110x.
Harvard 12	aa	16h57m00s	−40°38.0'	q 407	Sco	6"	buona / buono	gruppo di stelle molto disperso e di forma non ben definita, esteso per circa 1°; è situato ~ 1° a N di NGC 6231; riportato sull'Uranometria come **Collinder 318**. Un piccolo asterismo formato da 5 o 6 stelle relativamente brillanti si trova poco a W del centro dell'ammasso: è un oggetto a sé stante che il Megastar denomina **Vdb-Ha 205**.
Harvard 16	aa	17h31m08s	−36°47.0'	q 376	Sco	10"	ottima / discreto	gruppo disperso di stelle deboli che a bassi ingrandimenti si presenta come un'estesa chiazza lattescente sulla quale risaltano 5 stelle che ricordano la costellazione della Sagitta.
Harvard 19	aa	18h17m11s	−13°20.7'		Ser	6"	m. buona / m. buono	è un debolissimo addensamento stellare che appare in visione distolta a 30x; non è segnato sull'Uranometria, mentre sul Megastar è riportato come Trumpler 32 (situato a ~ 30" NW di M16).
Harvard 20	aa	19h53m12s	+18°20.0'	q 162	Sge	6"	m. buona / m. buono	oggetto piccolo e oblungo, orientato da NW a SE e di dimensioni 6'x4' sul quale risaltano poche stelle.
Harvard 21	aa	23h54m17s	+61°44.0'	q 15	Cas	16"	buona / m. buono	si vedono 5 stelline abbastanza ravvicinate e di eguale luminosità disposte a "U" o come un piccolo triangolo curvilineo esteso < 2'; le altre 5 stelline di luminosità simile situate a W forse non appartengono all'ammasso — 270x.
Haute Prov. 1	ag	17h31m05s	−29°58.9'	q 376	Oph	24"	buona / ottimo	è una chiazza rotonda con Ø di una 80-ina di secondi, relativamente facile e debolmente screziata a 450x; 3 stelline ad arco (quella più a W è una doppia stretta e sbilanciata) sembrano lambirne il bordo N; era osservabile anche nel 40 cm. a 225x.
Hickson 1B	gx	00h26m06s	+25°43.1'		And	24"	buona / buono	è un piccolo nodulo evidente esteso una 15-ina di secondi situato a ridosso SW di UGC 248 — 450x.
Hickson 1C	gx	00h25m54s	+25°43.4'		And	24"	buona / buono	piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (situata 3' a W di UGC 248) — 450x.
Hickson 3A	gx	00h34m13s	−07°33.9'		Cet	24"	m. buona / mediocre	diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con piccola condensazione centrale poco evidente — 450x.
Hickson 3B	gx	00h34m25s	−07°36.0'		Cet	24"	m. buona / mediocre	è la più facile del quartetto, diffusa, orientata da E a W con dimensioni 30"×20" e di luminosità pressoché uniforme; c'è una debole stellina a una 30-ina di secondi verso SE — 450x.
Hickson 3C	gx	00h34m20s	−07°36.0'		Cet	24"	m. buona / mediocre	debolissimo baffo esteso una 30-ina di secondi e orientato da NW a SE; è la più difficile del quartetto e appare solo in visione distolta a 450x.
Hickson 3D	gx	00h34m10s	−07°36.1'		Cet	24"	m. buona / mediocre	di dimensioni simili alla 3B, salvo il fatto che è orientata da N a S e presenta una condensazione centrale abbastanza evidente — 450x.
Hickson 4C	gx	00h34m15s	−21°25.0'		Cet	24"	buona / buono	molto piccola e debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 340x.
Hickson 4D	gx	00h34m17s	−21°28.6'		Cet	24"	buona / buono	molto piccola e debolissima, situata a ridosso SE di ESO 540-2, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 340x.
Hickson 4E	gx	00h34m08s	−21°26.1'		Cet	24"	buona / buono	anche questa è molto piccola e debolissima, appare in visione distolta a 1' E di ESO 540-1; non dovrebbe essere più estesa di 10"-15" — 340x.
Hickson 5B	gx	00h38m55s	+07°03.3'		Psc	16"	ottima / ottimo	costituisce la parte meridionale del sistema doppio di NGC 190; la divisione si nota abbastanza facilmente a 380x.
Hickson 8A	gx	00h49m34s	+23°34.7'		And	24"	m. buona / m. buono	la più evidente ed estesa di un quartetto formato da 4 galassiette ravvicinate, molto deboli, relativamente compatte, rotonde e di luminosità uniforme; questa ha un Ø di ~ 20"; Hickson 8B presenta un Ø poco inferiore ed è più debole; Hickson 8C è molto debole, con Ø simile alla 8B e si trova quasi a ridosso verso E della 8A; infine Hickson 8D è debolissima, non più estesa di una dozzina di secondi; appare in visione distolta a 450x tra la 8ª e una stellina a SSE (v. cartina).
Hickson 8B	gx	00h49m35s	+23°35.5'		And	24"	m. buona / m. buono	v. **Hickson 8A**
Hickson 8C	gx	00h49m38s	+23°35.1'		And	24"	m. buona / m. buono	v. **Hickson 8A**
Hickson 8D	gx	00h49m37s	+23°34.4'		And	24"	m. buona / m. buono	v. **Hickson 8A**
Hickson 12A	gx	01h27m33s	−04°41.0'		Cet	24"	m. buona / discreto	diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø di una 40-ina di secondi — 450x.
Hickson 12B	gx	01h27m34s	−04°39.1'		Cet	24"	m. buona / discreto	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; salta fuori facilmente in visione distolta quando si osserva la precedente 1.5' a S — 450x.
Hickson 14A	gx	01h59m50s	−07°03.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia assieme a Hickson 14B la cui visione è un po' disturbata dalle SAO 129614 e 129617 di 9ª grandezza in mezzo alle quali si trovano — molto debole, allungata da NNW a SSE, di dimensioni 60"×30" e con condensazione centrale appena accennata (falcetto di luna presso il tramonto) — 400x.
Hickson 14B	gx	01h59m52s	−07°05.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	è di aspetto più uniforme di Hickson 14A, dalla quale dista sì e no un paio di primi verso S, orientata da N a S con dimensioni 40"×20" (falcetto di Luna presso il tramonto) — 400x.
Hickson 18D	gx	02h39m05s	+18°23.7'		Ari	24"	m. buona / buono	è una sorta di piccolo nodulo rotondo esteso meno di 20" che si separa a momenti a N di UGC 2140 — 450x.
Hickson 19A	gx	02h42m38s	−12°25.2'		Cet	24"	m. buona / ottimo	la più facile di un quartetto di galassiette cui appartengono anche **Hickson 19B**, **-C** e **-D** — relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø di 30" e di luminosità uniforme — 400x.
Hickson 19B	gx	02h42m42s	−12°25.6'		Cet	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un quartetto di galassiette cui appartengono anche **Hickson 19A**, **-C** e **-D** — molto debole e molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" e di luminosità uniforme (situata 1' a ESE della prima elencata) — 400x.
Hickson 19C	gx	02h42m47s	−12°23.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un quartetto di galassiette cui appartengono anche **Hickson 19A**, **-B** e **-D** — debolissima, appare in visione distolta, allungata da E a W con dimensioni 45"×30" e molto diffusa (situata 2.5' a NE di Hickson 19A) — 400x.
Hickson 19D	gx	02h42m43s	−12°26.8'		Cet	24"	m. buona / ottimo	fa parte di un quartetto di galassiette cui appartengono anche **Hickson 19A**, **-B** e **-C** — elusiva, appare solo a momenti, ma occorre spingere a 570x; non è comunque più estesa di 10" o 15" (situata 2' a SE di Hickson 19A).
Hickson 23D	gx	03h06m55s	−09°37.7'		Eri	16"	buona / ballerino	fa parte del terzetto di NGC 1214: da quest'ultima dista 5' a S — molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme, approssim. rotonda con Ø inferiore a 1' — 188x e 270x.
Hickson 24A	gx	03h20m15s	−10°51.8'		Eri	24"	buona / buono	poco diffusa, rotonda con Ø di 20" o 25" e di luminosità uniforme — 450x.
Hickson 24B	gx	03h20m23s	−10°51.9'		Eri	24"	buona / buono	poco più debole della precedente e più diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata a ridosso S di una stellina — 450x.
Hickson 24C	gx	03h20m13s	−10°51.8'		Eri	24"	buona / buono	appare elusivamente subito a W di Hickson 24A, estesa non più di 15" — 450x.
Hickson 24D	gx	03h20m20s	−10°51.5'		Eri	24"	buona / buono	salta fuori solo a momenti, ma rimane di aspetto stellare anche a 450x.
Hickson 31B	gx	05h01m25s	−04°15.8'		Eri	24"	m. buona / buono	fa parte assieme a Hickson 31C di un terzetto molto serrato cui appartiene anche NGC 1741 — è una piccola lama di luce molto tenue, orientata da NE a SW ed estesa una 30-ina di secondi; un nucleo stellare appare abbastanza facilmente a 450x.
Hickson 31C	gx	05h01m38s	−04°15.5'		Eri	24"	m. buona / buono	a prima vista, sembra un nodulo luminoso situato a ridosso W di NGC 1741; a 450x appare invece una galassietta a sé stante, molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×15".
Hickson 32A	gx	05h01m45s	−15°26.9'		Lep	24"	ottima / ottimo	debole poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità pressoché uniforme; c'è una stellina quasi a ridosso verso W — 450x.
Hickson 32B	gx	05h01m40s	−15°23.9'		Lep	24"	ottima / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e a tratti condensata, orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" (situata 3' a N di Hickson 32A) — 450x.
Hickson 32C	gx	05h01m49s	−15°25.8'		Lep	24"	ottima / ottimo	è la più difficile del quartetto, molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (situata a poco più di 1' NE di Hickson 32A) — 450x.
Hickson 32D	gx	05h01m45s	−15°25.8'		Lep	24"	ottima / ottimo	piccolissima e con nucleo puntiforme, estesa una decina di secondi; forma una coppia serrata con una stellina a N (situata a 1' N di Hickson 32A) — 450x.
Hickson 35A	gx	08h45m21s	+44°31.2'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	assieme alle 4 successive fa parte di un quintetto abbastanza serrato e orientato da N a S — debole, molto allungata da N a S con dimensioni < 30"×10" e condensata — 495x.
Hickson 35B	gx	08h45m21s	+44°30.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	è la più facile del quintetto, molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con nucleo stellare — 495x.
Hickson 35C	gx	08h45m18s	+44°31.6'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	molto piccola e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
Hickson 35D	gx	08h45m21s	+44°32.4'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	è la più elusiva del quintetto, in visione distolta appare orientata con dimensioni simili a Hickson 35A — 495x.
Hickson 35E	gx	08h45m21s	+44°30.2'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	situata a ridosso S di Hickson 35B, appare come una stellina percettibile solo a momenti — 495x.
Hickson 38C	gx	09h27m45s	+12°17.3'		Leo	24"	m. buona / buono	v. **UGC 5044**
Hickson 40B	gx	09h38m55s	−04°51.9'		Hya	24"	buona / m. buono	fa parte assieme a Hickson 40C e Hickson 40D del quartetto di Arp 321 — allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; è abbastanza compatta e poco più brillante verso l'interno — 400x.
Hickson 40C	gx	09h38m53s	−04°51.6'		Hya	24"	buona / m. buono	debolissima, appare in visione distolta orientata a perpendicolo con Hickson 40B, molto allungata quindi da NW a SE con dimensioni 45"×15" e di luminosità uniforme — 400x.
Hickson 40D	gx	09h38m56s	−04°50.2'		Hya	24"	buona / m. buono	molto piccola, compatta e condensata, allungata da E a W con dimensioni 25"×10"; c'è una stellina appena percettibile al bordo SE — 400x.
Hickson 41C	gx	09h57m27s	+45°14.3'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola e molto debole, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
Hickson 41D	gx	09h57m50s	+45°13.7'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola ed elusiva, appare solo a momenti in visione distolta al vertice meridionale di un piccolo triangolo equilatero formato con 2 stelline molto deboli — 495x.
Hickson 42C	gx	10h00m10s	−19°37.3'		Hya	16"	ottima / ottimo	piccolo oggetto molto facile, compatto, con Ø max 20" che in visione distolta sembra lambito dalla 3091 nella sua parte NW — 270x.
Hickson 43D	gx	10h11m13s	−00°05.2'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima, molto piccola e diffusa, in visione distolta appare rotonda con Ø 10"-15" — 450x.
Hickson 43E	gx	10h11m14s	−00°03.1'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debolissima, appare solo a momenti in visione distolta, forse rotonda con Ø di 10"-12" — 450x.
Hickson 46B	gx	10h22m13s	+17°51.2'		Leo	24"	m. buona / buono	molto debole, poco diffusa, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina appena percettibile a ridosso N — 450x.
Hickson 46C	gx	10h22m13s	+17°51.5'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima, tende a fondersi con Hickson 46B situata a ridosso S, anche se di fatto appare solo il nucleo stellare (a meno che non si tratti di una stellina sovrapposta) — 450x.
Hickson 46D	gx	10h22m17s	+17°52.9'		Leo	24"	m. buona / buono	debolissima e diffusa, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo 20"×15" — 450x.
Hickson 47B	gx	10h25m49s	+13°43.7'		Leo	24"	ottima / m. buono	piccola e debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
Hickson 47C	gx	10h25m49s	+13°45.2'		Leo	24"	ottima / m. buono	appare elusivamente a ridosso NE della componente "D", ma è di aspetto praticamente stellare — 450x.
Hickson 47D	gx	10h25m48s	+13°44.9'		Leo	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
Hickson 51D	gx	11h22m31s	+24°18.0'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
Hickson 51F	gx	11h22m26s	+24°17.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	è una debole e piccola protuberanza estesa 12"-15" che aggetta verso S da NGC 3651 — 450x.
Hickson 51G	gx	11h22m28s	+24°17.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto debole e di aspetto stellare anche a 450x, situata al bordo SE di NGC 3651.
Hickson 56A	gx	11h32m46s	+52°56.5'		UMa	24"	m. buona / buono	fa parte di un quintetto molto compatto assieme alla coppia Hickson 56C-D, a Hickson 56E e a UGC 6527 — debolissima lama di luce orientata da N a S ed estesa 45" che appare in visione distolta a 400x; un tenuissimo nucleo stellare appare solo a tratti forzando a 570x.
Hickson 56C	gx	11h32m37s	+52°56.9'		Cet	24"	m. buona / buono	assieme a Hickson 56D forma coppia serrata appartenente a un quintetto molto compatto — si riesce a separare dalla compagna solo a momenti forzando a 560x (a 400x sembra ancora un unico oggetto allungato da E a W); la 1ª presenta un nucleo stellare circonfuso da un tenue alone approssim. rotondo con Ø di una 30-ina di secondi; la 2ª è un minuscolo oggetto esteso 10" o 15".
Hickson 56D	gx	11h32m35s	+52°56.9'		UMa	24"	m. buona / buono	v. **Hickson 56C**
Hickson 56E	gx	11h32m32s	+52°56.4'		UMa	24"	m. buona / buono	piccola, molto debole e diffusa, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 400x.
Hickson 67B	gx	13h49m00s	−07°11.7'		Vir	24"	buona / ottimo	molto debole, con tenue condensazione centrale osservabile a momenti, molto allungata da N a S con dimensioni 60"×15" — 450x.
Hickson 67C	gx	13h49m12s	−07°12.6'		Vir	24"	buona / ottimo	molto piccola, poco diffusa approssim. rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta come una sorta di appendice a N di NGC 5306 — 450x.
Hickson 67D	gx	13h49m10s	−07°13.9'		Vir	24"	buona / ottimo	piccolissima, di aspetto praticamente stellare anche a 340x; solo a 450x si nota leggermente diffusa (situata a ridosso SW di NGC 5306).
Hickson 74B	gx	15h19m24s	+20°53.4'		Ser	16"	buona / mediocre	è una sorta di debole protuberanza che a tratti si separa verso S da NGC 5910 — 270x.
Hickson 80B	gx	15h59m21s	+65°13.4'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e con condensazione centrale appena percettibile — 450x.
Hickson 80C	gx	15h59m07s	+65°14.0'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, poco diffusa e condensata, forse rotonda con Ø di 12"-15" — 450x.
Hickson 80D	gx	15h59m12s	+65°13.3'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è la più difficile del quartetto, appare a tratti come una debole stellina appena sfuocata (il Megastar la riporta di magnitudo 16.8!) — 450x.
Hickson 84B	gx	16h44m13s	+77°51.5'		UMi	24"	m. buona / ottimo	è un elusivo baffo di luce orientato da E a W ed esteso per ~ 20"; appare solo a momenti in visione distolta subito a N di una stellina appena percettibile; una stellina brillante si trova a 1' verso W — 450x.
Hickson 84C	gx	16h44m29s	+77°49.8'		UMi	24"	m. buona / ottimo	altro piccolo baffo di luce esteso una 15-ina di secondi che si diparte a NE di una debole stellina — 450x.
Hickson 85B	gx	18h50m26s	+73°20.7'		Dra	24"	buona / ottimo	piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme; è situata quasi a ridosso SE di CGCG 341-10 — 450x.
Hickson 89A	gx	21h20m01s	−03°55.3'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da NE a SW con dimensioni 40"×30"; c'è una doppia molto stretta a 1' SE che a prima vista pare un piccolo oggetto diffuso; una stellina appena percettibile si trova a ridosso verso SW — 450x.
Hickson 89B	gx	21h20m19s	−03°53.7'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	debolissima e di luminosità uniforme, poco diffusa, in visione distolta appare a momenti orientata da NNW a SSE (come la doppia sbilanciata situata 1' scarso a S) con dimensioni 30"×15" (situata < 5' a ENE di Hickson 89A) — 450x.
Hickson 89C	gx	21h20m08s	−03°55.1'		Aqr	24"	m. buona / m. buono	oggetto molto piccolo e debole, relativamente compatto, orientato da N a S con dimensioni 20"×10"; appare abbastanza facilmente anche in visione diretta a 450x (situata 2' a E di Hickson 89B).
Hickson 91D	gx	22h09m08s	−27°48.0'		PsA	16"	buona / buono	a 188x appare come una stellina appena percettibile a ridosso N di NGC 7214.
Hickson 98B	gx	23h54m12s	+00°22.6'	q 215	Psc	16"	buona / ottimo	a una 40-ina di secondi SE di NGC 7783 si nota facilmente un piccolo oggetto rotondo, compatto ed esteso una 20-ina di secondi, con piccola nucleo stellare visibile a tratti e leggermente decentrata verso E: è appunto la **Hickson 98B** riportata sull'Uranometria come **7783B** — 270x.
Hickson 100C	gx	00h01m13s	+13°08.7'		Peg	24"	buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta quando si fissa lo sguardo sulla debole stellina situata subito a S — 450x.
Hickson 100D	gx	00h01m15s	+13°06.8'		Peg	24"	buona / m. buono	è un elusivo baffo di luce che si diparte a SW della più meridionale di una coppia abbastanza stretta di stelline; appare solo a momenti in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
Hough 197	ss	23h11m24s	+38°13.3'		And	16"	buona / m. buono	è una tripla che forma un piccolo triangolo isoscele ottusangolo con la base di 1' scarso e i due lati uguali di una 40-ina di secondi; la componente più brillante è bianco-gialla, quella intermedia azzurra, mentre quella più debole appare, forse per contrasto, di tonalità violacea — 270x.
IRAS 57+4021	gx	00h08m20s	+40°38.0'		And	28"	m. buona / buono	piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una debole stellina a ridosso SE (altresì nota come come **PGC 626**) — 495x.
IRAS 321-18	gx	00h34m43s	−00°02.4'		Cet	24"	discreta / buono	debolissimo baffo di luminosità uniforme, orientato da N a S ed esteso una 40-ina di secondi; appare in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x (altresì nota come **PGC 2080**).
IRAS 1401-506	gx	01h42m38s	−04°51.7'		Cet	16"	m. buona / ottimo	è molto debole e stemperata sul fondo cielo, di aspetto un po' confuso e di luminosità uniforme; è situata quasi a ridosso SE di una stellina (altresì nota come **PGC 6300**) — 380x.
IRAS 2530+411	gx	02h55m34s	+02°23.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare con una certa difficoltà in visione distolta a 450x; non dovrebbe essere più estesa di 10" o 15" (a 340x sembra a tratti una stellina leggermente sfuocata (altresì nota come **PGC 11044**).
IRAS 4023+2114	gx	04h05m16s	+21°22.3'		Tau	28"	m. buona / ottimo	piccola e debolissima, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×15"; c'è una stellina subito a NW — 495x.
IRAS 4028+1109	gx	04h05m37s	+11°18.1'		Tau	24"	ottima / discreto	baffo di luce molto tenue e di luminosità uniforme orientato da E a W ed esteso una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto tenue subito a NW — 450x.
IRAS 4120+622	gx	04h14m45s	+06°29.6'		Tau	24"	ottima / discreto	debolissima chiazza diffusa molto piccola, estesa sì e no 10"-12" — 450x.
IRAS 4124-803	gx	04h14m53s	−07°55.6'		Eri	24"	m. buona / buono	è una sorta di piccolo alone molto tenue con Ø di una 20-ina di secondi che circonda una stellina ben evidente (ma non sembra trattarsi del nucleo della gx (altresì nota come **PGC 14727**) — 450x.
IRAS 4144+1020	gx	04h17m13s	+10°27.3'		Tau	24"	ottima / discreto	molto piccola e debole, a tratti condensata, orientata da E a W con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina a 1' S e un'altra molto debole alla stessa distanza verso NW — 450x.
IRAS 4175-106	gx	04h20m04s	−00°59.7'		Eri	24"	ottima / discreto	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 450x.
IRAS 4187+42	gx	04h21m20s	+00°49.7'		Eri	24"	ottima / discreto	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' NE; disturbata dalla SAO 111767 situata 2.5' a NW — 450x.
IRAS 4259-440	gx	04h28m26s	−04°33.8'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30" (altresì nota come **PGC 15196**) — 450x.
IRAS 4449-513	gx	04h47m21s	−05°08.2'		Eri	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente compatta e con condensazione stellare, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una doppia abbastanza stretta a 1.5' WSW (altresì nota come **PGC 16005**) — 450x.
IRAS 4461-454	gx	04h48m35s	−04°49.1'		Eri	16"	ottima / scarso	debolissima e molto diffusa, appare senza difficoltà in visione distolta a 270x a 1.5' NE di una stellina; forse rotonda con Ø non superiore ai 30" (è altresì nota come PGC 16061).
IRAS 4502-317	gx	04h52m44s	−03°12.9'		Ori	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con condensazione centrale evidente; c'è una stellina quasi a ridosso verso N (altresì nota come **PGC 16226**) — 450x.
IRAS 4508-426	gx	04h53m18s	−04°22.4'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta subito a NE di una stellina; a tratti appare orientata da NE a SW con dimensioni 30"×15" (altresì nota come **PGC 16257**) — 450x.
IRAS 5035-1002	gx	05h05m57s	−09°59.0'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, poco più brillante all'interno, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina molto debole a ridosso E e un'altra poco più evidente subito a N (altresì nota come **PGC 16733**) — 450x.
IRAS 8339+6517	gx	08h38m23s	+65°07.2'		UMa	16"	m. buona / ottimo	facile, compatta, rotonda, con Ø di 20"-25" e un nucleo stellare percettibile a 380x (altresì nota come **PGC 24283**).

IRAS 11180-428	gx	11h20m38s	−04°45.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 40"×20" e con condensazione stellare appena percettibile; è situata all'interno di una losanga irregolare di stelle brillanti orientata come la gx (altresì nota come **PGC 34727**) — 450x.
IRAS 11199+431	gx	11h22m31s	+04°14.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 450x a ridosso W di una stellina abbastanza brillante, forse rotonda con Ø di 15"-20" — 450x.
IRAS 18203+4133	gx	18h21m53s	+41°34.6'		Lyr	28"	ottima / ottimo	molto piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi (altresì riportata come **PGC 61775**) — 495x.
IRAS 20273−1523	gx	20h30m08s	−15°13.7'		Cap	24"	buona / discreto	debole, ma relativamente facile da vedere, poco diffusa, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina molto debole subito a ESE (altresì nota come **PGC 64822**) — 450x.
IRAS 23201+111	gx	23h22m41s	+11°27.1'		Peg	24"	ottima / m. buono	è un'elusiva lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; appare con un certa difficoltà in visione distolta anche a 450x.
King 4	aa	02h36m02s	+59°01.0'	q 38	Cas	6" 16"	discreta / discreto	è un oggetto curioso: nel DS-16 a 75x appare allungato in direzione N-S sinuoso e con diramazioni che talora paiono perdersi nelle stelle di campo; probabilmente con un'apertura e ingrandimenti minori e una focheggiatura non buona l'oggetto potrebbe essere scambiato a prima vista per una galassia irregolare. Nel Comet Tracker a 30x dava effettivamente questa impressione: l'ammasso appariva infatti irrisolto e molto debole.
King 5	aa	13h14m40s	+52°42.0'	q 38	Per	10"	buona / discreto	molto debole, di forma vagamente circolare; appare a tratti granulato in visione distolta.
King 6	aa	03h28m00s	+56°27.0'	q 38	Cam	10"	buona / discreto	gruppo a forma di triangolo equilatero contenente 7 stelle brillanti e almeno una 15-ina di altre più deboli.
King 9	aa	22h15m31s	+54°24.5'		Lac	10"	discreta / discreto	debole chiazza estesa un paio di primi che appare leggermente granulata a 178x; c'è una stellina di 11-esima praticamente nel mezzo (non è riportato sulla Uranometria: situato 5' scarsi a NNE di NGC 7245).
King 10	aa	22h55m00s	+59°10.0'	q 58	Cep	28"	buona / ottimo	è esteso ~ 3' e di forma vagamente triangolare, salvo 4 stelline poste ad arco nella parte meridionale; le componenti più brillanti sembrano immerse in un fondo debolmente screziato che non si riesce totalmente a risolvere; 3 stelle luminose allineate da WNW a ESE si trovano 4' a N — 495x.
King 12	aa	23h53m00s	+61°57.0'	q 15	Cas	16"	buona / m. buono	allungato da E a W, "appuntito" verso W ed esteso un paio di primi; c'è una coppia serrata all'estremità meridionale, mentre una stellina relativamente brillante si trova al bordo E; a 270x si contano in tutto una 20-ina di componenti sino al limite; a 132x sembra immerso in una chiazza lattescente.
King 14	aa	00h31m54s	+63°10.0'	q 15	Cas	6"	buona / ottimo	contiene una 15-ina di stelle abbastanza brillanti immerse in una chiazza lattescente; è molto simile a NGC 146 (situato una dozzina di primi NE) anche se un poco più esteso e allungato verso k Cas; col sunnominato NGC 146 ed NGC 133, situato ~ 12' NNW, forma un piccolo triangolo equilatero.
King 16	aa	00h43m42s	+64°11.0'	q 16	Cas	10"	m. buona / buono	nella posizione riportata dall'Uranometria di vedono soltanto 4 stelline poste a "Y".
King 18	aa	22h52m08s	+58°18.2'		Cep	28"	buona / ottimo	si notano 3 stelline brillanti poste a triangolo rettangolo esteso 5' (il vertice più acuto punta a N) con all'interno una dozzina di componenti più deboli foggiata a "X": quella vicina al margine SW è una doppia stretta *(non è riportato sull'Uranometria)* — 495x.
King 19	aa	23h08m18s	+60°31.0'	q 58	Cep	10"	discreta / discreto	piccolo gruppo povero e disperso di una decina di stelle.
KUG 5+523	gx	00h08m06s	+32°38.0'		And	24"	m. buona / buono	molto piccola, osservabile elusivamente anche in visione diretta a ridosso di una coppia abbastanza stretta di stelline; a 450x appare a tratti orientata da E a W ed estesa < 20".
KUG 9+216	gx	00h12m29s	+21°55.7'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una stellina abbastanza brillante quasi a ridosso SW — 450x.
KUG 13+19	gx	00h15m55s	+02°12.2'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
KUG 13+310	gx	00h16m07s	+31°19.5'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
KUG 15+1	gx	00h18m21s	+00°24.3'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, anche a 450x appare solo come una stellina sfuocata; poco meglio evidente spingendo a 580x; c'è una stellina appena percettibile subito a E un'altra più brillante e poco più distante verso N.
KUG 19-16	gx	00h22m41s	−01°20.8'		Psc	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, a tratti condensata, forse rotonda con Ø di 10"-12"; di aspetto quasi stellare a 340x e meglio evidente a spingendo a 580x (situata 2.5' a S di UGC 212).
KUG 28-28	gx	00h31m00s	−02°32.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una debole stellina a 1' verso S — 450x.
KUG 109-276	gx	01h11m50s	+27°57.6'		Psc	24"	m. buona / m. buono	debolissima e diffusa, appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x; in visione distolta appare a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×15"; c'è una stellina subito a N.
KUG 111+323	gx	01h14m14s	+32°38.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e molto debole, forse rotonda con Ø di 12"-15"; situata tra una stellina a E e una coppia serrata di deboli stelline a ridosso W — 450x.
KUG 113+306	gx	01h16m26s	+30°56.1'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
KUG 142+316	gx	01h44m53s	+31°55.8'		Tri	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso E; la gx è poco disturbata da una stellina brillante situata 1' a SW (fa parte di un piccolo asterismo di 5 componenti abbastanza brillanti) — 495x.
KUG 152-50	gx	01h55m17s	−04°49.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1' verso W — 450x.
KUG 152-52	gx	01h54m58s	−05°00.2'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola e debolissima, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
KUG 152-100	gx	01h54m43s	−09°47.0'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25" — 450x.
KUG 152+349	gx	01h55m24s	+35°10.9'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da E a W con dimensioni grosso modo di 40"×20"; c'è una stellina al bordo W — 495x.
KUG 156-76	gx	01h59m21s	−07°24.9'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola e debolissima, salta fuori in visione distolta a 450x, ma solo a momenti appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo 30"×15".
KUG 157-108	gx	01h59m45s	−10°39.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	chiazza molto debole e stemperata sul fondo cielo, osservabile in visione distolta in una piccola plaga depleta, per cui occorre scalare a 340x; forse rotonda con Ø di una 30-ina di secondi.
KUG 158-92	gx	02h00m31s	−09°02.1'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima, diffusa e molto piccola, estesa max 20" e di luminosità uniforme; appare in visione distolta a una 40-ina di secondi SW di una stellina (situata poco meno di 5' WSW di NGC 787) — 400x.
KUG 200-114	gx	02h03m12s	−11°10.4'		Cet	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; equidistante, nonché quasi allineata, con 2 stelline a S — 450x.
KUG 202-27	gx	02h05m15s	−02°30.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, rotonda con Ø < 30" e di luminosità uniforme — 450x.
KUG 205-104	gx	02h08m17s	−10°14.3'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debolissima e diffusa, a tratti allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×20" e di luminosità uniforme — 400x.
KUG 205+41	gx	02h08m05s	+04°24.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	piccola e molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina quasi a ridosso W — 450x.
KUG 207-92	gx	02h10m11s	−09°03.6'		Cet	24"	ottima / ottimo	debole, molto diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 40"×20"; è situata praticamente sul cateto minore di un piccolo triangolo rettangolo la cui componente più meridionale si trova a ridosso SE della gx; meglio contrastata scalando a 340x.
KUG 208-77	gx	02h10m48s	−07°33.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	ancora un oggetto debolissimo e diffuso, appare abbastanza in visione distolta a 450x, a tratti orientata da NW a SE con dimensioni 30"×15".
KUG 209+308A	gx	02h12m03s	+31°05.1'		Tri	24"	ottima / ottimo	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
KUG 209+308B	gx	02h12m13s	+31°05.5'		Tri	24"	ottima / ottimo	debolissimo baffo di luce esteso sì e no 20", orientato da NE a SW con una stellina a ridosso W — 450x.
KUG 211+10	gx	02h13m37s	+01°18.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
KUG 212+281	gx	02h15m49s	+28°25.0'		Tri	28"	m. buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
KUG 212+305	gx	02h15m04s	+30°44.3'		Tri	24"	m. buona / discreto	piccola e debolissima, appare in visione distolta subito a S di PGC 8613, forse rotonda con Ø non superiore a 15" — 450x.
KUG 212+309A	gx	02h15m02s	+31°12.1'		Tri	28"	m. buona / buono	è un debolissimo baffo di luce molto piccolo che appare elusivamente e solo a momenti subito a SE di una stellina; un'altra stellina più debole e poco più distante si trova a E — 495x.
KUG 214-20	gx	02h16m47s	−01°48.7'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
KUG 214+307	gx	02h17m02s	+30°56.6'		Tri	28"	m. buona / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare molto allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×10"; allineata ed equidistante con 3 stelline a E (fanno parte di un piccolo asterismo di 4 componenti foggiato a "Y") — 495x.
KUG 217-116	gx	02h19m27s	−11°25.8'		Cet	24"	m. buona / buono	debolissima, molto piccola e compatta, estesa max 15" o 20"; a bassi ingrandimenti se il seeing non è buono bisogna stare attenti a non confonderla con la stellina situata a poco più di 1' SW — 400x.
KUG 221-25	gx	02h23m46s	−02°19.8'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10"; è situata tra 2 deboli stelline orientate da NNW a SSE — 450x.
KUG 222-112	gx	02h24m59s	−11°03.4'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme — 570x.
KUG 223-20	gx	02h25m59s	−01°51.2'		Cet	24"	ottima / m. buono	piccola, disturbata, ma con nucleo stellare evidente; è situata quasi a ridosso SE di una stellina — 450x.
KUG 223+283	gx	02h26m41s	+28°35.0'		Tri	24"	ottima / ottimo	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata tra due stelline della stessa luminosità, distanti 1' in direzione ENE-WSW — 450x.
KUG 227-33	gx	02h30m27s	−03°06.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto diffusa, salta fuori in visione distolta a 450x, ma solo a tratti appare orientata da E a W con dimensioni grosso modo 30"×20".
KUG 228+326	gx	02h31m51s	+32°54.0'		Tri	28"	m. buona / buono	debolissima lama di luce orientata da NW a SE ed estesa una 40-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1.5' verso E; un piccolo asterismo di 4 stelline piuttosto deboli e orientato da E a W si trova a S — 495x.
KUG 230+299	gx	02h33m32s	+30°12.2'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina subito a N — 450x.
KUG 230+306	gx	02h33m25s	+30°50.4'		Ari	28"	m. buona / buono	debole, relativamente compatta e di luminosità pressoché uniforme, molto allungata da N a S con dimensioni 30"×10" — 495x.
KUG 231-110	gx	02h33m42s	−10°49.4'		Cet	16"	ottima / m. buono	debolissima e molto piccola, appare solo a tratti in visione distolta a 270x ed è estesa max 20"-25".
KUG 231+343	gx	02h34m33s	+34°31.6'		Tri	28"	m. buona / ottimo	appare solo come una stellina appena percettibile situata a ridosso SW di **MAC 0234+3431** — 495x.
KUG 231+364	gx	02h34m32s	+36°39.7'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da WNW a ESE con dimensioni 40"×10"; c'è una tripletta arcuata di stelline brillanti a 5' verso E — 495x.
KUG 233+349	gx	02h36m32s	+35°07.4'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, molto debole e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una tripletta serrata di stelline allineate da NE a SW a 1.5' verso S (la componente a SW è abbastanza brillante) — 495x.
KUG 238+364	gx	02h41m15s	+36°37.6'		Tri	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di 12"-15" — 495x.
KUG 239-42	gx	02h41m58s	−04°03.4'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, approssim. rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
KUG 248-69	gx	02h51m10s	−06°42.4'		Eri	24"	buona / buono	è un'elusiva lama di luce che appare solo a momenti in visione distolta a 340x, a poco più di 1' SE di una stellina; è orientata da N a S ed estesa una 30-ina di secondi; sparisce totalmente a 450x.
KUG 254-4	gx	02h56m41s	−00°14.7'		Cet	24"	m. buona / ottimo	debole, ma relativamente facile e compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è un poco difficile da trovare a 450x in quanto situata in una piccola zona depleta.
KUG 302-26	gx	03h05m29s	−02°28.5'		Eri	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
KUG 305-44	gx	03h07m48s	−04°17.6'		Eri	24"	m. buona / m. buono	debolissima, solo a momenti in visione distolta appare molto allungata nucleo stellare con dimensioni grosso modo 30"×10", ma non bisogna scendere sotto i 450x.
KUG 306-26	gx	03h08m32s	−02°25.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	facile, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15" — 450x.
KUG 307-25	gx	03h10m00s	−02°21.8'		Eri	24"	buona / ottimo	molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
KUG 308-29	gx	03h10m44s	−02°43.1'		Eri	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×20"; c'è una stellina brillante a 1' NE — 450x.
KUG 311-64	gx	03h14m08s	−06°17.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	debole, molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
KUG 315-21	gx	03h18m24s	−01°55.9'		Eri	16"	ottima / buono	molto piccola e compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 380x.
KUG 315-21B	gx	03h18m20s	−01°55.0'		Eri	16"	ottima / buono	debolissima, rimane di aspetto stellare anche a 380x; situata una 40-ina di secondi a NE di una stellina — 380x.
KUG 320-36	gx	03h23m28s	−03°29.8'		Eri	24"	ottima / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 20"-25"; situata sul lato nord-occidentale di un triangolo isoscele di stelline brillanti il cui vertice più acuto punta a SW — 450x.
KUG 321-61	gx	03h24m02s	−05°56.1'		Eri	24"	ottima / buono	debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (forma una coppia ravvicinata con **MAC 0324-0555** situata a ridosso verso N — 450x.
KUG 325-53	gx	03h28m12s	−05°11.5'		Eri	24"	discreta / buono	relativamente facile, poco diffusa e di luminosità uniforme, molto allungata da E a W con dimensioni 60"×15" — 450x.
KUG 325-54	gx	03h28m27s	−05°11.5'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a ~ 30" NE e un'altra poco più debole alla stessa distanza verso NW — 450x.
KUG 326-44	gx	03h28m54s	−04°14.9'		Eri	24"	discreta / buono	debole chiazza a prima vista di forma indistinta, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo 45"×30"; non sembra più contrastata scalando a 340x.
KUG 330-13	gx	03h32m41s	−01°11.0'		Tau	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza approssim. circolare, estesa una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; meglio evidente a 450x.
KUG 330-77	gx	03h33m13s	−07°33.0'		Eri	24"	ottima / ottimo	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' W — 450x.
KUG 339-23	gx	03h41m45s	−02°10.7'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
KUG 436+74	gx	04h39m27s	+07°29.9'		Tau	24"	ottima / buono	debolissima di luminosità uniforme, a tratti orientata da E a W con dimensioni grosso modo di 30"×20" — 450x.
KUG 447+80	gx	04h50m13s	+08°08.1'		Ori	24"	ottima / buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
KUG 730+745B	gx	07h36m43s	+74°27.1'		Cam	16"	ottima / m. buono	forma una coppia ravvicinata con l'elusiva UGC 3906 situata a ridosso SW ed è più evidente di quest'ultima; di fatto, osservando a 380x, è quella che appare per prima; è comunque debolissima, ma in visione distolta è abbastanza chiaramente allungata da N a S per una 40-ina di secondi.
KUG 801+386	gx	08h05m17s	+38°27.9'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	debolissima, in visione distolta appare a tratti molto allungata da E a W con dimensioni 30"×10" — 450x.
KUG 822+407	gx	08h25m54s	+40°37.4'		Lyn	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi o poco più; ci sono 2 deboli stelline a 1' N e NE — 495x.
KUG 825-407	gx	08h29m13s	+40°35.2'		Lyn	28"	m. buona / mediocre	molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 291x.
KUG 831+438	gx	08h34m47s	+43°43.6'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola, relativamente facile e compatta, gradatamente più brillante verso l'interno, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15"; c'è una stellina subito a ESE — 495x.
KUG 846+399	gx	08h49m34s	+39°44.9'		Lyn	28"	m. buona / buono	molto debole, in visione distolta appare molto allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 30"×10"; è una gx difficile, perché situata in una piccola zona abbastanza depleta — 495x.
KUG 848+394	gx	08h51m34s	+39°16.2'		Lyn	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole e relativamente compatta allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina brillante a poco più di 1' verso W — 495x.
KUG 901+422	gx	09h04m41s	+42°02.5'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, salvo un nucleo stellare visibile tuttavia solo a momenti, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi. Forma una coppia ravvicinata con MAC 0904+4203 situata subito a N — 495x.
KUG 1026+393	gx	10h29m11s	+39°06.9'		LMi	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' NNW — 495x.
KUG 1027+437	gx	10h30m11s	+43°26.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	poco più evidente di **PGC 2220335**, situata un paio di primi a SW, molto piccola e condensata, rotonda con Ø di 12"-15" (presenza di chiarore lunare) — 495x.
KUG 1037+394	gx	10h40m13s	+39°14.0'		LMi	28"	ottima / ottimo	poco più evidente della successiva, osservata per prima, con dimensioni e orientamento analogo — 495x.
KUG 1037+395	gx	10h40m48s	+39°17.0'		LMi	28"	ottima / ottimo	molto piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 495x.
KUG 1038+403A	gx	10h41m01s	+40°05.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	anche questa è molto piccola e molto debole, di luminosità uniforme, in visione distolta appare orientata da NE a SW con dimensioni 20"×10" — 495x.
KUG 1050+437	gx	10h53m29s	+43°30.4'		UMa	28"	ottima / m. buono	minuscola galassietta molto debole, in visione distolta appare a tratti orientata da N a S con dimensioni < 20"×10" (presenza di chiarore lunare) — 495x.
KUG 1128+368	gx	11h31m09s	+36°36.0'		UMa	16"	m. buona / ottimo	è un oggetto rotondo, molto debole, relativamente compatto, di luminosità uniforme e Ø ~ 30"; forma un piccolo triangolo isoscele con 2 stelline il cui vertice più acuto punta a S — 380x.
KUG 1148+367	gx	11h51m01s	+36°29.4'		UMa	16"	mediocre / ottimo	relativamente facile, ma di aspetto un po' confuso, grosso modo rotonda con Ø di 40" e di luminosità uniforme — 380x.
KUG 1154+173	gx	11h56m41s	+17°03.7'		Leo	24"	buona / m. buono	debolissima e molto piccola, appare a momenti in visione distolta, ma occorre spingere a 580x, perché la visione è disturbata da una stella brillante di 10ª grandezza situata un paio di primi a E; forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
KUG 1200+397A	gx	12h02m50s	+39°26.0'		UMa	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×20"; altresì riportata come **PGC 38039** — 450x.
KUG 1201+396	gx	12h03m52s	+39°22.7'		UMa	24"	m. buona / m. buono	debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; altresì riportata come **PGC 38130** — 450x.
KUG 1206+234	gx	12h09m14s	+23°13.1'		Com	24"	ottima / m. buono	debolissima chiazza di luminosità uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
KUG 1206+371	gx	12h09m10s	+36°51.0'		CVn	16"	buona / buono	relativamente facile in visione distolta, diffusa, rotondeggiante con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; è situata a ~ 1' SE di una stellina brillante — 380x.
KUG 1206+411	gx	12h09m27s	+40°49.9'		CVn	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso verso S — 495x.
KUG 1212+418	gx	12h15m03s	+41°33.5'		CVn	28"	m. buona / ottimo	anche questa è piccola e debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina 1.5' a W e una coppia abbastanza stretta a un paio di primi verso N — 495x.
KUG 1241+274	gx	12h44m26s	+27°11.6'		Com	24"	ottima / ottimo	molto debole, ma più che altro molto disturbata da una stellina brillante situata a 1' verso N; in visione distolta appare relativamente compatta, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
KUG 1320+237A	gx	13h22m24s	+23°27.1'		Com	16"	buona / buono	debolissima e molto piccola; appare a tratti a 380x come una stellina sfuocata; c'è una stellina di 15-esima a ~ 30" W e un'alta brillante a ~ 1' verso E; la galassietta è allineata con queste 2.
KUG 1327+312	gx	13h50m02s	+31°00.6'		CVn	16"	m. buona / ottimo	debolissimo oggetto rotondo di luminosità uniforme e relativamente compatto, di una 20-ina di secondi con Ø; è poco più contrastato a 380x.
KUG 1355+137	gx	13h57m45s	+13°28.5'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima, molto piccola e diffusa, forse rotonda con Ø di una decina di secondi; allineata ed equidistante con due stelline a E: quella più vicina alla gx è molto debole — 450x.
KUG 1401+165	gx	14h03m44s	+16°20.2'		Boo	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, è osservabile in visione distolta, ma appare solo come una stellina sfuocata anche a 450x.
KUG 1429+541	gx	14h31m19s	+53°55.2'		Boo	24"	m. buona / discreto	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
KUG 1552+191	gx	15h54m22s	+19°02.2'		Ser	24"	ottima / m. buono	molto debole e piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
KUG 1553+130	gx	15h55m31s	+12°53.7'		Ser	24"	ottima / buono	molto piccola e debole, situata in una piccola zona quasi depleta a 450x, rotonda con Ø di una 10-ina di secondi; c'è una debole stellina a 1' NW.
KUG 1556+131	gx	15h59m13s	+12°58.7'		Ser	24"	ottima / buono	piccola chiazza rotonda molto debole con Ø di una 20-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' verso E — 450x.
KUG 1601+168	gx	16h03m39s	+16°42.5'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di 15"-20" e un nucleo stellare appena percettibile — 450x.
KUG 1605+143	gx	16h08m04s	+14°03.4'		Ser	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina appena percettibile quasi a ridosso di SW — 450x.
KUG 1614+419	gx	16h16m06s	+41°49.0'		Her	28"	m. buona / buono	piccola, molto debole diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; poco disturbata dalla SAO 45998 di 10ª grandezza situata un paio di primi a NW — 495x.
KUG 1619+401	gx	16h21m40s	+39°59.6'		Her	28"	m. buona / buono	debole, molto piccola diffusa e condensata, rotonda con Ø di ~ 15" — 495x.
KUG 1622+411B	gx	16h24m39s	+41°02.2'		Her	16"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a poche decine di secondi verso N (situata a poco più di 3' SW di NGC 6138) — 270x.
KUG 1625+390	gx	16h27m15s	+38°57.2'		Her	28"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare allungata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×15" (situata verso la parte sud-occidentale dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
KUG 1625+391	gx	16h26m56s	+39°02.2'		Her	28"	m. buona / ottimo	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø do una 20-ina di secondi (situata verso la parte sud-occidentale dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
KUG 1625+410	gx	16h27m11s	+40°54.4'		Her	24"	m. buona / m. buono	fa parte del nutrito ammasso **AGC 2197** — molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 450x.
KUG 1626+412	gx	16h28m03s	+41°08.5'		Her	28"	ottima / ottimo	molto piccola e molto debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø non superiore a 15" (fa parte dell'ammasso **AGC 2197**) — 495x.
KUG 1632+393A	gx	16h33m46s	+39°16.3'		Her	28"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo baffo di luce esteso sì e no 20" e orientato da E a W; c'è una stellina a ridosso NE — 495x.
KUG 1633+402	gx	16h34m52s	+40°11.7'		Her	28"	ottima / buono	piccola, debole, poco diffusa e appena più brillante all'interno, rotonda con Ø < 20" — 495x.
KUG 1634+401	gx	16h36m11s	+40°04.3'		Her	28"	ottima / buono	poco più debole della precedente — osservata subito prima — molto piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
KUG 1635+360	gx	16h37m16s	+35°58.7'		Her	24"	m. buona / mediocre	debolissima e diffusa, molto piccola, a tratti in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
KUG 1641+405	gx	16h22m58s	+40°24.7'		Her	28"	m. buona / buono	molto debole diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni grosso modo di 30"×15" — 495x.
KUG 2254+124	gx	22h56m37s	+12°41.5'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole e di luminosità uniforme, approssim. circolare con Ø di una 20-ina di secondi; si trova a ridosso SW della più meridionale di una coppia di stelline orientate da N a S e distanti ~ 30" — 450x.
KUG 2255+144	gx	22h57m53s	+14°44.9'		Peg	24"	buona / ottimo	piccola e molto debole, relativamente compatta, allungata da N a S con dimensioni 20"×10", ma l'orientamento si evince meglio spingendo a 570x.
KUG 2255+145	gx	22h58m12s	+14°51.0'		Peg	24"	buona / ottimo	più facile della precedente, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata nello stesso modo, ma con dimensioni poco superiori.
KUG 2257+127A	gx	23h00m08s	+13°01.3'		Peg	24"	buona / ottimo	molto debole, ma relativamente compatta, piccola e di luminosità uniforme; a 570x appare allungata da N a S con dimensioni 20"×10".
KUG 2313+97	gx	23h15m43s	+10°03.7'		Peg	24"	ottima / m. buono	è un'elusiva lama di luce orientata da E a W ed estesa non più di 40"-45"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
KUG 2347+375B	gx	23h50m00s	+37°49.9'		And	28"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE. Forma una coppia ravvicinata con **CGCG 517-2** situata a ridosso N — 495x.
KUG 2352+316	gx	23h55m22s	+31°53.3'		Peg	24"	m. buona / m. buono	è molto piccola, ma appare elusivamente e soltanto a momenti a 1' NE di una stellina — 450x.
KUG 2356+177	gx	23h59m23s	+17°59.5'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e piccola, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a 1' scarso SW — 450x.
KUG 2357+225	gx	00h00m34s	+22°46.7'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole e stemperata sul fondo cielo, in visione distolta appare rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; allineata ed equidistante con 2 stelline a SW (quella più esterna è percettibile solo a momenti) — 450x.
LBN 928	neb	05h38m10s	−00°09.5'	q 226	Ori	24"	buona / mediocre	alone molto diffuso, ma evidente attorno a 3 stelline brillanti allineate in direzione E-W (le 2 più a E sono distanti meno di 1'); per confronto le 2 stelle situate rispettivamente 8' ENE e 8' WSW del terzetto ne sono sprovviste; la nebulosa si trova a 25' ENE da IC 426 — 200x.
LBN 1066	neb	07h52m46s	−26°16.6'	q 320	Pup	24"	ottima / ottimo	è una piccola zona lattescente molto debole che fa da sfondo a 3 stelline abbastanza luminose facenti parte dell'ammasso aperto Haffner 19; fa parte del più ampio complesso nebulare denominato **SH2-311**.
LDN 1616	nebo	05h16m30s	−03°26.0'	q 225	Ori	24"	buona / scarso	è una formazione scura di circa 90"×60" situata a SW della nebulosa NGC 1788.
Markarian 47	gx	12h15m59s	+40°34.3'		CVn	28"	ottima / m. buono	è di aspetto quasi stellare a bassi ingrandimenti, in quanto estesa non più di 10"; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso NW; la 2 CVn, stella arancione molto brillante di magnitudo 5.7 situata 5' a N ricorda vagamente la γ Andromedae, in quanto presenta una compagna di 8ª grandezza a 10"-12" verso W che per contrasto appare bluastra — 495x.
Markarian 50	gx	12h23m24s	+02°40.7'		Vir	24"	m. buona / m. buono	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina percettibile solo a momenti a ridosso NE; una stellina più brillante si trova invece a 1' SE — 450x.
Markarian 78	gx	07h42m42s	+65°10.6'		Cam	16"	m. buona / m. buono	piccolissimo oggetto rotondo, compatto e relativamente brillante, con Ø di una 15-ina di secondi e nucleo stellare — 380x.
Markarian 92	gx	08h35m40s	+46°29.6'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con **PGC 24140** situata a ridosso S — la Markarian è debole, di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni 30"×15"; la PGC è molto piccola, relativamente compatta e condensata, forse rotonda con Ø di 15" — 495x.
Markarian 96	gx	08h49m00s	+46°15.0'		Lyn	28"	m. buona / ottimo	debole, molto piccola, relativamente compatta e con nucleo stellare evidente, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
Markarian 113	gx	09h29m16s	+62°40.9'		UMa	16"	ottima / ottimo	piccola, compatta, con nucleo stellare abbastanza marcato circonfuso da un alone rotondo con Ø di 15"-20"; c'è una stellina a 1' scarso verso N; potrebbe apparire di aspetto stellare a bassi ingrandimenti — 380x.
Markarian 125	gx	09h50m15s	+45°57.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a 1.5' SW e una coppia di deboli stelline orientate da N a S un paio di primi a E — 495x.
Markarian 163	gx	11h06m27s	+48°38.1'		UMa	28"	m. buona / m. buono	debolissima e di aspetto stellare, situata tra UGC 6156 e una stellina a un paio di primi verso SW — 495x.
Markarian 205	qso	12h21m44s	+75°19.6'		Dra	24"	ottima / m. buono	appare come una stellina ben evidente e che pare immersa in un piccolo e tenue alone; situata a ridosso S di NGC 4319 — 450x.
Markarian 215	gx	12h32m35s	+45°46.1'	q 75	CVn	16"	ottima / buono	è di aspetto stellare a bassi ingrandimenti; a 270x, invece, appare chiaramente, attorno al nucleo brillante e puntiforme un tenue alone molto piccolo con Ø di una 20-ina di secondi — 270x.
Markarian 267	gx	13h39m36s	+43°03.2'	q 76	CVn	24"	m. buona / m. buono	relativamente compatta, allungata da N a S, di dimensioni 20"×15" e con tenue condensazione centrale; c'è una stellina a ridosso N; è riportata sul Megastar come **CGCG 218-33** — 450x.
Markarian 290	gx	15h35m52s	+57°54.2'		Dra	28"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo stellare molto brillante (ma non sarà una stella sovrapposta?) circonfusa da un piccolo alone molto tenue con Ø di una 20-ina di secondi — 495x.
Markarian 299	gx	16h05m47s	+17°18.4'		Her	24"	ottima / m. buono	situata al bordo SSE dell'ammasso **AGC 2151** — molto piccola e debole, rotonda con Ø di 12"-15"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso SW — 450x.
Markarian 335	gx	00h06m19s	+20°12.1'	q 125	Peg	16"	ottima / ottimo	è abbastanza brillante, ma rimane pressoché stellare anche a 380x; solo in visione distolta appare un piccolo alone con Ø massimo di una dozzina di secondi.
Markarian 349	gx	00h53m35s	+21°30.8'		Psc	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, dimensioni 20"×15" e con nucleo stellare appena percettibile; è posta all'estremità meridionale di una bisciolina di 7 stelline — 450x.
Markarian 376	gx	07h14m15s	+45°41.9'		Lyn	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø max di 15" e nucleo stellare evidente — 450x.
Markarian 407	gx	09h47m47s	+39°05.1'	q 71	LMi	16"	buona / m. buono	piccola, compatta, circolare, con Ø di 20"-30" e un nucleo stellare — 380x.
Markarian 408	gx	09h48m05s	+32°53.0'	q 104	Leo	16"	ottima / m. buono	relativamente brillante, compatta, rotonda, con Ø max di 30" e con evidente condensazione centrale; situata poco più di 1' SE di una stellina brillante — 380x.
Markarian 424	gx	11h30m27s	+36°44.2'	q 106	UMa	16"	ottima / m. buono	piccola galassia debole e compatta con Ø massimo di 15 o 20 secondi — 270x.
Markarian 426	gx	11h40m49s	+35°12.2'	q 107	UMa	16"	buona / m. buono	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 40"×20" e con nucleo stellare molto tenue; nota altresì come CGCG 186-23 — 380x.
Markarian 429	gx	11h46m26s	+34°51.1'	q 107	UMa	16"	buona / buono	piccola, rotonda, diffusa, con Ø < di 30" e con marcata condensazione centrale di aspetto stellare — 380x.
Markarian 465	gx	14h01m23s	+36°48.0'		CVn	16"	buona / ottimo	debole, ma relativamente compatta, rotonda, con Ø di ~ 20" e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x.
Markarian 486	gx	15h36m38s	+54°33.5'		Dra	28"	m. buona / m. buono	si vede soltanto il nucleo stellare brillante, perché il piccolo alone molto tenue che vi si nota attorno potrebbe essere un semplice effetto di diffusione — 495x.
Markarian 500	gx	16h48m36s	+48°43.0'		Her	28"	ottima / buono	molto piccola e molto debole, relativamente compatta, in visione distolta appare orientata da N a S con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
Markarian 502	gx	16h53m43s	+64°05.2'		Dra	24"	m. buona / ottimo	è un alone molto tenue esteso sì e no una 20-ina di secondi che circonda una stellina abbastanza brillante — 450x.
Markarian 505	gx	17h21m26s	+39°42.1'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto diffusa e con nucleo stellare marcato, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina a 1.5' NE — 495x.
Markarian 509	gx	20h44m10s	−10°43.4'		Aqr	16"	ottima / buono	nella posizione segnata si nota solo una stella — che appare poco più debole di quella situata 4' a N; scalando a 270x sembra di notare a tratti, in visione distolta, una leggerissima traccia di nebulosità negli immediati dintorni.
Markarian 514	gx	21h20m29s	+02°46.6'		Equ	16"	m. buona / buono	debole, molto piccola e compatta, di 15" o 20" con Ø e con nucleo stellare visibile a tratti a 380x; c'è una debole stellina a ridosso SW.
Markarian 515	gx	21h23m30s	−07°44.7'		Aqr	24"	discreta / buono	debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
Markarian 557	gx	00h48m53s	−02°22.9'		Cet	24"	m. buona / ottimo	compatta e relativamente brillante, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; ha più l'aspetto di una planetaria che di una galassia — 580x.
Markarian 563	gx	01h11m50s	−01°39.3'		Cet	24"	ottima / ottimo	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 30"×15"; c'è una stellina quasi a ridosso NE; un terzetto allineato di stelline si trova a 1.5' verso SW — 450x.
Markarian 570	gx	01h26m50s	−00°58.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	presenta un nucleo stellare molto brillante (ma non sarà effettivamente una stella sovrapposta?) e un tenue alone diffuso che in visione distolta appare rotondo con Ø < 30" — 450x.
Markarian 585	gx	02h03m30s	+02°34.0'		Psc	24"	ottima / ottimo	molto piccola, compatta e condensata; a bassi ingrandimenti apparirebbe come una stellina sfuocata — 450x.
Markarian 609	gx	03h25m25s	−06°08.6'		Eri	24"	m. buona / mediocre	relativamente compatta e con condensazione centrale marcata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina subito a N — 450x.
Markarian 610	gx	03h25m31s	−06°07.7'		Eri	24"	m. buona / mediocre	rotonda, con Ø pressoché uguale Markarian 609, dalla quale dista un paio di primi scarsi a NW, ma di aspetto più uniforme; anche la condensazione centrale appare evidente ma meno contrastata della precedente — 450x.
Markarian 612	gx	03h30m41s	−03°08.3'		Eri	24"	discreta / buono	debole, poco diffusa, allungata da NW a SE, di dimensioni 30"×20" e con condensazione centrale evidente; c'è una coppia di stelline rispettivamente a N e a NE della gx — 450x.
Markarian 629	gx	10h17m20s	+15°29.4'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e una condensazione stellare visibile a tratti; c'è una stellina a 1' NE; poco disturbata dalla SAO 99037 di 9a grandezza situata un paio di primi a NW — 450x.
Markarian 689	gx	15h36m19s	+30°40.9'	q 112	CrB	16"	buona / ottimo	così è riportata sull'Uranometria, ma il nome "ufficiale" è CGCG 166-19 — molto debole, di luminosità uniforme, poco diffusa, rotonda con Ø ma x di 25" o 30"; c'è una stellina appena percettibile a pochi secondi verso W — 270x.
Markarian 695	gx	16h02m51s	+15°57.7'		Her	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola e condensata, rotonda con Ø di 10"-15" — 450x.
Markarian 711	gx	09h55m11s	+13°25.7'		CrB	24"	m. buona / ottimo	relativamente facile, molto piccola, poco diffusa e condensata, rotonda con Ø di max 15"; c'è una stellina a poco più di 1' NNW — 450x.
Markarian 734	gx	11h21m47s	+11°44.3'		Leo	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, compatta e con nucleo stellare, rotonda con Ø di una decina di secondi; sembra a tutti gli effetti una nebulosa planetaria — 580x.
Markarian 742	gx	11h37m31s	+15°29.2'		CrB	24"	m. buona / ottimo	debole, piccola e relativamente compatta, a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
Markarian 789	gx	13h32m24s	+11°06.3'		Vir	24"	m. buona / ottimo	minuscolo oggetto relativamente brillante, compatto e condensato, orientato da N a S con dimensioni 15"×10"; c'è una stellina quasi a ridosso verso SE; un'altra stellina si trova a 45" SW — 570x.
Markarian 797	gx	13h55m42s	+12°11.7'		Boo	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina al bordo W — 450x.
Markarian 818	gx	14h38m58s	+47°18.5'		Boo	28"	m. buona / buono	molto piccola e debole, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 495x.
Markarian 821	gx	14h40m40s	+16°39.8'		Boo	24"	buona / ottimo	debolissima, ma appare abbastanza facilmente in visione distolta posando lo sguardo sulla stellina situata a poco più di 1' SE; è di aspetto quasi stellare anche a 400x; a 570x appare diffusa, condensata, ma non più estesa di 10".
Markarian 822	gx	14h46m15s	+16°05.7'		Boo	24"	buona / ottimo	molto debole, diffusa, poco più brillante all'interno, approssim. rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 570x.
Markarian 823	gx	14h48m12s	+15°33.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	debolissima, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; appare in visione distolta a 1' E di una debole stellina — 450x.
Markarian 825	gx	14h49m45s	+50°42.7'		Boo	24"	ottima / ottimo	piccola e debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
Markarian 841	gx	15h04m01s	+10°26.3'		Boo	24"	buona / ottimo	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un piccolo alone rotondo molto tenue e con Ø < 20" — 450x.
Markarian 843	gx	15h05m44s	+56°23.5'		Dra	24"	ottima / ottimo	molto piccola, debole e diffusa, rotonda con Ø < 20" — 450x.
Markarian 876	gx	16h13m57s	+65°43.1'		Dra	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e con nucleo stellare brillante, ma non capisco se è tale o se si tratta di una stellina; in effetti nella posizione riportata dal Megastar è presente la quasar 1613+658 — 450x.
Markarian 877	qso	16h20m12s	+17°24.5'		Her	24"	m. buona / m. buono	anche se il Megastar la dà di magnitudo 15.5, appare facilmente come una debole stellina di campo; è altresì riportato con la sigla 1617+175 — 450x.
Markarian 880	gx	16h22m54s	+40°29.7'		Her	28"	m. buona / buono	debole, poco diffusa, allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare evidente — 495x.
Markarian 882	gx	16h27m34s	+39°06.1'		Her	28"	m. buona / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, allungata da E a W con dimensioni di 30"×20" (situata verso la parte sud-occidentale dell'ammasso **AGC 2199**) — 495x.
Markarian 884	gx	16h31m49s	+20°24.7'		Her	16"	ottima / buono	piccola, molto debole e poco diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di 25"-30" — 380x.
Markarian 889	gx	16h53m03s	+57°21.0'		Dra	24"	m. buona / discreto	molto debole e molto piccola, relativamente compatta, di aspetto quasi stellare a 340x; a 450x appare rotonda con Ø di 10"-12"; forma un minuscolo triangolo equilatero con due deboli stelline a S e SW — 450x.
Markarian 914	gx	22h34m41s	+40°40.0'		Lac	24"	m. buona / ottimo	presenta un nucleo stellare brillante circonfuso da un piccolo e tenue alone con Ø < 20"; una debolissima chiazza diffusa, estesa per ~ 1' si estende a ridosso WSW in direzione della SAO 52153 di 8ª grandezza situata 2.5' a W della gx — 450x.
Markarian 930	gx	23h31m58s	+28°56.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	molto piccola e relativamente compatta, rotonda con Ø di 12"-15" e un nucleo stellare — 450x.
Markarian 935	gx	00h01m45s	+13°06.1'		Peg	24"	ottima / ottimo	relativamente facile, diffusa e con nucleo stellare, rotonda con Ø < 30"; c'è una stellina a 1' scarso verso NE — 450x.
Markarian 953	gx	00h37m12s	+35°54.1'		And	24"	m. buona / ottimo	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 30"×15"; c'è una coppia di stelline a ridosso W (quella più a N si vede solo a momenti); allineata ed equidistante con altre due stelline molto deboli a E — 450x.
Markarian 964	gx	00h26m08s	−03°41.0'		Cet	24"	buona / discreto	molto piccola e debole, compatta e a tratti condensata, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' scarso verso W; disturbata dalla SAO 129035 di 7ª grandezza situata 3.5' a SSW — 450x.

Markarian 966	gx	00h57m42s	−04°56.9'		Cet	16"	m. buona / m. buono	è poco più facile di NGC 321 situata ~ 4' SSW; è allungata ~ da E a W, dimensioni 40"×30" e di luminosità pressoché uniforme; è anche riportata come **MCG-1-3-42** — 270x.
Markarian 979	gx	01h18m01s	+12°12.4'		Psc	24"	buona / m. buono	molto piccola e debole, rotonda con Ø di 10"-12", situata a ridosso NE di una debole stellina — 450x.
Markarian 980	gx	01h19m16s	+34°51.5'		And	28"	m. buona / buono	piccola, debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è un trio di stelline abbastanza serrato a 1.5' verso W — 495x.
Markarian 988	gx	01h23m30s	+34°34.1'		Her	16"	m. buona / m. buono	è una galassietta relativamente facile, compatta, di luminosità uniforme e con Ø di una 30-ina di secondi — 270x.
Markarian 996	gx	01h27m35s	−06°19.6'		Cet	16"	ottima / m. buono	molto debole, relativamente compatta, a tratti appare allungata da N a S, di dimensioni 30"×15" e con nucleo stellare osservabile a 380x.
Markarian 1004	gx	01h39m57s	−05°04.5'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola, relativamente compatta e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 20"×15" — 450x.
Markarian 1013	gx	01h59m38s	−07°31.2'		Cet	24"	m. buona / buono	molto debole e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (falcetto di Luna presso il tramonto) — 400x.
Markarian 1031	gx	02h18m52s	−03°02.4'		Cet	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, relativamente brillante e compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20" — 450x.
Markarian 1036	gx	02h24m04s	−04°33.1'		Cet	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debole, più che altro di aspetto stellare (probabilmente si tratta o del nucleo della gx o di una stellina sovrapposta); anche spingendo a 580x l'impressione non cambia.
Markarian 1071	gx	03h12m21s	−10°30.8'		Eri	24"	buona / buono	facile da vedere, piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
Markarian 1078	gx	03h40m49s	−03°49.7'		Eri	24"	discreta / buono	molto debole e di luminosità uniforme, allungata da NW a SE con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina appena percettibile a ridosso NW — 450x.
Markarian 1084	gx	04h44m09s	+08°50.4'		Ori	24"	ottima / buono	piccola, debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, poco allungata da N a S con dimensioni 20"×15" — 450x.
Markarian 1105	gx	16h15m13s	+12°34.4'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccola e debole, rotonda con Ø < 20" e una condensazione stellare — 450x.
Markarian 1108	gx	16h50m48s	+28°50.8'		Her	16"	ottima / buono	molto debole, ma relativamente compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 380x.
Markarian 1117	gx	17h40m21s	+39°15.3'		Her	28"	ottima / ottimo	poco diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 30" e nucleo stellare molto tenue — 495x.
Markarian 1129	gx	23h06m40s	+10°00.3'		Peg	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, salta fuori abbastanza facilmente in visione distolta a 450x a poco più di 1' S di una debole stellina; forse rotonda con Ø < 20" (situata 7' a ENE di UGC 12370).
Markarian 1133	gx	23h44m01s	+27°42.9'		Peg	24"	m. buona / m. buono	relativamente facile e compatta, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi — 450x.
Markarian 1142	gx	00h20m43s	+21°58.0'		And	24"	m. buona / m. buono	debolissima e molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di 10"-12"; forma un piccolo triangolo equilatero con una stellina brillante a 1.5' NW e una più debole alla stessa distanza verso N — 450x.
Markarian 1182	gx	02h40m41s	+16°49.8'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SE — 450x.
Markarian 1184	gx	02h45m55s	−05°38.4'		Cet	24"	ottima / m. buono	relativamente facile, diffusa e gradatamente più brillante verso l'interno, rotonda con Ø < 40" e un nucleo quasi stellare; c'è una stellina a 1' verso E — 450x.
Markarian 1187	gx	02h48m22s	+13°56.1'		Ari	24"	ottima / ottimo	molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, in visione distolta appare a momenti allungata da N a S con dimensioni 30"×20" (o poco meno); c'è una stellina molto debole subito a N o NNW — 450x.
Markarian 1193	gx	04h07m01s	−10°10.2'		Eri	24"	m. buona / mediocre	piccola, debolissima e con nucleo stellare appena percettibile, rotonda con Ø < 20"; è immersa nel bagliore di una stellina brillante quasi a ridosso verso NE — 450x.
Markarian 1204	gx	07h49m40s	+28°56.7'		Gem	16"	ottima / buono	oggetto rotondo molto debole, relativamente compatto e molto piccolo, con Ø < 20"; salta fuori facilmente a 270x (al momento dell'osservazione era ancora molto bassa).
Markarian 1206	gx	07h57m10s	+14°39.5'		Cnc	24"	m. buona / mediocre	molto piccola, compatta e relativamente brillante, ancorché disturbata da una stellina luminosa situata quasi a ridosso verso E; è rotonda con Ø < 20" — 450x.
Markarian 1213	gx	08h14m09s	−00°22.2'		Hya	24"	buona / ottimo	molto debole, piccola e relativamente compatta, con nucleo stellare, allungata da NW a SE con dimensioni 30"×15" — 570x.
Markarian 1236	gx	09h49m54s	+00°37.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	sembra una piccola appendice sud-orientale di NGC 3023; è compatta, orientata da E a W con dimensioni 20"×10" — 450x.
Markarian 1252	gx	10h16m34s	−08°11.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	piccola, molto debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e una condensazione stellare appena percettibile — 450x.
Markarian 1258	gx	10h38m00s	−07°18.0'		Sex	24"	m. buona / m. buono	relativamente brillante, poco diffusa e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi — 450x.
Markarian 1274	gx	10h58m51s	+06°43.8'		Leo	28"	ottima / buono	piccola, molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, orientata da N a S con dimensioni 20"×10"; c'è una stellina a 1' verso W — 495x.
Markarian 1285	gx	11h11m35s	+22°11.0'		Leo	24"	m. buona / m. buono	molto debole e piccola, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e di luminosità uniforme; c'è una stellina subito a ESE — 450x.
Markarian 1298	gx	11h29m17s	−04°24.1'		Leo	24"	m. buona / m. buono	è un piccola chiazza molto tenue che a 580x tende ad aggettare per 10" o 15" secondi a SE di una stellina abbastanza brillante.
Markarian 1320	gx	12h19m09s	−01°48.5'		Vir	24"	ottima / m. buono	molto piccola e debolissima, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di una decina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a 1' ESE — 450x.
Markarian 1342	gx	13h01m11s	−05°33.4'		Vir	24"	ottima / buono	relativamente facile, diffusa, molto allungata da NE a SW, di dimensioni 60"×20" e con piccolo bulge poco contrastato — 450x.
Markarian 1379A	gx	14h17m42s	−07°25.0'		Hya	24"	m. buona / mediocre	molto debole, poco diffusa e di luminosità pressoché uniforme, grosso modo rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è situata a ridosso E di NGC 5534 (altresì denominata **Mkn 1379**) con la quale forma una coppia interagente — 450x.
Markarian 1401	gx	02h48m48s	−00°06.5'		Cet	24"	m. buona / ottimo	molto debole, relativamente compatta rotonda con Ø di una 20-ina di secondi e con condensazione stellare appena percettibile — 450x.
Markarian 1404	gx	03h12m37s	−07°34.3'		Eri	24"	m. buona / scarso	piccola, relativamente compatta e condensata, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; è un po' disturbata dalla SAO 130350 di 9ª grandezza situata 4.5' a S — 340x.
Markarian 1422	gx	09h41m51s	+12°11.0'		Leo	24"	buona / ottimo	piccola, debole e con tenue condensazione centrale visibile a tratti, rotonda con Ø una 20-ina di secondi — 450x.
Markarian 1464	gx	11h55m57s	+43°35.5'		UMa	28"	m. buona / ottimo	piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina abbastanza brillante a un paio di primi verso E — 495x.
Markarian 1493	gx	14h52m54s	+60°07.8'		Dra	16"	ottima / ottimo	molto debole, compatta, rotonda con Ø max di 20"; si vede abbastanza facilmente a 380x.
Melotte 15	aa	02h32m42s	+61°27.4'	q 38	Cas	6"	discreta / buono	gruppo di stelle brillanti immerse in una chiazza lattescente (associata a IC 1805); una di queste si trova proprio nel mezzo. L'oggetto, altresì denominato **Collinder 26**, è facilmente osservabile col 20×80; La nebulosa nella quale è immerso è invece appena accennata. A 50' SSW (02h29.7m, +60°41') si trova un piccolo raggruppamento molto povero e disperso, costituito da una decina sì e no di componenti, che come nel caso di Frolov 1 è difficile stabilire se sia o meno un ammasso.
Melotte 71	aa	07h37m30s	−12°03.6'	q 274	Pup	6"	buona / buono	oggetto facile, di forma un po' irregolare, esteso 6' o 7'; si contano oltre 25 stelle a 60x; altresì noto come **Collinder 155**.
Melotte 72	aa	07h38m29s	−10°41.6'	q 274	Mon	6"	buona / buono	debole chiazza irrisolta ed estesa ~ 5'; altresì noto come **Collinder 156**.
Minkowski 1-92	np	19h36m19s	+29°32.8'	q 118	Cyg	24"	m. buona / m. buono	brillante e compatta, molto piccola, orientata da E a W con dimensioni 15"×10", poco più sfumata verso E; non aiuta il filtro O III; c'è una stella brillante quasi a ridosso verso W — 570x.
Minkowski 2-9	np	17h05m38s	−10°08.5'	q 292	Oph	24"	m. buona / m. buono	oggetto debole e poco diffuso, molto allungato da N a S con dimensioni 60"×20"; presenta una condensazione puntiforme abbastanza marcata (presumibilmente una stellina sovrapposta) verso il bordo meridionale; una debole stellina si trova a 1' NW. Sulla vecchia edizione dell'Uranometria è riportata con doppia numerazione PK 10+18.1 e -2 — 450x.
OΣ 461	ss	22h04m13s	+59°52.0'		Cep	24"	buona / discreto	nel cercatore 12x50 appare soltanto come un piccolo oggetto oblungo e serrato, ma osservando a 210x è in realtà costituito da 5 stelle brillanti, orientate da NNE a SSW su un'estensione di 7'; sono bianche tranne la componente più debole che possiede una tinta giallo-arancia.
Palomar 1	ag	03h33m21s	+79°35.0'		Cep	24"	buona / m. buono	piccola chiazza molto debole, a tratti irregolare, ma irrisolta anche a 580x; è grosso modo circolare ed estesa una 30-ina di secondi (era a mala pena visibile nel 16" a 380x).
Palomar 2	ag	04h46m06s	+31°22.8'	q 96	Aur	16"	m. buona / ottimo	è una debole chiazza rotonda con Ø di ~ 1', molto diffusa e a bassissimo gradiente; salta fuori facilmente in visione distolta a 270x; a 380x si nota, seppur a tratti, qualche tenuissimo nodulo all'interno.
Palomar 3	ag	10h05m31s	+00°04.3'		Sex	24"	ottima / buono	è una piccola chiazza debolissima, estesa meno di 30", che appare in visione distolta quasi a ridosso NE di una stellina; la visione non sembra migliorare spingendo a 450x.
Palomar 4	ag	11h29m17s	+28°58.4'	q 106	UMa	16"	m. buona / ottimo	è una chiazza indistinta di aspetto molto irregolare, debolissima, estesa forse più di 1'; a tratti, a 380x, sembra di vedere qualche tenuissimo "grumo" di luce.
Palomar 8	ag	18h41m30s	−19°49.5'		Sgr	16"	buona / scarso	debole, di luminosità uniforme, piuttosto irregolare, con dimensioni attorno a 1'; non si riesce a risolvere a 188x e non è possibile aumentare gli ingrandimenti a causa del seeing; c'è una stellina a ridosso verso S.
Palomar 10	ag	19h18m02s	+18°34.3'	q 161	Sge	16"	m. buona / ottimo	appare solo a tratti qualche elusivo cenno di lattescenza, ma non bisogna scendere sotto i 270x.
Palomar 12	ag	21h46m39s	−21°15.0'	q 346	Cap	16"	m. buona / ottimo	chiazza estremamente debole, estesa non più di 1' e situata subito a NNW di un piccolo triangolo serrato di stelline; una debolissima stellina verso il bordo NW forse non appartiene all'ammasso; meglio tuttavia scalare a 270x.
Palomar 13	ag	23h06m44s	+12°46.3'	q 213	Peg	24"	m. buona / buono	macchia molto debole, diffusa, irrisolta ed estesa oltre 1'; una doppia stretta a 2' scarsi verso E fa da riferimento; è situato all'interno di un piccolo triangolo isoscele molto allungato col vertice più acuto che punta a N e la cui base è ~ 1'; questo piccolo triangolo si nota facilmente e fissando lo sguardo sulla stellina al vertice N salta fuori l'ammasso che risulta meglio osservabile a 340x.
Pease 1	np	21h29m59s	+12°10.4'		Peg	16" 20"	m. buona / ottimo	alias PK 318+41.1, ossia la planetaria situata all'interno di M15 — la bontà del seeing permette di vedere in visione diretta a 380x un minuscolo oggetto leggermente nebuloso; in visione distolta lo si nota all'estremità di un nodulo luminoso che dal centro di M15 si protende verso NE; non ho notato alcun miglioramento scalando a 270x e utilizzando l'O III, anzi l'immagine mi sembrava più impastata. Era poco più evidente quando l'ho osservata nel 50 cm. di Michele Bini a circa 500x.
Picot 1	aster	14h14m58s	+18°32.7'		Boo	6"	buona / buono	è costituito da 7 stelline di magnitudo compresa tra la 9ª e l'11-esima grandezza e foggiate a guisa di un cappello a tesa larga orientato da NE a SW ed esteso una 20-ina di secondi ina di primi.
Pismis 24	aa	17h24m43s	−34°12.9'		Sco	10"	ottima / discreto	è un minuscolo asterismo di 4 stelline allineate fatto a "Y" molto stretta le quali sono le componenti più brillanti di un piccolo e insignificante ammasso stellare; a E di quest'ultimo si diparte verso S una stringa di 4 stelle brillanti della stessa luminosità estesa per circa mezzo grado.
Pismis-Moreno	aa	22h18m45s	+63°16.0'		Cep	24"	m. buona / m. buono	orientato da E a W ed esteso meno di 20', è costituito da una 15-ina di stelle principali che ricordano una imbarcazione a vela; la più brillante, situata sulla "chiglia", è una doppia con componenti distanti ~ 20" (denominata Σ2896) — 110x.
PK 3-17.1	np	19h05m36s	−33°11.6'	q 379	Sgr	16"	m. buona / m. buono	rimane di aspetto stellare anche a 270x; a tratti sembra di vedere un piccolissimo alone, ma è difficile capire se trattasi dell'inviluppo della planetaria o di un effetto di diffusione della stellina; s'individua facilmente a 132x con l'O III (riportata sul Megastar come ESO 397-2).
PK 7-6.2	np	18h28m00s	−26°06.8'	q 296	Sgr	16"	ottima / scarso	debole, molto piccola; a tratti appare leggermente sfuocata se si confronta con una stellina di luminosità simile situata una 20-ina di secondi a N (riportata sul Megastar come **ESO 522-27**) — 188x.
PK 9-9.1	np	18h44m43s	−25°21.5'	q 340	Sgr	16"	ottima / scarso	molto debole e piccola, ma a tratti, in visione distolta, appare chiaramente nebulosa; è situata a una 40-ina di secondi NNE di una stellina brillante (riportata sul Megastar come **ESO 523-6**) — 188x.
PK 11-5.1	np	18h29m11s	−21°46.9'	q 340	Sgr	16"	ottima / scarso	appare in visione indiretta come una stellina leggermente sfuocata; c'è una stella di egual magnitudo a una 30-ina di secondi verso N (riportata sul Megastar come **ESO 591-2**) — 188x.
PK 17-21.1	np	19h46m34s	−23°08.2'	q 342	Sgr	16"	buona / buono	molto debole è piuttosto estesa, in visione distolta appare poco allungata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 90"×60" e di luminosità pressoché uniforme; si osserva abbastanza facilmente a 100x con l'O III, ma rimane praticamente invisibile senza filtro. Alcune stelline brillanti punteggiano il campo oculare fra cui 3 componenti a NW poste ad arco; una debole stellina subito a SE della planetaria si può vedere a 188x, ma solo senza filtro (riportata sul Megastar come ESO 526-3).
PK 25-4.1	np	18h54m20s	−08°47.5'		Sct	16"	m. buona / ottimo	rimane di aspetto stellare anche a 380x; si riesce a scovare a 270x facendo passare l'O III davanti all'oculare: in questo modo diviene molto evidente (vedi); è riportata sul Megastar come Kohoutek 4-8.
PK 32-2.1	np	18h58m26s	−01°03.8'		Aql	24"	m. buona / ottimo	rimane di aspetto stellare anche a 450x, con una colorazione leggermente azzurrata che però si apprezza meglio scalando a 340x; 3 debolissime stelline allineate si notano a una 30-ina di secondi verso N (riportata sul Megastar come **Minkowski 1-66**).
PK 32-6.1	np	19h13m00s	−03°32.0'	q 251	Aql	24"	m. buona / ottimo	si vede, nella zona riportata dall'Uranometria, un vistoso triangolo il cui vertice meridionale è costituito da una stella arancione — la SAO 143142 di magnitudo 8.4 — mentre quelle che delimitano il cateto inferiore sono bluastre; in visione distolta attorno alla stella arancia, a 380x, appare in effetti una tenuissima nebulosità, più evidente rispetto a quella delle altre 2, ma è difficile escludere che si tratti di un semplice alone di diffusione. L'utilizzo dell'O III non aiuta a dirimere la questione.
PK 32-8.1	np	19h22m00s	−04°12.0'		Aql	24"	m. buona / ottimo	debolissimo lucore rotondo con Ø di una 40-ina di secondi e di luminosità uniforme; appare abbastanza facilmente in visione distolta a 340x; c'è una stellina al bordo settentrionale.
PK 33-5.1	np	19h10m26s	−02°20.4'	q 251	Aql	16"	ottima / ottimo	s'individua facilmente a 132x con l'O III; è una macchiolina rotonda, diffusa, di luminosità pressoché uniforme e del Ø di ~ 1'; senza filtro è di aspetto confuso, anche perché debolissime stelline a ridosso ne disturbano la visione pur osservando a 270x (riportata sul Megastar come Abell 55).
PK 36-1.1	np	19h02m00s	+02°09.4'		Aql	24"	m. buona / ottimo	tenue nebulosità molto diffusa e di aspetto un po' irregolare che circonda una stellina abbastanza brillante (che in realtà è doppia: c'è una debole componente verso N); allungata da N a S con dimensioni 2'×1'; la luminosità non è uniforme: più contrastata nella parte settentrionale e più diffusa in quella opposta; la visione con l'O III migliora sensibilmente, ma occorre scalare a 200x; in questo modo, però, la nebulosa è di aspetto più uniforme (riportata sul Megastar come **SH2-71**) — 340x.
PK 36+17.1	np	17h53m32s	+10°37.4'	q 204	Oph	16"	m. buona / buono	è una tenue chiazza diffusa e circolare, di luminosità pressoché uniforme e Ø di ~ 1.5'; si vede abbastanza facilmente a 132x e filtro O III; a 270x e senza filtro si vedono solo 3 debolissime stelline ravvicinate che in visione distolta paiono immerse in una in una tenuissima chiazza lattiginosa (ma potrebbe trattarsi di un effetto ottico — riportata sul Megastar come Abell 43).
PK 38-25.1	np	20h31m33s	−07°05.3'	q 298	Aql	16"	buona / ottimo	debole bolla circolare di luminosità uniforme e Ø di una 30-ina di secondi; è appena più evidente a 188x e filtro O III; c'è una stellina a 1' scarso verso SE (riportata sul Megastar come **Abell 70**).
PK 38+12.1	np	18h17m34s	+10°09.0'	q 204	Oph	16"	m. buona / buono	brillante, ma rimane stellare anche a 380x l'utilizzo dell'O III non è di alcun aiuto (se non quello di abbattere inutilmente il fondo cielo!); è riportata sul Megastar come **Cannon 3-1**.
PK 39-2.1	np	19h13m35s	+04°38.0'		Aql	24"	m. buona / ottimo	debole, di aspetto praticamente stellare anche a 340x; solo a 450x appare leggermente diffusa; c'è una stellina appena percettibile a ridosso verso E (riportata sul Megastar come **Minkowski 2-47**).
PK 43-13.1	np	19h58m27s	+03°03.0'		Aql	24"	m. buona / ottimo	è un debolissimo chiarore circolare di luminosità uniforme e con Ø di 1' scarso; appare in visione distolta a 340x (riportata sul Megastar come **Abell 67**).
PK 44-9.1	np	19h45m35s	+05°33.9'		Aql	24"	m. buona / ottimo	molto diffusa e di luminosità pressoché uniforme grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; c'è una stellina al bordo N e un'altra quasi a ridosso verso NE — 340x.
PK 47-4.1	np	19h33m18s	+10°37.1'	q 207	Aql	16"	m. buona / ottimo	è una debolissima chiazza lattiginosa, estesa oltre 1' e di aspetto molto confuso, immersa in un campo molto ricco; appare tuttavia solo a 132x con l'O III (riportata sul Megastar come Abell 62).
PK 49-88.1	np	12h59m28s	+27°38.6'		Com	16"	buona / buono	rimane stellare anche a 380x, poco più brillante della stellina situata 3' a E (riportata sul Megastar come **Haro 4-1**).
PK 51-9.1	np	18h49m48s	+20°50.6'	q 160	Her	16"	m. buona / ottimo	è brillante, ma rimane di aspetto stellare anche a 380x; appena più luminosa della stellina situata 1.5' SSW e di tonalità più giallognola.
PK 52-2.2	np	19h39m10s	+15°56.7'	q 207	Aql	10"	buona / buono	relativamente brillante, puntiforme a 60x; a 240x sembra costituita da 2 nuclei molto ravvicinati lungo la congiungente N-S (riportata sul Megastar come **Henize 2-441**).
PK 53+24.1	np	17h54m23s	+27°59.9'	q 159	Her	16"	m. buona / ottimo	è brillante, ma rimane di aspetto stellare anche a 380x; sembra "accendersi" con l'O III a 270x (riportata sul Megastar come Vyssotsky 1-2).
PK 55+2.1	np	19h23m25s	+21°08.0'	q 161	Vul	16"	m. buona / ottimo	assieme a PK 55+2.2 forma una coppia di debolissime macchioline che a 380x appaiono diffuse, con Ø di 10"-15"; la 2ª è forse appena più evidente; a 1.5' E della 1ª c'è una doppia stretta molto debole; la visione migliora a 270x con l'O III, ma mentre la 1ª rimane di fatto diffusa, la 2ª diviene di aspetto stellare (quest'ultima non è però riportata sulla Uranometria, mentre è riportata sul Megastar come Henize 2-432).
PK 55+2.2	np	19h23m47s	+21°06.6'		Vul	16"	m. buona / ottimo	v. **PK 55+2.1** (riportata sul Megastar come **Henize 2-433** o **Henize1-1**).
PK 55+16.1	np	18h31m19s	+26°56.2'	q 160	Lyr	16"	discreta / buono	è molto debole e si riesce a vedere solo a 132x con l'O III; è una bolla circolare di luminosità uniforme e del Ø di ~ 1' (riportata sul Megastar come Abell 46).
PK 56-6.1	np	20h02m36s	+17°36.8'		Sge	24"	m. buona / ottimo	molto piccola, diffusa e condensata, rotonda con Ø una decina di secondi; allineata con 3 stelline in direzione NE-SW: quella a SW è più brillante della coppia situata dalla parte opposta (riportata sul Megastar come **Kohoutek 3-51**) — 450x.
PK 58+6.1	np	19h17m06s	+25°37.6'	q 161	Vul	16"	buona / ottimo	appare abbastanza facilmente in visione distolta, ma solo utilizzando l'O III e scalando a 188x; ha un Ø di 35"-40" ed è situata a ~ 1' NW di una stellina brillante; non si riesce a intravedere senza filtri, neppure abbassando ulteriormente gli ingrandimenti (riportata sul Megastar come **Abell 57**).
PK 59-18.1	np	20h50m02s	+13°33.5'	q 209	Del	16"	buona / buono	è una debolissima chiazza lattiginosa, approssim. rotonda, ma visibile solo in visione distolta con l'O III; a 132x sembra allungata da E a W, arrivando a inglobare la stella brillante situata un paio di primi a W; a 188x è molto difficile da vedere col filtro, ma è di dimensioni più contenute, con un Ø di ~ 1.5' (riportata sul Megastar come Abell 72).
PK 61+41.1	np	16h40m18s	+38°42.3'		Her	16"	buona / ottimo	relativamente brillante, ma rimane di aspetto stellare anche a 380x; c'è una stellina molto debole a ~ 45" SW.
PK 64+5.1	np	19h34m45s	+30°31.0'	q 118	Cyg	16"	m. buona / ottimo	molto brillante, di una decina di secondi con Ø; a 380x si vede facilmente la stellina centrale; pare immersa in un tenuissimo alone, ma trattasi quasi certamente di un effetto ottico; c'è una stellina a ~ 40" verso S (riportata sul Megastar come **Henize 2-438**).
PK 64+15.1	np	18h50m02s	+35°14.5'	q 117	Lyr	16"	m. buona / ottimo	facile, compatta rotonda, di luminosità uniforme e bordi definiti; ha un Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso verso N (riportata sul Megastar come **Minkowski 1-64**) — 380x.
PK 65-5.1	np	20h17m21s	+25°21.7'		Vul	24"	m. buona / ottimo	chiazza molto debole, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi (riportata sul Megastar come **Henize 1-6**) — 450x.
PK 66-5.1	np	20h19m38s	+27°00.1'		Vul	24"	m. buona / ottimo	relativamente brillante, ma di aspetto quasi stellare anche a 450; occorre forzare a 580x per riuscire a discernere un minuscolo dischetto del Ø di pochi secondi (riportata sul Megastar come **Henize 1-7**) — 450x.
PK 68-0.1	np	20h04m44s	+31°27.3'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	debolissima, appare soltanto in visione distolta a 400x, forse rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; meglio senza filtro; con l'O III a 200x è osservabile, ma è difficile capire se trattasi della planetaria o di quella stellina appena percettibile situata subito a S (riportata sul Megastar come **Minkowski 1-75**).
PK 68+1.1	np	19h56m34s	+32°22.2'		Cyg	24"	buona / buono	appena percettibile, rimane di aspetto stellare anche a 570x; è situata quasi a ridosso verso S di un piccolo triangolo ottusangolo esteso una 30-ina di secondi; è poco meglio osservabile a 210x con filtro O III (riportata sul Megastar come **Kohoutek 4-41**).
PK 68+1.2	np	19h59m18s	+31°54.6'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	è relativamente facile a 200x con l'O III; anzi, in questo caso il filtro è importante, in quanto smorza la luce di una stellina brillante situata al bordo SE; il filtro in questo caso regge bene anche a 400x: la planetaria è rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; di aspetto un poco più confuso senza filtro a 570x (riportata sul Megastar come **Henize 1-4**).
PK 68+14.1	np	19h00m27s	+38°21.1'		Lyr	16"	m. buona / ottimo	è di aspetto quasi stellare anche a 380x (il Ø non dovrebbe di fatto essere superiore ai 4" o 5") e brillante come la stellina situata 2' a W; salta fuori facilmente con l'O III a 270x (riportata sul Megastar come Shapley 4-1).
PK 69-3.1	np	20h21m59s	+29°59.3'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	debolissima, appare a momenti a 400x senza filtro, estesa non più di 10" (riportata sul Megastar come **Kohoutek 3-58**).
PK 69+3.1	np	19h50m00s	+33°45.9'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	debolissima chiazza estesa una 20-ina di secondi osservabile in visione distolta a 400x; è situata subito a E di un piccolo semicerchio formato da 5 stelline, 3 delle quali abbastanza brillanti (riportata sul Megastar come **Kohoutek 3-46**).
PK 71-2.1	np	20h21m04s	+32°29.3'	q 120	Cyg	24"	buona / ottimo	è facile da vedere, ma rimane di aspetto stellare anche a 570x; non serve l'O III (riportata sul Megastar come **MInkowski 3-35**).
PK 72+0.1	np	20h12m48s	+34°20.5'		Cyg	24"	buona / ottimo	molto debole, di aspetto stellare con l'O III a 200x; solo leggermente diffusa a 570x, ma con Ø inferiore a 10"; una stellina appena percettibile appare solo a momenti a una 30-ina di secondi verso S (riportata sul Megastar come come **Kohoutek 3-57**).
PK 75+4.1	np	20h04m16s	+39°35.5'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	è una macchiolina elusiva che appare solo a momenti in visione distolta a 450x; l'ho tentata senza successo col filtro a 200x (forse eventuali debolissime stelline sovrapposte tendono a mascherarne l'effetto); non dovrebbe essere più estesa di 20".
PK 75+35.1	np	17h13m51s	+49°16.1'		Her	24"	m. buona / ottimo	presenta una brillante stellina centrale circonfusa da un tenue alone molto piccolo con Ø di una 10-ina di secondi; il filtro O III la rende solamente più compatta e di aspetto più uniforme (riportata sul Megastar come **Sanduleak 4-1**) — 450x.
PK 80-6.1	np	21h02m19s	+36°41.7'	q 121	Cyg	16"	m. buona / ottimo	brillante e compatta, con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina ben evidente a ridosso verso S; entrambe sembrano immerse in un alone (probabile effetto ottico); stranamente la visione sembra peggiorare scalando a 270x e impiegando l'O III.
PK 81-14.1	np	21h35m29s	+31°41.7'	q 121	Cyg	10"	buona / buono	estremamente debole, estesa per oltre 1' e visibile con gran difficoltà a 60x con filtro O III; è disturbata dalla luce di alcune stelline vicine fra cui una abbastanza brillante situata 3' a SSW e una debole praticamente a ridosso verso NE (riportata sul Megastar come **Abell 78**).
PK 85+4.1	np	20h32m23s	+47°20.9'	q 85	Cyg	16"	ottima / mediocre	è un debolissimo lucore di forma indistinta, esteso per ~ 1.5' visibile solo a tratti in visione distolta a 132x con l'O III; c'è una coppia di stelle a ridosso verso S; una doppia stretta si trova appena più a N (riportata sul Megastar come Abell 74 o SH2-116).
PK 86-8.1	np	21h33m08s	+39°38.2'	q 86	Cyg	10"	buona / buono	relativamente brillante, leggermente allungata da N a S, con dimensioni 25"×20"; c'è una debolissima stellina a ridosso verso SE — 240x.
PK 89-0.1	np	21h14m07s	+47°46.4'	q 86	Cyg	16"	ottima / mediocre	è molto debole a 270x e appare come una sorta di baffo indistinto che si diparte verso NW da una stellina; a 132x con l'O III è poco più evidente, allungata da NW a SE, di dimensioni 60"×30" e di luminosità uniforme, ma la stellina non è più visibile.
PK 93-2.1	np	21h37m02s	+48°56.0'	q 86	Cyg	16"	buona / discreto	debole, orientata da E a W con dimensioni 40"×30", molto diffusa e di luminosità uniforme; è situata a ridosso di un piccolo triangolo rettangolo isoscele di stelline; una di queste, molto debole, si trova a ridosso verso W. questa planetaria era già stata osservata col 25 cm in condizioni di trasparenza migliori: si vedeva con una certa facilità a 60x e filtro O III, anche se mi era apparsa rotonda con Ø di una 30-ina di secondi (riportata sul Megastar come **Minkowski 1-79**) — 188x.
PK 94+27.1	np	18h21m52s	+64°21.9'		Dra	24"	ottima / m. buono	debolissimo lucore molto diffuso, approssim. circolare con Ø di oltre 1'; appare solamente in visione distolta col filtro O III, ma occorre scalare a 210x; è situata all'interno di un pentagono abbastanza regolare formato da 5 stelline brillanti; al centro del pentagono ce n'è una sesta che lambisce la planetaria a E; la stellina centrale, bianco-azzurra, è facile da vedere senza filtro, ma diventa appena percettibile con l'O III (riportata sul Megastar come **Kohoutek 1-16**).
PK 95+7.1	np	20h56m27s	+57°26.0'	q 56	Cep	28"	buona / ottimo	è un debolissimo lucore approssim. circolare con Ø di 1' scarso, ma appare con grande difficoltà a 495x; è poco meglio evidente a 179x con filtro O III; c'è una debole stellina subito a N (riportata sul Megastar come **Abell 73**).
PK 100-8.1	np	22h31m44s	+47°48.0'		Lac	24"	m. buona / ottimo	è abbastanza brillante, ma rimane di aspetto pressoché stellare anche a 580x con filtro O III; c'è una doppia stretta e piuttosto sbilanciata quasi a ridosso NW (riportata sul Megastar come Merrill 2-2).
PK 102-5.1	np	22h34m45s	+52°26.2'	q 58	Lac	28"	m. buona / m. buono	è una chiazza che appare elusivamente in visione distolta a 179x con filtro O III; più che altro sembra formata da due "baffi" orientati da N a S e distanti grosso modo un paio di primi in direzione E-W (quello a W è appena più evidente); la zona interna è finemente screziata dalla probabile presenza di alcune stelline al limite della visibilità che si riescono a risolvere individualmente solo spingendo a 495x (ma previa rimozione del filtro); è altresì riportata sul Megastar come **Abell 80**. Lo ⇒ schizzo, opportunamente rinormalizzato ed enfatizzato per chiarezza, è stato effettuato a 179x col filtro.
PK 104-1.1	np	22h32m18s	+56°10.4'		Lac	28"	buona / ottimo	è un debole dischetto grigiastro e uniforme con Ø di una 20-ina di secondi; è facilmente visibile anche senza il filtro (riportata sul Megastar come **Minkowski 2-53**) — 495x.
PK 104-6.1	np	22h51m39s	+51°50.6'		Lac	28"	buona / ottimo	piccolo alone molto tenue che circonda una stellina brillante; non sembra trattarsi di un effetto di riverberazione, perché a 1' verso W c'è un'altra stellina poco più brillante e osservandole entrambe con l'O III attorno a quest'ultima non si vede niente — 495x.
PK 104-29.1	np	23h35m54s	+30°28.0'	q 124	Peg	10"	discreta / buono	estesa, con Ø di 5', molto stemperata sul fondo cielo, di aspetto confuso e disuniforme in brillanza; osservando a 60x col filtro O III appare come una sorta di anello irregolare, scuro all'interno, ma frammentato, con un paio di deboli rinforzi luminosi a N e a S (riportata sul Megastar come **Jones 1**).
PK 107-2.1	np	22h56m20s	+57°09.3'	q 58	Cep	28"	buona / ottimo	piccolo dischetto grigiastro relativamente compatto e brillante con Ø di una 10-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a E; simmetricamente a questa, verso E, c'è una stellina di luminosità più o meno uguale alla planetaria (riportata sul Megastar come **Minkowski 1-80**) — 495x.
PK 107-13.1	np	23h22m58s	+46°54.0'	q 88	And	16"	discreta / m. buono	è un oggetto brillante nel quale, a 380x, si nota la stellina centrale come una sorta di condensazione puntiforme abbastanza marcata; appare di aspetto diffuso anche a 270x, ma è molto piccola, con Ø di una 10-ina di secondi (riportata sul Megastar come Vyssotsky 2-3).
PK 111-2.1	np	23h26m15s	+58°10.9'	q 58	Cas	28"	m. buona / m. buono	piccolo dischetto molto brillante esteso sì e no una 10-ina di secondi; c'è una stellina brillante a 1' E; una coppia di deboli stelline si trova tra questa e la planetaria (riportata sul Megastar come **Hubble 12**) — 495x.
PK 116-8.1	np	23h31m51s	+70°22.3'	q 15	Per	16"	ottima / m. buono	è una bolla perfettamente rotonda, ben definita ai bordi, di luminosità uniforme e del Ø di 40"; a 132x la visione migliora con l'O III, mentre il filtro non è particolarmente utile a 270x ; a 380x è meglio la visione naturale, ma la planetaria appare molto debole; c'è una stellina a 1' verso E e un'altra più brillante un paio di primi a NE (riportata sul Megastar come Minkowski 2-55).
PK 122-4.1	np	00h45m35s	+57°57.6'	q 37	Cas	16"	ottima / ottimo	facilmente visibile con l'O III a 132x; a 270x, senza filtro, appare debole, diffusa, di luminosità uniforme e Ø poco superiore ai 30" (la stima è stata effettuata in riferimento alla separazione di quel piccolo terzetto di stelline situato 9' a E); c'è una stellina a ridosso SW (riportata sul Megastar come Abell 2).
PK 124+10.1	neb	01h07m13s	+73°33.0'	q 37	Cas	24"	buona / m. buono	**supernova remnant** — è un debolissimo lucore diffuso e di forma indistinta, esteso un paio di primi (ossia delle dimensioni del piccolo trapezio di stelline brillanti situato subito a NW); è osservabile col filtro O III a 210x; senza filtro sembra di intravederlo solo a momenti tra il trapezio di cui sopra e una coppia di stelle di 11-esima a SE della nebulosa.
PK 125-47.1	np	00h59m54s	+15°44.0'		Psc	24"	m. buona / buono	debolissima, solo in visione distolta è possibile scorgere la parte più interna estesa meno di 1' e delimitata da una stellina brillante a ridosso verso E e da un'altra debole alla parte opposta; occorre tuttavia l'O III senza andare oltre 200x; c'è un piccolo trapezio irregolare a pochi primi NW.
PK 131+2.1	np	02h12m07s	+64°09.0'	q 17	Cas	16"	ottima / ottimo	è un debolissimo oggetto rotondo di max 30" con Ø situato a ridosso W di una doppia abbastanza stretta dalle componenti sbilanciate; appare solo in visione distolta a 132x con l'O III; a 270x col filtro si vede solo a tratti, ma la visione, spinta al limite, è molto confusa (riportata sul Megastar come SH2-189).
PK 144-15.1	np	02h45m24s	+42°33.0'		Per	24"	m. buona / m. buono	debole, ma facile da vedere a 340x, relativamente compatta, rotonda con Ø < 30"; appare poco più contrastata con l'O III, ma rimane comunque di luminosità uniforme. È altresì nota come **Abell 4**, è situata 40' scarsi a ESE di M34 (q 62).
PK 158+17.1	np	06h19m34s	+55°36.7'	q 41	Lyn	16"	ottima / mediocre	si vede facilmente, ma è molto piccola, appena diffusa a 270x; a 380x pare orientata da NW a SE con dimensioni ~ 12"×6"; l'O III non è di alcun aiuto.
PK 164+31.1	np	07h57m52s	+53°25.3'	q 43	Lyn	24"	ottima / ottimo	a 210x con l'O III è distintamente formata da due lobi nettamente separati in direzione NW-SE e di aspetto simile; qualche debole stellina ammicca qua e la nella parte interna scura, anche se non si vede quella centrale; senza filtro è ancora ben visibile, ma è di aspetto più uniforme, anche a causa delle numerose stelline che saltano fuori; si tratta di un oggetto globalmente circolare con Ø di ~ 6' (era osservabile col filtro anche nel 10" a 46x, solo con una vaga ombreggiatura all'interno).
PK 166-6.1	np	04h42m54s	+36°06.8'		Aur	16"	m. buona / m. buono	elusiva, appare solo a tratti in visione distolta a 380x, ma la vedo stellare.
PK 167-9.1	np	04h36m37s	+33°39.5'		Per	24"	ottima / m. buono	è di aspetto stellare anche a 450x, poco più brillante della stellina situata una 30-ina di secondi a WSW; riportata sul Megastar come **Kohoutek 3-66**.
PK 171-25.1	np	03h53m36s	+19°29.6'	q 132	Tau	28"	m. buona / ottimo	appare facilmente a 179x con filtro O III, perfettamente rotonda con Ø di 45"; a 495x senza filtro è soltanto un debolissimo lucore approssim. circolare e situata tra una coppia di deboli stelline a ridosso NW e SE.
PK 173-5.1	np	05h07m08s	+30°49.4'	q 97	Aur	10"	buona / buono	grosso modo rotonda con Ø di un paio di primi, di luminosità uniforme, ben visibile a 60x assieme al filtro O III, anche se appare di aspetto uniforme; è comunque difficile capirne la struttura perché il campo è molto ricco di stelline che interferiscono con l'osservazione; 2 di queste tendono a delimitarla a N e S; erroneamente riportata sull'Uranometria come **LBN 809**, mentre sul Megastar è siglata anche **Kohoutek 2-1**.
PK 189+7.1	np	06h37m21s	+24°00.6'	q 137	Gem	16"	ottima / ottimo	relativamente brillante e compatta, rotonda con Ø inferiore a 30"; a tratti screziata se osservata a 380x (riportata sul Megastar come **Minkowski 1-75**).
PK 190-17.1	np	05h05m34s	+10°42.4'	q 180	Ori	16"	buona / ottimo	è un oggetto brillante, ma bisogna spingere a 380x per scoprire che non è proprio stellare: una stellina bluastra circonfusa da un piccolissimo e tenue alone esteso per una 20-ina di secondi e orientato da N a S (a 270x l'effetto si nota molto meno); insomma, potrebbe apparire come una stella in una notte di seeing mediocre (riportata sul Megastar come Jonckheere 320).
PK 193-9.1	np	05h40m45s	+12°21.3'		Ori	16"	ottima / ottimo	bella e facile a 380x, perfettamente rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; la stellina centrale è evidente; c'è una molto debole a ridosso verso W (riportata sul Megastar come **Haro 3-75**).
PK 194+2.1	np	06h25m57s	+17°47.4'	q 137	Gem	10"	buona / discreto	è abbastanza brillante e di un colore azzurro intenso; tuttavia tende a rimanere di aspetto stellare anche a 178x; soltanto a 240x appare come un minuscolo dischetto dai contorni netti e con una stellina a ridosso esattamente a S (riportata sul Megastar e sul Tirion come **Jonckheere 900**).
PK 198-6.1	np	06h02m20s	+09°39.2'		Ori	24"	m. buona / m. buono	è un oggetto facile a 340x con filtro O III, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi e di aspetto uniforme; appare a momenti leggermente screziata; senza filtro tende a essere sommersa dall'intenso alone della μ Ori di 4ª grandezza, ma anche spingendo a 450x la visione non sembra migliorare gran che (già precedentemente osservata nel 16" a 270x in una notte con ottime condizioni di visibilità); è riportata sul Megastar come Abell 12.
PK 204-8.1	np	06h04m48s	+03°56.6'	q 226	Ori	24"	buona / mediocre	debolissimo lucore di forma indistinta esteso un paio di primi scarsi, più evidente verso W in corrispondenza di una debole stellina; appare a tratti in visione distolta a 280x; stranamente l'utilizzo dell'O III non si è rivelato di alcuna utilità (riportata sul Megastar come **Abell 13**).
PK 205-26.1	np	05h03m42s	−06°10.1'		Eri	24"	m. buona / m. buono	è abbastanza brillante, ma rimane praticamente di aspetto stellare anche a 580x; appare solo un poco più evidente a 450x col filtro O III.
PK 205+14.1	np	07h29m04s	+13°34.9'	q 184	Gem	16"	ottima / buono	molto bella a 100x con filtro O III, rotonda con Ø di una decina di primi; in visione distolta sembra tagliata quasi a metà verso NW mostrando chiaramente 2 cuspidi a mo' di crescente lunare; in visione diretta l'effetto è meno evidente. A 132x senza filtro appare solo un'estesa nebulosità irregolare e fratta in un campo abbastanza ricco di stelline (riportata sul Megastar come Abell 21 o SH2-274).
PK 210+1.1	np	06h53m34s	+03°08.4'		Mon	24"	m. buona / discreto	compatta e relativamente brillante, poco allungata da E a W con dimensioni 25"×20"; decisamente più contrastata a 340x con filtro O III (riportata sul Megastar come **Minkowski 1-8**).
PK 212+4.1	np	07h05m19s	+02°46.9'		Mon	16"	m. buona / ottimo	rimane di aspetto stellare anche a 380x (a tratti sembra, in verità, di vederla leggermente sfuocata, ma potrebbe solo trattarsi di...autosuggestione); è riportata sul Megastar come **Minkowski 1-9**.
PK 214+7.1	np	07h22m58s	+01°45.6'	q 229	CMi	16"	ottima / discreto	a 100x con filtro O III appare come una chiazza un poco irregolare, ma approssim. rotonda con Ø di ~ 1'; a 270x senza filtro è solo un diffuso lucore con alcune stelline sovrapposte (riportata sul Megastar come Abell 20).
PK 215+11.1	np	07h36m08s	+02°42.4'		CMi	16"	m. buona / ottimo	è un debolissimo lucore approssim. rotondo di ~ 1.5' con Ø che appare solo in visione distolta a 132x con filtro O III, a ridosso W di una stellina (riportata sul Megastar come **Abell 22**).
PK 217+2.1	np	07h06m51s	−03°05.2'		Mon	24"	m. buona / discreto	debole, relativamente compatta e di luminosità uniforme, diviene molto facile a 340x con filtro O III, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi; c'è una stellina brillante a poco più di 30" W (riportata sul Megastar come **Abell 24**).
PK 217+14.1	np	07h51m39s	+03°00.5'	q 230	CMi	16"	ottima / ottimo	è una planetaria elusiva! Grazie alla bellissima serata sono riuscito a vedere, in visione distolta a 132x, solo la parte orientale — evidentemente più brillante — aiutandomi però col filtro deepsky; con l'O III non sono stranamente riuscito a vedere nulla; la porzione intravista era una chiazza approssim. circolare con Ø di ~ 4' e di luminosità uniforme (riportata sul Megastar come **Steph 3-1**).
PK 219+31.1	np	08h54m13s	+08°54.0'		Cnc	6"	m. buona / scarso	debolissima nebulosa visibile a tratti in visione laterale a 30x e filtro O III; appare come una chiazza lattescente di forma indistinta anche per il fatto che il campo è molto ricco di stelline che disturbano; è comunque estesa all'incirca come la Helix! (riportata sul Megastar come **Abell 31** o **SH2-290**).
PK 231+4.1	np	07h42m04s	−14°21.3'	q 274	Pup	24"	ottima / ottimo	molto debole, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina al bordo SW facilmente visibile a 340x; la planetaria appare poco più evidente e contrastata a 160x con filtro O III, ma la stellina di cui sopra non si vede (riportata sul Megastar come **Minkowski 1-18**).
PK 232-1.1	np	07h21m15s	−18°08.6'		CMa	24"	m. buona / ottimo	brillante e relativamente compatta, di luminosità uniforme, a prima vista rotonda, ma forzando a 570x appaiono come 2 tenui anse a N e a S che tendono ad allungarla leggermente; appare quindi di dimensioni 25"×20" (riportata sul Megastar come **ESO 559-6** o **Minkowski 1-13**).
PK 232+5.1	np	07h48m04s	−14°07.7'		Pup	24"	ottima / ottimo	rimane stellare anche a 570x; c'è una stellina di eguale luminosità una 30-ina di secondi a N; non aiuta l'utilizzo del filtro O III.
PK 238+34.1	np	09h39m09s	−02°48.5'	q 233	Hya	24"	buona / m. buono	è grosso modo rotonda con Ø > 3'; in visione distolta appare all'interno una tenue macchia scura di forma un po' irregolare; c'è una doppia stretta molto debole al bordo NW; a quello S ce n'è un'altra (di fatto forma un piccolo triangolo con la doppia precedente); al brodo W ce n'è una terza; la visione migliore si ottiene a 110x e filtro O III; è osservabile la stellina centrale, ma occorre rimuovere il filtro e aumentare gli ingrandimenti; è riportata sul Megastar come **Abell 33**.
PK 318+41.1	np	13h40m41s	−19°53.0'	q 331	Vir	16"	buona / buono	è un debolissimo alone grosso modo rotondo, di ~ 4' con Ø che circonda una stellina abbastanza brillante (per confronto, la stella situata 10' a NE, che è poco più brillante, ne è priva); la dimensione della nebulosa, tuttavia, si contempla solo in visione distolta, ma bisogna utilizzare l'O III: senza filtro è totalmente invisibile! È riportata sul Megastar come **Abell 36** o **ESO 577-24** — 132x.
Pothier 10	aster	19h47m36s	+18°49.3'		Sge	24"	ottima / buono	gruppo di oltre una 20-ina di stelle a forma di rombo, orientato da N a S con dimensioni 4'×2'; più che altro la forma è dettata dalle 4 stelle più luminose situate ai rispettivi vertici della losanga — 210x.
RCW 127	neb	17h19m55s	−35°50.0'	q 376	Sco	10"	ottima / discreto	nebulosa "zampa di gatto" — è molto debole, ma diviene più semplice impiegando l'O III assieme al 18 mm. (60x) di modo da avere ~ 1° di campo; appaiono allora con una certa facilità, in visione laterale, le quattro caratteristiche chiazze più luminose (è riportata sull'Uranometria, forse erroneamente, come NGC 6334)
Roslund 4	aa	20h04m50s	+29°12.6'		Cyg	24"	buona / buono	è un insieme alquanto disomogeneo di stelline fra le quali si nota un piccolo terzetto di componenti di 12-esima allineato da NW a SE; alcune di queste stelline sono associate alle piccole nebulose IC 4954 e -5.
Roslund 5	aa	20h10m00s	+33°46.0'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	gruppo relativamente esteso e disperso di una 20-ina di stelle brillanti e molte altre più deboli; a 110x l'oggetto occupa praticamente tutto il campo dell'oculare e diviene pertanto difficile stabilirne i confini (anche perché immerso in una zona molto ricca).
Ruprecht 1	aa	03h36m25s	−14°09.0'		CMa	24"	ottima / m. buono	gruppo di una 15-ina di stelle poste ad aquilone (può addirittura far venire in mente una ciaspola), orientato da NW a SE ed esteso una decina di primi; è però difficile stabilire se le componenti più esterne — sia le 3 brillanti formanti un piccolo triangolo rettangolo a NW, sia quella al vertice opposto — ne facciano o meno parte; probabilmente l'ammasso vero e proprio è formato da quella decina di stelle al centro di forma grosso modo circolare.
Ruprecht 21	aa	07h27m06s	−31°10.0'	q 361	Pup	10"	ottima / ottimo	gruppo disperso di forma assai irregolare di una 15-ina di stelle che circondano una stella brillante posta al centro.

Ruprecht 37	aa	07h49m47s	−17°14.8'		Pup	24"	ottima / ottimo	è immerso nei bagliori della 6 Puppis di 5ª grandezza e di un bel colore arancio; spicca un piccolo triangolo molto allungato in direzione NNE-SSW, mentre a SW di questo notasi un altro piccolo triangolo molto serrato di stelline deboli che a prima vista, operando a bassi ingrandimenti, potrebbe essere scambiato per un piccolo oggetto nebuloso; altre 5 o 6 deboli stelline si trovano immerse nell'alone (non riportato sulla Uranometria) — 450x.
Ruprecht 55	aa	08h12m19s	−32°34.0'	q 362	Pup	10"	ottima / ottimo	gruppo disperso di una dozzina di stelle abbastanza brillanti fra cui ne risalta una molto luminosa presso W.
Ruprecht 62	aa	08h32m30s	−19°39.8'	q 321	Pyx	24"	buona / ottimo	piccolo gruppo disperso di una dozzina di stelle abbastanza brillanti e alcune altre più deboli; c'è una doppia debole e serrata al "margine" SE; l'ammasso è comunque poco evidente sul fondo cielo anche scalando a 200x.
Ruprecht 145	aa	18h50m19s	−18°12.0'	q 321	Sgr	10"	buona / buono	è un gruppo disperso di una 50-ina di stelle di luminosità a prima vista abbastanza uniforme (salvo una molto brillante al bordo NE), sparse su un'area estesa una 30-ina di primi; è poco distinguibile dall'intenso background stellare ed è ovviamente meglio visibile a 60x.
Ruprecht 157	aa	08h28m52s	−19°05.8'	q 321	Pyx	24"	buona / ottimo	gruppo irregolarmente disperso di una 30-ina di stelle a grande range di luminosità; a 200x sembra allungato da N a S, con dimensioni grosso modo di 15'×10', anche se non si stacca gran che dal fondo cielo; ci sono 2 coppie serrate verso W.
Ruprecht 173	aa	20h41m48s	+35°33.0'	q 120	Cyg	6"	buona / buono	gruppo molto disperso di stelle brillanti facilmente visibile nel cercatore 6×30, le cui 8 più luminose formano una "x" sbilenca.
SH2-54	neb	18h19m43s	−12°04.0'	q 294	Ser	10"	m. buona / buono	è un'ampia zona di luminosità irregolare costituita da chiazze e noduli luminosi; è molto diffusa nella parte meridionale e più netta verso W; a 63 con l'O III è abbastanza evidente una zona curva a NW.
SH2-90	neb	19h49m12s	+26°50.8'	q 162	Vul	24"	ottima / buono	è una debolissima chiazza estesa, di aspetto confuso, solo a tratti leggermente arcuata con concavità rivolta verso E; la visione risulta tuttavia molto difficile a causa della presenza di numerose stelline sovrapposte; ho effettuato alcune prove col deepsky, l'O III e l'H-β (ossia a banda progressivamente più ristretta), ma tutto sommato la visione migliore si ha rimuovendo ogni filtro e scalando a 210x.
SH2-100	neb	20h00m54s	+33°29.4'		Cyg	24"	buona / ottimo	elusiva chiazza di aspetto indistinto, salta fuori a momenti a 200x con filtro O III, ma tende a confondersi col fine polverio di stelline presenti; dovrebbe costituire una sorta di propaggine occidentale della 6857. La denominazione potrebbe tuttavia riferirsi a quel debolissimo lucore esteso una 30-ina di secondi, situato una decina di primi a W, che avviluppa una stellina; non può trattarsi di un effetto di diffusione, in quanto a 1' SE di quest'ultima ce n'è un'altra poco più brillante, ma che in visione distolta non presenta alcuna traccia di nebulosità intorno; l'oggetto è comunque meglio evidente senza filtro a 400x.
SH2-101	neb	19h59m55s	+35°21.0'	q 119	Cyg	24"	buona / ottimo	si nota dapprima un triangolo molto allungato formato da 2 componenti molto brillanti color ambra distanti distanti 6' in direzione NE-SW e una poco più debole bianco-azzurra distante 1.5' da quella a SW; attorno a queste 2 c'è la parte più cospicua della nebulosa che si evidenzia maggiormente a 200x col filtro O III; un alone molto debole si nota anche attorno alla stella di NE; un'ulteriore debolissima banda estesa da E a W si trova a ~ 4' verso S dalla coppia precedente.
SH2-130	neb	20h43m25s	+63°13.2'		Cep	24"	m. buona / discreto	sorta di debolissimo lucore indistinto che, quasi non bastasse, è pure disturbato dalla SAO 19003 di 7ª grandezza situata a ridosso S; in visione distolta appare tuttavia solo la parte attorno a una stellina appena percettibile situata a sua volta a 1.5' NE della suddetta SAO (si veda la → figura nella quale la stellina è indicata dalla freccia); una doppia stretta dalle componenti molto deboli dànno a prima vista l'impressione di un nodulo marginale — 340x.
SH2-138	neb	22h32m44s	+58°28.4'		Cep	28"	buona / ottimo	debolissima chiazza situata a ridosso SW di una stellina brillante; a 495x appare grosso modo rotonda con Ø di una 40-ina di secondi; tuttavia è poco meglio visibile scalando a 179x con filtro O III.
SH2-139	neb	22h35m04s	+58°13.5'		Cep	28"	m. buona / m. buono	si nota soltanto un piccolo ed elusivo lucore esteso sì e no 1' e che in visione distolta sembra aggettare a SE di una coppia di stelline; situato 3' a NE della SAO 34580 di 7ª grandezza che ne disturba la visione; occhio a non farsi ingannare da una stringa di debolissime stelline appena percettibili, ma a mala pena risolvibile a 495x, che si trova subito a S.
SH2-140	neb	22h19m00s	+63°17.5'		Cep	24"	m. buona / m. buono	debolissima chiazza estesa ~ 5' e orientata da NW a SE; si nota probabilmente per contrasto col fondo cielo dalla parte NE; è necessario tuttavia un filtro UHC — 200x.
SH2-142	neb	22h47m10s	+58°03.0'	q 58	Cep	24"	ottima / m. buono	è una nebulosa associata con l'ammasso aperto NGC 7380 (esteso una decina di primi e costituito da un gruppo di forma vagamente triangolare di stelle brillanti: quella più a SW è una stella azzurra di magnitudo 8.60 denominata SAO 34810); l'ammasso e immerso in una tenue chiazza lattescente che è altresì una delle parti più evidenti della nebulosa; una zona scura molto tenue si nota subito a E dell'ammasso, mentre a S un'altra chiazza scura più pronunciata sembra formare una sorta di baia; ancora più a S si estende una zona chiara molto estesa e sfumata; 4 stelline quasi allineate costituiscono la propaggine SE dell'ammasso e a E di queste ultime un'altra tenue chiazza debolmente luminosa aggetta per 4 o 5 primi — 110x con filtro O III.
SH2-146	neb	22h49m30s	+59°55.1'		Cep	28"	m. buona / m. buono	sembra come divisa in 2: una parte molto debole orientata da E a W con dimensioni grosso modo 60"×30" e una debolissima più piccola situata a ridosso S; è appena più evidente scalando a 179x con l'O III, ma così facendo le 2 parti si "fondono" insieme.
SH2-148	neb	22h56m18s	+58°30.9'		Cep	28"	m. buona / m. buono	debole chiazza approssim. rotonda con Ø di 1.5'; c'è una coppia di stelline decentrata verso N; quest'ultima è formata da una componente abbastanza brillante e da una debole doppia molto serrata; poco meglio evidente scalando a 179x con filtro O III.
SH2-149	neb	22h56m26s	+58°32.2'		Cep	28"	m. buona / m. buono	piccola e debole, estesa una 30-ina di secondi; c'è una coppia sbilanciata di stelline all'interno; la visione non migliora con l'O III e anzi sembra meglio evidente a 495x.
SH2-152	neb	22h58m42s	+58°47.2'		Cas	28"	m. buona / m. buono	è una piccola chiazza lattescente estesa 1' e grosso modo circolare con una stellina abbastanza brillante decentrata verso S; come nel caso di SH2-149 anche qui è presente una stringa di debolissime stelline a ridosso SE, mal risolvibile a 495x che dànno l'impressione di un distaccamento nebulare dalla zona principale.
SH2-153	neb	22h59m13s	+58°44.7'		Cas	28"	m. buona / m. buono	è un indistinto lucore esteso 2' o 3' con al centro una doppia sbilanciata; è tuttavia difficile riconoscerlo da un eventuale effetto di riverberazione indotto dalle stelline di campo; la visione non sembra migliorare con l'O III; meglio comunque scalare a 179x.
SH2-157	neb	23h16m08s	+60°02.5'	q 58	Cas	28"	m. buona / m. buono	chiazza circolare con Ø di 1.5' molto diffusa e relativamente facile da vedere a 179x con filtro O III; c'è una stellina abbastanza brillante al centro che ha una debole compagna a ridosso NW; è delimitata da 2 stelline, a ridosso S e NW; a 495x è sempre ben visibile, ma sembra più piccola (in realtà fa parte di un vasto complesso nebulare che tuttavia non sono riuscito a vedere).
SH2-212	neb	04h40m38s	+50°27.5'		Per	24"	m. buona / m. buono	è una debole chiazza lattescente molto stemperata sul fondo cielo e di forma grosso modo circolare con Ø di ~ 3' che circonda il piccolo ammasso aperto NGC 1624 (non è riportata sull'Uranometria)— 450x.
SH2-308	neb	06h54m13s	−23°55.7'		CMa	24"	m. buona / ottimo	debole nebulosità molto estesa e quasi centrata sulla stella azzurra di Wolf-Rayet denominata EZ CMa (situata 15' a N di o1 CMa); è osservabile con un certo agio solo a 110x con filtro O III; visualmente sembra però estendersi solo per ~ 180°; la porzione occidentale, la più evidente ed estesa una 20-ina di primi, arriva a lambire un piccolo triangolo di stelle brillanti situato a 18' SW della EZ; la parte che si estende da NW a NNE della EZ è invece più evanescente, presenta irregolarità più marcate e tende a confondersi nel background ricco di stelle. Le zone osservabili sono grosso modo quelle che nell'immagine pubblicata appaiono rosate.
SH2-311	neb	07h52m24s	−26°25.2'	q 320	Pup	24"	ottima / ottimo	è un oggetto esteso e contrastato se osservato a 124x con filtro UHC (il contrasto è effettivamente maggiore con questo filtro che con l'O III); la parte più brillante è rotondeggiante, con Ø di 4' e presenta 2 baffi sfumati, posti grosso modo a 90°, alle estremità NE e SW; un'ampia zona più tenue, estesa come il corpo principale, sfuma verso N; una piccola zona scura rotonda si trova decentrata verso SE; 2 lobi estesi e molto tenui si trovano a una 15-ina di primi verso NE e sono separati da una canalina scura che si protende verso SW sino al corpo principale, lambendo verso E una "V" di stelline orientata da E a W facente parte dell'ammasso Haffner 18; il lobo a SE è più evidente e meno esteso; un'altra piccola zona molto debole, lattescente denominata LDN 1066, fa da sfondo a 3 stelline abbastanza luminose facenti parte dell'ammasso aperto Haffner 19.
Stephenson 1	aa	18h53m36s	+36°55.0'	q 117	Lyr	10"	buona / buono	è un gruppo stellare molto disperso, difficile da riconoscere come tale dal fondo cielo; lo segnalo unicamente per l'interessante contrasto cromatico delle tre componenti più brillanti, azzurra arancione e verde; la stella arancia è la Delta[2] Lyrae, mentre quella verde è la Delta[1]
Stock 1	aa	19h35m47s	+25°10.5'	q 162	Vul	6"	discreta / buono	oggetto molto esteso che contiene una 20-ina di stelle brillanti, fra cui una di 8ª grosso modo al centro, e parecchie altre più deboli; una stella arancione molto luminosa si trova al margine NW; ma tutto sommato è un oggetto poco interessante, anche scalando a 30x.
Stock 2	aa	02h15m35s	+59°32.0'	q 37	Cas	6"	buona / buono	gruppo esteso e disperso di stelle di luminosità abbastanza uniforme già visibile nel cercatore 6×30; appare più facilmente in un binocolo quando si osserva il Doppio Ammasso di Perseo situato 2.5' più a S.
Stock 3	aa	01h12m03s	+62°16.4'	q 16	Cas	10"	m. buona / buono	piccolo gruppo assai povero e serrato di 6 componenti delimitato da un terzetto di stelle di cui 2 brillanti.
Stock 4	aa	01h52m42s	+57°04.0'	q 37	Per	16"	buona / ottimo	è di forma vagamente rettangolare, molto ricco e di dimensioni 20'×10'; le stelline più brillanti ricordano, molto vagamente, una scatola aperta con dentro un oggetto a forma di cuore — 188x.
Stock 5	aa	02h04m44s	+64°21.4'	q 17	Cas	10"	buona / ottimo	strana conformazione stellare che ricorda una paletta per schiacciare le mosche; forse, però, il "manico" non appartiene all'ammasso.
Stock 7	aa	02h29m45s	+60°40.0'	q 37	Cas	24"	m. buona / discreto	è formato da una dozzina o poco più di stelle; se ne notano 4 brillanti poste ad arco: quella più a S è una doppia stretta sbilanciata; un'altra doppia stretta, ma stavolta omogenea, si trova subito a W; una terza doppia, meno stretta, è situata a W dell'arco principale; altre 4 stelline più deboli sono presenti a ridosso delle più brillanti. Riportato sull'Uranometria come Mrk 6 — 340x.
Stock 8	aa	05h28m07s	+34°25.4'	q 97	Aur	10"	buona / discreto	piccolo gruppo disperso di componenti che tendono a confondersi col background e con al centro una stella brillante di 7ª grandezza; è situato 7' scarsi a SE della φ Aurigae di 5ª grandezza.
Stock 10	aa	05h39m00s	+37°52.0'	q 97	Aur	10"	ottima / buono	oggetto molto disperso esteso una 20-ina di primi; è praticamente delimitato da una coppia di stelle brillante a NE e da una di luminosità simile a SW (presenza di chiarore lunare).
Stock 19	aa	00h04m39s	+56°04.9'	q 35	Cas	10"	discreta / discreto	gruppo povero e disperso di una decina di stelle fra cui un terzetto con componenti serrate: appare come nello schizzo riportato sul web.
Stock 23	aa	03h16m17s	+60°02.1'	q 38	Cam	6"	m. buona / m. buono	gruppo molto serrato di una decina di stelle facilmente visibile con qualsiasi ausilio ottico.
Stock 24	aa	00h39m50s	+61°57.6'	q 16	Cas	6"	buona / ottimo	molto compatto, nebuloso a 30x, mentre a 90x si contano 5 stelle più una doppia abbastanza brillante al bordo SE.
Terzan 7	ag	19h17m44s	−34°39.5'	q 379	Sgr	16"	m. buona / m. buono	è una debolissima chiazza assai stemperata e irrisolta; a 270x appare solo in visione distolta, grosso modo rotonda con Ø pari ai 2/3 della distanza delle 2 stelline di riferimento: 2' SE e 1.5' SW.
Terzan 8	ag	19h41m45s	−34°00.0'	q 380	Sgr	16"	m. buona / m. buono	è un'altra debolissima chiazza irrisolta del Ø max di 50"-60" che appare in visione distolta a 270x (a 132x non l'ho visto).
Tombaugh 4	aa	02h29m11s	+61°47.1'		Cas	24"	m. buona / discreto	è una debole chiazza circolare con Ø di 2.5' e in gran parte irrisolta; poche stelle si staccano dal fondo lattiginoso a 340x: la più brillante si trova all'estremità SE.
Tombaugh 5	aa	13h47m44s	+59°05.4'	q 39	Cam	10"	buona / discreto	debole, di forma vagamente quadrangolare; stelle di luminosità molto disuniforme.
Ton 469	qso	09h58m21s	+32°24.0'		Leo	24"	buona / buono	è una stellina facile da vedere situata poco meno di 2' a N di NGC 3067 — 450x.
Trumpler 1	aa	01h35m40s	+61°17.2'	q 16	Cas	10"	buona / discreto	gruppetto molto serrato di una decina di stelle le cui 4 più brillanti sono perfettamente allineate in direzione NE-SW e pressoché equidistanti (riportato sul Megastar come Collinder 15).
Trumpler 2	aa	02h36m53s	+55°54.9'	q 38	Per	6"	buona / buono	gruppo disperso di poche stelle luminose poste a "×" allungata, le più brillanti delle quali sono una decina; l'oggetto è facilmente riconoscibile nel 12×50 (riportato sul Megastar come Collinder 29).
Trumpler 3	aa	03h12m00s	+63°11.0'	q 18	Cas	6"	buona / ottimo	è di forma irregolare, alquanto disperso, facilmente visibile nel cercatore; le 3 stelle brillanti allineate situate grosso modo nel mezzo sembrano immerse in una chiazza lattescente, ma trattasi quasi certamente di un effetto ottico perché a 90x questo scompare; si contano una 20-ina di componenti su un'area di circa 20' (riportato sul Megastar come H 1).
Trumpler 6	aa	07h26m23s	−24°12.7'	q 319	CMa	10"	buona / buono	piccolo gruppo disperso di una 20-ina di stelle deboli sparse su un'area estesa 5' o 6'; è costituita da 2 piccoli filari di stelline orientati da N a S (riportato sul Megastar come Collinder 145).
Trumpler 7	aa	07h27m21s	−23°58.0'	q 319	CMa	10"	buona / buono	è più o meno esteso come Trumpler 6, ma è piuttosto singolare e interessante se osservato a bassi ingrandimenti; è riportato sul Megastar come Collinder 146.
Trumpler 9	aa	07h55m40s	−25°53.2'	q 320	Pup	6"	m. buona / ottimo	oggetto peculiare formato da 5 stelle molto luminose foggiate a "punta di lancia" con all'interno un piccolo gruppo assai serrato di 9 stelline deboli che ricordano una "Z"; queste ultime, però, appaiono distintamente solo a 86x (noto anche come Collinder 168 o H 2).
Trumpler 26	aa	17h28m30s	−29°28.0'	q 376	Sco	6"	buona / buono	piccolo gruppo disperso le cui stelle più brillanti sembrano disposte a guisa di stella a 3 punte con quella orientale più corta; è riportato sull'Uranometria come Collinder 331 e sul Megastar anche come H 15.
Trumpler 30	aa	17h56m24s	−35°19.0'	q 377	Sco	6"	buona / buono	è una chiazza fortemente granulata, seppur irrisolta a 30x, estesa una dozzina di primi e situata quasi a ridosso SE di M7; riportato sul Megastar come Collinder 355 o H 18.
Trumpler 33	aa	18h24m40s	−19°43.5'	q 339	Sgr	10"	m. buona / m. buono	oggetto molto povero e relativamente compatto costituito da 6 o 7 stelle principali; ci sono 3 stelle in fila orientate da NNE a SSW (quella più meridionale, arancione, è la SAO 161436 di magnitudo 7.5) separate da 1' di distanza fra loro; un'altra stella arancione più debole si trova a 6' o 7' verso SW (riportato sul Megastar come Collinder 378).
Trumpler 34	aa	18h39m48s	−08°28.0'	q 295	Sct	10"	buona / buono	piccolo gruppo di stelle molto deboli che a 60x appare soltanto come una chiazza lattescente leggermente granulata; a 178x si riescono a contare non più di 7 o 8 componenti (riportato sul Megastar come Collinder 387).
Trumpler 35	aa	18h43m00s	−04°13.5'	q 250	Sct	10"	buona / buono	è molto allungato da NW a SE, esteso per 7' e leggermente arcuato; a 178x si contano facilmente una dozzina di componenti (riportato sul Megastar come Collinder 388).
UM 617	qso	13h51m50s	−00°07.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	è appena percettibile a 450x, ma è meglio non scalare gli ingrandimenti.
VdB 69	neb	06h08m07s	−06°22.4'		Mon	16"	m. buona / ottimo	come la vicina NGC 2183, si presenta come un debole alone, molto stemperato e diffuso attorno a una stellina; è molto evidente in visione distolta — 270x.
VdB 93	neb	07h04m31s	−10°28.0'	q 273	Mon	24"	buona / buono	a 200x con filtro deepsky si nota abbastanza facilmente una banda allungata di dimensioni grosso modo 7'×2', orientata da E a W e di luminosità uniforme; appare più netta e sottile verso E, poco più spessa e confusa dalla parte opposta; la visione è purtroppo disturbata dalla SAO 152320 di 7ª grandezza; subito a E della nebulosa c'è una piccola cascata di 7 stelline quasi allineate in direzione N-S (altresì nota come SH2-292).
Vdb-Ha 205	aa	16h56m12s	−40°40.1'	q 273	Sco	6"	buona / buono	è un piccolo asterismo formato da 5 o 6 stelle relativamente brillanti situato poco a W del centro dell'ammasso H12 — 55x.
Webb 9	ss	20h00m43s	+36°34.8'		Cyg	24"	buona / discreto	è un quintetto relativamente serrato, esteso 1' e formato da una brillante stella bianca di magnitudo 6.7 (la SAO 69252) accompagnata da un piccolo archetto di 3 compagni che si protendono verso SSW, il più brillante dei quali (la SAO 69251 di 8.6) ha una tinta tra il giallo e l'arancio; una 5ª componente di 12-esima è situata a 1' scarso NE della SAO 69252 — 210x.
2MASS 00000892 +0817337	gx	00h00m09s	+08°17.6'		Eri	24"	m. buona / discreto	molto piccola, compatta e con condensazione centrale abbastanza evidente, rotonda con Ø di 10"-20" (situata 1' NNE di UGC 12890) — 450x.
2MASS 00182148 +3813287	gx	00h18m21s	+38°13.4'		And	24"	buona / discreto	è un oggetto molto piccolo, esteso pochi secondi che appare in visione distolta a ridosso SE di MCG+6-1-24 — 450x.
2MASS 00254248 +3005308	gx	00h25m43s	+30°05.6'		And	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso SW — 450x.
2MASS 00412967 +4051015	knot	00h41m30s	+40°51.0'		And	24"	m. buona / ottimo	in M31 — è una debole chiazza poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 30-ina di secondi situata 3' a S di G96: dovrebbe quindi trattarsi o di un'associazione stellare, o di una regione H II — 450x.
2MASS 01152772 +2003227	gx	01h15m27s	+20°03.5'		Psc	24"	m. buona / m. buono	forma una coppia serrata con 2MASS 01152855+2003200 situata a ESE — sono due elusive galassiette non separabili a 450x (impossibile tentarlo a 580x, perché il campo negli immediati dintorni è virtualmente depleto); appaiono a tratti come un unico oggetto orientato appunto da WNW a ESE ed esteso una 20-ina di secondi.
2MASS 01262548 +1911311	gx	01h26m25s	+19°11.5'		Psc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e compatta, rotonda con Ø di 10"-15"; sarebbe una galassietta abbastanza facile se non fosse immersa nell'intenso alone della ρ Piscium di 5ª grandezza situata a neanche 3' SW (da non confondere con IC 113, un oggetto inesistente che secondo il SIMBAD sarebbe situato una 40-ina di primi a NNW) — 450x.
2MASS 01334014 +3020554	knot	01h33m41s	+30°21.2'		Tri	24"	ottima / m. buono	regione H II in M33: molto debole e di luminosità uniforme, molto allungata da ENE a WSW ed estesa oltre 2'; equidistante con una stellina di 14-esima a NNW e la SAO 54783 di 8ª grandezza — 450x.
2MASS 01513028 −0412042	gx	01h51m30s	−04°12.1'		Cet	24"	m. buona / mediocre	è una piccola galassietta diffusa, di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 20-ina di secondi situata a poco più di 1' NNE della SAO 129535 di 7ª grandezza; una stellina abbastanza brillante di 13-esima si trova a 30" ESE — 450x.
2MASS 02084748 +3041271	gx	02h08m48s	+30°41.5'		Tri	28"	m. buona / ottimo	appare elusivamente come una stellina appena percettibile a 1' SW di una stellina evidente — 495x.
2MASS 02134998 +3152019	gx	02h13m50s	+31°52.0'		Tri	28"	m. buona / ottimo	molto piccola, condensata e molto debole, rotonda con Ø di 10"-12", appare in visione distolta a ~ 1' WNW di CGCG 504-34 — 495x.
2MASS 02333490 +4120422	gx	02h33m35s	+41°20.7'		And	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina appena percettibile a 1' W di CGCG 539-44 — 450x.
2MASS 02352228 +1938468	gx	02h35m22s	+19°38.8'		Ari	24"	m. buona / buono	piccola e debolissima, appare abbastanza facilmente in visione distolta a 1' SW di CGCG 462-29, ma non bisogna scendere sotto i 450x; è grosso modo rotonda con Ø di una 15-ina di secondi.
2MASS 02401735 +4155496	gx	02h40m18s	+41°55.8'		Per	28"	ottima / buono	baffo di luce molto tenue orientato da E a W ed esteso 30"-35"; c'è una stellina appena percettibile al bordo W — 495x.
2MASS 06500464 +2622498	gx	06h50m05s	+26°22.8'		Gem	24"	ottima / discreto	appare elusivamente come una stellina appena percettibile e debolmente sfuocata a ridosso SE di CGCG 115-20 — 450x.
2MASS 07392934 +5532582	gx	07h39m29s	+55°33.0'		Lyn	28"	buona / buono	appare come una stellina molto debole e appena diffusa a ridosso E di CGCG 262-15 con la quale forma una coppia serrata interagente — 495x.
2MASS 07520522 +2328513	gx	07h52m05s	+23°28.8'		Gem	24"	m. buona / buono	appare come una stellina appena percettibile a ridosso W di IC 477 — 450x.
2MASS 08035300 +2631233	gx	08h03m53s	+26°31.4'		Cnc	24"	ottima / buono	v. IC 491
2MASS 08245096 −0250403	gx	08h24m51s	−02°50.7'		Hya	24"	m. buona / buono	(situata 1' scarso a ENE di CGCG 4-18) — appare elusivamente a ridosso S di una stellina appena percettibile; sembra molto piccola, estesa sì e no 10"-15"; meglio spingere a 580x.
2MASS 08272988 +4129305	gx	08h27m30s	+41°29.5'		Lyn	28"	m. buona / buono	appare come una stellina appena percettibile che salta fuori a momenti quasi a ridosso E di CGCG 208-4 — 495x.
2MASS 08314342 +3940080	gx	08h31m43s	+39°40.8'		Lyn	28"	m. buona / buono	è una sorta di debolissimo nodulo che appare a tratti a ridosso W di MAC 0831+3940, quasi volesse "allungarla"; non più estesa di una decina di secondi — 495x.
2MASS 08341972 +4805141	gx	08h34m19s	+48°05.2'		UMa	28"	m. buona / buono	appare elusivamente e solo a momenti a ridosso W di MCG+8-16-13, come se si trattasse di una stellina allineata ed equidistante con 2 stelline molto deboli a N — 495x.
2MASS 08342082 +4804233	gx	08h34m21s	+48°04.4'		UMa	28"	m. buona / buono	molto piccola e debolissima, estesa sì e no 10", appare in visione distolta a 1' scarso S di MCG+8-16-13 — 495x.
2MASS 08380907 +2517226	gx	08h38m09s	+25°17.4'		Cnc	24"	ottima / molto buono	molto piccola, poco diffusa, rotonda con Ø di 10"-12"; c'è una stellina abbastanza brillante a ridosso S — 450x.
2MASS 09144310 +0735420	gx	09h14m43s	+07°35.7'		Cnc	24"	m. buona / ottimo	molto piccola e debole, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina quasi a ridosso verso E — 450x.
2MASS 09362290 +0302540	gx	09h36m23s	+03°02.9'		Hya	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, rotonda con Ø di 10"-12"; appare in visione distolta, ma non bisogna scendere sotto i 450x.
2MASS 09430389 +1409120	gx	09h43m04s	+14°09.2'		Leo	24"	m. buona / buono	appare elusivamente come una stellina appena percettibile situata a ridosso NE di CGCG 63-50 — 450x.
2MASS 09461775 −1819359	gx	09h46m18s	−18°19.6'		Hya	24"	m. buona / buono	debolissima e molto piccola, diffusa e di luminosità uniforme; situata sul lato occidentale di un piccolo triangolo isoscele col vertice più acuto che punta verso SSW (situata 13' a ENE di NGC 2989) — 450x.
2MASS 09510713 +2616534	gx	19h51m07s	+26°16.8'		Leo	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina appena percettibile situata a ridosso SW di CGCG 152-76 — 450x.
2MASS 10150266 +0540369	gx	10h15m03s	+05°40.6'		Sex	24"	m. buona / m. buono	situata una 40-ina di secondi a W di CGCG 36-71 è anche questa una galassietta molto piccola, di dimensioni simili, ma decisamente più debole; appare tuttavia facilmente in visione distolta a 450x.
2MASS 10203209 −0228231	gx	10h20m32s	−02°28.4'		Sex	24"	m. buona / m. buono	debole, ma facilmente visibile a 450x come una stellina sfuocata situata a 1' WSW di UGC 5586; la galassietta presenta un Ø di una decina di secondi.
2MASS 10242067 +4142362	gx	10h24m21s	+41°42.6'		UMa	28"	ottima / ottimo	è una minuscola galassietta estesa < 10" situata a ridosso W di CGCG 211-54 e che appare solo come una stellina appena percettibile — 495x.
2MASS 10244497 +1459073	gx	10h24m45s	+14°59.2'		Leo	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia ravvicinata con CGCG 94-37 situata 30" a SSE — molto piccola e debole, ma visibile abbastanza facilmente spingendo a 580x: appare a tratti condensata con Ø di 10"-12"; c'è una stellina a ridosso SE *(presenza di debole chiarore lunare)*.
2MASS 10260157 +0527571	gx	10h26m04s	+05°28.3'		Sex	24"	m. buona / discreto	molto piccola, appare elusivamente in visione distolta a 1' SE di CGCG 37-34, ma non sembra più estesa di 10"-12" — 450x.
2MASS 10374886 +3947412	gx	10h37m49s	+39°47.6'		UMa	28"	m. buona / buono	è oggetto molto piccolo e debolissimo, esteso non più di 10" situato 1' a S di MAC 1037+3948 — 495x.
2MASS 10400680 +3905572	gx	10h40m07s	+39°06.0'		LMi	28"	ottima / ottimo	appare solo come una stellina molto debole e leggermente sfuocata situata a ridosso S della debolissima gx MCG+7-22-40 — 495x.
2MASS 11000364 +4309367	gx	11h00m04s	+43°09.6'		UMa	28"	ottima / m. buono	molto piccola e molto debole, ma appare facilmente in visione distolta tra 2 stelline brillanti, forse rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 495x.
2MASS 11005018 +1735408	gx	11h00m50s	+17°35.7'		Leo	24"	m. buona / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto forse rotondo con Ø di 10"-12" situato 1' a NE di NGC 3487; è visibile in visione distolta, ma è meglio non scendere sotto i 450x.
2MASS 11005967 +1213498	gx	11h01m00s	+12°13.8'		Leo	24"	m. buona / buono	forma una coppia ravvicinata con PGC 1405923 (alla quale si rimanda).
2MASS 11012325 +0433140	gx	11h01m23s	+04°33.2'		Leo	24"	m. buona / buono	molto piccola, relativamente compatta e a tratti condensata, rotonda con Ø < 20" — 450x.
2MASS 11101286 +0447037	gx	11h10m13s	+04°47.0'		Leo	24"	discreta / m. buono	debolissima ed estesa una decina di secondi; appare a tratti in visione distolta spingendo a 570x a una 30-ina di secondi NW di una stellina brillante (situata 4' a SW di UGC 6212).
2MASS 11104958 +1009091	gx	11h10m50s	+10°09.2'		Leo	28"	ottima / buono	molto piccola e molto debole, poco diffusa e a tratti condensata, in visione distolta appare orientata da NW a SE con dimensioni grosso modo di 20"×10" — 495x.
2MASS 11165439 +4227020	gx	11h16m54s	+42°27.0'		UMa	28"	ottima / m. buono	v. PGC 2199341
2MASS 11194608 +5428025	gx	11h19m46s	+54°28.0'		UMa	28"	ottima / m. buono	appare come una stellina molto debole e appena sfuocata a 1' W di UGCA 233 *(presenza di chiarore lunare)* — 495x.
2MASS 11203926 −0719279	gx	11h20m39s	−07°19.5'		Crt	24"	m. buona / m. buono	appare in visione distolta come una debolissima stellina sfuocata situata a 1' S di PGC 34728 — 450x.
2MASS 11253305 +5110202	gx	11h25m33s	+51°10.3'		UMa	28"	ottima / m. buono	appare a tratti come una stellina appena percettibile a ridosso S di CGCG 268-33 — 495x.
2MASS 11515876 +4649105	gx	11h51m59s	+46°49.2'		UMa	28"	ottima / ottimo	appare come una debolissima stellina leggermente sfuocata a ridosso NE di CGCG 243-20 — 495x.
2MASS 12044446 +4835496	gx	12h04m44s	+48°35.5'		UMa	28"	ottima / ottimo	appare a tratti come una stellina appena percettibile subito a NE di MAC 1204+4835A — 495x.
2MASS 12124511 +4538063	gx	12h12m45s	+45°38.1'		CVn	28"	m. buona / ottimo	è una sorta di minuscola "eco" luminosa di una stellina situata a ridosso verso S; non sembra più estesa di 10" — 495x.
2MASS 12340686 +6433073	gx	12h34m07s	+64°33.7'		Dra	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina appena percettibile a 1' scarso S di UGC 7730 — 450x.
2MASS 13015047 +0949167	gx	13h01m50s	+09°49.3'		Vir	24"	m. buona / m. buono	molto debole, poco diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; forma un piccolo triangolo isoscele con una coppia di stelline a NW e WNW — 450x.
2MASS 13095461 +6014238	gx	13h09m55s	+60°14.4'		UMa	24"	m. buona / ottimo	debolissima e molto piccola, estesa sì e no una decina di secondi (poco più di una stellina sfuocata); appare in visione distolta quando si osserva CGCG 294-25 situata 1.5' a SE; allineata ed equidistante con due stelline a NE — 450x.
2MASS 13104893 +5636422	gx	13h10m49s	+56°36.7'		UMa	24"	m. buona / ottimo	appare come una debolissima stellina sfocata quasi a ridosso SW di MCG+10-19-49 — 450x.
2MASS 13105725 +0837385	gx	13h10m57s	+08°37.7'		Vir	24"	m. buona / ottimo	molto debole e diffusa, di luminosità uniforme, allungata da NE a SW con dimensioni 40"×20"; c'è una stellina a 1.5' NE, una molto debole subito a SE e una 3ª appena percettibile quasi a ridosso SW — 450x.
2MASS 13244054 +5302463	gx	13h24m41s	+53°02.8'		UMa	28"	m. buona / buono	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø < 20"; c'è una stellina a 1' E e una a 1.5' verso S — 495x.
2MASS 13505100 +0219386	gx	13h50m51s	+02°19.6'		Vir	24"	m. buona / m. buono	appare come una stellina appena percettibile a ridosso NW di UGC 8750 — 450x.
2MASS 14292421 +1036573	gx	14h29m24s	+10°36.9'		Boo	24"	ottima / ottimo	piccolo e debolissimo oggetto diffuso esteso sì e no 10"-12" situato a ridosso S di una stellina brillante; poco meglio evidente spingendo a 580x.
2MASS 14464247 +1058541	gx	14h46m42s	+10°58.9'		Boo	24"	buona / ottimo	piccola, diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; c'è una stellina a ridosso S — 450x.
2MASS 15152312 +2555183	gx	15h15m23s	+25°55.3'		Boo	24"	buona / buono	debolissima chiazza diffusa e stemperata sul fondo cielo, grosso modo rotonda con Ø di una 30-ina di secondi; c'è una stellina brillante subito a N che ne confonde un po' la forma; un'altra stellina percettibile solo a momenti si trova a ridosso W — 450x.
2MASS 15240742 +2953202	gx	15h24m07s	+29°23.3'		CrB	28"	m. buona / m. buono	forma una coppia ravvicinata con PGC 1881700 situata una 20-ina di secondi a SSE; è poco più debole di quest'ultima, forse rotonda con Ø simile — 495x.
2MASS 15284478 +0723570	gx	15h28m45s	+07°24.0'		Ser	24"	m. buona / ottimo	appare come una debolissima stellina quasi a ridosso verso N di CGCG 49-171 — 450x.
2MASS 15315126 +4525241	gx	15h31m51s	+45°25.4'		Boo	28"	m. buona / discreto	appare come una stellina molto debole a ridosso SW di CGCG 249-27 — 495x.
2MASS 15335474 +3249339	gx	15h33m55s	+32°49.5'		CrB	28"	m. buona / m. buono	assieme alla successiva forma una coppia di debolissime galassiette situate rispettivamente a NW e SW di CGCG 194-10; sono entrambe molto piccole, estese sì e no 10"; la seconda è poco più evidente — 495x.
2MASS 15335490 +3248149	gx	15h33m55s	+32°48.2'		CrB	28"	m. buona / m. buono	v. 2MASS 15335474+3249339
2MASS 15585175 +5922450	gx	15h58m52s	+59°22.7'		Dra	28"	m. buona / m. buono	appare come una debolissima stellina a tratti leggermente sfuocata e situata un paio di primi a SW di MCG+10-23-12 — 495x.
2MASS 16015919 +1233447	gx	16h01m59s	+12°33.7'		Ser	24"	ottima / ottimo	è un piccolo e debolissimo oggetto esteso una 10-ina di secondi situato subito a S di NGC 6029 — 450x.
2MASS 16022629 +6420303	gx	16h02m26s	+64°20.5'		Dra	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina debolmente sfuocata subito a S di CGCG 319-40 — 450x.
2MASS 16210889 +1307423	gx	16h21m09s	+13°07.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	piccolo oggetto molto debole, compatto e leggermente diffuso situato a ridosso S di CGCG 80-8 — 450x.
2MASS 16251480 +3019296	gx	16h25m15s	+30°19.5'		Her	28"	ottima / m. buono	appare come una debolissima compagna irrisolta a S di una stellina situata a ridosso NW di CGCG 168-8 — 495x.
2MASS 16330511 +1145408	gx	16h33m05s	+11°45.7'		Her	24"	m. buona / m. buono	molto piccola, debole e relativamente compatta, rotonda con Ø di 10"-15"; è situata quasi a ridosso SW di una coppia serrata di stelline (una terza stellina allineata e di luminosità simile si trova 1' scarso più a S) — 450x.
2MASS 16594209 +6826353	gx	16h59m43s	+68°26.6'		Dra	24"	m. buona / ottimo	appare come una stellina percettibile solo a momenti a ridosso NE di PGC 59387 — 450x.
2MASS 17110127 +3941260	gx	17h11m01s	+39°41.4'		Her	28"	m. buona / m. buono	poco più evidente di PGC 59760, dalla quale dista 1' verso E, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi e condensata — 495x.
2MASS 17112244 +3941319	gx	17h11m22s	+39°41.5'		Her	28"	m. buona / m. buono	molto debole e molto piccola, forse rotonda con Ø di 12"-15" e nucleo stellare abbastanza evidente; c'è una debole stellina subito a N e una appena percettibile diametralmente opposta, ma quest'ultima è risultata essere la 2MASS 17112339+3940470; una stella brillante si trova 1.5' a NW — 495x.
2MASS 17112339 +3940471	gx	17h11m23s	+39°40.7'		Her	28"	m. buona / m. buono	appare come una stellina appena percettibile solo a momenti subito a S della galassietta precedente — 495x.
2MASS 17152513 +4351466	gx	17h15m25s	+43°51.8'		Her	28"	ottima / ottimo	molto piccola e a tratti condensata, rotonda con Ø di una decina di secondi — 495x.
2MASS 17240934 +5326553	gx	17h24m09s	+53°26.9'		Dra	28"	m. buona / ottimo	molto debole e molto piccola, in visione distolta appare grosso modo rotonda con Ø di 10"-12" (situata 1' a S di CGCG 277-41) — 495x.
2MASS 17400627 +3348306	gx	17h40m06s	+33°48.5'		Her	24"	m. buona / buono	appare come una sorta di stellina debolmente sfocata al bordo SE di CGCG 199-5 — 450x.
2MASS 17422270 +3855025	gx	17h42m23s	+38°55.0'		Her	28"	ottima / ottimo	molto piccola, debole e condensata, rotonda con Ø < 20"; situata al vertice settentrionale di un piccolo triangolo formato da due stelle brillanti — 495x.
2MASS 17465537 +4542385	gx	17h46m55s	+45°42.7'		Her	24"	m. buona / discreto	piccola, debolissima e diffusa, forse rotonda con Ø di una decina di secondi; c'è una stellina subito a E — 450x.
2MASS 17572518 +5043414	gx	17h57m32s	+50°13.5'		Dra	24"	m. buona / m. buono	molto debole, piccola e condensata; in visione distolta non sembra più estesa di 10" o 12" (situata 1' a E di NGC 6515) — 450x.
2MASS 19212557 +4353167	gx	19h21m26s	+43°53.3'		Cyg	28"	m. buona / ottimo	appare come una stellina molto debole e sfuocata situata 30" a NW di PGC 63116 (erroneamente riportata sul Megastar con questa sigla) — 495x.
2MASS 20064562 +7157055	gx	20h06m46s	+71°57.1'		Dra	24"	m. buona / discreto	appare soltanto come stellina percettibile solo a momenti situata a ridosso W di MCG+12-19-1 — 450x.
2MASS 20240580 +1545243	gx	20h24m06s	+15°45.4'		Del	24"	m. buona / ottimo	forma una coppia serrata con CGCG 447-3 situata a ridosso verso W — a 580x appare rotonda con Ø 15" e una condensazione centrale abbastanza evidente abbastanza evidente (altresì denominata LEDA 64615).
2MASS 23054082 +2842118	gx	23h05m41s	+28°42.2'		Peg	24"	m. buona / ottimo	appare elusivamente e solo a momenti, ma rimane di aspetto stellare anche a 450x; situata tra CGCG 496-39 e una stellina a NW — 450x.
2MASS 23321252 +3105481	gx	23h32m13s	+31°05.8'		Peg	24"	m. buona / ottimo	molto debole, piccola, diffusa e di luminosità uniforme, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi; disturbata da una stellina brillante situata 1' a S; un'altra stellina, decisamente più debole, si trova a subito a SE della galassietta — 450x.
2MASS 23411150 +7815062	gx	23h41m12s	+78°15.7'		Cep	24"	buona / buono	piccola, debole, poco diffusa e a tratti condensata, rotonda con Ø di una 15-ina di secondi — 450x.
2MASS 23573106 +4726599	gx	23h57m31s	+47°27.0'		And	24"	ottima / ottimo	piccolo oggetto diffuso molto debole esteso una decina di secondi e a tratti irregolare che appare abbastanza facilmente a ridosso N di CGCG 548-18 — 450x.
2MASS 23574356 −2135208	gx	23h57m44s	−21°35.4'		Cet	24"	ottima / mediocre	appare come una stellina molto debole a 1' SE di ESO 538-10 — 340x.